12
1 S
12

NAZIONALE
55
1 I
BIBLIOTECA VITT. EMANUELE
ROMA

Ex Bibliotheca
majori Coll. Rom.
Societ. Jesu

Digitized by Google

Ff. 11. 2.

Digitized by Google

Mss. R. B. N. fo. Reuchlian non et add. Bibl. nat. Coll. Sorb.

ΠΕΔΑΚΙΟΥ

ΔΙΟΣΚΟΡΙΔΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΖΑΡΒΕΩΣ ΤΑ ΣΩΖΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΑ.

PEDACII DIOSCORIDIS ANAZARBAEI OPERA QVÆ EXTANT OMNIA.

Ex noua interpretatione IANI-ANTONII SARACENI Lugdunæi, Medici.

Addita sunt ad calcem eiusdem Interpretis Scholia, in quibus variæ codicum variorum lectiones examinantur, diuersæ de Medica materia, seu priscorum, seu etiam recentiorum sententiæ proponuntur, ac interdum conciliantur: ipsius denique Autoris corruptiora, obscuriora, difficiliora, loca restituuntur, illustrantur, & explicantur.

Sumtibus hæredum Andreæ Wecheli,
Claudii Marnii, & Ioan. Aubrii.
M D XCVIII.
Cum S. Cæsareæ Maiestatis Priuilegio.

7 4193

SVMMA PRIVILEGII.

S. CÆSAREÆ *Maiestatis Priuilegio cautum est Andreæ Wecheli hæredibus, Claudio Marnio, & Ioanni Aubrio, ne quis Pedacij Dioscoridis Anazarbæi opera, quæ omnia iam noua interpretatione græco-latina Iani-Antonij Saraceni Lugdunæi, Medici, donata in lucem prodiere, per sex annorum spatium, à prima editionis die computandum, intra fines sacri Romani Imperij, regnorum & dominiorum Cæsareæ Maiestati hæreditariorum, eodem aut diuerso charactere formave, recudere, aut alibi recudenda dare, vel alibi expressa importare, vendere, distrahere, apertè vel occultè, absque supradictorum Wecheli hæredum voluntate ac consensu præsumat. Qui secus fecerit, is non solum libris impressis, sed etiam decem auri puri marchis sine vlla venia mulctabitur; vt latius declaratum est in diplomate Cæsareo, dato Viennæ, die vigesimaquinta, mensis Maij, anno* M. D. LXXXII.

Rodulphus.

Io. Baptista Weber.

Ad mandatum S. Cæs.
Maiestatis proprium.

P. Obernburger.

HENRICO IIII.

REGI GALLIARVM ET NAVARRAE CHRISTIANISSIMO.

IMPORTVNVS haud dubie, Rex Christianissime, parúmque circumspectus, imo vero temerarius fortasse videbor, qui tuam Maiestatem hoc tempore in apparando bello Aremorico quam occupatissimam compellare, ac potius interpellare nõ erubescam. Sed mihi ipse temperare non possum, quominus eidem meas hasce qualescunque in Dioscoridem lucubrationes offeram, cui iam multis abhinc annis illas vouiatq; consecraui. Enimuero quando pro tua summa benignitate me nil minus cogitantem, misso etiam sacro Regio diplomate in Medicorum tuorum collegium cooptasti, iam tum eas parturiebat animus, simúlq; præsentiebat, iis nõ aliunde fœlicius lucem splendorémq; affulgere posse, quam si sub Augustæ Tuæ Maiestatis nomine in publicum prodirent. Etsi enim in istis, quæ mea

sunt, vt quæ sint operę leuioris, libens agnosco minime digna esse, quæ tanti præsertim Regis nomen præferant: attamen cum & Diis olim suis rustici multæque Gentes lacte supplicarent, & mola tantũ salsa litarent, quibus deerant thura: sic & ego, cum neque mihi sit in præsentia quicquam aliud ad manum, vixque mea tenuitas imposterum ampliora polliceri possit, malui hoc quantuloquoque testimonio, quam debet & seruulus Domino, & subditus Regi suo, à quo tantum etiam beneficium acceperit, reuerentiam quoquo modo profiteri, quàm cõmittere, vt tantam benignitatem videri possem silentio dissimulasse. Cæterum, quod ad scripta ipsius Dioscoridis attinet, nulla, sat scio, ne apud Regiam quidem Maiestatem indigent commendatione. Continent enim amplissimam stirpium aliarúmque id genus naturalium rerum ad summam hominum & vtilitatem, & honestissimã voluptatem comparatarum historiam, quæ nullum non hominum genus ad sui cognitionem per sese mirum in modũ alliciat. Nam & permulti iam olim Principes viri tantum ad illorum Naturæ operum contemplationem

nem

nem ſtudii adhibuerunt, vt Philoſophis etiam ac Medicis, ad quos potiſsimum ea pertinebat, minime ceſsiſſe videantur. Teſtabantur id olim varii aliquot potentiſsimorũ Regum Solomonis, Mithridatis, Iubæ, Attali & Euacis de ſtirpibus commentarii, de quibus varię loquuntur hiſtoriæ, quiq; temporum iniuria non ſine magno mortalium damno ac detrimento interciderunt. Teſtantur idipſum etiamnunc & nõnullæ ſtirpes, vti Gentiana, Lyſimachia, Clymenon, Telephium, Artemiſia, & Helenium, quas Principes quondam Maximos non puduit ſuis nominibus honeſtare: partim vt ſtudii, quo fuerãt magnopere delectati, poſteris fidem facerent, eosque ſuo etiam exemplo ad contemplanda ſuſcipiendáq; Naturæ miracula prouocarent, partim etiam vt ſempiternam ſui memoriam relinquerent. quam nõ dubitabãt vnà cum plantis ipſis repullulantibus atque reuireſcentibus quotannis eſſe quaſi reuicturam. Sed te quoq;, Rex Chriſtianiſsime, confido, mihiq; ipſe polliceor, prout es ingenio virtutum, diſciplinarũ ſcientiarumq; omnium capaciſsimo, cum primũ à grauiſsimis illis laboribus, quibus Gal-

lla tua ſalutem etiã ſuam, velut alteri parenti merito acceptam refert, reſpirare tibi Deus Optimus Maximus precibus ſuorum perpetuis exoratus conceſſerit, læuiora hæc animi quaſi relaxandi gratia minime aſpernaturum. Ego vero ſummæ, ſicuti par erit, fœlicitatis loco ponam, ſi meum hunc quodammodo factum Dioſcoridem in gratiam clientelamq; tuam comiter ac beneuole recipere Maieſtas tua non dedignabitur. Quod vnum ſupereſt, Deum Optimum Maximũ precibus omnibus obteſtari non deſinam, vt poſt domitos, ac plane debellatos hoſtes huic per te florentiſsimo Regno tuo viciniſque populis omnibus optatiſsimã pacem, eamque ſtabilem ac firmam, tandẽ aliquando largiatur, qua tũ fœliciſsime, tum quam diutiſsime perpetua cum ſacratiſsimi nominis gloria perfruantur: ac te interim nobis, qui fatorum tuorũ auſpicia ſequimur, totiq; Chriſtianæ Reipublicæ ſeruet incolumem. Kal. Mart. 1598.

Tuæ Maieſtati addictiſsimus

Jan-Antonius Saracenus
Lugdunenſis.

Ad candidum Lectorem.

CANDIDO LECTORI S.

MIRABERE *forsan, Candide Lector, vndenam mihi in mentem venerit, vt nouam Dioscoridis interpretationẽ sim aggressus: praesertim cum tot clarissimi viri eloquentia, doctrina, iudicioq; insignes, Hermol. Barbarus, Marc. Virgilius, Ianus Cornarius, & Io. Ruellius in eo vertendo magna quasi cõtentione ac dimicatione satis superq; iam pridẽ elaborarint, egregiamq; operam magna cum laude nauarint. Sed tum demũ mirari profecto desines, cum, quibus rationibus eò adductus impulsusve fuerim, tute intellexeris. Iam olim vtriusque Linguae, tum Graecae, tum Latinae peritissimum Typographum Henricum Stephanum per literas frequentiores vrgebat, piae memoriae, D. Io. Sambucus Caesareus Medicus & Historiographus, vti Regiis typis elegantioribus Dioscoridis Graecolatinum contextum mandaret, eiusq; margini missas paulo ante suas notulas, seu potius varias in eum Autorem lectiones, è complurium vetustorum codicum in diuersis Principum bibliothecis repertorum fida diligentiq; collatione à se magno labore decerptas, adiiceret. Dum vero ad opus accingit sese Stephanus, Ruellianam versionem, quam quidem ceu cateris merito anteferendam ex aduerso Graeci contextus locare cõsilium erat, deprehendit esse, vti reuera est, multis in locis paulo liberiorem, ita vt Graecis Latina non satis apte responderent: iccirco me pro ea, qua mihi cum illo intercedebat familiaritate, rogat, imo vero exorat, vt eam accuratè recognoscerem, & locorum omnium in quibus Ruellius, seu temeratum quempiam codicem secutus, seu etiam Plinio, vti fere est, nimium addictus sensa Dioscoridis illiusq; verborum vim non satis expressisse videretur, emendationẽ margini adscriberem. Sed vix dum aliquot priores paginas contulerã, cum veluti deterritus oneris grauissimi difficultate, fui coactus à proposito declinare, mutareq; sententiam. Tot enim (venia sit dicto) subinde occurrebant censura & animaduersione digna, vt*

partim odiosi laboris defugiendi gratia, partim & inuidiæ atque offensionis eorum vitandæ, qui me nimium in Ruellii manes iniurioſum ſuſpicari potuiſſent, ſatius duxerim nouam interpretationem adornare, quam alienam interpolare. In ea certe quidem non Paraphraſtæ, ſed Interpretis officio me defunctum vere affirmare poſſum, vt qui, quantum in me fuit, ne latum quidem vnguem à Dioſcoridis mente receſſerim, ac interim Pliniani ſermonis puritatem mordicus retinuerim. Sed illi, malo, iudicium faciant, qui cum illorum verſionibus meam bona fide contulerint. Vtut ſit, opus propemodum ad coronidem perduxerã, cum ecce nobis Sambucus diligẽtiſſimus ἐφηβώτατος præmatura morte præripitur. Tum Stephanus animum quaſi deſpondere, imo, quantumuis & alii complures inſtarent operi, moras varias nectere, diemque de die ducere, ſiue per iuſtas occupationes, quibus interdum diſtrahebatur, ſiue propter peregrinationes, quæ interea temporis frequentiores, ac pene perpetuæ illi fuere, non daretur promiſſum implere, fidemque datam exoluere. Atque inde adeo factum eſt, vt meæ ille in Dioſcoridem lucubrationes in ſcriniis meis pluſculis annis delituerint. Id porro, cum Andreæ Wechelí hæredes rei literariæ iuuandæ quam ſtudioſiſſimi animaduerterent, cuperentq; nõnullorum bonorum virorũ deſiderio & expectationi ſatisfacere, hoc à me tandem impetrant, eas vti patiar in hominum aſpectum lucemq; proferri. Hæ ſunt, vt ſemel dicam, operis inſtituti, ſimulq; tamdiu ad hæc vſque tempora retardati cauſa. Quod ad Græcum contextum attinet, id operam dedimus, vt quoad eius fieri poſſet, nitori ſuo priſtino reſtitueretur. Etſi enim doctiſſimi Goupyli editionem Pariſienſem, tanquam omnium, quotquot extabant, integerrimam & emendatiſſimam, religioſe ſecuti ſumus, typographica tamen ſcriptura quæ adhuc ſupererant menda, quantum fieri potuit, ſuſtulimus: quæ vero, & res ipſa, & exemplariũ, ſeu impreſſorum, ſeu etiam manu exaratorum certa fides & autoritas immutanda ſuadebant, audacter immutauimus: at nuſquã ſeu noſtris, ſeu aliorum coniecturis tantũ tribuimus, vt citra meliorum codicum fidem quicquam auſi fuerimus, eas contenti notaſſe interlineari aſteriſco, qui te, Lector, ad Scholia noſtra relegaret. Sin, quod rarius accidit, loca quædã comperimus adeo corrupta & deprauata, vt ex iis ſenſus nullus elici potuerit, neq; tamen vlli, ſeu ex coniectura, ſeu ex antiquarum lectionũ veſtigiis reme-

diole-

dió locus fuerit, aſteriſco marginem conſignauimus. Varias autem tum Clariſs. viri D. Sambuci, tum & aliorum hinc inde in Dioſcoridem deprompt as lectiones, (nam & nonnullas idem ille D. Stephanus, nonnullas etiam D. Opſopœus ex Palatinorũ exemplarium collatione nobis communicarunt) eas, inquam, etiam citra delectum, vt de iis liberum foret vnicuique iudicium, margini eidem adſcribere viſum eſt, inſuperq; nonnullas etiam Interpretum animaduerſiones & emendationes, additis perpetuo ſingulorum nominibus, ex quibus eas deſumpſimus, vt ne ſuo quenquam merito defraudaſſe videremur. Caterum noſtras annotationes ad operis calcem reiecimus, in quibus diſcrepantis à cateris interpretationis noſtræ ratio plerunque redditur, nec non & varia noſtra in Dioſcoridem coniectanea in medium proferuntur. Sed & multa ibidem obiter, ac velut in tranſcurſu reperias in Autores alios, præſertim vero Theophraſtum ac Plinium, animaduerſa, quæ ſeſe ſub manum dederunt. Denique velut ἐξ ὑπαίτιος diuerſas diſcrepantesq; de Medica materia, ſeu priſcorum, ſeu etiam recentiorum ſententias proponimus, interdumq; cõciliamus, præterea q; dubia multa, quæ paſſim occurrebant, ſoluere ac diluere nitimur. Attamen velim ſcias, eò præcipuè nos omni ſtudio incubuiſſe, vt ipſius Dioſcoridis corruptiora, obſcuriora, difficiliora que loca reſtitueremus, illuſtraremus, & explicaremus. Habes, Lector beneuole, quæ in hac editione ſint à nobis præſtita: è quibus ſi fructum aliquem percepiſſe te animaduertero, addetur animus ad alia fortaſſe maiora vtiliq; aque in apertum proferenda. Interim Vale.

IN EFFIGIEM ET MONVMENTA

PEDANI DIOSCORIDIS ANAZARBÆI COGNOMENTO PHACÆ, MEDICI ANTIQVISSIMI,

illustrata à Jano Antonio SARACENO Lugdunensi Medico & Philosopho clarissimo.

EPIGRAMMA.

MAgne Dioscorides, Medicorum gloria: vultu
Talis eras quondam, talis & ingenio.
Naevus in ore tibi dederat cognomina PHACÆ,
Sed naevus non est, quem tegit ingenium.
Ingenii monumenta tamen sunt passa ruinam,
Poscebant medicum, qua fuerant medica.
Quid non tempus edax? sciolorum audacia quid non?
Et quid non potuit Gottica barbaries?
Ecce tibi SARACENVS *adest, ad publica natus,*
Te totum sanans, omnia restituit.
Restituit decus antiquum, Tirynthius alter,
Pluraq; cum dederit commoda, plura feret.
Et sic extollit per te quoq; secula prisca,
Sic paria & per se tempora nostra probat.

JOAN. PALVDIVS Philophilus.

IN

IN EFFIGIEM

CELEBERRIMI CLARISSIMIQVE MEDICI, IANI ANTONII SARACENI.

EPIGRAMMA.

SARACENE, *Tuos vultus qui vidit, amauit:*
Hoc est, cur placeat picta tabella mihi.
Verum muta silet, Quia non fecère loquentem
Æra, nec artifices hoc potuère manu.
Ergo vt te viua spectémque habeámque tabella;
Cuius es Interpres, tractio Dioscoridem.
Illa mihi viua est & docta loquentis imago,
Nempe sui domini picta tabella manu est.
Nil hic Cous habet quod iam desideret vltrà,
Hic sunt quæ Musis inuideantur opes.
Ite, Machaoniæ iam nil latet amplius artis,
Prodítur hic prisca quicquid in arte fuit.
Iam non infesto descendant aere morbi,
Audidotes omnes nam tua penna dedit.

Paulus Stephanius.

ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΟΣΚΟΡΙΔΟΥ ΕΚΔΟΣΙΝ, ΤΗΝ ΥΠ' ΙΑΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ μετ' ἀκειβείας πλείστης ὅσης ἐκπο-νηθεῖσαν.

ΝΟΥΣΩΝ λιγαλέων ταῖς σῶμα δαμάζεται ἀμοί,
Καὶ μινύθει βιαροῖσι περιῤῥεόν, καὶ τήκεται ἀμφὶς
Ὀλλύμενον φθινυθόν τι, θεοῦ μεγάλου διὰ βουλάς,
(Ἡμετέρων, αἰ αἰ περιτέρων ἄτῃ ἡμετέρων,)
Πολλὰ Διοσκορίδης ἀληθέα φάρμακα πεφρὼς
Εὑρέμενος, χαίρας ὅ γε ἀμφοτέρας ἐπαληθεύς,
Εὑρὼν Ἀσίλω τε μαθὼν βεβολημένος οἴστρῳ.
Πολλὰ δὲ καὶ πινυτῶν πινυτῷ νόῳ ἀρηρότα
Ἀνδράσι τοῖσι πρὶν ἔλυτο, διέκρινε δ' ἄλλοθεν ἄλλα
Λεξάμενος σύμπτυμα, σοφὸν τόδε τεῦχος ἔτευξε,
Δαιδάλεον, παντοῖον, ἰαχὲς φίλοις μέγ' ὄνειαρ.
Ἔνθα πόας εὕροις καὶ δένδρεα αἰθομένοιο,
Ἠδὲ ὅσ' ὀπὶ τε καφερὴς φύεται, ἢ βένθεσι γαίης
Φαρμακόεντα μέταλλ' ὅσα γίγνεται, ὅσσ' ἐνὶ πόντῳ.
Ἔνθ' ὀφίων ἑτέρων τε σὺν ὀλοφώια θηρῶν
Ἀντιδότ' ἐκκέκριται, λύσιν θ' ἑτεραλκέα κήδευς
Ἀλλοίων ἰοῦδας. ἐπεὶ φῶτες κακοεργοὶ
Γράμμα τὸ πρὶν ἀρίδηλον ἀμαυρώσαντο νόοιο
Φθείραντες, φεῦ, φεῦ! κακὰ θηρία, ἄδηλον ἔθηκαν.
Οὐ γάρ σοι ῥίζαι ὄφελον δαιμονίη ἀνδρῶν,
Χραίσμησαι, ὅσα τ' ἄλλα ὀπίσατο αἶσαν ἐρύκειν.
Οὐ μέλος, ἢ μέρος ἦλον ἔχες παλαπίεσε πρέσβυ,
Ἰηχῦς δ' ἄλλων περιῤῥεών, βρύες ἕλκεσιν αὐτός.
Ἔνθ' εἴκ' αὖ βείζοντα ἰδοὺς δίον Σαρακηνὸν,
Τὸν νέον Ἵππαρχον τῷ πρὶν παλάμῃσι σοφῆσι
Πολλάκις εἰν ἀίδην νεκύων ἀπάνευθε πόλιν.
Κεῖνος δὴ τὸν ἄριστον ἐπ' ἰητῆσιν ἄειρεν
Ἵππαρχον, θρέψας ὀδυνηφάτα φάρμακα πάντων.
Σοὶ ποτὰ οἱ κυκεῶνα, σοὶ δ' ἐγχείσεις ὀπιγείων.
Οὐδὲ πολυμήλειος περισκαρτηρέων ἀπέφθη,
Πείνῃσιν παλίορσον ἐς αὐγὰς ἠελίοιο
Οὐλομελὴς, ὑγιὴς, φρυτανίη τ' ἄλλοις ὑγιείης.
Σοὶ δ' ἅμα παύσαιτ' ὀμβρηδὸν, ὁ δὲ παύσαιτο κάμινος.
Χαίροις δὴ Σαρακηνὲ ἔργον μέγα ἐκπαλυπτύσας
Ὄφελον, ὀφελίτελεσον, ὄφελός ὅπορ ἀλφῆσι.

IS. Casaubonus.

IN DIOSCORIDEM ANAZARBÆVM,
à Cl. V. & Medicinæ Doctore præstantissimo, IOANNE ANTONIO SARACENO, post aliorum doctissimorum virorum emendationes, diligentissimè & felicissimè restitutum.

NVMINIS *imperio Verbum Genitale loquuti,*
Plantarum quæ prima tulit miracula Tellus,
Quàm placitura oculis, tam miris vsibus apta,
Est mirata simul, simul est scrutata vetustas.
Hoc raptus studio sapientum maximus ille
Iessiades Solomon, à summis orsus, ad imas,
Plantarum historiam chartis mandarat Hebræis.
Quæ nobis si salua foret, satis esset abundè,
Quantumuis auidas quod pasceret vndique mentes.
Illa licet verò periit, res tanta jacere
Attamen haudquaquam potuit, neque vana videri:
Immò personuit, non solis nota Sophorum
Porticibus, verùm populis immanibus ipsis,
Illorúmque ipsis populorum Regibus olim,
Hoc siue vtilitas suasit, siue ipsa venustas,
Siue adeò grati florum placuistis odores.
Hinc tot non vna ex lingua, nec gente, subinde
Commoda felices hominum in communia nati,
Hæc qui tractarent rerum miracula mystæ.
Quos inter, nulli doctrina aut arte secundus,
Immò pro cunctis meritus vel solus haberi,
Ille DIOSCORIDES *tandem nos ecce reuisit:*
Non tot vulneribus fœdatus turpiter ille,
Qualem barbaries indocta legebat auorum,
Immò nec qualem, magna cum laude, politum,
Ætas produxit melior quæ deinde sequuta:
Sed qualem SARACENA *manus longo vsa labore,*
Iudicióque pari, nunc toto corpore sanum
Restituit, propriæ sic nomen laudis adepta.
Nam reliquis nomen medicis medicina ministrat,
Artis at illa suæ nunc clara in luce Magistrum
Quum, SARACENE, *tuo nunc demum munere cernat,*

Sese ipsam debere tibi Medicina fatetur.
Viue igitur, SARACENE, *diu, longúmque superstes,*
Exurgat donec soboles te digna parente,
Qua tu egeas nunquam, sis cunctis vtilis arte.

Th. B. V.

ODE
AD IANVM ANTONIVM
SARACENVM, MEDICVM.

MENTI voluptas maxima, consitos
Sollerter hortos stirpibus,& nouis
Plantis, & herbarum vigentum
Seminiis,adeóquè florum
Decente comptu,luminibus vagis
Circùm intueri.maius at,omnium
Notas potestatésque nosse,
Delicium,& potior facultas:
Quali fatendus Teuto videlicet
Excellere omnes ante alios,catus
Sagáxque GVILANDINVS ille
MELCHIOR Euganeis in oris:
Persæpe nostras qui quasi fascino
Disertus aures ante decennium
Sensúsque totos visus arte
Vocéque detinuisse mirâ.
Nam quid retrusis in Sophiæ libris
Inest,quod illum non penitissimè
Callere, quídve in sospitali
Arte Machaoniâ,quod illum
Latere credas? Te SARACENE, te
Patris verendi,qui medicantium
Cluebat antistes, sequuum
Consilia & studia à tenello
Prudenter vngui,sic ope Cynthij
In Pessulano monte per omnia
Formauit adiutrix Minerua
Pæoniis habilem repertis:
Vt docta doctus non modò opuscula

Vulg

Vulgaris antè,& quæ peridonea
Nobis Anazarbæus olim
Scripta DIOSCORIDES reliquit,
Dextrè explicaris,verùm etiam dehinc
Complura,cedro digna,perennibus
Sis publicaturus papyris.
Quod quidem vti facias,adurget
Industriorum POSTHIVS arbiter
Censórque librorum,& Podaliriis
Antiquioris (quis neget?) non
Inferiórve minórve sæcli.
Tu perge felici ingenio sacrum
Beare diuini agmen Apollinis,
Eiúsque nec spem falle,nec rem.
Præmia certa tuo parauit
Augur labori: Nos tibi vindici
Promitteremus serta Amarántina,
Ni cuncta cunctis ipse dudum
Serta merens prior abstulisses.

Myrtilleti ad Nicrum, Anno CIↃ IↃ LXXXVII.
Mense Aprili.

Paulus Melissus Francus, Comes sacri
Palatij & Eques, ciuis Romanus.

IN LVCVBRATIONES IANI ANTONII SARACENI.

Ingenio quantum Saracenus & arte medendi
Excellat, editi docent
Felici genio sæua de Peste libelli,
Doctúq; Commentarijs
Illustrata Dioscoridis monumenta. Fruitur
Vnâ diu, plures diubit
Diuitis ingenij venturo tempore fructus.
Prolem ô bonam boni patris!

IN DIOSCORIDEM EIVSDEM.

Luce Dioscoridis quondam monumenta carebant,

Auctorisq; boni rarior vsus erat.
Multam illis operam multi impendêre periti:
Multa sed in multis menda relicta locis.
Sustulit hæc multo Saraceni cura labore,
Auctori lucem restituitq; suam.
Post alios igitur qui talia præstitit omnes,
Ante omnes palmam non meritò ille ferat?

Iohan. Posthius, Archiater
Palat. f.

IN DIOSCORIDEM COGNOMENTO ΦΑΚΑΝ, à CL. V. IANO ANTONIO SARACENO, *Doctore Medico celeberrimo, Latinitate donatum, purgatum, ac doctissimis annotationibus illustratum, Ioan. Tornæsij Epigramma.*

ILLA sui Phœbus turpi deformia nævo
Nascentis cernens ora Dioscoridis,
His illum verbis fertur solatus amicis,
Quem socium in medica iungeret arte sibi,
PRODI, INFANS, VVLTVS NEC FOEDA HAEC SIGNA MORATOR,
SPLENDORE INGENII MOX ABOLENDA TVI:
AEGROTIS ETENIM VIVES MEDICINA, TVÍQVE
DELICIAE LIBRI POSTERITATIS ERVNT.
SVNT TAMEN HÎC, FATEOR, POSSIS QVAE IVRE VERERI,
NEMPE TRAHIT SECVM QVAE MALA BARBARIES,
FOEDATVRA TVOS, EHEV! SIC VNDIQVE FOETVS,
ILLOS VT POSSIS ESSE NEGARE TVOS:
SED TANDEM SVRGET VENTVRIS ORDINE SECLIS,
HAEC TVA QVAE SANET VVLNERA CVNCTA, MANVS,
VT TOTO NITEAS RVRSVM PVLCHERRIMVS ORBE,
IMMO VT PROFVERINT HAEC QVOQVE DAMNA TIBI.
Dixit: & hæc verè Phœbum sic esse loquutum
En tua demonstrat nunc, SARACENE, manus.

AD

AD CLARISSIMVM VIRVM,

I. ANTONIVM SARACENVM, Philoſophum acutiſſ. Medicum feliciſſ.

SAVCIVS è cæco veluti qui verbere, tandem
Sentit ab affluxu, ſucci partem melioris
In pus conuerti fœtens, ſi judice ſolùm
Aſpectu externo Medicus leue (quod latet imo
Vulnus in oſſe) putet, parti parcátque tegenti:
Haud ſecus accepit per plurima ſæcula mendas
Ipſe Dioſcoridis textus, quas cura neglexit
Segnior haud paucas Doctorum, indoctáque turba
Scribarum auxerunt, ſícque errori additus error.
Nec tentaſſet adhuc ætas noſtra hoc cacoëthes,
Ni tu, SARACENE, (velut de nomine nomen
Saracena herba ducens, quæ concauæ ſanat
Vlcera) mouiſſes occalleſcentia labra,
Carne repleuiſſes viuóque è ſanguine vulnus.
Ergo Anazarbæi ſcriptis dum ſæcla fruentur,
Nónne ſimul laudes tibi, SARACENE, manebunt?

Georg. Ieniſchius Neurodenſis Sileſius.

Περὶ Διοσκορίδου, ἐν τῇ Συνόψει.

Διοσκορίδης Ἀναζαρβεὺς ἰατρὸς, ὁ ἐπικληθεὶς Φακᾶς διὰ τὸ ἐπὶ τῇ ὄψει φακὸς. Συνέγραψε δὲ Κλεοπάτρᾳ τῇ ἐπὶ Νέρωνος βιβλία ιδ'. ἔστι φάρμακα ἰατρικὰ πολυώφελῆ.

Ἐκ τοῦ Γαληνοῦ, ἐν τῷ ἕκτῳ περὶ τῆς τῶν ἁπλῶν Φαρμάκων δυνάμεως.

Ὁ δὲ Ἀναζαρβεὺς Διοσκορίδης ἐν πέντε βιβλίοις τῶν χρησίμων ἁπάντων ὕλην ἐγκατέλιπεν, οὐ βοτανῶν μόνον, ἀλλὰ καὶ δένδρων, καὶ καρπῶν, καὶ χυλῶν, καὶ ὀπῶν, ἔτι τε τῶν μεταλλευομένων ἁπάντων, καὶ τῶν ἐν τοῖς ζῴοις μορίων μνημονεύσας. καίτοι δοκεῖ τελειότατον πάντων εἶδέ τῳ περὶ τῆς ὕλης τῶν φαρμάκων πραγματείαν πεποιῆσθαι. πολλὰ μὲν γὰρ καὶ τοῖς ὑπομνήσασιν ὑπὲρ αὐτῶν ἐγκατέλιπε καλῶς, ἀλλ' ὑπὲρ ἁπάντων οὔτως οὐδενί.

Ἐκ τοῦ δ' περὶ συνθέσεως Φαρμάκων κ' γρφή.

Τὸν Διοσκορίδην οὐδενὸς ἂν τις εἴποι δεύτερον τῶν περὶ τὴν ὕλην ἰατρικῶν σοφῶν ἁπάντων.

Ἐκ τοῦ α' περὶ ἀντιδότων.

Τίνα δὲ ἐκάστῃ χώρᾳ γίνεται κάλλιστα φάρμακα, Διοσκορίδης τε καὶ οἱ ἄλλοι ἐγκάφασιν ἀληθῶς.

Πάλιν ἐν τοῖς ἑφεξῆς.

Γέγραπται δ' αὐτάρκως περὶ πάσης τῆς κατ' ἰατρικὴν ὕλης ἐν ε' βιβλίοις Διοσκορίδου· πλὴν ὅ γε ἄλλα τε τὰς ὀφθαλμίας καὶ γυναικὸς ποιότητας, αἷς γινομένοις μάλιστα ἔδει βοηθεῖν, δοκιμώτατα φάρμακα τῇ φαυλοτέρων, ἵνα εἰ καὶ μανθάνοιεν. ἐν ᾧ εἶναι δ' καὶ τὰς ἰδέας ποιότητας ἑκάστου σμικρὰ σωτιλίσας εὕρηκεν.

καὶ μετ' ὀλίγα.

Τὰς μὲν οὖν ἐκάστου τῶν Διοσκορίδου καὶ τῶν ἄλλων, ὅσοι περὶ ὕλης ἐγράψαν ἑκάστου τῶν φαρμάκων, δοκιμασίας διηφορηκότες αὐτοῖς, ὅταν προσθῆτε τὴν ἰδίαν αὐτοψίαν ὑπὸ πολλῶν, ἀκριβῶς δυνήσεσθε διακρίνειν ἀλλήλων, ὅσα γε διακρίνεσθαι δύναται. τινῶν γὰρ, ὡς ἐφθάσαμεν εἰπόντες, οὐδ' ὅλως ἐστὶν, οὐδὲ ἀκριβὴς ἡ διάκρισις. ἀλλὰ συμβήσεται τὰ γνωρίσματα τῶν φαινόμενα ἰσχυρὰ ἡμῖν.

Γαληνὸς ἐν τῷ α' περὶ ἀντιδ.

Ἔμπειρον εἶναι συμβουλεύω τὸν ἰατρὸν, εἰ οἷόν τε, πάντων φυτῶν. εἰ δὲ μὴ, ἀλλὰ τῶν πλείστων γε καὶ ὧν ἡ χρεία πολλή.

Ἐκ τοῦ Ὀρειβασίου ἐν τῷ ιε'. τῶν ἰατρικῶν συναγωγῶν.

Ἡ γνῶσις τῶν ἁπλῶν φαρμάκων καὶ τῶν ἐν αὐτοῖς δυνάμεων ἵνας ἀναδιαφυλάττειν καθίστησιν, ὡς μηδ' οἷόν τε εἶναι χωρὶς ταύτης ἰατρεύειν ὀρθῶς. ἅμα τε γὰρ ὑποτίθεται τὰ δεῖ, καὶ καθ' καιρὸν παρεῖσαν ἰσχυρῶς εὐεπιτύμφα, καὶ εἰς τὰς ὁπηκόους τῶν συνθέτων δυναμεις εὐχρηστεῖ γνῶσις· ἔτι δ' εἰς τὰς εὑρέσεις αὐτῶν· καθόλου δὲ τεχνίου ὁπηφαίνει πᾶσι πάσαν ἡ τούτων αἵρεσις.

De

De Dioſcoride, ex Suida.

Dioſcorides Anazarbæus Medicus, cognomento Phacas, quaſi lentiginoſus, à lentiginibus ita dictus, quibus illius facies dehoneſtabatur. Vixit cum Cleopatra Antonij temporibus. Scripſit libros Medicos xxiiii. qui quidem omnes magnopere celebrantur.

Ex Galeno, 6. de ſimpl. med. facultatibus.

Dioſcorides Anazarbæus quinque libris vtilem omnem materiam Medicam abſoluit, nec herbarum modò, ſed & arborum, fructuum, ſuccorum atque liquorum meminit, inſupérque metallicorum omnium, & partium animalium. Et mihi quidem omnium perfectiſſimè videtur medicamentorum materiam tractaſſe. Etſi enim qui illum anteceſſere, de ijs bene ſcripſiſſe reperiantur, nemo tamen omnium æquè de omnibus.

Ex 4. de comp. med. ſecundùm genera.

Dioſcoridem medicinalis materiæ ſcriptorem nulli eorum qui in ea quaſi arena deſudarunt ſecundum eſſe quiſquam dixerit.

Ex priore de Antidotis libro.

Quænam quacunque in regione medicamenta optima proueniant, cùm Dioſcorides, tum & alij vetè ſcripſerunt.

Ibidem deinceps.

De omni medica materia Dioſcorides quinque libris ſatis ſupérque ſcripſit, à quo tum alia diſces, tum & notas guſtu olfactúque perceptas, quibus probatiora medicamenta certiſſimè cognoſci & ab improbatis diſcerni queant. In quibuſdam verò & perceptas oculis qualitates reperias, quæ haud parum vtilitatis afferunt.

Rurſúmque paulò poſt.

Si quis tum à Dioſcoride, tum ab alijs materiæ medicæ Auctoribus tradita ſimplicium examina pentitauerit, ſuúmque ipſe exmultorum inſpectione acquiſitum iudicium adhibuerit, exactè quæcunque diſcerni poſſunt internoſcet. Quædam enim, vti dixi, vel nullatenus, vel non exactè ab adulterinis diſcerni queunt: vſqueadeò falſis vera ſunt vtrorumque confuſa indicia.

Galenus 1. de Antid.

Medicus vt ſtirpium omnium, ſi fieri poteſt, notitiam habeat ſuadeo: ſin minus, plurium ſaltem, & quarum frequentior vſus eſt.

Ex Oribaſij Med. Collect. lib. xv.

Simplicium medicamentorum, & facultatum quæ ijs inſunt, cognitio ita neceſſaria eſt, vt citra eam nemo rectè medicari queat. Nam & parata vulgo ſunt, & faciliè quauis tempeſtate inueniuntur. Quin & eadem notitia perquàm vtilis eſt ad diſcernendas inueſtigandásq; compoſitorum medicamentorum facultates, ac in vniuerſum quod artis eſt omnibus patefacit.

Πίναξ

ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΥΛΙΚΟΙΣ

παρεχομένων. ὁ μὲν πρότερος ἀριθμὸς, τὸ βιβλίον, ὁ δὲ ὕστερος, τὸ κεφάλαιον ὑποδεικνύει.

ἀβροβίοτος ε,κξ
ἀβροβιότης οἶνος ε,ξς
ἀβρόζωον γ,κθ
ἀγάλλοχον ε,πε
ἄγαλμα γ,α
ἀγγεῖον γ,να
ἀγχόβα δ,κγ, κδ,κε
ἀγώραζον δ,νθ
ἄγνος ε,ρλε
ἀγχιλαία ε,ρλζ
ἀγχιόμολε ε,ρξγ
ἀγχιοείγανος γ,λδ
ἄγχωσις δ,λ
ἄγχωσις ἡ ὁν Παρμένιν δ,λς
ἀδάρκης ε,ρλζ
ἀδίανζον δ,ρλς
ἀείζωον λεπτόφυλλον δ,ζε
ἀείζωον μέγα δ,πθ
ἀείζωον μικρὸν δ,ζ
ἀϊτίτης λίθος ε,ρξα
ἄϊθυρα β,φδ
αἰγίλωψ δ,ρλθ
αἴγιπερος ε,ργ
αἰδοῖον ἄρρενος ἰλάφε β,μγ
αἰθοπὶς δ,ρε
αἴλυρος ς,κθ
αἷμα ς,σζ
αἱματίτης λίθος ε,ρμδ
αἵρα ς,ρκς
ἀκακαλὶς ε,ρπε
ἀκακία ε,ρλγ
ἀκακλύφε δ,ζδ
ἄκακθα γ,νθ
ἄκακθα ἀχρία γ,κ
ἄκακθα Ἀραβικὴ γ,πε
ἄκακθα λευκὴ γ,νδ
ἀκάνθιον γ,ιω
ἄκινος γ,ν
ἀκόνη ε,ρξη
ἀκόνιζον δ,οζ,ον
ἀκοϊτης οἶνος ε,ογ
ἄκορον ε,ς
ἀκρίδες ς,νζ
ἀκτὴ δ,ρωδ
ἀλαβαστρίτης λίθος ε,ρνγ
ἀλευρομὶς ς,μς
ἄλιος ε,ρπς
ἁλθαία γ,ρξγ
ἄλμιος ε,ρκ
ἄλσμα γ,ρξθ
ἀλκία γ,ρξδ
ἀλκυόνιον ε,ρλς
ἄλμη ε,ρκη
ἄλοη γ,κε
ἁλὸς ἄχνη ε,ρκζ
ἁλοσάνθιτος οἶνος ε,ος
ἅλος ἄνθος ε,ρκθ
ἁλσίνη δ,πζ
ἄλυπον δ,ρπ
ἄλυσον γ,ρι
ἀμαράκινον ε,ξη
ἀμβροσία γ,ρκθ
ἀμίαντος λίθος ε,ριε
ἄμμι γ,ο
ἄμμος ε,ρξζ
ἀμμωνιακὸν γ,ιζη
ἀμόργη ε,ρλδ
ἀμπελῖτις γῆ ε,ρπε
ἀμπελόφραγον ς,ρπ
ἄμπελος ἀχρία δ,ρπγ.ε,ς
ἄμπελος λευκὴ δ,ρπδ
ἄμπελος μελαίνα δ,ρπι
ἄμπελος οἰνοφόρος ε,ε
ἀμυδαλὴ ε,ροε
ἄμυλον ς,ρκγ
ἄμωμον ε,νδ
ἀνάγαλλις β,οθ
ἀνάγυρις γ,ρξζ
ἀνδράχνη β,ρν
ἀνδράχνη ἀχρία ς,ρπε
ἀνδρόσαιμον γ,ρογ
ἀνδρόσακις γ,ρν
ἀνημώνη β,οζ
ἀνήθινον ε,ξα
ἀνήθινος οἶνος ε,οι
ἄνηθον γ,ξζ
ἄνθεμις γ,ριδ
ἄνθος ἁλός ε,ρκθ
ἄνθος χαλκοῦ ε,πη
ἀνθυλλὶς γ,ρτγ
ἄνιζον γ,ξι
ἀνιτπαθὶς ε,ρμ
ἀντίῤῥινον δ,ρλγ
ἀντίσανδα ε,πς
ἀνωνὶς γ,κα
ἀπαρίνη γ,ρδ
ἄπιον ε,ρξζ
ἄπιος δ,ροζ
ἀπίτης οἶνος ε,λς
ἀποκίνον δ,πα
ἀπόπαζος ς,σπ
Ἀραβικὸς λίθος ε,ρμθ
ἀραχνη ς,ξη
ἀργεμώνη ς,σπ
ἄργυρι σκωρία ε,ρα
ἀρίστερον β,ῤξη
ἀρίστολοχία πλατύτης γ,ς
ἀρίστολοχία μακρά γ,ε
ἀρίστολοχία στρογγύλη γ,δ
ἄρκιον δ,ρζ
ἀρκιυθιδίτης οἶνος ε,μς
ἄρκευθος ε,ργ
ἄρκτιον δ,ρς
Ἀρμενιακὰ ε,ρξε
Ἀρμένιον ε,ρ
ἀρνόγλωσσον ς,ρκγ
ἄρον ς,ῤζ
ἀρτεμισίου ε,ρμε
ἀρτεμισία γ,ρκζ
ἀρτεμισία λεπτόφυλλος γ,ρκη
ἀρωματίτης οἶνος ε,ξδ
ἀσβεῖτις οἶνος ε,ξε
ἄσπερον ε,θ
ἄσβεστος ε,ρλγ
ἀσβόλη ε,ρπζ
Ἄσσος λίθος ε,ρμβ
ἀσκληπίας γ,ρς
ἄσπυρον γ,ροζ
ἀσπάλαθος ε,νθ
ἀσπάραγος ς,ρκζ
ἄσπλιον γ,ρκε
ἀστὴρ Ἀτλικὸς δ,ρκ
ἀστράγαλος δ,ξβ
ἀστράγαλος ὗς β,ξς
ἄσφαλτος ε,ῤβ
ἀσφόδελος ς,ῤζθ
ἀτραπτυλὶς γ,ρζ
ἀτράφαξις β,ρμο
ἀφάκη ς,ρος
ἀφρὸς νίτρου ε,ρλε
ἀχιλλειος δ,λς
ἄχνη ἁλὸς ε,ρκζ
ἀχρὰς ε,ρξε
ἀψίνθιον ε,πς
ἀψίνθιον Θαλάσσιον γ,κζ
ἀψίνθιον Σαυρόνιον γ,κη
ἀψινθίτης οἶνος ε,μθ

Β

βάκχαρις γ,νε
βάλανοι ε,ῤμγ
βαλαν

βάλανος μυρεψικὴ δ,ρξ
βαλσάμιον α,ρπδ
βαλλωτὴ γ,ριζ
βαλλάμων α,μη
βάλλης δ,λξ
βάλλης ἱδαία δ,λα
βαπτάχιον ς,ιτς
βάπτραχος β,πα
βδέλλιον α,π
βάχιον γ,ρμς
βλίτον ς,ρμιγ
βολβὸς ἐδώδιμος ς,ιτ
βολβὸς ἐμετικὸς ς,στ
βότρυς γ,ρλ
βοίλωτον δ,ρπα
βουνιὰς ς,ρλς
βύσσον δ,ρκδ
βυτίτης οἶνος ι,ντς
βώκαρησις ς,ξξς
βώτυρον ἐξ ἐξ αὐτῆ λεγτύς ς,πα
βόφθαλμον γ,ρτς
βραθυς α,ρδ
βριζωτικὴ δ,ς
βρύον α,ιε
βρύον θαλάσσιον δ,ιθ
βρῶμος δ,ρα

Γ

Γαγάτης λίθος ι,ρμις
γάλα β,ει
γάλα γυναικὸς ς,οα
γαλακτίτης λίθος ι,ρν
γάλα χοιρὸν ς,οζ
γαλὴ καβιτιδίου ς,κζ
γαλίοφις δ,ζι
γάλλον δ,ζξ
γάββαι ς,λδ
γλυκασὴ γ,γ
γεράνιον γ,ρλα
γιάδης λίθος ι,ρξθ
γῆ ι,ρο
γῆ ἀμπελῖτις ι,ρπα
γῆ Ἐρετριὰς ι,ρου
γῆ καμάρινη ι,ροθ
γῆ Κιμωλία ι,ροξ
γῆ Λημνία ι,ρμγ
γῆ Μηλία ι,ρον
γῆ πετρῖτις ι,ρος
γῆ Σαμία ι,ροδ
γῆ Σελινουσία ι,ροη
γῆ Χία ι,ροθ
γλήχιδιον ς,ρξζ
γλαύκιον γ,ρ
γλεῦκινη σκευασία α,ξζ
γλήχων γ,ιλς
γλαυκιτίτης οἶνος ε,ξς
γλυκυῤῥίζα γ,ιζ
γναφάλιον γ,ρλς
γοζυλὶς β,ρλδ
γοζυλὶς ἀγρία ς,ρλι
γύψος ι,ρλδ

Δ

δάκρυον Αἰθιοπικῆς ἰλαίας α,ρμα
δακίτης οἶνος ι,ο
δαῦκος γ,πγ
δαρτίλαγον α,μθ
δάφνη α,ρς
δάφνη Ἀλεξανδρεια δ,ρμζ
δαφνοειδὴς δ,ρμα
δελφίνιον γ,πδ,πι
δενδροειδὴς τιθύμ. δ,ρξι
δωτικὸς οἶνος ι,ντ
δικτιαμνίτης οἶνος ι,ιζ
δίκταμνος γ,λζ
δίκταμνος λευκὴ Κρήτης γ,λθ
διφρυγὸς ι,ρμ
δίψακος γ,ντγ
δορύκνιον δ,οι
δράκη β,ρπζ
δρακόντιον ς,ρλς
δράκων θαλάσσιος ς,π
δρυοπτερὶς δ,ρπθ
δρῦς α,ρμδ

Ε

ἔλενος α,ριθ
ἐλκιφαλὲς ἀλικεβρόδες ς,ντ
ἐλαία α,ρλη
ἐλαίας κολυμβάδις α,ρλθ
ἐλαίας ἀγρίας ἔλαιον α,ρμι
ἐλαιόμηλα α,λς
ἔλαιον ἀμυγδάλινον α,λθ
ἔλαιον βαλάνινον α,μ
ἔλαιον ἐκ τῆ ἀγρίας ἐλαίας α,λά
ἔλαιον καρύϊνον α,μά
ἔλαιον κίκινον α,λὴ
ἔλαιον κοτινὸν α,λ
ἔλαιον λευκὸν α,λβ
ἔλαιον σκοπέμινον α,μια
ἔλαιον Σικυώνιον α,λή
ὕλαιον ὑοσκυαμινον α,μδ
ἔλαιον ὠμοβρεχὶς α,ιθ
ἐλατήριον δ,ριθ
ἐλατίνη δ,μ
ἐλάτινον α,ιδ
ἐλαφόβοσκον γ,ιδ
ἐλαιοστάλινον γ,ιι
ἐλειοσταφιτίτης οἶνος ι,ρα
ἐλειόσταφυλον γ,μ
ἐλένιον α,κζ
ἐλένιον Αἰγύπτιον α,κη
ἐλέφαντος ὀδόντος ἔνιτμα ς,ξα
ἐλίχρυσον δ,οζ
ἐλλεβορίτης οἶνος ι,ντδ
ἐλλέβορος λευκὸς δ,ρν
ἐλλέβορος μέλας δ,ρνὰ
ἔλξινη δ,λθ,πς
ἔλυμος ς,ρκ
ἐμπνεγον δ,ρπκ
ἔντερα γῆς ς,οζ
ἐνίθομον δ,ρθ
ἐνταμίδιον δ,ρθ
ἐνταμκτὶς δ,ρθ
ἐρεβινθος β,ρκφ
ἐρεύκη α,ρος
Ἐρετριὰς γῆ ι,ροα
ἔρεα β,πς
ἔρεα κεκαυμένα β,πγ
ἔρινος δ,πθ
ἐρπυλλος γ,μς
ἐρυθρόδανον γ,ρξ
ἐρύσιμον ς,ρπα

Ζ

ζέα β,ρια
ζιζύφορος ς,ρζ
ζύθος β,ρθ
ζωμὸς νεαρῶν ἰχθύων β,λι
ζώστικον α,ζπ

Η

ἡδύοσμον ἄγειον γ,μθ
ἡδύοσμος ὄμερος γ,ρμα
ἡδύοσμον γ,ρμς
ἡδύχρων α,ο
ἡλιοσκόπιος τιθύμ. δ,ρξι
ἡλιοτρόπιον μέγα δ,ρζγ
ἡλιοτρόπιον μικρὸν δ,ρζδ
ἡμεροκαλλὶς γ,ρλζ
ἡμιονῖτις γ,ρτβ
ἧπαρ αἰγὸς βμζ
ἧπαρ αἰθυίας β,ν
ἧπαρ κάπρου β,μα
ἧπαρ κυνὸς λυσσώντος β,μθ
ἧπαρ ὄνειον β,μβ
ἡσυχίων δ,ζξ
ἡρυγγιον γ,κδ

Θ

Θαλασσιμελὶς ι,κ
Θαλάττιος οἶνος ι,πζ
Θάλιπρον δ,ζπ
Θαψία δ,ρς
Θεῖον ι,ρμδ
Θέρμος ς,ρλς
Θέρμος ἄγριος ς,ρλη
Θελυπτερὶς δ,ρπζ
Θλάσπι β,ρπς
Θρακίας λίθος ι,ρμιζ
Θρίδαξ ἀγρία β,ρξς
Θρίδαξ ἥμερος β,ρξι
Θυίτης λίθος ι,ρκδ
Θύμβρα γ,μα
Θυμβρίτης οἶνος ι,ξ
Θυμελαία δ,ρεγ
Θυμελαίτης οἶνος ι,ση
Θυμίτης οἶνος ι,νθ
Θυμοξάλμη ι,πδ
Θύμος γ,μδ

Ι

Ἴασπις λίθος ι,ρξ
Ἰδικὸς α,ρπα
Ἰδαία ῥίζα δ,μδ
Ἱερὰ βοτάνη δ,ξα
Ἱεράκιον μέγα γ,οζ
Ἱεράκιον μικρὸν γ,οη
Ἰνδικὸν ι,ρζ
Ἰξία γ,ρη
Ἴον δ,ρμβ δὶς ξυσὸς ι,ζα
Ἰόνια β,ς
Ἰὸς σιδήρου ι,ντ
Ἰὸς σκώληξ ι,ζβ

Γ'υδαϊκὸς λίθος ι,ρτε
ἱππακη ς,π
ἱππολωσιον δ,ρλς
ἱπποκαμπος β,γ
ἱπποκαπαθον ς,ρμα
ἱππομάραθρον γ,πς
ἱπποποζόμα ὀρχις β,κα
ἱπποσέλινον γ,ιω
ἵππυρις δ,μς,μζ
ἱπποφαές δ,ρξς
ἱππορφαιζον δ,ρξγ
ἰξ ἱερδος οἶνος ι,ξι
ἱερίνη ςυψις α,ξς
ἶερις α,κε
ἰσάτις ἀχρία ς,στς
ἰσάτις ἡμιρος ς,στι
ἰσόπυρον δ,ρμα
ἰωνοπίτης οἶνος ο,μ
ἰτέα α,ρλς
ἰχθυόκολλα γ,μβ

Κ

καΐκαμον α,κγ
καΐχρυ γ,ντα
καδμεία ι,πδ
κακαλία δ,ρκγ
καλαμάχρωσις δ,λε
καλαμίνθη γ,μγ
καλαμινθίτης οἶνος ι,ξς
κάλαμος α,κ,ριδ
καμέινον γῆ ι,ροθ
καμπαί ς,ξδ
καυθαρίδις ς,ξι
κάνναβις ἀχρία γ,ρξς
κάνναβις ἡμιρος ſ,ρξι
κάπνος δ,ρι
καπναρις β,σδ
καρδάμωμον β,ρπι
καρδάμωμον α,ι
καρκῖνος β,ιβ
καρος γ,ξς
κάρυα βασιλικά α,ροι
καρυα Ποντικά α,ρ,ιθ
κασσία α,ιβ
κάσσια α,ρμι
κάσορος ὄρχις β,πς
καῦσανάγκη δ,ρλδ
καυσρχίτης οἶνος ο,μα
κατὰμαῦα ς,να
καύκαλις ς,ρξθ
κεῖχρος β,ρμθ
κιδρινος οἶνος ω,μι
κιδρίτης οἶνος ι,μζ
κίδρος α,ρι
κινζάμωμον μέλι γ,π
κινζάμωμον μικρόν γ,θ
κεραις ελάφυ ς,ξγ
κεράστια α,ρνζ
κεράτια α,ρπι
κισρίτης οἶνος ι,νδ
κισρον δ,α
κικις α,ρμς
κικκάβα γ,ρξπ
κηρὸς ς,ρι
κίκυ δ,ρξδ
Κιμωλία γῆ ο,ρος
κιννάβαρι ο,ρθ
κινναμώμινον α,οδ
κιννάμωμον α,μγ
κιρκαία γ,ρλδ
κίρσιον δ,ριθ
κίσσηρις ι,ρκι
κισσός ς,στ
κίσσος α,ρκς
κλιματίτη τίφρα ι,ρλι
κλιματὶς δ,ζ
κλιματῖτις δ,ρπς
κλινοπόδιον γ,ρθ
κλυμῦμον δ,ιγ
κνιδέλαιον α,μγ
κνικέλαιον α,μδ
κνικος δ,ρζ
κόκκος βαφικὴ δ,μκ
κοκκυμηλία α,ροδ
κόλλα γ,ρα
κολόκυνθα ς,ρξς
κολοκυνθὶς δ,ροκ
Κολχικόν δ,πδ
κόμαρος α,ροι
κονδρίλλη ς,ρξα
κονία ἡ συκῆς α,ρπς
κόντζα γ,ρλς
κοράλλιον ι,ρλθ
κόρεις ς,λς
κόρις γ,ροδ
κορυδαλλός β,νθ
κόσκινον γ,οα
κορωνόπους β,ρκι
κόσσος α,ιι
κοτυληδών δ,ζβ,ζγ
κυβαρίδις ς,λζ
κῦμυ β,ρι
κοχλία β,ια
κράμβη β,ρμς
κράμβη θαλασσία β,ρμκ
κράμβη ἀχρία ς,ρμζ
κρανία α,ροβ
κραταίγονον γ,ρλθ
κελθή ς,ρκ
κρίθμον ς,ρνζ
κρίμνον ς,ρνς
κρίνον γ,ρις
κρόκινον α,ξδ
κροκοδείλιον γ,νς
κροκόμαγμα α,πς
κρόκος α,κι
κρόμμυον ς,ρπα
κυαμος Αἰγύπτιος β,ρκη
κυαμος Ἑλλωικὸς ς,ρκζ
κυανος ο,ρς
κυδώνεια α,ρξ
κυδωνίτης οἶνος ι,κη
κυκλάμινος ς,ρζδ,ρζι
κυμινον ἄγριον γ,ξθ
κυμινον ἡμερον γ,ξη
κυνοζλωσσον δ,ρκθ
κυνοκράμβη δ,ρζς
κυνοσβαῖρ α,ρκγ
κυπαρισσίας τιθύμ. δ,ρξο
κυπάρισσος α,ρβ
κυπειρος α,δ
κυπρίνη σύψις καὶ σκυπασία α,ξι
κυπρος α,ρκδ
κύρπικος ς,ι
κύτινον α,ροβ
κύτινος δ,ριγ
κῦφι α,κδ
κυφοὶός ς,λς
κώνειον δ,οθ

Λ

λαγωὸς θαλάσσιος ς,κ
λαγωὸς χερσαῖος ς,κα
λαῖπτυς δ,ιζ
λακδανον α,ρκη
λαβυρὶς δ,ρξζ
λαμψάνη ς,ρμς
λάπαθον ς,ρμι
λεμμνιον δ,ις
λειχλοὺ δ,νγ
λειχλοῦς ἵππιος ς,μι
λειοβοτιζαλον γ,ρι
λειοβοτιδιον δ,ρλα
λεπιδιον ς,στ
λεπὶς ι,πθ
λεπὶς σκαμώμωβος ι,ζ
λευκάκανθα γ,μς
λευκὰς ſ,ρυγ
λευκη α,ρθ
λευκὶδιον ſ,ρλα
Λημνία γῆ ι,ρμſ
λίβανος α,πα
λιβάνου μάννα α,πſ
λιβάνου φλοιὸς α,πς
λιβανωτὶς ſ,πζ,πθ
λιβανωτῦ αἰθάλη α,πδ
λιθὶνις ῥητίνης α,ζſ
λιθὶνις ῥητίνης ἐκ σμύρνης, ῥητίνης, καὶ σύ-
ρακος α,πι
λιθυσικὸν ſ,ιπ
λιθάργυρος ι,ρς
λιθόκολλα ι,ρξδ
λίθος αἰτίτης ι,ρξα
λίθος αἱματίτης ι,ρμδ
λίθος ἀλαβαστρίτης ι,ρνγ
λίθος ἀμιάντος ι,ρις
λιθος Ἀραβικὸς ι,ρμθ
λιθος Ἄστιος ι,ρμβ
λίθος Γαγάτης ι,ρμς
λίθος γαλακτίτης ι,ρ
λίθος γιώδης ι,ρξθ
λιθος Θρακίας ι,ρμζ
λίθος θυίτης ι,ριδ
λιθος ἰασπις ι,ρξ
λιθος Γυδαϊκὸς ι,ρια
λιθος μαγνήτης ι,ρμια
λίθος μελιτίτης ι,ρπα
λιθος Μεμφίτης ι,ρια
λίθος μόροχθος ι,ροβ
λιθος ὀστρακίτης ι,ρξε
λίθος ὀφιτης ι,ρξς
λιθος πυρίτης ι,ρμγ
λίθος Σάμιος ι,ρογ
λιθος σαπφειρος ι,ρις
λιθος σκιλλιτης ι,ριθ
λιθος σμυρις ι,ρξς
λιθος σπόγγων ι,ρξγ
λίτρος

λίθος χιτὼς ,ρμε
λίθος ψευγίτης ,ρμς
λιθοσπερμον ,ρμη
λιποζωσις δ,ρϛ
λιπος ,ρμθ
λιχήτης ,ρξ ,αρξβ
λιψυδριον ,ρφ
λυκιον α,ρλδ
λυκοψις δ,κβ
λυσιμάχιον δ,ν
λυχνις ἀσβέστη ,ρμα
λυχνις στοιχειωματική ,ρμδ
λωβὸς ,ρπα
λωβὸς ἄχριος δ,ριβ
λωβὸς Αἰγυπτίος δ,ρκδ
λωβὸς ἡμερος δ,ρπα

Μ

μαδίντης λίθος ,ρμη
μαγνὶς ζλα
μάκαρ ,ρκ
μαλακὸν ἄφριον ,ρμς
μαλακὸν ἄφρον ,ρμς
ἐκ μαλακοῦ ἄφρου οἶος ,ρξζ
μαλαχὴ βκμδ
μανδραγόρας ,δ,ος
μανιόραγοειτὴς οἶνος ,ρπα
μαραθρίτης οἶνος ,ρ,ρ
μαραθρον ,γεπε
μαρὸν ,ρπδ
μασχάλαιον ,ρπε
Μασσαλεῖον ,ρκβ
μελαν ,ρπγ
μελανθίλαιον ϡ ,ρμς
μελανθιον ,ρκδ
μελανπεῖα ,ρπα
μελὶ ,ζρκ
μελὶ Ποντικὸν ,βρϙ
μελὶ Σαρδῶον ,βρβ
μελιὰ ,ιρπ
μελικράζων ,ως
μελιλωτὸς ,γρμ
μελίμηλα ,αρζκ
μελισσόφυλλον ,γρπ
μελιτίτης λίθος ,ρμκ
μελιτίτης οἶνος ,ρμς
Μεμφίτης λίθος ,ρφπ
Μενδήσιον ,ρκζ
μεσπίλον ,αρξ ,ρπ
μεσσήλλα ,ρπδ
μετώπιον ,ρφπ
Μηδικὰ ,αρξς
μηλιὰ ,ζρφζ
μηλιον ,δ,ρπ
μηλιον ἀκρία ,δ,ρξι
μηλιον ἀφρώδες ,δ,ρξζ
μηλιον ἥμερος ,δ,ρξι
μηλιον κυρατῖτις ,δ,ρξς
μηλιον ῥοιὰς ,δ,ρξδ
Μῆλα Ἠπειρωτικὰ ,αρφζ
Μῆλα Περσικὰ ,αρφδ
μηλιὰ ,αρφβ
Μήλια γῆ ,ρφπ
μηλίνον ,ρφπ
μηλόμηλα ,ρπδ
μῆραν ,ρπγ
μίλτος Σινωπικὴ ,αρμπ
μίλτος τευθωτικὴ ,αρμβ
μίσυ ,αρμζ
μισελίδ αμπε ,αρ
μολιβδοειδὴς λίθος ,α,ρπε
μόλιβδος κεκαυμένος ,α,ζφ
μολιβδος πεπλυμένος ,α,ζο
μολιβδος σκωρία ,α,ζζ
μορια ,αρπε
μορόχθος λίθος ,α,ρβ
μυαρχος ,δ,ριζ
μυίσκος ,βιζ
μυκλοὶ ,βιζφ
μυὶς ,βιοδ
μυιοπτας ,βιση
μυοχάλη ,ζιογ
μυὸς ὦτα ,βιοθ
μυρίκη ,αρπϛ
μυρόφυλλον ,δ,ρπ
μυρρίς ,δ,ρος
μυρσινίλαιον ,ρπε
μυρσίνη ,α,ρπε
μυρσίνη ἀκρία ,δ,ρμϛ
μυρσινίτης οἶνος ,α,λζ
μυρτίδιον ,αρπϛ
μυρτίτης οἶνος ,α,λς
μύρων σκώληκες ,ιμιβ
μυρτα ,γοδ

Ν

ναρδόνιον μύρον ,α,α
νάρδος ,αιϛ
νάρδος Κελτικὴ ,αιζ
νάρδος ὀρεινὴ ,α,π
ἐκ νάρδου ἀκρίας οἶνος ,ιξθ
ἐκ νάρδου Κελτικῆς οἶνος ,ιξζ
ἐκ νάρδου Συριακῆς οἶνος ,ιξζ
νάρθηξ ,γιζα
νάρκη ,βιζ
ναρκίσσινον ,αιξη
νάρκισσος ,δ,ρξα
νάτακφθον ,α,ιβ
νάφθα ,αρπε
νεβρίτης οἶνος ,ιξς
νήσιον ,ρμγ
νίτρον ἀφρὸς ,αρλα
νυμφαία ,γρμ,ρμβ

Ξ

ξύλιθον ,δ,ρλα
ξυρὸν ,δ,μ
ξυσὸς ,δ,ρς
ξυσὸς ἰὸς ,α,ζμ

Ο

ὀθόνα ,β,σιη
οἰνάνθη ,γφπ,α
οἰνάνθινον ,α,ας
οἰνάνθινος οἶνος ,ι,λγ
οἰνόμελι ,α,ις
οἶνος ἀζροβοίτης ,ι,ξβ
οἶνος αἰθυσίαμος ,ιρη
οἶνος ἀκορίτης ,ι,ογ
οἶνος ἀλοσύνθινος ,ι,ος
οἶνος ἀνίθινος ,ι,ει
οἶνος ἀπίτης ,ι,λβ
οἶνος ἀραμαστίτης ,ι,ξδ
οἶνος ἀραιοθαλίτης ,ιμβ
οἶνος ἀζαλίτης ,ιξη
οἶνος ἀλειθυιτης ,ιμιδ
οἶνος βυσίτης ,ι,ιϛ
οἶνος βλιχωνίτης ,ιξβ
οἶνος δαμιτης ,ι,ιθ
οἶνος διπλασιοίτης ,ι,οζ
οἶνος ἐλαιοσφακίτης ,ι,ιθ
οἶνος ἐλλιβοειτης ,ι,γβ
οἶνος θαλάσσιος ,ι,οιζ
οἶνος θυμβρίτης ,ι,ξ
οἶνος θυμελαίτης ,ι,ιη
οἶνος θυμίτης ,ι,ιβ
οἰνοσίξ ἴρους ,ι,ξη
οἶνος καλαμιτὶς ,ι,ιξβ
οἶνος κασθρχίτης ,ι,ημς
οἶνος κίδρινος ,ι,ιμζ
οἰνοκίδρινος ,ι,ρμζ
οἶνος κορυφίτης ,ι,ρδ
οἶνος κοτυλίτης ,ι,ξγ
οἶνος κυδωνίτης ,ι,ιιη
οἶνος ἐκ μελαθάθρου ,ι,ξζ
οἶνος μαινομαραθρίτης ,ι,πε
οἶνος μακραξρίτης ,ι,ιι
οἶνος μιλτίτης ,ι,μ
οἶνος μυρσινίτης ,ι,λζ
οἶνος μυρτίτης ,ι,λς
οἶνος ἐκ ναρδου ἀκρίας ,ι,ξθ
οἶνος ἐκ ναρδου Κελτικῆς ,ι,ξζ
οἶνος ἐκ ναρδου Συριακῆς ,ι,ξζ
οἶνος ναζαρίτης ,ι,ξθ
οἶνος νιτρίτης ,ι,ιδ
οἶνος ξηραντὴς ,ι,ιγ
οἶνος ὀσφρητικὸς ,ι,ιμ
οἶνος ῥοδίτης ,ι,λα
οἶνος ῥοίτης ,ι,λδ
οἶνος σιλικίτης ,ι,οδ
οἶνος σκαμμωνίτης ,ι,ιη
οἶνος σκιλλιτικὸς ,ι,ιη
οἶνος ἐκ σμυρνης ,ι,ξβ
οἶνος ἐκ τῆ ἀκρίας στυφελῆς ,ι,δ
οἶνος στιχαδίτης ,ι,ιδ
οἶνος συκομορίτης ,ι,ιδ
οἶνος τραγοειγενὴς ,ι,ιι
οἶνος τροχιλίτης ,ι,ιδ
οἶνος χίνινος ,ι,λα
οἶνος σαρμινθος ,ι,λθ
οἶνος ὑακωπίτης ,ι,ιι
οἶνος φθίσιος ἰμερώσας ,ι,οζ
οἶνος φοινικίτης ,ι,ιμ
οἶνος χαμαιδρυίτης ,ι,ιε
οἶνος χαμελαίτης ,ι,οδ
οἶνος χαμαιπιτυίτης ,ι,ιπ
οἶνων διαφορὰ ἐκ τῆ ἕλους ,ι,ιι
οἴνων δύναμις ,ι,ιε
οἴνων φυσὶτις ἐκ τῆ ἁλικίας ,ιξ.
ἐκ τῆ χρόας ι,π. ἐκ τῆ γεύσεως
ἐκ τῆ μεμιγμένων ,ιιβ
οἶδμος β,ιιδ
ὄλυσσον δ,ιε
ὀλμιθος ,αρπυ

ὄλυρα βιμγ
ὀμφάκιον ομε
ὀμφακίτης ομβ
ὀμφακόμηλα ολα
ὀνάχρα δρμα
ὀνῆτες ὄρεγο γνλγ
ὀνοβρυχίς γνρα
ὀνοσμία γνρμζ
ὄνυξ ζιο
ὄνυχες αἰγῶν βιμς
ὀνυχὶς οἴνων ζιμδ
ὀξαλμὶς ιμκγ
ὄξος ιμκε
ὄξος σκιλλιτικὸν ιμκε
ὄξος τετραδικὸν ιμτγ
ὀξυάκανθα αμφδ
ὀξύμηλα ιμεδ
ὀρεοσέλινον γιοθ
ὀρεχανίτης οἶνος ιτξα
ὀρίγανος γιλδ
ὄρμινον γμμα
ὀρνιθόγαλον βιρκδ
ὀροδάφνη ζιρηβ
ὄροβος βιρλα
ὀρόβος γάλακτος βιοϛ
ὄρυζα βιριζ
ὄρχις γμμαμμβ
ὄσπρεα ιτρεα
ὀστρακίτης λίθος ιμρξι
ὄστρεις δμμγ
ὄυα αμρτγ
ὕρον βιφθ
ὀφεως γῆρας βιιδ
ὀφίτης λίθος ιμξϛ

Π

παιωνιράτιον βιοη
παιωνία γιρις
παλίουρος αμρια
πάνακες γιτα
πάνακες Ἀσκληπιοῦ γιτϛ
πάνακες χειρώνιον γιοζ
πανακίτης οἶνος ιμοϛ
πάπυρος αμρα
παράλιος τεθύμ. δμρξι
παρθένιον γιρτ
παρωνυχία δμοδ
πενταφύλλον δμμβ
ἐν πεπίρᾳ οἶνος ιτξι
πέπερι βιρπθ
πευκὶς δμρξθ
πέπλος δμρξη
πέπων βιρξδ
πετραιόβμων διαδ
πετρεσιρίου δμξ
πετρόσα αμρπζ
πετροσίτης δμρα
πετροσέλινον γιοζ
πευκέδανος γιφβ
πήγανον γιτβ
πήγανον ἄγριον γιστγ
πίσια ξηρὰ αιμζ
πίσια ὑγρὰ αιμδ
πιστάκιον αιφα
πίσσης ὑγρᾶς λιγνύς αιμϛ
πισσίτης οἶνος ιμμα

πισσάκη αιροζ
πιτυόκεφαλος αιρ
πιτύα ζιτυ
πιτυὶς αιπζ
πιτύνδα δμρξϛ
πίτυς αιπτ
πλάτανος αιρζ
πλατύφυλλος τεθύμ. δμρξι
πνεύμων ἀλόπτυκος ζμια
πνεύμων θαλάσσιος βιλθ
πνεύμων χέρνιος βιμ
Πνυγίτης γῆ ιτροζ
πολύμαλον δτα
πόλιον γιτμδ
πολύγαλον δμριβ
πολυγόνατον δτε
πολύγονον ἄρρεν δτδ
πολύγονον θῆλυ δτα
πολύκναημον γιτμ
πολυπόδιον δμπα
πομφόλυξ ιμπι
πορφύρα ζιδ
ποσθομογόνων δμρα
ποτήριον γιοζ
πράσον γιοδ
πρασίτης οἶνος ιμπα
πρασῖον βιροδ
πρῖνος αιμρδ
πρίσπελος ζιφε
πρόπολις βιρζβ
πτελέα αιμια
πύλιρος δμρπε
πυκνόφυλλον δμροϛ
πύρθρον γιπϛ
πυρίτης λίθος ιμμγ
πυρὸς βιρζ

Ρ

ῥᾶ γιβ
ῥάμνος αιρθ
ῥαφανίδαριον αμια
ῥαφανὶς ζιρλζ
ῥαφανὶς ἀγρία βιρλα
ῥαφίνη αιζζ
ῥητίτης οἶνος ιμγ
ῥίζα ἰδαία δμμδ
ῥίζα Ῥοδία δμια
ῥόα αιρπα
ῥόδα αιρλ
ῥοδόδις αιρλα
ῥόδινον αιφγ
ῥοδίτης οἶνος ιλο
ῥοίτης οἶνος ιμλδ
ῥοῦς αμμζ
ῥύπος βαλανείων αιλδ
ῥυπος γυμνασίων αιλϛ
ῥύπος ὀπὸ ϑ σκαλίστρας αιλι

Σ

σαγπαλωὶν γιφι
σάκχαρον βιρδ
σαλαμάνδρα βιξζ
Σαμία γῆ ιτρος
Σάμιος λίθος ιτργ
σαμψύχινον αιτα
σανδαράχη αιρμβ
σαπρότης ξύλων αιρις

σάπφειρος λίθος ιτρζ
σάμψυχον γιμζ
σαρκοκόλλα γιζϐ
σατύριον γιθμγ
σατύριον ἰρυθρόιον γιθμδ
σαῦρα βιξθ
σαυλωίτης λίθος ιτρθ
σελινίτης οἶνος ιτοδ
σέλινον γιτοδ
Σελινουσία γῆ ιτρια
σέρις βιρξ
σέσελι Λίβυστικὸν γιξα
σέσελι Μασσαλωτικὸν γιξ
σέσελι Πελοποννησιακὸν γιξϛ
σεσία ζιτγ
σεσαμοειδὲς μέγα διρϛ
σεσαμοειδὲς μικρὸν διρη
σέσαμον βιφπα
σέυφ ζιο
σιδηρῖτις διλγιλδλα
σιδήρου ἰός ιιζγ
σιδήρου σκωρία ιιζδ
σίδηρος αιρτγ
σίκυος ἄγριος διμδ
σίκυος ἥμερος βιρξγ
σίλλουρον δμρθ
σίλφη ζιλα
σίλφιον γιζβ
σισαρίλαιον αιμιϛ
σίσυμπρον βιμπθ
Σιτανικὰ μύλῳ ιιρια
σίτον ζιμδ
σίταρον βιμλθ
σισύμβριον ζιρπιρτε
σίσων γιξβ
σκαμμωνίτης οἶνος ιιπγ
σκαμμωνία διρια
σκανδυξ βιρξα
σκάνθος ζιοα
σκίλλα ζιαϛ
σκιλλιτικὸν ὄξος ιιπα
σκιλλιτικὸς οἶνος ιιπε
σκολόπενδρα βιτε
σκόλυμος γιοε
σκόπελον γιρια
σκορδόσαραβον βιπη
σκόροδον βιπϛ
σκορπιοειδὴς δμρξι
σκόρπιος Θαλάσσιος βιλδ
σκόρπιος χερσαῖος ζιση
σκωληξ ἰός αιξβ
σκωρία ἀργύρου ιιμα
σκωρία μολίβδου αιιζ
σκωρία σιδήρου αιιξβ
σμαραγδίς βιλ
σμίλαξ ζιρκσιδπ
σμίλαξ λόια διρμα
σμίλαξ τραχεῖα διρμδ
σμυρις λίθος ιιρξϛ
σμύρνα αιοζ
σμύρνα Βοιωτικὴ αιοα
ἐν σμύρνῃ οἶνος ιιξι
σμύρνιον γιοθ
σόγχος βιρσθ
σόκκος αιξβ

σπαργάνη

σπαργάνιον δ,κα
σπαρτίον δ,ρνθ
σπογγιὰ ι,ρλκ
σπόγγιον λίθον ι,ρξγ
σκιλὶς α,οη
σκορὶς ι,δ
σκορὶς ἀχρία δ,ρνς
σκορυλὶς ι,ὸγ
σκορυλῖνος γ,ιθ
σκόχυς γ,ρα
σίαρ ζ,πς
σίαρ βόϊον ζ,πθ
σίαρ πῶς ἀμματισίον β,ζκ
σίαρ πῶς ζωμψυχίζει ζ,ζζ
σίαρ ταύρειον, παρὰ ἄλλοις, κριὸς λιόντειον ζ,ζ
σίαρ τράγειον, κριὸς προβάτειον, ἢ ἐλαφήϊον ζ,πα
σίαρ ὑείον ἢ ἄρσενον ζ,πζ
σίαρ χοίρειον κριὸς ἀρσὴν ζ,ζγ
σιάτιον δυσόσμως β,ζδ
σίμωσις ι,ζθ
σκαλιὸν ἕξος ι,ιγ
σκαλίτης οἶνος ι,μζ
σκίας γ,λα
σκολὶ δ,ιβ
σκομμάτιος λευκὸς ι,ζ
σκοπάτης δ,ρζ
σκοπάτης χαλιόφυλλος δ,ργ
σκορδίλιτης οἶνος ι,μδ
σκόρδιλος ω,νσν
σκύθιον ζ,ρζγ
σκύζιον ἀλκακάβου δ,οβ
σκύζιον μικρὸν δ,οθ
σκύζιον ὑπνωτικὸν δ,οη
σκύζος δ,οα
σκυπλεία ι,ρκγ
σκύραξ α,οθ
σκυὰ ἀχρία α,ρπδ
συκομορίτης οἶνος ι,μς
συκόμορον α,ρπα
σῦκον α,ρπγ
σῦκον ὁ Κύπριον α,ρπζ
σύμφυτον ποτηρίων δ,θ,ι
σφενδύλιον γ,ιζ
χαμαίλαιον α,ι
χαμαὶ ῥιτίνη α,ιζ
χίνινος οἶνος ι,λκ
χίος α,πθ
χρυσὸς λίθος ι,ρμο
χυμὸς α,σγπθ.δ,ι
σῶμα ω,ρνθ

Τ

ταβωκὰ μίλιος ι,ρνθ
τελλῖνα ζ,ιι
τερμίνθινος οἶνος ω,λθ
τέρμινθος α,ζα
τέττιγος ζ,ος
τήλειον γ,ειια
τήϊτλον β,μιθ
τίφρα κλιματίνη ι,ρλι
τηλίφιον ζ,σιζ
τίλιως ἄλευρον ζ,ρμδ
τίλινον ω,νζ
τιθυμαλος θῶλυς δ,ρξο
τιθυμάλων ἐπὶ ἀῤῥὴν δ,ρξι
τορβύλιον γ,ξγ
τραγάκανθα γ,κγ
τράγιον δ,μιθν
τραγοπώγων ζ,ρογ
τραγοσεληνίτης οἶνος ι,νε
τραγοσίγειος γ,λι
τράγος ζ,ρου. δ,να
τρίβολος δ,ιι
τρίβολα ζ,κδ
τριπίλιον δ,ρλι
τρίφυλλον γ,ρκγ
τριχόμανες δ,ρλζ
τρυξ ι,ρλζ
τρυγὼν Θαλασσία ζ,κβ
τυρὸς νεαρὸς ζ,οθ
τυφὼ γ,ρλγ
ὑάκινθος θ,ξγ
ὑδνον β,ρου
ὑδράργυρος ι,ρι
ὑδρόμελον ω,λ
ὑδροπίπερι ζ,ρζα
ὕδωρ ι,ιπ
ὕδωρ Θαλάσσιον ι,ιθ
ὑοσκύαμος δ,ξθ
ὑπερικὸν γ,ρος
ὑπόκιστις δ,ξη
ὑπόκιστις α,ρκζ
ὕσσωπος γ,λ

φακὸς β,ρκθ
φακὸς ὁ ὑπὸ τ τελμάτων δ,πα
φαλάγγιον γ,ρκζ
φάλαγξ γ,ρμθ
φασήολος ζ,ρλ
φεγγὸς α,ρμδ
φθίειος ἰμβρίων οἶνος ι,οζ
φιλλυρία α,ρκε
φίνιξ ζ,πα
φλόμος δ,ρδ
φοίνικες Θηβαϊκαὶ α,ρμθ
φοινικίτης οἶνος ι,κι
φοίνιξ α,ρμε.δ,μγ
φοίνιξ ἀκάνθη α,ρο
φοῦ ι,ποε
Φρύγιος λίθος ι,ρμια
φύκος Θαλάσσιον δ,ιβ
φυλλίνη ζ,ρκα
φύλλον γ,ρμι
φύτευμα δ,ρλ

Χ

χαλβάνη γ,ιζζ
χάλκανθος ι,ριδ
χαλκίτις ι,ρκα
χαλκὸς κεκαυμένος ι,πζ
χαλκοῦ ἄνθος ι,πα
χαμαιάκτη δ,ρκε
χαμαιῤῥάφανος δ,ρμθ
χαμαιῤῥοῦς οἶνος ι,νε
χαμαίῤῥους γ,ρδς
χαμαίκισσος δ,ρκς
χαμαιλαίτης οἶνος ι,οθ
χαμαιλεύκη δ,ρμζ
χαμαιπιτυόεις οἶνος ι,πι
χαμαιρλέων λευκὸς γ,ι
χαμαιρλέων μέλας γ,ιια
χαμαιπίτυς γ,ρκ
χαμαιρύκη δ,ρο
χαμελαία δ,ρος
χιλιδόνιον β,ια
χιλιδόνιον μικρὸν β,οδ
χιλιδὼν β,ξ
χῆνες ζ,ιβ
Χία γῆ ι,ρκδ
χολὴ β,ζς
χόνδρος β,ρια
χρυσάνθεμον δ,πα
χρυσόγονον δ,ις
χρυσοκόλλα ι,ρδ
χρυσόκομη δ,ρι

ψευδοβούνιον δ,ρκε
ψευδοδίκταμνον γ,λα
ψιμμύθιον ι,ργ
ψύλλιον δ,ο
ψωρικὸν ι,ρις

Ω

ὠτόμηλον α,οθ
ὠκιμοειδὲς δ,ια
ὦκιμον ζ,ρια
ὠμοβόσχος β,λγ
ὄον β,οδ
ὠὸν λευκὸν β,ιο
ὄχνη ιβρ

INDEX EORVM QVAE LIBRIS V.

de materia Medica continentur. Prior numerus
librum, posterior caput indicat.

Abiga 1,175,176
Abortiuum vinum 5,27
Abrotonini confectio 1,60
ex Abrotono vinum 5,62
Abrotonum 3,29
Absinthites vinum 5,49
Absinthium 3,26
Absinthium marinum 3,27
Absinthium Santonicũ 3,28
Acacalis 3,118
Acicia 1,133
Acantha 3,19
Acantha sylueſtris 3,20
Acathium 3,18
Acetum 5,41
Acetum scillinum 5,25
Acetum stœchadites 5,51
Achillea 4,36
Acinus 3,50
Aconitum 4,77,78
Acorites vinum 5,73
Acorum 1,2
Adarces 5,137
Adeps 2,86
Adeps anserinus & gallinaceus 2,93
Adeps quomodo lampſuchi odore imbuatur 2,92
Adeps suillus & vrſinus 2,87
Adeps taurinus, pantherinus, ac leoninus 2,90
Adiantum 4,136
Adipum vis 2,94
Ægilops 4,139
Æris flos 5,88
Æris squama 5,89
Ærugo rasilis 5,91
Ærugo scolecia 5,92
Æs vstum 5,87
Æthiopis 4,105
Ætites lapis 5,161
Agallochum 1,21
Agaricum 3,1
Ageratum 4,59
Alabastrites lapis 5,153
Alcea 3,164
Alcyonium 5,136
Alga 4,100
Aliſma 3,169
Allium 2,182
Aloe 3,25
Alsine 4,87
Althæa 3,163
Alumen 5,33
Alypum 4,180
Alyssion 3,105
Amaracinum 1,68
Ambrosia 3,119
Amianthus lapis 5,156
Ammi 3,70
Amomum 1,14
Ampelites terra 5,188
Ampelopraſon 2,180
Amurca 1,134
Amygdalæ 2,176
Amylum 1,133
Anagallis 2,200
Anagyris 4,162
Anchuſa 4,23,24,25
Androsaces 3,150
Androsæmon 3,173
Anemone 2,107
Anethini compositio 1,61
Anethinum vinum 5,75
Anethum 3,67
Anguium senecta 2,19
Anisum 3,65
Anonis 3,25
Anthemis 3,144
Anthyllis 2,153
Antipathes 5,120
Antirrhinon 4,133
Antiſpoda 5,186
Aparine 3,104
Aphaca 2,178
Apiastrum 3,138
Apios 4,179
Apite vinum 5,38
Apium 3,74
Apium paluſtre 3,75
Apocynon 4,81
Apollinaris herba 4,69
Aqua 5,18
Aqua marina 5,19
Aqua mulſa 5,17
Arabicus lapis 5,149
Aranea 2,68
Arbutus 1,175
Arcion 4,107
Arction 4,106
Argena 5,167
Argemone 3,108
Argenti scoria 5,101
Argenti spuma 5,102
Argentum vinum 5,110
Arietum 2,198
Aristolochia Clematitis 3,6
Aristolochia longa 3,5
Aristolochia rotunda 3,4
Armeniaca 1,165
Armenium 5,105
Aromatites vinum 5,64
Aron 2,197
Arsenicum 5,121
Artemisia 3,127
Artemisia tenuifolia 3,128
Arundo 1,124
Asarites vinum 5,68
Asarum 1,9
Asclepias 3,106
Asclyron 3,172
Asius lapis 5,142
Aspalathus 1,18
Asparagus 2,152
Asphodelus 2,199
Aspleon 3,141
Astes Atticus 4,120
Astragalus 4,62
Atbera 2,180
Atractylis 3,103
Atramentum librarium 5,184
Atramẽtum metallicum 5,118
Atramentum sutorium 5,114
Atriplex 2,144
Anena 2,116
Auricula muris 2,214
Auripigmentum 5,122

B.

Baccharis 3,58
Balaustium 1,154
Ballote 3,117
Balsamum 1,18
Barbula hirci 2,173
Bdellium 1,80
Beta 2,149
Beta sylueſtris 4,16
Bitumen 1,99
Blatta 2,38
Blitum 2,103
Botrys 3,130

Braſſica

Brassica 2,146
Brassica marina 2,148
Brassica sylvestris 2,147
Britannica 4,2
Bromus 4,140
Buccina 2,5
Buglossum 4,128
Bulbus esculentus 2,200
Bulbus vomitorius 2,201
Bunias 2,136
Bunites vinum 5,56
Bunium 4,124
Bupthalmum 3,156
Bupresti 2,66
Butyrum, & eius fuligo 2,81

C

Cacalia 4,123
Cachry 3,88
Cadmia 5,84
Cæpa 2,181
Cæruleum 5,106
Calamintha 3,43
è Calamintha vinum 5,62
Calamus odoratus 1,17
Calx viua 5,133
Cancri 2,12
Cancamum 1,23
Cannabis satiua 3,165
Cannabis sylvestris 3,166
Cantharides 2,65
Capnos 4,110
Capparis 2,204
Cardamomum 1,5
Carduus 3,16
Caries lignorum 1,112
Carum 3,66
Caseus recens 2,79
Cassia 1,12
Castaneæ 1,145
Castorium 2,26
Catanance 4,134
Catorchites vinum 5,41
Caucalis 2,169
Cedrinum vinum 5,45
Cedrites vinum 5,47
Cedrus 1,105
Centaurium maius 3,8
Centaurium minus 3,9
Cepæa 3,168
Cera 2,105
Cerasia 2,157
Cerebrum gallinarum 2,53
Cerussa 5,103
Cestrites vinum 5,54
Chalcitis 5,115
Chamæ 2,9
Chamæacte 4,175
Chamæcissus 4,126
Camædaphne 4,149
Chamædryites vinum 5,51
Chamæleon albus 3,10
Chamæleon niger 3,11
Chamæpeuce 4,127
Chamæpityinũ vinum 5,80
Chamæpitys 3,175
Chamæsyce 4,170
Chamelæa 4,172
Chamelaites vinum 5,79
Chelidonia 2,211
Chelidonia minor 2,212
Chia terra 5,174
Chondros 2,118
Chrysanthemon 4,58
Chrysocolla 5,104
Chrysocome 4,55
Chrysogonon 4,56
Cicadæ 2,56
Cicer 2,116
Cicuta 4,79
Cimices 2,36
Cimolia terra 5,176
Cinis sarmentitius 5,135
Cinnabari 5,109
Cinnamomum 1,13
Cinnamominum oleum 1,
74
Cionia 2,6
Circæa 3,134
Cirsium 4,119
Cistus 3,126
Clematis 4,7
Clematitis 4,182
Clinopodium 3,109
Clymenon 4,13
Cnicus 4,190
Coagulum 2,85
Coccum tinctile 4,48
Cochlea 2,11
Colchicum 4,84
Colocynthis 4,178
Colymbades oliuæ 1,139
Condrylla 2,161
Conyza 3,136
èConyza vinum 5,63
Corallium 5,139
Coriandrum 3,71
Coris 3,174
Cornu cerui 1,63
Cornus 1,172
Cos 5,168
Coronopus 2,158
Costus 1,15
Cotonea 1,160
Crataegonum 3,139
Crimnon 2,112
Crithmon 2,157
Crocini confectio 1,64
Crocodilium 3,72
Crocomagma 1,26
Crocum 1,25
Cucumis satiuus 2,163
Cucumis sylvestris 4,154
Cucurbita 1,162
Cuminum satiuum 3,68
Cuminum sylvestre 3,69
Cupressus 1,102
Curmi 2,110
Cyanus 5,106
Cyclaminus 2,194,195
Cydonites vinum 5,28
Cynocrambe 4,192
Cyparissias tithym. 4,165
Cyperus 1,4
Cyphi 1,14
Cyprini spissamẽtum ac præ
paratio 1,65
Cyprus 1,124
Cytini 1,152
Cytisus 4,113

D

Daphnoides 4,148
Daucites vinum 5,70
Daucus 3,83
Delphinium 3,84,85
Dendroides 4,165
Dictamnites vinum 5,57
Dictamnum 3,37
Dictamnum Creticum 3,39
Diphryges 5,120
Dipsacus 3,13
Dorycnion 4,75
Draba 2,187
Draco marinus 2,15
Dracunculus siue Dracontiũ
2,196
Dryopteris 4,189

E

Ebenus 1,129
Ebur 2,61
Echinus marinus 2,1
Echinus terrestris 2,2
Echion 4,17
Elæomeli 1,57
Elaphoboscon 3,80
Elaterium 4,155
Elatine 4,40
Elatini confectio 1,54
Elichryson 4,57
Elleborites vinum 5,82
Empetrum 4,188
Ephemerum 4,85
Epimedium 4,19
Epipactis 4,109
Epithymum 4,179
Equisetum 4,46,47
Eretria terra 5,171
Erica 2,117
Erinus 4,29
Eruca 2,170
Erucæ 2,64
Eruum 2,131
Eryngium 3,14
Erysimon 2,188
Eupatorium 4,41
Euphorbium 3,96

F

Faba Ægyptia 2,128
Faba Græca 2,127
Fabrilis rubrica 5,112
Fax 5,132
Fagus 1,144
Fel 2,96
Ferri recremẽtum seu scoria
5,94
Ferrugo 5,93

Ferula 3,91
Feſtuca 4,139
Fibri teſtes 2,26
Fici 1,183
Ficus Cypria 1,182
Ficus ſylueſtris 2,184
Filicula 4,188
Filix 4,186
Filix fœmina 4,187
Fimus 2,98
Flos æris 5,88
Flos ſalis 5,129
Fœniculus 3,81
Fœnigræci farina 1,124
Fornacum terra 5,179
Fraxinus 1,108
Fucus marinus 4,100
Fuligo ex myrrha, reſina & ſtyrace 1,85
Fuligo pictoria 5,182
Fumaria 4,110
Fungi 4,83

G

Gagates lapis 5,146
Galactites lapis 5,150
Galbanum 3,97
Galerita 2,59
Galiopſis 4,95
Galla 1,146
Gallinæ 2,52
Gallium 4,96
Garum 2,34
Genitale cerui maſculi 2,43
Gentiana 3,3
Geodes lapis 5,169
Geranium 3,131
Gingidium 2,167
Gith 3,93
Glandes 1,145
Glaſtus 2,215
Glaucium 3,100
Glaux 4,143
Gleucini compoſitio 1,67
Glutinum 3,101
Glycyrrhiza 3,7
Gnaphalium 3,132
Gobius 2,32
Gramen 4,30
Gramen arundinaceum 4,31
Gramen Parnaſſium 4,32
Groſſi 1,185
Gypſum 5,134

H

Hæmatites lapis 5,144
Halimus 2,120
Hammoniacum 3,98
Haſtula regia 2,199
Hedera 2,210
Hedera humi repens 4,126
Hedychroon 270
Hedyſarum 3,146
Helenium 2,27
Helenium Ægyptium 1,28
Heleoſelinum 3,75
Helioſcopius tith. 4,165
Heliotropium magnũ 4,193
Heliotropium paruum 4,194
Helleborum album 4,150
Helleborum nigrum 4,151
Helxine 4,39,86
Hemerocallis 3,137
Hemionitis 3,152
Hepar aſininum 2,42
Hierabotane 4,61
Hieracium magnum 3,72
Hieracium paruum 3,73
Hippace 2,80
Hippocampus 2,5
Hippolapathum 2,141
Hippomarathrum 3,82
Hippophaës 4,162
Hippophæſton 4,163
Hippopotami teſticulus 2,25
Hippoſelinum 3,78
Hirundo 2,60
Holoſtium 4,11
Hordeum 2,108
Horminum 3,145
Hyacynthus 4,63
Hydrargyrum 5,110
Hydromelon 5,30
Hydropiper 2,191
Hyoſcyamus 4,69
Hypecoon 4,68
Hypericum 3,171
Hypociſtis 1,127
Hypogloſſon 4,232
Hyſſopites vinum 5,50
Hyſſopus 3,30

I

Iaſpis 5,160
Iberis 2,188
Ichthyocolla 3,102
Iecur aprinum 2,40
Iecur canis rabidi 2,49
Iecur caprinum 2,47
Iecur mergi 2,50
Iex 1,144
Indicum 5,107
Irini ſpiſſamentum 1,66
ex Iride vinum 5,65
Irio 2,188
Iris 1,1
Iſatis ſatiua 2,215
Iſatis ſylueſtris 2,216
Iudaicus lapis 5,155
Iuncus 4,52
Iuncus odoratus 1,16
Iuniperinum vinum 5,46
Iuniperus 1,103
Iuſculum recentium piſcium 2,35

L

Labruſca 5,2
Lac 2,75
Lac muliebre 2,78
Lac ſchiſtum 2,77
Lacerta 2,69
Lacryma oleæ Æthiopicæ 2,141
Lactariæ herbæ 4,165
Lactuca ſatiua 2,165
Lactuca ſylueſtris 2,166
Ladanum 1,128
Lagopus 4,17
Lampſana 2,142
Lanæ 2,82
Lanæ vſtæ 2,83
Lapathum 2,140
Lapides ſpongiarum 5,163
Lapis actites 5,161
Lapis alabaſtrites 5,153
Lapis amiantus 5,156
Lapis Arabicus 5,149
Lapis Aſius 5,142
Lapis Gagates 5,146
Lapis galactites 5,150
Lapis geodes 5,169
Lapis hæmatites 5,144
Lapis ialpis 5,160
Lapis Iudaicus 5,155
Lapis magnes 5,148
Lapis Melitites 5,151
Lapis Memphites 5,158
Lapis morochthus 5,152
Lapis ophites 5,162
Lapis oſtracites 5,165
Lapis Phrygius 5,142
Lapis pyrites 5,143
Lapis Samius 5,173
Lapis ſapphirus 5,157
Lapis ſciſſilis 5,145
Lapis ſelenites 5,159
Lapis ſmyris 5,166
Lapis Thracius 5,147
Lapis thyites 5,154
Lathyris 4,167
Laurus 1,106
Laurus Alexandrina 4,147
Lemnia terra 5,113
Lens 2,129
Lenticula paluſtris 4,88
Lentiſcinum vinum 5,38
Lentiſcus 1,89
Leontopetalum 3,110
Leontopodion 4,131
Lepidium 2,205
Lepus marinus 2,20
Lepus terreſtris 2,21
Leucacantha 3,22
Leucas 3,113
Leucoïon 3,138
Libanotis 3,87
Libanotis coronaria 3,89
Lichen 4,53
Lichenes equorum 2,45
Liguſticum 3,58
Lilium 3,116
Linum 2,125
Limonium 4,16
Linozoſtis 4,192
Lithocolla 5,164
Lithoſpermon 3,158
Lixiuium ficus 1,186
Locuſtæ 2,57

Lolium 2,122
Lonchitis 3,161,162
Lotus 1,171
Lotus Ægyptia 4,114
Lotus satiua 4,111
Lotus syluestris 4,112
Lupinus 2,132
Lupinus syluestris 2,133
Lychnis coronaria 3,114
Lychnis syluestris 3,115
Lycium 1,132
Lycopsis 4,26
Lyncurium 2,100
Lysimachia 4,3

M

Macer 1,110
Mænæ 2,31
Magnes 5,148
Mala Epirotica 1,162
Mala Persica 1,164
Mala syluestria 1,163
Malabathrinum oleum 1,76
è Malabathro vinum 5,67
Malabathrum 1,11
Malicorium 1,153
Malua 2,144
Malum Punicum 1,151
Malus 1,159
Mandragora 4,76
Mandragorites vinum 5,81
Marathrites vinum 5,75
Marrubium 3,119
Marum 3,49
Medica 2,177
Medica mala 1,166
Medium 4,18
Medullæ 2,95
Megalium 1,69
Mel 2,101
Mel Ponticum 2,103
Mel Sardoum 2,102
Melanteria 5,118
Melanthium 3,95
Melia terra 5,180
Melilotus 3,48
Melimela 1,161
Melini compositio 1,55
Melitites lapis 5,151
Melitites vinum 5,15
Melomeli 5,29
Memphites lapis 5,158
Mendesium 1,72
Menta satiua 3,41
Menta syluestris 3,42
Mercurialis 4,191
Mespilus 1,169,170
Metalla 5,84
Metallicum atramentũ 5,118
Metopium 1,71
Meum 1,3
Milium 2,119
Millefolium 4,115
Millepedæ 2,37
Minij 5,117
Molibdæna 5,100
Moly 3,54
Morochthus lapis 5,152
Mullus 2,24
Mulsum 5,16
Mures 2,74
Muria 5,128
Mus araneus 2,73
Musculi 2,7
Muscus 2,10
Muscus marinus 4,99
Mustela domestica 2,27
Myagros 4,117
Myolotis 2,214
Myrica 1,116
Myriophyllon 4,115
Myrrha 1,77
Myrrha Bœotica 1,78
è Myrrha vinum 5,65
Myrrhis 4,116
Myrsinites vinum 5,37
Myrteum vinum 5,36
Myrtidanum 1,156
Myrtus 1,155
Mystus syluestris 4,146
Mytuli 2,7

N

Naphtha 1,101
Narcissinum 1,63
Narcissus 4,161
Nardinum vnguentum 1,75
è Nardo Celtica vinum 5,67
è Nardo syluestri vinum 5,69
è Nardo Syriaca vinum 5,67
Nardus 1,6
Nardus Celtica 1,7
Nardus montana 1,8
Nascaphthum 1,12
Nasturtium 2,185
Nectarites vinum 5,66
Nerion 4,8
Nitri spuma 5,131
Nitrum 5,130
Nuces auellanæ 1,179
Nuces iuglandes 1,178
Nymphæa 3,148,149

O.

Ochra 5,108
Ocimastrum 4,18
Ocimini præparatio 1,59
Ocimoides 4,18
Ocimum 2,171
Oenagra 4,118
Oenanthe 3,156,515
Oenanthini confectio 1,56
Oenanthinum vinum 5,33
Oesypus 2,84
Olea 2,138
Oleæ syluestris oleum 1,140
Oleaster 2,137
Oleum amygdalinum 1,39
Oleum balaninum 1,40
Oleum candidum 1,32
Oleum caryinum 1,41
Oleum cicinum 1,38
Oleum cnicinum 1,44
Oleum commune 1,30
Oleum Gnidicum 1,43
Oleum hyoscyaminum 1,42
Oleum laurinum 1,49
Oleum lentiscinum 1,50
Oleum mastichinum 1,51
Oleum melanthinum 1,46
Oleum myrtinum 1,48
Oleum omphacinum 1,29
Oleum rhaphaninum 1,45
Oleum sesaminum 1,41
Oleum Sicyonium 1,33
Oleum sinapinum 1,47
Oleum syluestris oliuæ 1,31
Oleum terebinthinum 1,59
Olyra 2,115
Omotarichos 1,35
Omphacites vinum 5,12
Omphacium 5,6
Omphacomeli 5,31
Onitis 3,35
Onobrychis 3,170
Onosma 3,147
Onyx 2,10
Ophites lapis 5,162
Orchis 3,141,142
Oreoselinon 3,76
Origanites vinum 5,61
Origanum 3,32
Origanum syluestre 3,34
Ornithogalon 2,174
Orobanche 2,172
Oryza 2,117
Osyris 4,143
Ossifragus 2,18
Ostracites lapis 5,165
Othonna 2,215
Oui candidum 2,55
Ouum 2,54
Oxalme 5,23
Oxymeli 5,28

P

Pæonia 3,157
Paliurus 1,121
Palma 1,148
Palmæ elate 1,150
Palmæ Thebaicæ 1,149
Palmeum vinum 5,40
Panaces 3,55
Panaces Asclepij 3,56
Panaces Chironium 3,57
Panacites vinum 5,78
Pancratium 2,205
Panicum 2,129
Papauer cornutum 4,66
Papauer erraticum 4,64
Papauer satiuum 4,65
Papauer spumeum 4,67
Papauer syluestre 4,65
Papyrus 2,115
Paralius 4,165
Paronychia 4,54
Parthenium 3,165
Pastinaca 3,59
Pastinaca marina 2,22

Pedicularis herba 4,156
Peplis 4,169
Peplos 4,168
Pepo 2,164
Periclymenon 4,14
Perſtereon 4,60
Perſea 1,187
Perſonata 4,107
Petaſites 4,108
Petroſelinum 3,77
Peucedanum 3,92
Phalangium 3,122
Phalaris 3,159
Phaſiolus 2,130
Phillyrea 1,125
Phœnicea herba 4,43
Phrygius lapis 5,141
Phthorium vinum 5,77
Phu 1,10
Phyllitis 3,121
Phyllon 3,140
Phyteuma 4,130
Picatum vinum 5,48
Picinum oleum 1,95
Picis liquidæ ſuligo 1,96
Pingue aromatibus vt imbuatur 2,91
Pinus 1,86 Piper 2,189
è Pipere vinum 5,65
Piſſaſphaltum 2,100
Piſtacia 1,177
Pityides 1,87
Pityuſa 4,166
Pix liquida 1,94
Pix ſpiſſa, ſiue arida 1,97
Plantago 2,133
Platanus 1,107
Platyphyllos tithym. 4,165
Plumbago 5,100
Plumbarius lapis 5,98
Plumbi lotura 5,95
Plumbi ſcoria 5,97
Plumbum vſtum 5,96
Prigitis terra 5,177
Polemonia 4,8
Polium 3,124
Polycnemon 3,108
Polygala 4,142
Plygonatum 4,6
Polygonon fœmina 4,5
Polygonon mas 4,4
Polypodium 4,188
Pompholyx 5,85
Populus alba 1,109
Populus nigra 1,113
Porrum 2,179
Portulaca 2,150
Portulaca ſylueſtris 2,151
Potamogeton 4,101
Poterium 3,17
Praſites vinum 5,58
Propolis 2,106
Prunus 2,174
Pſeudobunium 4,125
Pſeudodictamnum 3,58
Pſoricum 5,116
Pſyllium 4,70
Ptarmica 2,192
è Pulegio vinum 5,62
Pulegium 3,36
Pulmo marinus 2,39
Pulmo ſuillus 2,40
Pulmo vulpinus 2,41
Pumex 5,125
Purpura 2,4
Pycnocomon 4,176
Pyrethrum 3,86
Pyrites lapis 5,143
Pyrum 2,167
Pyrum ſylueſtre 2,168

Q

Quercus 1,142
Quinquefolium 4,42

R

Radicula 2,157,193
Radicula ſylueſtris 2,138
Radix Idæa 4,44
Radix Rhodia 4,45
Ranæ 2,28
Ranunculus 2,206
Rapum 2,134
Rapum ſylueſtre 2,135
Raſilis ærugo 5,91
Recrementum ferri 5,94
Reſina lentiſcina 1,90
Reſinæ variæ 1,92
Reſinæ vrendæ modus, eiúsque ſuligo 1,93
Reſinatum vinum 5,45
Rha 3,2
Rhamnus 2,119
Rhaphanus 2,137
Rhodites vinum 5,35
Rhoites vinum 5,34
Rhus 1,147
Ricinus 4,164
Roſa 3,130
Roſacei præparatio 1,53
Roſei paſtilli 2,131
Rubia 3,60
Rubigo ferri 5,93
Rubrica fabrilis 5,128
Rubrica Sinopica 5,111
Rubus canis 1,123
Rubus 4,137
Rubus Idæus 4,58
Rumex 2,140
Ruſcus 4,146
Ruta 3,52
Ruta ſylueſtris 3,53

S

Sabina 1,104
Saccharum 2,104
Sagapenum 3,95
Sal 5,126
è Salis flore vinum 5,76
Salis flos 5,129
Salis ſpuma 5,127
Salamandra 2,67
Saliuaris herba 3,86
Salix 2,136
Salſugo 5,128
Saluia 3,40
è Saluia vinum 5,71
Sambucus 4,174
Sambucus humilis 4,175
Samia terra 5,172
Samius lapis 5,173
Sampſuchini cõpoſitio 1,18
Samptuchum 3,47
Sandaracha 5,122
Sanguis 2,97
Sapphirus lapis 5,157
Sarcocolla 3,99
Sarmentitius cinis 5,135
Satyrium 3,143
Satyrium erythroniũ 3,144
Scammonia 4,171
Scammonites vinum 5,83
Scandix 2,168
Schiſtus 5,145
Scilla 2,202
Scillinum acetum 5,25
Scillinum vinum 5,26
Scincus 2,71
Sciſſilis lapis 5,145
Scolecia ærugo 5,92
Scolopendra 2,16
Scolymus 3,6
Scordium 3,125
Scoria argenti 5,101
Scoria ferri 5,94
Scoria plumbi 5,97
Scordopraſon 2,183
Scorpio terreſtris 2,13
Scorpioides 4,195
Scorpius marinus 2,14
Selenites lapis 5,159
Selinites vinum 5,74
Selinuſia terra 5,175
Semperuiuum magnũ 4,89
Semperuiuum paruum 4,90
Semperuiuum tertium 4,91
Senecio 4,97
Sepia 2,23
Seps 2,170
Seris 2,160
Serpyllum 3,46
Sertula Campana 3,48
Serum lactis 2,76
Seſamoides magnum 4,152
Seſamoides paruum 4,153
Seſamum 2,121
Seſeli Æthiopicum 3,61
Seſeli Maſſilienſe 3,60
Seſeli Peloponnenſe 3,62
Seuum bubulum 2,89
Seuum hircinũ, ouillum, & ceruinum 2,88
Sideritis 4 33,34,35
Siliquæ 1,158
Silphium 3,94
Silurus 2,29
Silybum 4,159
Sinapi 2,184

Sinopica rubrica 5.111
Siser 2.139
Sison 3.64
Sisymbrium 2.155.156
Sium 2.154
Smaris 2.30
Smilax aspera 4. 44
Smilax hortensis 2.176
Smilax laxus 4.145
Smyris 5.166
Smyrnium 3.79
Solanum halicacabum 4.72
Solanum hortense 4.71
Solanum manicum, siue furiale 4.74
Solanum somnificum 4.73
Solaris herba maior 4.193
Soltæ veteres 2.51
Sonchus 2.159
Sorba 2.173 Sory 5.119
Sparganium 4.21
Spartium 4.158
Sphondylium 3.90
Spina acuta 3.122
Spina alba 3.14
Spina Arabica 3.15
Spodi succedanea 5.86
Spongiæ 5.118
Spongiarum lapides 5.163
Spuma argenti 5.102
Spuma maris arida 5.127
Spuma nitri 5.131
Spuma salis 5.127
Squama æris 5.89
Squama Stomomatis 5.90
Stacte 2.73
Stachys 3.120
Staphisagria 4.156
Stibium 5.99
Stœbe 4.12
Stœchadites acetum 5.53
Stœchadites vinum 5.52
Stœchas 3.31
Stomomatis squama 5.90
Stratiotes 4.102
Stratiotes millefolius 4.103
Strigmenta à balneis 2.34
Strigmenta gymnasiorũ 2.36
Strigmenta palæstrica 2.35
Strobili 2.88
Strobilites vinum 5.44
Struthium 2.193
Styrax 1.79
Sulphur 5.124
Suini compositio 2.62
Sutorium atramentum 5.114
È Sycomoris vinum 5.42
Sycomorus 2.181
Symphytum petræũ 4.9.10

T

Talus suillus 2.62
Tamarix 1.16
Taxus 4.80
Telephium 2.117
Telini compositio 2.57
Tellinæ 2.8
Terebinthinum vinum 5.39
Terebinthus 2.91
Terra 5.170
Terra ampelitis 5.181
Terra Chia 5.174
Terra Cimolia 5.176
Terra Eretria 5.171
Terra fornacum 5.179
Terra Lemnia 5.113
Terra Melia 5.180
Terra Pnigitis 5.177
Terra Samia 5.172
Terra Selinusia 3.175
Testæ 5.178
Testiculus 3.141.142
Teucrium 3.111
Thalassomeli 5.20
Thalictrum 4.98
Thapsia 4.157
Thelypteris 4.187
Thlaspi 2.186
Thracius lapis 5.147
Thuris cortex 1.82
Thuris fuligo 1.84
Thuris manna 1.83
Thus 1.81
Thyites lapis 5.154
Thymbra 3.45
Thymbrites vinum 5.60
Thymelæa 4.173
Thymelaites vinum 5.78
Thymites vinum 5.50
Thymoxalme 3.24
Thymum 3.44
Tithymali 4.165
Tithymalus fœmina 4.165
Tordylium 3.63
Torpedo 2.17
Tragacantha 3.23
Tragium 4.49.50
Tragoriganites vinum 5.55
Tragoriganum 3.35
Tragos 2.115 Tragus 4.51
Tribulus 4.15
Trichomanes 4.137
Trifolium 3.123
Tripolium 4.135
Tussago 3.112
Triticum 2.107
Tubet 2.175
Tussilago 3.126
Typha 3.133

V

Veratrum album 4.150
Veratrum nigrum 4.151
Verbascum 4.104
Verbenaca recta 4.60
Verbenace suprina 4.61
Vermes terreni 2.72
Vettonica 4.1
Vini natura pro ætatis ratione 5. coloris 5.8. pro saporum, eorumq; quæ illi miscentur, differẽtia 5.9. pro locorũ differẽtia 5.10. pro vini generum facultate 5.11
Vinum abortiuum 5.77
Vinum ex abrotono 5.62
Vinum absinthites 5.49
Vinum aconites 5.73
Vinum adynamum 5.13
Vinum anethinum 5.75
Vinum apite 5.32
Vinũ aqua marina factũ 5.27
Vinum aromatites 5.64
Vinum asarites 5.68
Vinum è betonica 5.54
Vinum bunites 5.56
Vinum è calamintha 5.62
Vinum catorchites 5.41
Vinum cedrinum 5.45
Vinum cedrites 5.47
Vinum chamædryites 5.51
Vinum chamæpityinum 5.80
Vinum chamelaites 5. 9
Vinum conyzites 5.63
Vinum cydonites 5.28
Vinum daucites 5.70
Vinum dictamnites 5.57
Vinum elleborites 5.82
Vinum hyssopites 5.50
Vinum ex iride 5.65
Vinum iuniperinum 5.46
Vinũ èlabrusca expressũ 5.14
Vinum è malabathro 5.67
Vinum lentiscinum 5.38
Vinum mandragorites 5.81
Vinum marathrites 5.75
Vinum melitites 5.15
Vinum ex myrrha 5.65
Vinum myrsinites 5.37
Vinum myrteum 5.36
Vinum è nardo Celtica 5.67
Vinum è nardo syluestri 5.69
Vinum è nardo Syriaca 5.67
Vinum nectarites 5.66
Vinum œnanthinum 5.34
Vinum origanites 5.61
Vinum palmeum 5.39.40
Vinum panacites 5.72
Vinum phthoricum 5.77
Vinum picatum 5.48
Vinum è pipere 5.65
Vinum prasites 5.58
Vinum è pulegio 5.62
Vinum resinatum 5.43
Vinum rhodites 5.35
Vinum rhoites 5.34
Vinum è salis flore 5.76
Vinum è saluia 5.71
Vinum scammonites 5.83
Vinum scillinum 5.26
Vinum secundarium 5.13
Vinum selinites 5.74
Vinum stœchadites 5.52
Vinum strobilites 5.44
Vinum è sycomoris 5.42
Vinum terebinthinum 5.39
Vinum thymbrites 5.60

Vinum thymelaites 5,78
Vinum thymites 5,59
Vinum tragoriganites 5,55
Viola alba 3,138
Viola nigra seu purpurea 4,122
Vipera 2,18
Viscus 3,103
Vitex 2,135
Vitis alba 4,184
Vitis nigra 4,185
Vitis sylvestris 4,183. 5,2
Vitis vinifera 5,1
Vlmus 2,111
Vmbilicus Veneris 4,92,93
Vnguentorum compositio 2,52
Vnguis 2,10
Vngulę asinorum 2,44
Vngulæ caprinæ 2,46
Vrina 2,99
Vrtica 4,94
Vua 5,3
Vua passa 5,4

X

Xanthium 4,138
Xiphion 4,20
Xyris 4,22

Z

Zea 2,111
Zingiber 2,190
Zoptilla 3,98
Zythum 2,109

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΑΛΕΞΙ-

φαρμάκοις ἀφειεχομένων κεφαλαίων.

ELENCHVS CAPITVM QVAE IN

Alexipharmacis continentur.

Τὸ προοίμιον.		*Prefatio.*	
Περὶ κανθαρίδων.	κεφ. α	*De Cantharidibus.*	C. I.
περὶ πιτυοκάμπης.	κεφ. β	*De Pinorum eruca.*	C. II.
περὶ βυπρήστιος.	κεφ. γ	*De Buprestie.*	C. III.
περὶ σαλαμάνδρας.	κεφ. δ	*De Salamandra.*	C. IIII.
περὶ ἐφημέρου.	κεφ. ε	*De Ephemero.*	C. V.
περὶ δορυκνίου.	κεφ. ς	*De Dorycnio.*	C. VI.
περὶ ἀκονίτου.	κεφ. ζ	*De Aconito.*	C. VII.
περὶ τοῦ Ἡρακλείου μέλιτος.	κεφ. η	*De melle Heraclio.*	C. VIII.
περὶ κορίου.	κεφ. θ	*De Coriandro.*	C. IX.
περὶ ψυλλίου.	κεφ. ι	*De Psyllio.*	C. X.
περὶ κωνείου.	κεφ. ια	*De Cicuta.*	C. XI.
περὶ σμίλακος.	κεφ. ιβ	*De Taxo.*	C. XII.
περὶ ὑοσκυάμου καρπέου.	κεφ. ιγ	*De Carpasi liquore.*	C. XIII.
περὶ Σαρδωνίας πόας.	κεφ. ιδ	*De Sardonia herba.*	C. XIIII.
περὶ ὑοσκυάμου.	κεφ. ιε	*De Hyoscyamo.*	C. XV.
περὶ μανδραγόρου.	κεφ. ις	*De Mandragora.*	C. XVI.
περὶ μήκωνος ὀποῦ.	κεφ. ιζ	*De Papaveris liquore.*	C. XVII.
περὶ μήκωνος κερατίτιδος.	κεφ. ιη	*De cornuto Papavere.*	C. XVIII.
περὶ φακικοῦ.	κεφ. ιθ	*De Phacite.*	C. XIX.
περὶ τοξικοῦ.	κεφ. κ	*De Toxico.*	C. XX.
περὶ ἰξίου.	κεφ. κα	*De Ixia.*	C. XXI.
περὶ ψιμυθίου.	κεφ. κβ	*De Cerussa.*	C. XXII.
περὶ μυκήτων.	κεφ. κγ	*De Fungo.*	C. XXIII.
περὶ γύψου.	κεφ. κδ	*De Gypso.*	C. XXIIII.
περὶ αἵματος ταυρείου.	κεφ. κε	*De Taurino sanguine.*	C. XXV.
περὶ γάλακτος ἐμπεπυωδιάτος.	κεφ. κς	*De lacte intus coagulato.*	C. XXVI.
περὶ λιθαργύρου.	κεφ. κζ	*De Argenti spuma.*	C. XXVII.
περὶ ὑδραργύρου.	κεφ. κη	*De Argento vivo.*	C. XXVIII.
περὶ τίτανου, σανδαράχεως καὶ ἀρσενικοῦ.	κεφ. κθ	*De Calce, Sandaracha, & Auripigmento.*	C.
περὶ λαγωοῦ θαλασσίου.	κεφ. λ	XXIX.	
περὶ σφυρίδος καὶ βατράχου ὑλαίου.	κεφ. λα	*De Lepore marino.*	C. XXX.
περὶ βδέλλας.	κεφ. λβ	*De Rubeta & rana palustri.*	C. XXXI.
		De Hirudine.	C. XXXII.

De

De Veratro albo, thapsia, elaterio, & quibusdam alijs. C. XXXIII.

De aqua frigida, & caeteris quæ iisdem nobis domestica & in quotidiano vitæ vsu sunt. C. XXXIIII.

περὶ ἐλλεβόρου λευκοῦ, θαψίας, ἐλατηρίου, καὶ τῶν ἄλλων. κεφ. λγ

περὶ ὑδάτος ψυχροῦ, καὶ ἄλλων ἐμοὶ οἰκείων ὑδάτων. κεφ. λδ

Ἔλεγχος τῶν ἐν τοῖς Θηριακοῖς ὑφηγουμένων κεφαλαίων.

Elenchus capitum quæ in Theriacis continentur.

Præfatio.

Τὸ προοίμιον.

Signa rabiosi canis, eorumq; qui ab eo demorsi fuerint. C. I.

Σημεῖα κυνὸς λυσσῶντος καὶ τῶν ὑπ' αὐτοῦ δηχθέντων. κεφ. α

Morsus rabidi canis particularia remedia. C. II.

Θεραπεία ἰδιωτικὴ τῶν ὑπὸ λυσσώντος κυνὸς δηχθέντων. κεφ. β

Victus ratio demorsorum à cane rabioso. C. III.

περὶ διαίτης τῶν ὑπὸ λυσσώντος κυνὸς δηχθέντων. κεφ. γ

De Phalangijs. C. IIII.

περὶ φαλαγγίων. κεφ. δ

De Scolopendra. C. V.

περὶ σκολοπενδρας. κεφ. ε

De Scorpione. C. VI.

περὶ σκορπίου. κεφ. ϛ

De Pastinaca marina. C. VII.

περὶ τρυγόνος θαλασσίας. κεφ. ζ

De Mure araneo. C. VIII.

περὶ μυγαλῆς. κεφ. η

De Vipera. C. IX.

περὶ ἰχνεύμονος. κεφ. θ

De Scytale & Amphisbæna. C. X.

περὶ σκυτάλης καὶ ἀμφισβαίνης. κεφ. ι

De Dryina. C. XI.

περὶ δρυΐνης. κεφ. ια

De Hæmorrhoo. C. XII.

περὶ αἱμορρόου. κεφ. ιβ

De Dipsade. C. XIIII.

περὶ δι.ψάδος. κεφ. ιγ

De Natrice. C. XIIII.

περὶ ὑδρου. κεφ. ιδ

De Cenchro. C. XV.

περὶ κεγχρου. κεφ. ιε

De Ceraste. C. XVI.

περὶ κεράστου. κεφ. ιϛ

De Aspide. C. XVII.

περὶ ἀσπίδος. κεφ. ιζ

De Basilisco. C. XVIII.

περὶ βασιλίσκου. κεφ. ιη

Communia vulnerum à venenatis animantibus insticlorum curatio. C. XIX.

Τὰ κοινὰ τῶν ἰοβόλων θεραπεία. κεφ. ιθ

Curatio à vespa & apibus morsorum. C. XX.

περὶ θεραπείας τῶν ὑπὸ σφηκῶν καὶ μελισσῶν δηχθέντων. κεφ. κ

Curatio a Phalangijs morsorum. C. XXI.

περὶ τῶν ὑπὸ φαλαγγίων δηχθέντων. κεφ. κα

Curatio demorsorum a scolopendra. C. XXII.

περὶ τῶν ὑπὸ σκολοπενδρας δηχθέντων. κεφ. κβ

De Scorpionis ictu. C. XXIIII.

περὶ τῶν ὑπὸ σκορπίου δηχθέντων. κεφ. κγ

De Pastinaca marina ictu. C. XXIIII.

περὶ τῶν ὑπὸ τρυγόνος θαλασσίας δηχθέντων. κεφ. κδ

De marinorum scorpij draconumq; ictibus. C. XXV.

περὶ δρακόντων καὶ σκορπίου τῶν ἐν θαλάσσῃ. κεφ. κε

De Muris araneæ morsu. C. XXVI.

περὶ τῶν ὑπὸ μυγαλῆς δηχθέντων. κεφ. κϛ

De Viperæ morsu. C. XXVII.

περὶ τῶν ὑπὸ ἰχνεύμονος δηχθέντων. κεφ. κζ

De Amphisbænæ morsu. C. XXVIII.

περὶ τῶν ὑπ' ἀμφισβαίνης δηχθέντων. κεφ. κη

De morsu Dryinæ. C. XXIX.

περὶ τῶν ὑπὸ δρυΐνης δηχθέντων. κεφ. κθ

De morsu cum Hæmorrhoo tum etiam Dipsadis. C. XXX.

περὶ τῶν ὑφ' αἱμορρόου καὶ διψάδος δηχθέντων. κεφ. λ

De morsu Natricis. C. XXXI.

περὶ τῶν ὑπὸ ὑδρου δηχθέντων. κεφ. λα

De Cenchridis morsu. C. XXXII.

περὶ τῶν ὑπὸ κεγχρίδων δηχθέντων. κεφ. λβ

De morsu Cerastæ. C. XXXIII.

περὶ τῶν ὑπὸ κεράστου δηχθέντων. κεφ. λγ

De Aspidis morsu. C. XXXIIII.

περὶ τῶν ὑπ' ἀσπίδος δηχθέντων. κεφ. λδ

De Basiliscj morsu. C. XXXV.

περὶ τῶν ὑπὸ βασιλίσκου δηχθέντων. κεφ. λε

PLINIVS INITIO LIB. XXV.

IPSA quæ nunc dicetur herbarum claritas, medicinæ tantùm gratia gignente eas tellure, in admirationem curæ priſcorum diligentiæq; animum agit. Nihil ergo intentatum inexpertumq; illis fuit. Nihil deinde occultatum, quoq; non prodeſſe poſteris vellent. At nos elaborata iis abſcondere atque ſupprimere cupimus, & fraudare vitam etiam alienis bonis. Ita certe recondunt, qui pauca aliqua nouêre, inuidentes aliis: & neminem docere, in auctoritatem ſcientiæ eſt. Tantum ab excogitandis nouis, ac iuuanda vita mores abſunt. Summúmque opus ingeniorum diu iam hoc fuit, vt intra vnumquenq; rectè facta veterum perirent. At herculè ſingula quoſdam inuenta Deorum numero addidêre, hominum vtique vitam clariorem fecêre cognominibus herbarum, tam benignè gratiam memoria referente. Non æquè hæc cura eorum mira eſſet in his quæ ſatu blandiuntur, aut cibo iuuant, ſed culmina quoque montium inuia, & ſolitudines abditas, omneisq; terræ fibras ſcrutati inuenêre, quid quæque radix polleret, ad quos vſus herbarum folia pertinerent, etiam quadrupedum pabulo intacta ad ſalutis vſus vertentes. Minùs hoc quàm par erat, noſtri celebrauêre, omnium vtilitatum & virtutum rapaciſſimi. Primusq; & diu ſolus idem ille M. Cato, omnium bonarum artium magiſter, paucis duntaxat attigit, boum etiam medicina non omiſſa. Poſt eum vnus illuſtrium tentauit C. Valgius, eruditione ſpectatus, imperfecto volumine ad diuum Auguſtum, inchoata etiam præfatione religioſa, vt omnibus malis humanis illius potiſſimùm principis ſemper mederetur majeſtas. Anteà condiderat ſolus apud nos, quod equidem inueniam, Pompeius Lenæus, Magni libertus, quo primùm tempore hanc ſcientiam ad noſtros peruenille animaduerto. Nanque Mithridates maximus ſua ætate regum, quem debellauit Pompeius, omnium ante ſe genitorum diligentiſſimus vitæ fuiſſe argumentis præterquàm fama intelligitur. Vni ei excogitatum, quotidie venenum bibere, præſumptis remediis, vt conſuetudine ipſa innoxium fieret. Primò inuenta genera antidoti, ex quibus vnum etiam nomen eius retinet. Illius inuentum autumant, ſanguinem anatum Ponticarum miſcere antidotis, quoniam veneno viuerent. Ad illum Aſclepiadis, medendi arte clari, volumina compoſita extant: quum ſolicitatus ex vrbe Roma, præcepta pro ſe mitteret. Illum ſolum mortalium vigintiduabus linguis loquutum certum eſt, nec de ſubjectis gentibus vllum hominem per interpretem appellatum ab eo annis LVI. quibus regnauit. Is ergo in reliqua ingenij magnitudine medicinæ peculiariter curioſus, ab omnibus ſubiectis, qui fuêre pars magna terrarum, ſingula exquirens, ſcrinium commentationum harum & exemplaria, effectuſq; in arcanis ſuis reliquit. Pompeius autem omni regia præda potitus, transferre ea ſermone noſtro libertum ſuum Lenæum, grammaticæ artis doctiſſimum, iuſſit: vitæq; ita profuit non minùs quàm reipublicæ victoria illa. Præter hos Græci auctores medicinæ prodidêre, quos ſuis locis diximus. Ex his Euax rex Arabum, qui de ſimplicium effectibus ad Neronem ſcripſit: Crateuas, Dionyſius, Metrodorus, ratione blandiſſima, ſed qua nihil penè aliud quàm rei difficultas intelligatur. Pinxêre nanque effigies herbarum, atque ita ſubſcripsêre effectus. Verùm & pictura fallax eſt, coloribus tam numeroſis, præſertim in æmulatione naturæ: multumq; degenerat tranſcribentium ſors varia. Præterea parum eſt, ſingulas earum ætates pingi, quum quadripartitis varietatibus anni faciem mutent. Quare cæteri ſermone eas tradidêre. Aliqui ne effigie quidem indicata, & nudis plerunque nominibus defuncti, quoniam ſatis videbatur poteſtates vimq; demonſtrare quærere volentibus. Nec eſt difficilis cognitio: nobis certè, exceptis admodum paucis, contigit reliquas contemplari ſcientia Antonij Caſtoris, cui ſumma auctoritas erat in ea arte noſtro æuo, viſendo hortulo eius, in quo plurimas alebat, centeſimum ætatis annum excedens, nullum corporis malum experſus, ac ne ætate quidem memoria aut vigore concuſſis.

Neque aliud mirata magis Antiquitas reperietur, &c.

PEDACII DIOSCORIDIS ANAzarbæi De medica materia Liber primus.

ΠΕΔΑΚΙΟΥ ΔΙΟΣΚΟΡΙΔΟΥ ΑΝΑζαρβέως Περὶ ὕλης ἰατρικῆς βιβλίον πρῶτον.

IANO ANTONIO SARACENO, LVGDVNAEO, INTERPRETE.

Præfatio.

Τὸ προοίμιον.

QVONIAM, amicissime Arce, conscripsere multi, non modò veteres, sed & recentiores, de medicamentorum cùm præparatione, tum etiam facultate atque examine: demonstrare tibi conabor, me neque frustra neque citra rationem ad hác commentationẽ impulsum fuisse: quòd ex ijs ipsis alij nihil absolutum reliquerint: alij pleraque ex narratione descripserint. Enimuero Iolas Bithynus & Heraclides Tarentinus, prorsum omissa herbarum tractatione, rem ipsam leuiter ac paucis attigerunt: quin neque metallicorum aromatúmve omnium meminerunt. Crateuas autem herbarius & Andreas medicus (qui quidem accuratiùs quàm reliqui hac in parte versati existimátur) radices multas apprimè vtiles, herbásque nonnullas non satis designatas reliquerunt. Veruntamen priscis hoc dandum elogij, etsi pauca tradiderint, accuratè tamẽ in iisipsis elaborasse. At recẽtioribus (quo in numero sunt, Iulius Bassus, Niceratus, Petronius, Niger & Diodotus, Asclepiadæ omnes) assentiẽdũ nõ est: vt qui vulgatá & vnicuique cognitá materiá quadantenus accurata descriptione dignati sint: medicamentorũ verò facultates & examina cursim tradiderint, ac minimè vim eo-

ΟΛΑΣΩΝ, οὐ μόνοι ἀρχαῖοι, ἀλλὰ καὶ νέοι, συνεταξάμεθα περὶ τῆς τῶν φαρμάκων σκευασίας τε καὶ δυνάμεως, καὶ δοκιμασίας, φίλτατε Ἄρκε, πεφασμένοι σοι ἀναγκαῖον, μήτε κενὴν, μηδὲ ἄλογον ὁρμὴν ἐσχηκέναι τοῦς πλείοσι τὴν τοιαύτην συγγραφίαν· ἀφ' ὧν μὲν γὰρ αὐτῶν μήτε τὴν ἀφέλειαν τελείαν ἔσχον ἐξ ἱστορίας τὰ πλῆστα ἀναγράψαι. Ἴολας μὲν γὰρ ὁ Βιθυνὸς καὶ Ἡρακλείδης ὁ Ταραντῖνος ἐπ' ὀλίγον ἥψαντο τῆς αὐτῆς συγγραμματείας, τὴν βοτανικὴν πραγματείαν ἁπλῶς παραδόντες· μήτε τῶν μεταλλικῶν ἢ ἀρωμάτων πάντων ἐμνήσθησαν. Κρατεύας τε ὁ ῥιζοτόμος, καὶ Ἀνδρέας ὁ ἰατρὸς, (ὅτι γὰρ δοκοῦσιν ἀκριβέστεροι τῶν λοιπῶν περὶ τοῦτο τὸ μέρος αἱρεῖσθαι) πολλὰς ῥίζας διχρησοτάτας, καὶ ὅλας βοτάνας ἀπαρασημάντους εἰάσθην. πλὴν τοῖς μὲν ἀρχαίοις μυρίοις, καὶ τὸ ὀλιγότητος τῆς παραδόσεως, καὶ τὸ ἀκριβῶς ἐξετάζειν συγγνωστέον· τοῖς δὲ νέοις οὐ συγκαταθετέον. ὧν ὅτι Βάσσος ὁ Ἰουλιανὸς, καὶ Νικήρατος, καὶ Πετρώνιος, Νίγρ τε καὶ Διόδοτος, Ἀσκληπιάδαι πάντες. οὐ τὸ μὲν πᾶσι συμφυλον καὶ γνώριμον ὕλλω ἠξίωσθαι ὅτι ποσὸν ἀναγραφῆς ἀκριβοῦς, τὰς δὲ τῶν φαρμάκων δυνάμεις καὶ δοκιμασίας ἐξ ὑπερβολῆς παρέδοσαν· καὶ τῷ

Bibl. hominem adhibita in iis ipsis industria testimonium reddidisse.

Al. τίνας.

Ver. lib. ἀρώμα. τῶν. Por. καὶ τῆς ὑμνημένου.

V. ὧν ὅτι καὶ ὁ Βάσσος ὁ Ἰουλιανὸς. Al. Τύλλιος.

V. ἀσκληπιάδαι.

Id cod. addit δυνάμεις καὶ δι-
κηγορίας
Ang. Gadald. ex quodã antiquo codice, teste Mathiolo, legit ut ὄγκων διαστροφὰς ἐχόντων, tanquã ad voluptatẽ intuere Dioſc. quod annotauit Gallib. i ſimpl. med. c. 5 quoddã facultatũ medicamentorũ cauſas in tumores & meatus retul. ſic.
Par. ſic ſcripſit Pal. tu.
Par. ἀλλὰ θέσεως.
Par. cod. πρὸς ὁμοίως
Par. cod. ἐμπαιδεύσω. Ald. ἀσυμπαιδεύτως
Al ἡμῖν
Al ὠφελείας
Al. διηγήσεως
Al. ἐπιγνώμων
Al. ἀκριβείας
Al πρὸς δὲ καὶ ἐξ ἱστορίας τοῖς πᾶσι συμφ.

πείρᾳ τῷ ἐνέργειαν αὐτῶν χαρακτίζον- A
τες· τῇ δὲ τῆς αἰτίας κενοφωνίᾳ, εἰς ὄγκου
διαφορὰς ἔκαστον αὐτῶν ἀναφέροντες,
μετὰ τοῦ καὶ ἄλλα αὖτ' ἄλλων διαγρά-
φειν. ὁ μὲν οὖν διαπρεπὴς δοκῶν εἶ ἐν
αὐτοῖς Νίγερ, τὸ διὰ φόρβιον φησὶν ὀπὸν
εἶναι χαμελαίας, ἡμιωμφὴς ἐν Ἰτα- B
λίᾳ· ᾗ τὸ αἱδρόσαιμον, ταυτὸν ὑπάρ-
χειν ὑοσκιῷ, ἀλόην δὲ ὄρυκτὸν ἐν
Ἰουδαίᾳ ἡμιωμῆσθαι. καὶ ἄλλα τούτοις ὁ-
μοια πλείστα περὶ τῶν ἐν ἀργίαν
ἐκλίψεται ψευδῶς. ἁπερ ἔστι τεκμήρια
οὐκ αὐτοψίας, ἀλλὰ τῆς ἐκ παρακου-
σμάτων ἰσοσθείας. ἥμαρτον δὲ καὶ περὶ
τὴν τάξιν· οἱ μὲν ἀσυμφύλους δυνά- C
μεις συγκρούσαντες· οἱ δὲ καθ' ἕκαστα
ἀναλαβόντες, διέζευξαν τῆς ὁμογε-
νείας πάντη ἡμῖν καὶ τῆς ἐνεργείας αὐτῶν,
ὡς δηθεν τοῦτ' ἀσυμμιμνεύσαι γένεσθαι.
ἡμεῖς δ' ὡς ἔστιν εἰπεῖν ἐκ παρέτυχης ἡ-
λικίας ἀληθὲς ἵνα ἔχοντες ἐπιθυμίαν
περὶ τὴν ἐπίγνωσιν τῆς ὕλης, καὶ πολ- D
λὴν χρῆσιν ἐπιλαβόντες. οἷα γὰρ ἡμῖν
φιλόλογον βίον, συναγωνίζεσθαι τὴν
πραγματείαν ἐν ἑπτὰ παραδεδομένοις βι-
βλίοις σοὶ παρεσκευάσμεθα, ᾧ καὶ περὶ
συντάξεως ἀπάσης, δίχα ἐστὶν ἐκ-
πληρεστάτης πάσης, δι' ἣν ἔχεις πρὸς
ἡμᾶς ἀφάτως, φύσει μὲν πρὸς πάν- E
τας τοὺς ἀπὸ παιδείας αἱρουμένους· οἰ-
κειότερος, μάλιστα δὲ πρὸς τοὺς ὁμο-
τέχνους, ἰδιαίτερον δὲ πρὸς ἡμᾶς. δεῖγμα
δ' οὐ σμικρὸν τῆς ἐν σοὶ καλοκαγαθίας,
καὶ ἡ τῶν κρατίστου Λικινίου Βάσσου πρὸς
σὲ ἀφάτως, ἣν ἔγωμεν συνδιάγοντες
ὑμῶν, ἀξιοζήλωτον τὸ παρ' ἀμφοτέρων F
ὑμῶν πρὸς ἀλλήλους ἔρωτος ὁρῶντες· πα-
ρακαλοῦμεν δέ σε καὶ τοὺς ἐντυγχανομένους
τοῖς ὑπομνήμασι, μὴ τὴν ἐν λόγοις ἡμῶν
δύναμιν σκοπεῖν, μηδ' ἐν τοῖς πράγμα-
σι μὴ ἐμπειρίας ἐπιμέλεσθαι. μετὰ γὰρ
πλείστης ἀκριβείας καὶ μὴ πλάσας δι' αὐ-
τοψίας γονίας, καὶ ἐξ ἱστορίας συμφώνως G
τοῖς πᾶσι καὶ ἀνακρίσεως τῶν πρὸ ἑκάστοις ἐ-
πιχωρίων ἀκριβωσάντες. φράσομεν καὶ τῇ
τάξει διαφορᾷ χρήσασθαι, καὶ τοὺς ἡμῖν καὶ ἡμᾶς

rũ ad experiẽtię normã examinantes, ſed mania in aſſignandis cauſis verba funditãtes, ſingula in controuerſiarũ aceruũ extulerint: præterquã quòd alia pro alijs deſcripſerũt. Siquidem Niger, qui inter eos eximius cenſetur, euphorbiũ eſſe chamelææ in Italia naſcentis ſuccũ aſſerit: vt & androſæmõ cũ hyperico vnum & idem eſſe: quinetiã aloëm in Iudæa foſſilẽ naſci, aliáqi plurima hiſce ſimilia prodit manifeſtò falſa. Quæ quidẽ argumẽto ſunt, ea non oculata fide, ſed narratione ex auditu ab alijs accepta cognouiſſe. Porrò etiã in ordine peccarunt: dũ alij nulla cognatione iunctas facultates copularũt, alij ordinẽ elemẽtorũ ſecuti tum genera tũ eorũ vires à ſua cognatione diſiunxerũt, vt vel hãc vnã ob cauſã difficiliùs memoriæ mandari poſſint. Nos verò à primis, vt ita dicã, annis lugi quodã pernoſcendæ materię deſiderio capti, poſtquam terras multas obiimus (nec enim militarem vitam egiſſe nos ignoras) commẽtationem quinque libris comprehenſam te hortante exaraũimus: cui etiã opus ipſum dedicamus, gratum tuq; erga nos beneuolentiæ debitum implentes officium. Etenim, quæ tua eſt natura, cùm omnibus doctrina excultis, tum verò maximè ijs qui tecum eandem artem facilitant, ac nobis etiam aliquantò peculiarius teipſum familiarẽ exhibes. Neque vero paruo eſt ad tuam morum integritatem argumento viri optimi Licinij Baſſi inſigne erga te ſtudiũ, ſat nobis perſpectũ, cùm vna vobiſcum ageremus, mutuámque inter vos beneuolẽtiam æmulatione dignã obſeruaremus. Cæterùm te & quotquot alij eſtis hoſce lecturi cõmẽtarios rogatos velimus, vt ne ad noſtrum dicendi genus attendatis, ſed ad eam potiùs quæ rebus eſt adhibita cum experiẽtia induſtriã. Cùm enim maxima cum cura diligentiáque accurata plurima quidẽ oculata fide cognouerimus, alia verò partim ex concordi apud omnes hiſtoria, partim ex eorum indagatione quæ apud ſingulos eſſent domeſtica atque vernacula perdidicerimus, dabimus certè operam vt & diuerſo ab alijs vtamur ordine, & tũ

vel ſimplicia-rum
vel cum peritia & diligentia

genera tũ vires vniuſcuiuſque medicamenti accuratè deſcribamus. Porrò tractatú de medicamẽtis eſſe neceſſarium nulli non eſt in confeſſo, vt qui toti ſit arti coniunctus, eiúſque partibus omnibus incomparabile prẽſtet aũxiliũ. Quin & ars ipſa ex prẽparationibus, miſturis atque morborũ experimentis incrementũ capere poteſt, plurimùm ad id conferẽte ſingulorũ medicaminum cognitione. Prætereà verò familiarem vulgatámque materiam complectemur, quò ſcriptũ euadat numeris omnibus abſolutũ. Igitur ante omnia danda eſt opera, vt ſuis quęque temporibus ſingula tum legantur, tum etia reponantur. Nam ad horum rationẽ medicamẽta vel ſunt efficacia, vel penitus exoleſcũt. Siquidem ſerena cœli conſtitutione legere illa oportet: nec parui refert, ſiccáne an pluuia tempeſtate colligantur. Illud quoque multum intereſt, an loca ſint montoſa; edita, perflabilia, frigida, arida & ſiriculoſa. His enim in locis medicamentorum vires maiores validioréſque habentur. At quæ in campeſtribus, vliginoſis, vmbroſis, ac vento minimè peruijs enaſcuntur, vt plurimum effectu viribúſque ſunt infirmioribus, multóque magis ſi nec ſuo tempore nec opportunè collecta fuerint, aut etiam per infirmitatem intabuerint. Sed nec illud ignorandũ eſt, ea ſæpenumero pro loci proprietate & anni temperatura citius tardiúſve adoleſcere. Nonnulla quoque per hyemem propria peculiarique vi flores foliáque proferunt: ſunt & quædam bis anno florifera. Porrò cui in animo eſt horum peritiam aſſequi, eum oportet tum primo germinantu è terra prorumpentibus, tum adultis, atque etiam flaccęſcentibus adeſſe. Nec enim qui tantummodo pullulanti herbæ aſtiterit, eandem adultam noſſe poterit, nec qui adultam viderit, recèns erumpentem agnoſcat. Quo fit vt propter mutatam foliorum faciem, ac caulium, florum fructuúmque magnitudinem & id genus alias peculiares notas, magno in errore interdum verſentur qui non ita ſtudioſè ſingula fuere contemplati.

non ſanabilis aut inſſic.

A δυνάμεις ἐκείνου αὐτῶν ἀναγράφασθαι. Ὅτι μὲν οὖν ἀναγκαῖος ὑπάρχει ὁ περὶ φαρμάκων λόγος, πᾶσιν που δῆλον, συνεζευγμένος ὅλῃ τῇ τέχνῃ, καὶ τοῦτο ἀφ' ἑαυτοῦ συμμαχίαν ἀπτῶτον πρὸς μέρη παρεχόμενος. καὶ διότι δυσὶν δεῖται κατά τε τὰς σκευασίας καὶ τὰς μίξεις καὶ τοῦ

B ὅτι τῶν παθῶν τὰ φάρμακα πλῆθος συμβαλλομένης τῆς περὶ ἕκαστον τῶν φαρμάκων γνώσεως. ὥσπερ ἐφαλῆ μεθ' ἁλὸς καὶ τοῦτο σκευάσθη καὶ σύμφυλον ὕλῃ, ἵνα ἡ γραφὴ ᾖ πλήρης τελεία. περὶ πόσων δεῖ διορίζειν καὶ συλλογῆς ἑκάστου καὶ τοῖς οἰκείοις καιροῖς

C ὥσπερ. πῶς δὲ δεῖ τούτους ἢ ἐνεργῆ, ἢ ἐξίτηλα γίνεται τὰ φάρμακα. αἰθρίᾳ μὲν οὖν τῷ καταστήματος συλλέγειν δεῖ. μεγάλη δὲ καὶ τούτῳ ἐστὶ διαφορὰ διαφοροῖς, τῷ αὐχμῶν ἢ ὄμβρων ἡμῖν τοῦτο συλλογὴν ποιεῖσθαι. ὡς γὰρ καὶ ἐν ὀρεσι καὶ ὑψηλοῖς καὶ διαπεπωμένοις καὶ

D ψυχροῖς καὶ ἀνύδροις εἶναι τοὺς τόπους. ἰσχυρότερα γὰρ εἶναι αἱ δυνάμεις αὐτῶν· αἱ δὲ ἐν πεδινοῖς καὶ καθύγροις καὶ καλαμώδεσι καὶ μὴ διαπεπωμένοις, ἀπονώτερα καὶ τὸ πλῆθος, καὶ μᾶλλον αἱ μὲν καθ' ὥραν βίκαιρος συλλεγεῖσαι, ἢ δ' ἀδέτως ἐφθαρμέναι. Οὐκ ἀγνοητέον

E μὴν τοῦτο ὅτι πολλάκις ταῦτα διὰ τὴν ἰδιότητα τῆς χώρας, καὶ διὰ τὴν σύγκρασιν τοῦ ἔτους, τάχιον ἢ βραδύτερον ἀκμάζει. ἔνια δὲ καὶ διὰ τὴν ἑαυτῶν ἰδιότητα· ἐν χειμῶνι αὐξῆται καὶ φύλλα φέρει· ἐναί δὲ καὶ δὶς τοῦ ἔτους ἀνθοφορᾷ. ᾧ δὲ βουλόμενον ἐν τούτοις ἐμπειρίαν ἔχειν, δεῖ κατά τε τὴν

F ἀνθοφυῆ βλάστησιν ἐκ τῆς γῆς καὶ ἀκμάζουσι καὶ παρακμάζουσι παρεπιτυγχάνειν. οὔτε γὰρ ὁ τὴν βλάστησιν ἐν τούτοις μόνον, δύναται τὸ ἀκμάζον γνωρίσαι, οὔτε ὁ ἐωρακὼς τὸ ἀκμάζον, τὸ ἀνθοφυὲς ὁπηνίκα. πρὸς δὲ τοῖς μεταβαλλομένοις τὰ φύλλα, καὶ τῷ μεγέθει καὶ αὐξήσει καὶ καρποῖς, καί τινας ἄλλας ἰδιότητας, μεγάλη πλάνη γίνεται ἐπ' ἐνίοις, οἷς μὴ ὅτου τὴν ὕλην ποιησάμενος.

In quibuſdã codicibus deeſt ἐκείνου.

Par. ἀπ' ἐκεῖ

Al. ἐκ τοῦ

Pal. ἐκ τῶν φαρμάκων

Al. ἐφαλῆ.

V. καὶ πόσων

V. συγκράσεως

In Ald. cod. deeſt.

Al. ἀδιαστόλως.

V. τὰ πεπαῦσθαι

V. ἐκ τῆς

Par. βλάστ

Par. τὸ ἀκμάζον

τῶν δὲ τοιούτων χρὴ τὴν αἰτίαν, ἵνες τὴν ἀναγκαίαν ἁμαρτίαν ἁπλανῆ ᾖ, εἰπόντες ὅτι μήτε αὐξη μήτε καυλὸν μήτε καρπὸν φέρει, καθάπερ ὅτι τῆς ἀγρώστεως, καὶ βρυζίου καὶ πενταφύλλου. ὁ δὲ πολλάκις ἐπιτυγχάνων αὐτοῖς, καὶ ἐν πολλοῖς τόποις μάλιστα τὴν ἐπίγνωσιν ποιήσεται. χρὴ μὲν οὖν εἰδέναι ὅτι μόνα τὴν ἐντομικὴν φαρμάκων ὅτι πολλὰ ἔτη διαμένει, οἷ ἐλλέβορος ὁ λευκὸς καὶ μέλας· τὰ δὲ λοιπὰ ἄχρι τελείας ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ὅτου αὔξησε. τὰ μὲν δὴ ἐρυώδη, ὡς ὅτι σουχὰς, χαμαίδρυς, πόλιον, ἀβρότονον, σέριφον, ἀψίνθιον, ὕσσωπον, καὶ τὰ ὅμοια τούτοις, συλλέγειν δεῖ, ἐγκύμονα τὴν σπερμάτων· αὐξη δὲ πρὸ τῆς ἀποπτώσεως αὐτῶν· τοὺς δὲ καρποὺς πεπείρους ἔνεκε· καὶ τὰ σπέρματα δὲ ἀρχόμενα ξηραίνεσθαι πρὸ τῆς ἀποῤῥύσεως. χυλίζειν δὲ τὰς βοτάνας, ἀφαιρεθέντων ὄντων τῶν καυλῶν, ὁμοίως ᾗ καὶ τὰ φύλλα, ὁποῖς δὲ καὶ τὰ δάκρυα λαμβάνειν, τέμνοντας εἰς ἀκμὴν ἐπὶ τοὺς καυλούς. τὰς δὲ ἐις ἀπόθεσιν ῥίζας καὶ χυλίσματα ἐκ φλοιῶν ἀφαιρέσεως, ἀρχομένων φυλλορροεῖν τῶν βοτανῶν, καὶ τὰς μὲν καθαρὰς αὐτόθι ξηραίνειν ἐν τόποις αἰθρίοις, τὰς δὲ μετὰ χύσεως γῆς ἢ πηλοῦ, πλυθέντα ὕδατι. ἀποτίθεσθαι δὲ καὶ αὐξη, καὶ ὅσα βώδη τυγχάνει ἐν κιβωτίοις φιλυρείνοις αἰθρίοις, ἔστι δ' ἃ καὶ χάρταις ἢ φύλλοις χρησίμως ἐνειλεῖται πρὸς διαμονὴν τῶν σπερμάτων. τοῖς δὲ τὰ ὑγρὰ φάρμακα ἁρμόσει ὕλη πᾶσα ἡ πυκνὴ ἐξ ἀργύρου ἢ ὑέλου ἢ κεραίνου· γεγλυμμένων καὶ ὀστρακίνη δὲ ἡ μὴ λεπτὰ βάπτουσα· καὶ χυλίνων δὲ ὅσα ἐν πύξου· καταπλυνόμενα· τὰ δὲ χαλκᾶ ἀγγεῖα, ἁρμόσει πρὸς τὰ ὀφθαλμικὰ φάρμακα· ἐκ ὑγρὰ, καὶ ὅσα δὲ ὄξους ἢ πίσσης ὑγρᾶς ἢ κεδρίας καταπλύνεται. γίνεται δὲ καὶ μυελοὶ, ἐν κεραπτείνοις ἀγγείοις· ἀποτίθεσθαι δεῖ.

Hánceque ipſam ob cauſam in eum errorẽ quidá ſcriptores impulſi fuere, vt nónulla neq; flores neq; caulẽ neque ſemẽ producere aſſeruerint: veluti de gramine, tuſſilagine & quinque folio proditũ eſt. Ergo qui ſæpius ac multis in locis illa obſeruauerit, eorum etiam cognitionem maximè cõſequetur. Quin & illud ſcire conuenit, ſola ex herbarũ medicaminibus veratrum album & nigrũ in multos annos perdurare: reliqua verò maxima ex parte donec trimatum exceſſerint, eſſe ad vſum accommodata. Quæ verò fruticoſa ſunt, vti ſtœchas, triſſago, poliũ, abrotonũ, ſeriphiũ, abſinthium, hyſſopum & id genus alia, dum ſemine prægnãt, colligenda ſunt: flores autẽ, antea quàm ſponte decidant. At fructus maturos decerpere oportet, vt & ſemina, cùm primùm ſiccari cœperint, priuſquam in terram defluant. Sic & herbarũ æquè ac foliorum ſucci recens germinantibus cauliculis eliciendi ſunt. Liquores autẽ & lachrymæ excipiẽdæ inciſis caulibus iã adultis. Quæ verò radices aſſeruãdæ ſunt, aut è quibus exprimi ſucci, corticéſve auferri debent, eas eruere conuenit, cumprimùm herbæ folia amittere cœperint. Ac eas quidẽ quę mundę videbũtur, ex tẽpore ſiccis locis exiccare: quę verò terra lutóve fuerint obſitæ, aqua prius eluere oportet. Flores autẽ & quęcunque odorata fuerint, capſulis tiliaceis minimè humectis reponãtur. Sunt & qui chartis foliiſve ad ſeminũ conſeruationem vtiliter inuoluantur. Cęterum liquidis medicamentis conueniet materia quæuis denſior: qualis eſt argẽtea, vitrea aut cornea. Quin & fictilis, ti modo rara non ſit, accommodatur: itémque lignea, cáq; potiſſimũ quæ ex buxo paratur. Apta verò erunt ænea vaſcula medicamentis ocularijs ac liquidis, tiſque omnibus quę ex aceto, pice liquida aut cedria componuntur. Adipes autẽ ac medullas ſtanneis vaſis recondi oportet.

Περὶ Ἰριδος. Κεφ. α'.

De Iride. Cap. I.

ΙΡΙΣ ἀπὸ μὲν τῆς κατ' οὐρανὸν ἐμφερείας ὠνόμασται. φύλλα δ' φέρει ὅμοια ξιφίῳ, μείζονα δὲ καὶ πλατύτερα καὶ

IRIS à cœleſtis arcus ſimilitudine nomẽ obtinuit. Folia fert gladiolo ſimilia, ſed maiora, latiora & pin-

guiora: flores verò in caule ita è regione inter se collocatos vt sibi mutuo respondeant, reflexos ac varios. Partim enim albi, partim pallentes, partim nigri, partim purpurei, partim denique cærulei conspiciuntur. Atque adeò propter hanc varietatẽ factum est, vt pláta ipsa iridi cœlesti assimilata fuerit. Radices subiacent geniculatę, solidę, odoratæ: quas incisas in vmbra siccari, tádémque lineo filo traijci, atque ita recondi oportet. Est porrò prestátior Illyrica & Macedonica: ac inter has ipsas optima cui dẽsa radix est, quasi decurtata, frangenti cótumax, colore subfuluo, per quam odorata, gustu amariore, odore sincero, quæque situm non redolet, ac inter tundendum sternutamenta ciet. Secundum verò quo ad vires locum obtinet Africana, colore alba, gustu amara. Veterascentes teredinum iniuriam sentiunt: tunc tamen odoratiores reddi solent. Cęterùm vim habent omnes excalfactoriam, attenuantem, & contra tusses efficacem, vt quæ humores ægrè excreabiles attenuent. Crassos biliosósque humores ex mulsa septem drachmarum pondere potæ purgant: somnum quoque conciliat, lachrymásq; cient, & torminibus medentur. Eędẽ ex aceto potę venenatorũ morsibus auxiliantur: itemq; lienosis, cõuulsis, perfrigeratis aut rigentibus, iisque quibus genitura effluit: ex vino verò bibitæ mensęs ducũt. Sed & earum decoctum ad muliebres fotus est accommodatũ: quippe quod locos emolliat & aperiat: nec minus idoneum ad ischiadicorum infusa, itémque ad ea medicaméta quæ fistulas & sinus carne explent. Radices ipsæ cum melle collyrij in modum subditæ fœtus extrahũt. Coctæ verò & admotę, strumas inueteratósque scirrhos emolliunt. Siccæ eædem ac tritæ vlcera implent, & cum melle expurgant, ossáque nudata carne operiunt. Conferunt & ad capitis dolores ex aceto & rosaceo applicitæ: lentigines & maculas à Solis ardore contractas exterunt, cum veratro albo & duplo melle illitæ. Induntur & pessis, malagmatis & acopis: ac in vniuersum ad multa sũt vtilissimæ.

A λιπαρώτερα. αἴθη δ' ὅτι καὶ λῶπα ῥοδόλευκα, ἐπικαμπῆ, ποικίλα· ἢ γὰρ λευκὰ ἢ ὠχρὰ ἢ μέλανα ἢ πορφυρᾶ ἢ κυανίζοντα ὁρᾶται· ὅθεν δὴ καὶ τὴν ποικιλίαν ἀπεικάσθη ἴριδι τῇ οὐρανίᾳ. ῥίζαι δ' ὑπόκεινται γονατώδεις, στρεπταί, διώδεις, αἷς δεῖ μὲν τὰ τομὰν ξηρᾶναι ἐν σκιᾷ καὶ διείρασθαι λίνῳ

B διαπήλαντα. ἔστι δὲ βελτίων ἡ Ἰλλυρικὴ καὶ Μακεδονική, καὶ ἐν ταύταις ἀείσιν ἡ πυκνόῤῥιζος, καὶ ἀποκόλεβος, καὶ διάθραυστος, καὶ τῇ χρόᾳ ὑποκίρρος, καὶ στρόφοδα διώδης, καὶ τῇ γεύσει πικροτέρα· πλείστη τε ὀσμὴ εἰλικρινὴς, καὶ μὴ ναπίζουσα· πλαρμοί τε ἐν τῷ κόπτεσθαι κινοῦσι.

C δευτέρα δὲ ἡ Λιβυκή, λευκὴ καὶ παχέα ῥίζαι, πικρὰ πρὸς γεῦσιν, δὲ τερεύσα τῇ δυνάμει παλαιόμυα δὲ περιδυνίζει). βέλτιστον μὲν τὸ τότε γόνει). δυνάμιν δ' ἔχουσι πᾶσαι θερμαντικὴν, λεπτυντικὴν, ἁρμόζουσαι τοῖς ὄμμασι, καὶ τὰ δυσθεράπευτα ὑγρὰ λεπτο-

D ποιοῦσαι. καθαίρουσι δὲ παχὺ καὶ χολὰς πολιζούσας μετ' ὑδρομέλιτος, ὀλυνθῆς < ζ. εἰσὶ δὲ καὶ ὑπνοποιοὶ, καὶ δακρυοποιοὶ, καὶ τροφοὺς ἰῶνται. μέλι δ' ὄξος δὲ πινόμεναι θηριοδήκτοις ἀρήγουσι, καὶ σπληνικοῖς, καὶ σπωμένοις, καὶ τοῖς ψυχομένοις ἢ ῥιγοῦσι, καὶ οἷς γόνος τρυ-

E πᾶται· σὺν οἴνῳ δὲ πινόμεναι, ἄγουσιν ἐμμηνα· καὶ ὁ ἀπόζεμα δ' αὐτῶν πρὸς γυναικείας φυσίας εὔθετον, μαλάσσον ὁμοίως τόπους καὶ αἰδοῖα, ἰσχάδος τε δίκην ἐπὶ ἔγκλυσμα, καὶ συρίγγων καὶ κόλπων σαρκωδικά. τρυφοποιοῦσι δὲ ὡς κολλύρια μετὰ μέλιτος, ἐμβρύα καθαίρουσι μαλάσσουσι δὲ χειρῶνας καὶ σκίῤῥώματα παλαιὰ ἐφθαὶ καὶ καταπλασθεῖσαι. ξηραὶ δ' πληροῦσιν ἕλκη καὶ αἰανθαίρουσι μετὰ μέλιτος, καὶ τὰ ἐμπλώματα τῶν ὀστέων σαρκοῦσιν. ὠφελοῦσι δὲ καὶ κεφαλαλγίας, σὺν ὄξει καὶ ῥοδίνῳ καταπλασθεῖσαι. φακοὺς τε καὶ ἐφηλίδας ἀ-

G ποκαθαίρουσι, σὺν ἐλλεβόρῳ λευκῷ δὲ διπλασίονι μέλιτι καταπλασθεῖσαι. μίγνυνται δὲ πισσοῖς καὶ μαλάγμασι δὲ ἀκόποις δὲ καθόλου εἰσὶ πολύχρηστοι.

Περὶ Ἀκόρου. Κεφ. β'.

De Acoro. Cap. II.

A

Ἄκορον τὰ μὲν φύλλα ἴχει ὁμοφερῆ ἰρεσὶ, στενώτερα δὲ, καὶ ῥίζας οὐκ εὐόμιλους, ἀλλὰ πεπλεγμένας ἢ ἐκ ὀλίγου πυθμένος, ἀλλὰ πλαγίας καὶ ἐξεπιπλῆς, χόρτοις διάκαυμάς, ὑπολιβάνους, δριμείας τῇ γεύσει, καὶ τῇ ὀσμῇ ἡδείς. Διαφέρει δὲ τὸ πιεσὲν καὶ λευκὸν, ἀραιόν τε καὶ πλῆρες, καὶ ὠδές. τοῦτο δέ ἐστι τὸ ἐν Κολχίδι καὶ τὸ ἐν τῇ Γαλατίᾳ Ἀσπλήνιον λεγόμενον. Δύναμιν δὲ ἔχει ἡ ῥίζα θερμαντικὴν. πινόμενον δὲ ἀφέψημα αὐτῆς ὕδατι κοιλ· ἁρμόζει πρὸς πλευρᾶς πόνοι καὶ ἡπατος καὶ ἤπατος, στρόφοις, ῥήγμασι, σπασμοῖς· σπληνὸς τήκει· ὠφελεῖ καὶ στραγγουριῶντας, θηριοδήκτοις. ἐπὶ ἐπιπλάσματος ὡς ἰρεὶς πρὸς τὰ γυναικεῖα ἁρμόζει. ὁ δὲ χυλὸς τῆς ῥίζης ἀποκαθαίρει τὰ ὑποχυσιοῦντα τῆς κόρης μίγνυται δὲ καὶ τοῖς αἰτιδότοις ἡ ῥίζα χρησίμως.

Acorvm folia habet iridis æmula, attamen anguſtiora, radiceſq; nõ diſſimiles, verũ implicitas, neque in rectum actas, ſed obliquas & in ſumma terræ ſuperficie ſparſas, geniculis interceptas, ſubalbidas, guſtu acres & odore non ingratas. Præſtat verò denſum, album, carie non exeſum, plenum & odoratum. Huiuſmodi autem eſt quod in Colchide naſcitur, quodq; ex Galatia aduectum Aſplenium dicitur.

B

Vim habet radix calfactoriã: potúmque eius decoctum vrinas ciet, lateris, thoracis hepatiſq; doloribus ſubuenit: itémque torminibus, ruptis, conuulſis. Lienes abſumit: iuuat & eos quibus ſubſtillum eſt lotium, & à beluis venenatis demorſos: ac inſeſſu tanquam uris ad muliebria conducit. Succus radicis ea quæ pupillæ officiunt caliginemq; offundunt diſcutit. Vtiliter etiam ipſa radix antidotis immiſcetur.

C

Περὶ Μέου. Κεφ. γ'.

De Meo. Cap. III.

D

Μέον δὲ καλούμενον Ἀθαμαντικὸν θηλαῖαν πλῆσιον ἐν Μακεδονίᾳ καὶ Ἱσπανίᾳ, ὅμοιον κεγχρῷ ἐπὶ τοῖς φύλλοις ἀνήθῳ, παχύτερον ἢ τὸ ἄνηθον· δ' πηχῶν αἰωρούμενον λεπταῖς, πλαγίαις, καὶ ὀρθίαις, μακραῖς, βιώδεσι, θερμαινούσαις τὴν γλῶτταν· αἱ ῥίζαι ἀποζεθεῖσαι μὲθ' ὕδατος, ἢ καὶ λεῖαι δὲ χαὶ ἐψήσεως ποθεῖσαι, καὶ στραγγουρικοῖς καὶ νεφριτικοῖς πάνυ παρηγοροῦσι, καὶ δυσουρίαις ἁρμόζουσι, στομάχου τε ἐμπνευματώσεσι καὶ στρόφοις, ὑστερικῆς τε διαθέσεσι καὶ ἕδρας πόνοις. θώρακι ῥευματιζομένῳ σὺν μέλιτι λεῖαι αἱ ῥίζαι καλλιστὰ βοηθοῦσιν, αἷμά τε ἄγουσαι δι' ἐμπλάστου ἀποζεθεῖσαι εἰς ἴγκαθισμα. παιδίων δὲ κεκαπλασθεῖσαι ἐφηβαίοις οὖσι ἄγουσιν. ὄξει δὲ καὶ φαλαγγίς πλεῖον ἢ δεῖ πινόμενον.

Meum, quod Athamanticum denominatur, plurimũ in Macedonia & Hiſpania naſcitur, caule foliiſque anetho ſimile, ſed eo ipſo craſſius, ad duos aliquando cubitos aſſurgens: ſparſis ima parte radicibus tenuibus, partim obliquis, partim etiam rectis: longis, odoratis & linguam excalfacientibus. Hæ in aqua decoctæ, aut etiã citra coctura ad læuorem tritæ vitia ex veſicæ renumque anguſtiis orta potu leniunt, & vrinę difficultati conducunt: itémque ſtomachi inflationibus, torminibus, vterinis affectibus & articulorum doloribus. Thoraci quoque fluxione laboranti eclegmatis inſtar cũ melle tritæ auxiliantur. Earundem decoctum inſeſſu ſanguinem per menſtrua pellit. Infantium autem imo ventri illitæ vrinas mouent. Quòd ſi Meum largiùs quàm oporteat ebibatur, capitis dolorem conciliat.

E

F

Περὶ Κυπείρου. Κεφ. δ'.

De Cypero. Cap. IIII.

G

Κύπειρος, ὃν ἐρισίσκωνθον εἰς τινὲς ἀπὸ λαθοῦ καλοῦσι. φύλλα ἔχει ὅμοια σχοίνῳ, μακρότερα δὲ καὶ

Cypervm nõnulli æquè atque aſpalathum ervliſceptrũ nominant. Folia (ima) ferè porro ſimilia,

sed longiora & exiliora: caulem verò cubitalem aut etiam maiorem, angulosum, iunco similem: cuius in cacumine minuta folia sese proferunt, inter quæ est semen. Radices subiacent, quarum etiam vsus est, oblongæ instar oluarum, inter se cohærentes, aut etiam rotundæ, nigræ, odoratæ, amarulentæ. Nascitur in locis cultis iuxta atque palustribus. Optima radix quæ grandissima est, densa, plena, ægrè fragilis, aspera & odorata cum quadam acrimonia. Huiusmodi verò censetur Cilicia, itémque Syriaca, & quæ à Cycladibus insulis petitur. Vis ei excalfaciendi, vasorum oscula recludendi & vrinas mouendi. Calculosis & hydropicis pota auxilio est, vt & à scorpione ictis. Quin & vuluæ perfrigerationibus & obstructionibus fotu accommodatur, menses{que} cuocat. Sicca & ad læuorem trita facit ad oris vlcera, etiam depascétia. Miscetur & malagmatis calfaciétibus, & ad vnguentorũ spissaméta aptatur. Memoratur & altera Cyperi species quæ in India nascitur, zingiberis effigie: quæ commáducata croci vim reddere & amarore prædita esse animaduertitur. Illita verò quamprimum depilat.

A ἰσχόπεφ᾽ καυλὸν ὃ πηχυαῖον, ἢ καὶ μείζονα, γωνιώδη, ὅμοιον σχοίνῳ, οὗ κατὰ κορυφὴν φυλλαρίων ἐστὶν ἔκφυσις μικρῶν καὶ σπέρματος. ῥίζαι δὲ ὕπεισιν, αἱ καὶ ἡ χρῆσις, βραμάχοις ὥσπερ ἐλαίας συναφῆς ἑαυτῇς, ἢ καὶ στρογγύλαι, μέλαιναι, βώδεις, ἔμπικροι. φύεται δὲ τόπους ἐρ-

B γασίμους καὶ πελματώδεσιν. ἀρίστη δέ ἐστιν ἡ βαρυτάτη καὶ πυκνὴ καὶ ἁδρά, δύσθραυστος, πραχεῖα, βώδης μετά τινος δριμύτητος. τοιαύτη δέ ἐστιν ἡ Κιλίκις, καὶ ἡ Συριακὴ, καὶ ἡ ἀπὸ τῶν Κυκλάδων νήσων.

Δύναμις δέ ἐστιν αὐτῇ θερμαντικὴ, αἱματωπική, διυρητική· λιθιῶσι δὲ ὑδρωπικοῖς πινομένη βοηθεῖ, καὶ σκορπιοδήκτοις,

C καὶ ταῖς περὶ μήτραν ὑπὸ καταψύξεων καὶ μύσεσι πνευμάτων· ἁρμόζει, ἀγρύσα ἔμπλαστα. ποιεῖ δὲ καὶ τοῖς ἐν σώματι ἕλκεσι καὶ τοῖς ἐν στόμασι ξηρὰ λαμβανόμενα καὶ μαλάγμασι θερμαντικοῖς, καὶ εἰς τὰ σύμμικτα τῶν μύρων· βλήτιν. ἱστορεῖται δὲ καὶ ἐ-

D περὶ εἴδος κυπείρου ἐν Ἰνδίᾳ γινόμενον, παραπλήσιον ζιγγιβέρει· ὃ δὲ γεύσει δριμύν, χροιᾷ δὲ καὶ πικρὸν βραίνεται. καταχριόμενον δὲ τὰ δέρματα φιλοῖ τὰς θήρας.

De Cardamomo. Cap. V.

Περὶ Καρδαμώμου. Κεφ. ε.

CARDAMOMVM præstantissimum cẽsetur, quod ex Comagene Armenia & Bosphoro importatur. In India quoque & Arabia prouenit. Eligito quod est frangenti contumax, plenum, occlusum (quod enim tale non est, exoletum iudicatur) & caput odore tentans, gustu acre & subamarum. Vim habet cathactoriam. Ex aqua potum facit ad epilepticos, tussientes, ischiadicos, paralysim, rupta, conuulsa, tormina: & latum lumbricum expellit. Confert autẽ ex vino epotum renũ vitio laborantibus, difficulter meiẽtibus, à scorpione ictis, omnibúsque quos virulenta animantia venenis appetiuerunt. Cum lauri verò radicis cortice drachmæ pondere bibitum calculos comminuit: nec non fœtus fusitum enecat, & psoras ex aceto illitum aufert. Quin & ad vnguentorum spissamenta aliásque antidotos additur.

Vi fricandi vel potius frigendi.

ΚΑΡΔΑΜΩΜΟΝ ἄριστον τὸ ἐκ τῆς

E Κομαγηνῆς καὶ Ἀρμενίας καὶ Βοσπόρου κομιζόμενον. γίνεται δὲ καὶ ἐν Ἰνδίᾳ καὶ Ἀραβίᾳ. ἐκλέγου δὲ ὃ δύσθραυστον, πλῆρες, μεμυκός, ὃ δὲ μὴ τοιοῦτον, ἐξωρὲς ἐστι, καὶ ὃ τῇ ὀσμῇ πλησιάζον, γεύσει δὲ δριμὺ καὶ ὑποπικρον. Δύναμιν δὲ ἔχει θερμαντικὴν πινόμενον μετὰ ὕδατος πινόμενον πρὸς βηχικοὺς, βήττοντας, ἰσχιαδικοὺς, καὶ τοὺς ἄλλους, ῥήγμασι, ἀπάσμασι, τρόφοις, καὶ ἕλμινθα πλατεῖαν ἐκβάλλει· μετ᾽ οἴνου δὲ πινόμενον, νεφριτικοῖς, δυσουρικοῖς, σκορπιοπλήκτοις, καὶ πᾶσι τοῖς ἰοβόλοις ἁρμόζει· μετὰ δὲ δάφνης ῥίζης φλοιοῦ πολλοῦ

G ὄντος ἐν λίτρᾳ τριφθέν. φλέγει καὶ ἔμβρυα ἐκτοπιζόμενον, ἐν φώσει ἐξαίρει σὺν ὄξει καταχριόμενον μόνον· ἐν δὲ εἰς τὰ τῶν μύρων σύνθεσις ἐν ἑτέραις ἀντιδότοις.

Vt add ἐν πολυσπέρμῳ Catar. ἐν πολυσπέρμῳ καὶ στενομήκει. Al. μακρῷ.

V. ἐν ᾧ σπαράττεται αὐτόμενος. In v. cod. non legitur ἐν ᾧ σπαρ.

V. σπανὶ ἀφὶ ἐν βάδι.

Deeſt in Ald. & vet. V. ἐν ᾧ ἐκπνεῖται καὶ ἀφίσταται τὸ πνεῦμα βοηθεῖ δὲ ἐν ὕπνῳ.

V. ἐν ᾧ περὶ τοὺς πνεύμονας γινόμενα βήττει δὲ μάλιστα. Antonius duos Cardã.

Al. ἐν χροιᾷ.

Quidam addit μὴ ἔχει. Veteres aliqui carẽt. Pal. apud. Ac magis

Deſiderantur hæc pernodus in vet. cod.

Περὶ Νάρδου. Κεφ. ϛ'.

De Nardo. Cap. VI.

ΝΑΡΔΟΥ εἰσὶ δύο γένη· ἡ μὲν γάρ τις καλεῖται Ἰνδικὴ ἡ δὲ Συριακή. οὐχ ὅτι ἐν Συρίᾳ βλαστάνει, ἀλλ' ὅτι τὰ ὄρη ἐν ᾧ γεννᾶται, τὸ μὲν πρὸς Συρίαν τέτραπται, τὸ δὲ πρὸς Ἰνδούς. καὶ τῆς λεγομένης Συριακῆς, ἐστὶ βελτίων ἡ πρόσφατος, καὶ κύφη, πολύκομος, ξανθὴ τὴν χρόαν, βώδης ἄγαν, καὶ μετὰ τοῦ κυπτειάζειν ἐν τῇ ὀσμῇ· μικρὸν ἔχουσα στάχυν, πικρὰν τὴν γλῶσσαν, καὶ γλαφυρὰν ἀναξηραντικήν, ἐπιμένουσάν τε τῇ βώδει ἐφ' ἱκανόν. τῆς δὲ Ἰνδικῆς ἡ μέν τις λέγεται Γαγγῖτις, ἀπό τινος ποταμοῦ παραῤῥέοντος τὸ ὄρος Γάγγου καλουμένου, περὶ ᾧ φύεται. ἀσθενεστέρα δὲ δυνάμει ἐστὶ τῶν ἄλλων· ὃ ἐφ' ὑδατώδων τόπων ἐστὶ καὶ ἐπιμηκεστέρα, πλείονάς τε ἔχουσα τοὺς στάχυας ἀπὸ τῆς αὐτῆς ῥίζης, καὶ πολυκόμους καὶ περιπεπλεγμένους, εὐρομιώδεις τε τὴν ὀσμήν· ἡ δὲ ὀρεινοτέρα βώδεστέρα, καλλοβοτοῦσα χώρα, κυπτειάζουσα τε τὴν βώδειαν, ἔχουσά τε καὶ τὰ ἄλλα ἐν αὐτῇ, ὅσα περ καὶ ἡ Συριακὴ λεγομένη. καλεῖται δὲ ὡς καὶ Σαμφαριτικὴ, σφόδρα καλλοβὴς, ἀπὸ χωρίου οὕτω μασθείσης, μεγαλόστάχυς, λευκοτέρα καυλόν, ἐλάττω ὅτι μέσον ἔχουσα, ὑπερβαλλόντως τῇ ὀσμῇ, ὡς δεῖ ἀπεκλέγεσθαι. πιπράσκεται δὲ καὶ ἀποβεβρεγμένη, ὅταν γινώσκεται ἐκ τοῦ λευκὸν εἶναι στάχυα καὶ αὐχμηρὰ, καὶ μὴ ἔχειν τὸ χρῶς· δολίζουσι δὲ αὐτὴν ἐμφυσῶντες σίμμι μετ' ὕδατος ἢ οἴνου φοινικίτου, πρὸς δὲ συμπλοδαῖς αὐτὴν, ἵν' εὐρυτέρα γένηται. ὅτε δὲ τῆς χρείας ἀφαιρεῖν δεῖ, εἰ περιστείη ταῖς ῥίζαις πηλὸς, καὶ σήπειν χρόνιζόντα τὸ χλωρὸν, οὐχ ῥηστὸν τὰς χλεγινίπλεγας.

Δύναμιν δὲ ἔχουσι θερμαντικὴν, ξηραντικὴν, ὑγρικὴν, ὀδυνικὴν, κοιλίας τε ἰσχὺν ποιοῦσαι, ἵν' ἐκ μήτρας ῥύσεις προσιζάνουσαι, ἵν' ἰχῶρες στίλλουσι. βοηθοῦσι δὲ ναυτίαις, σὺν ψυχρῷ ὕδατι πινόμεναι τοῖς καρδιωγμοῖς, καὶ ἐμπνευματουμένοις, πάσχουσί τι καὶ ἰκτερικοῖς καὶ νεφριτικοῖς· ἐνάφεψηθεῖσαι δὲ ὕδατι, καὶ πυελισθεῖσαι, εἰς ἐγκαθίσματα φλεγμονὰς μήτρας

NARDI duo sunt genera. vna siquidem Indica, altera Syriaca nuncupatur: non quòd in Syria inueniatur, sed quòd montis in quo nascitur pars vna Syriam, altera Indos spectet. Ac in eius quidem quæ Syriaca dicitur genere præstantior ea censetur, quę recens est, leuis, comosa, colore flauo, per quam odorata, quæq; præterquam quòd odore cyperum imitatur, breuem habet spicam, gustu est amaro linguamq; maximè siccante, ac in sua odoris gratia diutinè permanet. Ex Indicæ verò nardi genere est quæ Gangetica dicitur, a fluuio quodam Gange nominato, qui montem, ad cuius radices ea nascitur, præterfluit. Hęc viribus est infirmiorib⁹ quòd in locis aquosis prouenìat, estq; procerior, atque complures habet spicas ab eadem radice tum comosas, tum sibi inuicē circumuolutas, virúsque redolentes. At quæ in editiore montis parte legitur, odoratior est, pusillásque habet spicas, iucundúmque cyperi odorem æmulatur, ac cæteras habet in se dotes, quas & Syriaca cognominata. Est & quędam cui Sampharitice nomē à loco inditum est, admodum pusilla, attamen magnas habens spicas, inter quas medius interdum prorúpit caulis, candidior & supramodū hircum olens. Hanc damnare in πλεον totum oportet. Venditur & madefacta: quod vitium ex eo deprehenditur, quòd candida sit spica, squalida, nulláque obsita lanugine. Adulteratur inspirato stibio cū aqua aut vino palmeo, quo videlicet magis compacta ponderosiorq; appareat. Vsus tempore si quod lutum radicibus hæserit, idipsum auferre oportet, vt & puluerē cribro incernere, qui quidem ad aquam eluendis manibus dicatam accommodatur. Vim habent excalfaciendi, exiccandi, vrinásque ciendi. Quamobrem & aluū epotæ sistūt, & appositæ ex vtero fluxiones saniémque cōpescūt. Ex frigida verò potę nauseę & stomachi rosionibus auxiliantur: itémque iis qui a flatibus exagitantur, hepaticis, ictericis atque nephriticis. Aquæ autē incoctę seu fotu seu insessu vuluę inflá-

V. cum Ruellio scribimus

V. πυκνὸν malūt. Al. τῇ μόνῃ

V. addit ἡ μετὰ ταῦτα, cui lectioni stipulantur Gal. 8. Simpl. & Paulus cap. de nardostachy.

V. caret & legit Μασσείσῃ

Al. δολοῦσι

V. φοινικίτου.

V. ἐμπνευματουμένοις

V. πυελισθεῖσαι φλεγμονὰς ἰδίας.

mationibus medétur. Faciunt & ad superfluo humore redundantes oculorum palpebras, dum ipſa cilia aſtringunt & condenſant. Quin & ficeæ humétibus corporib⁹ ad ſummouendam graueolentiam vtiliter inſperguntur. Miſcentur etiam antidotis. Porrò ad ocularia quoque medicamenta vſque ad ſummú lęuorem tritæ & cum vino in paſtillos conformatæ vaſe nouo non picato reconduntur.

A ἰῶνται. ποιοῦσι καὶ πρὸς τὰς ἐν ὀφθαλμοῖς μυδήσεις τῶν βλεφάρων, σύφουσαι καὶ δασύνουσαι τὰς βλεφαρίδας, καὶ ῥύσεις τε σώμασι πᾶσι φλεγμασίας μίγνυνται δὲ καὶ αἱ πόσεις. ἀποτίθενται δὲ εἰς τὰ ὀφθαλμικὰ ἐν ἀγγείῳ χαλκῷ ἀκονίτῳ, λεαινόμενοι ὕδατι οἴνῳ καὶ αἷμα πλασθῆσαι.

De Nardo Celtica. Cap. VII.

B Περὶ Κελτικῆς Νάρδου. Κεφ. ζ.

Celtica nardus naſcitur quidem in Liguriæ Alpibus, vernaculo ſermone Gallica dicta, ſed & in Iſtria prouenit. Eſt vero puſillus breuiſq; frutex, qui cú radicibus in manuales faſciculos colligitur: foliis oblõgis, ſubflauis, flore luteo. Caulium & radicum dũtaxat vſus eſt & odoris ſuauitas. Quare pridie aſperſos aqua faſciculos, amoto terremi ſi q̃d inhæſerit in humidiore ſolo ſuppoſita prius charta inſternere oportet, ac poſtridie repurgare: ſiquidem vtile cum acerboſo & alieno minimè propter humoris vim excutitur. Adulteratur autem herba perſimili quæ vna cú ea vellitur, quamq; propter viroſum odorem hirculũ nominant. Facile vero eſt hanc ab illa internoſcere: quandoquidem herba eſt ſine cauliculo & candidior, minuſque oblõga habet folia: quin neque radicem amará aut aromaticã, quẽadmodum legitima nardus. Itaque abiectis ſolis cauliculos radicéſque ſeponito: ac ſiquidem ad vſum reponere volueris, tritos vino excipito, tandémque ex ijs concinnatos paſtillos fictili vaſe nouo ac diligẽter operculato reſerua. Optima vero cẽſetur, quæ recẽs eſt & odorata, radicoſa, plena minimèque fragilis. Iiſdem quibus & Syriaca viribus pollet: ſed & valentius vrinas ciet, & ſtomacho eſt accõmodatior. Iecoris inflãmationibus ſuffuſiſq; felle auxiliatur: itemq; ventriculi inflationibus cum abſinthij decocto pota. Eodem plane modo valet & ad lienis, veſicæ renúmque vitia: itemq; ex vino ad venenatorum morſus. Cæterum additur etiam in malaginata, potiones & vnguenta calfacientia.

C Ἡ δὲ Κελτικὴ Νάρδος, χλοηρά) μὲν ἐν τοῖς κατ' Ἀγγελίαν Ἄλπεσιν, ὑπ' ἐπιχωρίων ὠνομασμένη Ἀλιόσλια χλοηρά) δ' ἐν τῇ Ἰστρίᾳ ἔστι. θαμνίσκος μικρὸς σὺν τῇ ῥίζῃ εἰς δίσμας ἀναλαμβανόμενος χλοπλησίως ἔχει δὲ φύλλα ἐπομήκη, ἐπὶ στενὸν ἀγόμενα, αὐθος μήλινον. μείων δὲ τοῦ καυλοῦ ἐστι καὶ τοῦ ῥίζωμα ἡ χρῆσις καὶ ἡ ὀσμή. ὅλην δεῖ πρὸ μιᾶς ἡμέρας καταῤῥαίνειν ταῖς ὕδατι ταῖς δίσμας, καὶ χωρίζοντας τὰ γλωῶδες, ὑφῆναι ἐπ' ἐδάφους νοτεροῦ, πρωϊνοκρωβύῳ χάρτῃ, τῇ δ' ὑστεραίᾳ καθαίρειν· ἀχρήστου γὰρ σωματοκαθαίρεται τοῦ ἀχυρώδους καὶ ἀλλοτρίου τὸ βύσσινον, ἀφ' οὗ τὴν ὀσμὴν εὐωδίαν. δολίζεται δὲ σέλινα ποιμαίνης αὐτῇ πόας ἑτέροις, διὰ τὸ ὅμοιον τῷ ὁμοίῳ βοσκωδες, πάλιν καλεῖσθαι. ὠχρὰ δὲ ἐπίγνωσις· ἄκαυλος γάρ ἐστιν ἡ πόα καὶ λευκοτέρα, καὶ ἧττον ὀπιμήκη τὰ φύλλα ἔχει, οὐδὲ τὴν ῥίζαν πικρὰν ἢ ἀρωματίζουσαν ὥσπερ ὅτι τῆς ἀληθινῆς ἔχει. ἀποφύσας οὖν τοὺς καυλοὺς καὶ τὰς ῥίζας, τοὺς δὲ φύλλα ῥίψας, εἰ βούλοιο δὲ ἀποτίθεσθαι, ἀναλαμβάνων λεῖα οἴνῳ, καὶ ξηράνας ἀμαπλάσας, φύλαττε ἐν ὀστρακίνῳ ἀγγείῳ χαλκῷ, πωμάζων ὀπιμελῶς. ἀρίστη δέ ἐστιν ἡ πρόσφατος καὶ εὐώδης, πολύῤῥιζος, οὐκ εὔθρυπτος, πλήρης. δύναται δὲ ὅσα καὶ ἡ Συριακὴ διυρητικωτέρα τε ἐστὶ καὶ εὐστομαχωτέρα ὠφελεῖ δὲ καὶ τοὺς ἠπατικοὺς φλεγμονάς, καὶ ἐκπυρικούς, καὶ πνευματώσεις στομάχου, μετ' ἀφεψήματος ἀψινθίου πινόμενον. ὁμοίως καὶ σπλῆνα, καὶ τὰ περὶ τὴν κύστιν καὶ νεφροὺς ἐπὶ πρὸς τὰ ἰοβόλων δήγματα σὺν οἴνῳ. ἐπὶ εἰς τὰ μαλάγματα μίγνυται καὶ ποτίσματα, ἐπὶ χρίσματα θερμαντικά.

Quidam, ἀλπεσιν

V. & Orib. ἠπαμάτων

V. addit πίνεται

V καὶ χρίσμασι καὶ ποτίσμασι θερ.

Περὶ Ὀρεινῆς Νάρδου. Κεφ. ρ'.

Ἡ δὲ Ὀρεινὴ νάρδος, καλουμένη δὲ ὑπό τινων καὶ θυλακίτις καὶ νῆρις, γινέται ἐν Κιλικίᾳ καὶ Συρίᾳ. φύλλα καὶ καυλοὺς ὅμοια ἠρυγίῳ ἔχουσα, μικρότερα μέν, οὐ μὴν πάχεα καὶ ἀγριώδη. ῥίζαι δὲ ὕπεισι μέλαιναι, βώδεις, δύο ἢ καὶ πλείους, ὥσπερ ἀσφοδίλου, ἰσχνότεραι καὶ μικρότεραι πολλῷ. οὔτε δὲ καυλὸν, οὔτε καρπὸν, οὔτε ἄνθος φέρει. ποιεῖ δὲ ἡ ῥίζα πρὸς ὅσα καὶ ἡ Κελτικὴ νάρδος.

Περὶ Ἀσάρου. Κεφ. θ'.

Ἄσαρον, οἱ δὲ, νάρδον ἀγρίαν καλοῦσι. φύλλα ἔχει κισσῷ ὅμοια, πυκνότερα δὲ πολλῷ καὶ στρογγυλότερα. ἄνθος μεταξὺ τῶν φύλλων πρὸς τῇ ῥίζῃ, κυανοῦν, ἰοσπυάμῳ κυλικρῷ ἐμφερές, ἐφ' ᾧ τὸ σπέρμα ὁμοιον γιγάρτῳ. ῥίζαι δὲ ὕπεισι πολλαὶ, γραμματώδεις, λεπταὶ, πλόκιμοι, ὅμοιαι ἀγρώστει. ἰσχνότεραι μέντοι πολλῷ καὶ βώδεις, θερμαίνουσαι καὶ διακαίουσαι λίαν τὴν γλῶτταν. δύναμις δὲ αὐτῶν διαρρητικὴ, θερμαντικὴ καὶ ἐμετικὴ, ἁρμόζουσα ὑδρωπικοῖς, ἰσχιαδικοῖς χρονίοις. ἄγουσι δὲ καὶ ἔμμηνα μετὰ μελικράτου πινόμεναι αἱ ῥίζαι πλῆθος ⊀ ς'. καθαίρουσιν ὡς ἑλλέβορος λευκός. μίγνυται δὲ καὶ μύροις. φύεται δὲ ἐν Ἀστακηνοῖς ὄρεσι, τῶν Ἄλπεων δὲ ἐν Πόντῳ καὶ Φρυγίᾳ καὶ Ἰλλυρίδι, καὶ ἐν Τουσίῃ τῆς Ἰταλίας.

Περὶ Φοῦ. Κεφ. ι'.

Φοῦ, οἱ δὲ, ἣν τινὲς ἀγρίαν νάρδον καλοῦσι, γίνεται μὲν ἐν Πόντῳ, φύλλα δὲ ἐλαφοβόσκου ἢ ἱππομελίνου ἔχουσα πλείονα καὶ καυλὸν πηχυαῖον ἢ μείζω, λεῖον, πυφερὸν, ἐμπορφυρον, μεσόκαυλον, διειλημμένον γόνασιν, οὗ ἡ ῥίζα τὰ τῆς νάρκισσου, ἐλάσσω δὲ καὶ πυφερώτερα, καὶ ἐν τῷ ἀνθολεύκῳ ἁλουργὰ πορφυρᾶ· ῥίζα δὲ ἡ μὲν ἄνωθεν, οἷον δακτύλου μικροῦ τὸ πάχος, πλόκια δὲ ὑπόρριζα ἔχει, καθάπερ χρῖνος ἢ μίλαξ ἑλλέβορος, ἀλλήλοις ὑπιπεπλεγμένα, ἀνόσμα, βώδη, ναρδίζοντα τῇ ὀσμῇ, μετὰ πικρᾶς βάσεως βρωμώδους. δύναται δὲ θερμαίνειν, οὐχ ἱκανῶς, ξηρὰ ποιοῦντα.

De Nardo Montana. Cap. VIII.

Nardus montana, quæ à quibusdam thylacitis & neris appellatur, in Cilicia & Syria naſcitur, foliis & caulibus eryngio ſimilibus: ſed minoribus, non tamen aſperis & aculeatis. Radices ſubiacent nigræ, odoratæ, binæ plurés ve ceu haſtulæ regiæ, ſed graciliores longéque minores. Neque verò caulem neque fructum neque florem diu ſuſtinet. Valet ad eadem omnia radix, ad quæ & Celtica Nardus.

De Aſaro. Cap. IX.

Asarvm aliqui ſylueſtre Nardú appellant. Folia habet hederæ, ſed dēſiora multò & rotúdiora: florem inter folia iuxta radicem, cęruleum, hyoſcyami cytinum referentē, in quo ſemen acini nucleo ſimile. Radices ſubiacēt numeroſæ, geniculatæ, tenues, obliquæ, gramini ſimiles, longè tamen graciliores & odoratæ: quæ quidem linguam excalfaciunt valdéque mordent.

Calfaciendi vrinas vomitúmque ciendi vi prædita ſunt: ideóque hydropicis & inueteratę Iſchiadi proſunt, ac menſes quoque proliciunt. Senis drachmis ex mulſa bibitæ radices veratri albi modo purgant. Miſcentur & vnguentis. Prouenit autē aſarum in opacis montibus: plurimum verò in Ponto, Phrygia, Illyrico & Veſtino Italiæ agro.

De Phu. Cap. X.

Phv, quod & ipſum aliqui ſylueſtre nardum appellant, in Ponto naſcitur, foliáque profert Elaphoboſco aut Oleri arro ſimilia: caulem cubitalem, aut etiam maiorem, læuem, mollem, purpuraſcentem, in medio cauum, geniculis interceptū. Flores ad narciſſinos proximè accedunt, ſed & minores ſunt & teneriores, & in albicante colore purpurei. Radix ſuperiore quidem ſui parte digiti parui craſſitudinē fermè æquat, ſed habet ex obliquo capillamenta iunci aut Veratri nigri inſtar inuicem implicita, flaueſcentia, odorata, atque adeo odore nardum æmulátia, cum viroſa quadam grauitate. Trita potui data calfaciendi, vrináſq; mouēdi vim habet.

Eius verò decoctũ & idipsum præstare potest, & ad lateris dolorẽ est efficax, mensesq; cit, & antidotis inseritur. Adulteratur ruisci radicibus admista: sed facile est illas dignoscere: sunt enim durę & frangi contumaces, citra gratiam odoris vllam.

De Malabathro. Cap. XI.

MALABATHRVM nonnulli Nardi Indicæ folium esse arbitrantur, odoris quadam cognatione decepti. (Sunt enim multa odore nardo similia, veluti Phu, Asarum, Neris) Secus autem se res habet. Etenim peculiare genus est, quod in paludibus Indicis gignitur. Folium id est, quod lentis palustris modo aquæ innatat, nulla fultum radice. Idipsum collectum statim lino traijcitur, siccatúmque reconditur. Aiunt & aqua per æstuos ardores exiccata cremis fomitibúsve aridis terram peruri: atque id nisi fiat, non amplius renasci. Laudatur recens & in nigrore quodam albicans, minime fragile, integrum, nares odore feriens, illiúsque suauitate diutius implens, nardo sapore simile, nullo salis gustu. Infirmum verò ac minutatim concisum quódque recepta vetustatis carie situm quasi redolet, vitiosum est. Easdem cum Nardo vires sortitur, sed illud efficacius omnia præstat: attamen malabathrum & vrinas ciendi maiore vi pollet, & stomacho conuenientius est. Oculorum inflammationibus in vino feruefactum tritúmque ac illitum apprimè confert. Subditur & linguæ ad commendandum oris halitum. Quin vestibus etiam vtiliter interponitur: eas siquidem & à tineis defendit, & odore non ineleganti tuetur.

Et carioſum expreſſus halitum

De Cassia. Cap. XII.

CASSIÆ complura sunt genera, quæ circa feracem aromatum Arabiam gignuntur. Habet autem crassi corticis sarmẽtũ, foliaq; piperis. Delige fulueſcentẽ, probè coloratá, corallij æmulá, pquàm angustã,

Περὶ Μαλαβάθρου. Κεφ. ια'.

ΜΑΛΑΒΑΘΡΟΝ ἔνιοι ὑπολαμβάνουσιν εἶ τῆς Ἰνδικῆς νάρδου φύλλον, πλανώμενοι ἀπὸ τῆς κατὰ τὸ ὁσμιλὲς ἐμφερείας. πολλὰ γὰρ ὅστιν ὅμοια τῇ ὀσμῇ νάρδῳ, ὡς τὸ φοῦ, ἄσαρον, νήρεις. ὧδε ἔχει δ' οὔτως. ἴδιον γάρ ὅστι γένος φυόμενον ἐν τοῖς Ἰνδικοῖς τέλμασι, φύλλον ὃν ὑπτιηχόμενον τοῦ ὕδατι, καθάπερ καὶ τὸ τῶν τελμάτων φακῆ, ῥίζαν οὐκ ἔχον. ὅταν συλλέγοντες, βύσσῳ λεπτῇ λίνῳ, καὶ ξηράναντες ἀποθῶνται. φασὶ δὲ καὶ τῆς ἠρείας αἰαζηρανθέντος τοῦ ὕδατος, καίεσθαι φρυγανίοις τὸ χλοῦ· μὴ ἀναμιγνύειν γὰρ τούτου μηκέτι φύεσθαι. ἔστι δὲ καλὸν τὸ εὐόσφραντον καὶ ὑπόλευκον ἐν τῷ μελανίζειν, ἀθραυστόν τε καὶ ὁλόκληρον, πλῆκτικὸν τῇ ὀσμῇ, καὶ ὑπὸ δάκνοντι τῇ δίψῃ, ναρδίζον δὲ τῇ γλώσσῃ, μὴ ἀμυδρίζον. τὸ δ' ἀδρανὲς καὶ τὸ λεπτοκοπτόμενον, βίρωπῶσθαι ἔχον τὴν ἀποφοράν, φαῦλον· δύναμιν δ' ἔχει τὴν αὐτὴν τῇ νάρδῳ. ἐνεργέστερον δ' ἐκείνης πάντα ποιεῖ. διουρητικώτερον μέν τοι καὶ εὐστοματικώτερον ὅστι τοῦ μαλαβάθρου δύναμις, καὶ πρὸς τὰς ὀφθαλμικὰς φλεγμονὰς ἀσμόζει αἰαζεσθεὶς σὺν οἴνῳ καὶ λέβητι ὑπτιηχόμενον ὑποτιθὲν δ' καὶ γλώσσῃ πρὸς εὐωδίαν στόματος, καὶ στεῤῥὰ ἱματίοις πίπτει. ἄβρωτα γὰρ καὶ εὐώδη τοῦτα τρυφᾷ.

Περὶ Κασσίας. Κεφ. ιβ'.

ΚΑΣΣΙΑΣ δέ ὅστι πλείονα εἴδη, περὶ τὴν ἀρωματοφόρον Ἀραβίαν γινώμενα. ἔχει δ' ῥάβδον παχύφλοιον, φύλλα δ' ὡς πεπέρεως. ἐκλέγου δὲ τὴν ἐγχρόου, βύσσῃ, χρωμῒζουσαν, σινωπὶ λίαν,

Al. ἰλλο. τοσαμυλώμενον.

V. ἀσίνα Al. πολλὰ γὰρ ἐστιν ὅμοια τῇ ὀσμῇ νάρδου, ὡς τὸ φοῦ. Lon codex ἀσαρον. mox al. ἀὴ τὸ, ναρεις. ἰερις Al. ναιρις)

Quidam μελανίζειν τε ἀθραυστον ἐχόντα.

Al. νάρδου ὀδμὴν. si Lacuna e ſequentibus, ναρδίζον δὲ τῇ γλώσσῃ μὴ

Al. ἐν ὀξυμέλιτι ἡ φλύκταινας

V. & Ald. certe

Al. κάκιον. & S Actius

μακρὰ καὶ παχῖαν, ἁπτὸς συελίσσοις πλήρη, διπλασίων ἐν τῇ γεύσει, καὶ σύφωσόν μετ' ὀλίγης πυρώσεως, ἀρωματίζουσαν, οἰνίζουσαν τῇ ὀσμῇ. ἡ δὲ τοιαύτη ἐστὶ τῶν βατικωτέρων· ἄχνη καλεῖται. δαφνὶς δὲ παρεισφέρεται ἐπὶ τῶν εἰς Ἀλεξάνδρειαν ἐμπόρων. τρίτη δέ ἐστιν ἡ μέλαινα καὶ ἐμπύρφυρος παχεῖα, γίζιρ καλουμένη, ῥοδίζουσα τῇ ὀσμῇ, μάλιστα πρὸς τὸν ἰατρικὸν· χρῆσιν δ' ἔχουσα βύσσου. δευτερεύει δ' ἡ παρεφθαρμένη. τετάρτη δέ ἐστιν ἡ καλουμένη Ἔλατὸς μοσυλίτης. αἱ δὲ λοιπαὶ βύπλεῖς, ὡς ἡ καλουμένη ἀσυφήμων, μέλαινα καὶ ἀηδὴς καὶ λεπτόφλοιος, ἥν καὶ φλοιορράγη· ὡς καὶ ἡ κιτρὼ καὶ δάκαρ καλουμένη. Ἔστι δέ τις ἐν ψευδοκασίᾳ ἀφάτως ἐμφερὴς, ἥτις ἐλέγχεται τῇ γεύσει, οὐκ οὖσα δριμεῖα, ὑδὲ ἀρωματώδης, παρεστιγμένον τι ἔχουσα φλοιὸν ἐπὶ τῷ ἐντὸς μέρει. ὠφελοῦσι δὲ καὶ πλατεῖα σύριγξ, ἁπαλὴ, κύφη, βάρους, ἀφαιρουμένου τῆς ἄλλης. ἀποδοκιμάζεται δὲ τὸ ὑπόλευκον ἐν φωρώδει, πεπαλιζόμενον ἐν τῇ ὀσμῇ, καὶ τὸ μὴ ἔχουσαν δὲ τὸ σύριγξ παχῖαν, φωρώδη δὲ καὶ λεπτόν. δύναμιν δ' ἔχει θερμαντικὴν καὶ οὐρητικὴν, ξηραντικὴν, σύφουσαν μετρίως. ἐκμοιοῖ δὲ εἰς τὰ πρὸς ὀξυδορκίαν ὀφθαλμικὰ καὶ μαλάγματα. φασί τινες αἵρειν μὲν μέλιτος καταχριομένην, καὶ ἔμμηνα ἄγειν, καὶ ἐχιοδήκτοις βοηθεῖν πινομένην, καὶ πρὸς τοὺς ἐντὸς φλεγμονὰς πᾶσαν ποτιθεῖσαν καὶ πρὸς πεφευγυίας εἰς ἕλκωσιν· καλά τε ἐστὶ καὶ συνθυμιάματα γυναιξὶ, πρὸς αἰδοίων μύτρας. διπλάσιον δ' αὐτῆς μισσύμβριον τῆς φαρμάκου, εἰ μὴ παρὼν τύχοιμι, δὲ αὐτὸ δρᾷ· ἄγαν δέ ἐστι πολύχρηστος.

A longam, craſſam, fiſtularum plenam, guſtu mordacem & cum multo feruore aſtringentem, aromaticam, odore vinoſo. Talis ab indigenis achy nuncupatur: à mercatoribus verò Alexandrinis daphnitis cognominatur. Huic præfertur nigra, purpuraſcens ſimul & craſſa, quæ Gizir appellatur, tanquam roſarum odorem ſpirans, & ad vſum medicum maximè accommodata. Secundum locum tenet antedicta. Tertia verò cenſetur quæ moſyleticus blaſtus, hoc eſt, germen, nominatur. Reliquæ viles habentur, velut ea quæ Aphyſemon dicitur, nigra, iniucunda & cortice tenui aut etiam rimoſo, necnon & ea quę Moto & Darca vocitatur. Eſt & quædam adulterina caſſia, ſimilitudine ineffabili: attamen guſtu deprehenditur: quippe quæ neque ſit acris, neque aromatica, adhærentémque medullæ corticem habeat. Reperitur & lata fiſtula, tenera, leuis, ſurculoſa: quæ quidem illi alteri præſtat. Reijce albicantem, ſcabram, quæq; hircinum virus oboleat, neque fiſtulam habeat craſſam, ſed tum ſcabram tum tenuem. Vim habet calfaciendi, vrinas mouendi, exiccandi & leniter aſtringendi. Conuenit ad ea medicamentà, quæ exacuendæ oculorum aciei gratia concinnantur, & ad malagmata. Lentigines tollit ex melle illita, menſtruáque ciet. Quin & à vipera demorſis pota auxiliatur. Confert & epota internis inflammationibus omnibus, renibúſque affectis. Prodeſt quoque fœminis tum inſeſſu tum ſuffitu, ad vteri dilatationem. Si deſit cinnamomum, huius duplum medicamentis admiſtum eadem quæ illud præſtat. Eſt denique ad multa per quàm vtilis.

B

C

D

E

F

Περὶ Κιναμώμου. Κεφ. ιγ'.

De Cinnamomo. Cap. XIII.

ΚΙΝΝΑΜΩΜΟΥ ἐστὶ πλείονα εἴδη, ἐνομαζόμενα ἐθνικῶς. Διαφέρει δὲ ὁ μόσυλον, διαφέρει δὲ ὁ σάζιν· πρὸς τὸν Μοσυλίτην καλούμενον κασσίαν. καὶ τούτου δὲ τὸ σφόδρα τὸν χρόα μέλαν, τὸ πρεῖζον,

CINNAMOMI plura ſunt genera: gentilitijs regionum in quibus naſcuntur deſignata nominibus. Excellit verò quod Moſylum ex eo dicunt, quòd aliquantulam retineat ſimilitudinem eius caſſiæ quæ Moſylitis nuncupatur: prætereáque in eo ipſo genere quod recens eſt, colore nigrum, ex vinoſo

G

ex vinoso in cinereum vergens, tenuibus virgultis, lęue, nodis frequẽtibus præditum, perquàm odoratum. Verè siquidem præstantissimũ ex odoris iucundi proprietate diiudicatur. Etenim in optimo & singulari reperitur odor rutæ aut cardamomo proximus. Præfertur & gustu acre ac mordacitatis particeps, necnon etiam cũ calfactione quadãtenus falsum, quodq; inter atterendũ nõ citò friatur, ac inter frágendum etiá ex se puluisculũ emittit, læuiáq; interim habet internodia. Facturus periculũ sumito ab vna radice surculũ. siquidẽ facilis est huiusce modi probatio. Enimuerò fragmenta miscellanea quædá sunt: atque adeò cùm primum fit experimentum, quæ præstantiora fuerint, dum halitu afflatúve suo odoratum implent, deterioris iudicium impediunt. Est & montanum crassum, pumilum, colore admodũ fluescens. Itémque tertium à Mosylo, quod est nigrum & valdè odoratum; attamen fruticosum, nec ita multis interstinctum geniculis. Quartum verò album est, fungosum, aspectu tuberosum ac vile, fragile, grandique radice cassiam redolente. Quintũ odore nares ferit, fluescit, corticeq; habet cassiæ ruffæ simillimũ: tangẽti verò solidũ animaduertitur, non valde neruosũ est, radiceq; crassa firmatur. In hoc genere quod thus, myrrhã, cassiã aut amomũ odoris suauitate imitatur, deterius est. Deligito candidũ, scabrũ rugosoq; cortice: at lęue & quod circa radicẽ lignosũ est, tanquá inutile repudiato. Est & aliud quiddam simile, quod adulterinũ cinnamomũ cognominatur, vile, odoris inualidi, viribúsque defectũ. Appellatur & quiddá zingiber, quod habet aliquã cũ cinnamomo cognationẽ, cũ tamẽ sit xylocinnamomũ. Est verò lignosũ cinnamomũ virgultis lõgis robustisque præditum, sed odore longè cinnamomo inferioribus. Sunt & qui xylocinnamomum genere ipso à cinnamomo differre dicant, quasi alterius sit naturę. Porrò cinnamomũ omne vim habet calfaciendi, vrinas ciẽdi, emolliẽdi atque cõcoquendi. Menstrua quoque ac fœtus pellit cũ myrrha, tum epotum, tũ & appositum. Contra bestias quæ virus eiaculãtur, venenáque conuenit.

tertium iuxta atque quod Mosylum dicitur, nigrum & valdè odoratum sed fruticosum.

Al. radici proximus.

A Ἄ ὸ τῷ οἰνώδη, λεπτὸν ᾗ πυκνὸς ῥαβδίοις καὶ λεῖον, ὄζοις σπανίοις κεχρημένον, σφόδρα εὐῶδες. ἡδὸν γὰρ ἡ πεῦκε ἀείσευ· κρίσις ὅτι πρὸς τὸ τῆ εὐωδία ἰδιότητα. εὐείσκεται γὰρ μετὰ τῦ ἀείσευ καὶ ἰδιάζοντος ἡ ὀσμὴ πηγαΐζουσα, ἢ καρδαμώμῳ ἐμφερὴς. ἔστι ᾗ δριμὺ ᾗ δηκτικὸν τῇ γλώσῃ, ᾗ ὑφδυνειζον μετὰ θερμασίας, ἔτι τῇ πρὸς πτέψει μὴ παχέως δασυνομένων, καὶ τὸ τῷ θραύεσθαι χροᾶδες, ἐ λεῖοι ἔχον τὸ μεταξὺ τῦ ὄζων. δοκιμάζε ᾗ ἀπὸ μιᾶς ῥίζης λαμβανῶν τὸ θαλλόν. εὐχερὴς γὰρ ἡ πίστη δοκιμασία. τὰ γὰρ θραύσματα, μίσματα τυγχάνῃ, ᾗ χῇ τὸ πρὸς τὴν δοκιμασίαν τὰ χρείττονα ἐκπονοῦντα ἐ πληροῦντα τὸ ὄσφρησιν, ἐμποδίζῃ τὸ ᾗ ἕτερος ἐπίκρισις. ἔστι ᾗ ὀρφνὸς, παχύς, κελεβόεις, σφόδρα ὑποξάνθου τὸ χρόαν. ᾗ τέτρον τρίτος δ' μόσυλον, μέλας ἐ λίαν εὐῶδες· εὐειρώδης ᾗ ᾗ οὐ πολυγλίσατον. τέταρτον, λευκὸν, χαῦνον, ὀγκώδες ἰδιάζῃ ᾗ ὑπὸ λείς, εὔθραυστόν τε ᾗ μεγάλην ἔχον ῥίζαν καὶ ἀρίζῃ. πέμπτον, τῇ ὀσμῇ πλησιάζει, ὑποξάνθου ᾗ ἐ τραχυεμφερὲς καὶ σὰ πυρρᾷ. τρὸς τὸ ἀφὴν ᾗ τερεὸν, ᾗ πάνυ ἰνώδες, παχύῤῥιζον. τούτων ᾗ ὃ πέον λιβανωτῦ ἢ μυρσίνης ἢ κασσίας ἢ ἀμώμου εὐώδιας, ἥττον ὄζει. ἀπολέγου ᾗ ὃ λευκὸν καὶ τὸ ψωρώδες, καὶ τὸ ῥυσόκαρφον ἐ ἄφνον, ᾗ τὸ ξυλῶδες ᾗ χῇ τὸ ῥίζας ὡς ἄχρηστον πρᾶγῦ. Ἔστι δέ τι καὶ ἄλλο ὅμοιον τὸ καλούμενον ψευδοκινάμωμον, εὐπλές, οὐκ ἄσσενον τῇ ὀσμῇ, οὐκ λεγόμενον ᾗ καὶ τῇ διαφορᾷ. καλᾶσι ᾗ καὶ ζιγγίβερ ξυλοκινάμωμον ὄν, ἔχον δέ πνα ἐμφέρειαν κινναμώμῳ. ἔστι ᾗ ξυλῶδες κινναμώμου, ἔχον ῥάβδους μακρὰς ᾗ ῥωμαλέας, καὶ τὸ εὐώδιαν πολὺ κατεστερηκός. λέγου ᾗ οὖν εἶναι ᾗ χῇ γένος ἑτερόφυλλον κινναμώμου τὸ ξυλοκινάμωμον, ἑτέρας ὂν φύσεως. Δυνάμεν δὲ ἔχει πρῶ κινναμώμου θερμαντικὴν, οὐρητικὴν, μαλακτικὴν, πεπτικήν. ἀγᾷ ᾗ καὶ ἔμμηνα καὶ ἔμβρυα πτόμενον

Al. ὁ τῷ οἰνώδη

Par. κρίσις

V. ἰδίωσιν

Ex veteri interpretis κεχρόμενον legendum putat Marc. Virgilius.

Ald μόσυλον.

Ald οὐ ἀχρῖον παραῤῥηγνύμενον. Alter. ex ea manuscr. πάντως ἐκ τοῦ ἐπάνω ἐστὶ κεφαλῆς ᾗ φαίνεται κρατὸς τινός. Al. ὁμοίως οὐ πανυπόδηλ. Ant. οὐδόλως. Marc. λόδης. Quidam ὀρφνὸς & tolerabilem, vt infrenum. Lacuna addit τὸ μὴ λ.

Ald. & v. μακρὰς

b. j.

καὶ πεσσόμενον μὴ σμύρνῃ, καὶ ἰοβόλοις θηρίοις· καὶ θανασίμοις ἁρμόζει· καὶ τὰ ταῖς κύρηις ὑποσκοτοῦντα ἀποκαθαίρει, θερμαίνει τι καὶ λεπτύνει, καὶ ἔστι διυρητικὸν, φακούς τε καὶ ἐφήλεις ἀποκαθαίρει μὴ μέλιτος ὑπαρχούσης· ποιεῖ δὲ καὶ πρὸς βῆχας, καὶ καταῤῥόους, ὑδρωπας, νεφρίτιδας, δυσουρίας. μίσγουσι δὲ καὶ τοῖς πολυτελέσι μύροις· καὶ καθόλου ἐστὶ πολύχρηστον. ἀποτίθεται δὲ εἰς ἀφαυρὸν λέβητα οἴνῳ ἀναλαμβανόμενον, καὶ ξηραινόμενον ἐν σκιᾷ.

Non habetur ὑ in Ald.

Deeſt καὶ in Ald.

Addit Ald. quæ Cratevæ tribuuntur. Ἐᾶν δέ τι λοιπὸν κατάμορον ἐστὶ τοῦ ὑδατοκαμμένου ἐφ' ἑαυτοῦ. ἄκρατὸν σπόδιον καὶ πεσσόμενον· ἔχει τινὰ μὲν πικρὰ ἐκκαθαίροντα μετρίως καὶ τὸ ὀσμῶδες καὶ χυμῶδες· καὶ τὸ μὲν τὸ λευκὸν καὶ τὸ κεχρωσμένον, καὶ τὸ ὀσμῶδες καὶ καυστικὸν χυμῶδες. id est, Est & cinnamomi quoddam genus, quod nonnulli pseudocinnamomum appellant, fruticosum valde virgultisque crassioribus, at tum odore tu etiã sapore cinnamomo longe inferius. Quidam dealbatum, μιγαρίζον. Florent. τὸ μιγαρὸν V. τὸν χρῶτα Vulg. πυγαρίζον S. add. ὑπόχλωρον. Μασσαλιῶτον δὲ ἄκρατον add. οἱ

Ἀμώμου. Κεφ. ιδ'.

Ἄμωμον ἔστι θαμνίσκος οἱονεὶ βότρυς, ἐκ ξύλου αἰτεμπεπλεγμένος ἑαυτῷ. ἔχει δέ τι καὶ αἶθος μικρὸν, ὡς λευκοΐου, φύλλα δὲ βρυωνίας ὅμοια. κάλλιστον δέ ἐστι τὸ Ἀρμένιον, χρυσίζον τῇ χρόᾳ, ἔχον τι καὶ ξύλον ὑποκίρρον, εὐώδεις ἱκανῶς. ὃ δὲ Μηδικὸν ἄφαυρόν ἐστι πεδίοις καὶ ἐν ὑφύδροις τόποις φύεσθαι, ἁδρωματώτερον. ἐστὶ δὲ μέγα καὶ ὑποχλωρον, καὶ πρὸς τὴν ἁφὴν ἁπαλὸν, καὶ ἰνώδεις τοῖς ξύλοις, ὀριγανίζον τῇ ὀσμῇ. ὃ δὲ Ποντικὸν ὑποκίρρον, οὐ μακρὸν, οὐδὲ δύαφρον, βοτρυώδες, πλῆρες καρποῦ, καὶ τῇ ὀσμῇ πλητικόν. ἐκλέγου δὲ τὸ φρόσφαλον καὶ λευκὸν ἢ ὑπόξυθρον, οὐ πεπιλημένον ἢ συμπεπλεγμένον, λελυμένον δὲ καὶ ἀφηκυῖαν, σπέρματος πλῆρες, ὅμοιον ὀστρυδίοις, βαρὺ, σφόδρα εὐώδες, δίκαια θύρσου, καὶ ὀρίγανον τὴν γλῶσσαν, ἁπλοῦν τῇ χρόᾳ καὶ ἁπαλὸν. Δυνάμεις δὲ ἔχει θερμαντικὴν, φυσητικὴν, ξηραντικὴν, ὑποτιτθίων, ἀνώδυνον τῶν μετὰ πάθους καὶ πλασσόμενον. φλεγμονάς τε καὶ μελικηρίδας πεπαίνει καὶ διαφορεῖ· σκορπιοπλήκτους τε μετ' ὄξους καταπλασθὲν ὠφελεῖ· ποδαγρικοῖς συμβάλλεται, καὶ ὠφελεῖ καὶ παρηγορεῖ καὶ ὀφθαλμῶν φλεγμονὰς, καὶ τοὺς ἐν ἀπλάγχνοις στεῤῥοὺς φθόους. τροφὸς δὲ τὰ γυναικεῖα ἄγει ἐν ποσὶ δόσει. ἐν ἐγκαθίσμασι χρήσιμον, πολὺν δὲ τὸ ἀφέψημα αὐτοῦ ἁρμόζει ἰπποκρηπικοῖς, νεφριτικοῖς, ποδαγρικοῖς. μίσγουσι δὲ καὶ αὐτὸ δόσει,

Deſunt hæc in Ald.

A Quæ pupillis caliginem offundunt diſcutit, calfacit ſimul & attenuat. Illitum ex melle, lentigines & maculas à Solis ardore contractas exterit. Facit & ad tuſſes, defluxiones, hydropem, renũ vitia, vrinæq; difficultatem. Quin & vnguentis pretioſis admiſcetur: ac in vniuerſum ad multa eſt vtile. Quò diu-
B tiùs eduret, tritum vino excipitur, in vmbra ſiccatur, atque ita reconditur.

De Amomo. Cap. XIIII.

AMOMVM puſillus eſt frutex, in vuæ modum ſuopte
C ligno in ſeipſum conuolutus. Florem habet paruum ceu violæ albæ, folia verò vitis albæ ſimilia. Præſtantiſſimum cenſetur Armeniacum, colore aureolum, ligno fulueſcente, valde odoratum. Medicum quoniam in planis aquoſiſque locis prouenit, infirmius exiſtit. Eſt autem magnum &
D ſubviride, tactu molle, virgultis ligneis venoſis, odore origani. Ponticum fulueſcit, nec longum nec ægrè fragile: racemoſum verò eſt, fructu plenum & odore nares feriens. Deligito recens & candidum aut ſubrubrum: non compactum aut cohærens, ſed laxum arque diffuſum, ſemine refertum
E acinis ſimili, ponderoſum, valde odoratum, minimè mucidum ſitúve obſitum, acre linguámque mordicans, ſimplici miniméque vario colore. Vim habet excalfaciendi, aſtringendi & exiccandi. Somnificum eſt dolorémque ſedat, fronti illitum. Inflammationes ac meliceridas maturat & diſcutit. A
F ſcorpione ictos ex ocimo illitum iuuat. Podagricis confert. Et iuuat & lenit etiam oculorum inflammationes, itémque viſcerum ex vua paſſa. Ad muliebria vitia tum peſſorum appoſitu, tum & inſeſſionibus vtile. Eiuſdem decoctũ epotum ex hepate, renúmque vitio
G laborantibus & podagricis apprimè conuenit. Inſeritur & antidotis,

vnguentísque pretiosíssimis. Sunt qui Amomum herba simili, quæ Amomis dicitur, adulterent: sed quæ & inodora sit & fructu careat. Nascitur ea in Armenia, floremq; profert origani. Porro in huiusce modi simplicium medicamentorum probationibus fragmēta fugiēda sunt: eligenda verò quæ ab vna radice suos habeant integros surculos.

De Costo. Cap. XIV.

COSTVS præcellit Arabicus, candidus & leuis, eximio suauique odore præditus. Secundum locum obtinet Indus, crassus, leuis ac niger ceu ferula. Tertius est Syriacus, grauis, colore buxeus, odore feriens. Præstantissimus censetur recens, candicans, omnino plenus, densus, aridus, a teredinibus non erosus, minimè virosus, sapore mordaci ac feruido. Vim habet excalfaciendi, vrinas ciendi, menstruáque ducendi. Veteri vitius & appositu & tum humido tum etiam sicco fotu opitulatur. A vipera demorsis succurrit semunciæ pondere potus: itémque pectoris affectibus, conuulsis, inflationibúsque ex vino & absinthio. Venerem ex mulso stimulat. Quin & latum lumbricum ex aqua pellit. Contra febriles rigores ante accessionum initia, necnō etiam paralysim ex oleo perunctione prodest. Ex aqua aut melle itidem illitus discolorem à Sole cutem emendat. Additur quoque in malagmata & antidota. Cæterùm nónulli admistis helenij Commageni validissimis radicibus ipsum adulterant. Sed facilè deprehenditur dolus: siquidem neque gustu feruet helenium, neque iucundum odorem, potentem sensúmque ferientem expirat.

De Iuuco odorato. Cap. XV.

IVNCVS odoratus alius in Africa, alius in Arabia nascitur: rursúmque alius in ea parte Arabiæ quæ Nabatæa dicitur. Et hic quidem omnium est laudatissimus. Secundum locum sibi vendicat Arabicus, quem nonnulli Babylonium, alij Teuchitim cognominant. Afer verò inutilis censetur.

A καὶ τῆς πολυτελεστάτης τῶν μύρων.

ἀλλίζουσι δέ τινες τὸ ἄμωμον τῇ λεγομένῃ ἀμωμίδι, ἐμφερῆ ὄση τῇ ἀμώμῳ, ἀόσμῳ μέν τοι καὶ ἀκάρπῳ, γλυκωτέρᾳ δὲ τὸ Ἀρμενίᾳ, αἶθος ἔχουσι ἐμφερὲς ὀρεϊγάνῳ. διὸ δὲ καὶ τῶν πιστῶν δοκιμασίαις τὰ θραύσματα ἐκφεύγει. ἐκλέ-

B γουσι δὲ τὰ ἀπὸ μιᾶς ῥίζης ἔχοντα κλάδους τελείους.

Hæc ad marginē habent codices nonnulli, vt alius esse videantur.

Gal. τὰ ὄντα τῶν ἰδίων κλάδων. al. ἔχοντα τοὺς ἰδίους κλάδους.

Περὶ Κόστου. Κεφ. ιε'.

ΚΟΣΤΟΣ διαφέρει ὁ Ἀραβικὸς, λευκὸς ὢν καὶ κοῦφος, πλείστῳ ἔχων καὶ ἡδεῖαν τὴν ὀσμήν. δευτερεύει δὲ ὁ Ἰνδικὸς, ἁδρὸς ὢν καὶ κοῦφος καὶ μέ-

C λας ὡς ναρθηξ. τρίτος δέ ἐστιν ὁ Συριακὸς, βαρὺς, τὴν χρόαν πυξώδης, πλήκτικὸς τῇ ὀσμῇ. ἄριστος δέ ἐστιν ὁ πρόσφατος, λευκὸς, πλήρης ὅλος, πυκνὸς, ξηρὸς, ἀτερηδόνιστος, ἄβρωμος, γλυκὺ δηκτικὸς, καὶ πυρώδης. Δυνάμιν δ' ἔχει θερμαντικὴν, διυρητικὴν, ἐμμηνώσεις ἀγωγὸν, καὶ

D τὰ ὠδὶ ὑστέραι παθῶν ἔρωσι, σὺν ὄξει πινόμενος καὶ κατάπλασμα καὶ πνιγμοῖσι. πινόμενος δ' ἐχιοδήκτοις βοηθεῖ οὐγγιὰν β'. πλῆθος, καὶ ὑδρωπικοῖς πόνους καὶ σπάσματα, καὶ πνευματώσεις μετ' οἴνου καὶ ἀνιθίου. καὶ ἀφεψόμενον δὲ πεσσομᾷ μετ' οἰνομέλιτος. ἄλλ δὲ καὶ ἔλ-

E μινθα πλατεῖαν μὲν ὕδατος, σὺν ἀλεύρῳ καὶ τι ῥητίνης δοὺς μετ' ἐλαίου τοῦ τῆς ἐπισπασίας, καὶ τοῦ ἁλυπικοῦ. καθαίρει δὲ καὶ ἔφηλιν καταχριόμενος μὲν ὕδατος ἢ μέλιτος. μίγνυται δὲ καὶ μαλάγμασι καὶ ἀντιδότοις. μιγνύουσι δέ τινες τοῦ ῥωμαλεωτάτου τοῦ κομμαγηνοῦ

F ἐλενίου ῥίζας, δολοῦντες αὐτόν. ὑγρὸς δὲ ἡ διάγνωσις. ὅτι μὲν πυρὶ τὸν χλοῦν τὸ ἐλένιον, οὔτι τὴν ὠδὶν ὄψονται καὶ πλῆκτικὴν παρέχει.

Hac videtur legisse Ruellius Suadēs Desideratur in Ald. At Cornarius ὑγιὲς ἡμῖσυ legit. Al. ἡμιπνιγμονώδες

Marc. legit καὶ Serapionis fortè auctoritate ducti.

V. quidam addit ὑγιὲς καὶ τὸ φυσῶδες.

Περὶ Σχοίνου. Κεφ. ις'.

ΣΧΟΙΝΟΣ, ἡ μὲν τις γίνεται ἐν Λιβύῃ· ἡ δὲ, ἐν Ἀραβίᾳ· ἑτέρα δὲ ἐν

G τῇ Ἀβαταίᾳ λεγομένῃ· ἥτις ἐστὶ κρατίστη. δευτερεύει δὲ ἡ Ἀραβική, ἣν ἔνιοι Βαβυλώνιον καλοῦσιν· ἡ δὲ, Τευχῖτις. ἡ δὲ Λιβυκὴ ἄχρηστος.

V.C. ἀβατίᾳ fortè τραβωνίτιδι

ἐκλέγου ὃ τὸ πρόσφατον, ἐμπυῤῥον, πολυανθῆ, σχιζομένου ὃ ἐμπόρφυρον καὶ λεπτόν, ᾧ ῥοδίζουσαν τῇ ὀσμῇ τῆς ἰούσης, ἐπιδηκτικὸν ἁφὴ τείβοντι ὃ ταῖς χερσὶ, ᾧ δάκνουσαν τὸ γλῶσσαν μετὰ πολλῆς πυρώσεως. χρῶνται ὃ τῇ ἄνθει καὶ τῷ καλάμῳ καὶ τῇ ῥίζῃ. Δύναμιν ὃ ἔχει διαῤῥηκτικὴν, ἐμμηνῶν ἀγωγὸν, πνευμάτων ἁφανλυτικὴν, κεφαλῆς καρηβαρικὴν, ὑποχύσεων μετεωρικὸν, ἐπὶ ᾧ ὀδυνηλικὴν, πεπτικὴν, καὶ ἀναστομωτικὴν. ὅ μὲν οὖν ἄνθος αὐτῆς ποτίσμασι χρήσιμον πρὸς αἵματος ἀναγωγὰς καὶ πόνους στομάχου, πνεύμονος, ἥπατος, νεφρῶν. μίγνυται ὃ καὶ αἰτιδόπιος ἢ ὃ ῥίζα τριπλασιαστέρα. δίδοται ᾧ τοῖς ἀσκώδεσι στομάχοις δίδοται, ὑδρωπιῶσί τε καὶ ἀπόσμασι χολικῇ μετ' ἴσου πεπέρεως πρὸς ἡμέρας πέντε. ὅ δ' ἀπόζεμα αὐτῆς, ταῖς περὶ μήτραν φλεγμοναῖς εἰς ἐγκάθισμα ἁρμόδιον.

Plin. καρηβαρικὸν ἢ ὑπνωτικὸν. Ald. & V. ὑπνωτικὸν. V. κεφάλαιον. Qui dã Spreliano OT. delet Sãb. V C legunt ἢ καλούμενον αἶδος ἀμυντικὸν ἐπιθέματος. Ald. & V. εἰς ἀδῖνας. Quidã ἀνιδίοις. In Par. pondus deest. Al. χνίσμα. dilatum

Περὶ Καλάμου. Κεφ. ιζ'.

ΚΑΛΑΜΟΣ ἀρωματικὸς φύεται μὲν ἐν Ἰνδίᾳ. ἔστι ὃ αὐτοῦ κάλλιστος ὁ κιρρὸς, πυκνογόνατος, καὶ εἰς πολλὰς σκιδαμοὺς θραυόμενος, γέμων ἀραχνίων τῷ σύριγγα, ὑποχλωρος, ἐν ᾧ τῷ ἀρωματικῷ γλίσχρος, στυπτικὸς, ὑποδριμὺς. δύναται ὃ ὕδρα κινεῖν πρὸς ἰόν. ὅταν ἁρμόζῃ μετὰ ἀγρώστεως ἢ σελίνου σπέρματος ἀφιππλῆς καὶ πολὺς, ὑδρωπικοῖς νεφριτικοῖς, στραγγουρικοῖς, ῥηγμασιν. ἄγει ὃ καὶ ἔμμηνα πανόλβιος καὶ πετροσέλινος, βήχαί τε ἰᾶται ὑποθυμιώμενος καθ' ἑαυτὸν, καὶ σὺν ῥητίνῃ τερεβινθίνῃ, τῷ κατὰ στόμα σύριγγος ἑλκομένῳ τῷ στόματι. ἀφίεται ὃ καὶ εἰς ἐγκαθίσματα γυναικεῖα, ᾧ ἐγκλύσματα. μίγνυται ὃ καὶ μαλάγμασι, καὶ θυμιάμασι πρὸς εὐωδίαν.

Plin. addit Oribas. Pal. ἀφίπλητος. V. carent.

Περὶ Βαλσάμου. Κεφ. ιη'.

ΒΑΛΣΑΜΟΝ ὃ μὲν δένδρον ἐστὶ μήκεθος λευκῆς ἢ πυρακάνθης τελεύτης, φύλλα ἔχον ὅμοια πηγάνῳ λευκοτέρα δὲ πολλῷ καὶ διαλλάττοντα, γενόμενον ἐν μόνῃ Ἰουδαίᾳ, καθ'

Al. addunt ἐκ χυμοῦ, alias aliter legit.

ΔΕ Deligito recentem, summè rutfum, flore copioso: quique dú scinditur finditúrve purpurascat, tenuem, quique dum manibus confricatur, suauem rosæ odorem emittat, multóque cũ feruore linguá mordeat. Vsus est floris culmorum & radicis. Vim habet vrinas mensésque ciendi. Inflationes discutit, caput aggrauat, leuiter ac modicè astringit: itémque calculum comminuit, concoquit, vasorúmque oscula aperit. Flos eius in potiones adhibitus vtilis ad sanguinis reiectiones & oris ventriculi, pulmonis, iecoris & renum affectus. Additur & in antidota. Radix est magis astrictoria: ideóque ad stomachi fastidia exhibetur: itémque hydropicis & conuulsis ad drachmam vnam cum pari piperis pondere per dies aliquot. Eius verò decoctum vuluę inflammationibus insessione conuenientissimum.

Pl. rubentibus fragmentis. Pl. effoliis fragmentis

De Calamo odorato. Cap. XVII.

CALAMVS aromaticus in India nascitur. Est verò probatissimus in eo genere suluus, crebris distinctus geniculis seu internodijs, quíque confractus in assulas multas dissilit, plenam habens araneorum fistulam, subalbidus, in commanducando lentus viscidúsve, astringens & subacris. Potus ad vrinam ciendam valet. Quare cum gramine aut apij semine decoctus & potus conuenit hydropicis, renum vitio laborantibus, iísque quibus substillum est lotium, & ruptis. Menses quoque & potu & appositu trahit. Tussi suffitu medetur tum per se, tum etiam cum resina terebinthina, ore nimirum hausto per fistulam fumo. Decoquitur & ad muliebres insessus, nec non & infusiones. Miscetur denique malagmatis atque suffitibus ad conciliandam odoris gratiam.

De Balsamo. Cap. XVIII.

BALSAMVM arbor lycij seu pyxacanthæ magnitudine conspicitur, foliáque habet rutæ proxima, sed candidiora multò & perpetuò magis virétia. In vnius iudææ certa

quadam cõualle, & Ægypto, naſcitur, differens ipſum à ſcipio, ſcabritia, proceritate & gracilitate. Quod igitur in frutice tenue & capillaceũ eſt, theriſtõ quaſi demeſſile dicitur: quoniã fortaſſis ob gracilitatẽ facilè demetatur. Quod vero opobalſamum dicitur, æſtiuis ſub ortu Canis ardoribus excipitur inciſa ferreis vnguibus arbore. Sed tá paucũ extillat, vt quotannis vix plures quam ſeni ſeptenive cõgij colligátur, inibiq; pondus argento duplo repẽditur. Eſt autẽ bonus ſuccus qui recẽs eſt, validi odoris, ſincerus, nõ ſubacidus, diluí facilis, læuis, aſtringens, & linguá modicè mordens. Sed variè vitiatur. Sunt enim qui ipſi olea vnguentáve admiſceát, quale terebinthinum eſt, cyprinum, lentiſcinum, ſuſinum ſeu liliaceum, balaninum ac metopium: itémque mel & ceratum myrtinum aut cyprinum valdè liquidum. Huiuſmodi verò maleficium facilè deprehenditur. Siquidem ſincerus laneæ veſti inſtillatus, ſi deinde eluatur, neque maculam facit, neque notam vllam relinquit: at vitiatus inhæreſcit. Rurſúmque purus lacti inſtillatus idipſum coagulat, id quod adulteratus non efficit. Quin & ſincerus lacti aut aquæ infuſus celeriter diffunditur, atque lacteſcit: at adulteratus olei modo innatat, in orbem circumageus aut diffundens ſeſe ſtellæ in modum. Attamen ſincerus etiam vetuſtate craſſeſcens, ſeipſo deterior euadit. Porrò hallucinantur qui ſincerum hunc exiſtimant aquę inſtillatum priùs ad ima ſidere fundúmque petere, ac poſtea tanquam qui facilè diffundatur & diffluat ſurſũ remeare. Lignũ verò quod xylobalſamũ vocant, probatur recens, ſarmento tenui, ruſſum, odoratum, quadantenus opobalſamum ſpirans. E fructus genere (nã & huius neceſſarius eſt vſus) eligito flauum, plenum, grandem, ponderoſum, guſtu mordentẽ & feruentẽ in ore, modicè opobalſamũ redolẽtem. Aſportatur à Petra oppido ſemen hyperico ſimile, quo fructus hic adulteratur: ſed ex eo dignoſces quòd maius illud ſit, inane, ignauũ, ſapore piperis. Efficaciſſima liquori vis ineſt, vt qui q̃ maxime calfaciat.

A λινα αὐλῶνα, καὶ ὁ Αἴγυπτος, διαφέρον αὐτὸ ἑαυτῷ τραχύτητι καὶ μήκει καὶ ἰσχνότητι. λέγεται γοῦν ὃ λεπτὸν καὶ τριχῶδες τῷ θάμνῳ θεριστὸν· ἴσως διὰ τὸ εὐχερῶς θερίζεσθαι ἰσχνὸν ὄν. τὸ δὲ ὀποβάλσαμον λεγόμενον ὀπίζει τοῖς πρὸ κυνὸς καύμασιν, ἐντιμονόμῳ σιδηρίῳ ἐνυξι τὸ

B δένδρον· ῥεῖ δὲ ὀλίγον, ὡς καθ' ἕκαστον ἔτος μὴ πλεῖον ἢ ἓξ ἢ ἑπτὰ χόας συναθροίζεσθαι. πωλεῖται δὲ τὸ τοῦ τέτρτου μέρους ἀυτοῦ τοῖς διπλοῦν ἀργύριον. ἔστι δὲ ὁπὸς καλὸς ὁ πρόσφατος, τῇ ὀσμῇ βύτυος καὶ εἰλικρινὴς, καὶ μὴ παροξίζων, διϋλιστος, λεῖος, ξύφων καὶ δάκνων μετρίως τὴν

C γλῶτταν. δηλοῦται δὲ ποικίλως· οἱ μὲν γὰρ χρίσματα μίσγουσιν αὐτῷ ὡς τὸ τερεβίνθινον, κύπρινον, σήσινον, σούσινον, βαλάνινον, μετώπιον, μέλι, κηρωτὴν, μύρινον ἢ κυπρίνου ὀγερὸν λίαν ἐλαίῳ· ἀλλὰ δοκιμάζεται ὁ βύτυος ὁ πιόδης· βάπτεται γὰρ ὁ ἀκήρατος εἰς ἔριον οὖφος, καὶ οὐκ πλανᾶται, κηλίδα δὲ οὐ ποιεῖ φαίνεται· ὁ δὲ διδόλωμένος

D τῇ μὲν θολερᾷ μᾶλλον· ὁ δὲ διδόλωμένος τῇ γάλακτι ὁ βάπτισμὸς πήγνυσι τοῦτο ὅπερ διδόλωμένος οὐ δρᾷ. ἔτι ὁ ἀκήρατος βάπτισμὸς γάλακτι ἢ ὕδατι χεῖται ταχέως καὶ γάλακτος· ὁ δὲ διδόλωμένος βάπτισμὸς καθαρῶς ἔλαιον, συστρεφόμενος ἢ ἁπτόμενος ἀτρεφῶς,

B τῷ μὲν τοι χρόῳ καὶ ὁ ἀκήρατος παχυνόμενος, ἑαυτοῦ χείρων γίνεται. πλανῶνται δὲ οἱ νομίζοντες τοῦτον ἀκήρατον βάπτισμα ὕδατι χωρεῖν εἰς βάθος πρῶτον. εἶτα ἀναπλεῖν διαφάνειαν. τὸ δὲ ξύλον ὃ καλοῦσι ξυλοβάλσαμον, δοκιμάζεται ὅτι τὸ πρόσφατον καὶ λεπτὸν καὶ φόν, καὶ πυ-

F ρὸν διδόντες, βραχὺ πρόσω ὀποβαλσάμου. ὅταν δὲ καρπὸν, (καὶ γὰρ τούτου ἡ χρῆσις αἰδοκία) ἐκλέγου τὸν ξανθὸν, πλήρη, μέγαν, βαρύν, δάκνοντα· τὸν γλοιὸν καὶ πυ-

G ρῶδη. μετρίως δὲ παπτόντα τὸ ὀποβαλσάμου. φέρεται δέ τι ἀπὸ τῆς Πέτρας, ᾧ δολίζουσι τὸν καρπὸν, σπέρμα τρικῷ ὅμοιον. ὅταν γεύσῃ σὺ δ' μεῖζόν τι εἶναι καὶ κενὸν καὶ ἀδύναμον, τι πρεῖζον τῇ γλώσσῃ. Δυνάμει δ' ἔχει ὁμοίας ἐνεργείας τῷ ὀπῷ, θερμαντικώτερος ὤν,

Pl. cutherasum

V. χίον

Non habetur in vet. exempl.

V. ἢ παροξίζων

Ald ἰμπλαδεῖ V ἐμπλάδει

Al. χεῖται καὶ τὰ χροὶ γαλ.

V. καὶ

V. τὸν ἀκήρατον

Locus nihil ad hunc conferendus. V. ἀλλ' ἔχει al. διέχει

In alt. veteri codice obſeruauit Goupylus hoc eſſe capitis alterius initium, cum eſſet inſertio τοῦ ξυλοβαλσάμου.

V. καὶ ὀδόντων. Ald. πραχὺ: poſt quam vocem aliquid deſiderari videtur. Vt enim in vetuſtiſſ. codicibus ita & in Ald. vacat hoc loco trium interuallorum ſpacium.

Al. τὸ χρόῳ Par. μεῖζόν τι

V. ἐμπίπτ

ἐμπίπτων τὰ ὑπόσκοπα τῶν ὀφθαλμῶν, καὶ τὰς τοῦ μήκους ψυχὰς ἰῶνται, τραχηλιάσματος μετὰ ῥοδίνης κηρωτῆς ἀγόμενον ἐπιτιθέμενος. Deest in Ald. & Priet. Vet. λιπαροῖ

μενα, καὶ διυτήρα, καὶ ἐμβρυα, καὶ ῥίγη συλλειωτὰς λύει. καθαίρει δὲ καὶ τὰ ῥυπαρὰ τῶν ἑλκῶν. ἔστι δὲ καὶ πτιλικὸς καὶ οὐρητικὸς πυρῆνος, δυσεντερίαν ἁρμόζων, καὶ τοῖς ἀκόντων πεπωκόσι μετὰ γάλακτος, καὶ θηριοδήκτοις μίγνυται δὲ καὶ ἀκόποις, καὶ μαλάγμασι καὶ ἀλοιφαῖς. καὶ καθόλου δραστικώτατον ἔχει τὴν δύναμιν ὁ ὀπὸς τοῦ βαλσάμου. Al. λυτικόν

λαχάνου δὲ καρπὸς, ὁ δὲ καρπὸς πυρῆνος ἁρμόζει πλευριτικοῖς, περιπνευμονικοῖς, βηχώδεσιν, ἰσχιαδικοῖς, ὀπισθοτονικοῖς, σκοτωματικοῖς, ὀρθοπνοϊκοῖς, τροφίμοις, δυσουρικοῖς, θηριοδήκτοις, καὶ εἰς τὰ γυναικεῖα δὲ τὰ ὑποθυμιάματα δίδοται, καὶ εἰς ἐγκαθίσματα ἀφεψήματος αἱμορροεῖ τὴν μήτραν, καὶ ὀπισθοτονικοῖς ὠφελεῖ. Τὸ δὲ ξύλον τὴν αὐτὴν ἔχει δύναμιν τῷ καρπῷ, ἧττον μέντοι. Συμπίνεται δὲ ἀφεψηθὲν ὕδατι καὶ πυρήνων, ἀπεψίαις, τρόφοις, θηριοδήκτοις, ἀπωμώσεσι, ὑπὲρ πᾶν ἄγει, καὶ πρὸς τὰ ἐν κεφαλῇ πταίσματα μετὰ ἴριδος ἁρμόζει ξηρᾶς· ἀπάγει δὲ καὶ λεπίδας. μίγνυται δὲ καὶ εἰς τὰ τῶν μύρων σύμματα. V. αἱμορροεῖ V. ἀποπτώμασι Par. μίγνυται

A Quæ pupillis tenebras offundunt exterget: atémque vuluę perfrictionibus medetur, cum cerato rosaceo appositus. Menses quoque, secundas & fœtus extrahit: rigores illitu soluit, sordidáque vlcera expurgat. Quin & potus concoctionem iuuat, vrinasque ciet: ægre spirantibus conuenit, necnon & iis qui aconitum hauserunt, si cum lacte exhibeatur, itémque à vipera demorsis. Miscetur & acopis, malagmatis & antidotis. Ac in vniuersum efficacissimá vim habet balsami liquor, proximam huic fructus, minimam verò lignum. Fructus potui datus conuenit pleuriticis, peripneumonicis, tussientibus, ischiadicis, comitialibus, vertiginosis, orthopnoicis, torminosis, difficulter meientibus, & à vipera venenatisque aliis animalibus demorsis. Porrò & ad muliebres suffitus accommodatur: itémque decoctus infessu vuluam aperit, humiditatémque exhaurit. Lignum easdem cum fructu vires habet, attamen minores: ex aqua decoctum & potum cruditatibus, torminibus, virulentorum morsibus, conuulsisque opitulatur. Vrinas quoque ciet, & capitis vulneribus cum iride sicca conuenit: squamas etiam ossium extrahit. Denique ad vnguentorum etiam spissamenta additur.

B C D

Περὶ Ἀσπαλάθου. Κεφ. ιθ'. — *De Aspalatho. Cap. XIX.*

Quidam ἐρείκης ex Plinio legendum suspicantur. Al. ἀκαίθης πολλὰς κεκτημένος. Vet. ἀκαίθης πολλὰς ἐκχεούσης. Vet. καρυωδέστ. Al. κεκαρφ & κεκαμμ. Actius, φλεγμονὰς

ΑΣΠΑΛΑΘΟΣ, οἱ δὲ ἐρυσίσκηπτρον, θάμνος ὄζοις ξυλώδης, ἀκάνθας πολλὰς κεκτημένος, ὑπερύθρῳ τῷ χρώματι· ἐν Κνίδῳ δὲ καὶ Συρίᾳ καὶ Ῥόδῳ χρῶνται οἱ μυρεψοὶ εἰς τὰ τῶν μύρων σύμματα. ἔστι δὲ καλὸς ὁ βαρὺς, καὶ μὴ ὁ ὑπερυθριῶν ὑπόξυθρος ἢ πορφυρίζων, πυκνὸς, διώδης, πικρίζων ἐν τῇ γεύσει. ἔστι δέ τι καὶ ἕτερον εἶδος αὐτῆς, λευκὸν, ξυλῶδες, ἄοσμον· ὃ δὴ καὶ χεῖρον καθέστηκε. Δύναμιν δὲ ἔχει θερμαντικὴν μετὰ στύψεως. ὅθεν πρός τε τὰς ἀφθὰς ἐφεψηθεὶς μεθ' οἴνου καὶ διαχλυζόμενος ἁρμόζει, καὶ πρὸς τὰ ὑπὸ αἰδοίοις καὶ νομὰς καὶ ἀκαθαρσίας ἐγχλυζόμενος, καὶ πρὸς τὰς ὀζαίνας, ἐμβρυά τε καταπασσόμενος ποσῷ πηλοῦ ἢ ἀφέψημα αὐτῆς κοιλίαν ἵστησι καὶ Inu. ὃ legitur ἃ V. καιρεπ.

E

A Spalathvs, alijs eryfisceptrum, frutex est lignosus, spinis crebris aculeatus. Nascitur in Istro, Nisyro, Syria & Rhodo: eóque vnguentarij ad spissanda vnguenta vtuntur. Probatur ponderosus, detracto cortice rubens aut in purpuram vergens, densus, odoratus, & gustu amarescens. Est & alterum genus, candidum, lignosum, inodorum, quod etiam deterius habetur. Vim calfactricem cum astrictione obtinet. Quo fit vt ad tetra oris vlcera in vino decoctus colluúsque conueniat, atque etiam ad genitalium nomas, immundámque illuuiem, necnon ad ozænas commodè infundatur. Pesso additus, fœtus detrahit. Eius verò decoctum aluum sistit. Quin

F G

& potu ſanguinis reiectionem cohibet, vrinæq; difficultatem ac inflationes diſcutit.

De Muſco. Cap. XX.

MVSCVS Græcis bryon, à nonnullis etiá ſplanchnon appellatur. In arboribus; cedro, populo alba aut quercu reperitur. Præſtat verò cedrinus: proximus huic populneus: quo in genere probatur qui odoratior eſt & candidus: nigricás autem deterior cenſetur. Muſcus aſtringendi vim habet in caliditate ac frigiditate medius, facitque decoctus inſeſſu ad vuluæ affectus. Miſcetur & vnguentis balaninis ac oleis ſeu illitibus, propter eam qua præditus eſt inſpiſſandi vim. Eſt & ad ſuffitum & acoporum medicamentorum præparationes vtile & accommodatum.

De Agallocho. Cap. XXI.

AGALLOCHVM lignum eſt, quod ex India & Arabia deportatur, Thyiæ ligno ſimile, punctis maculiſve diſtinctũ, odoratum, guſtu quodammodo aſtringens cum quadam amaritudine, cortice veſtitum cutis inſtar molli & aliquantulum verſicolore. Facit autem commanducatũ, itémque decocto collutum, ad commẽdandum oris halitũ: ac toti quoque corpori ſiccũ trituinque odoris gratia inſpergitur. Ad ſuffimẽta denique thuris inſtar adhibetur. Radix verò drachmæ vnius pondere pota, ſtomachi ſuperfluos humores, imbecillitatẽ ardorémque mitigat. Ijs quoque quos lateris & iecinoris dolor excruciat, ac dyſentericis aut torminoſis ex aqua bibita opitulatur.

De Naſcaphitho. Cap. XXII.

NASCAPHITHVM, alijs narcaphithũ, etiam ex India defertur. Eſt verò corticoſum, mori libro ſimile, quod iucundi odoris gratia ſuffitur. Factitijs ſuffimentis inſeritur: vuluam quoque aſtrictam ſuffitum iuuat.

De Cancamo. Cap. XXIII.

CANCAMVM eſt arboris Arabicæ lachryma, myrrham quadantenus referens, viroſi guſtus: qua quidem tanquam ſuffimento vtuntur. Ea quóque veſtes additis

A αἵματος ἀναγωγὸν πολύ, δυσουρίαν τε καὶ ἐμπνευματώσεις λύει.

Περὶ Βρύου. Κεφ. κ'.

BRYON, ὑπό τινων δὲ πλάτανον καλεῖται, διαιροῦμεν ὅτι δένδρων κεδρίνων, ἢ λευκάνων, ἢ δρυΐνων. Ἀφαφὲς δὲ τὸ κέδρινον· δεύτερον δὲ τὸ λεύκινον. ἔστι δὲ αὐτῶν τὸ εὐωδέστερον καὶ λευκότερον, καλόν, τὸ δὲ μελανίζον, χεῖρον. Δύναμιν δὲ ἔχει στυπτικὴν, μέσον. θερμοῦ δὲ ψυχροῦ, ποιοῦσι πρὸς τὰ ἕδρας μήτραν τε ἀφεψήματος εἰς ἐγκάθισμα. μίγνυται δὲ καὶ μύροις βαλανίνοις καὶ χρίσμασι πρὸς τὸ αὐτῷ στυπτικὸν, καὶ εἰς θυμιάματα δὲ καὶ ἀκόπτων σκωλασίδων ὄφελος ἔχει.

Par. hæc nũ habet.

V. ἀφεψήσαντα

V. addi τοῦ

Pal. ἀκοπίας

Περὶ Ἀγαλλόχου. Κεφ. κα'.

ΑΓΑΛΛΟΧΟΝ ξύλον ὄφι φερόμενον ἐκ τῆς Ἰνδίας, καὶ Ἀραβίας ἔοικος θυίνῳ ξύλῳ, ἐστιγμένοι, εὐώδες, παραφύρον τὴν χρόαν μετὰ ποσῆς πικρίας, φλοιὸν ἔχον δερματώδη, καὶ ὑποποίκιλον. πιὸν δὲ σχῆμα στρόμβου καὶ σχοινίζομενον καὶ ἀφέψημα πρὸς ὠδίνας στόματος. καὶ ἔμπασμα δὲ ὅλου τοῦ σώματος ἐστί. θυμιᾶται δὲ καὶ λιβανωτοῦ. ἡ δὲ ῥίζα αὐτοῦ < ὁλκὴ πυρμιδίου, στόμαχου σκληρὸν καὶ ἀποίαν καὶ καῦσωνα πρόσηνορός· τοῖς τε ἀλγοῦσι πλευρὴν καὶ ἧπαρ ἢ δυσεντερικοῖς ἢ προφορμίοις ἀρήγει πυρμιδίου μὲν ὕδατος.

Ita legunt Oxib Aldin. & alibi, Goupylus, Hermolaus & Marcell. at imperfecta adhuc sententia habet Dioscor.

V. ὄλον.

Pal. ἡ θυμιᾶται δὲ

Περὶ Νασκάφθου. Κεφ. κβ'.

NΑΣΚΑΦΘΟΝ, οἱ δὲ νάρκαφθον, καὶ πυστὸ ἐκ τῆς Ἰνδικῆς κομίζεται. ἔστι δὲ φλοιώδες, σκληροῦ λεπίσματι ἔοικος, θυμιώμενον ὡς τὸ θύον, καὶ μιγνύμενον τοῖς σκευαστοῖς θυμιάμασι, ὠφελοῦσι καὶ μήτραν ἐσχαρωμένην ὑποθυμιαθέν.

Ver. addit, ἡ προσομοίως ἀκαγ. Δ

V. σκευαστοῖς

Al. ὑποθυμιάσθεν

Περὶ Καγκάμου. Κεφ. κγ'.

KΑΓΚΑΜΟΝ δάκρυόν ἐστιν Ἀραβικῆς ξύλου σμύρνῃ προσεοικὸς, χρωμένοις ἐν τῇ χύσει, ὥσπερ οἷς θυμιάμασι χρῶνται. ὑποκαπνίζουσι δὲ καὶ ἱμάτια μετὰ

V. σκευαστοῖς

σμύρνης καὶ στύρακος. Δύναται δὲ ἰσχνό- A myrrha & ſtyrace ſuffumigantur. Porrò corpora obeſa emaciádi vim habere perhibetur, ſi ternûm obolorum pondere ex aqua aut aceto mulſo pluſculos dies ebibatur. Datur & lienoſis, comitialibus & ſuſpirioſis. Menſes ex aqua mulſa prolicit. Oculorum cicatrices confeſtim exterit, & eorundē hebetudinibus B medetur, vino dilutum. Quin & aduerſus gingiuas humore prægnantes & ad dētium dolores eſt ſi quid aliud efficax.

Περὶ Κύφεως. Κεφ. κδ'.

De Cyphi. Cap. XXIIII.

Multi mendi exarati codices hoc capite carent: aliqui verò ei margini adiectum habent.

Κύφι θυμιάματός ἐστι σύνθεσις θεοῖς χρεῖα καὶ ἱερεῦσιν Αἰγύπτου. χρῶνται δὲ αὐτῷ καταχόρως οἱ ἐν Αἰγύπτῳ ἱερεῖς. μίγνυται δὲ καὶ αὐτὸ ἀντίδοτοις, καὶ ἀθμαλιχοῖς δίδεται εἰς πόσιμα. σύνθεσιν δὲ αὐτοῦ ἐμφέρονται πλείονες, ἐν αἷς ἐστι καὶ αὕτη· κυπέρου ἡμίξεσι· ἀρκευθίδος ἀνδρᾶς ὅσ· σαφίδων λιπαρῶν ἐκ γεγυαλισμένων μνᾶς ις'· ῥητίνης ἀποκεκαθαρμένης μνᾶς ε· κάλαμου ἀρωματικοῦ, ἀσπάλαθου, ἰρεως, ἑκάστου μνᾶν δ. σμύρνης < ις'· οἴνου παλαιοῦ ξέστας θ'. μέλιτος μνᾶς β'. ἐκ γεγυαλισμένας τὴν σαφίδα κόψον καὶ λείωσον μετ' οἴνου καὶ σμύρνης, καὶ τὰ ἄλλα κόψας καὶ σήσας, μίξον τούτοις, ἅσοις τὴν συνεπιοῦσαν ἡμέραν α'. εἶτα ἑψήσας ὅσον μέλι ἄχρι καλλώδους συστάσεως, μίξον θυμιαλῶς τὴν ῥητίνην τετηκυῖαν· εἶτα τὰ λοιπὰ συνθυατείψας θυμιαλῶς ἀπόθου εἰς ἀγγεῖον ὀστράκινον.

Multa nomina exarati codices hoc capite carent: aliqui verò ei margini adiectum habent.

V. τερέβινθον

Cyphi ſuffimenti cōpoſitio eſt Dijs grata & accepta, qua Ægyptij ſacerdotes abundè vtuntur. C Sed miſcetur & antidotis, ac ſuſpirioſis datur in potu. Plures verò circunferuntur componendi rationes, quarum vna hæc eſt: Sumito cyperi dimidium ſextarium, craſſiorum iuniperi bacarum tantundem, vuarum paſſarum pinguium à vinaceis expurgatarum minas xij. reſinę repurgatę minas v. calami aromatici, aſpalathi & iunci odorati ſingulorū minam. myrrhæ drachmas xij. vini veteris ſextarios ix. mellis minas ij. Vuam paſſam exemptis nucleis tundito, & cum myrrha ac vino ſubigito: cætera verò tuſa & cribrata his admiſceto, ſinitóque humorem cōbibere diem vnum. Deinde cocto melle dum ſibi glutinis aſciſcat craſſitudinem, eliquatā retinam ei accuratè permiſceto, ac tum demum etiam reliqua diligēter ſimul contrita: tandem vaſe fictili recondito.

Περὶ Κρόκου. Κεφ. κέ.

De Croco. Cap. XXV.

In v. non legitur κρίνεσθαι, ſed deceptus habetur: χρίσασθαι δὲ ὁ σκυφ.

Al. ἐλαιηρᾶς.

Aut ἐλαίου μὴ τὸ παχυμερὲς τοῦ ἀκροτόνου λιχμάσθω. V. τοῦ χρῶτος V. carct Paris. ἁψάσθω

Addit Marcellus ἀσφαλῶς

Crocum in vſu medico præſtantiſſimum eſt Corycium, recens ac probè coloratū, paulum candidi gerens in capreolo, oblongum, ſuis partibus omnibus conſtās, minimè fragile aut pingue, plenū, cuius dilutum manus inficiat, nō carioſum aut humidū, odore illiciens ac leuiter acre. Nam quod tale non eſt, aut vetuſtum eſt, aut maceratum. Secundùm verò a Corycio locum G obtinet, quod è tractu Lyciæ contermino, itémque quod ex Olympo Lyciæ monte: mox quod ex Ægis Æoliæ defertur. Cyrenaicum verò & quod ex Centuripino Sici-

lix agro, viribus minùs pollét: quippe cum sint omnia olerũ instar satiua. Veruntamen propter succi copiam & coloris bonitatem, qui in Italia ligna thyina inficiunt, hoc postremo vtuntur: atque ideò etiam magno vẽditur: sed ad medicamẽta quod primo loco descriptum est vtilissimum existit. Adulteratur autem admixto crocomagmate tuso, aut sapæ sublitu, intrita, simul quò pondus adiiciatur argẽti spuma aut plumbagine. Sed maleficium indicat, tum quod occurrit puluerulentum, tum etiam defruti odor. Porrò vim habet crocus concoquendi, emolliendi, leuiter astringendi, & vrinas ciendi. Elegantem colorem præstat, crapulámque arcet ex passo bibitus: oculorũ fluxiones illitus ex lacte muliebri cohibet. Miscetur & vtiliter potionibus quę ad internos parantur affectus, itémque subditicijs nodulis & caraplasmatis vtero sedive adhibẽdis. Venerem quoq; stimulat, inflammationésque erysipelate comitatas inunctus demulcet: ac denique ad auriculares inflãmationes confert. Aiunt etiam exitiosum esse, si triũ drachmarũ pondere ex aqua bibatur. Quò verò faciliùs ad summum lævorem conteratur, apud solem in fictili calido exiccari, tumque celeriter idẽtidem versari oportet. Cæterùm & ipsius radix ex passo pota vrinas mouet.

Α λίαν, ἀσθενὴς καὶ δυνάμιν, λαχνώδης ὅπως πάντες. ὄζει μὲν τοι ὃ πολύχυλον καὶ βύσσῳ οἱ ἐν τῇ Ἰταλίᾳ τὴν θύαν βάπτοντες, τούτῳ χρῶνται. πολλοῦ δὲ πιπράσκεται διὰ τοῦτο. εἰς δὲ τὰ φάρμακα ὁ πεσσηγεγραμμένος ὅτι χρήσιμος. δόλοῦται δὲ μίξει κροκομάγματος

Β κεκομμένου, ἢ δι' ἐμπλάστρου ἐπαλφόμενος σεσηπτεμμένου, εἰς ὃ βαρυτάτην μίσυν, λιθαργύρου ἢ μολυβδαίνης. δηλοῖ δὲ τοῦτο τό, τε σίτιον ἔχον κενορτῶδες, καὶ τὴν τοῦ ὁσμὴν ἐμπλαστοῦδη τυγχάνον. Ἔχει δύναμιν πεπτικὴν, μαλακτικὴν, ἐπισφίγγουσαν, ῥυπτικὴν

C παρέχει βύσσου, καὶ ἀκρατάλης ὅτι μετὰ γλυκέος πινόμενος· ῥεῦμά τε ὀφθαλμῶν διαχεόμενος στέλλει σὺν γάλακτι γυναικείῳ. μίγνυται δὲ καὶ τοῖς φαρμάκοις τὰ εἰς πέσσεσθαι χρήσιμα, καὶ προσθέμασι καὶ καταπλάσμασι τοῖς πρὸς τὴν μήτραν καὶ δακτύλιον. παρί-

D στησι δὲ καὶ φαρμάκοις ἀφεδρίοις, ἔς τε ἐρυσιπελατώδεις φλεγμονὰς προσφορὰ καταχριόμενος, καὶ εἰς τὰ ὠτικὰς χρήσιμα βλέ. Φασὶ δὲ καὶ αἱρετικὴν αὐτὸν εἶ μὲν ὕδατος πινόμενον, πλῆθος < γ'. πρὸς δὲ τὸ βιλίαιζον αὐτὸν γίνεσθαι, δεῖ ἐν ἡλίῳ ψύχειν ἐν ὀστρακίνῃ θερμῇ. ἐν χάλκῃ δὲ δεῖ

E τρέφειν. καὶ ῥίζα δὲ αὐτοῦ πινομένη σὺν γλυκεῖ, οὖρα κινεῖ.

Vetus addit μελανίζον

V. codex ita legendum videtur: ἢ δι' ἐμπλάστρου ἐπαλφόμενος σεσηπτεμμένου, εἰς ὃ βαρυτάτην μίσυν, λιθαργύρου ἢ μολυβδαίνης. δηλοῖ δὲ τοῦτο τό, τε σίτιον ἔχον κενορτῶδες, καὶ τὴν τοῦ ὁσμὴν ἐμπλαστοῦδη τυγχάνον.

Hæc aliqui vinum ducunt non habẽte vsui ad capita dolẽtia.

Ald. ψύχει. Aut ἐν ὀστράκῳ quod Marcellus legisse videtur. ἐν ἡλίῳ ψύχειν ἐν ὀστρακίνῃ θερμῇ.

De Crocomagmate. Cap. XXVI.

Περὶ Κροκομάγματος. Κεφ. κϛ'.

CROCOMAGMA ex crocino fit vnguẽto, expressis aromatis & in pastillos digestis. Probatur quod odoratum est, modicè myrrheum, ponderosum, nigrum, ligni ramentorum expers: quódque sufficienter dilutum croci colorem reddat, lævue, subamarum, ac dentes linguámque vehemẽter & ad horas multas permanente colore inficiens. Tale verò est quod è Syria defertur. Vim habet ea detergendi quæ pupillis caliginem offundunt, vrinam ciendi, molliendi, concoquẽdi & excalfaciendi. Denique ad croci vires quadantenus accedit: quippe cuius etiam plurima parte sit particeps.

ΤΟ δὲ κροκόμαγμα γίνεται ἐκ τοῦ κροκίνου μύρου, τῶν ἀρωμάτων ἐκπιεσθέντων, καὶ διαπλασθέντων. ἔστι δὲ αὐτοῦ ὃ εὐώδες καλὸν, μίσυος καὶ τοῦ σμυρνοῦ, βαρὺ, μέλαν,

F ἄξυλον, ὃν τοῦ διεῦσαι ἱκανῶς κροκοῦδες τὴν χρόαν, λαῦρον, ὑποπίρρον, βάπτον ἱκανῶς τοὺς ὀδόντας καὶ τὴν γλῶτταν, ἐπιμένον τε συχνὰς ὥρας. ζιόβιον δ' ὅτι ὃ ἀπὸ Συρίας. Δύναμιν δ' ἔχει σμηκτικὴν τοῦ ὅτι σκεδαστικὸν τὰς κόρας, οὐρητικὸν, μαλακτικὸν, πεπτικὸν, θερμαντικόν. ἀναλογεῖ δὲ καὶ ποσότητι τῇ τοῦ

G κρόκου δυνάμει. πλεῖστον γὰρ τούτου μετέχει.

Ruellius malè legisse videtur συχνὰ ὥρα. Ista non habentur in Paris. quæ tamen agnoscũt Serapio, Hermolaus & Ruellius.

BIBLIOTECA ROMA

Περὶ Ἑλενίου. Κεφ. κζ.

ΕΛΕΝΙΟΝ φύλλα ἔχει φλόμῳ ὁμοιοτέρα στενοφύλλῳ παρεμπλήσια, τραχύτερα δὲ καὶ ὀλιγομήκεα. λόγον δ' οὐκ ἀνίησιν· ἐν ὄρεσι τόποις. ῥίζαν· ἰσοπύρρον, βώδη, μεγάλην, ὑποφαιμον, ἀφ' ἧς φύλλα τοῖς φύτοις, καθάπερ ὀλίγα πρίνων ἢ ἄρκων, λοπαὶ παρεφυάδες λαμβάνονται. γίνεται δὲ ἐν ὀρεινοῖς καὶ συσκίοις καὶ ἐνύδροις τόποις. ὀρύττεται δὲ ἡ ῥίζα θέρους, καὶ τεμαχισθεῖσα ξηραίνεται. πίνεται δὲ ὁ ἀφέψημα αὐτῆς πυρέσσουσι καὶ ἔμπυα· αὐτὴ δὲ ἡ ῥίζα λαμβανομένη ἐν ὀξυλεκίθῳ μετὰ μέλιτος, ἁρμόζει βηξὶν, ὀρθοπνοίαις, ῥήγμασι, σπάσμασι, ἐμπυήμασι, τοῖς ἐκ πλευρίτιδος, ῥήγμασι, καθόλου θερμασίαις· ὑπάρχουσα. τὰ δὲ φύλλα αὐτῆς ὅταν πλατέα ᾖ, ἀφεψηθέντα μετ' οἴνου ἰσχιαδικοῖς ὠφέλιμος. ἔστι δὲ καὶ δύσμαχος ἁλισυχνίσασα ἐν γλυκεῖ· ξηραίνεται δὲ αὐτὴ ἐπ' ὀλίγον ἀλμυτή, εἶτα ἀφεψίζεται, ἀποβρέχεται ὕδατι ψυχρῷ· εἶτα βάλλονται εἰς ἔψημα, ἀπολύονται εἰς χρῆσιν. πίνεται δὲ λεῖα πινομένη, αἱμοπτοϊκοῖς.

Περὶ Ἑλενίου Αἰγυπτίου. Κεφ. κη.

Ἑλένιον ἄλλο ἱστορεῖ Κρατεύας γίνεσθαι ἐν Αἰγύπτῳ· πόα δέ ἐστι κλῶνας ἔχουσα πηχυαίους, ὅτι μάλιστα ἐρριμμένους ὥσπερ ὁ ἵρπυλλος. φύλλα δὲ τοῖς τοῦ φακοῦ ὅμοια, μακρότερα δὲ καὶ πολλὰ περὶ τοὺς κλῶνας, ῥίζαν ὠχρὰν, πάχος δακτύλου μικροῦ, κάτωθεν λεπτὴν, αὔωθεν δὲ παχυτέραν, φλοιὸν ἔχουσαν μέλαινα. φύεται δὲ ἐν παραθαλασσίοις τόποις καὶ γηλόφοις. δύναμιν δὲ ἔχει μεῖον οἴνου πινομένη· μία ῥίζα, ἡμιοδέκτοις βοηθεῖ.

Περὶ Ἐλαίου ὠμοῤῥιζοῦς. Κεφ. κθ.

ΕΛΑΙΟΝ πρὸς τὰ ἐν ὑγιείᾳ χρῆσιν ἄριστον ὂ ὠμοῤῥιζές· ὃ καὶ ὀμφάκινον καλεῖται· τοῦτου διαφέρει τὸ νέον, ἀδηλίῳ, βδώδες. χρήσιμον δὲ τὸ τοιοῦτον καὶ εἰς τὰ τοῦ στόματος ἕλκη. ἔστι δὲ καὶ δύσμαχον ἁλισυχνίσαν· ἐν δὲ τῷ ψυχρῷ, καὶ οὔλοις σταλτικόν, καὶ ὀδόντων πρὸς τὰ τρυγμοὺς, χρατύνει δὲ τὰ τοῦ στόματος καὶ ἱδρῶτας ἐφέλκεται.

De Helenio. Cap. XXVII.

HELENIVM folia habet verbasco angustioribus foliis prædito simulia, sed asperiora & oblonga: caulē verò quibusdā in locis non emittit. Radice est subruffa, odorata, grandi, subamara: ex qua ad confectionem, velut in serendis cinaris, opimi & insignes oculi decerpuntur. Prouenit in montibus, locis vmbrosis & humidis. Æstate radix eruitur, & concisa siccatur. Huius decoctū potum vrinas mensésque ciet. Ipsa verò radix in eclegmate sumpta cū melle prodest tussi, orthopnœę, ruptis, conuulsis, inflationibus & venenatorum morsibus: quippe quæ in vniuersum excalfaciendi vi polleat. Folia ex vino decocta vtiliter Ischiadicis illinuntur. Est & radix stomacho vtilis, dulci misto condita. Siquidem salgamarij paululum exiccatam eam, mox decoctam, aqua frigida demergunt: postea in defrutum conijciūt & ad vsum reponunt. Trita potáque ad sanguinis reiectiones est efficax.

De Helenio AEgyptio. Cap. XXVIII.

Helenij genus alterum in Ægypto gigni Crateuas memorat. Herba vero est ramis cubitalibus, serpylli modo humi sese spargentibus: foliis lenticulæ proximis, sed longioribus numerosisque circa ramulos: radice pallida, digiti minimi crassitudine, acper una quidem tenui, supernè verò crassiore, nigro vestita cortice. Nascitur locis maritimis & tumulosis. Radix vnica ex vino bibita contra serpētium ictus auxiliandi vim habet.

De oleo omphacino. Cap. XXIX.

OLEVM ad vsum per sanitatem optimum: quod, quia ex crudis & acerbis seu imaturis oliuis exprimitur, crudum nec non etiam omphacinum appellatur. Excellit in hoc genere recēs, minimè mordens, atque odoratū. Est & tale ad vnguentorum compositionem vtile: quinetiam propter astringendi vim stomacho accommodatum. Ore si contineatur, gingiuas contrahit, dentésque firmat: sudores denique cohibet.

De oleo communi. Cap. XXX.

Quod vetuſtius ac pinguius eſt, ad medicamentorum vſum eſt accommodatum. In vniuerſum autem oleum omne calfaciendi vim habet, carnem emollit, corpus contra algores munit, ipſúmque ad actiones obeundas expeditius reddit. Bonam etiam aluum facit, éſtq; molliendi vi præditum. Exulcerantium medicamentorum vires permiſtũ hebetat. Exhibetur quoque contra venena, ſic vt ſubinde bibatur ac reuomatur. Purgat heminæ menſura cũ pari ptiſſanæ ſucco aut aqua epotum. Torminoſis vtiliter datur in potu cum ruta decoctum ſex cyathorum menſura, lumbricóſq; pellit. Infunditur & idipſum ad ileoſos maximè affectus. At vetus tum magis excalfacit, tum etiá vehementiùs diſcutit, & ad exacuendam oculorum aciem ſublinitur. Sin deſit vetus, hac præparatione opus eſt. De eo cuius eſt copia quod præſtantius erit in vas defundito, & ad mellis craſſitudinem decoquito, atque ita vtitor. Eandem enim cum prædicto vim aſciſcit.

Περὶ ἐλαίου κοινοῦ. Κεφ. λ.

Τὸ δὲ καὶ παλαιότερον καὶ λιπαρώτερον, εἰς πολὺ τῶν φαρμάκων χρῆσιν βέλτιον. κοινῶς δὲ πᾶν ἔλαιον, θερμαντικόν ἐστι καὶ μαλακτικὸν τῆς σαρκός, δυσπερίψυκτον φυλάσσει τὸ σῶμα, ἑτοιμότερον πρὸς τὰς ἐνεργείας ποιοῦν. ἔστι δὲ καὶ βηχικόν καὶ μαλακτικόν, ἀμβλύνον τι τῶν πολὺ ἐλκόντων φαρμάκων δυνάμεις· ὁ τῇ μίξει. δίδοται δὲ καὶ πρὸς τὰ θανάσιμα συνεχῶς πινόμενον καὶ ἐξεμούμενον. καθαίρει δὲ ὅσον κοτύλη σὺν πλείονι ἴσῳ χυλῷ πολίου ἢ ὕδατι. προφυλάσσει τε ὁ ποταθὲν ὠφελίμως δίδοται μετὰ πηγανίου ἑψηθὲν· κυάθων ἓξ πλῆθος, ἕλμινθάς τε ἐκβάλλει. καὶ ἐνίστε δὲ τὸ αὐτό, μάλιστα πρὸς τὰς εἰλεώδεις. Τὸ δὲ παλαιὸν θερμαντικώτερον καὶ διαφορητικώτερον· πρὸς ὀξυδρκίας τε ὑπάλειμμα. μικτέον δ' εἰ μὴ παρείη τὸ παλαιὸν ἔλαιον ὅτῳ, καὶ χειράσας εἰς ἀλίβον τὸ πρόσφατον τὸ χρῆσον, ἕως ἂν ἡ μέλιτος πάχος, ἑψῶ· πολὺ γὰρ αὐτὴν ὡς προφρωδῶ εἰσφέρει δύναμιν.

De oleo ſylueſtris oliuæ. Cap. XXXI.

Quod è ſylueſtri oliua exprimitur oleum vehementiùs aſtringit, & ad vſum ſanorum ſecundum ſibi locum vendicat. Caput dolentibus roſacei vice cõuenit. Sudores ſiſtit, & defluos capillos inhibet. Quinetiam furfures & vlcera capitis manantia, ſcabiem ac lepras extergit: moratúrque canos, ſi quotidie illinatur.

Περὶ Ἐλαίου ἐκ τῆς ἀγρίας ἐλαίας. Κεφ. λά.

Τὸ δὲ ἐκ τῆς ἀγρίας ἐλαίας ἔλαιον, στυπτικώτερον, πρὸς μὲν πολὺ ἐν ὑγιείᾳ χρῆσιν, δεύτερον. κεφαλαγροῦσι δ' αὐτὸ ῥοδίνῳ ἀρμόζει, ἐπέχον τε ἱδρῶτας καὶ ῥίχας ῥεούσας. ἀποσμήχει δὲ καὶ πίτυρα, καὶ ἀχῶρας, καὶ ψώρας, καὶ λέπρας· βραδύνει τε πολιοῖ καθ' ἑκάστην ἡμέραν ἐπαλειφόμενον.

Oleum candidum. Cap. XXXII.

Candidatur oleum hunc in modum: ſumito album colore, nec anniculo vetuſtius, & in fictile nouum lati oris infundito centum heminarum menſura. Mox in ſole expoſitum quotidie circa meridiem concha refundito, ex alto deturbãs, vt frequenti volutatione ac verberatu agitatum alteretur & ſpumeſcat. Octaua deinde die fœnũgræcum purgatum drachmarum ſo põdere, aquáque calida maceratũ, atque adeo remollitũ, aqua interim neutiquã expreſſa, in ſupradictum

Ἐλαίου λευκοῦ. Κεφ. λβ'.

Λευκαίνεται δὲ ἔλαιον οὕτω· λαβὼν τὸ τῇ χρόᾳ μὲν λευκὸν, πολὺ δὲ λιπαίνει δὲ μὴ πλέον ὀκταετοῦς, ἔγχει εἰς κεραμεοῦν ἀγγεῖον πλατύστομον, καινόν· ἑκατὸν δὲ μέτρῳ κοτύλαι ρ'. εἶτα θεὶς ὑφ' ἥλιον, ἀναχύ κάζων καθ' ἑκάστην ἡμέραν τὸ μέσον, ὑφλὸν τῇ κεφαλῇ φορᾷ χρώμενος, ἵνα τῇ συνεχεῖ κυλίσει καὶ πληγῇ μεταβάλῃ καὶ ἀφρίσῃ. τῇ δὲ ὀγδόῃ ἡμέρᾳ ῥίξας τέλεως καθαρᾶς ⊀ ι' εἰς ὕδατι θερμῷ, ἐμβαλὲ μαλακὴν ἠμομένην εἰς δ' τετριμμένον ἔλαιον χωρὶς τῶ

V. addit μεταβλητὸν τῆς σαρκὸς τὸ παλαιὸν εἰς τὸ πολὺ &c.

Vulg. χειρας

V. δυσπερίψυκτον φυλ. τὸ σῶμα τε καὶ ἑτοιμότερον

Pal. carca.

V. addit Bonacol Ald. in noth. θερμὸ κοτύλας ς'. Pal. θερμοῦ

V. θερμαντικὸν

Comm. περιττὸν

Comarius legit καὶ τριάσας & reliqua.

Veteres his carent.

Add. Ald. cod. in noth. καμζίμυρσον.

Pat. ἰδρῶτας

V. τὸν χρόα

V. καινὸν al. κενὸν

Pat. ἐψῶν

V. μεταβάλλοντα καὶ

γραγγίσαι. ὕδωρ· προσαπόδος δὲ καὶ ἁλὸς πιτυΐνης ὡς ὄπι λιπαρώτατον καὶ εἰς λεπτὰ κατεγμένου ταῖς ἴσαις ὁλκαῖς, καὶ οὕτως ἐᾶσον ἡμέρας ὀκτὼ ἡμέρας διελθεῖν μεθ' ἃς ταύτας ἀναχύσαι τὸν κύαθον ὃ ἔλαιον. τὸ, τι λοιπὸν εἰ μὴ εἴη τοῦ πίνους πεπυχὸς, εἰς χύτραν ἀλείσιον προσκαλυσάμενον αὖθις παλαιᾷ καὶ ζεούσῃ, ἐπιπάσσειν προσυπεσραμμένον μιλτώδους σφυρίσκου ἀλίσκου ὀλκῆς ιά. καὶ ἕρπεως τῆς ἴσης· εἰ δὲ μή, πάλιν ἐν ἁλὶ θετέον αὐτό. καὶ ἐργασίαν ἄγειν οὗ λιπαρὸν ᾖ.

Con. ἐπιπάσσειν
Par. ἕρπεως

A oleum conijcito: tædam quoquè pineam præpinguem & in tenues assulas cõcisam pari pondere insuper addito: atque ita dies octo alios elabi sinito. His transactis concha oleum denuo cõfundito. Postremò, si finẽ assecutũ fuerit, in vas nouum prius vetere vino elutum, subtritis anteà sertulæ Campanæ corollis B drachmas vndecim pendentibus cum iridis pari pondere, decapulato atque recondito. Sin autem candorem nondum cõtraxerit, oleum rursus insolandũ, & opus ipsum repetendum, dum candidum illud euaserit.

Περὶ Σικυωνίου ἐλαίου. Κεφ. λγ'.

De Sicyonio oleo. Cap. XXXIII.

Ἔνεστι δὲ καὶ Σικυώνιον τὸ προειρημένον οὕτω σκευάζειν· εἰς λέβητα χαλκοῦν πλατύσωμον, ἐγχέας νέου ἐλαίου ὠμοτριβοῦς καὶ λιπαροῦ χοᾶν ā. ἐπ' ὕδατος ἡμίχουν, ἕψε χύφῳ πυρὶ μετρίου· ὅταν δὲ ζέσῃ δίς, ὑπόσπασον τὸ πῦρ, καὶ ψύξας ἀποκάθαιρε τὸ ἔλαιον. εἶτα ἄλλο ἐπίδοσιν ὕδωρ, συνεφύλισον αὐτῷ, καὶ τὰ λοιπὰ ποιήσας καθὼς σοὶ ὑποδέδεικται, ἀπόθου. σκευάζεται δὲ μάλιστα ἐν Σικυῶνι, Σικυώνιον καλούμενον. Δύναμιν δὲ ἔχει ποσῶς θερμαντικὴν, ἀρμόζον δὲ πυρετοῖς καὶ τοῖς περὶ νεῦρα πάθεσι. χρῶνται δὲ αὐτῷ καὶ αἱ γυναῖκες ὅτι τοῦ C γιλβώτερον.

Sed & ex prædicto Sicyonũ hoc modo parare licet. In lebetem æris ampli stanno inductum recentis olei omphacini candidiq; congiũ vnum, aquæ verò dimidium infundito: tùm igne leui coquito leniter agitando. At cumprimũ bis effebuerit, ignem subtrahito, & vbi refrixerit, oleum decapulato. Tandẽ alia adiecta aqua simul iterum feruefacito: ac reliquis, veluti prædemonstratum est, peractis reponito. Maximè verò cõficitur oleum huiusmodi in Sicyonia: atque inde Sicyonij nomen accepit. Vim habet leuiter calfactoriam, in febribus ac neruorum affectibus accommodatum. Vtuntur & eo mulieres ad in- D ducendum cuti nitorem.

Ῥύπος βαλανείων. Κεφ. λδ'.

Strigmenta à balneis. Cap. XXXIIII.

Ὁ δὲ ὅτι τοῖς βαλανείοις συναγερόμενος, διὰ τὴν θερμότητα, μαλάττειν, διαφορῆσαι, ῥαγάσι τε καὶ κονδυλώμασιν ὠφελεῖσθαι.

STRIGMENTA quæ in balneis destringuntur, calfaciendi, molliendi, discutiendique vim habent: ad rimas sedis & condylomata pernunctione prosunt.

Ῥύπος ἐκ τῆς παλαίστρας. Κεφ. λε'.

Strigmenta palæstrica. Cap. XXXV.

Ὁ δὲ ὅτι τῆς παλαίστρας προσκλυφὼς τὸν κόνιν, ἐοικὼς δὲ ῥύπῳ, ταῖς περὶ τοὺς κονδύλους συγροφαῖς ὑπειλημμένος ὠφελεῖ· ὠφελεῖ δὲ ἰσχιαδικοὺς θερμὸς αἰτὶ μαλάγματος ἢ πυέλου ὑπειλημμένος.

Quæ verò in palæstra puluerem sibi asciuere, similia sordibus, articulorum collectiones ac nodos imposita iuuant. Quin & calentia ischiadicis fotus aut malagmatis instar vtiliter admouentur.

Ῥύπος γυμνασίων. Κεφ. λς'.

Strigmenta gymnasiorum. Cap. XXXVI.

Καὶ ὁ ἐν τοῖς τῶν γυμνασίων πίναξι ῥύπος, καὶ ὁ ἀπὸ τῶν ἀνδριάντων, θερ- G Sordes è gymnasiorum parietibus, simulacrisque derasæ, excalfactoriam

factoriam vim habent, discutiúntq; tubercula quæ ægrè ad coctionem maturitatémve perducuntur: abrasis seu desquamatis & senum vlceribus aptè conueniunt.

A μείγνη τι καὶ ὀξυχεῖ πὸ δύναπλα φύματα, καὶ πρὸς ἀποσύρματα καὶ φαγέδαινα τριοδύλικὰ ἁρμόζει.

De Elæomelite. Cap. XXXVII.

Περὶ Ελαιομέλιτος. Κεφ. λζ.

In Palmyreno Syriæ tractu quod Elæomeli vocãt ex quodam caudice manat, oleum crassius melle, sapore dulci. Id cyathis duobus bibitum cum vna aquæ hemina, crudũ bilioſúmque humorem aluo detrahit. Sed qui assumpsere torpescunt, viribúsque deficiuntur: attamen eo minimè terreri oportet. Quin excitandi sunt, neque permittẽdum vt somno grauiore consopiantur.

Ελαιόμελι καλεῖ Παλμυρεῖ τῆς Συρίας ἔκ τινος ξυλίχνης ἔλαιον μέλιτος παχύτερον ῥᾷ, γλυκὺ τῇ γεύσει· ὅσον πυάθοιν πλῆθος κυάθων β' μετὰ κοτύλης μιᾶς ὕδατος, ἀγλὺ καὶ παχὺ καὶ λίαν ὠμὸν καὶ χολώδες· ἔνιοι δὲ καὶ γίνονται καὶ ἐκλύουσι λαμβάνοντες, ὅθεν οὐ δεῖ βλάβεσθαι· διεγείρει δὲ αὐτοὺς μὴ ἐῶντας καταφέρεσθαι. σκυβάλῳ δὲ καὶ αὐτὸ λίπους τῶν ἄλλων ἔλαιον· ἔστι δὲ αὐτοῦ κάλλιστον καὶ παλαιόν, καὶ παχὺ καὶ λεπαρόν, οὐ τελολωμένον· θερμαίνει δὲ ἰδίως πιοιῶν ἐπὶ τὰ ὑποκείμενα τοῖς χόραις ὑπιχειόμενον καὶ λίπωσις ἐξ ὀμφάκων ἐπὶ τοὺς τραχήλους ἐγχειόμενον ὠφελεῖ.

Cornarius legẽdum putat ἐξ δ' ἀμφοῖν, & sic legisse videtur Plinius lib 15. cap 7. cum ait in maritimis nasci.

V. addit χρώμ.

Marc. legit νίπους

V. inungitur

De Cicino oleo. Cap. XXXVIII.

Περὶ Κικίνου ἐλαίου. Κεφ. λη.

Cicinum oleũ fit hoc modo: Sumito maturorum ricinorum quantum videbitur, & instratos vuarũ in morem, quæ super cratibus disposita insolantur, ad solem exiccato, dũ ambiens cortex disruptus excidat: túmque collectam eorum carnem in pilam conijcito, ac diligenter tusam in lebetem stanno inductũ qui aquam habeat transferto, succensóque igni feruefacito. Cùm verò insitum humorẽ prorsus deposuerint, sublato ab igni lebete innatãs oleum conchula tollito atque reponito. At Ægyptij quoniam copiosum ipsum expetunt, aliter conficiũt. Nam repurgatos ricinos molæ mandãt accuratéq; molunt: deinde quod molitũ est in sportulas coniectum torculo exprimẽt. Tùm porrò tẽpestiui sunt ricini, cùm vestientibus folliculis exuuntur. Facit verò Cicinum oleum ad vlcera capitis manantia, psoras & sedis inflammationes, nec non ad vteri obstructiones atque euersiones: itémque ad cicatrices fœdas, auriúmque dolores. Quin & emplastris admistum ea reddit efficaciora.

D

Κίκινον ἔλαιον σκυβάλῳ τούτῳ τῷ τρόπῳ· λαβὼν ὠμῶν κροτώνων ὅσον αὐ δοκῇ, καὶ ψύξας εἰς ἥλιον, καθεψήσας θλεπίδου τρόπον, ἕως αὐ ὁ περιεστὼς φλοιὸς ἀπορραγεὶς ἐκπέσοι, συναγαγὼν τὴν σάρκα, ἐμβαλὲ εἰς ὅλμον, καὶ κόψας ὑπιμελῶς εἰς λέβητα κεκασσιτερωμένον βάλε, ὕδωρ ἔχοντα, ἐξ ἀνάβρασον ὑπὸ καιόν. ὅταν δὲ ἀνῶσι τὴν ὑπὸ αὐτῶν ὑγρότητα πᾶσαν, ἆρας τὸν λέβητα ἀπὸ τοῦ πυρός, ἀπόψα μύαξι τὸ ἐπιπλέον ἔλαιον καὶ ἀπόθου. ἡ δὲ Αἰγύπτιοι διὰ τὸ δαψιλοῦς χρῆσθαι, ἐπείρως αὐτὸ σκευάζουσι. μετὰ γὰρ τὸ καθᾶραι εἰς μύλωνα ἀποδιδόασι τοὺς κρότωνας, ἀληθοῦσιν ὑπιμελῶς· εἶτα εἰς σπυρίδας ἐμβαλόντες δ' ἀληθεσμένον, δ' ὀργάνου ἐκθλίβουσιν. ὠμοὶ δέ εἰσιν οἱ κρότωνες, ὅταν ὑπὸ τῶν ἐπεχόντων αὐτοὺς σφαιρίων ἀπολύωνται. πυῤῥᾷ δὲ τὸ κίκινον πρὸς ἀχῶρας καὶ ψώρας καὶ τὰς ἐν ἕδρᾳ φλεγμονάς, πρός τε ὑσέρας μίσεις καὶ διαστροφὰς ἔτι δὲ ὕλκεις ἀνεπτοὺς καὶ ὠτηγίας· ἐμπλάστροις τε μιχθὲν, ἐμποικιλωτέρας αὐτὰς ἐργάζεται.

V. addit ἡμιῶν

Pat. δαψιλοῦς

Pal. ἀποδίδοται

Ald. ἐπιπλέον & sic Pal.

ἄγχῃ δὲ καὶ ἐξ ὑδατώδεις πυήν, ἐκκρίνῃ δὲ καὶ ἕλμινθας.

Περὶ Ἀμυγδαλίνου ἐλαίου.

Κεφ. λθ.

Ἀμυγδάλινον ἔλαιον, ὃ ἔνιοι μετώπιον καλοῦσι, σκυλάζειν οὕτως· ἀμυγδάλων πικρῶν ἓξ. δ. κεφάλας καὶ ξηράνας, κόψον ξυλίνῳ ἐν ὄλμῳ κυφὸς μέχρις μαίζα γένηται, ὕπεχέας τι ζεστοῦ ὕδατος· κοτύλας β'. ἵνα συμπίῃ ἡμίωρον, ἀφ' ἧς πάλιν διαιρέτερον πεῖσε, εἶτα ἀποθλίβων πρὸς πλάκα ἔξέπου, καὶ ὃ ἀπὸ τῶν δακτύλων εἰς μύακα αἰαλάμβανε· εἶτα πάλιν εἰς ὃ ἀποτεθλιμμένον κοτύλιον ὕδατος μίαν ὑπεχέας, καὶ συμπίῃ ἐάσας, τὸ αὐτὸ ποίει. ἀποδίδωσι δὲ κοτύλιον ἃ ὃ πιπεραχίνιον. ποιεῖ δὲ πρὸς ταῖς ἐν μήτρᾳ ἀλγηδόνας καὶ πήγας ὑστερικὰς, ἀλφοφάς τε καὶ φλεγμονὰς τῶν αἰτῶν πίνων· ἐπὶ δὲ κεφαλαλγίας καὶ ὤτων πόνους, καὶ ἤχους ἃ συελμοὺς ὠφελεῖ ἃ ἐκ νεφριτικοὺς. ἃ δυσουριῶντας, καὶ λιθιῶντας, καὶ ἀθμαπτικοὺς, καὶ σπληνικούς· αἴρει δὲ ἃ σπίλους ἐκ προσώπου, καὶ ἐφήλεις καὶ ῥυσίδας, μέλιτι μιγνύμενον ἃ χρίον ῥίζῃ καὶ κυπρίνῃ ἢ ῥοδίνῃ κηρωτῇ· καὶ ἀμβλυωπίας δὲ ὄντι ἀσκευαστικόν· σὺν οἴνῳ δὲ ἀχῶρας καὶ πίτυρα σμήχει.

Περὶ Βαλανίνου ἐλαίου. Κεφ. μ'.

Ὁμοίως δὲ καὶ τὸ βαλάνινον σκευάζειν· δύναμιν ἔχει καθαρτικὴν σπίλων, φακῶν, ἰούλων, οὐλῶν μελανίας, καὶ λίας καθαρικόν· ἔστι δὲ κακοστόμαχον· ἁρμόζει δὲ καὶ ὠτολογίας, ἤχοις, καὶ συελμοῖς, μετὰ χλιαροῦ χήνειος ἐγχεόμενον.

Ἔλαιον σησάμινον καὶ καρύινον.

Κεφ. μά.

Ὁμοίως δὲ σκευάζειν τοῖς προγεγραμμένοις, τό, τε σησάμινον ἐκ τοῦ σησάμου, καὶ τὸ καρύινον, ἐκ τῶν βασιλικῶν καρύων συνπιθέμενον. δύναμιν ἔχουσι τὴν αὐτὴν τῷ βαλανίνῳ.

A Porum denique aquas per aluum ducit, lumbricósque pellit.

De Amygdalino oleo. Cap. XXXIX.

Amygdalinum oleum, quod aliqui Metopium vocant, hoc modo paratur: Amygdalarum amararum repurgatarum & arefactarum chœnices quatuor in pila ligneo pistillo leuiter in offam contundito, affusisque aquæ feruentis heminæ duabus finito semihoræ spatio humorem imbibere, túmque postea maiore vi terito, ac deinde tabellis comprimens exprimito, quódque digitis hæserit concha excipito. Tandem magmati iterum aspersa aquæ hemina quam combibere fueris, idem facito. Singulas porrò heminas reddunt quaterni chœnices. Est autē efficax contra vulnerum dolores & strangulatus, ac eorundem locorum tum conuersiones tum etiam inflammationes: itémq; ad capitis dolores, auriúmque ægritudines, sonos incertos atque tinnitus. Iuuat & vitijs renum laborantes, ægrè meientes atque calculosos. Suspiriósis itidem lienosísque prodest. Quin & maculas tollit è facie, à sole vstis medetur, & cutem erugat, admixtū melli, lilij radici, ac cyprino rosaceóve cerato. Hebétem etiam oculorum aciem emendat: denique vlcera quoque manantia & furfures cum vino expurgat.

De Balanino oleo. Cap. XL.

Simili modo fit & oleum balaninum. Vim autē habet repurgandi maculas, lentigines, varos & cicatricum nigritias. Purgat idem aluum, sed stomacho aduersatur. Cōtra dolores aurium, sonos atque tinnitus auxilio est, cum anserino adipe infusum.

Olea Sesaminum & Caryinum. Cap. XLI.

Eodem quoque quo antedicta modo sesaminum oleum ex sesama præparatur: itémque caryinū, quod è iuglandibus nucibus conficitur. Easdem verò cum balanino vires obtinent.

De Hyoſcyamino oleo. Cap. XLII.

Hyoſcyaminum autem ſic præparatur: ſemen ipſum album, ſiccum, recens accipito, & contuſum aqua calida ſubigito, veluti in amygdalino dictum eſt. Dum verò inſolabis, areſcétes eius quæ ſub manu ſunt [hoc eſt, ſuperiores] partes toti maſſæ permiſceto. Idipſum tádiu facito, dum nigreſcat graueolénſque reddatur: mox per linteolũ percolatũ & expreſſum reponito.

Ad aurium dolores eſt efficax, peſſiſq; ammiſcetur: emolliendo vtile.

De Gnidico oleo. Cap. XLIII.

Similiter etiam paratur quod ex Gnidio grano fit oleum, decorticato ſemine atque contuſo. Potum id aluum ſoluendi vim habet.

De Cnicino oleo. Cap. XLIIII.

Eodem quoque modo Cnicinũ oleum cõficitur. Vis autem eadem quæ Gnidico, ſed remiſſior.

De Raphanino oleo. Cap. XLV.

Raphaninum ex ipſo fit raphani ſemine, quemadmodũ & reliqua. Iis qui ex mala valetudine phthiriaſes contraxere conuenit, ſcabritiáſque cutis in facie emendat. Eo vtuntur Ægyptij, vna cum obſonijs ipſum coquentes.

De Melanthino oleo. Cap. XLVI.

Melanthinum eaſdem cum raphanino vires, conſimilémque præparationem ſortitur.

De Sinapino oleo. Cap. XLVII.

Sinapinum fit ad læuorem trito Sinapis ſemine & aqua calida macerato, adiecto poſtea oleo ac ſimul expreſſo. Facit ad dolores diuturnos, dum ipſa vitia ex alto extrahit.

De Myrtino oleo. Cap. XLVIII.

Myrtei olei præparandi ratio hæc eſt: Myrti nigræ ſeu ſylueſtris ſeu ſatiuæ tenerrima quæque folia tundito atque exprimito, ſucco deinde omphacini olei parem menſuram admiſceto, & ad prunas calfacito, donec ſimul cocta fuerint, tollens id quod ſupernatat. Fuerit verò minùs operoſa confectio, ſi foliorum molliſſima contuſa in aqua & oleo decoquas, & quod innatat deradas: peculiari quoque modo, ſi

A Περὶ Ὑοσκυαμίνου ἐλαίου. Κεφ. μϛ'.

Καὶ ὁ ὑοσκύαμινος δὲ σπυρίζεται ὕδατι λαβὼν τὸ λευκὸν καρπὸν, ξηρὸν, τρόφανον, καὶ κόψας, ὕδατι θερμῷ φύρε, ὡς τερετίσπτας ἐπὶ τῆς ἀμυγδαλίνου. ἡλιάζων δὲ τὰ ὑπὸ χεῖρα ξηραινόμενα αὐτοῦ μέρη, τῷ ὅλῳ ἀναμίσγε· καὶ τὸ αὐτὸ

B ποίει ἄχρις ἂν μελανθῇ καὶ δυσώδες ᾖ γένηται· εἶτα διὰ ὀθονίου διηθήσας καὶ ἐκθλίψας ἀποτίθεσο. ποιεῖ δὲ καὶ πρὸς ὠτολογίας, καὶ πυοῖς μίγνυται, μαλακτικὸν ὄν. Al. δι' ὑμοῦ. Par. caret.

Περὶ Κνιδελαίου. Κεφ. μγ'.

Ὁμοίως δὲ καὶ ὁ ἀπὸ τοῦ Κνιδείου σπυρίζεται κόκκου λεπιδώσας καὶ κοπίσας· καθαρίσιον δὲ ἔχει δύναμιν χοιλίας πυούμενον. C Al. λεπιδώσαι.

Περὶ Κνικελαίου. Κεφ. μδ'.

Ὡσαύτως δὲ καὶ ὁ κνίκινον σπυρίζεται. δύναμις δὲ ἡ αὐτὴ τῷ ἀπὸ τοῦ κνιδίου κόκκου, ἀσθενεστέρα δὲ μᾶλλον. V. ἡ αὐτὴ

Περὶ Ῥαφανελαίου. Κεφ. με'.

D Τὸ δὲ ῥαφάνινον σπυρίζεται ἐκ τοῦ αὐτοῦ σπέρματος· ὡς γὰρ καὶ τὰ λοιπά. τοῖς ἐκ νόσου δὲ φθειρίασιν ἁρμόζει, καὶ τοῖς περὶ τὸ πρόσωπον σπιλὴν παχύτητα. χρῶνται δὲ αὐτῷ οἱ ἐν Αἰγύπτῳ τοῖς ὠμοῖς ὀψωμασι σπυρίζοντες αὐτό. V. add. ἰματίοις

Περὶ Μελανθελαίου. Κεφ. μϛ'.

E Καὶ ὁ μελάνθινον δὲ τὴν αὐτὴν ἔχει δύναμιν, καὶ σκευασίαν τοῦ ῥαφανίνου. Hæc Ruellius omiſit.

Περὶ Σιναπελαίου. Κεφ. μζ'.

Τὸ δὲ σινάπινον σπυρίζεται, λεαινομένου τοῦ σινήπεως καὶ βραχυνομένου ὕδατι θερμῷ, ἔπειτα μιγνυμένου ἐλαίῳ, καὶ συνεκθλιβομένου. ποιεῖ δὲ πρὸς τὰ χρόνια ἀλγήματα μᾶλλον συγκρίνον. F

Περὶ Μυρσινελαίου. Κεφ. μή.

Μυρσίνινον δὲ σπυρίζεται ὧδε· λαβὼν τὰ ἁπαλὰ φύλλα τῆς μελαίνης μυρσίνης ἢ ἀγρίας ἢ ἡμέρου, κόπτε πιέζων· ἴσον δὲ τοῦ χυλοῦ ἐλαίου ὀμφακίνου μίσγων, χλιαίνε ἐπ' ἀνθράκων, ἕως ἂν συνεφθῇ ἄρτι ὃ ἐφίσταται. θᾶσσον δὲ σκευασία, τὰ ἁπαλὰ τῶν φύλλων κόψασα, ἕψε μετ' ὕδατος καὶ ἐλαίου, καὶ ὃ ἐφίσταται ἀποψᾶν· ἰδίως δὲ τὰ φύλ- G V. μίγνυ. V. addit ἰματίοις.

λα καθίνται εἰς ἥλιον, ὁ ἐλαίῳ ἀποβρέχειν. ἔνιοι δὲ προσφύουσι ὃ ἔλαιον σιδίου, κυπαρίσσῳ, κυπείρῳ, σχοίνῳ. ἔστι δὲ ἐμπυρευματικώτερον τῇ γλοιᾷ πιπρίζον, καὶ ἐλαιῶδες, χλωρόν, διαφανές, ὄζον μυρσίνης. Δύναμις δὲ αὐτοῦ συστατικὴ, σκληρυντικὴ δὲ καὶ ποιᾷ μιγνύμενον ἀπυλοτικαῖς, καὶ προσπυείκουσα, ἀχῶρας, πίτυρα, ἕλκη θηλώδη, παρατετιλματα, ῥαγάδας, κονδυλώματα, ἄρθρα κεχαλασμένα· ἱδρῶτας φίλλει, καὶ ὅσα φύσεως ἢ πυκνώσεως ἔχει χρείαν.

A exposita Soli folia in oleo maceres. Nec desunt qui oleũ priùs inspisset malicorio, cupresso, cypero ac iunco odorato. Efficacius est quod gustu subamarũ deprehẽditur, oleosũ, viride & translucidum cernitur, ac myrtũ redolet. Vis porrò ei astringẽdi & indurandi: quare efficaciter cicatricẽ obducẽtibus medicamentis immiscetur. Facit quoq; ad ambustiones, vlcera capitis manantia, furfures, papularũ eruptiones, attrita, rhagadas, condylomata & laxatos articulos. Sudores compescit, ac denique ad omnia valet, quæ astrictionẽ densationémve desiderant.

B

Γερὶ Δαφνελαίου. Κεφ. μθ'.

Τὸ δὲ Δάφνινον συνθλάζεται ἀπὸ τῶν δαφνίδων, ὅταν ὦσι ὀρυοπτοῦς, ἐψομένων μὲν ὕδατος· ἐκ γὰρ τοῦ ἀφεψημένου λέπους ἁπαλοῦ ἀύπνον λιπαρίαν τινὰ, ἣν ἀφαιροῦντες χερσὶν εἰς μύαγρα αἱαλαμβάνουσιν. ἔνιοι δὲ ὀμφάκινον ἔλαιον προσφύοντες, κυπείρῳ, καὶ σχοίνῳ καὶ καλάμῳ, καὶ μετὰ τοῦτο δάφνης φύλλα ἀπαλὰ βάλλοντες, συνεψοῦσιν. ὅταν δὲ, καὶ δαφνίδας, ἕως ἂν ἱκανῶς ἁλῶσιν τῇ ὀσμῇ. ἔνιοι δὲ καὶ σύριγκα μίσγουσι καὶ μυρσίνου. ἀρίστη δὲ πρὸς ἀπασαίαν ἡ ὀρεινὴ καὶ πλατύφυλλος δάφνη. ἀπαφέρει δὲ τὸ πρόσφατον, χλωρὸν τῇ χρόᾳ, πικρόταλον, δριμύ. Δύναμιν δὲ ἔχει θερμαντικὴν, μαλακτικὴν, διαπεπτικὴν, κόπων λυτικήν. ἁρμόζει δὲ τοῖς ἀπὸ τὰ νεῦρα πάθεσι πᾶσι, καὶ ὑπαλγίαις, καὶ καταῤῥοιζουμένοις· γενεσιτικοῖς δὲ τοῖς ἀπὸ ψύξεως ἀήθμασί ἐστιν ἄριστον, ὡς ὑδὲν ἕτερον ὠφελοῦν. ἔστι δὲ καὶ ναυλώδης πότον.

C Laurinum è drupis seu maturitate deciduis lauri baccis in aqua decoctis conficitur. Tùm enim ex ambiente cortice pinguitudinẽ quandã exudãt, quæ manibus priùs expresso è tritis baccis succo cõchis excipitur. Nonnulli verò vbi omphacinũ oleum cypero, iunco odorato & calamo priùs inspissauerũt, D renera deinde lauri folia in id cõiecta simul decoquunt. Sunt qui lauri baccas addant, dum iustus odor accesserit: alij styracem & myrrham ammiscent. Porrò ad eiusmodi olei confectionẽ optima est laurus mõtana & latifolia. Laurinum verò oleũ excellit, quod recens est, colore viride, amarissimũ & acre. Vis ei E excalfaciendi, emolliẽdi, spiracula venarũ aperiẽdi, & lassitudines discutiendi. Quin & malis neruorũ omnibus, doloribus auriũ ac destillationibus cõfert: renum verò vitio ex frigore contracto laborantibus illitus est præstantissimus, & maximè si quid aliud vtilis. At potum idem nauseosum est. F

Forte αἰαίσιον

Legendum φιλύρου

V. addit ἡδύσμου τε

Par. codex hanc periodo caret. Ald. ad notha retulit.

Γερὶ Σχινελαίου. Κεφ. ν'.

Τὸ δὲ σχίνινον ὁμοίως ἐκ τοῦ καρποῦ πεπέρου συνθλασθὲν, ὡς τὸ δάφνινον, προσφυθὲν, ὑγιάζει ψώρας κτηνῶν καὶ κυνῶν· καὶ εἰς πτισὶς καὶ εἰς ἄκοπα καὶ λεπρικὰ ὀπτηδίως μίγνυται· φύλλει δὲ καὶ ἱδρῶτας. καὶ ὁ τερεβίνθινον δὲ ὁμοίως συνθλάζεται· ψύχει δὲ καὶ σύφει.

V. προσφὺν

Desunt hæc in Ald. Forte ψύχῃ

De Lentiscino & Terebinthino. Cap. L.

Lentiscinum vero similiter atque laurinum ex maturo fructu confectum ac priùs inspissatum, scabiem iumentorum canumque sanat. Pessis, acopis & ad lepras tollendas accommodatis medicamẽtis aptè & vtiliter immiscetur: ac sudores etiã cohibet. Eodem quoque modo paratur terebinthinum, quod exiccat & astringit.

De Maſtichino. Cap. L I.

Maſtichinum è trita maſtiche paratur. Contra omnia vuluæ mala efficax eſt, leniter calfaciens, aſtringens ſimul & emolliens. Eſt & vtile ad prominentes circa ſtomachum ſcirrhos, vt & ad cœliacorum dyſentericorúmque cruciatus. Vitia quæ ſunt in facie emendat, colorémque meliorem præſtat. Optimú verò in Chio inſula componitur.

De vnguentorum compoſitione. Cap. L II.

QVANDOQVIDEM vnguẽta nonnullis affectibus accommodantur, partim medicamentis admixta, partim inſtillata ſeu perfuſa, partim etiá naribus obiecta, conſequens eſſe ducimus, vt horum quoque tractationé perſequamur. Eorú porrò periculum facientes obſeruare oportet, an illud olfactui repreſentent, ex quo temperamentú ipſorú conſtat. Optimum ſiquidem eſt huiuſcemodi iudicíú. Attamẽ id in nõnullis locú non habet, propter vehementiorú quæ miſcentur prę-ualés dominiú: velut in amaracino, crocino & telino, nec non & alijs quibuſdá: quę quidẽ ex crebra circa ipſa exercitatione ꝓbare cõueniet.

De Roſacei præparatione. Cap. L III.

Roſaceum oleum fit hoc modo: Iunci odorati contuſi & aqua ſubacti libras quinq; & beſſem in olei libris xx & quincunce ſubinde mouẽdo coquito: deinde vbi percolaueris, in olei libris illis xx & quincunce roſarú numero mille nõ madefactarú foliola conijcito: vnctíſq; melle odorato manibus ſenſim aliquantulú premẽs identidẽ mouero: deinde vbi noctẽ vnã ſiueris, exprimito. Quú verò id quod fæculentú eſt ſubſederit, mutato recipiẽte vaſe in crateré melle oblitú recõdito. Porrò expreſſis roſis in labellũ coniectis olei inſpiſſati libras viij & quadrantẽ affundito, iterúq; exprimito: eritq; hoc tibi ſecundariũ oleũ. Quòd ſi volueris ad tertiam vſque quartámve macerationem progredi, toties oleum roſis affundito & exprimito. Fit enim & primarium & ſecundarium & tertiarium & quartarium vnguentum. Sed quoties id feceris, crateras melle priùs oblinito. Sin ſecundam iniectionem inſti-

A Περὶ Μαστιχελαίου. Κεφ. να'.

Τὸ δὲ μαστίχινον ἡ μαστίχης λείας σκευάζεται. ποιεῖ δὲ πρὸς τὰ ὑγρὰ πτώματα, ὑπίους θερμαῖνον, σύφον, μαλάσσον, καὶ πρὸς τὰ ἀπὸ τοῦ στόματος ὀδυρτικὰ σκιρρώματα, καὶ κοιλιακὰ, καὶ δυσεντερικὰ, καὶ τὰ ὀπὶ τῶν προσώπου. B καθαίρον, καὶ εὔχροιαν ποιεῖ· σωλῆνας δὲ ἐν Χίῳ τῇ νήσῳ κάλλιστον.

V. τοῦ Μαστιχοσίνου

Περὶ σωληνίστων Μύρων. Κεφ. νβ'.

ΕΠΕΙ δὲ καὶ τὰ μύρα εὐθετεῖ ἐπ' ἐνίων παθῶν, ἢ μίγνυται φαρμάκοις καὶ ἐμβρεχόμενα ἢ ὀσφραινόμενα, ἀκόλουθον ἡγησώμεθα καὶ περὶ τούτων πρᾶξαι δοκιμάζοντας ὁπηνίκα C σαλῇ. ἃ δεῖ δοκιμάζοντας ὁπηνίκα λείπῃ, εἰ ἀφ' οὗ ἡ κρᾶσις ἐστὶ τοῦ μύρου, ἐκεῖνο ποιεῖ καὶ τὴν ὀσφρησιν. ἀρίστη δ' ἐστὶν ἡ τοιαύτη κρίσις· ἐπ' ἐνίων μόνον τις ἂν φυλάττεται ὃ τοιοῦτον δ' ὑπερβάλλον μυρεψικῷ σοφιστοτέρων, ὡς ὑπὲρ ἀμάρακον καὶ κρόκινον καὶ τηλίνου καὶ ἄλλων τινῶν, ἃ δεῖ καὶ D αὐτὰ γυμνασίας δοκιμάζειν.

V. ἀλλ' ἐνίων

V. ἀλλ' ἐνίων

Al. γυμνασίας

Περὶ Ῥοδίνου σκευασίας. Κεφ. νγ'.

Ῥόδινον ἔλαιον γίνεται ὕτω· χοίνικος λίτρας ε'. οὐγγίας ἡ'. τοῦ ἐλαίου λίτρας κ'. ὀγγίας ε' κόψας καὶ φυράσας ὕδατι, ἕψε ἀκαινάν· εἶτα ἀποθλίψας εἰς ζ κ'. λίτρας καὶ ὀγγίας ε'. ἐλαίου, ἐμβὲ ῥόδων ἀ- E βεβήχων ἀειθιῶ χίλια πέταλα καὶ ζ χεῖρας μελιτ ζείσας, ἀνακύψ πλεονάκις ὑποθλίβων ἠρέμα· ἔπειτα ἐάσας τὴν νύκτα ἐκθλιβε· ὅταν δὲ τὸ τρυγῶδες ὑποχῇ, ἀντλησον τὸ ὑποδεχόμενον ἀγγεῖον ἀποπλυνον δὲ εἰς κρατῆρα μέλιτι κεκερασμένον. βαλὼν δὲ εἰς λουτρεῖδιον τὰ ἐξιπωθέντα ῥόδα, ὑπόχυ λίτρας ἡ. ὀγγίας F γ'. τοῦ ἐσυμμένου ἐλαίου, καὶ πάλιν ἐξίπτου. ἔσαι δὲ σοι τοῦτο δεύτερον, κἂν ἐκλιθῇς ἄ- χρι γ'. ἢ δ'. ἀποβεβηκὼς ὅτι χίων ἐξίπτου. γίνεται γὰρ τὸ μὲν α'. τὸ δὲ β'. τὸ δὲ γ'. τὸ δὲ δ'. μύρον. ἰσάκις δ' ἂν ποιῇς, τοὺς κρατῆρας προεκπλύνειν μέλιτι. εἰ δὲ θέλεις δεύτερον ἐμβολὴν ποιή- G

Al. Ἀπὸ τῶν ὠῶν

Al. Ἀπὸ τῶν ὠῶν

σαθαι, εἰς δὲ τοῦτον ἐκπιεσθὲν ἔλαιον ἅ
ἴσον ἀρίθμει τοῦ σφάτων ῥόδων ἀ-
βέχον ἔμβαλε, καὶ ἀναχυλῶ ταῖς χερ-
σὶ τοῦ δόδμιας μέλλι, ἐκπιεζε,
καὶ πάλι δ' ἄλλοτε καὶ τέταρτον καὶ πέ-
ταρτον ὁμοίως ἐκ ῥιζῶν. καὶ ὁσάκις
δ' ἂν ποιῆς τοῦτο, παρὰ ἀνχίζων τοὺς
ἅλλε ῥόδα. δυναμικώτερον γὰρ γίνε- β
ται· ἄχει δὲ ἐβδόμης ἐμβροχῆς· ὅτι δὲ-
χεται δ' ἔλαιον τρὶς ἐμβολιῶ τῶν ῥό-
δων, ἔπειτα δὲ σκέπε· κηρεῖσθω δὲ καὶ
ἡ λίνεος μύλιτι· δεῖ δὲ θερμαλέως τὸ ἔ-
λαιον τῶ χυλοῦ χωρίζειν· ἀπολιφθὲν
γὰρ πύλαχνον, δ' μύρον φθείρει. ἔνιοι δὲ
αὐτὰ μόνα τὰ ῥόδα ὀνυχίσαντες καὶ ὑ- c
λιάσαντες, σὺν ἁλὸς κόκκοις τοῦ ἐλαίου ἐ-
γχύσαντες καθ' ὑγρίας ς'. εἰς μίαν ξέσην
ἐλαίου, καὶ ἀλλάσοντες ἡμέρας ἡ. καὶ
ἡλιάζοντες ὅτι ἡμέρας μ'· ἄχει τελέ-
ας ἐμβροχῆς, οὕτως ἀπολύονται. ἔνιοι δὲ
τοῦ σύφοροι δ' ἔλαιον, κύλαμον καὶ ἀ-
σπάλαθον ἐμβάλλοντες· οἱ δὲ, καὶ ἄζου- D
σθαι ἔνεκεν βύζοίας, καὶ ἄλας τοῦς δ'
μὴ φθείρειν. Δύναμιν δ' ἔχει συπλικήν,
ψυκτικήν. ὠφέλιμον εἰς ἐμβρέγματα καὶ κα-
τάπλασμάτων μίξεις· λύει δὲ καὶ κεφάλαιο
πολιζόμενον, καὶ καῦσον σβέννυσι στομά-
χου. ἔστι δὲ καὶ θρεπτικὸν κοίλων ἑλκῶν,
καὶ τῶν κακοήθων τοιούτων, ἀχώρων E
καὶ ἐκ ξεμάτων ἐπάλειμμα. καὶ κεφα-
λαλγίας ἔμβρεγμα, ἐπὶ ἀρχῇ ὀδον-
ταλγίας ἀφέλκυσμα· ποιεῖ δὲ καὶ τοὺς
βλέφαρα ἐσκληρυμμένα ἐγχριόμενον,
καὶ τὰ ἐντέρων ἐρεθισμοὺς καὶ ὑστέρας
ἐγκλυζόμενον χρήσιμον.

Περὶ Ἐλαίνου σκευασίας. Κεφ. νδ'.

Ἐλάτινα ἄφλοια καὶ ἀφεψή-
σας ἔμβαλε εἰς λουτῆρα, καὶ ὀπὸς
ὀμφάκινον ἔλαιον ὅτι ἡμέρας γ'. ἀνελό-
μενός τε εἰς σαυρίδα ἔκπιεσον. ἔπειτα δὲ ἐ-
κάτερα ἰσόσταθμα. εἶτα ἀποθέμενος εἰς
καθαρὰ ἀγγεῖα, χρῶ. Δύναμιν δὲ ἔ-
χει ἀναλογοῦσαν τοῦ ῥοδίνου, κοιλίαν δὲ
οὐ μαλάσσει.

tuere libet, in primò expreſſum o- A
leum recentiũ ac minimè madida-
rũ roſarũ parem numerũ immitti-
to, & manibus melle priùs imbutis
agitans exprimito: ac ſecundò, ter-
tiò aut quartò, ſimili modo expri-
mens facito, totiéſque recentes ro-
ſas detractis vnguibus adijcito. Sic
enim oleum multò potentius eua- B
det. Porrò ad ſeptimam infuſionẽ
oleum iniectionẽ roſarum admit-
tit, præterea verò minimè. Cæte-
rùm melle prælum illinatur: oleum
à ſucco diligenter ſecerni oportet.
Nam ſi huius vel tantillum relin-
quatur, vnguentum vitiabit. Sunt
qui roſas ipſas ſolas vnguibus de-
tractis inſolatas ſelibræ põdere im- C
mergunt in olei ſextarium vnum:
ac per dies octo permutantes, & ad
dies XL inſolates ſic vt tertiò roſa-
rum maceratio fiat, ita recondunt.
Nonnulli additis calamo & aſpala-
tho oleum priùs inſpiſſant: alij an-
chuſam pulchri coloris conciliandi
gratia & ſalem quò minus corrum-
patur, adijciunt. Vim aſtringendi
& refrigerandi obtinet, irrigatio- D
nibus & cataplaſmatum mixtioni-
bus accommodatam. Aluum quo-
que potum ſoluit, ardorémque ſto-
machi reſtinguit. Caua item vl-
cera nutrit ac replet: maligna verò
demulcet. Ad manantia capitis vl-
cera ac feruidas eruptiones illini-
tur. Caput dolens eo perfunditur.
Ad dentium dolores inter initia
colluitur. Illitum quoque ad palpe- E
bras induratas efficax eſt: denique
ad inteſtinorum ac vuluæ roſio-
nem proritationémve vtiliter in-
funditur.

De Elatini confectione. Cap. LIIII.

F

Tuſam diſcerptámque elaten (hoc eſt, florentium adhuc pal-
marum fructus corticem ſeu inuo-
lucrum) in labrum conijcito, & om-
phacinum oleum affundito: in quo
tridui ſpatio eam macerari ſinito.
Mox fiſcella excipito & exprimi- G
to. Sint verò vtraque paria pon-
dere. Tandem vbi vaſe mundo repo-
ſueris, vtitor. Vim habet roſaceo
proportione reſpondentem: ſed alu-
um minimè mollit.

De Melini compositione. Cap. LV.

Oleum melinum hunc in modum præparatur. Vbi olei sextarios sex & aquæ sextarios decem simul commiscueris, spathę seu elatę cõtusæ vnc. iij. iúci odorati vnc. j. adiicito: ac posteaquam diem vnum macerari siueris, coquito. Mox excolatum oleum in vas oris lati coniicito, ac imposita matta arundinacea aut storea rariore, mala cotonea desuper insternito, eáque obuelata vestimẽtis ad dies satis multos finito, dum oleum malorum vires ad sese allexerit. Alij mala operimentis obuoluunt ad dies decem, vt coerceatur, miniméq; exhalet odoris suauitas: ac postea duorũ dierum totidémque noctium spatio in oleo macerant, tandémque oleum expressum recondunt. Vim porrò astringentem & refrigeratoriá obtinet: facitque ad scabiosa vlcera, furfures, perniones & herpetas. Ad vuluæ exulcerationes commodè instillatur: quin & concitatam vrinam infusum sistit, sudoréfque cohibet. Bibitur & contra cantharidas, bupresteś & pinorũ erucas. Probatur verò in hoc genere maximè, quod cydonia mala redolet.

A Περὶ Μηλίνου σκευασίας. Κεφ. νʹ.

Ἔλαιον μήλινον σκευάζεται ὧδε· ξυ- V. hac prima periodo caret.
πτου τοῦτον· ἐλαίου ξέστας ϛʹ. ὕδατος ξέ- Al. γ.
στας ιʹ. μίξας, προσεμβαλὼν λεπάδης τε- Lege καπάδης vel λάπης.
θλασμένης οὐγγίας γʹ. ἀρίνου οὐγγίαν ἀ. καὶ
ἐάσας ἡμέραν μίαν, ἕψησον. εἶτα ἀπηθήσας τὸ ἔλαιον, βάλε εἰς ἀγγεῖον πλατύσ-
B τομον, ὅτι ἔχῃς τι ῥῖπον ἐκ καλάμου, ἢ φύλ- Par. ῥῖπος
λου ἀραιοῦ, αἰῶλόν τι ἐπιθεὶς κυδωνίοις μῆ- Al. σπαρτίου
λοις, καὶ περικαλύψας ἱματίοις, ἐάσον ἡμέρας ἑπτὰ, ἕως αἰσθάνοιο τὴν ἀπὸ τῶν μήλων δυνάμιν τοῦ ἐλαίου. ἔνιοι δὲ καὶ μῆλα κατακόλλοντες ἱματίοις ὅτι ἡμέρας ἑπτὰ, ἵνα σφόδρα καὶ μᾶλλον ἀφαπτόμενα V. non habet τὸ
C τὴν ὀσμὴν, μεθ' ἡμέρας τοῦτο ἀποβρέχουσι τῷ ἐλαίῳ ἡμέρας βʹ καὶ νύκτας· εἶτα ἐξιπτοῦσιν ἀποθλίβοντες. Δύναμιν δὲ ἔχει συμπτικὴν, ψυκτικὴν ποιοῦσι πρὸς τὰ φλεγμαίνοντα καὶ ἐξ ἕλκη, ἐρπητας, καὶ πρὸς V. non habet τὸ
τας ἐν ὑστέρᾳ ἕλκωσις ἐν χειμῶνι· λύει, οὐδέν τι ἐρεθισμένα σκληρὰ ἐν κλυσμῷ λύει,
D καὶ ἱδρῶτας ἐφίστησι. πίνεται δὲ καὶ πρὸς κυνοδαιδας, δουπρήστις, πιτυοκάμπας. ἔστι Vulg. πιτυοκάμπιλον
δὲ καὶ δόκιμον τὸ κυδωνίων ὄζον μήλων.

De OEnanthini confectione. Cap. LVI.

OEnanthen exuua (syluestri) odoratam posteaquam marcescere siueris, in oleum omphacinum coniicito, & vndiquaque versando agitato: porrò cum ad biduum siueris, exprimito atque reponito. Vim habet astrictoriá rosaceo proportione respondentem, præterquàm quòd aluum neque soluit neque mollit. Probatissimum verò etiam est, quod œnanthen odore quam maximè refert.

Περὶ Οἰναίθης σκευασίας. Κεφ. νϛʹ.

Οἰναίθην τοῦ ἐκ φυλῆς βʹ οὐδὴ
E μεφάνας, βάλε εἰς ὀμφάκινον ἔλαιον, καὶ κίνει μεταγρέφων· ἐάσας δὲ ἡμέρας δύο, ἔξίπου, καὶ ἀπόθλιβε. Δύναμιν δὲ ἔχει συμπτικὴν, ἀναλογοῦσαν τῇ τοῦ ῥοδίνου, ἐπὶ τὸν χαλκοῦν λύει δὲ μαλακτικῶς. καὶ τούτου δὲ ὄζει δοκιμώτατον, τὸ ἐμφαῖνον ἐν τῇ ὀσμῇ τοῦ οἰναίθου.
F

De Telini componendi ratione. Cap. LVII.

Fœnigræci libras v. olei libras ix. calami libram vnam, cyperi libras ij macera in oleo ad dies septem, ita vt ter quotidie agites: dein exprimito atque reponito. Sũt qui pro calamo quidem cardamomum, pro cypero verò xylobalsamum simul macerant: alij oleum iis ipsis priùs inspissant, ac deinde fœnumgræcum in ipso macerant,

Περὶ Τηλίνου σκευασίας. Κεφ. νζʹ.

Τήλεως λίτρας ε. ἐλαίου λίτρας V. ϛ.
ϛʹ. καλάμου λίτραν ά. κυπείρου λί- V. έ.
τρας βʹ. ἀποβρέχε τῷ ἐλαίῳ ὅτι ἡμέρας ζʹ. κινῶν ἑκάστης ἡμέρας τρεῖς. εἶτα V. κινῶν τρὶς τοῦ ἐκάστης & sic etiam habet Actius.
ἐξίπου καὶ ἀπόθλιβε. οἱ δέ, ἀντὶ μὲν καλά-
G μου καρδάμωμον, ἀντὶ δὲ τοῦ κυπείρου, ξυλοβάλσαμον συναποβρέχουσιν. ᾧ δὲ, προσφύρουσι τὸ ἔλαιον τούτοις· καὶ μετὰ ταῦτα τῷ τήλει ἀποβρέχοντες

ὀξυπόδι. Δυνάμιν ἔχει μαλακτικὴν ἀποπεπτικήν, πεπτικήν. μάλιστα δὲ ἁρμόζει πᾶσι τοῖς κατὰ μήτραν πᾶσι σκληρύνσεσι. δυσκόπους τε ἐγχριόμενον, ἐπιδήσας καταζήνας τὸ κατὰ τὸν τόπους ἥκοντα, τοὺς ἐκπεπτηκότων τῶν ὑγρῶν, τοὺς τε ἐν δακτυλίοις φλεγμονάς, καὶ ἐλκύζοντα ὅτι τῶν πυοποιῶν ὠφελίμως, πίτυρά τε καὶ ἀχάρεις σμήχει, καὶ πρὸς καταπάσματα καὶ χρίσεις μετὰ κηροῦ, σμήχει τὰς ἐφηλίδας· καὶ εἰς στλεγμάτα μίγνυται. ἐκλέγου δὲ τὸ πρόσφατον καὶ μὴ λίαν παρεμφαῖνον τὴν τῆς πίλεως ὀσμήν, σμῆχον τὰς χεῖρας, γλυκύπικρον ἐν τῇ γεύσει· ὃ γὰρ τοιοῦτον κάλλιστον.

A tandémque exprimunt. Porrò vim habet apoſtemata molliendi atque maturandi: maximè autem omnibus circa vterũ duritijs accommodatum eſt: ægrè parientibus commodè inſtillatur, vbi excretis antè humoribus loci muliebres ſiccitatem contraxerint. Quin & ad ſedis inflammationes, necnon ad tenoſmos vtiliter infunditur: furfureſq; & vlcera capitis manantia detergit. Facit & ad ambuſta & pernionis, addita cera. Maculas quoque à Solis ardore contractas exterit, atque medicamentis ad faciei nitorẽ inducendum admiſcetur. Cæterùm eligito recens, quódque fœnigræci odorem non admodũ referat, manúſque abſtergat, ac dulcedinis amarori permixtæ ſaporẽ redoleat. Tale ſiquidem præſtantiſſimum iudicatur.

Περὶ Σαμψυχίνου σκευασίας. Κεφ. νδ'.

De Sampſuchini componendi ratione. Cap. LV III.

Ἑρπύλλου, κασίας, ἀβροτόνου, σισυμβρίου, ἀνθέων, μυρσίνης πιπάλων, σαμψύχου, ἑκάστου λαμβάνειν σοχασμῷ πρὸς τὴν ἑκάστου αὐτῶν δύναμιν ἀποβλέποντα, κόπτειν δὲ τὰ αὐτὰ πρῶτα, καὶ βάπτειν ἐλαίου ὀμφακίνου ποσὸν, ὥστε μὴ καταπραπῆναι τὴν δύναμιν τῶν ἐν αὐτῷ βρεχομένων, καὶ ἐᾶσαι ἡμέρας τέτταρας· καὶ ἐκθλίβειν, καὶ πάλιν δὲ αὐτὸ πλῆθος τῶν αὐτῶν προσφάτων ἀποβρέχειν ὁμοίως χρόνου, καὶ ἐξιέναι. ἔστι γὰρ δυνατώτερον. ἐκλέγου δὲ τὸ μελανόχλωον τῇ χρόᾳ, σαμψύχου ὀπτοῦ ὄζον, μετρίως δριμύ. Δύναμιν ἔχει θερμαντικὴν, λεπτυντικὴν, δριμεῖαν· ποιεῖ δὲ καὶ πρὸς μύσιν καὶ διαφορητικὴν ὑγιέρας, ἐμμηνά τε, διύτερα καὶ ἔμβρυα ἐκπιπτόντα, καὶ πίνας ὑστερικὰς ἀναπτόντας, ὀσφύων τε καὶ βουβώνων ἀλγήματα πρόσφορα, σὺν μέλιτι δὲ αὐτῷ χρῆσθαι βέλτιον, ἐπὶ τῆς σφοδρᾶς σύψεως σκληρύνουσι τοὺς τόπους, λύει καὶ κήπους συρίττοντας, εἴς τε τὰ ὀπισθότονικὰ καταπλάσματα ἐπιτηδείως μίγνυται, & τῶν ἄλλως κατωμιῶν.

Serpylli, caſſiæ, abrotoni, florum ſiſymbrij, myrti foliorum, ſampſuchi, ſingulorum ſumito quantum ad ipſorum vniuſcuiuſque vires animum attendens fat eſſe conieceris, vnáque omnia tundito: & olei omphacini quantum fuerit ſatis affundito, dummodò ne euincatur eorum vis quæ in ipſo macerantur, ac poſt quatriduum exprimito. Rurſum verò illorum eorundẽ recentium par pondus æquali tempore in eodẽ oleo macerato & excolato: ſic enim efficacius reddetur. Verum ſampſuchum eligito colore ex nigro viridi, plurimùm odoratũ ac mediocriter acre. Vim habet calfactoriã, extenuantem & acrẽ. Facit porrò ad vuluæ pręcluſionem atque diſtorſionẽ: menſtruáque, ſecundas & partus extrahit, ac vuluæ ſtrangulatus recreat. Lumborũ inguinúmque dolores lenit. At cum melle ſatius eſt ipſo vti: quandoquidem vehementi aſtrictione locos indurat. Laſſitudines etiam illitum diſcutit, ac denique aptiſſimè opiſthotonicorum alitérque conuulſorum caraplaſmatis inſeritur.

Περὶ Ὠκιμίνου σκευασίας. Κεφ. νϛ'.

De Ocimini præparatione. C. L I X.

Λαβὼν ἐλαίου λίτρας κ'. ὠκίμου σπάνιν λίτρας ιά. οὐγγίας ἡ. ἀποφυλ-

Olei libras x x. ocimi pondo libras x i. & beſſem ſumito: huius

V. πεπέμενον
Vet. ἐγχρισ.
Al. διαπίλῳ
V. κατὰ
Marc. σμήχει
C. Byzantinus caret
C Ald. caret istimque Pal.
C Leon. & Ald. tribus ſequentibus vocibus carent, necnon & Pal.
Al. add. δὲ
V. ἐπὶ δὲ
V σαμψύχου ἐπιπολὺ ὄζον Pal σαμψύχου πικρὸν
Voce λύπρα carẽt vulg. excmp
In quibuſdã veteribꝰ codicibus eſt hoc capitis exordium ὠκιμίνου σπάνιν τοῦτο τὸ κατὰ τοῦτον ἐπιγραφόμενον περὶ ὠκιμίνου ἐν τοῖς ἐξηγημένοις περὶ ὀπισθοτονικῶν καὶ ἄλλων ἐπιτηδείως μίγνυται. Alius ſic habet: ὠκίμου σπάνιν λύει καὶ κήπους συρίττοντας ἔστιν τὸ ὠκίμινον

decerpta folia in oleo ipso diei vnius noctisque spatio macerato, dein exprimito atq; reponito. Exemptis porrò è quasillo foliis rursum olei parem mensuram affundito & excolato. Vocatur autem hoc secundarium: tertiam enim macerationem minimè admittit. Exinde recentis ocimi æquale pondus iterum macera, vt in rosaceo dictum est, ita vt affuso prioris macerationis oleo temporis eodē spatio madere sinas: tumque postea exprimito atque recōdito. Quòd si ter quatérve macerare volueris, recens ocimum semper injicito. Potest & ex omphacino confici: sed illo modo melius. Eadem quæ sampsuchinum præstat: at minus est efficax.

A λίσας, ἀποβρεχε νύκτα καὶ ἡμέραν ἐν ᾧ ἐλαίῳ, εἶτα ἐξίπου καὶ ἀπόθλιβε. ἐκκαθώσας δὲ τὰ ἀπὸ τῆς κυρίδος, ὕστερα πάλιν ὅσον πλῆθος τοῦ ἐλαίου καὶ ἐξίπου. καλεῖται δὲ τοῦτο δεύτερον· τρίτην γὰρ οὐκ ὑπομένει βρεχμόν. εἶτα προσφαλὲν ὤκιμον λαβὼν ἴσον, πάλιν ἀποβρεχε, ὡς ὅτι τοῦ ῥοδίνου εἴρηται· τὸ δὲ ἤδη ἀποβεβρεγμένον ὅτι χρὴ ἐᾶν ὃν αὐτὸν χρόνον, ἔκθλιβε καὶ ἀπόθλιβε. καὶ ἂν τρὶς δὲ ἢ τετράκις θέλῃς, ἀποβρεχε, προσφατον ἀεὶ ὤκιμον ἐμβάλλων. δύναται δὲ καὶ ἐκ τοῦ ὀμφακίνου σκευάζεσθαι· βέλτιον δὲ ἐκείνως· δύναται δὲ τὰ αὐτὰ τῷ σαμψύχῳ, ἐλαττῶν ἐργῳῶ.

V. hanc non habet. Vetus ni fallor

Περὶ Ἀβροτονίνου σκευασίας.

Κεφ. ξ.

Ἀβροτόνινον ἐκ τοῦ εἰς ὃ κύπριον ἠρωματισμένου ἐλαίου λίτρας θ' οὐγγίας ε'. ἀβροτόνου φύλλων λίτρας η'. ἐμβαλὼν δ' ἀποβρέξας, νύκτα καὶ ἡμέραν ἐξίπου. πολυχρόνιον δ' εἰ βούλῃ ποιῆσαι, ἐκβαλὼν τὰ πρῶτα φύλλα, ἄλλα ἔτερα φύλλα, καὶ σκαποβρέχων ἐκ πίεζε. Δύναμιν δὲ ἔχει θερμαντικήν, ποιοῦσθαι πρὸς ταῖς ὑστέραις μίσεσι καὶ σκληρίαις, ἄγει ἔμμηνα καὶ δύτερα.

V. Ἐμβαλὼν

V. ἄλλα ἔτερα

Περὶ Ἀνηθίνου σκευασίας.

Κεφ. ξά.

Ἐλαίου λίτρας η'. οὐγγίας θ'. ἀνήθου αὐθους λίτρας ιά. οὐγγίας η'. σκαποβρεχε τῷ ἐλαίῳ ἡμέρας ά· εἶτα σκ πίεζε ταῖς χερσί, καὶ ἀπόθλιβε. ἔσται δὲ ἡλίῳ ἀλιγόχροον ποιῆσαι, προσφαλὲν ἀνήθου αὖθις ὡσαύτως ἀποβρεχε. δύναται δὲ μαλάσσειν τὰ τῆς μήτρας καὶ διαστομοῦν, ἁρμόζον τοῖς τὰ σκληρὰ ῥίζη θερμαῖνον καὶ κόπους λύον, καὶ ἀλγήματα ἄρθρων ὠφελοῦν.

Orib. τοῦ αὐθους λίτρας ιά. οὐγγίας η'. ἀνήθου αὖθους τὸ αὐτό.

Antiquus alter, αὐθους πλῆθος. Goupylus.

Περὶ Σουσίνου σκευασίας. Κεφ. ξβ.

Τὸ δὲ σούσινον, ὃ ἔνιοι κρίνινον καλοῦσιν, οὕτω σκευάζεται· ἐλαίου λίτρας θ'. οὐγγίας ε'. καλάμου λίτρας ε', οὐγγίας γ'. σμύρνης οὐγγίας ε'. φυσίσας

V ὀγγίας γ'. In veteribus nonnullis haec desiderantur. V. ὀγγίαν

Suſinum, quod lurinum seu liliaceum nonnulli appellāt, ita temperatur: Olei libras ix & quincuncem, calami libras v & quadrantē, myrrhę quincūcem posteaquam

B

C

D

E

F

G

οἴνῳ βώδῃ, ἔψει, εἶτα ἀπηλήσας τὸ ἔλαιον, ἀπόχει μεθ' ἁρδαμώμου κεκομμένου καὶ βεβρεγμένου ὕδατι ὁμβείῳ * λίτρας γ'. σύγχεας ς'. καὶ ἐάσας βραχέως, ἀπόθλιβε· καὶ λαβὼν ἐκ τοῦ ἐσυμμένου ἐλαίου τρεῖς καὶ ἥμισυ λίτρας, κρίνα ἀριθμῷ χίλια, ἀποφυλλίσας, θὲς εἰς λουτῆρι πλατεῖ, μὴ βαθεῖ· θλίχιας τε ὅ ἔλαιον, ἀναχύσῃ ταῖς χερσὶ μέλιτι κεχρισμένας· ἐάσας δὲ ἡμέρας μίαν καὶ νύκτα, ὡς φὶ εὐελαίμους εἰς πυξίδα ἐξίπου, ὅ δὲ φερόμενον ἀπήλῃ βύτως ἀπὸ τοῦ σωσηθλιβέντος ὕδατος τοῦ ἐλαίου· οὐ γὰρ ἐσταμᾷ ὡς τὸ ῥόδινον, συνθερμαινόμενον δὲ αὐαζεῖ καὶ σήπεται. μετάχιζε δὲ πολλάκις εἰς ἕτερα ἀγγεῖα μέλιτι κατακεχρισμένα ὡς ἐπάνω * ἄλας λεπτόν, καὶ τὸ συλλεγόμενον ἀκαθαρσίαν θλίμμασιν ἀφαιροῦ. * μετακεφάσας δὲ ἐκ τοῦ κυρθίου ὅ ἐξίπωλιν * ἀρώματα εἰς Ⓜ λουτῆρα, πάλιν θλίχει τῷ ἡραμαπομένου ἐλαίου τὸ ἴσον πλῆθος τοῦ πρώτου, καὶ καρδαμώμου κεκομμένου συνέμβαλε ὀλίγας ἱ. καὶ * ἀλαχνήσας χερσὶν ταῖς χερσὶ, καὶ θλίψας μικρόν, ἐξίπου, ὅ ἀπορρέον ἀπαναιρῶν. καὶ τρίτον θλίχιας πάλιν τὸ αὐτὸ ποίει, προσεπιμβάλλων καὶ ὅ καρδάμωμον καὶ * ὃν ἄλας ὁμοίως, καὶ ταῖς χερσὶ * βρέχων τοῦ μέλιτος ὀλίγων, καὶ ἔσαι ὅ μὲν πρῶτον ἐκπιεσθὲν ἄριστον· ἐχόμενον δὲ ὅ ἐξῆς· τρίτον δὲ τὸ τελευταῖον. καὶ πάλιν λαβὼν χίλια κρίνα καὶ ἀποφυλλίσας ἀφ' ὧν καὶ θλίχιας ὅ πρῶτον ἐξιπωλῶ μεθόδῳ, τὰ αὐτὰ ποιῶν ὥσπερ ἐπάνω θλίβει τοῦ πρώτου, καρδάμωμον προσμίσγων, εἶτα ἐξίπου. ποίει δὲ αὐτὰ καὶ θλίβει τῷ δευτέρου καὶ τρίτου ὡς εἴρηται, προσεπιβάλλων καὶ ὅ καρδάμωμον· εἶτα ἐξίπου καὶ ποίει τὰ αὐτά. ὁσάκις δ' ἂν ἀποβρέξῃς νεαρὰ κρίνα, δυναμικώτερον ἕξεις ὅ μύρον. ὅτι τέλος δὲ ὕστερον αὐτάρκως ἔχει· σὺν δραχ. μίσγε ἐκπιεσθείσης σμύρνης χρυσῆς < οδ'. κρόκου < ί. * καρδαμώμου < οε'. οἱ δὲ κρόκου τῷ

vino odorato subegeris, coquito. Deinde colo traiectum oleum vna cum cardamomi tusi & aqua pluuia macerati libris iij & semisse refundito: ac vbi macerari fueris, exprimito. Tùm olei huius inspissati tres libras cum semisse sumito, liliáque numero mille. Horũ decerpta folia in labello lato, non tamen profundo, ponito, affusóque oleo perunctis melle manibus versato. Tandem vbi diem noctémque vnam cõquiescere fueris, mane in fiscellam translatum excolato: quod verò supernatabit oleum illico ab aqua quę simul cum eò expressa fuerit secernito. Neque enim vti rosaceum mistá sibi patitur aquá: concalfactum siquidem referuet atque cõputrescit. In alia porrò vasa melle oblita sæpius transfundito, salem tenuem priùs inspergens, & collectam immunditiem diligenter auferens. Expressum autem magma postquá ex quasillo in labrũ transtuleris, aromatibus imbuti olei par priori pondus rursum affundito, simúlque cardamomi tusi drachmas x conijcito. Hæc vbi probè manibus agitaueris, interiecta breui mora exprimito, & quod defluet repurgato. Tertiò demum affuso oleo, idẽ rursum facito & cardamomum ac etiamnum salem insuper adijciens, & manibus melle imbutis premens. Erit porrò primo expressum oleum optimũ: ab hoc secundum, quod sequitur: tertium locum sibi vẽdicat, quod postremum est. Tum verò denuo lilia mille decerptis folijs sumito atque disponito: & affuso quod primò expressum est oleo, eandem quam in primo viam & rationem inito, idémque facito, cardamomum adhuc admiscens, ac deinde exprimẽs. Eadem quoque in secundo ac tertio veluti dictum est præstato, cardamomum pariter adijciens: deinde excolato, ac reliqua denique similiter conficito. Quò porrò frequentius lilia recentia macerabueris, eo potentius efficaciúsve vnguentum habebis. Tandem cùm satis esse tibi visum fuerit, vnicuique præparationi myrrhę quàm optimę drachmas LXXII croci drachmas x, cinnamomi drachmas LXXV misceto. Alij croci &

V. δὲ λ.

Cornarius legit σμύρνα δὲ σὺν εὐώδει

V. ἅλας

Cornarius ἀφαιρῶν

Cornarius legit ἀλαχνήσας

V. τὸ ἅλας

V. caret. Al. ἢ τοῦ χεῖρας μέλιτι χρίσας ἢ θλίσον.

Par. σφίγγων

Hæc τὸ λιβάνου in Palat. no codice & forsasse redundant.

V. ἰχὼρ δίχα

V. < ε'.

cinnamomi æquale pondus immiſcent. Hæc tuſa cretáque in labrum cum aqua conijcito, primóque expreſſum vnguentum affundito: ac non ita multo poſt in vaſcula excipito ſicca, prius illita gummi aut myrrha, & croco ac melle aqua dilutis. Eadem in ſecunda, itémque tertia expreſſione facito. Nonnulli verò ſimplex ex balanino alióve oleo ac lilijs conficiunt. Excellere porrò videtur quod in Phœnice & Ægypto paratur, ac cum primis laudatur quod lilia redolet. Vim habet excalfaciendi, molliendi, aperiendique vuluæ præcluſiones: eiuſdem inflammationibus accommodatũ eſt, ac in vniuerſum ad muliebria mala eſt vtiliſſimũ. Conuenit & ad vlcera in capite manantia, varos, furfures ac feruidas eruptiones. Vibices etiá quamprimùm emendat, & reliquæ cuti concolores efficit: denique egregiè rarefacit. Potũ quoque bilem per aluum extrahit, vrinámque ciet: at ſtomacho noxium eſt, nauſeámque parit.

De Narciſſini miſtura. Cap. LXIII.

Narciſſinũ oleum ſpiſſatur hunc in modum: olei eloti libras LXX & quincuncem, aſpalathi libras VI cũ ſextante ſumito. Hunc tuſum & aqua maceratũ tertiæ olei parti miſceto & coquito. Dein exempto aſpalatho calami libras V. & beſſem adijcito: quin & myrrhę grumũ vbi contuderis atque cribraueris, vino vetere odorato ſubigito, itidémque miſceto atque decoquito. Simulac autẽ cum ijs efferbuerit oleum, ab igne amouẽto, & refrigeratum excolato. Tandem eius portionem in labellũ refundito, & flores narciſſi quamplurimos immittito, biduiq; ſpatio agitato: túmque, vt in Suſino dictum eſt, excolato, ac frequenter decapulato: ſiquidem hoc quoque corruptioni eſt obnoxium. Facit autem ad vuluæ vitia: quippe quod ipſius duritias emolliat, præcluſionéſque aperiat: ſed capitis dolores facit.

De Crocini confectione. C. LXIIII.

Ad præparandũ Crocinũ, oleum priore loco ſpiſſabis, velut in Suſino

A κινναμώμου τὸ ἴσον κόψας· σήσας ἔμβαλε εἰς τ' λυτῆρα· μὴ ὕδατος, καὶ θλίγας ὃ περίττον ἐκπιεζὸν μύρον· εἶτα ἐάσας μικρὸν, ἀναλάμβανε εἰς ἀγγεῖα μικρὰ ξηρὰ· πρόχρισμένα κόμμεϊ ἢ σμύρνῃ, καὶ κρόκῳ καὶ μέλιτι μὴ ὕδατος διεμμένοις. τὸ δὲ αὐτὸ ποίει ἐπὶ δευτέρου ἐκπιέσματος καὶ θλίβε οὗ πλεῖον. ἔνιοι δὲ ἀπλοῦν ἐξ ἐλαίου βαλανίνου ἢ ἄλλου καὶ κρίνου σκευάζουσι· δοκεῖ δὲ διαφέρειν ὃ ἐν Φοινίκῃ καὶ ἐν Αἰγύπτῳ γινόμενον. ἄριστον δέ ἐστιν αὐτοῦ, τὸ ὅζον κρίνων. Δύναμιν δὲ ἔχει θερμαντικὴν, μαλακτικὴν, διαπεπτικὴν τῶν ἐπὶ μήτραν μύστων καὶ φλεγμονῶν. καὶ καθόλου πάντων ὅσα χρησιμεύειν πρὸς τὰ γυναικεῖα· ἁρμόζει δὲ καὶ πρὸς ἀχῶρας, ἰούλους, πίτυρα, ἐκζέματα. μέλαινάς τε ἀνθρώπους μελανθείσας καὶ ὁμόχρους ποιεῖ. ἐὰν καθόλου ἐστὶν ἀραιωτικὸν ἄγαν ὂν καὶ χολὴν καὶ κοιλίαν πινόμενον κινεῖ· ὂν δὲ ὄφρυον. ἔστι δὲ καὶ κακοστόμαχον, καὶ ναυλίας ποιητικόν.

Περὶ Ναρκισσίνου σκευασίας. Κεφ. ξγ'.

Ἔλαιον ναρκίσσινον σύφεται οὕτως· ἐλαίου πεπλυμμένου λίτρας ὀ. αὐγίας ἑ. ἀσπαλάθου λίτρας ς'. αὐγίας ϛ'. κόψας καὶ βρέξας ὕδατι, τῷ πείτῳ τῷ ἐλαίῳ μίξας, ἕψει. εἶτα ἐξελὼν ἀσπάλαθον καλάμου βάλε λίτρας ἑ. αὐγίας ἡ. καὶ σμύρνης χόνδρον κόψας καὶ σήσας, φύρασον οἴνῳ παλαιῷ βώδει, καὶ μίξας ἕψει· ὅταν δὲ καὶ μετὰ βύτων αἴσῃ ἑψῇ, ἐξελὼν ἀπόψει τὸ ἔλαιον ψυχρὸν· εἶτα λαβὼν ἐκ τοῦ ἐλαίου εἰς λυτῆρα, ἀποχέει καὶ τῷ ναρκίσσου ὡς ὅτι πλεῖστον ἔμβαλε τὸ ἄνθος, θλίβει ἡμέρας β'. κινῶν, ὡς θλίβει τὸ σεσίνου, ἐξέπου τε καὶ μετὰ χλίζε πυκνῶς· καὶ γὰρ οὕτω σύπτεται ταχέως δὲ πρὸς τὰ ὑγρὰ μαλάσσει τε καὶ πρὸς αὐτὸν σκληρίας καὶ μώσεις· ἔστι δὲ κεφαλαλγής.

Περὶ κροκίνου σκευασίας. Κεφ. ξδ'.

Κρόκινον δὲ σκευάζων, προσχύσεις τὸ ἔλαιον, ὡς εἴρηται ὅτι τοῦ Σουσίνου,

Parisianus.
Corn. expungit
Deeſt in Ald. & v cod.
Par. περιπλοκαμον
V. τοῦ δ' αὐτοῦ
Vulg. cod ἢ μύρου ἢ ἄλλου ἀνάμεσα.
Ant. quidem ἄριστον. Hæc in Ald. deſiderantur: neque enim illum in vetuſto codice manuſcripto.
In Leonicenſi cod. ita principium legitur. Ναρκίσσινον δὲ σύφεται· ἔστι καλάμου πεπλυμμένου λίτρας ὀ. &c.
V. addit ἡμέρας
Cor. ἔπειτα τοῦ ἐλαίου
Al. περιπλέκων
V. θλασίνου σέσεως οὖν
Ald. & Pal. χύσας τὸ ἔλαιον ἐπὶ
Palim πλέον

πλήθει καὶ συσταθμίᾳ τῇ αὐτῇ· λαβὼν δὲ ὃν ἓξ ἐσυμμείνῃ ἐλαίῳ εἰς τὸ σύσιτον λί-
Ruell. legit ὑγιᾶ. V. πλωτάκιος
τρας τρεῖς ἥμισυ, βάλε χρόκου < ἡ. ἐν ἀ-
ναχύσει πολλάκις τὴν ἡμέρας, ποιοῦν ὅπου συ-
νεχῶς ὅλῃ ἡμέρας ἑ. τῇ δὲ ἕκτῃ * ἀπόχεε τὸ
ἔλαιον ἀπὸ τοῦ χρόκου καθαρίως, ᾧ δ' αὐ-
τῷ χρόκῳ ὅλῃ τὸ ἴσον πλῆθος τοῦ ἐλαίου
καὶ ἀναχύσει ἡμέρας * γ'. εἶτα ἀποχίας
παρόσμιξον σμύρνης κεκομμένης καὶ στεσ-
μένης < μ'. ἓ κίνει ὡς ὅλμῳ χρησίμως,
εἶτα ἀπόθου. ἔνιοι δὲ τὸ ἴσον εἰς κύπριον ἠ-
ρωματισμένου ἐλαίου καὶ εἰς τὸ κρόκινον
χρῶνται. ἔστι δὲ αὐτοῦ κράτιστον, τὸ καλλιχρόου
χρόκου πνέον, ὅπερ εἰς τὴν ἰατρικὴν χρῆσιν ἁρ-
V. τῶν σμύρνης παρεμφέρειαν, vt infra in cap. de commotione.
μοζεῖ. δεύτερον δὲ τὸ τῇ σμύρνῃ παρεμφέ-
ρον. Δύναμιν δὲ ἔχει θερμαντικὴν, ὑπνω-
V. τὸν ὕπνον ἐπάγει τὸ μύρον τὸ κύπριον καὶ τὸ κρόκινον καὶ τὸ σμυρνόχροον καὶ τὸ ἀπὸ τῆς μυξούσης ἀκακίας.
τικὴν, ὀθνεῖον πολλάκις ὅτε φρενιτικοῖς ἁρ-
μόζει καταβρεχόμενον, ἢ ἀποσφραιό-
μενον, ἢ ἐν τῇ μυξούσῃ ἀκακίᾳ χριόμενον·
ἔστι δὲ καὶ πυοποιόν, καὶ καθαρτικὸν ἑλκῶν,
καὶ πρὸς τὰ ἐν τῇ μήτρᾳ σκληρίας δὲ μύ-
σεις καὶ τὰ ὑπὸ αὐτῇ κακοήθη, σὺν κηρῷ καὶ D
χρίκῳ δὲ μυελῷ καὶ ἐλαίῳ διπλασίοις.
V. συμπίπτει δὲ καὶ μαλάσσει καὶ ὑγραίνει καὶ σηπεδόνι· ποιεῖ δὲ πρὸς τὰ ἀπολλυ-
κώσεις μετ' ὕδατος ὑπαλειφόμενον. ἀ-
ναλογεῖ δὲ αὐτῷ καὶ τὸ λεγόμενον ὑακίν-
θινον καὶ ὀυύχινον, δὲ στυράκινον, τοῖς ὀνόμα-
σι μόνον διαφέρουσα, τῇ μὲν τοι σκευασίᾳ
καὶ τῇ δυνάμει ὅτι παραπλήσια. E

Περὶ Κυπρίνου σύνθεσις καὶ σκευα-
σίας ἐλαίου. Κεφ. ξέ.

Ελαίου ὀμφακίνου πεπλυμμένου * μέρος
Vtrobique κεράμιον legendū existimant Cornarius. Valg. cod. aer.
ἕν, ὕδατος ὀμβρίου μέρος * ἓν καὶ ἥμισυ. τὸ
μὲν ἐπίχεε δὲ ἐλαίῳ, τὸ δὲ φύρα σὺν τοῖς ἐμ-
βληθησομένοις ἀρώμασιν εἶτα λαβὼν ἀ- F
σπαλάθου λίτρας ἑ, ἥμισυ. καλάμου λί-
τρας ς', ἥμισυ σμύρνης λίτραν ἀ. καρδα-
Corn. legit ixtias, & ex Ac.
μώμου λίτρας γ'. ὑσσίας θ'. ᾧ * ἐλαίου λί-
τρας θ', ὑσσίας ἑ. τὴν ἀσπάλαθον κόψας καὶ
Corn. addit ἐπὶ ἐλαίου ᾧ τὸν &c.
ῥίξας εἰς ὕδατι ἐμβρεχέω, ἕως μὴ δὲ ἐ-
λαίου, ἕως ἂν συναναζέσῃ τὴν δὲ σμύρ-
νην δεῖς οἴνῳ παλαιῷ θυώδει, καὶ κά-
λαμον κεκομμένον συναναφύρας μετὰ
τῆς σμύρνης, καὶ ἐξελὼν τοῦ ἀσπάλα-
θου, ἐμβάλε δὲ φύραμα τοῦ καλάμου.

dictum est, eadem seruata mensurę ponderisque æqualitate. Sumptis igitur olei ad Susinũ conficiendum spissati libris tribus & semisse, croci drachmas octo immittito, ac sępius quotidie versato, opere ad dies quinque continuato. Sexta demum die oleum purè probéque à croco sucçernito: eidémque croco parem B olei modum affundito, & triduo agitato. Deinde vbi refuderis, myrrhæ tusæ & cribratæ drachmas xl admisceto, ac in pila exactè mouето, tandémque recõdito. Nonnulli verò oleo ad cyprinũ conficiẽdum aromatibus imbuto, etiam ad crocinum vtuntur. Est porrò præstantissimũ, quod abundè crocum spirat, éstque id vsui medicinę aptum: proximũ verò quod myrrham redolet. Vim habet excalfaciendi somnúmque conciliandi: quò fit vt sępenumero phreneticis subueniat seu perfusum, seu olfactũ, seu denique naribus illitũ. Pus quoque mouet & vlcera purgat. Valet & ad veteri duritias, præclusiones malignáque vlcera, cũ cera, croco, medulla & oleo duplo. Concoquit enim, emollit, humectat ac etiamnum lenit. Facit & ad oculorũ glaucomata ex aqua sublitum. Huic autẽ proportione respondent butyrinum, onychinum & styracinum: quę quidem vnguenta nominibus tantùm differunt, præparádi verò modo ac viribus sunt per quàm simillima. E

De Cyprini olei spissamento ac præparatione. Cap. LXV.

Sumito olei omphacini eloti ceramium vnum, aquę pluuię tantundem cum semisse: huius partem vnam oleo affundito, alterã inijciendis aromatis admisceto. Dein assumptis aspalathi libris v cum semisse, calami libris vi & semisse, myrrhę libra vna, cardamomi libris iii & dodrante, helenij libris ix & quincunce, helenium & aspalathũ vbi cõtuderis & aqua maceraueris, oleo incoquito donec cõferuescát. G Calamum autem contusum simul cum myrrha vino vetere odorifero diluta subigito, exẽptóq; aspalatho calami misturam illam immittito.

Vbi

Vbi verò cum hac efferbuerit oleũ, amotum ab igne de aheno excolato, & ad cardamomum contusum aquáque reliqua subactum affundito, ac spatha perpetuò & sine intermissione donec refrixerit peragitato. Posteà percolato oleo in XLVIII libras olei, floris cypri libras XLVI & bessem inijcito, atque vbi macerari sueris, per fiscellam exprimito. Quòd si copiosius desideraueris, florum recentium par pondus immittito, ac similiter exprimito. Potes etiam iterum tertióve macerare, si volueris: efficacius enim hoc modo redditur. Eligi autem oportet bonum, quódque cum odoris gratia nares feriat. Sunt & qui cinnamomũ immisceant. Porrò vim habet calfaciendi, molliendi, osculáque vasorum aperiẽdi: atque adeò vuluæ neruorúmque vitijs conuenit: sic & pleuriticis & fracturis tũ per se, tum etiá cerato immistũ. Quin & in malagmata quæ opisthotonicis, angina laborantibus & inguinum inflammationi conueniunt, itémque in acopa additur.

Α ὅταν δὲ μετ' οὐ πολὺ ξέσῃ, καθαλὸν ἀπόθησον τῆς χαλκοῦ τὸ ἔλαιον· καὶ καθαρᾷ κατὰ τοῦ καρδαμώμου κεκομμένου καὶ πεφυρσμένου τῷ λοιπῷ ὕδατι, καὶ κίνει ἀσταλῆ ἕως αὖ ψυχῇ μὴ ἀφιστάμενον. εἶτα ἀπηθήσας τὸ ἔλαιον, ἔμβαλε εἰς ἓξ καὶ τ. τῷ ἐλαίου λίτρας αἴθυιος· κυπρίου

Corn legit μύ. Legendum ωῦ ου

Β λίτρας μς'. οὐγγίας ἡ. ἐάσας τι ἀποβραχιῶσαι, ἔξίπωσον ἀφὶ ἀσυρίδος. ἐὰν δὲ πλείω θέλῃς, τῆς παρῆ αἴθυιος τὸ ἴσον ἐμβαλὼν πλῆθος ὁμοίως ἔξίπου, ἐάν τε διθροῃ, ἐάν τι τείθροῃ· βουλῇ ποιῆν δυναμικώτερον γὰρ γίνεται. ἐκλέγεσθαι δὲ δεῖ τὸ χρηστὸν καὶ μάλ' ὀδωδίας πληκτικόν. ἔνιοι δὲ καὶ κιννάμωμον μίσγουσι.

V. ἰσθίει pro eodem.

Δυώαμιν δὲ ἔχει θερμαντικὴν, μαλακτικὴν, διαστομωτικὴν, ἁρμόζουσαν τοῖς ἕδραι μήτρᾳ τε καὶ νεύροις παθήσι, καὶ πλευριτικοῖς καὶ καταγμασι, καθ' ἑαυτό τε καὶ χρωτῇ μιγνύμενον. μίγνυται δὲ καὶ μαλάγμασι τοῖς ἁρμόζουσι, ὀπισθοτονικοῖς,

V. συναγχικοῖς idem βουβῶσι

C D συναγχικοῖς, βουβῶσιν φλεγμονῇ, καὶ ἀκόποις.

De Irini spissamento.
Cap. LXVI.

Spathæ seu elatæ quàm minutissimè contusæ libras VI cum besse in olei libris LXXIII & quincunce, ammixtis aquæ heminis decẽ, æreo vase coquito, quoad oleum odorem spathæ contraxerit: hoc postea in craterem melle oblitum excolato. Ex hoc ipso aromatis imbuto oleo primũ irinum temperatur, iride in oleo spissato, velut inferiùs scriptum est, macerata, vel hoc modo: In olei libris LXX & quincunce xylobalsami contusi, veluti dictum est, libras V & sextantem excoquito: postea detracto xylobalsamo calami contusi libras IX & dextantem, ac myrrhæ grumum vino vetere odorato perfusum adijcito. Postmodum assumptis olei spissati & aromatibus imbuti libris XIIII, iridis contusæ par pondus ad duos dies totidémque noctes in eo macerato: tandémque fortiter ac strenuè exprimito. Quòd si vis efficacius fieri, æquale pondus secundò ac tertiò

Περὶ ἰρίνου ἰείου. Κεφ. ξς'.

Σπάθης λίτρας ς'. οὐγγίας ἡ. ἐλαίου λίτρας ογ'. οὐγγίας ε'. κύλικας ὡς τεσσαράκοντα, μίξον ὕδατος κοτύλας ἑ. ἕψει ἐν χαλκῇ, ἕως μίζεις αὖθ' ὅτ' ὀσμὴν ἀναλάβῃ· εἶτα ἀπηθήσας εἰς κρατῆρα μέλιτι καταχρισμένον ἐκ τούτου δὲ ἀρωματισμένῳ ἐλαίῳ δ' φρῶτει ἶριν σκευάσῃς, ὀναπυρεχριθμὸς δ' ἐσυμμένου ἐλαίου ὅρεως ὡς ὑποστῆναι, ἢ ὕδατος ἐλαίου λίτρας ἑ. οὐγγίας ε. ξυλοβαλσάμου λίτρας ἑ. οὐγγίας β'. κύλικας ὡς εἴκοσι, σκεύασον εἶτα ἐξελὼν δ' ξυλοβάλσαμον, παρεσεμβαλὲ καλάμου κεκομμένου λίτρας θ'. οὐγγίας ἑ. σμύρνης χόνδρον οἶνῳ παλαιῷ ἐμβρέξαν δύο δ'. εἶτα λαβὼν ἐκ τοῦ ἐσυμμένου ἐλαίου ἢ ἀρωματισμένου λίτρας ιδ'. ὀναπυρεχθέντος κεκομμένης ἴσον τοῦ σταθμῷ, ἐῶν ἡμέρας β'. καὶ νύκτας β'. εἶτα ἐξίπου βιαίως καὶ νευικῶς. καὶ εἰ βούλει δυναμικώτερον εἶναι, ἴσον σταθμὸν καὶ δὶς καὶ τρὶς

Marcellus legit ς'.

V. ἀντὶ ἐλαίου

In quodam vetusto codice & apud Ruellium voces hæ desiderantur.

ὁμοίως ἐν ἀποβρέχων ἐλίπου. κρατίστου δὲ A
ἐστὶ τὸ ἐν ὀσφρητοῦ μηδενὸς ἄλλου,
μίνης δὲ τῆς ἴριδος ποιοῦσι. τοιοῦτον δέ
ἐστι τὸ ἐν Πέργῃ τῆς Παμφυλίας, καὶ
ἐν Ηλίδι τῆς Αχαίας * ἠρυσάλιφον.

Corn. Lu. Lo. nicerus ποιοῦσι retinet, & fuaui diendum putat ἐσπλῶ.

Δύναμιν δὲ ἔχει μαλακτικὴν, θερ-
μαντικήν. ἐξαίρει τε καὶ σπασθίνας ἐκ ῥυ-
πασείας αἰσχαλαίρει, καὶ τοῖς περὶ μή- B
τραν ἀλγοῦσιν ἁρμόζει, φλεγμονάς τε
καὶ μώσιν, ἔμβρυά τε ἐκβάλλει, καὶ αἱ-
μορροΐδας ἀναστομοῖ, πρός τε ἤχους ὠ-
τῶν σὺν ὄξει καὶ πηγάνῳ καὶ πικροῖς ἀ-
μυγδάλοις, καὶ πρὸς καταῤῥοὰς χρονί-
ζοντας, ἀλαχρειοῦται τοὺς μυξωτῆρας,
καὶ τοὺς ὀζαίνας· καταίρει δὲ καὶ τὴν κοι- C
λίαν, κυαθου πλῆθος πολύ. πρὸς εἰλεώδη,
κινεῖ καὶ οὖρα. καὶ ὅτι
τοὺς δυσχεροῦς ἐμοιῶσι, ἀλαχρειοῦται
τοὺς δακτύλους, ἢ τοὺς ἐμετηρίους, καὶ ἐ-
πὶ σπαργικῶν ἀλαχρειοῦται ἢ ἀναλαργαιζόλιθον σὺν μελικράτῳ, ἢ πρὸς
παχύτητα ἀρτηρίας. δίδοται καὶ τοῖς D
κώνειον ἢ μύκητας ἢ κόριον πεπωκόσιν.

similiter maceratum exprimito. Est verò longè optimum, quod nullius alius præterquam solius iridis qualitate odorarum atticit. Tale porrò est, quod in Perga Pamphyliæ & Elide Achaiæ præparatur. Vim habet emollientem & calfactoriam: crustas vlcerum, putredines ac sordes repurgat: vuluæ affectibus confert, nimirum eius inflammationibus atque præclusionibus: partus eijcit: hæmorrhoidas recludit, ad aurium sonitus ex aceto, ruta & amaris amygdalis prodest. Diuturnis etiam destillationibus, si nares eo illinantur, itémque contra ozænas auxiliatur. Aluum quoque purgat cyathi mensura potum. Facit & ad ilei cruciatus, vrinámque ciet. Ægrè vomentibus opitulatur, perunctis eo digitis, aliisve quæ ad vomitum ciendum ori induntur. Angina quoque laborantibus illinitur, aut ex aqua mulsa gargarizatur, vt & contra arteriæ asperitatem. Datur & ijs qui cicutam, fungos aut coriandrum hauserint.

Περὶ γλευκίνου σκευασίας. Κεφ. ξζ.

De Gleucini compositione. Cap. LXVII.

Γλεύκινον δὲ σκευάζεται ὁ ἁπλοῦς, ἔκ τε ἐλαίου ὀμφακίνου, καὶ σχοίνου, καὶ κρόκου, καὶ νάρδου Κελτικῆς, καὶ ἀσπάλα-
θου, καὶ ἄσπα λάξου, καὶ μελιλώτου, καὶ E
κόστου, καὶ γλυκέος συμπεπιεσμένων τῶν σμυρίνων τοῦ ἔγχλου ἀγλείῳ τὰ ἀ-
ρώματα καὶ οἶνον, καὶ ὃ ἔλαιον. κινεῖ-
ται δὲ ὅτι ἡμέρας λ'. δὶς τῆς ἡμέρας, καὶ μετὰ ταῦτα ἐκπιέζεται ἀποτίθεται.

Δύναμιν ἔχει θερμαντικὴν, μαλα-
κτικὴν, αἰσθητικήν· ποιεῖσθαι πρὸς τὰ ῥίγη F
καὶ τὰ νευρικὰ πάθη, καὶ τὰ ἐν ὑστέρᾳ. πάν-
τες δὲ ἀκόπου μᾶλλον ὠφελεῖ μαλακτι-
κόν ὄν.

Ραιφίκη Alexandrinè nostra

Γλεύκινον δὲ ἐν Κυζίκῳ κάλλιστον
γίνεται· σκευάζεται ὃ δεῖ τὸ ὀμφακίνον ἔ-
λαίον καὶ σχοινίνου, κυφοφοίνικος ξυλοβαλσά-
μου, σχοίνῳ, καὶ κρόκου, νάρδου, G
καρποβαλσάμου καὶ σμύρνης. ὃ δὲ πολυτελέστερον αὐτὸ ποιοῦντες, μίσγουσι καὶ κιννά-

Περὶ Αμαρακίνου. Κεφ. ξη.

De Amaracino. Cap. LXVIII.

Αμαράκινον δὲ ἐν Κυζίκῳ κάλλιστον γίνεται· σκευάζεται ὃ δεῖ τὸ ὀμφακίνον ἔ-
λαίου καὶ βαλανίνου, κυφοφοίνικος ξυλοβαλσά-
μου, σχοίνῳ, καὶ κρόκου, νάρδου, καρ-
ποβαλσάμου καὶ σμύρνης. ὃ δὲ πολυτελέστερον αὐτὸ ποιοῦντες, μίσγουσι καὶ κιννά-

Fit in Cyzico Amaracinũ probatissimum. Paratur autẽ ex oleis omphacino & balanino: quæ quidẽ xylobalsamo, σχοίνῳ & calamo spissata fuerint: suauiora verò reddita amaracco, costo, amomo, nardo, carpobalsamo & myrrha. Miscẽt & cinnamomũ qui sumptuosius ipsũ con-

vel, iuncto e-derato

Apud Gal. 7 ξ. γλεῦκος legitur συμπεπιεσμένων &c.

V μείζονος.

Ald. in nostra κρασία addit, cuius etiam meminit Plinius.

ficiunt. Assumuntur autem mel & vinum, tum ad vasorum illitionem, tum ad comminuta aromata subigenda. Porrò calfacit, soporem inducit, vasorum spiracula recludit, emollit, feruorem excitat, vrinam cit, putredinibus ac fistulis cõducit, necnon & aquosis ramicibus post curationem ope manus adhibitam. Crustas quoque ac efferata vlcera circumquaque rumpit. Vrinæ difficultati illita sede succurrit. Quin & huius ipsius inflammationibus & ad recludendas hæmorrhoidas itidem oblitum auxiliatur. Vrero appositum menses ciet, vuluę duritias & œdemata discutit, sauciatis denique neruis ac musculis confert, rarioribus lanæ hapsis eo irrigatis & impositis.

A μωμον. τὸ δὲ γλυκαίνεται δὲ μέλι καὶ οἶνος εἰς τὴν τῶν ἀγγείων χρίσιν, καὶ φύρεται τῶν κεκομμένων ἀρωμάτων. ἔστι δὲ θερμαντικὸν, καρωτικὸν, διαπνευστικὸν, μαλακτικὸν, πυρωτικὸν, οὐρητικὸν, βήχεται δὲ εἰς τε τὰς σπάσεις καὶ σύριγγας, καὶ V. ἰσπ.
ὑδρωπικὰς μετὰ τὰς χειρουργίας· περιῤῥήγνυταί τε τὰς ἑλκώσεις καὶ τὰ τεθηγειωμένα ἕλκη. τρώς τε δυσουρίαν ἁρμόζει τεθηγειομένου τὸ δάκτυλον· καὶ τοὺς τὰς φλεγμονὰς αὐτὸ, καὶ τὰς αἱμορροΐδων διαπνοὰς τεθηγειομένου· ἐμμηνά τε κινεῖ τεθηγειόμενον τῇ μήτρᾳ, καὶ σκληρίας καὶ οἰδήματα τὸ ὑστέρας διαφορεῖ. Ε
B τρὸς τὰ θυρόπτωσα καὶ μυόπτωσα συμφέρει τὸ πλήμασιν· ἐρεθισμοῖς βρεχόμενον καὶ ὕδατι πλυνόμενον. Pau. ἐκαύ:

De Megalio. Cap. LXIX.

Quondá factitabatur quod Megalium appellatur: at núc planè intercidit. Veruntamen ad historiæ complementum eius quoque meminisse non abs re fuerit. Huius igitur mistura cum amaracino eadem est, nisi quòd resina ampliùs accedit, qua quidem sola discrepat. Leniter emollit. Resina porrò neque conseruationis, neque voluptatis gratia, sed coloris crassamentíque causa vnguentis adijcitur. Miscetur autem terebinthina decocta, donec olere desinat. Eius verò coquendæ ratio in resinæ tractatione declarabitur.

Περὶ Μεγαλείου. Κεφ. ξθ'.

Τὸ δὲ Μεγαλεῖον καλούμενον, πάλαι μὲν ἐπετηδεύετο· ἐκλέλοιπε δὲ νεῦ. τρὸς ἀναπλήρωσιν δὲ καὶ τοῦτο ἱστορίας, οὐκ ἔστιν ἄτοπον· καὶ τοῦτο ἐπιμνησθῆναι. Ε τούτου D ἡ σκευασία ἡ αὐτὴ τῷ ἀμαρακίνῳ, πλεονάζει δὲ τῇ ῥητίνῃ, καὶ τούτῳ διαφέρει. ἔστι δὲ μαλακτικὸν ἁπίως. ἡ μέντοι ῥητίνη μίγνυται τοῖς μύροις, ὅτι φυλακῆς ἕνεκα τῆς ἡδονῆς χάριν, χρώματος δὲ καὶ πάχους ἕνεκα. Pauli cæt.
E μίγνυται δὲ ἡ τερεβινθίνη ἀφεψομένη, ἄχρις αὖ ἄοσμος γένηται. δηλωθήσεται δὲ ἐν τοῖς περὶ ῥητίνης ἡ ἕψησις αὐτῆς.

De Hedychroo. Cap. LXX.

Sed & quod Hedychroon cognominant, quódque in Co præparatur, easdẽ vires eundémque præparandi modum cum Amaracino F obtinet: at odoratius exístit.

Περὶ Ηδύχρου. Κεφ. ο'.

Καὶ τὸ καλούμενον ἡδύχρουν. σκευαζόμενον δὲ ἐν Κῷ, τῆς αὐτῆς ἔχεται δυναμεώς τε καὶ σκευασίας τῷ ἀμαρακίνῳ· διωδέστερον δὲ τυγχάνει. V. ἐν τῇ Αἰγύπτῳ

De Metopio. Cap. LXXI.

Præparatur & in Ægypto vnguẽtum, vernaculo nomine Metopium dictũ: scilicet propter galbani permistionem. Lignum enim è quo galbanum emanat, Metopion Ægyptijs appellatur. Ex oleo omphacino & amygdalarum amararum, cardamomo, schœno, calamo, melle, vino, myrrha, balsami

Περὶ Μετωπίου. Κεφ. οϛ.

Σκευάζεται δὲ καὶ ἐν Αἰγύπτῳ μύρον, ὃ τινες αὐτῶν καλούμενον μετώπιον, ἀπὸ τοῦ τὸ χαλβάνης μίξιν· ὃ γὰρ ξύλον ἐξ οὗ γίνεται ἡ χαλβάνη, μετώπιον καλεῖται. δι' ἀμυγδάλων δὲ πικρῶν καὶ ἐλαίου ὀμφακίνου καὶ καρδαμώμου, σχοίνου τε καὶ καλάμου καὶ μέλιτος καὶ οἴνου καὶ σμύρνης καὶ βαλσάμου V. ἐν αἰπὺ:

καρποῦ καὶ χαλβάνης καὶ ῥητίνης συντίθηται. δόκιμον δὲ ὅτι τὸ βαρύοσμον καὶ λιπαρὲν, ἀμφότερον μᾶλλον τοῦ καρδαμώμου καὶ τῆς σμύρνης, ἤπερ τῆς χαλβάνης· σφόδρα δὲ θερμαίνει καὶ πυρεῖ καὶ αἱαστομεῖ, ὀδιαπαῖ τε καὶ καθαίρει ἕλκη· πρὸς τε νεῦρα καὶ μύας ἀφαλοπίπτοντα ποιεῖ, ὑδροκήλας τε σὺν σπλάγχνοις μίγνυται δὲ καὶ μαλάγμασι καὶ κηρωτάις. πρὸς τε ῥίγη καὶ ὀπισθοτονικοὺς σπασμοὺς χρησιμεύει· κινεῖ δὲ καὶ ἱδρῶτας, καὶ αἱαστομεῖ τὰ κατὰ ὑστέρας, καὶ σκληρίας τοῦ κατὰ αὐτὴν χαλᾷ· καὶ καθόλου μαλακτικὴν ἔχει τὴν δύναμιν.

Vulg. cod. habet: Sed cum Cornario emendauimus ex Pal. cod. legimus & subintelligimus ἰμάλαξιν.

A semine, galbano & resina, componitur. Probatur quod grauiter olet ac pingue est, quódque cardamomum & myrrhā potiùs quàm galbanum resipit. Vehementer autem calfacit, adurit, ora vasorum aperit, attrahit, vlceráque expurgat. Ad neruos & musculos præcisos efficax est, itémq; ad aquosos ramices B septicis emplastris adhibitum. Malagmatis etiam ac ceratis inseritur. Rigoribus quoq; ac retrorsum curuato corpore conuulsis conducit. Ciet & sudores, atque vteri vasorū oscula referat, eiusdémque duritias laxat. Atque in vniuersum molliendi vi præditum est.

Plin. transliens

Περὶ Μενδησίου. Κεφ. οβ'.

Καὶ τὸ Μενδήσιον ὃ λεγόμενον, ἐκ τοῦ βαλανίνου ἐλαίου καὶ σμύρνης καὶ κασίας καὶ ῥητίνης σκευάζεται. ἔνιοι δὲ μετὰ τὴν καθ' ἕκαστα θυμιασιν, κιννάμωμον μικρὸν προστιθέασιν ἀωφελὲς· οὐκ ἐκδίδωσι γὰρ τὰ μὴ συνεψηθέντα τὴν δύναμιν. ἐμφερῆ δὲ ἔχει τὴν ἐνέργειαν τῷ μετωπίῳ, ἧττον μέντοι.

C *De Mendesio. Cap. LXXII.*

Quod Mendesium dicitur, ex balanino conflatur oleo, myrrha, cassia & resina. Nonnulli postquam alia singula certis ponderibus iniecerunt, cinnamomi exiguum insuper addunt, sed vtilitate nulla. Nec enim suas vires conferunt quæ non simul contrita fuerint. Cæterùm D similem Metopio vim obtinet, attamen inferiorem.

Symb. συνεψημένα

Περὶ Στακτῆς. Κεφ. ογ'.

Στακτὴ δὲ καλεῖται τῆς σμυρνοστάκτου σμύρνης τὸ λιπαρὸν, κεκμηκυίας μὲν ὕδατος ὀλίγου, ἀποτεθλιμμένου τε δι' ὀργάνου. θύωδης τε λίαν καὶ πολυτελής ἐστι· καὶ καθ' ἑαυτὴν δὲ οὐδὲν μύρον ὃ καλοῦμεν στακτή. δόκιμος δὲ ἐστιν ἡ ἀμιγὴς ἐλαίου, ἐν ἐλαχίστῳ πλείστην δυνάμιν κεκτημένη, οὐδὲν θερμαντικὴν, ἀναλογοῦσάν τῇ σμύρνῃ καὶ τοῖς θερμαίνουσι τὴν μύρων.

De Stacte. Cap. LXXIII.

Stacte verò vocatur pinguitudo recentis myrrhæ cum aqua pauca contusæ & organo expressæ. Ea per quàm odorata ac pretiosa est: quippe quæ vnguentum per se faciat, E quod stacte nominatur. Probatur quæ olei nihil admixtum habet, quæque vel minima quātitate vim maximam sortita est, nimirum calfactoriam, ac myrrhę vnguentísque calfacientibus proportione respondentem.

Περὶ κιναμώμου. Κεφ. οδ'.

Κιναμώμινον δὲ ἔκ τε ἐλαίου βαλανίνου καὶ ξυλοβαλσάμου, καλάμου, σχοίνου. ἥδυσμάτων δὲ κινναμώμου, βαλσάμου καρποῦ, σμύρνης τετραπλασίονος τοῦ δὲ κινναμώμου σκευάζεται. μίγνυται δὲ καὶ μέλι εἰς τὴν φύρσιν. δόκιμον δὲ ὅτι τὸ μὴ δριμὺ, μαλακὸν δὲ τῇ ὀσμῇ, καὶ παρεμφαῖνον σμύρνης, παχύ τε καὶ θύωδες, ἄγλυκυ δὲ τῇ γεύσει πικρόν. τὸ γὰρ τοιοῦτον οὐκ ἐκ ῥητίνης, ἀλλ' ἐκ σμύρνης ἔχει τὸ πάχος· ἡ γὰρ ῥητίνη

Deest in v. cod.

Part. τὸ δριμὺ. Sed negationem hic quoque addunt Marcellus Virgilius & Ruellius. Lacuna legit Κίνναμον δὲ ὃν τὸ δριμὺ μὴ ἔχῃ τῇ ὀσμῇ &c. Vbi dicit ὀσμῇ, τὴν γεύσει πικρόν.

De Cinnamomino. Cap. LXXIIII.

F Cinnamominum ex oleo cōstat balanino, & xylobalsami, calami ac schœni spissamētis: cinnamomi verò, balsami seminum & quadruplæ ad cinnamonū myrrhæ odoramentis. Quin & ad ea ipsa subigenda mel adijcitur. Probatur minime acre, molli odore, myrrhæ quiddam G referēs: quippe quod crassū sit & odoratū, ac gustu perquā amaro. Tale enim nō a resina, sed myrrha crassitudinem obtinet: quin neque resina

amaritudinem, neque odoris gratiam addit. Vim habet admodũ acrem, calfacientem & amaram. Proinde ora venarum calfaciendo aperit: humores quoque ac flatus discutit, diffundit & attrahit, sed caput aggrauat. Facit & ad vuluæ vitia cũ oleo duplo, cera & medulla: sic enim de acrimonia sua multũ amittit, emolliẽdique vim ascisc it. Nam alioqui comburit, ac prę cęteris crassis vnguentis vehementissimè indurat. Ad fistulas etiá ac putredines euidẽter est efficax: itémque ad aquosos ramices, carbunculos & gangrẽnas cum cardamomo. Quin & ad rigores circuitu redeũtes, tremores ac virulentarum bestiarũ morsus illinitur: scorpionum verò ictibus phalangiorúmq; morsibus cum tritis grossis imponitur.

A οὐ παρασίδωσι πικρίαν, οὐδὲ θύωδίαν.

Δυνάμιν ἔχει σφόδρα δριμέα καὶ θερμαντικὴν καὶ πικράν. διαπνοῆι γὰρ θερμαίνουσα καὶ διαφορεῖ, καὶ διαχεῖ καὶ ἐπισπᾶται τὰ ὑγρά, καὶ πνεύματα. ἔστι δὲ καὶ ἀποσηπτικὸν πρὸς τὰ ἕλκη μιγὲν μετὰ ἐλαίου διπλασίου καὶ κηροῦ καὶ μυελοῦ.

B ὅταν γὰρ ἀποβάλῃ τὸ πολὺ τῆς δριμύτητος, καὶ λίπῃ μαλακτικόν. διόπερ καὶ συλλαμβάνει καὶ σκληρυνθέντα βιαίως πρόπτωσιν τῶν παχέων μύρων. πρὸς καὶ πρὸς σύριγγας καὶ σήψεις σὺν ἀρωματικοῖς καὶ ὑδροκήλας καὶ αἴθρακας καὶ γαγγραίνας σὺν καρδαμώμῳ. πρὸς τε ῥίγη τὰ περιοδικὰ καὶ

C πρὸς θῆρας, καὶ οἷς ἀπὸ τῶν ἰοβόλων θηρίων δακνομένοις ἐν συγχρίσματι, ὀπόθημά τι σκορπιοπλήκτοις καὶ φαλαγγιοδήκτοις σὺν ὀλυρίνοις πεπατριμμένοις.

Hæc vox deest in v. cod.

Al. σὺν ὀλυρίνοις. Sic habent & Ruellii codex. Sed vulg. exempl. carent.

Περὶ Ναρδίνου μύρου. Κεφ. ος.

Νάρδινον μύρον ποικίλως σκευάζεται δι' ἀλλοτρίων μαλαβαθρίνου φύλλου, καὶ δι' ἄλλων τοιούτων ὡς τὸ πολὺ δὲ μίγνυται τῷ βαλανίνῳ ἐλαίῳ, ἢ ὀμφακίνῳ, πρὸς μὲν τὴν ἀρχὴν τῆς ἐλαίου χρῖσιν· πρὸς δὲ τὴν θύωδίαν κόσσον, ἄμωμον, νάρδον, σμύρναν, βάλσαμον. ἔστι δὲ χρῆσις ἡ λεπτή, μὴ δριμεῖα, ἔχουσα τὴν εὐωδίαν τῆς ξηρᾶς νάρδου ἢ ἀμώμου. Δυνάμεις δὲ αὐτῇ λεπτομερικὴ, δριμεῖα, σηπτική, ἀραιωτικὴ ὑγρῶν, θερμαντική. ὀγρὰ δέ ἐστι καὶ οὐγλοιώδης, ἐὰν μὴ ῥητίνην ἔχῃ. σκευάζεται δὲ καὶ λιπὶ δι' ὀμφακίνου ἐλαίου καὶ χρίσμου καὶ καλάμου, καὶ κόστου, καὶ νάρδου.

D

V. μύρου

V. μύρῳ Sed minus recte.

In vet. cod. non legitur. Codex Marcellæ tamen

Περὶ Μαλαβαθρίνου. Κεφ. οϛ'.

F Τὸ δὲ μαλαβάθρινον, ἔχει μὲν σύμμετρα ἃ καὶ ἡ νάρδος, σμύρνης δὲ πλέον· διὸ καὶ γίνεται θερμαντικὸν, ἀναλογεῖ δὲ χροκίνῳ καὶ ἀμαρακίνῳ τινὸ δυνάμει.

Περὶ Σμύρνης. Κεφ. οζ'.

G Σμύρνα δάκρυόν ἐστι δένδρου θηνωμένου ἐν Ἀραβίᾳ, ὅμοιον τῇ Αἰγυπτιακῇ ἀκάνθῃ· ὃ ἐκκοπομένου ὁποῤῥεῖ τὸ δάκρυον εἰς ὑποστρωμνίας ψιάθους· τὸ δὲ, ὅτι τοῦ ξύλου ἐκπήγνυται.

Sunt qui hoc loco de Iasmelaeo caput intersecunt, totidẽ ferè verbis ex Aldina transcriptum. In Florentino certè quidẽ codice inferiũ reperitur. Nos Aldinũ codicem secuti ad notha relegauimus V. caret.

Myrrha lachryma est arboris nascentis in Arabia, Ægyptiacæ spinæ similis: qua quidem incisa lachryma in substratas tegetes destillat, pars verò circa caudicem ipsum concrescit.

De Nardino vnguento. Cap. LXXV.

Nardinum vnguentum variè addito malabathri folio, aut sine eo, præparatur. Vtplurimum autem balanino oleo aut omphacino spissandi quidem gratia iuncus odoratus admiscetur: ad odoris verò gratiam conciliandá, costus, amomum, nardum, myrrha, balsamum. Laudatur tenue, minimè acre, nardi aridæ aut amomi odorem retinens. Vis ei extenuás, acris ac detergẽs: nec non & humores rarefaciendi & excalfaciendi vi pollet. Liquidum vero est, nec habet strigmenti crassitudinem, nisi resinam recipiat. Conficitur quoque vilius ex omphacino oleo, iuncо, calamo, costo atque nardo.

De Malabathrino. Cap. LXXVI.

Malabathrinum seu foliatũ eadẽ habet quæ nardinum spissamenta, myrrhæ autem plusculum additur: qua de causa calfacit, crocino aut amaracino viribus respondens.

De Myrrha. Cap. LXXVII.

καὶ λέγεται αὐτῆς ἡ μὲν τις πεδιάσιμος λιπαρά, ἧς πιεζομένης, ἡ σακὴ λαμβάνεται· ἡ δέ τις γαβιρέα λιπαρωτάτη, ἐν βωλείοις καὶ λιπαροῖς τόποις γινομένη, ἣ καὶ πολλὴν ἀνίησι τὴν σακήν. πρωτεύει δὲ ἡ Τρωγλοδυτικὴ καλουμένη ἀπὸ τῆς γινομένης αὐτῆς χώρας, ὑπόχλωρος καὶ δακνώδης οὖσα, διαυγὴς συλλέγεται· δέ τις καὶ λεπτὴ μὴ ἡ Τρωγλοδυτικὴ ἀριθμουμένη, ἐνάπαλλος ἴσα ὡς τὸ βδέλλιον, ὀσμὴν ἀποφέρουσα τὴν ὁσμήν, ἐν βωλείοις τόποις γινομένη. ἡ δὲ ὃις καυσαλὶς λεγομένη, ὑπόξηρος, μέλαινα, κάπηλος. ἡ δὲ χείστη σὺν ἁπάσαις ἐργασίμου καλεῖται, ἀφαρὰ καὶ ἀλιπὴς, ὁμιμφα, κομμίζουσα τὴν ὄψιν καὶ τὴν δυνάμιν· καὶ ἡ ἀμινναία δὲ καλουμένη, ἀποδόκιμος. καὶ πεπαμένα ἐστὶ ἐξ αὐτῶν γένη· ἀπὸ μὲν τῶν λιπαρῶν βώλων καὶ λιπαρά· ἀπὸ δὲ τῶν ξηρῶν ἀλιπῆ καὶ οὐκ εὐώδη, ἅτινα διὰ τὸ μὴ προσλιφέναι ἔλαιον εἰς τὸ ἄνω πλασιν. δολίζεται δὲ κόμμι βραχὺ σμύρνης ἀποβρεχμαλῆ καὶ μιγνυμένῳ. ἐκλέγου δὲ τὴν νέαν, ἁβρὰν, κοίφην, ὁμόχρων πεφυκυῖαν, καὶ τὰ εἴδωλα θλασθῆναι εὐόδως λευκὰς, ὀυχ ἑδρεῖς ἔχουσι διαφύσεις, λείας, μικροβώλους τε, πικρὰς, εὐώδεις, ὁριμφας, θερμαντικὴν· ἡ δὲ βαρεῖα καὶ τῇ χροᾷ παχώδης, ἐστὶν ἄχρηστος. Δύναμιν δὲ ἔχει θερμαντικὴν, διαφερετικὴν ῥευμάτων καθαρωτικὴν, κολλητικὴν, ξηραντικὴν, συμπεπτικὴν μαλάττει δὲ καὶ μήτρας μεμυκυῖαν καὶ ἀνατομὴν ἀγει· καὶ ἔμμηνα καὶ ἔμβρυα συνέλκουσα, σὺν ἀψινθίῳ ἡ σμύρνη ἀποβρεχμαλῆ, ἢ πηγάνου χυλῷ προσιθεῖσα. λαμβανέσθω δὲ ὠὸν καὶ κοτυλὴ μέλιτος κυάμου, πρὸς ὄγκα χρόνιον καὶ ὀρθόπνοιαν, καὶ πλευρᾶς πόνον καὶ θώρακος, λύουσι τὸ κοιλίας καὶ δυσεντερίας. λεῖα δὲ καὶ ῥίγη, βοηθεῖ τὰ τριταῖα πρὸ δύο ὡρῶν τῆς ἐπιβολῆς μετὰ πεπέρεως καὶ ὕδατος τὸ μέγεθος κυάμου πολλοῖσι, ἀρτηρίας τε βαχύτητα καὶ δασυσμοὺς φωνῆς ἀποκαθίστησιν ὑπολαμβάνουσα τῇ γλώττῃ καὶ ἀποχυλίζουσιν κτείνει δὲ καὶ ἕλμινθας, καὶ πρὸς δυσωδίαν στόματος ἁρμοστάτη· πρὸς δὲ μαλακῶν πόνους μετὰ συμπεπτικῆς ὑγρᾶς διαχρίει· σὺν οἴνῳ δὲ καὶ

Ac myrrha quidē quædam pediasimos, quasi campestris, appellatur, pinguis, qua expressa stacte excipitur. Alia vero Gabirea læto ac pingui solo prouenies, quæ multam quoque stactem fudat. Primas verò tenet quæ Troglodytica cognominatur a loco in quo gignitur, subuti- fortè pellu- cens dis ea quidem, mordax atque pellucida. Colligitur etiamnum tenuis quædam, quæ à Troglodytica secunda est, bdellij modo lentescens, odore quodammodo viroso, locis nascens apricis. Alia Caucalis dicitur, exoleta, nigra & retorrida. Omnium deterrima quæ Ergasima nominatur, quippe quæ sit squalore obsita, acris ac minimè pinguis, & aspectu viribusque gummi referat. Improbatur etia quæ Aminea nominatur. Ex ijs porro expressiones fiunt: e pinguibus quidem odoratæ ac pingues: è siccis vero, haud quaquá pingues, nec odoratæ, inualidæ: propterea quòd oleum dum conformarentur asciuerint. Adulteratur gummi macerato aqua in qua myrrha maduerit ac permisto.

Eligito recentem, friabilē, leuem, vndiquaque concolorem, quæque confracta intercurrentes lineas intrinsecus habeat cādidas, vnguium speciem præ se ferentes ac læues, quæque insuper minutis sit glebis, amara, odorata & acris. Ponderosa autem & quæ picei coloris est, inutilis censetur. Vim habet cultaciendi, fluxiones sistendi, soporem inducendi, glutinandi, siccandi & astringendi. Emollit etiam præclusam vuluam & aperit. Mentes & partus celeriter extrahit, cum absinthij vel lupinorum diluto aut rutæ succo admota. Deglutitur verò catapotij instar ad molē fabæ contra diuturnā tussim, orthopnœam, lateris ac thoracis dolorē, alui profluuium atque dysenteriam. Rigores quoque, maximéque quartanarios, discutit horis ante accessionē duabus, cū pipere & aqua fabæ magnitudine pota. Subdita linguæ liquatáque arteriæ asperitatē ac vocis raucitatem emendat. Quin & lumbricos enecat, & ad oris graueolentiam commanducatur. Aduersus alarum tædia cum alumine liquido illinitur: cum vino verò &

Mare & Corn. Vt videtur Plinij sententiæ.
V. ὠμὴ μωρία
V. ὁμιμφα
Corn. μυπῆρα
Sic Corn. et Par. habent
V. Interserit ὡς
Al. ὑφαρὰ
Addunt Ald. & v. cod. καὶ Cornarius reducit ad Par. ἀσχιὰν
Vulg. exempl. non habent.
Forte ἀψινθίου
V. addit ἡ πεπαντικὴ ἀντὶ τοῦ βδελλίου
Vulg. exempl. carent.

oleo colluta dentes ac gingiuas ſtabilit. Inſperſa quoque capitis vulnera glutinat. Fractis auribus nudatiſque oſſibus cum cochleæ carne peruncta medetur. Itémque purulétis auribus, nec non & inflammatis, cum meconio, caſtorio & glaucio. Ad varos autem cum caſſia & melle illinitur. Impetigines ex aceto detergit: defluétes capillos cum ladano vino & myrtino oleo firmat. Diuturnas etiam defluxiones compeſcit, ſi narium pinnæ illinatur. Oculorum vlcera complet, exteritque albugines & ea quæ pupillis tenebras offundunt: quin & ſcabritias ſeu aſperitudines expolit. Fit & ex ea quemadmodum è thure fuligo, veluti poſtea oſtendimus, ad eadem efficax.

A ἐλαίῳ ἀφαλυζομένη, ὀδόντας καὶ οὐλὰς κρατύνει· κολλᾷ δὲ καὶ τὰ ἐν τῇ κεφαλῇ
B τραύματα ἐπιπαττομένη, ἕλκη τιθηλᾶται· ἕλκεα ὦτα καὶ ἐφιλωμένα ὅσα ἰᾶται σὺν κοχλίᾳ ἕρπι ὀπὶ χριόμενη, καὶ τὰ πυορροοῦντα τῶν ὤτων καὶ φλεγμήνοντα, σὺν μήκωνι καὶ καστορίῳ καὶ γλαυκίῳ· ῥοὰς ἰόνθους μετ' ἀλφίτων καὶ μέλιτος ὑπαγρίεται, λέχηνας τε ἀποσμήχει σὺν ὄξει, καὶ ῥῖνας ῥεούσας μετ' ἀδάνου καὶ οἴνου καὶ μυρσινίνου καταχριόμενον ῥώννυσι· ταραίνει δὲ καὶ τὸν χροιοὺς καὶ τὰ ῥέοντα διαχριόμενον περὶ τὸν μυξωτῆρα· πληροῖ καὶ τὰ ἐν ὀφθαλμοῖς ἕλκη, καὶ παύει τὰ λευκώματα καὶ τὰ ὑπεσχισμένα τῶν κόρης, καὶ τραχώματα σμήχει. γίνεται δὲ καὶ λιγνὺς ἐξ αὐτῆς ὁμοίως τῇ ἐκ τοῦ λιβανωτοῦ, ὡς ὑποδείξομεν, ἁρμόζουσα πρὸς τὰ αὐτά.

Cornel. de χιονιον

De Bœotica myrrha. Cap. LXXVIII.

Bœotica verò myrrha ex arbore quadam in Bœotia naſcente ſtillat, inciſa radice: eligito quæ myrrham odoris ſuauitate repreſentet. Calfaciendi, molliendi, diffundendique vi pollet. Vtiliter quoque ſuffimentis inſeritur.

Περὶ Βοιωτικῆς σμύρνης. Κεφ. οη.

Ἡ δὲ Βοιωτικὴ σμύρνα, ἔστι δένδρου τινὸς ἐν Βοιωτίᾳ γινομένου ῥίζα τετμημένη. ἐκλέγου δὲ τὴν ἐμφερῆ σμύρνῃ τῇ βοώδει. Διαπαντὸς δὲ ἔχει θερμαντικὴν, μαλακτικὴν, ἀφαλυντικήν. μίγνυται δὲ καὶ θυμιάμασι χρησίμως.

D

Corn. ex Gal. διαπονεῖται ἐφ' & Paulus & Oribas.

De Styrace. Cap. LXXIX.

STYRAX lachryma eſt arboris cuiuſdam coronææ malo ſimilis. Præfertur flauus ac pinguis, reſinoſus, albicantibus grumis, quàm diutiſſimè in ſua odoris gratia permanens, quique dum mollitur ſubigiturve melleam quandam humiditatè ex ſe remittit. Talis eſt Gabalites, itémque Piſſidiacus atque Cilicius. Deterior niger, friabilis ac furfuroſus. Inuenitur & lachryma gummi ſimilis, tranſlucida, myrrhæ æmula: verum hæc perpauca naſcitur. Adulteratur porro arboris ipſius ſcobe, quæ vermiculorũ eroſione facta fuerit, admiſto melle ac iridis craſſamento & quibuſdam alijs. Nonnulli quoque ceram aut ſebum aromatis imbutum ad Solem acerrimum vnà cum ſtyrace ſubigunt, & per colum latis foraminibus peruium in aquam frigidá quaſi vermiculos effingentes exprimũt & vænundant. Styracem hunc ideò Scolecitem quaſi vermiculatũ cognominãt: atque imperiti tanquam

Κεφ. οθ'.

ΣΤΥΡΑΞ δάκρυόν ἐστι δένδρου τινὸς ὁμοίου κυδωνίᾳ. διαφέρῃ δ' αὐτῆς ὁ ξανθὸς καὶ λιπαρὸς, ῥητινώδης, θρόμβους ἔχων ὑπολεύκους, ὅτι διαμένων τὸν βόωδια ὡς ὀπιπλῆσαι, καὶ ἐν ᾧ μαλαπάσῃ ἔνεις ὑγρασίαν τινὰ μελιτώδη. ἔστιν δὲ ὅ τε Καβαλίτης καὶ Πισιδιακὸς καὶ Κιλικικός. φαῦλος δ' ὁ μέλας καὶ ψαθυρὸς, καὶ πτυρώδης. εὑρίσκεται δ' καὶ δάκρυον κόμμι ἐοικὸς, διαυγὲς, σμυρνίζον· ὀλίγον δ' ἔστι τοῦτο γινόμενον. δολίζουσι δ' αὐτὸ οἱ ἐκ τοῦ δένδρου τρίσμασιν ἄνθρ ὑπὸ τῶν σκωλήκων ἀναλισκόμενα, μιγνύμενα καὶ μέλιτι καὶ ἴριος ὑποσταθμῇ, καὶ ἄλλοις τισίν. εἴναι δὲ κηρὸν ἢ σέβας ἀρωματίσαντες· συμμαλάσσουσιν ἐν τοῖς ὀξυτάτοις ἡλίοις τῷ ξύσματι, καὶ διὰ κόσκινου βύρσης τοῦ ἡλίβουσιν εἰς ὕδωρ ψυχρὸν, ποιοῦντες σκώληκια, καὶ παλεύοντα σκωληκίτιδα ὀνομάζοντες. ἐγκρίνουσι δὲ οἱ ἀπὸ τῆς

Cornel. διαχιονιον

Alij σμυρνίζον. & in quoque Plinius legiſſe videtur.

V. ἰσχάδι

V. σκωληκίτιδα ὀνομάζοντες

V. addit ξύσματι

τοῦτον ὡς ἀκέραιον, ὃ προσέχοντες τῇ κρᾶ τὴν ὀσμὴν βδτονίαν· δριμὺς γὰρ λίαν ὅστις ὁ ἄδολος. Δύναμιν δὲ ἔχει θερμαντικήν, μαλακτικήν, πεπτικήν· ποιεῖ πρὸς βῆχας καὶ καταῤῥους, κορύζας, βραγχους, ἀποκοπὴν φωνῆς· ἁρμόζει καὶ πρὸς ἕλκη ἐν ὑγιάσμασι καὶ σηπεδόσι· ἐμπλᾶται τε ἄμα πυόμασι καὶ προσθήμασι, χιλίαις τε χύφωσι μαλάττει καταπάσμασι ὀλίγοις μετὰ ῥητίνης τερεβινθίνης· μίγνυται δὲ καὶ μαλάγμασι διαφορητικοῖς καὶ ἀκόποις χρησίμοις. καίεται δὲ καὶ ὀπᾶται καὶ φύγου δὲ καὶ αἰθαλοῦται ὡς λίβανος· ἁρμόζει τε ἡ αἰθάλη πρὸς ἃ καὶ ἡ τοῦ λιβανίου. ὃ δὲ ἕξει αὐτὸ σκευαζόμενον χρίσμα ἐν τῇ Συρίᾳ συρίκινον, θερμαίνει καὶ μαλάττει ἰσχυρῶς· κεφαλαλγίας μέντοι καὶ βαρυηκοΐας καταλυτικὸν καθίστησι.

A sincerum admittũt, non attendentes ad insignem odoris vehementiam. Est enim admodum acris qui fraudis expers est. Vim habet calfactoriam, emollientem & concoctoriam. Medetur tussi, destillationibus, grauedinibus, raucitatibus & vocis interceptioni: vuluæ quoque præclusæ duritiáque laboranti conB uenit. Cit mẽses potu appositúque, & aluum leuiter mollit, si exiguum cum resina terebinthina deglutiatur. Vtiliter etiam malagmatis discutientibus & acopis admiscetur. Vritur autem, assatur torretúrve: atque ex eo, quemadmodũ & è thure, fuligo colligitur: quæ quidem ad eadẽ, ad quæ thuris fuligo accomC modatur. Styracinũ vero vnguentum quod ex eo in Syria concinnatur, calfacit ac potenter emollit: verùm capitis doloré grauitatémque ac soporem conciliat.

Περὶ Βδελλίου. Κεφ. ϖ.

De Bdellio. Cap. LXXX.

V. μαδέλκιον

V. βολχὸν

Orib. ἀφαίσιμον. M. rc συνδεδεμένον ἐν ἀφεδίῳ. Hermolaus συμβεβυσσωμένον. Addit Ald. τῇ χειρί

V. ἀπὸ δὲ τῆς Πέτρας, ξηρὸν, ῥητινῶδες, ὑποπάλιον, δὲ τερεῦον τῇ δυνάμει.

V. μαδέλκιον, μολόκιον, ἀφόβολον quidam vetus codex exacte ita nuncupatum habet

Al. καὶ

V. τῇ χρόᾳ

BΔΕΛΛΙΟΝ δέ τινες μάδελκον, οἱ δὲ βολχὸν καλοῦσι· δάκρυον ἐστὶ δένδρου Σαρακηνικοῦ. δόκιμον δέ ἐστιν αὐτῶ τὸ τῇ γεύσει πικρὸν, διαυγὲς, ταυροκολλῶδες, λιπαρὸν ἁπτόμενον βάδην καὶ βιμάλακτον, ἀμιγὲς ξύλων καὶ ῥυπαρείας, βυώδες ἐν τῇ θυμιάσει, ἑωσικὸς ὄνυξ. ἔστι δὲ καὶ ἕτερον ῥυπαρὸν καὶ μέλαν, ἀδρόβωλον, παλαιῶδες, καμιζόμενον ἀπὸ τῆς Ἰνδικῆς. φέρεται δὲ ἀπὸ τῆς Πέτρας, ξηρὸν, ῥητινῶδες, ὑποπάλιον, δὲ τερεῦον τῇ δυνάμει. δολοῦται δὲ μιγνυμένου κόμμεος. ὃ μὲν οὖν παλαιὸν οὐχ ὁμοίως πικραίνει τὸν γεῦσιν, ἔν τε τῇ ἐκθυμιάσει οὐχ οὕτως βυώδες ἐστί. Δύναμιν δὲ ἔχει θερμαντικὴν, μαλακτικὴν, διαλυτικὴν σκληρῶν καὶ βεγγχικῶν, καὶ ὑδρωπικῶν, σὺν ὄλυρᾳ ἀσίτου· αἱσταμοῖ δὲ τὴν μήτραν προσθήμασιν καὶ ὑποθυμιώμενον ὠφέλησε μὲν καὶ τὰ ἔμβρυα καὶ πᾶσαν ὑγρασίαν· θρύπτει δὲ καὶ λίθους πινόμενον, καὶ οὖρα ἄγει. βηχικοῖς τε καὶ θηριοδήκτοις ὠφελίμως δίδοται· ἀγαθὸν δὲ καὶ πρὸς ῥήγματα, ἀπάσματα, καὶ πλευρᾶς πόνοι καὶ διαῤῥοιὰς πνευμάτων· μίσγεται δὲ καὶ μαλάγμασι τοῖς ἁρμόζουσι πρὸς τὰς σπληνας καὶ δίσεις τῶν νεύρων.

Ald. πίνον

V. μίγνυται

V. ἢ Mox: Ald. πλείστον καταχρίζειν συνδήμασιν

BDELLIVM nonnulli madelcum, alij bolchum appellant. D Lachryma est arboris Sarracenicæ. Probatur gustu amarum, translucidum, taurino glutini simile, pingue intima parte & facilè molliscens, lignorum ac sordium expers, in suffitione vnguis odorati in modum odoratum. Est & alterum sordidum ac nigrum, grádioribus glebis, in offas conuolutum, quod quiE dem ex India aduehitur. Defertur etiam à Petra oppido siccum, resinosum, subliuidum, sed facultate secundum. Adulteratur admixto gummi: verùm ita vitiatum non perinde gustui amaritudinem repræsentat, neque vsqueadeò suffitionibus odoratum est. Vim porrò obtinet calfaciendi, molliendi, F discutiendi duritias, turgescentia guttura, & aquosas hernias, ieiuni saliua dilutum. Tum appositu, tum etiam suffitu vuluæ spiracula laxat, & partus humiditatémque omnẽ extrahit. Calculos potu cõminuit, & vrinas ducit. Tussientibus & ijs qui à virulentis bestijs demorsi fuG rint, vtiliter exhibetur. Valet quoq; ad rupta, conuulsa, lateris doloré & vagos ac discurrentes flatus. Inseritur & malagmatis quæ ad duritias & nodos neruorum conueniunt.

Contusum verò subigitur affuso vino aut aqua calida.

De Thure. Cap. LXXXI.

THvs in ea quidem Arabia gignitur, quæ thurifera cognominatur. At primas tenet masculum stagonias appellatum, naturæ sponte rotundum. Tale autem minimè sectum est, candidumque visitur, & cùm frangitur intrinsecus pingue, cúmque adoletur, statim ardet. Indicum verò subfuluum est & liuido colore, sed rotundum etiam arte & industria factitatur. Nam in quadrangulares formas dissectum fictilibus tandiu versant atque volutát, donec formam rotundam contraxerit. Verùm huiusmodi thus tempore flauescit, atomúmq; aut syagrium appellatur. Secundũ locum tenet orobium, quódque in Amelo nascitur. Id nonnulli copiscum nominant, & minus ac fuluius existit. Est & genus quoddá cui amomitæ cognomen, quódque cætera candidum quidem est, at dum mollitur subigitúrve, mastiches more digitis cedit. Adulteratur porrò thus omne pinea resina & gummi artificiosè tractatum. Sed maleficium facilè deprehenditur. Siquidem incensum gummi flamınam nó concipit: resina in fumũ vanescit, thus verò exardescit. Eiusmodi præterea fraudem & odor ipse prodit.

Calfaciendi astringendiq; vi pollet, nec non & ea exterẽdi quæ pupillis caliginem offundũt. Caua vlcera implet & ad cicatricem perducit. Cruẽta vulnera glutinat: sanguinis eruptionem omnem cohibet, ac eam etiam ipsam quæ fit è meningibus. Cum lacte tritum & linamento exceptum sedis ac reliquarũ partium maligna vlcera mitigat. Myrmecia inter initia impetiginésque ex aceto & pice illitum tollit. Quin & igni ambusta vlcera pernionésque cum adipe suillo aut anserino sanat. Vlcera verò capitis manantia cum nitro affrictum percurat. Paronychijs cum melle, & contusis auribus cum pice medetur. Ad reliquos autem aurium dolores cum vino dulci vtiliter infunditur. Peructum quoque cum cimolia & rosaceo mammis confert

Περὶ Λιβάνου. Κεφ. πά.

ΛΙΒΑΝΟΣ γινᾶται μὲν ἐν Ἀραβίᾳ τῇ λιβανοφόρῳ καλουμένῃ, σαφωτάτη δ' ὁ ἄρρην καλούμενος σταγονίας, στρογγύλος φυσικῶς. ἔστι δὲ ὁ ἰσιώδης ἄτομος, λευκός τε καὶ θλασθεὶς ἔνδοθεν λιπαρός, ὀσφραμιαῖός τε ταχέως ἐκκαιόμενος. ὁ δὲ ἰνδικὸς ὑποκίρρος τε ὄζει, καὶ πέλιος τὴν χρόαν. γίνεται δ' ἐν τῇ τετάρτῃ ὀπτήδεσιν στρογγύλος· τίμνονται γὰρ αὐτὸν εἰς τετράγωνα σχήματα ἐν ξυλίνοις εἰς κεφάλαια, κυλίνδουν ἕως ἂν ἀπολάβοι τὸ στρογγύλον σχῆμα· γίνεται δὲ ὁ ἰσιώδης ξανθότατος, ἄτομος ἢ σύαγρος καλούμενος. διαφέρει δὲ ὁ Ἀραβίας καὶ ὁ σὺ Ἀμώλῳ, ὃν ἔνιοι κοπίσχον καλοῦσι, μικρότητι καὶ κιρρότερον ὄντα. λέγεται δέ τις καὶ ἀμωμίτης, ἄλλως μὲν λευκός· τὸ δὲ τῷ μαλάττεσθαι σιδηδὼς ὡς μαστίχη. δολοῦται δὲ πᾶς λίβανος τῇ πιτυίνῃ ῥητίνῃ μεμαδδώμενος, καὶ κόμμι· εὔκαυτος δέ ἐστιν ἡ ἀληθινή. τὸ μὲν γὰρ κόμμι σὺν ἐκφλογοῦται θυμιώμενον, ἡ δὲ ῥητίνη εἰς καπνὸν ἐκτυφοῦται· ὁ δὲ λιβανωτὸς ἐξαπίεται. δηλοῖ δὲ καὶ ἡ ὀσμὴ τὸ ἰσιοῦν. δύναται δὲ τὰ θερμαίνειν, σύφειν, ἀποκαθαίρειν τε καὶ ὀπτικεύειν ταῖς κόραις, καὶ τὰ κοίλα τῶν ἑλκῶν πληροῖ· καὶ ἀπουλοῖ, κολλᾷ τε ἕναιμα τραύματα, αἱμορραγίας τε πάσας, καὶ τὴν ἐκ μηνίγγων· ἐπέχει τε ῥῆξιν γοργὴ καὶ τὰ ἀπὸ δακτύλιον καὶ τὰ λοιπὰ μέρη κακοήθη ἕλκη, σὺν ἁλὶ καθαίρει. καὶ τὰς ἐν ἀρχῇ μυρμηκίας καὶ λεχήνας σὺν ὄξει καὶ πίσσῃ καθαιρεῖ· κόλλυμα ἀφεῖ. καὶ τὰ πυρίκαυστα δὲ ἕλκη καὶ χίμετλα ἰᾶται σὺν σίαλι χοίρειον ἢ χηνείῳ· ἀχῶρας δὲ σὺν νίτρῳ σμηχθεὶς ἰᾶται· παρωνυχίας τε σὺν μέλιτι, ὦτων δὲ πόνους σὺν πίσσῃ πρὸς δὲ τὰ λοιπὰ ἀλγήματα τῶν ὤτων, σὺν οἴνῳ γλυκεῖ ἐγχεόμενος, μασοί τε τοὺς ἀπὸ τιτθῶν φλεγμαίνοντας σὺν χυμωλίᾳ καὶ ῥοδίνῳ καταχεόμενος

Vetus his subdidit, τὸ δὲ λιβανωτὸν αὐχμεστέρον.

Vet. λιβανοφόρῳ

Orib. ἀτμητος

Marc. & Corn. ἐστιν. legisse videntur Al. σταχεῖτ Marc. ἀσθίας ἢ ὁ μαλάττεσθαι Par. σιδήρ. V. ἀμόλῳ

V. ἀμόλ. καὶ λιβ.

συφλοῖται

V. καὶ πυλικὰ τῇ μαλάξει τοῦ ἐκκαυ.

V. ἐπίσχ. τὴν ῥῆξ. ἀπὸ τῶν μηνίγγων καὶ τὰ

Serapio legit λιπαίνει

ὠφελεῖ· μίγνυται δὲ καὶ τοῖς πρὸς ἀρτηρίαν ὠφελίμοις, καὶ τοῖς ἀπλαγχνικοῖς
V. add. καὶ λιθοντριπτικοῖς φαρμάκοις, αἱμοπτοϊκόν τι ὠφελεῖ πινόμενος μανιώδης δὲ ἐστι πινόμενος ὑπὸ τῶν
V. μιγνύουσιν ὑγιαινόντων, πλείων ᾗ μετ' οἴνου πολλῆς καὶ κτενιᾶς. καίεται δὲ λίβανος ἐπ' ὀστράκου καθαροῦ ἐθέλοις, ὑφαπτόμενος τοῦ χόνδρου διαφθείρεται ἀπὸ λύχνου, ἄχρις οὗ ἐκκαῇ· δεῖ δὲ
V. πυρωθῆναι μὴ τὸ τελείως καῦσαι· πυμαίζειν γάρ πως, ἄχρις οὗ σβεσθῇ· ὅταν γὰρ ὑπερπυρωθῇ.
V. ἔνιοι δὲ εἰς τὸ ἐμπλάσσειν V. καὶ ἀντὶ ξυμφυτου μίσυος εἰς ἔγκαυσιν ἔνιοι δὲ εἰς ἔγκαυσιν τῶν λεπαδίων ἀγγεῖον χαλκοῦν, κοίλον καὶ μέσον τετρημένον, ὑπὸς ἔκκαυμα τοῦ λιγνύος, ὡς ὑποδεξόμενον τὸ ὑπὸ τοῦ αἰθάλης λιβανίου λόγῳ. ᾧ δὴ, εἰς ὧν μὲν χύτραν βάλλουσι καὶ
V. ἀποπλάσσουσι πηλῷ, καίουσι τὸ κεκμένον. φύλλον δὲ ἐπ' ὀστράκου καινοῦ καὶ αἰθάλικον ἀνθρακιαν, ἕως ἂν μηκέτι πομφολυγίζῃ, μηδὲ λιπαρίδα τινὰ ἢ ἀτμίδα ἀνίῃ. ἀφύπλεται δὲ ὑγρὸς καὶ ἀσχεκαυμένος.

Περὶ φλοιοῦ Λιβανου. Κεφ. πϚ'.

Φλοιὸς δὲ λιβανίου ἀγαθὸς ὁ παχὺς καὶ λιπαρὸς καὶ εὐώδης, πρόσφατος, λεῖος καὶ μὴ λεπιδώδης ἢ ῥυπώδης. δολοῦται δὲ μιγνυμένου αὐτῷ φλοιοῦ στροβιλίνου ἢ πιτυίνου· ἔλεγχος δὲ καὶ τούτων ὅ πῦρ· οἱ μὲν γὰρ λοιποὶ θυμιαθέντες οὐκ ἀναπέμπουσι, καπνιζόμενοι δὲ ὀλίγα εὐωδίας ἀναφορὰν· ὁ μὲν τοῦ λιβανίου φλοιὸς ἅπεται καὶ μετ' εὐωδίας ἀναθυμιᾶται· καίεται
V. cod. & Ald. addunt ᾗ δὲ καὶ σβέσαι ὡς ὁ λίβανος. δύναμιν δὲ ἔχει ἴσην καὶ ὁ λίβανος, ἀναγλύφεσθαι δὲ καὶ συμπλοκώτερος. ὅλην πολλὴν, αἱμοπτοϊκοῖς μᾶλλον καὶ ῥοϊκοῖς ἁρμόζει τὸ πεφθέντων· πυὶ καὶ πρὸς οὐλὰς τὸ ὀφθαλμοῖς, καὶ κηλώμασι καὶ ῥυπαρίαις. φωνῆς δὲ καὶ πρὸς ψωροφθαλμίας πυί.

Περὶ Μαίνης Λιβανου. Κεφ. πγ'.

Μαίνα δὲ λιβανου δοκιμὸς ὅστις ἡ λευκὴ καὶ καθαρὰ, ἔγχονδρος. Δύναμιν δὲ ἔχει ἴσην καὶ ὁ λιβανωτὸς, ἀναιμωδέστερος δὲ μᾶλλον. μίσγεται δὲ ἔνιοι δολίζοντες ῥητίνῃ πιτυίνῃ στεμφύῳ καὶ χύμῳ, ἢ φλοιοῦ λιβανωτοῦ κεκομμένου·

A à partu inflammatis. Sic & arteriæ internorúmque viſcerum medicamentis vtiliter ammiſcetur, & ſanguinem expuentes potu iuuat. Verùm in ſecúda valetudine hauſtum furorem inducit, & largius cum vino potum etiam interficit. Cæterùm thus in fictili mundo poſitum crematur grano ſuccéſum de lucerna accéſo, donec exuratur: poſt perfectam autem vſtionem operculo quodá integere oportet, vſquedum reſtinguatur: ſic enim in cineres minimè redigitur. Nonnulli porrò ollulæ vas æneum cauum & in medio perforatum ſuperimponunt ad fuliginem excipiendá, veluti mox, cùm de thuris fuligine fiet mentio, demonſtrabimus. Alij in ollam crudam luto oblitam immittút, vrúntque in fornace. Torretur quoque candétibus carbonibus in fictili nouo, dum nõ ampliùs bullet, aut pinguitudinem vaporémve vllũ emittat. Friatur verò facilè quod pervſtum eſt.

De Thuris cortice. Cap. LXXXII.

Cortex thuris præſtat craſſus, pinguis, odoratus, recens, lævis ac minimè ſcaber aut membranaceus. Adulteratur autem admixto ſtrobilino aut pineo cortice. Sed & horum index eſt ignis. Siquidem reliqui cortices incenſi nequaquá conflagrant, ſed citra odoris gratiam in fumum euaneſcũt: thuris verò cortex ardet, & cum odoris fragrantia ſuffitur. Cæterùm & hic ipſe thuris modo vritur. Vis autem ei eadem quæ thuri, verùm efficatior & magis aſtrictoria. Quare potus ſanguinem expuentibus accommodatior eſt, itémque alui vteri ve fluxione laborátibus noduli vice ſubditus. Eſt & ad oculorum cicatrices, cauitatéſque ac ſordes efficax. Torrefactus autem ſcabris etiam lippitudinibus auxiliatur.

De Manna thuris. Cap. LXXXIII.

Manna thuris probatur candida, pura & granoſa. Vim habet eandem quá thus, ſed aliquantò remiſſiorem. Sunt qui admixtis reſina pini cribrata & polline, aut etiá thuris contuſi cortice ipſam adulterét.

Sed hæc quoque maleficia ignis arguit. Neque enim incensa æquè ac pari vigore aëris modo purum vaporẽ, sed fuliginosum & impurũ emittet. Quin & odori grato permixta graueolentia comperietur.

De Thuris fuligine. Cap. LXXXIIII.

Thuris verò fuliginem sic facito: Thuris grana forcipicula singulatim apprehensa de lucerna accendito, & in nouam fictilem ollam concauam imponito. Deinde æreo vase introrsum cauo ac in medio perforato diligẽtérque detersо obtegito. Tùm ex altera eius parte, aut etiam vtrinque lapillos quaternùm digitorum altitudine subijcito, quò facilius introspici queat, vtrum illa vrantur: & locus vt sit per quem grana alia supponas, priusquã granum primum penitus restinctum fuerit. Hoc verò facies, donec sat fuliginis collegisse videare. Assiduè tamen externas æramenti partes aqua frigida ex spongia vndique imbuito. Sic enim ipso non magnoperè calente fuligo omnis firmiùs adhæresci, quæ alioqui sua leuitate delapsa thuris cineri permiscetur. Derasa itaque prima fuligine, idem opus repetito, quoties visum fuerit: ac cinerem quoque è cremato thure seorsim excipito. Cæterùm illa oculorum inflammationes leniendi vi pollet, fluxiones cohibet, vlcera expurgat, caua explet, & carcinomata compescit.

De Fuliginis confectione. Cap. LXXXV.

AD eundem modum è myrrha, resina & styrace fuligo conficitur, quam ad eadem accommodant. Ex reliquis quoque lachrymis fuliginem similiter excipito.

De Pinu. Cap. LXXXVI.

PINVS vulgo nota arbor est. Eiusdem verò generis est quæ picea dicitur: specie siquidem duntaxat hæc ab illa differt. Vtriusque cortex astrictorius est: ad intertrigines tritus & insperſus confert, itémque ad superficiaria vlcera & ambusta cũ argẽti spuma & manna.

Α ἐλέγχῃ δὲ ἐ τοῦτο ὃ πῦρ. οὔτε γὰρ καθ' ἴσον ἢ ἰσοτόνως θυμιᾷ θήσει) ἀεροειδῆ ὃν ἀτμὸν, ἀσθολοῦδή τ' καὶ οὐ καθαρὸν, ἀλλά τε βώδια μετὰ τοῦ ἔχει τὴν ἀποφορήν.

V addit de lucerna.

V. καθαρὸν.

Περὶ αἰθάλης Λιβανωτοῦ. Κεφ. πδ'.

ΑΙθάλην δὲ Λιβανωτοῦ ποιεῖ οὕτω· λαβὼν δίσκον καθ' ἕνα χόνδρον τῶν λιβανωτοῦ ἀ-
Β πίων πρὸς λύχνον, ὅπως ἂν εἰς τοῦτον λοπάδιον ὀστράκινον κοῖλον· εἶτα τοῦτο καλύψον χαλκωμα ἔγκοιλον, τετρημένον κατὰ μέσον καὶ ἐσμυγμένον ὀπιμελῶς· ὅπως ἂν μή τι καπὸ ὃ ἕτερον αὐτοῦ μέρος ἢ ἀμφότερα, λιθάρια ὑπὸ τετραδακτυλιαῖα πρὸς τὸ ἀφαφανῆ εἶναι. καὶ
C ἵνα χώρα ᾖ ἐκπνεῖσθαι ἑτέροις χόνδροις ἀεὶ, πρὸ τοῦ τὸν πρῶτον χόνδρον ἀποσβεσθῆναι πέτρωσιν· καὶ τοῦτο ποιῇ, ἕως ἂν αὐτάρκη λιγνὺν δέξῃς σὺν ἀγνοχύνῃ. συνεχῶς μὲν τι ἀποσπόγγῳ ἐξ ὕδατος ψυχροῦ τρίβε τὰ ἐκτὸς μέρη τοῦ χαλκώματος· οὕτω γὰρ συσκαλίζει
D πᾶσα λιγνὺς, μὴ ἀγχόμενον αὐτὸ πυρσυμένου· ἐπὶ ἀποκαίουσα ἀφὰ τὴν καυστότητα, μίγνυται τῇ τοῦ λιβάνου κόνδρῳ. ἀποψήσας οὖν τὴν πρώτην λιγνύν, ποίει τὸ αὐτὸ ἐφ' ὅσον ἂν δοκῇ, ἀναιρῶν τ' καὶ τὴν ἐκ τοῦ κενοῦ λιβάνου κόνδρον ἰδίᾳ. Δύναμιν δὲ ἔχει παιδιακὴν τ' ἐν ὀφθαλμοῖς φλεγμονῶν, σταλτικὴν ῥευμάτων, ἀναθαρτικὴν ἑλκῶν, πληρωτικὴν κοιλωμάτων,
E σταλτικὴν καρκινωμάτων.

Περὶ Λιγνύος σκευασίας. Κεφ. πέ.

ΤΟΝ αὐτὸν δ' τρόπον σκευάζε) καὶ ἐκ τῆς σμύρνης καὶ ἐκ τῆς ῥητίνης, καὶ ἐκ τοῦ στύρακος λιγνύς· ἁρμόζουσι δὲ πρὸς τὰ αὐτά. καὶ ἐκ τῶν λοιπῶν δὲ δακρύων ὁμοίως τὴν λιγνὺν λάμβανε.
F

ὁμοίως vocem vt caret. Ruellius vero hæc latinè omisit.

Περὶ Πίτυος. Κεφ. πς'.

ΠΙΤΥΣ γνώριμον δένδρον· ἔστι δὲ τοῦ αὐτοῦ γένους καὶ ἡ λευκὴ πεύκη, εἴδει διαφέρουσα· ἀμφοτέρων δὲ ὁ
G φλοιὸς στυπτικὸς, ἁρμόζων πρός τε παρεστέμματα λεῖος· καταπλασσόμενος, καὶ πρὸς τὰ ὑπὸ πόλαγα τῶν ἑλκῶν καὶ κεκαυμένα σὺν λιθαργύρῳ καὶ μέλιτι.

Par. διαφέρουσα, al. διαφέρουσι

Corn. καὶ κεκαυμένοις

V. ἰσχυτικοῖ

αἱ ἀλληφθεῖς δὲ κηρωτῇ μυρσίνῃ, ἕλκεσι τοῖς ἐν τοῖς ὠτίοις τῶν νυφεροχρώτων ἕλκη. καὶ τὰ ἑρπυστικὰ ἐπέχει μετὰ χαλκάνθης λεῖα. ἐμβρυά τε καὶ δίτοκα ὑστέρα θυμιαθεῖσα ἐκβάλλει, καὶ λίαν τὰ πολλὰ ἐφίστησι, καὶ οὖρα κινεῖ. καὶ τὰ φύλλα δ' αὐτῶν καταπλασθέντα λεῖα φλεγμονὰς παρηγορεῖ, καὶ τραύματα ἀφλέγμαντα ὑγιαίνει· λειανθέντα δὲ καὶ ἐψηθέντα ἐν ὄξει, ὀδόντων ἀλγίας παραύτικα διακλυζόμενα θερμὰ ἁρμόζει· δὶ καὶ ὑπατικεῖς τῶν φύλλων ὁλκὴ μία σὺν ὕδατι ἢ μελικράτῳ πολλάκις ποθεῖσα. ποιεῖ δὲ τὰ αὐτὰ καὶ ὁ τῆς στροβίλου φλοιὸς καὶ τὰ φύλλα πεφθέντα. καὶ ὃ ἔχει αὐτῶν δὲ διαλόγου χαλκοῦ εἰς λεπτὰ καὶ ἐψηθὲν σὺν ὄξει, ὀδόντων ἀλγίας παραύτικα, καταπιλήσου τὸ ἀφεψήματος καὶ τὸ πεπτωκὸς ὀδόντος. καὶ ἀπαλὴ δὲ ἐξ αὐτῶν γίνεται εἰς ἀκόπτων σκεπασίας καὶ παντὸς ὀδοντάλγους. ἡ δὲ ἐξ αὐτῶν λιγνὺς καμινίων ἐκλαμβάνεται ὠρὸς μέλανος γραφικοῦ κατασκευὴν, ποιοῦσα τὸν ὠρὸν καλλιβλέφαρα καὶ καυστοὺς βεβρωμένους, ὠρός τε πλίλα βλέφαρα καὶ ὀφθαλμοὺς δακρύοντας.

V. quidam κατασπασθέντα

Alii λειανθέντα

Sunt qui legant, στρόβιλος τοῦ φοινικοβάτου καὶ φύλλα καὶ βλαστοὶ

V. καὶ τὰ αὐτὰ καὶ ὁ τῆς στροβίλου φλοιὸς καὶ τὰ φύλλα πεφθέντα. καὶ ὃ ἔχει αὐτῶν δὲ διαλόγου χαλκοῦ εἰς λεπτὰ καὶ ἐψηθὲν σὺν ὄξει, ὀδόντων ἀλγίας παραύτικα, καταπιλήσου τὸ ἀφεψήματος καὶ τὸ πεπτωκὸς ὀδόντος. καὶ ἀπαλὴ δὲ ἐξ αὐτῶν γίνεται εἰς ἀκόπτων σκεπασίας καὶ παντὸς ὀδοντάλγους. ἡ δὲ ἐξ αὐτῶν λιγνὺς καμινίων ἐκλαμβάνεται ὠρὸς μέλανος γραφικοῦ κατασκευὴν, ποιοῦσα τὸν ὠρὸν καλλιβλέφαρα καὶ καυστοὺς βεβρωμένους, ὠρός τε πλίλα βλέφαρα καὶ ὀφθαλμοὺς δακρύοντας.

Al. καὶ ὁ

Hoc caput v. cod. cum præcedente iungit, vti & sequens.

Περὶ Πιτυίδων. Κεφ. πζ.

Πιτυίδες δὲ καλοῦνται ὁ καρπὸς τῆς πίτυος ἐκ τῆς πεύκης ὁ βιρισκόμενος ἐν τοῖς κώνοις. Δυνάμιν ἔχουσι συστελτικὴν, θερμαίνουσί τε ποσῶς. βοηθοῦσι δὲ πρὸς βῆξι καὶ τοῖς κατὰ πλευρὰν πάθεσι, καθ' ἑαυτὰς καὶ μετὰ μέλιτος λαμβανόμεναι.

Hæc verba suspicatur Matth. oluas aliunde in contextum perperã irrepsisse. V. συστελτικὸν, quasi extremis partibus astringat, interiorum vim calfaciendi adhibeat. Al. φθαρτικὸν

Περὶ Στροβίλων. Κεφ. πη.

Στρόβιλοι δὲ καθαρθέντες ἐλαιόμελι, ἢ μετὰ γλυκέος καὶ οἰνώδους σπέρματος πτισθέντες, ὑρητικοὶ, ἀμβλυωπικοὶ τὴν κατὰ κύστιν καὶ νεφροὺς δριμυτῆτα. πλὴν ῥοδίνου ἢ κυμαΐνου δηλαδὴ, μετ' αἰσθράχνης χυλῷ λαμβανόμενοι· ἐξερεθίσεσί τε ἀπὸ πλείονα σώματος, καὶ ταῖς τῆς ὑγρᾶς ἀκρίδος ἐξαμβλύνουσιν. ὅλοι δὲ οἱ στρόβιλοι ἀπὸ δένδρων πρόσφατοι θλασθέντες καὶ τὸ γλυκὺ ἐψηθέντες, ἁρμόζουσι παλαιαῖς βηξὶ καὶ φθίσεσι, τοῦ ἐξ αὐτῶν ὑγροῦ καθ' ἑκάστην ἡμέραν λαμβανομένου κυάθων δ πλῆθος τεσσάρων.

V. ἐξαίρετον ἀπὸ τῶν ἴτεων & Coen. Plinius cap. 8. 3. ἐξ ἀκρίτας legisse videtur. Par. Θλασθέντες ἐν γλυκεῖ καὶ ἐψηθέντες

Paraddit καὶ V non habet ὁ μέλιτος, ita vt καθ' ἑκάστην hoc loco vertendũ videatur, singulis vicibus, hoc est, quotiescunque usus fuerit. Sãb.

A Cerato myrteo exceptus vlcera tonella cute præditorum ad cicatricem perducit: eadem illa serpentia cum atramento sutorio tritus cohibet. Suffitu partus & secundas ejicit: potu vero aluum sistit & vrinas mouet. Quin & ipsarum folia trita & imposita inflammationes leniũt, & vulnera ab inflammatione vin-
B dicant. Ad læuorem autem trita & in aceto decocta dentium dolores demulcent, si calida colluantur. Prosunt & hepaticis folia, drachmę vnius põdere ex aqua mulsáve pota. Eadem præstant Strobili cortex foliáque epota. Quinetiam tæda ex ipsis in tenues assulas concisa & in aceto cocta dentium dolores miti-
C gat, si qua parte dens dolet decoctum id ore contineatur. Ex ipsis etiam spatha fit, ad acoporum & pessorum præparationes idonea. Quin & ex ijs, dum cremantur, fuligo excipitur, ad librarij atramenti confectionem vtilis: itémque ad medicamenta honestandis palpebris dicata. Erosis quoque oculo-
D rum angulis, glabris callosisque genis, & lachrymantibus oculis opitulatur.

De Pityidibus. Cap. LXXXVII.

Pityidum nomine picearum & pinorum fructus appellantur, qui in conis reperiuntur. Vim habent astrictoriã & aliquatenus excalfacientem. Tussi pectorisque vitijs tum per se, tum etiam cum melle sumptæ auxiliantur.

De Strobilis. Cap. LXXXVIII.

Strobili si repurgati edantur, aut cum passo & cucumeris semine bibantur, vrinas cient, & humorum acrimoniam hebetant, qui vesicam & renes infestant: sedant & rosiones stomachi sumptæ cum portulacæ succo: necnon corporis infirmitatem roborant, corruptorúmque humorum labem obtundunt. Toti autem strobili ab arboribus decerpti ac recentes contusi & in passo decocti ad vetustam tussim & tabitudinem conducunt, si ex eo liquore terni quotidie cyathi assumantur.

De

De Lentiſco. Cap. LXXXIX.

LENTISCVS nota arbor eſt, partibus ſui omnibus aſtrictoria. Etenim ipſius fructus, folium, ramorum & radicis cortex pares vires ſortiuntur. Exprimitur & ſuccus ex cortice, radice ac foliis ſufficienter in aqua decoctis: quæ deinde vbi à coctione refrigerata fuerit, abiectis foliis iterum coquatur, donec mellis habeat craſſitudinem. Valet is, qua pollet aſtringendi vi, ad ſanguinis reiectiones, alui profluuia & dyſenterias in potu: itémque contra ſanguinis ex vtero eruptiones, atque tum ipſius vteri, tum etiam ſedis procidentias. In ſumma denique acaciæ & hypociſtidis vice ipſo vti licet. Eadem quoque præſtat ſuccus è tritis foliis expreſſus. Quin & eorum decoctum fotu caua explet, oſſáque quæ nondum conferbuerunt obducto callo ſolidat, ex vtero fluxiones ſiſtit, nomas arcet, vrinas ciet, ac dentes mobiles collutione firmat atque ſtabilit. Virentes autem ſurculi arundineorum dentiſcalpiorum vice dentibus affricti, eos repurgant. Fit denique & ex ipſo lentiſci fructu aſtringens oleum, ad ea quæ aſtrictionem deſiderant accommodatum.

De Reſina lentiſcina. Cap. XC.

E lentiſco quoque reſina naſcitur, lentiſcina cognominata, & à nonnullis maſtiche dicta. Pota ſanguinis reiectioni & veteri tuſſi vtiliter adhibetur. Stomacho quoque eſt vtilis, ructúmque mouet. Additur etiam in dentifricia & facici illitus: quippe quæ nitorem cuti conciliet. Quin & pilos oculorum fluentes glutinat & cohibet: commanducata oris halitum commendat, gingiuáſque contrahit. Præſtantiſſima porro & copioſiſſima in inſula Chio prouenit. Præfertur pellucida, cetræ Tyrrhenicæ candore ſimilis, craſſior, arida, friabilis & odorata. Viridis autem minùs probatur. Adulteratur vero admiſtis thure ac reſina ſtrobilina.

A Περὶ Σχίνου. Κεφ. πϑ'.

ΣΧΙΝΟΣ δένδρον γνώεμον, ευπλεκὲς ὅλον· καὶ γὰρ ὁ καρπὸς αὐτῆς καὶ ὁ φύλλον καὶ ὁ φλοιὸς τῶν κλάδων· καὶ τῆς ῥίζης ἰσοδυναμοῦσι. γίνεται γὰρ καὶ χύλισμα ἐκ τε φλοιοῦ, καὶ τῆς ῥίζης καὶ τῶν φύλλων ἑψηθέντων σὺν ὕδατι ἐφ' ἱκανόν· B εἶτα μετὰ τὸ ἐψηθῆναι τὸ φύλλον ῥιπτομένων, τοῦ ὕδατος ἢ πάλιν ἑψουμένου μέχρι μελιτώδους συστάσεως. πίνεται δὲ κύφων πρὸς αἵματος ἀναγωγὰς καὶ ῥύσεις χειλίας καὶ δυσεντερείας πινόμενος, καὶ πρὸς ἕδρας ἐκ μήτρας· αἱμορραγίας καὶ προπτώσεις ὑστέρας καὶ δακτυλίου· καὶ C καθόλου αὐτῇ ἀκακίας καὶ ὑποκιστίδος ἔνεστιν αὐτῷ χρῆσθαι. καὶ ὁ χυλὸς δὲ τῶν φύλλων ἐκθλιβέντων τὰ αὐτὰ ποιεῖ. καὶ τὸ ἀφέψημα ἢ αὐτῶν κατεψυλούμενον, τὰ ἀσυμπλήρωτα πληροῖ, καὶ τὰ ἀπύρωτα πυροῖ ὀξέα, καὶ ἕδρας ἐκ μήτρας ῥύσεις σίλλῳ, καὶ τῶν ὠμῶν ἀποπεπτικὴν D καὶ οὐρητικόν ἐστιν. ἴασι δὲ καὶ στόμωσις ὀδόντας ἀφαλυζόμενον. τὰ δὲ ξυλάρια χλωρὰ αὐτὰ· καὶ λεμιδίου τρόπον τριβόμενα τοῖς ὀδοῦσι, σμήχει τούτους. γίνεται δὲ καὶ ἐκ τοῦ καρποῦ αὐτοῦ ἔλαιον εὐστόμαχον, ἁρμόζον πρὸς τὰ εὐψυχῆ διόμενα.

E Περὶ Ῥητίνης σχινίης. Κεφ. ϙ'.

Γίνεται δὲ καὶ ῥητίνη ἐξ αὐτῆς σχινίη καλουμένη, ὁποίαν δὲ μαστίχην χρησιμεύουσα πρὸς αἵματος ἀναγωγὰς, καὶ πρὸς παλαιὰ βῆχα πινομένη· ἔστι δὲ ὑστόμαχος ἐμπλαστική. μίγνυται δὲ καὶ σμήγμασιν ὀδόντων. καὶ ἐπιχρίσμασι προσώπου σιλβοποιοῦσα. ἀναχολᾷ δὲ καὶ τείχας τὸ ὀφθαλμοῖς, στόματός τε ὀδμὰς παύει ἀφαμα ἀπομένη, καὶ οὖλων ἵδρυσιν καλλιστική. ἡμᾶται δὲ καὶ καλλίστη καὶ πλείστη ἐν Χίῳ τῇ νήσῳ. διαφέρει δὲ αὐτῆς ἡ λαμπυρίζουσα· καὶ Τυρρηνικῷ κηρῷ ὁμοία τῇ λευκοτάτῃ, ἀβρά καὶ εὐπυρος καὶ εὐῶδης· καὶ εὐώδης. ἡ δὲ χλωρὰ ἧττον. δολοῦται δὲ λιβανωτοῦ καὶ ῥητίνης στροβιλίνης μετρουμένων αὐτῇ.

V. hæc omittit vs̄ sēq.

Oribaſij interpres legiſſe videtur φλοιοῦ τῆς ῥίζης

Marcellus codex addit καὶ φυλλῶν.

V. deſunt

Pro. αἱμοῤῥαγίας

V. quidam μόνα

V. Παραμαίδιον

Hoc caput v. c. præcedenti iungit.

V. σύνοικα τὰ δυσεῖας παρασκευάζεται

V. ἐμπλαστικὸν

In v. c. non legitur καὶ

V. λιβανωτοῦ καὶ λιβανωτοῦ στροβιλίνου μετρουμένων

Περὶ Τερμίνθου. Κεφ. ϟα'.

ΤΕΡΜΙΝΘΟΣ γνώριμον δένδρον, ἧς τὰ φύλλα καὶ ὁ καρπὸς καὶ ὁ φλοιὸς στυπτικὰ ὄντα ἁρμόζει πρὸς ἃ καὶ ἡ σχῖνος, σπυρίζομένα ὁμοίως καὶ λαμβανόμενα. ὁ δὲ καρπὸς αὐτῆς ἔστιν ἐδώδιμος, καὶ χρόμαχος, εὐρηπικός, θερμαντικός· ἔστι δὲ ἄριστος πρὸς ἀφροδίσια. σὺν οἴνῳ δὲ πινόμενος πρὸς φαλαγγίων δήγματα ἁρμόζει. ἡ δὲ ἐξ αὐτῆς ῥητίνη χρίεται μὲν ἐξ Ἀραβίας τῆς ὑπὲρ Πέτρας· γίνεται δὲ καὶ ἐν Ἰουδαίᾳ καὶ Συρίᾳ καὶ ἐν Κύπρῳ καὶ ἐν Λιβύῃ· καὶ ἐν ταῖς Κυκλάσι νήσοις· ἡ δὲ καὶ ἀφροφόρος διαυγεστέρα οὖσα, λευκή, ὑαλίζουσα τῷ χρώματι καὶ κυανίζουσα, ὠφελεῖ, τερμίνθου πίνουσα. ἀφαιρεῖ δὲ πασῶν τῶν ῥητίνων ἡ τερμινθίνη καὶ μετὰ ταύτην ἡ ἐλάτινη, εἶτα ἡ πιτυΐνη καὶ ἡ πευκίνη. μᾶλλον δὲ διαριθμοῦνται ἥ τε πιτυΐνη καὶ ἡ τραβιλίνη. ἔστι δὲ πᾶσα ῥητίνη, μαλακτική, θερμαντική, διαχωρητική, αἱμοκαθαρτική· βήσσῃ ἁρμόζουσα καὶ φθίσεσιν, ἐν ἐκλείχμασι καθ' ἑαυτὴν ἢ μετὰ μέλιτος, ἀναχαλώσασα καὶ τὰ ἐν θώραξι. ἔστι δὲ καὶ ἡ ὑρητίνη καὶ πιπτική, κολλᾶσθαί τε μαλάσσει, ἵν' τε αἱμορραγοῦντα τείχῃ ἁρμόζει τοῖς βλεφάροις, καὶ πρὸς λέπρας σὺν ἰῷ χαλκοῦ καὶ χαλκάνθῳ καὶ νίτρῳ, πρός τε τὰ ἐχωρρόα· ἕλκη ὦτα σὺν μέλιτι καὶ ἐλαίῳ, καὶ πρὸς κνησμοὺς αἰδοίων. μίγνυται δὲ καὶ ἐμπλάστροις, καὶ μαλάγμασι καὶ ἀκόποις. καὶ πλευρὰς δὴ χρίσασι βοηθεῖ καθ' ἑαυτὴν ὑπεζωσθεῖσα ἢ ὑπὸ τὴν μάλην.

Περὶ Ρητινῶν ἄλλων. Κεφ. ϟβ'.

Γίνεται δὲ ῥητίνη ὑλικὴ πιτυΐνη καὶ πευκίνη, κομιζομένη ἀπὸ Γαλλίας καὶ Τυρρηνίας καὶ ἀπὸ Κολοφῶνος δὲ πάλαι πίσσα ἐκομίζετο. ἐνῆν καὶ τὴν ἐπωνυμίαν ἔχει Κολοφωνία κληθεῖσα. καὶ ἀπὸ Γαλλίας δὲ πρὸς τὰς Ἄλπεσιν, ἣν ὀπὸν χοιρεῖον οἱ τῆς δὲ ἐπιχωρίου λάρικα ὀνομάζουσιν. ἐξέχυσε πεῦσα πρὸς τοὺς χρονίους βῆχας ἐν ἐκλείχμασι καθ' ἑαυτήν. διαφοροῦσι δὲ εἰσὶ τῷ χρώματι καὶ αὐταὶ ἡ μὲν γὰρ τίς ἐστι λευκή, ἡ δὲ ἐλαιώδης, ἡ δὲ μέλιτι ἔοικεν, ὥσπερ ἡ λάρικι. γίνεται δὲ καὶ κυπαρισσίνη ῥητίνη ὑγρά.

De Terebintho. Cap. XCI.

TEREBINTHVS cognita arbor est: cuius folia, fructus & cortex qua pollent astringendi vi ad eadem ad quæ etiam lentiscus conueniunt, simuli parata modo sumptáque. Eius fructus esculentus est, at stomacho noxius: vrinam vero ciet & excalfacit. Est & ad excitandam venerem aptissimus: ex vino vero potus contra phalangiorũ morsus prodest. Resina eius ex Arabia Petræa conuehitur. Prouenit tamen etiam in Iudæa, Syria, Cypro, Africa & Cycladibus insulis. Præfertur autem magis perlucida, candida, vitreo colore & in cæruleum vergente, odorata ac terebinthum olens. Resinas porro omnes antecedit terebinthina: proxima huic lentiscina: deinde pinea & abiegna. Post has numerantur ea quæ ferunt piceæ & strobilina. Vis autẽ resinæ cuiuis molliendi, calfaciendi, discutiendi dissipandive & expurgandi. Tussi ac tabi conueniunt in eclegmate per se aut ex melle, quæque ex pectore educi oportet expurgant. Vrinam quoque mouẽt, cruda concoquunt & ventrem emolliunt: ad agglutinandos palpebrarũ pilos conferunt: itémque ad lepras cũ ærugine, sutorio atramento ac nitro. Ad aures denique sanie manantes cum melle & oleo, necnõ ad genitalium prũritum sunt vtiles. Emplastris quoque, malagmatis & acopis admiscentur: quin & per se illitæ aut impositæ laterum doloribus auxilio sunt.

De Resinis alijs. Cap. XCII.

Manat & resina liquida tum è pinu, tum & è picea. Hæ ex Gallia & Hetruria conuehuntur. Quin & olim è Colophone asportabatur, quæ inde Colophoniæ cognomen sibi vendicauit. Itémque ex Gallia subalpina, quam incolæ nomine vernaculo laricem appellant. Ea in linctu & per se ad veterem tussim præclarè facit. Ipsæ quoque inter se colore differunt: siquidem candida quædam est, alia oleosa, alia denique mellis similitudinem habet, vti larigna. Prouenit & è cupresso resina liquida, quę quidem

ad eadem omnia est efficax. Ex siccis autem resinis alia est strobilina, alia abiegna, alia quam fundit picea, alia denique pinea. Eligito omnium maxime odoratam, perlucidam, non valde aridam neque humentem, sed cerę similem atque friabilem. In eo genere præstant pinea & abiegna: odoratæ enim sunt atque thus odore imitantur. Præstantiores ex Pityusa insula, quę secundum Hispaniam sita est, deferuntur. Quæ vero ex picea, strobilo & cupressо manarunt, inferiores sunt, neque tantis atque illæ viribus pollent. Veruntamen eorundem gratia, quorum & illæ, vsurpari solent. Lentiscina vero terebinthinę proportione respondet.

A ἥ τε ποιῆ τοιαῦτα αὐτά. τῆς μὲν πιτυΐνης, ἥ μὲν ἔστι στροβιλίτις καὶ ἐλάτινη, ἥ δὲ πεύκινη, ἥ δὲ πιτυΐνη. οὐκ λέγου δὲ πασῶν τὴν εὐωδεστάτην καὶ διαυγῆ καὶ μὴ καπυρὰν μηδὲ καλλιχρόαν, κηρωδεστάτην δὲ εὔφυτον. διαφέρει δὲ αὐτῶν ἡ πιτυΐνη καὶ ἐλάτινη εὐωδίᾳ· γάρ εἰσι δὲ λιβανίζουσαι. κομίζονται δὲ διαφέρουσι οὐκ Πιτυούσσης τῆς νήσου, ἥ τις κεῖται κατὰ τὴν Ἰσπανίαν ἥ δὲ πεύκινη καὶ στροβιλίτις, δὲ κυπαρισσίνη, οὐδετέρᾳ εἰσί, καὶ αὐχ ὁμοίως κεχρῶνται ταῖς δυνάμεσιν· ὡς οὐκ εἶναι παραλαμβάνονται δὲ πρὸς ὅσα καὶ οὐκ ἔστιν ἡ μὲν πιτυΐνη, αἱ δηλονότι τῇ τερμινθίνῃ.

B

Vide ad ma. stra. initio. Vadian

Hæ voces ἀλλ' οὐκ εἶναι desunt in vulgat.

C

Περὶ Λιγνύος ῥητίνης. Κεφ. ϟγ'.

De Vrenda resina modo, eiusdémque fuligine. Cap. XCIII.

Vritur resina omnis liquida in vase quadruplę capacitatis ad liquoris infundēdi quātitatē. Congrū enim resinæ, duos autē aquæ pluuiæ congios in ahenū immitti oportet, & ad prunas lēto igne coqui assiduè mouendo, dum odor penitus abolcatur, friabilis & arida reddatur, ac digitis minimè cedat. Tandem vbi refrixit, in fictile vas acomitum, hoc est, minimè picatum, recondi-tur: sitque hoc modo candoris eximij. Attamen resinam omnem eliquatam priùs excolari oportet, quo sordidi quicquid est secernatur. Vruntur quoque sine aqua super carbonibus leuiter primum: deinde vbi spissari cœperint, vehementiùs: sicque multis subiectis carbonibus ad dies tres totidémque noctes citra intermissionē discoqui oportet, vsque dū prius memoratas notas sibi asciuerint. Mox, vti dictum est, reponito. Attamen siccas tota die decoxisse sufficerit, atque ita reponere. Vtæ porrò magnoperè cōducunt ad odorata malagmata & acopa, necnon & ad vnguenta colorāda. E resina quoque, perinde atque de thure dictum est, fuligo excipitur: quę ad honestadis palpebris dicata medicamenta, ad circūfusos oculorū angulos, humore superfluo madentes palpebras, & lachrymātes oculos profunt. Ex hac eadē fit etiā stramētū, quo scribim⁹.

Καίεται δὲ πᾶσα ῥητίνη ὑγρὰ εἰς τετραπλασίονι ἀγγείῳ· καὶ τὸ τῆς εἰσχεομένης ὕδατος πλῆθος. δεῖ γὰρ χοᾶς μὲν τῆς ῥητίνης, δύο δὲ χοᾶς ὀμβρείου ὕδατος βαλόντας εἰς ἀγγεῖον, ἕψειν ἐπ' ἀνθράκων· φαύλως, διαπυκνοῦσθαι ἄχρις οὗ ἀέρος γένηται καὶ εὔφυτος καὶ καπυρά, καὶ ὡς τῆς δακτύλοις εἴκειν. λοιπὸν δεῖ ψύξαντας εἰς κεραμεοῦν ἀγγεῖον ἀχήτον, (τοῦτ' ἔστιν ἀπίσωτον,) ἀποτίθεσθαι μηδὲ) ἡ ὀξόχως λευκή· δεῖ μὲν καὶ πρόσθιν λίζειν πᾶσαν ῥητίνην τήκοντας, ἵνα χωρισθῇ ἐξ ῥυπῶδες αὐτῆς καίονται δὲ καὶ ἄνυδρα, ἐπ' ἀνθράκων καὶ φῶς πρῶτον ἑκάστου δὲ μαλακωτέρου πρόσφορ, ἀλλ' ὡς ἐπὶ πολλοῖς ὑποθετέον τοῖς ἀνθραξὶ, καὶ ἐλάττιον ἀλλὰ λείπωσιν ἐφ' ἡμέρας καὶ νύκτας τρεῖς, ἀλλ' ἂν αὖ τι προφρηνῶν ἴδωμα· ἀποπολίπωσιν ἀποτίθεσθαι δὲ ὡς εἴρηται. ταῖς μὲν τοιαύταις ξηραῖς ἀρκέσει δι' ὅλης ἡμέρας ἑψήσασθαι ἀποτίθεσθαι. ἀρκέσουσι δὲ καὶ ἀνακαυθῆναι, εἴς τε τὰ εὐώδη τῶν μαλαγμάτων καὶ ἄκεπα, καὶ εἰς χρωματισμοὺς μύρων. οὐ λαμβάνεται δὲ καὶ λιγνὺς ῥητίνης, ὥσπερ ἐπὶ τοῦ λιβανωτοῦ· ἥτις χρῆται καλλιβλέφαρα, καὶ παραβρεγνύουσι καὶ μυδῶντα βλέφαρα, καὶ δακρυόεντας ὀφθαλμούς. γίνεται δὲ ἐξ αὐτῆς καὶ μέλαν ᾧ γράφομεν.

In altero Goupyli codice hoc caput cum superiore coniunctū est. Vsus ferunt δὲ καὶ ἡ ξηραῖς ὕδατος ὀμβρείου. Marc. Cato, Plin. & Oribas. Al. ποιοῦσι

V. non habet καὶ

Al. τοῦτ' V. λοιπὸν δὲ ξύσαντας

Goupylio hæc verba non reperire in manuscriptis codicibus.

Legitur etiam σωματοποιεῖ, ut ita Rellius legisse videtur. V. adpriuc

In v. non haberur ἡ

V καπυρὰν ἡ δακρυόεσσαν ἡ ἐπὶ τοῦ λιβανωτοῦ om. sunt, quæ interpolata sunt.

Περὶ Πίσσης ὑγρᾶς. Κεφ. ϟδ'. A *De Pice liquida. Cap. XCIIII.*

ΠΙΣΣΑ ἡ μὲν ὑγρὰ, ἣν ἔνιοι κῶνον καλοῦσι, συνάγε ται ἀπὸ τῶν λιπαρωτάτων ξύλων πεύκης καὶ πίτυος. ἔστι δὲ καλὴ ἡ σιλβώσα καὶ λεία καὶ καθαρά. ποιεῖ δὲ πρὸς θανάσιμα φάρμακα, φθισικούς, ἐμπυικούς, βῆχας, ἄθματα, δυσπνοΐας τε ἐν θερμῷ ὑγρᾷ, ἐκλείχμενον κυάθου πλήθος μετὰ μέλιτος. ποιεῖ δὲ πρὸς ταῖς τῶν παρισθμίων καὶ τοῖς φυλῆς φλεγμονὰς καὶ συνάγχας διαφερόμενον. πρὸς ταῖς πυορροούσαις ὠσὶ σὺν ῥοδίνῳ, καὶ πρὸς ἑρπητῶν δήγματα σὺν ἁλῶν λείοις καταπλασσόμενον. χηρῷ δὲ ἴσῳ μιγεῖσα, λειοῖ τὰς ὀλύγας ἀφίησι, φύμασί τε ὑγιεῖς καὶ σκληρίας δακτυλίων διαφορεῖ· σὺν κριθῇ δὲ ἐφθῇ σὺν ἁλῶν ἀλφοὺς καὶ παιδὸς οὖρῳ, χειρῶδας ἀποῤῥήσσει μετὰ δὲ ἰοῦ ἢ πίτυος φλοιοῦ ἢ πιτύρων, ἕρπητας ἐπέχει καταχριόμενον· μανὴν δὲ καὶ χηρωτῇ μιγεῖσα, τοῖς ὑποφορὰς ἀδενικὰς, πρός τε τοῖς ὠσὶ καὶ ποσὶ καὶ δακτυλίοις ῥαγάδας ἁρμόζει καταχριομένη, πληγῆς τε καὶ ἕλκη, καὶ ἀποκαθαίρει σὺν μέλιτι· σὺν δὲ σταφίδι δὲ καὶ μέλιτι, αὐθρακας καὶ σπειδόνας ἀποχαράσσει· μίγνυται δὲ καὶ σπλάγχνοις χρησίμως.

PIX liquida, quam nonnulli conum appellant, è pinguissimis piceæ pinique lignis colligitur. Probatur splendida, læuis ac sincera. Facit autem ad lethalia medicamẽta, phthisicos, purulenta excreantes, tusses, anhelationes & humores intra pectus contẽtos ęgrè excreabiles, si cyathi mensura cum melle delingatur. Perunctа valet ad tonsillarum ac vuæ inflammationes & anginas, itémque ad aures purulentas cum rosaceo, necnon & ad serpentium morsus cum trito sale adhibita. Pari verò ceræ admista, scabros vngues detrahit: vuluæ tubercula sedisque duritias discutit. Cum farina hordeacea vrináque pueri decocta strumas circumquaque rumpit. Cum sulphure, pineo cortice aut furfuribus illita, quę serpunt vlcera cohibet. Mannæ thuris ac cerato permista, sinuosa vlcera agglutinat: pedum sedisque rhagadibus commodè illinitur: vlcera replet, & cum melle repurgat. Quin & cum vua passa & melle carbunculos putrescentiáque vlcera emarginat. Septicis quoque seu erodentibus emplastris vtiliter immiscetur.

Gal. & Aetius addunt, καὶ πρὸς χιόνας ὑπερθέσεως ἰδεοφωνοῦσι. Quæ verba non intellexerunt Scribonius Marcellus & Ruellius, imperfectumque emendat Marcellus. Restituimus ex Aetio, legendumque, συναγείρει τὰ ὑγρὰ καὶ οὐ μετὰ διαπύησιν. V. πο

V. πισσία

Περὶ Πισσελαίου. Κεφ. ϟε'.

Γίνεται δὲ καὶ πισσέλαιον ἐκ τῆς πίσσης, χωριζομένου τοῦ ὑδατώδους αὐτῆς. ἐφίσταται δὲ τοῦτο καθάπερ ὀρρὸς γάλακτι, καὶ ἐκλαμβάνεται δὲ τῇ ἐψήσει τῆς πίσσης, ὑποβαινομένων εἰς καθαρὸν, ὅταν ὅταν ἐκ τοῦ ἀφεψομένου ἀτμοὶ γλυκεῖς ἀφιέμενοι, ἐκθλίβεται εἰς ἀγγεῖον. καὶ τοῦτο γίνεται ἐφ' ὅσον αὐ χρόνον ἡ πίσσα ἕψηται. ποιεῖ δὲ πρὸς ὅσα καὶ ἡ ὑγρὰ πίσσα. δασύνει δὲ καὶ ἀλωπεκίας καταπλασσόμενον μετὰ κριθῆς ἀλφοῦς· θηριοδάκτοις δὲ τοῦτο καὶ ἡ ὑγρὰ πίσσα, καὶ τὰ ὀπὶ τῆς κτενῶν ἕλκη καὶ ψώρας ὑπαλείφομένη.

Io. v. cod. deest γάλακτι

V. καταχριόμενον

V. κατὰ χειμῶνα

De picino Oleo. Cap. XCV.

E PIce fit picinum oleum, separato quod in ea aquosum est, quodq; eidem veluti serum lacti supernatat. Excipitur porrò interea dum pix coquitur, expansis supra eam mundis velleribus: quæ postquam halitu ex ea sublato permaduerint, in vas aliquod exprimuntur. Iteratur illud, tantisper dum pix ea coquitur. Ad eadem ad quæ pix liquida est efficax. Cum hordeacea etiánum farina alopecijs adhibitum, capillos restituit. Idipsum quoque præstat pix liquida, quæ præterea iumentorum vlcera scabiémque illita emendat.

Περὶ Λιγνύος τῆς ἐξ ὑγρᾶς πίσσης. Κεφ. ϟϛ'.

De Picis liquidæ Fuligine. Cap. XCVI.

Γίνεται δὲ καὶ λιγνὺς τῆς ὑγρᾶς πίσσης οὕτως· εἰς λύχνον καινὸν

V. add. la

Fit & è liquida pice fuligo hunc in modum. In lucernam nouam

ellychnio, instructam picis nonnihil indito: illud accendito, ac fictili vase nouo in clibani speciem conformato, supernè quidem rotundo & angusto, internè verò, vti clibani solent esse, perforato lucernam operito & ardere sinito: consumptóque priore liquore nouum infundito, donec sat fuliginis collegeris, atque tum vtitor. Vim habet acré & astrictoriam. Ea verò vtendum ad pigmenta quibus palpebræ honestantur, & ad circumlitiones. Ité vbi superfluo humore madentibus atque adeo glabris genis pilos restitui oportet. Denique ad imbecilles, lacrymosos ampliúsque exulceratos oculos est vtilis.

A ἐλλυχνιασμένον δεῖ τι τῆς πίσσης, ἄλλον ἢ πυμάσας ⓐ λύχνον καινῷ ἀγγείῳ ὀστρακίνῳ ἐοικότα κλιβανοειδεῖ, αἰωρεῖν μὲν κατὰ μέσον περιφερῆ καὶ στενῷ, κάτωθεν δὲ πῆμα ἔχοντα κεκλασμένον ⓐ κλιβανοι, ἐᾶν καίεσθαι. ὅταν δὲ ἀναλωθῇ τὸ πρῶτον ὑγρόν, ἄλλο ἐπιχεῖν, ἕως ἂν αἰθαλώσης λίχνου αὐτάρκη, καὶ χρᾶ. Δυνάμιν δὲ ἔχει δριμεῖαν καὶ συμπικνωτικήν. χρῆσιν δὲ αὐτῆς εἰς τὰ καλλιβλέφαρα καὶ ἀλείφεσθαι, καὶ ὅταν μεμυδωκότα βλέφαρα περιχρίωσι δεῖ. καὶ τοὺς ἀδυνήτους καὶ δακρυορροοῦντας, ἔτι δὲ τοὺς ἑλκώδη ἄκμονα ἔχοντας χρήσιμος.

B

C

De Pice spissa siue arida. Cap. XCVII.

Pix sicca è liquida decocta fit. A nonnullis ea palimpissa, quasi pix iterum cocta nominatur. In hoc genere quędam est visci modo lentescens, boscas cognominata: altera sicca. Probatur pura, pinguis, odorata & subrutila ac resinosa. Talis Lycia & Brutia, quę quidem vtranque picis simul & resinæ naturam sortiuntur. Calfactoriam vim habet, mollit, pus mouet, tubercula panósque discutit, vlcera replet, ac vtiliter vulnerarijs medicamentis permiscetur.

Περὶ ξηρᾶς Πίσσης. Κεφ. ϛζ.

Ἡ δὲ ξηρὰ πίσσα ἐψοῦσιν τῆς ὑγρᾶς γίνεται. καλεῖται δὲ αὐτὴ ὑπό τινων παλίμπισσα. γίνεται δὲ αὐτῆς, ἡ μὲν πιεζώδης, βοσκὰς καλουμένη· ἡ δέ, ξηρά. ἔστι δὲ καλὴ ἡ καθαρά, καὶ λιπαρά, εὐώδης τε καὶ ὑποπύρρους καὶ ῥητινώδης. πιεῖται δέ ἐστιν ἡ Λυκιακὴ καὶ Βρυτία δύο φύσεων ἐχούσαι, πίσσης ἅμα καὶ ῥητίνης. Δυνάμιν δὲ ἔχει θερμαντικὴν, μαλακτικὴν, πυοποιὸν, διαφορητικὴν φυμάτων καὶ φυγέθλων, καὶ πληρωτικὴν ἑλκῶν. μίγνυται δὲ καὶ τραυματικοῖς χρησίμως.

D

Orib. legit ἰξώδης.

Non habentur hæc in veteribus vsque ad Δυνάμιν. Cornarius λιβανωτὸν legendum ex eo colligit, quòd Paulo lib. 4. cap. 3. pix Africana probetur.

De Zopissa. Cap. XCVIII.

Zopissam sunt qui nominent nauibus derasam cú cera resinā, quam nonnulli apochyma appellant. Ea dissipandi vim habet, quoniā aqua marina macerata fit. Alij pineā resinam eo nomine vocauerunt.

Περὶ Ζωπίσσης. Κεφ. ϛη.

Ζώπισσόν ἐστι ⓐ μὲν, εἴ τινι τῶν πλοίων ξυνῳδὸν ῥητίνῃ μετὰ τοῦ κηροῦ, καλουμένῳ ἐπὶ ἐσίων ἀπόχυμα, οἵῳπερ ἀφεψητικὸν ἀφῃρῆσθαι δύναται ⓐ ἐστι, τινὶ πιτυΐνῃ ῥητίνῃ ὕστερον ὠνόμασται.

E

De Bitumine. Cap. XCIX.

BITVMEN Iudaicū cæteris præstat. Probatur purpuræ modo splendens, odoris intensi ac ponderosum. Nigrum autem ac sordidum damnatur: admixta siquidem pice adulteratur. Nascitur in Phœnice, Sidone, Babylone & Zacyntho. Gignitur & in Agrigentino Siciliæ agro liquidum fontibus supernatās,

Περὶ Ἀσφάλτου. Κεφ. ϛθ.

ΑΣΦΑΛΤΟΣ ἀφεφέρει ἡ Ἰουδαϊκὴ τῆς λοιπῆς· ἔστι δὲ καλὴ ἡ πορφυρίζουσα ἐλάβουσα, εὐτονος τῇ ὀσμῇ καὶ βαρεῖα· ἡ δὲ μέλαινα καὶ ῥυπώδης, φαύλη. δολοῦται γὰρ πίσσης μιγνυμένης. γίνεται δὲ καὶ ἐν Φοίνικι, καὶ ἐν Σιδῶνι, καὶ ἐν Βαβυλῶνι, καὶ ἐν Ζακυνθῷ. γίνεται δὲ καὶ κατὰ τὸν Ἀκραγαντῖνον χῶρον τῆς Σικελίας ὑγρὸν ὑπονηχόμενον τὰ χρήματα,

F

ᾧ χρῶνται εἰς τοὺς λύχνους αἰτὶ ἐλαίου, καλοῦντες αὐτὸ Σικελὸν ἔλαιον, πλαστώμενον· ἔστι γὰρ ἀσφάλτου ὑγρᾶς εἶδος.

A quo ad lucernarum lumina olei vice vtuntur, quódque Siculum oleũ falsò appellant: nánque liquidi bituminis genus esse constat.

Περὶ Πισσασφάλτου. Κεφ. γ.

Κάλλεται δέ τις καὶ πισσάσφαλτος γινομένη ἐν Ἀπολλωνίᾳ τῇ πρὸς Ἐπιδάμνῳ, ἣν τις ἐκ τῶν Κεραυνίων ὀρῶν συλλαμβάνει τῇ τοῦ ποταμοῦ ῥύμῃ, καὶ ἐκβεβιασμένην κατὰ τὰς ἠιόνας, βωλοφόρους συμπιπτούσας, ὀζουσα πίσσης μεμιγμένης ἀσφάλτῳ.

Vulg. exempl. Ἐπιδώρῳ

V ἐκ τοῦ

B

De Pissasphalto. Cap. C.

Gignitur in Apollonia Epidamno vicina quę Pissasphaltos appellatur. Ea è montibus Ceraunijs çstuantis fluminis impetu deuoluitur, & in littus expuitur. illic inglebas coacta mistam bitumini picem redolet.

Περὶ Νάφθας. Κεφ. δ'.

Καλεῖται δέ τις καὶ νάφθα, ὅσπερ ἐστὶ τῆς Βαβυλωνίας ἀσφάλτου εἶδος, τῷ χρώματι λευκόν· εὑρίσκεται δὲ καὶ μέλαν. Δύναμιν ἔχον ἁρπακτικὴν τοῦ πυρός, ὥστε καὶ ἐκ μήκους ἁρπάζειν τὸ, ὅπερ πρὸς ἀποχύσεις χεόμενον καὶ λευκώματα· Δύναται δὲ ἔχειν πᾶσαν ἄσφαλτον ἀφλέγμαντον, κολλητικήν, διαφορητικήν, μαλακτικήν, ποιοῦσα πρὸς πήγας ὑγιεινὰς καὶ περιπώσεις, περιστατικὴν δὲ ὀσφρανομένην δὲ ἀποθυμιωμένην ἐλεῖν καὶ ὀπιλητικοὺς ἀποθυμιαθεῖσα, καθαίρει δὲ ὁ γαγάτης λίθος πινομένη μεθ' οἴνου δὲ καταλείων ἐμμένοντα κινεῖ, καὶ βηχὶ χρονίᾳ καὶ ἀθμητικοῖς καὶ δυσπνοίαις βοηθεῖ, καὶ ἐρπητικοῖς δήγμασι, δὲ ἰχθύων πόνοις καὶ πλευρῆς· δίδοται δὲ καὶ κοιλιακοῖς καταπόσει, καὶ θρόμβους αἵματος διαλύει σὺν ὄξει πιθεῖσα· ἐκλύζεται δὲ ὀπὶ δυσεντερικοῖς σὺν πτισάνῃ ταχεῖσα, καὶ καταῤῥοὰς ὑποθυμιωμένη θεραπεύει, δὲ ὀδόντων ἀλγήματα κηρωθεῖσα περιτρίβει· αἱ δὲ κολλᾶται καὶ πέτρας ἕξεσι διαλύουσι μελιτώδους θερμανθεῖσα. αἴρεται δὲ καὶ ποδαγρικοῖς, καὶ ἀρθριτικοῖς καὶ ληθαργικοῖς σὺν ὠμῇ λιτρῷ καὶ κηρῷ καὶ πίσσῃ καὶ πλαθεῖσα. ἡ δὲ πισσάσφαλτος δύναται ὅσα πίσσα καὶ ἄσφαλτος μεμιγμένα.

Vulg. exempl. Ἐπιδώρῳ

V. cod. teres hæc vsque ad δυνάμιν alterum non agnoscunt.

Vulg. exempl. πνοιῶν

V. ἀθμητικοῖς

V μετὰ πτισάνης διὰ μέλιτος. Vulg. exempl. θερμανθεῖσα ἢ ἀπόζεμα καὶ

Hæc pertinet ad finem capitis de Pissasphalto.

V. ἡ δὲ πίσσα καὶ ἄσφαλτος μίγνυται atque ita caput claudit.

V. εὑρίσκει δὲ ψῆφος

C

De Naphtha. Cap. CI.

Naphtha quoque vocatur bituminis Babylonij colamẽ colore cándidum: inuenitur etiam nigrum.

Vim obtinet ignis rapacem, adeò vt etiam è longinquo illum concipiat. Ad suffusiones oculorum & albugines est efficax. Porrò bitumen omne vim habet inflammationes arcendi, glutinandi, discutiendi atque etiá molliendi, ad vulux strangulationes & procidẽtias efficacẽ, seu appositum, seu olfactum, seu etiam suffumigatum. Quisi & comitiali morbo laborantes, veluti gagates lapis, suffitu prodit. Cum vino & castorio potum menses elicit. Tussi veteri, anhelationi spirandique difficultati auxilio est: serpentiú quoque morsibus, atque coxendicum lateriſque doloribus medetur. Cœliacis etiam catapotij instar deglutiendum exhibetur: & grumos sanguinis soluit cum aceto potum. Dysentericis itidem cũ ptissana liquatum infunditur, distillationibus suffitione medetur, dentium dolores circumlitú mitigat. Cæterùm quod siccum est, specillo impositum calfactúmque pilos agglutinat. Cum hordeacea autem farina, cera ac nitro adhibitum podagricos, arthriticos atque lethargicos iuuat. At verò pissasphaltos eadem quæ pix & bitumen, si ambo hæc fuerint permixta, potest.

Περὶ Κυπαρίσσου. Κεφ. ρβ'.

Κυπάρισσος· σύφει, ψύχει· τὰ φύλλα πεφθέντα μετὰ γλυκέος καὶ σμύρνης ὀλίγης, καὶ ῥυματιζομένη

G

De Cupresso. Cap. CII.

Cvpressvs astringit & refrigerat. Eius folia ex passo & myrrha pauca epota vesicæ fluxione

rentatæ ac vrinæ difficultatibus auxiliantur. Pilulæ autem contusæ & ex vino bibitæ ad sanguinis reiectionem, dysenteriã, alui fluxionẽ, orthopnœam atque tussim conueniunt. Quin & earum decoctum idem præstat. Cum fico tusæ duritias etiam emolliunt, nariúmque polypis medentur. Ex aceto etiamnum decoctæ & cũ lupinis tritæ scabros vngues detrahunt: ramices quoque intestinorum adhibitæ reprimunt. Folia iisdem pollent viribus. Sed & pilulæ cum arboris coma suffitæ culices fugare existimantur. Folia verò trita & imposita vulnera glutinant, sanguinémque supprimunt: cum aceto etiam trita capillos tingunt. Porrò tum per se, tum etiam cum polenta illinuntur ad erysipelata, herpetas, carbunculos & oculorum inflammationes. Cerato verò mista & admota ventriculum roborant.

Λ καὶ δυσεντερίας βοηθεῖ. τὰ δὲ σφαιρία κοπτόμενα καὶ σὺν οἴνῳ πινόμενα, ἁρμόζει πρὸς αἵματος αἰσαγωγὴν καὶ δυσεντερίαν, καὶ κοιλίας ῥύσεις παντοίας, βῆχα. καὶ δὲ ἀφεψήματα αὐτῆς δὲ αὐτὴ ποιεῖ μαλάττει δὲ καὶ σκληρίας κοπέντα μετὰ σύκου, ἐκ πολυπόδας τοὺς ἐν μυκτῆρσιν ἰᾶται. ἐκ βάλλει δὲ καὶ λεπρώδεις ὄνυχας, σὺν ὄξει καθαλοῖτα καὶ λιανθέντα μετ' ἤρεμον. σὺν δὲ καὶ σκώληκας κατασπλαδύντα. καὶ τὰ φύλλα δὲ καὶ αὐτὰ ποιεῖ. δακτοὺς δὲ καὶ κάνθαρος διώκειν τὰ σφαγεῖα μετὰ τῆς κόμης θυμιαθέντα. τὰ δὲ φύλλα λεῖα κατασπλαττόμενα, τραύματα κολλᾷ. ἔστι δὲ καὶ ἕλκαιμα. σὺν ὄξει δὲ λιανθέντα, πείρας βάπτει. καὶ κατασπλάττει δὲ καθ' αὑτὰ καὶ σὺν ἀμφίτῳ πρὸς ἐρυσιπέλατα καὶ ἕρπητας, αἰθιοπικὰς, καὶ πρὸς ὀφθαλμῶν φλεγμονάς. κηρωτῇ δὲ μιγέντα, στόμαχον κρατύνει ὑπερτιθέμενα.

V. λυσιτελεῖ δὲ καὶ πινόμενα. V. add. ἡ ῥίζα
V. λυσιτελεῖ δὲ πινόμενα ἡδυσματικῶς
V. ἀπὸ ἴσου δὲ αὐτῆς
V. horum nihil habet vsque ad Δακτ. δὲ
V. δὲ καὶ αὐτὰ καθ' αὑτὰ ἡ σφαῖρα κοπτομένη. Quidã aiunt.

De Iunipero. Cap. CIII.

Περὶ Ἀρκεύθου. Κεφ. ργ'.

IVNIPERVS quędam maior est, minor altera. Vtraque acris est, extenuat, vrinas ciet, excalfacit, accensáque serpentes fugat. Vnius fructus nucis Ponticę magnitudine reperitur: alterius verò fabá æquat, at rotundus est, odoratus, dulcis in mandendo ac subamarus, arkeuthis, id est, iuniperi bacca dictus. Moderatè calfacit & astringit, stomacho vtilis. Potus ad pectoris vitia, tusses, inflationes, tormina virulentarúmq; bestiarum venena cõfert. Vrinas quoque ciet: vnde & conuulsis, & ruptis, & vulvæ strangulatui subuenit.

Ἄρκευθος ῥιζώδης τις ἐστὶ μεγάλη, ἡ δὲ μικρά. δριμεῖα δὲ ἀμφότεραι, διουρητικαὶ καὶ θερμαντικαὶ, θυμιώμεναί τε θηρία διώκουσιν. τοῦ μὲν τοι καρπὸς ὁ μὲν τις κατὰ κεράσου πολιοῦ μέγεθος βιβίσκεται, ὁ δὲ κυάμῳ ἴσος, στρογγύλος. τὸ δὲ καὶ βώδης καὶ γλυκὺς ὁπόταν σαπῇ, καὶ ὑποπικρος, ἀρκευθὶς καλούμενος, θερμαντικὸς μετρίως καὶ συμπλικὸς, βύσσμαχος. ποιεῖ πρὸς τὰ ὑπὸ φθισικῶν, καὶ βῆχας καὶ πνευματώσεις καὶ στρόφους καὶ θηρία πινόμενος. ἔστι δὲ καὶ οὐρητικὸς, ὄθεν καὶ σπασμοῖσι καὶ ῥήγμασι καὶ ὑστερικαῖς πνιγμοῖς ἁρμόζει.

V. Λυσιτελεῖ δὲ καὶ πινόμενα ἡδυσματικῶς
Vulg. exx ἐστι ἀμφοτέρα ὁ μὲν μικρὸς ὁ μεγάλα.
Ald. addit τοῦ μὲν καὶ μικροῦ, ἀμοιον Sicha, οἱ δὲ μικροῦ δένδρου, οἱ δὲ κατακλάδες κολούουσι
V. ἀμφότερα δὲ διουρητικὰ καὶ κατακλάδες κολούουσι καὶ σύρουσι
Vulg exempl. ἐστὶ καρπὸς αὐτῶν ὁ μὲν τις καρπὸς μέγεθος ἀμοίως. ὁ δὲ καρπὸν κατακλάδος ἴσος.
Forte δὲ

De Sabina. Cap. CIIII.

Περὶ Βερέθρου. Κεφ. ρδ'.

SABINAM nonnulli barathrum appellant: cuius duo sunt genera. Vnum folijs quidem est cupresso simile, at spinosius, graueolens, acre ac feruentis naturę. Curta est arbor, ac sese magis in latitudinem fundit: folijs quidam ad suffitus vtuntur. Alterum genus est folio tamarici simile. Vtriusque folia nomas compescunt, & phlegmonas adhibita mitigant: nigritias

ΒΡΑΘΥΣ, ἔνιοι βάραθρον καλοῦσι. ἔστι δὲ τούτου εἴδη δύο. ὧν μὲν γὰρ ἔστι τοῖς φύλλοις ὅμοιον κυπαρίσσῳ, ἀκανθῶδες μᾶλλον δὲ καὶ βαρύοσμον, δριμὺ, πυρωλικόν. κολοβὸν δὲ τὸ δένδρον καὶ εἰς πλάτος μᾶλλον χύδην αὐξάνεται δὲ πῆχυν τοῖς φύλλοις αἱ θυμιάματος. τὸ δὲ ἕτερον μυρίκῃ τοῖς φύλλοις ὅμοιον. ἀμφοτέρων δὲ τὰ φύλλα ἴσχνει νομὰς, καὶ φλεγμονὰς καταπλασσόμενα παραύτικα, ἀπονεκαίρει

In v. cod. vox αὐτῆ non habetur
Dodonæus μυρίνῃ. legendum suspicatur.
V. ἰσχνοῖ
V. πνεῦμα

τὸ μελανίας σὺν μέλιτι καταπλασσό- A & sordes cum melle inducta repurgant, carbunculósque circumquaque rumpunt. Cum vino autem pota, sanguinem per vrinas educunt & partus expellunt: idipsum tum appositu, tum etiam suffitu præstat. Calfactorijs etiam vnguentis, ac priuatim gleucino immiscentur.

V. add.) μενα, καὶ τὰ ῥυπαρείας· ἐπ' αὐθράκας πε-
Par. deficit usq; ad V. Quadrumenta τὰς V. πτίσσης) καὶ αἷμα διὰ ἔμπυα ἀπὸ ἐμβρυα τὰ ἐκπιόντα.
ριῤῥήσσει, σὺν οἴνῳ πινόμενα, καὶ αἷμα διὰ
οὔρων ἀγει, ἔμβρυα τε ἐκπιόντα. ὡσαύ-
τως τὰ ἐν τοῖς θυμιάμασιν, τὸ αὐτὸ
ποιοῦντα, μίγνυται δὲ καὶ τοῖς θερμαντικοῖς χρί-
σμασιν, ἰδίως δὲ τοῖς γλυκέσι.

Περὶ Κέδρου. Κεφ. ρε'.

B

De Cedro. Cap. CV.

Κέδρος δένδρον ἐστὶ μέγα, ἐξ οὗ ἡ λεγομένη κεδρία συνάγεται. καρ-
Hæc quæ desiderabantur in vulg. exempl. addita ex Cæsareo exēp.
πὸν δὲ ἔχει ὡς τὸ κυπαρίσσου, μακρότε-
ρον μέντοι καὶ πολύ. λέγεται δὲ καὶ ἄλλη
κέδρος μικρά, ἀκανθώδης, ὥσπερ ἄρκευ-
Guillã Rymõdus ex Gal.
θος, καρπὸν φέρουσα μέγαν, μύρτου, C
τὸν εὐφερῆ. Τῆς δὲ κεδρίας ἡ λίπη
παχεῖα καὶ διαυγής, βαρεῖα τῇ ὀσμῇ. ἀ-
V. al. πεχομένη δὲ κατὰ σκωλήκων διαφθει-
ρομένους καὶ μὴ ἀφαιρουμένη. Δύνα-
μιν δὲ ἔχει σηπτικὴν μὲν τῶν ἐμψύχων,
φυλακτικὴν δὲ τῶν νεκρῶν σωμάτων. ὅ-
θεν καὶ νεκροὺς ζωοὺς τινες αὐτῇ ἐπάλει- D
φον. ἐὰν δὲ ἱμάτια δέρματα φθείρῃ ἀφ'
ὧν θερμαίνῃ· διὸ θλασθεῖσα μάλιστα καὶ ξηραίνει· διὸ
δοτέον δὲ εἰς τὰ ὀφθαλμικὰ ὀξυδερκὴς ὅσα
ἐξαιρουμένη, καὶ λευκώματα καὶ ὑλὰς σπη-
χεῖ. σὺν ὄξει δὲ ἀφαιρουμένη, σκώληκας τοὺς
ἐν ὠσὶ κτείνει, πόνους τε ἐὰν συείσμους παύει
σὺν ὑσσώπου ἀφεψήματι ἐγχεομένη. εἰς τὰ E
V. λοιμώματα V. ἀποσχήματα
ἐμβρώματα ὀδόντων· ἔστι λαγῶσα,
θραύει μὲν τοὺς ὀδόντας, παύει δὲ τοὺς ὀδυνῶντας·
V. ἐξ καὶ ἔξω) σὺν ὄξει δὲ ἀφαιρουμένη δὲ αὐτὸ ποιεῖ.
πεσσομένη δὲ αἰδοίῳ πρὸ τῆς συνουσίας,
V. ἀποκτείνει τὸ ἀτόκιόν ἐστι, σίναλον δέ τι πεσσόμενόν
ἐστι, καὶ παρεμπίπτουσι φλεγμοναῖς ἐσθιεῖ,
φθεῖρές τε καὶ κόνιδας φθείρει πεσσόμε- F
νον τε καὶ ἐφεστὸς δὲ ἡλμασι σὺν ὄξει κα-
ταπλασσομένη, ἀφαιρεῖ. πρὸς τε λαγῶος
θαλασσίου πόσιν, σὺν γλυκεῖ λαμβανο-
μένη βοηθεῖ, ὠφελεῖ καὶ ἐλεφαντιῶντας.
Deest in cod. Par. ἐπαλείφουσι δὲ καὶ τὰ τραύματα ἕλκη, ἐὰν ᾖ ὄσον κύαθος
ῥοφηθῇ, σκώληκάς τε καὶ ἀσκαρίδας G
ἐξελκύσει φθείρει δὲ ἔμβρυα καὶ ἀπο-
κτείνει δὲ ἔλαιον ἐξ αὐτῆς, χωνευόμενον
ἀπὸ τῆς κεδρίας διὰ ἐρίων ὑποθαλασσίων ὁμοίως τῷ ἐπὶ τῆς πίσσης, πεσσὸν πρὸς ὅσα

Cedrus arbor magna est, ex qua cedria dicta colligitur. Fructum profert vti cupressus, at multò grandiorem. Dicitur & altera cedrus, eáque parua, spinosa, iuniperi modo, fructum ferens myrti baccarum magnitudine, rotundum. Cedria verò laudatissima est, crassa, perlucida, grauis odoris: quæ dum effunditur in guttas coit, minimémque diffunditur. Vim ea obtinet viuentium quidem corporum corruptricem, defunctorum verò conseruatricem: qua ex causa quidam mortui vitam appellauerunt. Vestes quoque & pelles corrumpit, eò quòd vehementiùs calfaciat & siccet. Ocularijs porrò medicamentis accommodatur: quippe quæ inuncta oculis claritatem conciliet, eorundémque albugines ac cicatrices detergeat. Cũ aceto instillata vermes aurium necat, & cum hyssopi decocto infusa sonitus sibilósque sedat. Erosorum dentium cauis indita, eos quidem frangit, at dolores leuat: idem quoque facit, si ex aceto colluatur. Genitali ante coitum circumlita, sterilitatẽ facit. Anginosi quoque ea per vnguntur: quin & tonsillarum inflammationibus auxilio est. Pediculos ac lendes illitu enecat: ceratæ morsibus cum sale adhibita subuenit. Cõtra hausta leporis marini venena in passo sumpta auxiliatur. Iuuat & elephanticos. Linctu aut perunctione pulmonis vlcera purgat: & si cyathi mensura sorbeatur, persanat. Tum vermes alios, tum & ascaridas infusa necat, & partus extrahit. Fit & ex ea oleum quod à cedria seiungitur, velleribus interea dum coquitur supra eam expansis, vt de pice dictum est: ad eadẽ omnia, ad

quæ cedria vtile. Priuatim tamen oleum viriliter perũctum scabiem quadrupedum, canum boúmque, persanat: iis inhærentes ricinos admotum enecat, & vlcera ex tonsura oborta ad cicatricem perducit. Fuligo ipsius quo modo è pice colligẽda, isdem quibus illa viribus prædita. Cedrides porrò cedri fructus appellantur. Calfactoriam vim habẽt & stomacho aduersantur: tussi verò, conuulsis, ruptis & stranguriæ auxiliantur. Ex trito pipere potu menstrua ciunt, & contra hausturn leporem marinum in vino sumuntur. Fugantur & serpentes, iis perunctο corpore ex cerui adipe aut medulla: denique in antidota quoque adduntur.

A καὶ ἡ κεδρία· θερμαντικὴ " ἢ τὸ ἔλαιον ἰδίως καὶ ζᾷ ἔτι τῶν τετραπόδων ψώρας καὶ κνησμὸν καὶ βοὰς αὐθρικῶς καταχεόμενον, καὶ πὶ ἐπ' αὐτῇ κρότωνας φθείρᾳ " περιαιρούμενον " καὶ ζᾷς ὅτι τῇ χειρᾶ " γινομένας ἑλκώσεις " αὐτῷ ἐπουλοῖ " . πλεῖ " ἢ λεπρὰ σίναπτόν αὐτὰς, ὥσπερ πλεῖ τῆς πίσσης, δύναμιν ἔχουσαν πλεῖ αὐτῷ ἐκείνῃ." κεδρίδες δὲ καλοῦνται " ⓐ ὧν αὐτῆς καρποί. Διώκουσι ἢ ἕλξεσι θερμαντικὸν, κακοσόμαχον. βουθοῦσι ἢ βηχὶ, ἀσάσμασι, ῥήγμασι, στραγγουρίαις· καὶ ἔμμηνα ἄγουσι μετὰ πεπέρεως λείου πινόμεναι, καὶ πρὸς λαγνοὺς θαλασσίου πίσσῃ συνοίῳ λαμβάνονται. διώκουσι καὶ θηρία χερσαῖα πᾶν σώματος συνεπαφῇ φίλα. ἢ μιγνῦσι * μίγνυται δὲ καὶ ἀμπέλοις.

B

C

Deest in vulg. exempl. V. ὠφελ. In vet. cod. deest vox αὐτῷ V. ὑπουλοῖ V. hæc insunt loco

Legitur & alibi

Dulcis ſyrupus

De Lauro. Cap. CVI.

LAVRVS quædam est tenui folio, altera latiore. Vtraque excalfactoriam emollientémque naturam habet. Itaque decoctum ex his infessu vuluæ ac vesicæ vitiis conuenit. Virentia folia aliquantulum astringunt: trita & illita vesparum apúmque ictibus opitulantur. Eadem adhibita cum polenta & pane ad inflammationem quamlibet leniendam valent. Pota verò stomachum grauant & vomitiones mouent. Porrò lauri baccæ magis quàm folia calfaciunt. Proinde in elegmate tritæ cum melle aut passo prosunt tabi, orthopnœæ ac thoracis rheumatismis. Contra scorpionum ictus ex vino bibuntur, & vitiligines emaculant. Expressus ex ijs succus aurium doloribus auditúsque grauitati auxiliatur, cum vino vetere & rosaceo instillatus. Inseritur & acopis & vnguentis tum calfaciendi, tum etiam discutiendi vi præditis. Cæterùm cortex radicis calculos rumpit, partus necat & hepaticis prodest, tribus obolis in vino odorato potus.

Περὶ Δάφνης. Κεφ. ϛ'.

D ΔΑΦΝΗ, ἡ μὲν τις ὀξὺ " λεπτόφυλλος, ἡ δὲ, πλατυτέρα." θερμαντικαὶ δὲ ἀμφότεραι καὶ μαλακτικαί· ὅλον τὸ ἀφέψημα αὐτῶν εἰς ἐγκαθίσματα " τὰ ἕδρα μήτρᾳ καὶ κύστιν ἁρμόζει τὰ ἢ χλωρὰ τῶν " φύλλων ἡρέμα ἐπιτρύφει· ὠφελεῖ δὲ λεῖα καὶ τεπλαδίνια σφιγκτῆρα καὶ μελιτωθὲν πλυνάς.

E Δώσεται δὲ καὶ πᾶσιν φλεγμονὴν πρασύνῃ σὺν ἀλφίτῳ καὶ ἄνευ πολεπλαδίνια. πονίζει ἢ " πρασύνῃ ⓐ στόμαχον, καὶ ἐμέτους κατέ. αἱ ἢ " δαφνίδες θερμαντικώτεραι τῶν φύλλων εἰσὶ πικρότητος " ὧν ἐκλελοίδηνται λεῖαι σὺν μέλιτι ἢ γλυκεῖ, πρὸς φθίσιν καὶ ὀρθόπνοιαν καὶ πνεῦ θερμὰ ῥεύματισμούς. πίνονται δὲ σὺν οἴνῳ πρὸς σκορπιοπλήκτους, καὶ ἀλφοὺς δὲ σμήχουσι. τὸ δὲ πίσσωμα αὐτῶν, ὠπαλγίαις " καὶ δυσκοίαις βοηθεῖ, σὺν οἴνῳ παλαιῷ καὶ ῥοδίνῳ " ἐγχριόμενον. μίγνυται καὶ ἀκόνας καὶ συνχρίσμασι θερμαντικοῖς καὶ " ἀφροδισιακοῖς. ὁ ἢ φλοιὸς τῆς ῥίζης αὐτῶν, λίθους θρύπτει καὶ ἔμβρυα κτείνει καὶ ὑπαπτικὴν ὠφελεῖ, περιβολὴν πλῆθος σὺν οἴνῳ " διώδει πινόμενος.

F

G

V. quidam καὶ φοίνικος V. καὶ ἀνατείνων

V. πῶς αἱ πίσσαι καὶ μήτραι ἁρμόζει πλεῖον, αἱ ἢ καὶ ὑπαπτικαὶ καὶ ἀφροδισιακαὶ κακοῦσιν. Quidam malè ἕξιον.

Cornarius διαφέρει Alii ἢ μᾶλλον

V. πονίζει ἢ ὀπ.

Codex antiquus addit καὶ ἄχνη

V. addit διαῤῥ

Alii διαφορικὰς desiderant & suppletur quoque hæc vox in veteri codice. In v. c. vox hæc deest.

Περὶ Πλατάνου. Κεφ. ρζ'.

P.l. πλατανίου πτερυγ. πὶ φύλλ. ἐπ. Idem ωὶ ἐλιπ.

ΠΛΑΤΑΝΟΥ τὰ πυφεσὰ τῶν φύλλων ἐφθὰ ἐν οἴνῳ καὶ καταπλασθέντα, φύλλα ῥᾴμματα ὀφθαλμῶν χυφίζει· δι καὶ τὰ οἰδήματα καὶ φλεγμονας. ὁ δὲ φλοιὸς ἐφθεὶς σὺν ὄξει, ὀδοντάγρίας ἴσχει ἀφέλκυσμα. τὰ δὲ σφαιρία χλωρὰ σὺν οἴνῳ πεφθέντα, ἕρπητα δάκτοις βοηθεῖ· αἰδοηφθέντα δὲ σὺν ἁλὶ, πυρίκαυτα θεραπεύει. ὁ δὲ χυμὸς τῶν φύλλων καὶ τῶν σφαιρίων ἀκοὴν καὶ ὄψιν ἐμποιῶν λυμαίνεται.

V. πεμπτὸν

Περὶ Μελίας. Κεφ. ρη'.

ΜΕΛΙΑ δένδρον ὅτι γνώριμον, οὗ τῶν φύλλων ὁ χυλὸς, καὶ αὐτὰ σὺν οἴνῳ πυρίματα καὶ καταπλασμάτα, ἐχιοδηκτοις βοηθεῖ. ὁ δὲ φλοιὸς καὶς καὶ καταχρισθεὶς μὲθ' ὕδατος, λέπρας ἀφίστησι. τὰ δὲ πρυβήματα τοῦ ξύλου πεφθέντα, φασὶν αἱρετικὰ εἶναι.

V. tantum, σὺν ὕδατι καταπλασσ. Quidam adiiciunt, οἱ καὶ σὺν ὄξει πὶς σπασμοὺς. Al. ὑ ἰὸν πὶ

Περὶ Λεύκης. Κεφ. ρθ'.

ΛΕΥΚΗ τὸ δένδρον ὁ φλοιὸς πεφθεὶς ὅσον εὐγγίας μιᾶς πλῆθος, ἰσχιάδας ὠφελεῖ καὶ στραγγουρείας. ἰσορρόπως δὲ καὶ ἀτόκιος εἶναι, πεφθεὶς μετὰ μιδίου πεφθοῦ· καὶ τὰ φύλλα ὑπὸ πυρίματα μετὰ καθαροῦ σὺν οἴνῳ, ὃ αὐτὸ δρᾶν λέγεται. ὠφελεῖ καὶ ὠτολγίας ὁ χυλὸς τῶν φύλλων χλιαρὸς σὺν ζόμφῳ. τὸ δὲ κατὰ τοὺ ὀφθαλμοὺς τῶν φύλλων σφαιρία λεῖα μετὰ μέλιτος ἐγχριόμενα, ἀμβλυωπίας θεραπεύει. ἔνιοι δὲ ἐπιδεδώκασι τῷ φλοιῷ τῆς λεύκης καὶ τῆς αἰγείρου τιμωρίαν τοῖς λεπρὰ μεγάλη, καὶ ἀσπαρίνᾳ τοῦ σώματος κεκοπεισμένους, ὡς πρωτοκαιρῷ μύκητας ἐδωδίμους φύειν.

Al. ἐμβλύωσιν

Περὶ Μάκερος. Κεφ. ρι'.

ΜΑΚΕΡ φλοιὸς ὅτι κομιζόμενος ἐκ τῆς Βαρβάρου, ὑποξανθος, παχὺς. σύφων ἱκανὸς καὶ τὴν γλῶσσαν· πίνεται δὲ πρὸς αἵματος πτύσιν καὶ δυσεντερείας καὶ κοιλίας ῥεύματισμούς.

De Platano. Cap. CVII.

TENERRIMA platani folia in vino decocta, mox illita, oculorum fluxiones sistunt, actum œdemata cum phlegmonas leuant. Cortex in aceto coctus ad dentium dolores colluitur. Pilulæ verò viridis in vino potæ serpentium morsibus auxiliantur: exceptæ autem adipe, igni ambustæ sanant. Cæterùm foliorum pilularúmque lanugo (in aures & oculos) illapsa auditum visúmque labefactat.

De Fraxino. Cap. CVIII.

FRAXINVS arbor nota est: cuius foliorum succus & ea ipsa tũ in vino pota, tum etiam imposita viperarum morsibus opitulantur. Cortex vstus & ex aqua illitus lepras remouet. Ligni ramenta pota lethalia perhibentur.

De Populo alba. Cap. CIX.

POPVLI albæ cortex vnciæ vnius pondere potus ischiadicis & stranguriæ prodest. Traditur & conceptum prohibere, si cum mulino rene bibatur. Sed & folia post purgationes cum vino pota idem præstare dicuntur. Tepidus quoque foliorum succus aurium doloribus vtiliter instillatur. Pilulæ verò quæ primo foliorum germinatu erumpunt, tritæ & cum melle illitæ oculorum hebetudini medentur. Nec desunt qui memoriæ prodiderint, tum albæ tum etiam nigræ populi corticem in tenuia frusta concisum ac stercoratis areolis sparsum & quasi satum quauis anni tempestate fungos edules proferre.

De Macere. Cap. CX.

MACER cortex est è Barbaria aduehi solitus, subflauus, crassus & gustu per quàm astringens. Bibitur is ad cruentas excreationes, dysenterias & alui fluxiones.

De Vlmo. Cap. CXI.

VLMI & folia & rami & ipſe cortex aſtringendi vim habent. Folia trita ex aceto ad lepram efficaciter illinuntur, & vulnera glutinant: multo vero magis cortex, ſi faſciis loco circumuoluatur: eſt enim lori in modum flexilis. Craſſior autem cortex in vino aut aqua frigida vnciæ pondere potus, pituitam educit. Quin & decoctum foliorum aut corticis radicúmve oſſibus fractis ſi totus gratia perfundatur, ea celeriùs obducto callo ſolidat. Humor autem qui in folliculis prima germinis eruptione reperitur, faciei illitus cuti nitorem inducit. Ille idem dum exiccatur, in animalcula culicibus ſimilia reſoluitur. Cæterum recentia folia ad opſonia olerum more vſurpantur.

De Lignorum carie. Cap. CXII.

QVÆ verò caries ex veteribus lignis & caudicibus veluti farina colligitur, impoſita vlceribus ea repurgat & ad cicatricem perducit. Eadem ſerpentia cohibet cum pari antiſo & vino ſubacta, itidémque trita, linteis indita & impoſita.

De Populo nigra. Cap. CXIII.

POPVLI nigræ folia ex aceto impoſita podagricis doloribus auxiliantur: quæ verò ex ea manat reſina, malagmatis ammiſcetur. Semen ex aceto potum comitialibus vtile. Fertur populorum lachryma quæ ſecundum Padum amnem deſtillat concreſcere, fieríque ſuccinum, quod electrum vulgo Græcorum, nonnullis chryſophorum appellatur. Id attritu iucundum odorem ſpirat, & colore aurum æmulatur. Tritum potúmque ſtomachi aluique fluxiones ſiſtit.

De Harundine. Cap. CXIIII.

IN harundinum genere quædam naſtos, id eſt, plena ſolidáve appellatur: ex qua ſagittæ factitari ſolent: altera fœmina, ex qua tibijs li-

A Περὶ Πτελέας. Κεφ. ρια'.

V. πτελέας: & ſic deinceps. De vlmo lignorumque marcore duo capita in veteribus deſideramur: in margine tamen epigraphe Κηρὸς μιζόπυον.

ΠΤΕΛΕΑΣ τὰ φύλλα καὶ (q) ἀ-
χρέμωνες καὶ ὁ φλοιὸς συστατικά. ποιεῖ
δὲ τὰ φύλλα τοὺς λέπρας λεῖα σὺν
ὄξει ἐπιπλαττόμενα, καὶ τραύματα κολ-
λᾷ, μᾶλλον δὲ ὁ φλοιὸς αὐτὴ ὅτι δίμου
περιφλοιούμενος· ἔστι γὰρ ἱμαντώδης. ὁ δὲ
B παχύτερος φλοιὸς σὺν οἴνῳ ἢ ὕδατι Deeſt in vulg. exempl. quàquâ à Plinio & Sereno omiſſum eſt.
ψυχρῷ πόσεις ὅσον οὐγγίας α'. πλῆθος, ἀ-
γει φλέγμα. ἔστι δὲ ἀφέψημα ἡ τοῦ V. καὶ delet & legit ἢ εφ.
φύλλων ἢ τοῦ φλοιοῦ τῶν ῥιζῶν κατὰ-
πλουόμενον, κάταγμα πυρὶ πάχιον. ὃ
δὲ καὶ τοῖς φύσας κατὰ τὸν πορφύρεον V. φύσαις
ἐκβλάστησιν ὑπεισκόμενον ὑγρὸν, σὺν Forte σαλῷ
ἐλαίῳ ῥόδινον ὑπαιθόμενον. ξηραινόμενον
C δὲ ὃ ὑγρὸν τοῦτο, καθαίρεται εἰς ὠτία χω-
νοποιοῦσι. λαχανεύεται δὲ τὰ πρόσφατα V. εφ' ἃ λαχανεύεται δὲ
τῶν φύλλων ἐν ὄμφακα εἰς προσφάγματα. Quædam ſuppleta ex Iuuenale.

Περὶ Σαπρότητος ξύλων. Κεφ. ριβ'.

Η δὲ ἀπὸ τῶν παλαιῶν ξύλων καὶ
D πρίμνων σαπεία συνιζαλμύη, ὥσπερ ὄμβρου κατάπλασσομένη, καθαίρει καὶ
ἀπυλοῖ ἕλκη· τὰ δὲ ἐρπυστικὰ ἐπέχει, σὺν
ἴσῳ αἴσῳ φυραθεῖσα· καὶ οἴνῳ, ἐν ὀδό- V. σὺν
ναις τε καθεῖσα καὶ λεῖα· καὶ κατάπλασ- V. καθεῖσα
σομένη.

Περὶ Αἰγείρου. Κεφ. ριγ'.

In antiquis codicibus caput hoc capiti ἐλάτης aſcriptum eſt. Vulg. αἰγείρου. πόνου τε
B
Αἰγείρου τὰ φύλλα μετ' ὄξους
καταπλασσόμενα, ποδαγρικοὺς ὀ-
δυνῶντας ὠφελεῖ. ἡ δὲ ἐξ αὐτῆς ῥητίνη μί-
γνυται μαλάγμασιν. ὁ δὲ καρπὸς μετ' ὄ-
ξους πινόμενος, ἐπιληπτικοὺς ὠφελεῖ, ἱ-
στορεῖται δὲ ὅτι ὃ ἐξ αὐτῶν δάκρυον κατὰ V. ἐστὶν ἱστορού-μενον. λέγεται δὲ ὅτι Marc. αὐτῶν
F † Ἠελέκτρου ποταμοῦ καταχεόμενον πί- V. ἠλεκτρίδων
γνυται, καὶ γίνεται ὃ καλούμενον ἤλε-
κτρον, ὥσπερ σίλιον ὃ χρυσοφόρον βδέλλει
σὺν τῇ πολιτείᾳ καὶ χρυσοειδὲς τῷ
χρώματι, ὥσπερ πυρίμνου λέβης, στομάχου
καὶ κοιλίας ῥεύματα ἵστησι.

Περὶ Καλάμου. Κεφ. ριδ'. V. καλάμων

G
ΚΑΛΑΜΩΝ ὁ μὲν τις καλεῖται
τρασὺς, ἐξ οὗ τὰ βέλη γίνεται. ὁ
δέ τις θῆλυς, ἐξ οὗ αἱ γλῶτται τοῖς

αὐλοῖς κατασκευάζονται. ἄλλος δὲ συ- A
V. παχύσαρκος εὐγγίας, πολύσαρκος, πυκνοσάτος, εἰς βιβλιογραφίαν ἁρμόδιος. ὁ δὲ τῆς παχὺς καὶ κοῖλος, περὶ ποταμοὺς φυόμενος, ὃς καὶ δόναξ καλεῖται, ἀπό τινων δὲ Κύπειος. καὶ ἄλλος
V. ἀπὸ τινων δὲ al. ἄλλος δὲ καὶ ἀπό τινων καὶ ἀλλαχοῦ φοίνικος, φραγμίτης, λευκὸς ἀνώδυνος, πᾶσι γνώριμος. οὗ ἡ ῥίζα κεκομμένη B
Pal. κόπτεται καθ' ἑαυτὴν καὶ σὺν βολβοῖς, ἐπιτίθεται σπόλοπας καὶ ἀκίδας. σὺν ὄξει δὲ ἕλκεσι καὶ ὀσφύος ἀλγήμασι πρόσφορος. τὰ δὲ φύλλα χλωρὰ κοπέντα καὶ ἐπιτεθέντα, ἐρυσιπελατά τε καὶ τὰς ἄλλας φλεγμονὰς ἰᾶται. ὁ δὲ φλοιὸς C
ἀλωπεκίας ἁρμόζει κοπεὶς καὶ μετ' ὄξους κατασκευασθείς. ὁ δὲ αἰθόμενος
V. τῶν ἀκοῶν καλάμων ἐμπεσὼν εἰς τὰς ἀκοὰς, κώφωσιν ἐργάζεται. Δύναται δὲ τὰ αὐτὰ καὶ ὁ Κύπειος λεγόμενος κάλαμος ποιεῖν.

Περὶ Παπύρου. Κεφ. ριέ. D

ΠΑΠΥΡΟΣ γνώριμός ἐστι πᾶσιν, ἀφ' ἧς ὁ χάρτης κατασκευάζεται· βέλτιστος δὲ πρὸς τὴν ἐν ἰατρικῇ χρῆσιν, πρὸς διαστόμωσιν συρίγγων σκληθεῖσα μαλαχθεῖσα ἀφέψεσ-
Marcellus & Cornarius legũt σκληθεῖσα. Al. ἀβρέχθεισα. V. ὑγιεινὸν. V. σηπεδόνα. χος, εὐεπιλυμάτου λύσιν ἄγει ξη- E
ἀξιπλυμάτου. ραινόμενον γὰρ καὶ καθημένη ἐμπίπλαται ὑγρασίας, καὶ ἐξοιδοῦσα ἀφιστᾷ τὰς συρίγγας. ἔ-
ἀξιπλυμάτων χει δέ τι καὶ τὸ ῥίζα αὐτῆς καὶ τεφρίμοι· ἀφαυαίνουσι γοῦν αὐτὴν οἱ ἐν Αἰγύπτῳ, ἀποχυλίζοντες ἐκπίνοντες τὸ ἀφαυάσμα. χρῶνται F
δὲ καὶ ἀντὶ ξύλων αὐταῖς. ὁ δὲ κεκαυμένος πάπυρος ἄγει πρὸς ὀδόντων ὀδύνας δύναται νομὰς ἐπέχειν τοῖς ἐν στόματι καὶ πρὸς μέρη· βέλτιον δὲ ὁ χάρτης
V. addit, Ald. Vn. καυθεὶς δραχ" τὸ ποιοῦσιν.

Περὶ Μυρίκης. Κεφ. ριϛ'.

V. codex addit ἢ ἀβροπαγγάλου

ΜΥΡΙΚΗ δένδρον ἐστὶ γνώριμον, παρὰ λίμνας καὶ τοῖς ὑγροῖς ὕδασι φυόμενον, καρπὸν ἄνθος φέρουσα
V. ἀνθοῦσα

gulæ conficiuntur. Alia ſyringias, hoc eſt, fiſtuloſa, multa carne prædita, geniculis denſior, ad librorum ſcriptionem accommodata. Alia denique craſſa & concaua, circum amnes naſcens, quæ etiam donax & à quibuſdam Cypria vocatur. Eſt & alia phragmites, quaſi ſepimentis idonea, graciliór, candicans, vulgo nota. Cuius radix contrita, ac tum per ſe, tum cum bulbis impoſita ſpicula aculeóſque corpore extrahit. Ex aceto verò luxata doloréſque lumborum demulcet. Virentia porrò folia tuſa & impoſita tum eryſipelatis, tum alijs inflammationibus medentur. Cortex vſtus & ex aceto illitus alopecias emendat. Cæterùm paniculæ flos, ſi aures intrauerit, exurdat. Eadem quoque præſtare valet quæ Cypria harundo dicitur.

De Papyro. Cap. C XV.

PAPYRVS nulli non cognita, ex qua charta paratur. Præcipuæ verò eſt in Medicina vtilitatis ad laxanda fiſtularum orificia, ſi præparata fuerit, hoc eſt, liquore quopiam macerata lino fuerit obuoluta vſque dum inaruerit. Ita enim coarctata atque immiſſa humore completur, & intumeſcendo fiſtulas aperit. Habet autem radix alimenti nonnihil: quò fit vt eam commanducantes Ægyptij ſuccum exugant, commanſum reliquum expuant: Ipſis quoque radicibus iidem pro ligno vtuntur. At vſta papyrus dum in cinerem redacta fuerit, depaſcentia vlcera cùm omnium partium, tum oris maximè cohibet. Verùm id melius combuſta charta præſtat.

De Myrica ſeu tamarice. Cap. C XVI.

MYRICA nota arbor eſt, apud paludes ac reſides ſtagnantéſ ve aquas naſcens, fructúmque veluti florem ferens compa-

compage muſcoſum. Gignitur & in Ægypto Syriáque ſatiua quædam, cæterà ſylueſtri ſimilis, at fructum ferens gallæ proximum, guſtu inæqualiter aſtringentem, quíque vice gallæ ad oris oculorúmque medicamenta accommodatur. Datur & ad ſanguinis excreationes in potu: cœliacis quoque & fœminis vuluæ profluuio laborantibus, necnon & contra morbum regium, phalangiorúmque morſus. Impoſitus etiam œdemata inhibet. Cortex verò eadem quæ fructus præſtat. At foliorum decoctum in vino potum lienem liquat, & ore collutum ad dentium dolores ſalutare eſt. Quin & inſeſſu mulieribus vuluæ fluxioni opportunis auxiliatur: ijs quoque qui pediculos lendéſque gignunt affuſum prodeſt. Sed & ligni cinis appoſitus fluxionem ex vtero ſiſtit. Sunt & qui è caudice calices parent, quibus poculorum vice ſplenetici vtantur, ceu datus in eiuſmodi vaſis potus lieni conferat.

A βρυώδες κατὰ τὴν σύστασιν. Γενᾶται δέ τις ἐν Αἰγύπτῳ καὶ Συρίᾳ ἥμερος, καλὸν τὰ ἄλλα ὁμοία τῇ ἀγρίᾳ, καρπὸν φέρουσα ἐμφερῆ κηκίδι, ἀνωμάλως στύφοντα κατὰ τὴν γεῦσιν· ἐκμίζεται δέ τι ἀντὶ κηκίδος εἰς τὰ στοματικὰ καὶ ὀφθαλμικά, καὶ πρὸς αἵματος φύσεις ἐν ποτῷ, καὶ κοιλιακαῖς καὶ ῥοικαῖς γυναιξὶν, ἐκτέρῳ τε καὶ φαλαγγιοδήκτοις· οἰδήματά τε στέλλει καταπλασθείς. καὶ ὁ φλοιὸς δὲ τὰ αὐτὰ ποιεῖ τῷ καρπῷ. τὸ δὲ φύλλον ὃ ἀφέψημα σὺν οἴνῳ σὸν, σπλῆνα τήκει· καὶ ὀδοντολγίαις βοηθεῖ ἀφεψόμενον, ἐγκαθέμενά τε ῥοικᾶς, καὶ πεῖγμα τοῖς φθειρσὶ καὶ κόνιδας ἡνιοχοῦ ὀπτηθέντος· καὶ τὸ ἀπὸ τῆς ξύλου τέφρα πεσσευθεῖσα, ῥᾴδιον ἐκ μύτης στέλλει. κατασπυάζουσι δέ ἔνιοι καὶ κύλικας ἐκ τοῦ φρέατος, αἷς ὅτι τὸ σπληνικὸν χρᾶνται ἀντὶ τοιούτου, ὡς τοῦ δι' αὐτῆς στόματος ὠφελοῦντος.

B

C

D

V. δὲ ἐν

V. ἢ κηκίδι δὲ ὁμοία

V. ἀνώμαλον στύφουσα τὴν γεῦσιν

V. ἐκμίζουσι δέ τι

V. ἰδίως

V. ἀφέψημα δὲ τὸ φύλλον

V. ἐκ μύτης.

V. ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ τρόπου.

De Erica. Cap. CXVII.

ERICA fruticoſa eſt arbor, myricæ ſimilis, at longè minor: cuius flore dum vtuntur apes, minimè probatum mel efficiunt. Huius tam flos quàm coma ſerpentium morſibus illitu medetur.

minus bene

De Acacalide. Cap. CXVIII.

ACACALIS fructus eſt naſcentis in Ægypto fruticis, myricæ fructui quadantenus ſimilis: cuius dilutum ad collyria additur, quæ viſus claritati conueniunt.

De Rhamno. Cap. CXIX.

RHAMNVS frutex eſt circa ſepes naſcens, virgas gerens erectas, ſpináſque oxyacanthæ modo aculeatas: foliis paruis, oblongis,

Περὶ Ἐρείκης. Κεφ. ριζ.

ΕΡΕΙΚΗ δένδρον ὀλίγον θαμνώδες, ὅμοιον μυρίκῃ, μικρότερον δὲ πολλῷ· οὗ τὰ ἄνθη μέλιτται χρώμεναι, μέλι ἐργάζονται οὐ σπουδαῖον· ταύτης ἡ κόμη καὶ ὁ ἄνθος καταπλασσόμενα, ἕρπετῶν δήγματα ἰᾶται.

E

Pal. ἰᾶσθαι

V. ἰᾶσθαι σπουδῆς.

Περὶ Ακακαλίδος. Κεφ. ριή.

ΑΚΑΚΑΛΙΣ θάμνου καρπός ἐστι γινομένου ἐν Αἰγύπτῳ, ὁμοιούμενος κατά τι τὰ τῆς μυρίκης καρπῷ· οὗ τὸ ἀπόβρεγμα μίγνυται κολλυρίοις τοῖς πρὸς ὀξυδορκίαν ἐκμίζουσιν.

F

Pal. ὁμοιοῦται

V. add. καὶ ἀμβλυωπίαν

Περὶ Ράμνου. Κεφ. ριθ.

ΡΑΜΝΟΣ θάμνος ὀλίγος περὶ φραγμοὺς φυόμενος, ῥάβδους ἔχων ὀρθὰς καὶ ὀξείας ἀκάνθας, ὥσπερ ἡ ὀξυάκανθος· φύλλα δὲ μικρὰ, στρογγύλα,

G

V. codex ἰάμνος θαμνώδες ὀλίγον ὀξυ- S. c. Paulus quoque.

Marc. legit ραμνος ἀλλ' ἄκανθαι

Hæc verba ὧν ἡ κατ' ἰσχὺν ἄκανθα desunt Gruppylo, nō inueniuntur in altero codice quē habuit manuscripto Vulg. exempl. non habent. Valgi codi καὶ σπαν-

λίπαρα, μαλακά. ἔστι δὲ ἑτέρα πρὸς A ſuppinguibus ac mollibus. Præter hanc altera eſt candidior: itémque tertia nigrioribus latioribúſque folijs & quadantenus rubentibus, virgultis quinos ferè cubitos longis: ſpinoſioribus quidem, at minùs firmos, rigidóſve, minúſque acutos aculeos habentibus. Fructus eſt latus, candidus, tenuis, folliculi propè figura, verticillo ſimilis. Omnium folia eryſipelatis & herpetibus efficaciter illinuntur. Feruntur & huius rami ianuis feneſtriſve appoſiti veneficorū maleficia depellere.

ταύτην λευκοτέρα· ἣ δὲ τρίτη μελανότερα ἔχουσα καὶ φύλλα, καὶ πλατύτερα σὺν τῷ ἐρέμα ἐρυθραίνεσθαι. ῥάβδους μακρὰς πηχέων ὡς πέντε, καὶ μᾶλλον ἀκανθώδης, ἧττον δὲ στερεὰς καὶ ἐπάκμους ἔχουσας ἀκάνθας. καρπὸς δὲ πλατὺς, λευκὸς, λεπτὸς, ὡς θυλακώδης, ἐοικὼς σφονδύλῳ. πᾶσα δὲ πασῶν τὰ φύλλα τρίβεις ἐρυσιπέλατα καὶ ἕρπητας καταπλασσόμενα. λέγεται δὲ καὶ κλῶνας αὐτῆς, θύραις ἢ θυρίοις προσηλοῦντας, ἀποκρούειν τὰς τῶν φαρμάκων κακουργίας.

vel arcere

Al. ἐπιφανεστέρου διαστήματος.

Περὶ Ἁλίμου. Κεφ. ρκ'.

Ἅλιμος θάμνος ὄζῳ φραγμίτῃ, ὁμοιος ῥάμνῳ, ὑπόλευκος, σὺν ἔχων ἀκάνθας· φύλλα δὲ ἐλαίᾳ πρασπλησια, πλατύτερα μέν τι καὶ ἀπαλώτερα. φύεται δὲ παρὰ θαλάσσαις καὶ φραγμοῖς· λαχανεύεται δὲ αὐτῆς τὰ φύλλα, ἑψήματα εἰς βρασιν. τῆς δὲ ῥίζης < ἀ. ὁλκὴ πο- D θεῖσα σὺν μέλικρατι, κατάπλασμα, ῥύμματα καὶ τροφοὺς πρηῦνει, καὶ γάλα καθαίρει.

Vulg. exempl. non habent. V. ἐλαίᾳ Vulg. exemplo non habent. Addit Oribaſ. καὶ πρασίοις V. quidem carēt

Περὶ Παλιούρου. Κεφ. ρκα'.

Παλιουρος χαίρειμος ὄζῳ θάμνος, ἀκανθώδης, στερεὸς, οὗ τὸ σπέρμα λιπαρὸν καὶ λαγνιώδες βλίσκεται· ὅθεν πυόλιθον ἔξειν ἀρήγει, καὶ τοὺς ὑπὸ κύστεως λίθους θρύπτει, καὶ φὼς ἑρπετῶν δήγματα ποιεῖ. τὰ δὲ φύλλα καὶ ἡ ῥίζα συστατικὰ, ὧν τὸ ἀφέψημα πολὺ, χιλίδων ἴσχυσιν, οὐρά τε ἄγει, καὶ θηριακοῖς καὶ θηλυδρίοις βοηθεῖ. ἔξω φορᾷ δὲ πόμα τὰ θρόσφαλα φύματα καὶ οἰδήματα ἡ ῥίζα, λέγεται δὲ καὶ πλασθεῖσα.

Pal. παλιούρου

V. χαίρεμος, ἀκανθώδης

E

F

In v. cod. nō legitur, λάπαρα.

Περὶ Ὀξυακάνθης. Κεφ. ρκβ'.

Ὀξυάκανθα· ἣν τινες πυρίνην καλοῦσι. δένδρόν ἐστι πρασπλήσιον ἀχράδι, μικρότερον δὲ ἀκανθῶδες ἄγαν καρπὸν δὲ φέρει μύρτῳ ἐμφερῆ, ἁδρὸν, ἐρυθρὸν, εὔθρυπτον, ἔνδοθεν πυρῆνα ἔχοντα, ῥίζαν πολυσχιδῆ καὶ βαθεῖαν.

Quidam perperam πυρακάνθου

G

De Halimo. Cap. CXX.

C HALIMVS frutex eſt circa ſepimēta naſcens, ſimilis rhamno, ſubalbidus, ſine ſpinis, folijs oleæ proximis, ſed latioribus ac mollioribus. Naſcitur in maritimis (locis præruptis) ac ſepibus. Eius folia ciborum gratia olerum modo decoquuntur. Radix verò drachmæ pondere in aqua mulſa pota, conuulſa, rupta, tormináque mitigat, & lactis vbertatem præſtat.

De Paliuro. Cap. CXXI.

PALIVRVS frutex eſt vulgo notus, aculeatus, ſolidus, cuius ſemen pingue & lini ſeminis æmulum reperitur: quod quidem potum tuſſi opitulatur, veſicæ calculos comminuit & ſerpentium morſibus aduerſatur. Folia & radix aſtrictoriam vim habent: quorum decoctum potum aluum ſiſtit, vrinas trahit, & contra ſi venena venenatorumque morſus auxiliatur. Radix verò trita & impoſita recentia quæuis tubercula & œdemata diſcutit.

De Acuta ſpina. Cap. CXXII.

OXYACANTHA, quam pyrinam nonnulli, alij pyryanthen vocant, arbor eſt pyraſtro ſimilis, at minor & valde ſpinoſa. Fructum profert myrti baccis aſſimilem, plenum, rubrum, fragilem, nucleo intus præditum: radicem multifidam & profundam. Hu-

ius fructus tum potus, tum in cibo sumptus alui profluuium fluxúmque muliebrem sistit. Radix trita & illita infixa corpori spicula & aculeos extrahit. Perhibetur & radix abortus facere posse, si ter ea venter leniter feriatur aut perungatur.

A τούτου ὁ καρπὸς διαῤῥοίαν ἴσχει, καὶ ῥοῦν γυναικεῖον πυόμενος καὶ ἐσθιόμενος. ἡ δὲ ῥίζα καὶ ἡ πλατεῖα λεῖα, σύλλεπτος καὶ ἀκίδας ἐξισπᾷ. ἱστοροῦσι δὲ δυνασθαι τὴν ῥίζαν καὶ ἐκτρωσμοὺς ἐργάζεσθαι, τῆς κοιλίας ἡσυχῇ τρὶς πλησθείσης ἢ χριωθείσης.

V. Vide Plin.

V. addit ἢ περιθλίμενος.

De Cynosbato. Cap. CXXIII.

RVBVM canis alij oxyacantham appellant. Frutex est rubo longè maior, ad arboris magnitudinem accedens. Folia fert multò latiora quàm myrtus, robustos verò circa virgulta aculeos, florem candidum, fructum oblongum, oliuæ nucleo similem: qui quidem dum matureſcit fuluus, intus verò lanuginosus conspicitur Fructus arefactus exempta interiore lanugine (est enim arteriæ noxia) tum in vino feruefactus & potus, aluum sistit.

vel validos

B

Περὶ Κυνοσβάτου. Κεφ. ρκγ'.

ΚΥΝΟΣΒΑΤΟΝ ⓐ δὲ ὀξυάκανθαν καλοῦσι· θάμνος ὀξὺ βάτου πολλῷ μείζων, δενδρώδης· φύλλα φέρει πολλῷ πλατύτερα μυρσίνης, ἀκάνθας δὲ περὶ ταῖς ῥάβδοις ἰσχυράς, αἶγος λευκὸν, καρπὸν ὀβλύμηκη, πυρηνῶν ἐλαίας ἐοικότα, οἷς τοῦ πεπαίνεσθαι πυρρὸν, τὸ δὲ σῶμα ἐρυθρόν. ἴσχει δὲ χιλίδιον ὁ καρπὸς ξηρὸς, δίχα τοῦ ἐν αὐτῷ ἐρεώδους (κακοήθικὸν γὰρ τῆς ἀρτηρίας ἐστὶ τοῦτο)· * ἀποζεσθέντος ἐν οἴνῳ καὶ πινόμενος.

In v. cod. deest βάτου

In v. cod. deest πολλῷ

C

Vulg. exempl. ἀποζεσθέντος ἐν οἴνῳ ἢ πινόμενος

D

De Cypro. Cap. CXXIIII.

CYPRVS arbor est folijs circum virgulta oleæ similibus, sed latioribus, mollioribus & viridioribus: floribus candidis, muscosis, odoratis: semine nigro, sambuci fructui simili. Optima nascitur in Ascalone & Canopo. Folia astrictoriam vim habent: quare oris vlceribus commanducata medentur, & illita tum feruidis alijs inflammationibus, tum etiam carbunculis prosunt. Eorundem decoctum igni ambustis affunditur. Ruffant & capillos trita & illita folia, quę in struthij succo maduerint. Flos ex aceto tritus & fronti inductus capitis dolores sedat. Cæterùm quod ex eo præparatur cyprinũ vnguentum, odoratum est, ac vim ascisciț excalfaciendi molliendique neruos: siquidem feruenti natura præditorum medicamentorum misturam recipit.

Περὶ Κύπρου. Κεφ. ρκδ'.

ΚΥΠΡΟΣ δένδρον ἐστὶ παῖς ῥάβδοις φύλλα ἔχον ἐλαίᾳ παρεμπλήσια, πλατύτερα δὲ καὶ μαλακώτερα καὶ χλωρότερα· αὐθη λευκὰ, βρυώδη, βοώδη· ἀπέρμα μέλαν, ὅμοιον τοῦ τῆς ἀκτῆς. χρῶνται δὲ ἀείσῃ ἐν τῇ Ἀσκάλωνι καὶ Κανώπῳ. δύναμιν δὲ ἔχει τὰ φύλλα συμπικλεῖ· ὅθεν ἀλφιμαπλήστα ἄφθας ἰᾶται, καὶ ἕλκη ἄλλας πυρώδεις φλεγμονὰς καταπλασθέντα ὠφελεῖ, καὶ αἰθρακας. ὃ δὲ ἀφέψημα αὐτῶν, πυελικαῖς κατεψύγμα. ξηρὸν δὲ καὶ τείχας * τρυβλίου χυλῷ τὰ φύλλα λεῖα βεβαπτίζει καὶ ἐγχριόμενα. ὃ δὲ αἶγος ὀβλυπλασθὲν τοῦ μετώπου λύει μετ' ὄξους, κεφαλαλγίας * παύει· ὃ δὲ σκυβαλόμενον ἐξ αὐτοῦ ξείσμα κόπριον, θερμασίαν γόσπαι καὶ μελαγχολικὸν νόσον, * εὐώδες, ὅτι τοῦ τοσοῦτον μέλιτος πυρώδικὸ μίγμα ἔχει.

V. Inula

Alij κυπέρου δὲ, alius λευκότερα legit. al πλατύτερα δὲ ἢ χλωρότερα

Orib. βοτρυώδη v. caret, habet tantummodo λευκὰ καὶ ἁβρὰ

Pal. ἢ τῷ ἀξηρᾶς quod legitur in fine periodi, habet post lituram.

V. ἢ σταλὶς in Andro

V. addit. καὶ περιττὸν

Alij. addunt περιπλεκόμενον περιττὸν περιττὸν.

De Phillyrea. Cap. CXXV.

PHILLYREA arbor est cypri magnitudinem æquans, foliis o-

Περὶ Φιλλυρέας. Κεφ. ρκε'.

ΦΙΛΛΥΡΕΑ δένδρον ἐστὶν ὅμοιον κύπρῳ τὸ μέγεθος, φύλλα δὲ ἐλαίας ὁ-

μια, πλατύτερα δὲ καὶ μελάντερα. καρπὸν ἔχει ἐλίκῳ ἐμφερῆ, μέλανα, ὑπογλυκυν, ὡς ἐν βοτρυσι κεῖσθαι. ἐν πεδίοις δὲ τόποις γίνεται. Τούτου τὰ φύλλα σύφει ὡς ἀγριελαίᾳ, ποιεῖ δὲ καὶ πρὸς τὰ σύψεως δρόμους. μάλιστα δὲ τοῖς ἐστομίοις ἕλκεσι σχεμάσματα καὶ ἀφέψημα. καὶ πινόμενον δὲ οὖρα καὶ ἔμμηνα ἄγει. A B

V. καὶ pro eodem.

Περὶ Κίστου. Κεφ. ρκς'.

V. κιδος, & sic deinceps.

Κίστος, ὃν ἔνιοι κίσθαρον ἢ κίσσαρον καλοῦσι, θάμνος ἐστὶν ὁ πετρώδεσι τόποις φυόμενος, πολύκλαδος, φυλλώδης, οὐχ ὑψηλός, φύλλα ἔχων ἀγρίας, μήλῃσι, δασέα. ἄνθη ἄρρενος, ὡς σαφ ῥοιᾶς. ἐπὶ δὲ θήλεος, λευκά. Δύναμιν δὲ ἔχει συστηπτικὴν. ὅθεν τὰ ἄνθη λεῖα πινόμενα σὺν οἴνῳ αὐστηρῷ, δυσεντερείαις ἁρμόζει καθ' αὑτὰ δὲ καταπλασθέντα, νομὰς ἐφίστησι σὺν κηρωτῇ δὲ πυρίκαυστα καὶ παλαιὰ ἕλκη ἰᾶται. C D

Cat ξυλάδης. Seu quoque Serapio.

Vulg exempl. χρυσᾶ

In vulg exempl. deest.

Pal. συστελλει τὰ ἄνθη κόπτει πινόμενα σὺν οἴνῳ αὐστηρῷ ὅθεν δυσεντερικαῖς ἁρμόζει καθαπλασθέντα δὲ τοῖς ἕλκεσι.

Περὶ Ὑποκιστίδος. Κεφ. ρκζ'.

Φύεται δὲ καὶ ἐπὶ ῥίζας τοῦ κίστου ἡ λεγομένη ὑποκιστις· ὑπ' ἐνίων δὲ ῥόβηθρον, ἢ κύτινος καλουμένη, ὁμοία τι κυδωνίῳ ῥοιᾶς. ἡ δὲ μὲν αὐτῆ κιρρὰ, τὸ δὲ χλωρὸν, τὸ δὲ λευκόν· ὅταν ξυλίζεται ὡς ἡ ἀκακία. ἔνιοι δὲ ξηράναντες αὐτὴν καθαίρουσι, βρέχουσί τε καὶ ἕψουσι, καὶ τἄλλα ποιοῦσιν, ὡς ὅτι ἡ λευκή. Δύναμιν δὲ ἔχει τὴν αὐτὴν τῇ ἀκακίᾳ, συστελλοντάν ἡ καθαιρομένων χυμῶν, δυσεντερικούς, αἱμοπτοϊκούς, ῥοῦν γυναικεῖον, πινομένη καὶ ἐπιτιθεμένη. E F

V. hæc delet vsque ad τὴν ἀκ. Pal. ἐργάζονται. Alii ῥάβηθρον Ro. codex sic: ἡ μὲν τις κιρρὰ τὸ δὲ χλωρὸν, ὁ δὲ λευκός. Porrò τὸ δὲ χλωρὸν non legitur apud Oribasium.

V. ξυλίζ.

V. addit πινόμενον καὶ περὶ ἕδρας γυναικῶν cætera delet.

Περὶ Λαδάνου. Κεφ. ρκη'.

Ἔστι δὲ καὶ ἕτερον εἶδος κίστου, καλούμενον ὑπ' ἐνίων λῆδον, θάμνος καὶ αὐτὸς φυόμενος τοῦ κίστου· μακρότερα δὲ τὰ φύλλα ἔχει καὶ μελάντερα, λιπαρείας λιπαρὰς κατὰ τὸ ἔαρ ἀποπατούμενα, ἐξ ὧν τὴν φύλλειον ἡ δυνάμις συστελλουσα καθίστησι, ποιοῦσα πρὸς ὅσα καὶ ὁ κίστος. γίνεται δὲ ἐκ αὐτοῦ τὸ λεγόμενον λάδανον. G

Al. ἐκ φυλ.

leaceis, sed latioribus & nigrioribus, fructu lentisci, nigro, subdulci & quasi racemato. Locis asperis nascitur. Huius folia perinde ac coleastri astringunt, propterea quo ad ea faciunt quæ astrictionem desiderant, maximéque ad oris vlcera tum commanducata, tum etiam si decocto ea colluantur. Quin & potum decoctum vrinas mensésque ciet.

De Cisto. Cap. CXXVI.

Cistvs, quem nonnulli cistharon aut cissaron vocant, frutex est petrosis locis nascens, multos emittens ramulos, folioſus, improcerus, folijs rotundis, nigris, hirsutis. Flores masculo veluti mali punicæ, fœminæ albi. Vim habet astrictoriam: ideóque flores triti & ex vino austero bis die poti dysenterijs conferunt: ipsi verò per se illiti nomas cohibent, & cum cerato igni ambustis ac vetustis vlceribus medentur.

De Hypocistide. Cap. CXXVII.

Cisti radicibus adnascitur quiddam mali punicæ cytino simile, quod hypocistis dicitur: à nonnullis verò robethrum aut cytinus appellatur. Eius pars fulua, altera virens, quædam etiam candida cernitur. Ex ea succus acaciæ modo exprimitur. Aliqui tamen ipsam arefactam contusámque macerant & decoquunt, reliquáque vt in Lycio præstant. Vires hæbet acaciæ: verùm aliquantò magis astringit & exiccat. Prodest cœliacis, dysentericis, & sanguinem excreantibus, imò & fluxui muliebri tũ potum tum etiam infusa.

De Ladano. Cap. CXXVIII.

Est & alterum cisti genus, Ledum à nonnullis appellatum, frutex eodem quo cistus modo nascẽs, sed longioribus folijs ac nigrioribus, quæ verno tempore quiddam pingue contrahunt. Huius foliorum vis astringens eosdem quos cistus effectus præbet. Fit autem ex eo, quod ladanum appellatum.

Siquidem cùm cisti folia depascuntur capræ hircique, pinguitudinem cõspicuè barbis & femoribus, quoniam viscosa sit, adhærescentẽ excipiunt contrahúntve, quæ depexa colatur, & in offas efformata reponitur. Alij attractis per frutices funiculis, inhærentem ijs pinguitudinem deradunt & in offas cogunt. Maximè verò probatur odoratum, subviride, facilè molliscẽs, pingue, arenæ squalorisve expers ac resinosum. Tale autem est, quod in Cypro gignitur. Arabicum verò Libycumque vilius est. Natura ei astringendi, calfaciendi, molliendi & vasorũ oscula reserandi. Vino, myrrhæ & oleo myrteo admixtum fluentem capillum cohibet: cicatricibus decorem facit, cum vino illitum: aurium doloribus cum hydromelite aut rosaceo infusum medetur. Suffumigatur & ad secundas eijciendas: pessis immissum vuluæ duritias sanat: denique in medicamenta sedandis doloribus ac tussi dicata, itémque malagmata vtiliter inseritur. Aluum quoque sistit cum vino vetere potum, ac vrinæ prætereà ciendæ accommodatum est.

A τὰ φύλλα γὰρ αὐτῆς νεμόμεναι αἱ αἶγες καὶ ὁ τράγοι τὴν λιπαρείαν ἀναλαμβάνουσι τῷ πώγωνι γνωρίμως, καὶ τοῖς μηροῖς προσπλατυνόμενον. ἔστι δὲ τυλᾶναι ἐξῶδη, ἵνα ἀφαιρεθῶσιν ὑλίζοντες, καὶ ἀποδήσαντες ἀναπλάσσουσι μαγίδας. ἔνιοι δὲ καὶ ῥινία ὑπτιάζουσι τοῖς B θάμνοις, καὶ τὸ προσπλαθὲν αὐτοῖς λίπος ἀποξύσαντες ἀναπλάσσουσι. χράονται δὲ ἔστιν αὐτῷ τὸ βώδες, ὑποχλωρον, εὐμάλακτον, λιπαρὸν, ἀμείνονα Al. ὄμμυ. ψάμμου ἢ ψαφαρείας, ῥηπτικὸν· τὸ εὖπον δὲ ἔστι τὸ εἰς Κύπρον φερόμενον. ὃ μέσον τι Λιβυκοῦ καὶ Λιβυκοῦ βύπλέστερον. C ἐστι. Δύναμιν δὲ ἔχει στυπτικὴν, θερμαντικὴν, μαλακτικὴν, διαπεπτικὴν· ἴσχει δὲ τὰς ῥεούσας πεύκας, μιχθὲν οἴνῳ καὶ σμύρνῃ καὶ μυρσίνῳ ἐλαίῳ, οὐλάς τε διαφανεστέρας ποιεῖ μετ' οἴνου καταχριόμενον, καὶ ὠταλγίας μετ' ὑδρομέλιτος ἢ ῥοδίνου ἐγχριόμενον θεραπεύει· ὑποδυομένη δὲ καὶ τοὺς δακτίρων ἐκβολὰς, καὶ σκληρίας θεραπεύει τὰς ὑπὸ μήτραν ὑπὸ πεσσῷ μιχθὲν, καὶ D τοῖς ἀνωδύνοις καὶ βηχικοῖς καὶ μαλάγμασι χρησίμως μίγνυται· κοιλίαν τε ἵστησι σὺν οἴνῳ παλαιῷ πολλῷ· ἔστι δὲ καὶ οὐρητική.

Sunt & aliæ duæ species, altera Indica, altera Æthiopica, nigra, venarum pectinúmve expers, cornu elaborato læuore similis, quæque fracta densa apparet, mordet autem gustu ac leniter astringit. Prunis imposita cum odore iucundo & citra fumum vritur. Recens verò igni admota ob pinguitudinem accenditur, & ad cotem trita subfulua redditur. Est & altera Indica, intercurrentibus lineis prædita, candidis & fuluis, itémque maculis frequentibus: cæterùm prior bonitate antecedit. Nonnulli porrò mori aut acanthi ligna, quòd consimilia sint, pro ebeno vendunt. Ex eo autem internoscuntur, quòd fungosa sint, & in assulas ad purpuram vergentes resoluantur, nihil mordacitatis in gustu, nec suauis odoris in suffitu præ se ferentia.

Περὶ ἐβένου. Κεφ. ρκθ'.

E

ΕΒΕΝΟΣ κρείττων ἡ Αἰθιοπικὴ, καὶ μέλαινα, καὶ μὴ ἔχουσα κιρσοὺς, ἐμφερὴς, κέρατι εἰργασμένῳ τὴν λειότητα, θλασθεῖσα δ' πυκνὴ, δακτικὴ σὺν τῇ γεύσει καὶ στυφοῦσα· πλεῖστα τὰ ἐπ' ἀνθράκων μετ' ὠδῆς καὶ δίχα καπνοῦ ἐκθυμιώμενη. ἢ δ' ἑτέρα ἀπὸ τῆς λιπαρείας ἀναπέπταται, πυκνὰ γραφὴν ἔχουσα δ' ἐπ' ἀκάνθης, ὑπομύρρος γίνεται. Ἔστι δέ τις καὶ Ἰνδικὴ, ἔχουσα διαφύσεις λευκὰς καὶ κιρρὰς, καὶ στίλους ὁμοίους πυκνοὺς· πλὴν βελτίων ἡ πρώτη. ἔνιοι δ' τὰ σποδούμενα ἢ ἀκανθίνα ξύλα ἐμφερῆ ὄντα, αὐτὴ ἐβένῳ πωλοῦσι· διαγινώσκεται δὲ ἐν τῷ χρῶμά τι εἶναι, καὶ κατὰ σχίδακας μικρὰς ἀπολύεσθαι ἐμπορφύρουσι τῷ χρώματι, μηδὲν δὲ δακτικὸν ἔχουσας ἐν τῇ γεύσει, ἢ ἐν τῇ θυμιάσει βώδεις.

In vet. cod. decli ται

V. θυμιαθὲν

V. Ἔνιοι δὲ τὰ σποδούμενα ἢ ἀ κανθίνα ξύλα κατὰ ἐβένου ξύλα· διαγινώσκεται δὲ καὶ ἀκάνθινα ἢ ἐν σποδούμενα καὶ λύεσθαι ξύλα ἐμπορφύρουσι τῷ χρώματι αὐτῆ ἐβ.

Δώαμιν δὲ ἔχει συμπλεκτικὴν τῶν ὀπτικευόντων ταῖς κόραις. ποιεῖ δὲ καὶ πρὸς τὰ παλαιὰ ῥεύματα καὶ φλυκτίδας· εἰ δέ τις ποιήσας ἐξ αὐτῆς * ἀκήνιον χρῶτο εἰς τὰ κολλύρια, βέλτιον ἐνεργήσει. κατεργάζεται δὲ εἰς τὰ ὀφθαλμικὰ, τῶν τρυβλιμάτων ἢ ῥιγμάτων βρεχομένων ἐν οἴνῳ Χίῳ ἡμέρᾳ καὶ νύκτα· εἶτα λειωθέντων ἐκμελῶς, καὶ εἰς κολλύρια ἀναπλασσόμενον. ἔνιοι δὲ προσβάντες διηθοῦσιν αὐτὰ, εἶθ' οὕτω τὰ λοιπὰ ποιοῦσι. τινὲς δὲ αὐτὴ τῷ οἴνου ὕδατι χρῶνται. καίεται δὲ ἐν ὠμῇ χύτρᾳ, ἕως ἂν ἀνθρακωθῇ. καὶ πλύνεται ὡς ὁ κεκαυμένος μόλιβδος. ἁρμόζει δὲ ὅ ἐστι δυσὶ πρὸς ψωροφθαλμίας καὶ ξηροφθαλμίας.

A

B

C

Vim habet ebenus ea exterendi quæ pupillis caliginem offundunt: pollet & ad veteres fluxiones ac pustulas. Quod siquis facta ex ea coticula vtatur ad terenda collyria, efficaciùs medebitur. Ad oculorum medicamenta efficax quoque redditur, si scobes ramentáve in vino Chio per diem ac noctem macerata, diligentérque ad læuorem contrita in collyria digerantur. Nonnulli ipsa priùs trita cribro cernunt, ac deinde reliqua eo modo peragunt. Quidam pro vino aqua vtuntur. Vritur etiam in fictili nouo, donec in carbones redigatur: lauaturque plumbi vsti modo: itáque præparatum aridis scabrisque lippitudinibus conducit.

Περὶ Ῥόδων. Κεφ. ρλ.

ΡΟΔΑ ψύχει καὶ σύφει, τὰ δὲ ξηρὰ μᾶλλον σύφει. χυλίζειν δὲ δεῖ τὰ ἀπαλὰ ἀποφαλλίσαντας ὄνυξι καλουμένοις, ὅταν ᾖ τὸ λευκὸν τὸ ἐν τῷ φύλλῳ. ὃ δὲ λοιπὸν ἐκθλίβειν καὶ * πέσσειν ἐν σκιᾷ, ἐν ᾗ ὑγιὰς ἄχρις οὗ συραφῇ, οὕτω τε ἀποβάπτειν εἰς τὰς ὀφθαλμικὰς παρεσκευάς. ξηραίνεται δὲ τὰ φύλλα ἐν σκιᾷ συνεχῶς τρεφόμενα, ἵνα μὴ βύσωσιν. ποιεῖ δὲ τῶν ξηρῶν ἐψηθέντων ἐν οἴνῳ ὃ ἀποθλιμμα, πρὸς ἀγγήματα κεφαλῆς, ὀφθαλμῶν, ὤτων, οὐλῶν, δακτυλίων, ἀποδυσμένου ὑπέρυθρα, μύρτας, πέπερι ἐγχριόμενον καὶ προσκλυζόμενον. αὐτὰ δὲ ἰσχνὰ τῷ ἐκθλίβειν, κοπτὰ καὶ ἐπιπλασσόμενα, ποιεῖ πρὸς στομαχικῶν φλεγμονὰς, καὶ στόμαχον πλάδον καὶ ἐρυσιπέλατα· ξηρὰ δὲ λεῖα * πάσσει μυελοῖς προσπαίοντα, καὶ αἱμορραγίας καὶ τραυματικαῖς ἀνιάδεσι μίγνυται. καίεται δὲ καὶ εἰς τὰ καλλιβλέφαρα. ὃ δ' ἂν μίσους ἕνεκα ῥόδοις βυρσουμένοις αὖθις πρὸς ἄλων ῥευματισμοὺς ξηρὸν προσπασθῇ ποιεῖ. αἱ κεφαλαὶ δὲ πολεῖσαι, κοιλίας ῥέουσαν καὶ αἵματος ἀναγωγὰς ἐπέχουσιν.

D

E

F

G

Περὶ Ροδίδων. Κεφ. ρλά.

ΑΙ λεγόμεναι δὲ ῥοδίδες, σκευάζονται τρόπον τοῦτον· ῥόδων χλωρῶν

Vim habet ebenus ea exterendi quæ pupillis caliginem offundunt: pollet & ad veteres fluxiones ac pustulas. Quod siquis facta ex ea coticula vtatur ad terenda collyria, efficaciùs medebitur. Ad oculorum medicamenta efficax quoque redditur, si scobes ramentáve in vino Chio per diem ac noctem macerata, diligentérque ad læuorem contrita in collyria digerantur. Nonnulli ipsa priùs trita cribro cernunt, ac deinde reliqua eo modo peragunt. Quidam pro vino aqua vtuntur. Vritur etiam in fictili nouo, donec in carbones redigatur: lauaturque plumbi vsti modo: itáque præparatum aridis scabrisque lippitudinibus conducit.

De Rosa. Cap. CXXX.

ROSA refrigerat & astringit: sed sicca magis astringit. Succum autem è rosis recentibus exprimi oportet, resectis nimirũ prius forsice vnguibus (sic appellantur candidæ foliorũ partes) ita vt reliquum in pila prematur teratúrque: inde vero expressus succus in vmbra locari debet, dum spissescat, & ita ad oculorum circumlitiones recondi. Siccantur etiamnum folia in vmbra, continuò tamen versata, ne situm mucorémve contrahant. Siccarum vero rosarum in vino coctarum expressus liquor facit ad dolorem capitis, oculorum, aurium, gingiuarum, sedis, recti intestini ac vulvæ, siue illitus, siue etiam affusus. Eædem citra expressionem contusæ, móxque impositæ, hypochondriorũ inflammationibus, stomachi ex humiditate nimia solutionibus & erysipelatis conferũt: iisdem siccis ac tritis femina asperguntur: denique compositionibus quas antheras vocãt, & vulnerariis antidotis immiscentur: vruntur & in calliblepharа. Porrò flos qui in medijs rosis reperitur, aridus gingiuarũ fluxionibus efficaciter inspergitur. Capita verò pota fluentem aluum & cruentas reiectiones sistũt.

De Roseis pastillis. Cap. CXXXI.

Pastilli quos rhodidas vocãt, hac arte præparantur: Rosarũ viridium,

Al. αἰφμὴς ποιεῖ
V. αἱ δὲ ὀδαλμοὶ τῶν τριμμάτων ἢ ῥιγμάτων. Vulg. ὧν ἅλμει ῥέων
Al. διαβάζουσιν αὐτὰ
V. ἡ ποιεῖ
Deest in Par. cod. itéq; Colonienſi ψωρόφ. al. ψώρας καὶ ὑφθαλμίας.
Marcellus περὶ Deest in Par.
Vulg. exempl. ἀκαθόλων
Mox. παρασκίμπτειν μαζόν. V carent vsque ad ἀνιάδ.
Alij addunt καὶ χνοὴ καὶ μυρόφυλλα οἱ ἀπόπτα ἀλλ. ἄχρια, οἱ πολλὰ δὲ ἀδύνατα τοῖς ἕπτα τμῆς.

quæ nullo antè humore madefactæ extabeſcere cœperit, drachmæ XL, Indicæ nardi drachmæ X, myrrhæ drachmæ VI tritæ digeruntur in paſtillos ponderis ternûm obolorú: qui quidẽ in vmbra ſiccati vaſe fictili non picato ac probè vndique obturato, reponuntur. Sunt qui coſti drachmas II adijciant, & Iridis Illyricæ tantundem, vinum etiam Chium cum melle ammiſcentes. Mulieribus moniliũ vice collo circundati vſui ſunt ad retundendam ſudoris graueolentiam. Iiſdem etiã tritis vtuntur ad diapaſmata, quę ad ſudores coercendos corpori aſperguntur, itémque ad illitiones à balneo, & poſtquã inaruerint corpori, frigida abluuntur.

A ἀβεύχων μεμιδρασμένων < μ'. νάρδου Ἰνδικῆς < ί. σμύρνης < ς'. λεῖα ἀναπλάσσουσι εἰς ἐχίνους περιβολαίους· καὶ ἐν σκιᾷ ξηραίνεται, καὶ ἀποτίθενται εἰς κεραμεῖον ἀγλῆζον ἀκόνιτον περισφιγμένον. ἔνιοι δὲ προστίθασι καὶ κόστου < β'. καὶ ἴριος Ἰλλυρικῆς ὅ αὐτό, μίσγοντες καὶ οἶνον Χῖον μετὰ μέλιτος. χρῆσις δὲ αὐτῶν ἐστιν, ὅτι γυναιξὶν ἐπιτιθέμενοι τῷ τραχήλῳ αὐτὴν ὀρθῶς, ἀμβλυνουσιν τὴν τῶν ἱδρώτων δυσωδίαν. χρῶνται δὲ καὶ λείοις ἐν ἀφεψήμασι καὶ συγχρίσμασι μετὰ τὸ λουτρόν, ἐκ μέσου δὲ ξηραινθείσας ἀπολούουσι ψυχρῷ.

V. ἰμβρίχου

V. σμύρνης μὲν μέλιτος καὶ οἴνου Χίου· χρῶ.

Pal. οἱ τὰ τοιαῦτα τῷ τραχήλῳ αὐτῶν ἱμάντα λέγουσιν

V. ἐν τῇ ὁμοῦ

Quidam ἀμβλύνουσιν Pal. ἀμβλύνουσι V. & Flor. δὲ αὐτῶν τῇ νότῳ

Vulg. διαπλάσμασιν

Pal. μετὰ λουτρὸν ἢ συγχρίσεσι.

Add. malè ἰμάντων

C

Περὶ Λυκίου. Κεφ. ρλϛ'.

De Lycio. Cap. CXXXVII.

ΛΥΚΙΟΝ, ὃ ἔνιοι πυξάκανθαν καλοῦσι, δένδρον ἐστὶν ἀκανθῶδες, ῥάβδους ἔχον ὀργυιαίας ἢ καὶ μείζονας· τοῖς δὲ φύλλα πύξῳ ὅμοια, πικρά· καρπὸν ἔχει ὡς πίπερι μέλανα, πικρὸν, πυκνόν, λεῖον καὶ τὸ φλοιὸν ὁμοίως ὠχρὸν, ὅμοιον δὲ διεθέντι λυκίῳ· ῥίζας ὀλίγας, πλατείας, ξυλωδεῖς φύει· πλεῖστον δὲ Καππαδοκίᾳ καὶ Λυκίᾳ, καὶ ἐν ἄλλοις τόποις πολλοῖς· τραχέα ὀφείλει χωρία. χυλίζεται, τὰ φύλλα σὺν τοῖς θαλλοῖς θλασθέντων καὶ βραχέων ἐφ' ἡμέρας ἡμέρας, εἶθ' ἑψηθέντων, καὶ τὰ μὲν ξύλα ῥιπτουμένων, τὸ δὲ ὑγρὸν πάλιν ἑψουμένου μέχρι μελιτώδους συστάσεως. δολοῦται δὲ ἀμόργης ἅμα τῇ ἑψήσει μιγνυμένης, ἢ ἀψινθίου χυλίσματι, ἢ χολῇ βοείᾳ. καὶ τὸ μὲν ὀπτηχθὲν ἀφρῶδες ἐν τῇ ἑψήσει ἀφίων, ἀπόθου εἰς τὰ ὀφθαλμικὰ· τὸ δὲ λοιπὸν εἰς τὰ ἄλλα χρῶ. γίνεται δὲ καὶ ἐκ τοῦ κεραμοῦ ὁμοίως χύλισμα ἐκπιεζομένου καὶ ἁλιζομένου. ἔστι δὲ κάλλιστον τὸ κεκαυμένον λύκιον, καὶ κατὰ τὸ σβέσιμον τὸν ἀφρὸν ἐρυθρὸν ἔχον, ἔξωθεν μέλαν, διαρρεῖν δὲ κιρρόν, ἀδρομερὲς, σῦφον μετὰ πικρίας χρώματι κροκώδης, οἷόν ἐστι τὸ Ἰνδικὸν, ὃ καὶ φέρειν τὰ λοιπὰ καὶ δυναμικώτερον.

Δύναμιν δὲ ἔχει συμπεπλεγμένην, ἐκ μὲν ἐπισκιαζόμενα τοῖς κόραις καθαίρει· ψωριάσεις δὲ καὶ ὅτι τοῖς βλεφάροις, καὶ κοσμοῖς καὶ τὰ παλαιὰ ῥεύματα θεραπεύει· ποιεῖ δὲ καὶ

V. σκληρύνει τὴν μείζω

Quidam addunt μέσον θερμαῖ τῇ ψυχρᾷ

Ita vet. cod. non habetur in Or. balsus καμεῖν

Lycium, quod aliqui pyxacantham vocant, arbor eſt ſpinoſa, virgis trium cubitorum, aut etiam longioribus, circa quas folia ſunt buxo ſimilia, denſa. Fructum habet piperis inſtar nigrum, amarú, denſum, læuem: corticem verò pallidum, lycio diluto ſimilem, & radices numeroſas, obliquas, lignoſas. Naſcitur plurimũ in Cappadocia, Lycia, pluribúſque alijs locis. Aſpera loca amat. Succus elicitur radicibus cum frutice ipſo tuſis, & per dies multos maceratis, deindéque coctis: ac tùm ligna quidem abijciuntur, liquor verò iterum coquitur, donec mellis craſſitudo fiat. Adulteratur amurca inter coquendũ admixta, aut abſinthij ſucco, aut felle bubulo. Quod porrò ſpumoſum innatat inter coquendũ eximito, & ad oculorum medicamenta reponito: reliquo ad alia vtitor. Simili modo & è fructu expreſſo & inſolato ſuccus elicitur. Optimum eſt lycium, quod igni accenditur, quódque dum reſtinguitur, rubẽtem ſpumam edit, extrinſecus nigrum, intus verò cùm diſſecueris fuluum, minimè viroſum, cum amaritudine aſtringens, colore croceo: quale eſt Indicũ, reliquo præſtantius atque efficacius. Vim habet aſtrictoriam: quæ pupillis caliginem offundunt exterit, palpebrarũ ſcabiem, pruritus veteréſque fluxiones ſanat. Facit & illitum

πρὸς αὐτὰ πυορροοῦντα, πτίαθμα, οὖλα ἑλκωτὰ ἢ διερρωγότα χείλη, ῥαγάδας ὀ δακτυλίοις, καὶ πτερύγια ὀπτιχειρούμενον. ἁρμόζει καὶ κοιλιακοῖς καὶ δυσεντερικοῖς, πινόμενον καὶ ἐγκλυζόμενον. δίδοται δὲ καὶ αἱμοπτοϊκοῖς καὶ βιττῆσι σὺν ὕδατι, καὶ τοῖς ὑπὸ λυσσωντος κυνὸς δηχθεῖσιν ὀ καταποθὲν, ἢ σὺν ὕδατι ποτὸν ξανθίζει τὰ καὶ βίχας· πτερυγίας τε καὶ ἕρπητας, καὶ σπιλάδας ἰᾶται· ἴσχει δὲ ῥοιῶν γυναικεῖον προσλαμβανόμενον· βοηθεῖ δὲ καὶ λυσσοδήκτοις πολὺν μεθ' ἁλὸς, ἢ αὐτὴ καταπλικὴ λαμβανομένη. Λέγεται δὲ ὃ Ινδικὸν Λύκιον γίνεσθαι ὑπ' ἀκάνθης, ᾧ λεγομένης λεβηθίδος. ἔστι δὲ εἶδος ἀκάνθης, ῥάβδους ἔχουσα ὀρθὰς, τετραπήχεις ἢ ἐλάττους πολλὰς ἀπὸ τῆς πυθμένος, παχυτέρας βάτου. φλοιὸς ῥαγὶς ἐνερυθὴς· τὰ δὲ φύλλα ὅμοια ἐλαίᾳ, ἧς ἡ πικρὰ ἐν ὄξει ἐψηθεῖσα καὶ πολυχρόνιον ἰσχιάσεις φλεγμονὰς σκληρὰς ἐκτὸς ἰᾶται, καὶ καθάρσεις γυναικείας ἄγει. καὶ ὠμὴ δὲ λεῖα πολυθεῖσα, τὰ αὐτὰ ποιεῖ· καταδίδοται. τῶν δὲ σπέρματος μύστρα δύο πολύτα, ὑδατώδη καθαίρει, καὶ θανασίμοις βοηθεῖ.

A

V. ἀκανθώδης καὶ ἰξώδης

Deest ἢ in Ald. & Pal.

Marc. & Corn. hæc quia redundãt expungũt, & legunt φοινικοβαλάνου ἢ πάνυ &c. Al. μάλιστα, vt Ruell. Hæc ad capitis vsque finem minime Ignima esse suspicatur Marcellus.

V. λιπαρὸν

Al. διαχωρήσεων

Quidam connectũt ἰσχίας

V. καταδίδονται

Περὶ Ακακίας. Κεφ. ρλ'γ.

ΑΚΑΚΙΑ φύεται ἐν Αἰγύπτῳ· ἄκανθα δὲ ἐστι δενδρώδης, θαμνοειδὴς, οὐκ ὀρθοφυὴς, αὐτὸς ἔχουσα λευκὸν, ᾧ δὲ καρπὸν ὥσπερ θέρμον ἐν λοβοῖς κείμενον, ἐξ οὗ ἐκθλίβεται ὅ εἰς χύλισμα ξηραινόμενον ἐν σκιᾷ, μέλαν μὲν ἐν τῷ πεπέρει καρπῷ, ὑπόξανθον δὲ ἐκ τῶν ὠμῶν. ἐκλέγουσι δὲ τὸ ἡδύσμα εὐῶδες, ὡς ἐν ἀκακίᾳ. χυλίζουσι δέ τινες καὶ τὰ φύλλα σὺν τῷ καρπῷ. ἐκ κόμμι δὲ ἐκ τῆς ἀκάνθης θυνᾶται. Δύναμιν δὲ ἔχει συστατικὴν, ψυκτικήν. ἁρμόζει δὲ ὁ χυλὸς πρὸς τὰ ὀφθαλμικὰ ἐν ἐρυσιπέλασι, ἕρπησι, χάλαζαι, πτερύγια, τὰ ἐν τῷ σώματι ἕλκη. ἐκ προπτώσεις δὲ ὀφθαλμῶν καθίστησιν· ἐπέχει δὲ ἐκ ῥεῦν γυναικεῖον. ἐκ τὰς προπτώσεις δὲ τῆς ὑστέρας τίλλει, κοιλίαν τε ῥέουσαν ἐπέχει πινόμενος, τὰ ἐγκλυζόμενος· μιγεὶς δὲ ἐκ βίχας. πλύνει δὲ καὶ εἰς τὰ ὀφθαλμικὰ, τερεβινθίου μετ' ὕδατος ἀποχεομένου τῶν

V. ἀκακίδος

V. τὸν καρπὸν ὥσπερ θέρμον κείμενον

V. χύλισμα

Pal. ἐκ τὸ κόμμι δὲ ἐκ τῆς ἀκάνθης ἐξιᾶται αἷμα

Ald. χαμαίθλας v. χαμαίθλας

V. περίλαβον ἐφίσχει τὸ ὕδωρ

A ad aures purulentas, tonsillas, gingiuas exulceratas, labiorum fissuras, sedis rimas & attritus. Cœliacis & dysentericis tum potum tum etiam infusum conuenit. Datur & sanguinẽ excreantibus atque tussientibus ex aqua: itémque a rabioso cane demorsis, cataportij instar deuoratum aut ex aqua bibitum: B flauos facit capillos: reduuijs, herpetibus putrescentibúsque vlceribus medetur: fluxum muliebrem appositum sistit, & à rabiosis animalibus demorsis, seu in lacte bibitum, seu cataportij vice assumptum, auxiliatur. Fertur & Lycium Indicum fieri ex frutice, lonchitide appellato. Est is è spinarum genere, C virgas habens rectas tricubitales aut etiamnum maiores à fundo numerosas & rubo crassiores. Ruptus cortex rubescit: folia verò oleæ similia visuntur. Herba in aceto decocta propinatáque proditur lienis inflammationibus regióque morbo mederi, & fœminarũ purgationes elicere. Cruda quoque trita in D potu eadẽ præstare traditur. Seminis mystra duo epota aquosa expurgãt, súntque aduersus lethalia medicamenta remedio.

De Acacia. Cap. CXXXIII.

ACACIA in Ægypto nascitur, spina ad arboris magnitudinẽ accedens fruticosa, in rectum minimè assurgens, florem habẽs candidum, fructum verò lupini in modum, siliquis inclusum. Ex eo succus exprimitur, qui in vmbra siccatur, niger quidem ex maturo fructu, subfuluus autem ex immaturo. Eligito modicè fuluum & odoratum, vt in acacia esse potest. Sunt qui è folijs vnà cum ipso fructu succum exprimant. Manat & gummi ex ea spina. F Vim habet astrictoriam & refrigerantem. Conuenit porrò succus ad oculorum affectus, erysipelata, herpetas, perniones, pterygia & oris vlcera. Quin & procidentes oculos in integrum restituit, fluxum muliebrem sistit, ac ipsius etiam vuluæ procidentias cohibet: alui quoq; profluuia supprimit tum potus, tum etiam infusus: G capillos itidem denigrat. Lauatur & ad oculorum medicamenta cum aqua tritus, effuso identidem quod

in ſummo concreuerit, donec pura ſuperſtet aqua: atque ita in paſtillos cogitur. Vritur & in olla cruda fornaci inditus, tandiúque relictus dum & ipſum fictile percoquatur. Torretur & ſuper carbonibus, igne follibus ventilato. Spinæ verò decoctum ſolutos artus fotui committit. Præfertur eius ſpinæ gummi vermiculatum, vitrum referens, pellucidum, ligni expers: proximum eſt candidum: reſinoſum verò ac ſordidum, inutile. Vim habet ſpiracula cutis obſtruendi, medicamentorúmque acrium quibus admiſcetur vires hebetat: nec non ex ouo illitum ambuſta minimè patitur in puſtulas erumpere. Altera quoque acacia in Cappadocia Pontóque prouenit, Ægyptiam referés: ſed longè minor, humilis, ac tenerior, aculeis vallorum in modum obſita, foliis prædita rutæ ſimilibus. Autumno ſemen profert lenticula minus, in folliculis connexis ternûm quaternúmve capacibus. E tota planta ſuccus expreſſus etiam aſtringit, ſed viribus inferior, & oculorum medicamentis haudquaquam eſt idoneus.

De Amurca. Cap. CXXXVIII.

AMVRCA eſt expreſſæ oliuæ veluti fæx & craſſamentum. Ea in aheno cupreo ad craſſitudinem mellis decocta aſtringit, eoſdémque quos lycium præbet effectus: ex abundanti verò facit ad dentium dolores & vulnera, cum aceto, vino aut mulſo illita. Additur & in oculorum medicamenta, eáque quæ ſpiracula cutis obſtruendi vim habent. Inueterata melior euadit. Sedis, genitalium & vuluæ exulcerationi vtiliter infunditur. Dentes quoque corruptos extrahit, cum omphacio ad mellis craſſitudinem cocta & oblita. Scabiem iumentorum cum lupinorũ & chamæleontis decocto peruncta ſanat. Cruda vero & recens podagricos & arthriticos calente fotu iuuat. Velleri inducta & hydropicis impoſita, tumoris molem reprimit.

Plin. tauſoros vocat, ſcribit.

Α ὅτι πάχυ, ἄχρις αὖ καθαρὸν ἐφιςῆται τὸ ὕδωρ, καὶ οὕτως ἀναλαμβάνεται εἰς ἐγχύσεις. καίεται δὲ ὁ ὠμὸς χύτρᾳ μετὰ κεράμου ἐν καμίνῳ· ὀπτᾶται δὲ ἐπ' ἀνθράκων ἐκ φυσατηρίου· τὸ δὲ τῆς ἀκανθης ἔψημα κατόπτλουμένοις, ἀγρίαν ἀλγυμένα ἴσησι. Τὸ δὲ κόμμι τῆς ἀκαν-

Β θης διαφέρει ὁ σκωληκοφὰς, μελίζων, διαυγὴς, ἄξυλον, εἶτα ὁ λευκόν. τὸ δὲ ῥυπιῶδες καὶ ῥυπαρὸν, ἄχρηστον. Δύναμιν δὲ ἔχει πρὸς ἔμπλαστικὸν, ἀμβλωθριτικὸν δριμέων φαρμάκων οἷς μίγνυται. πνεικαυστὰ τε ἐκ ἐᾶ φλυκταινοῦσθαι καταχριόμενον μετ' ὠοῦ. Φύε-

C ται δὲ καὶ ἑτέρα ἀκακία ἐν Καππαδοκίᾳ καὶ Πόντῳ, παρεμφέουσα τῇ Αἰγυπτίᾳ. ἐλάττων μὲν τὸ μέγεθος καὶ χαμαίζηλος, καὶ πυκνοφυέστερος· ἀκάνθαις δὲ ἀκαλύφοις σκληροῖς, φύλλα ἔχουσα πηγανίῳ ὅμοια. τὸν δὲ φθι-

D νοπώρῳ φέρει σπέρμα ἐν θυλάκοις συνεχομένοις, τεττάρων ἢ πέντε καρύων, ἐλάττους φακοῦ. χυφὴ δὲ καὶ αὕτη χυλίζουσα σύμπασα, πλὴν ἥττων τῇ δυνάμει καθήκει, εἰς τὰ ὀφθαλμικὰ αἰεπιτήδειος οὖσα.

Περὶ Ἀμόργης. Κεφ. ρλδ'.

Hoc caput alibi repone poſt CXXXIX. Oribaſio.

ΑΜΟΡΓΗ ὑποσάθμη ὅστις ἐλαίας τῆς ἐκθλιβομένης, ἥτις ἐψηθεῖσα ἐν

Β χαλκῷ πυρείῳ μέχρι μελιτώδους συστάσεως, χυφὴ· ποιοῦσα πρὸς ἃ καὶ τὸ λεῖον, ἐκ θείου· δὲ καὶ πρὸς ὀδόντων ἀλγίας καὶ τραύματα, ὑπεγχριομένη μετ' ὄξους ἢ οἴνου ἢ οἰνομέλιτος· μίγνυται δὲ καὶ ὀφθαλμικαῖς δυνάμεσι καὶ ἐμπλαστικαῖς· παλαιουμένη τὸ βελτίων γίνεται

F ἔγκλυσμά τε ἕδρας ἐς αἰδοίῳ ἐς μήτρας εἰλκωμένας δεῖ· χρήσιμος. ἐκβαλλὲ δὲ καὶ σὺν ἐφαρμόσεσι ὀδόντας σὺν ὁμοφακίνῳ ἐψηθεῖσα ἄχρι μελιτώδους συστάσεως, καὶ ἐπιπλασθεῖσα· ψώρας τε κνησμὸν σὺν ὑδρομέλιτι ἀφεψήματι καὶ χα-

G μαιλέοντος καταχριομένη θεραπεύει. ἡ δὲ ἀνέψητος ἐς προσφατους ποδαγρικοὺς καὶ ἀρθριτικοὺς ὠφελεῖ, θερμὴ· κατόπτλη-

θεῖσα ἐγχριομένη δὲ εἰς κοιλίαν καὶ ὑπολυομένη ὅτι τὸ ὑδρωπικὸν ἐλλεῖ τὸν ὄγκον.

Περὶ Ἀγνοῦ. Κεφ. ρλέ.

Ἄγνος ἢ λύγος θαμνός ἐστι δενδρώδης, παρὰ ποταμοὺς καὶ πεδίοις ὑγροῖς, τραχίσπιτα τόπους καὶ χαράδρας φυόμενος, ῥάβδους ἔχων δυσθραύστους, μακράς. φύλλα δὲ ὡς ἐπὶ ἐλαίας, ἁπαλώτερα δὲ καὶ μείζονα. τὸ δ' ἄνθος ἐστὶ μὲν τὸ λευκὸν σὺν τῷ πορφυρίζοντι· ἔστι δὲ, ὃ πορφυροῦν φέρει· σπέρμα δὲ ὡς πίπερι.

Δύναμιν δὲ ἔχει θερμαντικὴν, συπτικήν. ὁ δὲ καρπὸς αὐτῆς πινόμενος βοηθεῖ σπληνικοῖς, καυστικοῖς, ὑδρωπικοῖς· καθαίρει δὲ καὶ γάλα, καὶ ἔμμηνα ἄγει πινόμενος ὅσον ⊀ δ. πλῆθος σὺν οἴνῳ· ἐκλύει δὲ καὶ γονήν. ἄπλεῖ δὲ καὶ φθίσεις, καὶ χάρον ἐπιφέρων. τὸ δὲ ἀφέψημα τῆς ῥίζης καὶ τοῦ σπέρματος, εἰς ἕλκη θήματα τῶν αἰδοίων ὑγίεια διαδίδοσι καὶ φλεγμονὰς ἀρύει· πολὺν δὲ μετὰ γλήχωνος καὶ ὑποζυμαδὲς τὸ σπέρμα ἐπιτιθέν, καθαρσιν καὶ λύει δὲ καὶ κεφαλαίας κεκαπλασμένον, ἐπὶ ληθαργικῷ τε καὶ φρενιτικῶν ἐμβρέχει δὲ σὺν ὄξει καὶ ἐλαίῳ καὶ τοῖς φύλλα ὑποζυμώσασά τε καὶ ὑποστρωννύουσα, θηρία διώκει, καὶ κεκαπλασμένα ἐπὶ τῶν θηριοδήκτων δοκεῖ, σκληρίας τε διδύμων μετὰ ῥητίνης καὶ φύλλων ἀμπέλου μαλάσσει, ῥαγάδας τε τοῖς ἐν δακτυλίῳ σὺν ὕδατι ἐπιπλασθὲν δὲ σπέρμα θεραπεύει· σὺν δὲ τοῖς φύλλοις, ἑρπύματά τε καὶ θαύματα ἰᾶται. δοκεῖ δὲ καὶ καλυτήριον εἶναι τῶν ὀδοιπορίας πλανωμένων, εἴπερ ῥάβδον αὐτῆς παρὰ χεῖρα κρατῶν. αὐόμενοι δὲ ἅγνος, διὰ δὲ τοῖς ἐν τοῖς Θεσμοφορίοις ἁγνεύουσαι γυναῖκες εἰς ὑπόστρωμα χρῶνται αὐτῇ· λύγος δὲ διὰ τὸ εὔθετοι τοῖς ῥάβδοις αὐτῆς εἶναι.

Περὶ Ἰτέας. Κεφ. ρλϛ'.

Ἰτέα δένδρον ἐστὶ πᾶσι γνώριμον, οὗ ὁ καρπὸς καὶ τὰ φύλλα καὶ ὁ φλοιὸς καὶ ὁ χυλὸς συπτικὴν ἔχει δύναμιν. ἁρμόζει δὲ τὰ φύλλα λεῖα μετὰ ὀλίγου πεπέρεως καὶ οἴνου πολλοῖς εἰλεώδεσι καθ' ἑαυτὰ δὲ σὺν ὕδατι ληφθέντα, ἀσυλληψίας καὶ ἐκβολὰς ἔχει. ὁ δὲ καρπὸς πολλοῖς, αἱμοπτοϊκοῖς ὠφελεῖ. ἔστι δὲ ὁ φλοιὸς δὲ τὰ αὐτὰ δρᾷ. κεῖται δὲ καὶ φυραθεὶς ὄξει, τύλους καὶ ἕλκη αὐτοῖς καλαπλασθέν-

Vulg. exēpl. non habent καὶ πεδίοις.

Deest in vulgatis exempl. Sed restituimus ex vet. codice, quē secutus est Serapio.

V. caret.

V. caret. V. subdit: ἢ χρεῖαι ἐπιγενόμεναι τοῦ ἐμμήνου.

Hæc in veteri desunt.

V. ἰωτὸς δ' καὶ ἢ τῶ σπέρμα εἰς ὕδωρ.

V. ἀφεψήματα

V. ἀπολεπίζει

Vulg. ἑρπυμαλά τε καὶ θαύματα ἰᾶται.

In vet. cod. deest τοῦτο

In ver. cod. desunt καὶ ὁ χυλὸς

A Vitice. Cap. CXXXV.

Vitex siue lygos frutex est in arborem assurgens, qui in fluminũ ripis campisque palustribus nascitur, nec non & in locis asperis ac salebrosis. Virgulta gerit fractu contumacia & longa: folia verò oliuæ, sed teneriora atque maiora. Florem est quæ album cum aliquatenus purpureo mittat, altera purpureum profert: semen est piperis instar. Porrò excalfactoriam astringentémque vim sortitur. Fructus eius epotus à serpente demorsis, lienosis & hydropicis auxiliatur. Lactis abundantiam facit, mensésque ciet drachmæ pondere in vino potus: genituram quoque exoluit: caput verò tentat, soporémque infert. Herbæ ac seminis decoctum ad infessus vuluę affectibus & inflãmationibus opitulatur. Semen cum pulegio potum, suffitu etiam & appositu, purgationes mouet: dolorem quoque capitis dissoluit illitum. Cum aceto & oleo lethargicorũ phreniticorúmque capitibus instillatur. Quin & folia tũ suffitu tum etiam substratu venenata fugant: contra venenatorum morsus adhibita auxiliantur. Testium duritias cum butyro vitiúmque folijs emolliunt. Rimas sedis semen cum aqua illitum mitigat: cum folijs verò, luxatis vulneribúsque medetur. Creditur & viticis virga interrigines arcere, si eam viator dum iter facit manu teneat. Cæterùm frutex hic Græcis agnos, quasi castus, nominatus est, quòd in Thesmophorijs matronæ castitatem custodientes eo ad strata vterentur: lygos verò, quasi vimen, dictus est, propter virgarum ipsius firmitatem.

De Salice. Cap. CXXXVI.

Salix arbor est vulgo nota: cuius fructus, folia, cortex & succus astringendi vim habent. Trita folia cum exiguo pipere & vino pota, ileosi subueniunt. Sumpta verò per se cum aqua, conceptum impediunt. Fructus epotus sanguiné expuentibus prodest: quin & cortex eadem præstat. Vitus verò & aceto subactus, callos clauósq; illitu tollit.

Pl. expuentibus

Pl. aqua mixtæ

Ex foliis & cortice ſuccus cum roſaceo in calyce punici calfactus, aurium doloribus auxiliatur. Sed & eorum decocto foueri podagras vtiliſſimum: id furfures quoque detergit. Excipitur & ex ipſa ſuccus, inciſo dum floret cortice: intus enim concretus inuenitur. Vim porrò habet ea expurgádi, quæ pupillis caliginem offundunt.

Pl. oculis obſunt

A οθείς. ὁ δὲ ἐκ τῶν φύλλων καὶ τοῦ φλοιοῦ χυλὸς, ὁ καλύφωρος θερμανθεὶς μετὰ ῥοδίνου, ὠταλγίας ὀρθῶς. καὶ τὸ ἀφέψημα δὲ αὐτῶν, κατάπλασμα ποδάγρας ἄριστον· σμήχει δὲ καὶ πίτυρα. λαμβάνει δὲ καὶ ὀπὸς ἐξ αὐτῆς ἐντιμοτάτην τοῦ φλοιοῦ χρῆσιν. ἔστω γὰρ ὠφελοῦσα

B σαπρούς. Δύναται δὲ ἔχειν σμηκτικὴν τῶν ἐπισχοπούντων ταῖς κόραις.

V. ὠτολγίας:

De Oleaſtro. Cap. CXXXVII.

SYLVESTRIS olea, quam nonnulli cotinum, alij Æthiopicam oleam appellant, folia habet aſtringendi vi prædita: quæ quidem trita & impoſita, eryſipelata, herpetas, epinyctidas, carbunculos, nomas reduuiáſque cohibent. Cruſtas eadem emarginant cum melle illita. Quinetiam vlcera ſordida repurgant, panos & inflammationes cum melle impoſita diſcutiunt, & cutem à capite auullam agglutinant. Oris etiam vlceribus & aphthis commanducata medétur. Sed & eorum ſuccus ac ipſum etiam decoctum eoſdem habent effectus. Admotus quoque ſuccus ſanguinis eruptionem, fluxum muliebrem, oculorum ſtaphylomata puſtuláſque inhibet: inſupérque vlcera veteréſque defluxiones ſiſtit. Quapropter etiam in collyria ſi addantur, genarum eroſionibus conferunt. Ad exprimendum verò ſuccum folia tundere oportet, & affuſo vino aut aqua exprimere, illúmque ſole ſiccatum in paſtillos digerere. Eſt porrò qui cũ vino exprimitur tum valétior, tum ad recondẽdum aptior eo qui cum aqua expreſſus fuerit. Facit & ad aures purulétas atque exulceratas: folia cum hordeacea farina illita cœliacis conueniunt. Vruntur autem cum floribus folia, vt ſpodij vicem præſtét, in olla cruda, cuius os luto ſit oblitum, vſque dum figlinum percoquatur: deinde vino reſtinguuntur, iterúmque vino ſubacta eodem modo cremantur: poſtremò ceruſſæ modo lauantur, & cogũtur in paſtillos. Cæterùm creduntur vſtionis eiuſmodi ratione in medicamentis oculorum ſpodio minimè cedere: quare & iiſdem viribus pollere cenſendum eſt.

Περὶ Ἀγριελαίας. Κεφ. ρλζ.

ἈΓΡΙΕΛΑΙΑ, ἣν ἔνιοι κότινον καλοῦσιν, οἱ δὲ, Αἰθιοπικὴν ἐλαίαν, ἔχει τὰ φύλλα συντικὰ· λεῖα δὲ καὶ πλατέντα, ἐφεκτικὰ ὄντα ἐρυσιπελατώδων, ἑρπήτων,

C ἐπινυκτίδων, ἀνθράκων, νομῶν, πρὸς ἰωνυχίαν, καταχραντικά τι ἐχόντα, σὺν μέλιτι καταπλασσόμενα· ἀναχαιτίζει δὲ τὰ ῥυπαρὰ ἕλκη, διαφορεῖ καὶ φύγεθλα καὶ φλεγμονὰς, σὺν μέλιτι καταπλασσόμενα, καὶ δέρμα κεφαλῆς ἀποπλατύνει τριχολλᾷ· ἰᾶται δὲ καὶ τὰ ἐν στόματι ἕλκη καὶ

D ἄφθας διαμασσόμενα. ἔστι δὲ ὁ χυλὸς δ' αὐτῶν καὶ τὸ ἀφέψημα, ὅ αὐτὸ ποιεῖ· ἐπέχει δὲ καὶ αἱμορραγίαν, καὶ ῥοῦν γυναικεῖον προσπάλλει δὲ ὁ χυλὸς, καὶ τὰ ἐν ὀφθαλμοῖς σταφυλώματα, καὶ φλυκταίνας. ἐπὶ δὲ ἕλκη καὶ παλαιὰ ῥεύματα σὺν μέλιτι. δεῖ δὲ μιγνύειν κολλυρίοις φρὸς τὰς τῶν βλεφάρων

E διαβρώσεις βύπτειν. χυλίζονται δὲ δεῖ κόπτειν τὰ φύλλα, καὶ καταχέοντας οἶνον ἢ ὕδωρ ἐκθλίβειν, καὶ ξηραίνοντας ἐν ἡλίῳ αὖα πλάσσειν. ἔστι δὲ βότρυωτερος, ὁ διὰ τοῦ οἴνου ἐκθλιβόμενος, καὶ εἰς ἀπόθεσιν μᾶλλον· τὸν δ' ὕδατος ἁρμόζει. ποιεῖ δὲ καὶ φρὸς

F ὦτα πυορροοῦντα καὶ εἰλκωμένα. τὰ δὲ φύλλα καὶ ἐπὶ χιλιακοῖς βύπτειν καὶ διαπλασσόμενα σὺν ὠμῷ λύσει· καίεται δὲ τὰ φύλλα μετὰ τῶν ἀνθῶν, καὶ αὖται ταυτοδίου λαμβάνει δὲ τὸ χύτρα ὠμὴ περιπλασσομένη πηλῷ ὃ στόμα μέχρις ὀπῆσαι τοῦ κεράμου. ἔπειτα καίεσθαι ἐῶσι, καὶ φυραθέντα πάλιν οἴνῳ, ὁμοίως καίεται. εἶτα πλύνεται ὡς τὸ ψιμύθιον καὶ ἀναπλάσαι). δοκεῖ δὲ ἡ διαυτὴ καῦσις μὴ λείπειν τοῦ ταυτοδίου εἰς τὰ ὀφθαλμικά. ὅθεν καὶ τὴν δύναμιν ὁμοίως ἡγητέον.

Pl. ἀγριελαία

Ita Flor. at vulg. exēpl. διαδύσει

In vet. τῶν δ' ὑδάτος non legitur.

V. αἰσθάνεται τὸ ταυτοδίου χύτρ.

Al. δύναται

V. δυνάμεως

Nota cum præcedenti capite in veteribus codicib. sunt continua.

Περὶ Ἐλαίας. Κεφ. ρλή.

Δυώπαγ δὲ ζᾷ αὐτὰ καὶ τὰ τῆς ἡμέρου ἐλαίας φύλλα, λείπεται δὲ τῇ δυνάμει ὅθεν πρὸς ζᾷ ὀφθαλμικὰ μᾶλλον ἁρμόζῃ. δηλοῖ τὸ ὑπεφλίσιεγ. ὃ δ' ἂν χλωρῷ ἢ ξόλῳ καιομένῳ ἐκπρίσμενον ὑγρὸν, πίτυρα καὶ ψώρας καὶ λέπρας καταχριόμενον ἰᾶται· καὶ ὁ καρπὸς δὲ αὐτῶν καὶ τὰ πλατθὶς, πίτυρα καὶ νομὰς θεραπεύει. ὃ δὲ ἐντὸς τοῦ πυρῆνος μετὰ νίτρου καὶ ἀλθύρου λευκοὺς ὄνυχας ἐκπναίει.

V. καὶ δὲ ὁ τῆς πυρῆνος ἐντὸς μετὰ &c.

Περὶ Κολυμβάδων ἐλαιῶν. Κεφ. ρλθ'.

Ἐλαῖαι κολυμβάδες λεῖαι καὶ ἀπλαθεῖσαι, πυρίασις ὑκ ἐῶσι φλυκταινᾶσθαι, καὶ ῥυπαρὰ δὲ ἕλκη καθαίρουσι. ὁ δὲ ἐκ τῶν ἥμισυς χυλὸς αὐτῶν ἀφεκλυζόμενος, οὖλα σέλλει, καὶ ὀδόντας στομώσεις κρατύνει. ἔστι δὲ ἡ μὲ ὑπόκιρρος καὶ πρόσφατος ἐλαία, δυσκίλιος, δύσπεπτος καὶ κακοστόμαχος, ὀφθαλμοῖς τε ἀνεπιτήδειος καὶ κεφαλαλγής. φρυγθεῖσα δὲ καὶ ἀπλαθεῖσα, νομὰς ἴσχει, καὶ ἄνθρακας παρίστησι.

V. ἐστὶ δὲ ἡ ὑπωρεσίδιος ἐλαία.

Al. κεφαλῇ

Περὶ ἐλαίου ἀγρίας ἐλαίας. Κεφ. ρμ'.

Τὸ δὲ ἐκ τῆς ἀγρίας ἐλαίας ἔλαιον, διάκλυσμα οὔλοις μυδῶσι, καὶ σαλιχνὸν ὑποσάλλον ὀδόντων ὄζει, πυεία τε δι' αὐτοῦ θερμαινομένου καὶ * διακλυζομένῳ ὅπῃ τύθηθος οὔλοις ῥυμαπιζομένοις. δεῖ δὲ ἔλαιον μιλωτῇ παρεπιθύειν ἀποβάπτειν εἰς τὸ ἔλαιον, καὶ παρυσταπτεσθαι τοῖς οὔλοις, ἀγρίας αὖ λευκὰ φανῇ.

Hæc velim transferri cap. de amygd.

Al. μυδῶσι

V. caret. Corrige διϋγιεμένου Hæc desunt in Ald. & veteri codice vsque ad ἄχρις αὖ &c.

Περὶ δακρύου ἐλαίας Αἰθιοπικῆς. Κεφ. ρμά.

Τὸ δὲ δάκρυον τῆς Αἰθιοπικῆς ἐλαίας, ἔοικέ πως σκαμμωνίᾳ, ἔγκιρρον, ὑκ μικρῶν καθόλων συνκείμενον, δηκτικόν· ὃ δὲ ὅμοιον κόμμι τῇ ἀμμωνιακῷ, μελανίζον τῇ δ' δηκτικὸν, ἀχρηστον. φέρει δὲ τὸ τοιοῦτον ἡ πρὸς ἡμῶν ἐλαία, ἡ ἀγριελαία. ποιεῖ δὲ πρὸς ἀμβλυωπίαν, καὶ οὐλὰς τῇ λευκώματα ἐγχριόμενον σμήχει, οὖρά τε καὶ ἔμμηνα κινεῖ, καὶ πρὸς ὀδόντων πόνους ἐπαρκεῖ, ἐπιθήμενον εἰς τὸ βρασμα.

V. caret & pro μυδῶσι μυδῶντα habet μῦσα καὶ ὄζει. V. δὲ τῇ τοιοῦτον ἀπὸ

V καὶ ἀμβλυωπίαν

V καὶ ἀμβλυωπίαν καὶ ὀδόντων πόνους ἀπὸ θυμ.

De Olea. Cap. CXXXVIII.

Ijsdem prædita sunt viribus & oleæ satiuæ folia, sed aliquanto minore efficacia: quare oculorum medicamentis ob suam vim mitiorem conuenientiora sunt. Qui verò humor ex accenso virente ligno emanat, furfures scabiem & lichenas illitu sanat. Quin & fructus earum furfuribus ac nomis seu depascētibus vlceribus medetur. Quod autem intra nucleum est, cum adipe & farina scabros vngues excutit.

De Colymbadibus oliuis. Cap. CXXXIX.

Oliuæ colymbades tritæ & ambustis illitæ pustulas gigni prohibent, ac sordida etiam vlcera purgant. Succus autem ipsarum ex muria collutione gingiuas contrahit, emotósque dentes stabilit. Est porrò oliua subfulua ac recens aluo incommoda, sed stomacho vtilis. Nigra verò & matura corruptioni opportuna stomachóque aduersa est, ac tum oculis minimè cōuenit, tum capitis etiam dolores inducit. Torrefacta autem ac illita nomas sistit, & carbunculos emarginat.

De syluestri oliuæ oleo. Cap. CXL.

Syluestris oliuæ oleum ad gingiuas vligine putri laborantes colluitur, dentésque labantes confirmat. Eiusdem calfacti & excolati fotus gingiuis fluxione tentatis est accōmodatus. Lanam porrò specillo circundatam in oleum demergere oportet, ac gingiuis tantisper adhibere, dum albæ conspiciantur.

De oleæ AEthiopicæ lachryma. Cap. CXLI.

Æthiopicæ oleæ lachryma quodammodo scammonio similis est, fulua, stillis constans exilibus, atque mordax. Quæ verò gummi & ammoniaci similitudinē refert, colore nigricans, nec gustu mordens, inutilis censetur. Nostrates oleæ oleastríque talem lachrymā ferūt. Facit porrò illa ad visus hebetudines, & oculorum citratrices albuginésque illita emendat, vrinas mensésque ciet: eorū dentiū cauis indita, ad eorum dolores efficaci est auxilio.

In me-

In medicamenta quoque exitiali vi prædita referitur, partúmque etiá pellit: sed impetiginibus ac lepræ medetur. Appellatur autem Æthiopica olea etiam olea sylvestris.

De Quercu. Cap. CXLII.

QVERCVS omnibus sui partibus astrictoriam vim habet: maximè verò astringit mẽbranacea tunica, quæ corticem & caudicem ipsum interiacet, similitérque tunica quæ circum glandem est calyci subiecta. Harum decoctum datur cœliacis, dysentericis & sanguinẽ excreantibus. Trita præterea illa tunica fœminis fluxione vuluę laborantibus in peso subditur.

De Glandibus. Cap. CXLIII.

Quin & glandes eosdem effectus exhibent: vrinam quoque cient, capitis dolorem & flatus in cibũ sumptæ pariunt: esitatæ verò virus eiaculantium ictibus resistunt. Earum quoque & corticis decoctum contra toxica prodest, ex lacte vaccino potum. Crudæ autem ac tritæ inflammationes illitu leniunt: cum axungia verò suilla salsa, ad malignas duritias & malefica vlcera conueniunt. Sunt porrò ilignææ glandes quernis efficaciores.

De Fago & Ilice. Cap. CXLIIII.

FAGVS & Ilex quereus genera cũ sint, similes quoque vires habẽt. Ilignææ verò radicis cortex cum aqua coctus dum mollitus intabescat, & per totam noctẽ impositus, capillos denigrat priùs cimolia terra detersos. Omnium folia tusa & trita tumoribus prosunt, & imbecillas membrorum partes corroborãt.

De Castaneis. Cap. CXLV.

SARDIANÆ glãdes, quas aliqui lopima, castaneas, amota aut louis glandes appellant, cùm & ipsæ astringant, similes quoque præbent effectus: maximè vero tunicæ quæ carnem & putamen intercurrant. Cæterùm caro ijs qui ephemerum bibernt conueniens est.

De Galla. Cap. CXLVI.

Galla fructus est quercus. Quædam omphacitis appellatur, parua quidem, sed tuberosa, grauis & nullo foramine pertusa:

A αἱ αγεφέται δὲ καὶ ἐν τοῖς φθαρτικοῖς· ἄγει δὲ καὶ ἔμβρυα καὶ λέχλιας θεραπεύει καὶ λέπρας. καλεῖται δὲ Αἰθιοπικὴ ἐλαία καὶ ἀγριελαία.

Περὶ Δρυός. Κεφ. ρμβ'.

ΔΡΥΣ πᾶσα φυτικῷ ἔχει δυνάμιν, μάλιστα δ' αὐτῆς φύφλ. δ' μεταξὺ τῆ

B φλοιοῦ καὶ τῆ περίκυου ὑμένος δύς· ὁμοίως καὶ τὸ ἀπὸ τῆ βαλάνου κατὰ τὸ κέλυφος. δίδοται δ' τὸ ἀφέψημα αὐτῆ κοιλιακοῖς, καὶ δυσεντερικοῖς, καὶ αἱμοπτοϊκοῖς· καὶ ἐν παυσὶ λφοι προσπλ. ῥοικαῖς γυναιξίν.

Περὶ Βαλάνων. Κεφ. ρμγ'.

Καὶ αἱ βάλανοι δ' τὰ αὐτὰ ποιοῦσιν

C εἰσὶ δ' καὶ ὑρηλικαὶ, καὶ καφαγμοὶς βιβρωσκόμεναι, & πθυματῶσαι ἁρμόζουσι δ' τοῖς τὰ ἰοβόλα ἐαθιόμεναι. καὶ τὸ ἀφέψημα δ' αὐτῆ καὶ τῆ φλοιῆ, βοηθεῖ τοξικῷ μετὰ γάλακτος βοείε πινόμενον. ὠμαὶ δὲ καὶ καταπλαθεῖσαι λφαι, φλεγμονὰς περιγορεῦσι σὺν ἁλὶ δ' χειρείῳ ταριχηρῷ, τοῖς κακοήθεσι σηπεδόσι, καὶ

D ἕλκεσι ποιημάτων ἕλκη ἁρμόζουσιν· ἰσχνοτέραις δ' τ' δρύϊναι αἱ πρίναι τῆ δυνάμει εἰσίν.

Περὶ Φηγοῦ καὶ Πρίνου. Κεφ. ρμδ'.

ΚΑΙ ἡ φηγὸς δ' & ἡ πρῖνος εἴδη ὄντα δρυός, ὁμοίαν ἐνεργοῦσι τῆς δ' ῥίζης τῆς

E πρίνου ὁ φλοιὸς ἐφθεὶς σὺν ὕδατι ἄχρις οὗ ταχέως ἥβηται, & ὅτι πλαθεὶς νύκτα ὅλην, πέλας μελαίνῃ τεθραμμένους κιμωλίᾳ γῆ. ἁρμόζει δ' τὰ φύλλα πτώσεσι, κοπίσι λφαι οἰδήμασι· καὶ τὰ ἄπια δ' μέρη κρατύνει.

Περὶ Καστάνων. Κεφ. ρμε'.

ΑΙ δ' Σαρδιαναὶ βάλανοι, ἃς τινες λόπιμα ἢ κάστανα καλοῦσιν, ἢ μύστα, ἢ

F Διὸς βάλανοι, σύφουσαι καὶ αὐταί, τῶν ὁμοίων εἰσὶ δραστικαί, καὶ μάλιστα & μεταξὺ τῆς σαρκὸς καὶ τῶ λέπους φλοιοί. ἡ δ' σὰρξ καὶ τοῖς ἐφημέρου πεπωκόσιν ἁρμόζει.

Περὶ Κηκίδων. Κεφ. ρμς'.

G Κήκις καρπός ἐστι δρυός. ἡ μὲν τις ὀμφακίτις καλεῖται, μικρὰ καὶ κονδυλώδης, σιβαρὰ, ἀπύρηνος.

V. add. ἡ ἔσωτ. πλοῦ

V. adde βάλανοι

V. in fine: τὰ δὲ φύλλα τῆ ὀμφακίτη πωλοῦσι τραγήματα, ἡ δυσεντερικοὶ οἱ βάλανοι (sed additamentum puto.

Al. κόπτουσι ἢ ἐρεθισμοῖς

Forte ἄμυστα vt apud Athen.

V. μετὰ τὸ λέπους ἐστὶ φλοιός.

Pal. καὶ δύν

V. ἐν ἀμφακίτῃ τε ἀμφακίτου

ἡ δὲ τῆς λᾶς, καὶ κούφη ἐστὶ καὶ πεπηγυῖα. ἐκλέγεσθαι δὲ δεῖ τὴν ὀμφακίτην, ὑπερισχύουσαν οὖσαν. ἀμφότεραι δὲ φύουσιν ἱκανῶς, καὶ φλοιοῖς λᾶαι τοῖς ὑποσαρκώσεις, ῥεύματισμούς τε οὔλων καὶ κονίδος, καὶ τοῖς ἐν στόματι ἄφθαις. ὃ δὲ μέσον αὐτῶν, βρώματι ὀδόντων ἐμπῆξαι, παύει τοὺς ὀδυνῶντας. γίνονταί τε καὶ ἴχαρμοι καυθεῖσαι ἐπ' ἀνθράκων ἄχρι πυρώσεως, καὶ κατασβεσθεῖσαι ἢ οἴνῳ ἢ ὄξει ἢ ὀξυμέλι. ὃ δὲ ἀπόζεμα αὐτῶν ποιεῖ καὶ τοὺς ἐγκαθισμοὺς, τοὺς ἐπὶ ὑγρᾶς ὑστέρας, καὶ ῥύσια ἰσμοῖς μελαίνουσι δὲ καὶ τρίχας, ἀποβαπτιζόμεναι ἐν ὄξει ἢ ὕδατι. ἁρμόζουσι δὲ καὶ κοιλιακοῖς καὶ δυσεντερικοῖς ὅπως πλατυσμένῳ οἴνῳ ἢ ὕδατι λᾶαι καὶ πινόμεναι· πῖσί τε τοὺς θρόμβους μιγνύμεναι, ἢ τοὺς ἀφιζανομένους ὅλαις ἐν τῷ ὕδατι, εἰς ὃ μέλλει τις ἕψεσθαι τῶν ἁρμοζόντων τοῖς αὐτοῖς· καὶ καθόλου ὅπου δεῖ σύψαι ἢ ἴσχαναι ἢ αἰσχυνέσαι, τούτοις λαμβάνεσθαι δεῖ τὴν χρῆσιν αὐτῶν.

altera verò plana, leuis & perforata. Eligi debet omphacitis, quippe quę sit efficacior. Vtraque vehementer astringit. Tritæ excrescentia in carne, gingiuarum & columellæ fluxiones, insuperq; oris vlcuscula cohibẽt. Quod verò in earum medio est, dentium cauernis inditum dolores sedat. Crematæ carbonibus donec igne candeant, & vino, aceto, aut etiam aceto salso extinctæ, fluentis sanguinis siſtendi vim asciscunt. Decoctum earum ad insessus efficax est contra vuluas procidentes & rheumatismos. Capillos quoque denigrant aceto aut aqua maceratæ. Cœliacis & dysentericis in aqua aut vino tritæ seu illitæ seu bibitæ conueniunt: necnon & obsoniis additæ, aut totæ in aqua priùs coctę, in qua nonnihil excoquendũ sit eorum quæ iis affectibus conferant. In summa, vbi quid astringere siſtere aut siccare opus est, vsurpandæ sunt.

Περὶ Ῥοῦ. Κεφ. ρμζ'.

De Rhu. Cap. CXLVII.

ΡΟΥΣ ὁ ὑπὸ τὰ ὄψα, ὃν ἔνιοι ἐρυθρὸν καλοῦσι, καρπός ἐστι τῆς καλουμένης βυρσοδεψικῆς ῥοός, ἣν ὡς ὀνομάσθη ἐκ τοῦ βυρσοδέψαις αὐτῇ χρῆσθαι, εἰς τὸ φύλλα τῶν δερμάτων. ἔστι δὲ δενδρύφιον φυόμενον ἐν πέτραις, ὡς δίπηχυ· ἐφ' οὗ φύλλα ὀξυμήκη, ὑποῤῥοᾶ, τὸν περσεᾶς φέρειαν ἐντὶ μικρῷ μείζω· ὁμοιοσχοῖνος, καρπὸς ὁ βοτρυώδης ἐοικὼς, πυκνὸς, καθάπερ ὁ μεγάλος τερεβίνθου, ὑποπλατὺς, οὗ ὁ περικείμενος φλοιὸς δριμύς ἐστιν· ὥστε χρῆσθαι. Δύναμιν δὲ ἔχει τὰ φύλλα συσταλτικὴν, ποιεῖ δὲ σὺν τοῖς ἄλλοις καὶ ἡ ἀκακία· μελαίνει δὲ τρίχας τὸ ἀφέψημα, δυσεντερίας τε ἐστὶ ἔγκλυσμα, καὶ πόμα, καὶ ἐγκάθισμα, καὶ ὠτων πυορροούντων ἔγκλυσμα. πτερύγια τε καὶ γαγγραίνας ἐπέχει καταπλασσόμενα τὰ φύλλα, μετ' ὄξους ἢ μέλιτος. καὶ τὸ χύλισμα δὲ τῶν φύλλων ξηρῶν ἐφυμένων σὺν ὕδατι ὥσπερ τὸ λύκιον ἄγει συσταλτικῶς μελίσσιόδες, ἁρμόζει τοῖς ὅσα καὶ τὸ λύκιον· καὶ ὁ καρπὸς δὲ τὰ αὐτὰ ποιεῖ, ἁρμόζων ἐν προσφήμασι κοιλιακοῖς, δυσεντερικοῖς

RHVS qui obsonijs aspergitur, quémque nonnulli erythron, hoc est, rubrum, appellant, fructus est rhois coriariæ sic vocatæ, quod ea coriarij ad spissanda perficiendáve coria vtantur. Est verò arbuscula in petris nascens, binũm ferè cubitorum altitudine, in qua folia sunt oblonga, subrubentia & in ambitu serrata: fructus autem racemulis similis, densus, terebinthini magnitudine, quadantenus latus, cuius corticosa tunica acinos ambiens per quàm vtilis est. Folia vim habent astringendi, & acaciæ effectus præbent. Decoctum eorum capillos denigrat: dysentericis infunditur, ab ijsdem bibitur, & ad insessum vsurpatur: necnon & purulentis auribus instillatur. Pterygia & gangrænas cohibent folia, ex aceto aut melle illita. Succus elicitur lycij in modum, aridis foliis ad mellis crassitudinem in aqua decoctis: & is quidem ad eadem ad quæ lycium conuenit. Quin & fructus eosdem exhibet effectus, ac cœliacorum dysentericorumq; obsonijs commodè inspergitur.

Contusa, desquamata liuidáque ex aqua illitus ab inflammatione vindicat: linguæ asperitates cum melle abstergit, alba ulcuscula profluuia sistit, & hęmorroidas simul cum querno carbone intrito imponitus. Huius quoque dilutum si decoquatur, cogitur coitque, ipso etiam fructu efficacius. Gummi quoque profert hæc arbuscula, quod erosorum dentium cauis inditur ad dolores finiendos.

A ἀφλέγματά τε τηρᾷ, σὺν ὕδατι καταπλαττόμενος, ἐλαφόμαλα, ἀποσύριγγα, πελιώματα· γλώσσης τε τραχύτητας σὺν μέλιτι, καὶ λευκὰ ῥοῦν ἵστησιν, αἱμορροΐδας τε ἀναπλάττει μετὰ δρυίνου ἀνθρακος λείου βαπτόμενος. καὶ τούτου ὁ ἀφεψήσας ἐλίγμους σιωΐζεται, βέλ-
B πόνας τε καρποῦ ποιοῦσι. φέρει δὲ κάμμι, ἐπὶ τοῖς βρώμασι τὴν ὀδύνην παρὰς ἀπιόσι.

Vel autumnalem fructū

Acaciæ myrobalano similis

Pal. lycium. τὸ χάμαι χλωρὸν

Marcellus, ἀφεψᾶς

V. hanc non habet Pal. ἐφεψᾶ δὲ ... Sed est ἀφεψᾶς, & sic deinceps in duali casu.

Addit Mar. ἐρύσιπελας cum pomis mulcis

Quidam hoc caput iungunt cum præcedenti.

Fibrilum ardorem

De Palma. Cap. CXLVIII.

PALMA in Ægypto gignitur. Ex ea verò fructus in medio autúmni vigore colligitur, Arabicę myrobalano similis, ac Poma dicitur, colore viridi, mali cotonei odoré referens. Quòd si ad integram maturitatem peruenire sinatur, phœnicobalanus fiet. Est porrò ille acerbus atque astringens, & contra aluí profluuia, fluxúmque muliebré in vino austero bibitur. Hęmorrhoidas quoque sistit & vulnera illitu conglutinat. Phœnicobalani verò recentes plus siccis adstringunt: sed capitis dolorem afferunt, & copiosiores in cibo sumptę inebriant. Siccæ autē sanguinem excreantes, stomachicos ac dysentericos esitatæ iuuant: necnon & tritæ cum cydonio & cerato œnanthino, vesicæ vitijs vtiliter illinuntur. Maximè verò caryotæ si comedantur, faucium asperitati medentur.

Περὶ Φοίνικος. Κεφ. ρμή.

ΦΟΙΝΙΞ ὁ Αἰγύπτιος γίνεται. τρυγᾶται δὲ μεσοπωρούσης τῆς τοῦ ὀπώρου ἀκμῆς, προσφέρων τῇ Ἀραβι-
C κῇ μυροβαλάνῳ, πῶμα δὲ λέγεται, χλωρὸς ὁ καρπὸς, ἐμφερὴς κυδωνίῳ κατὰ τὸ χρῶμα· εἰ δὲ ἀφεψηθῇ πεπαρόμενος, γίνεται φοινικοβάλανος. ἔστι δὲ τρυφερὸς, συμπικὸς, πνεύματος σὺν οἴνῳ αὐστηρῷ παρὸς διαῤῥοίαν καὶ ῥοῦν γυναικεῖον ἵστησι δὲ καὶ αἱμορροΐδας, καὶ τραύματα κολλᾷ καταπλαττόμενος. αἱ δὲ φοινικοβάλανοι, συμπι-
D κώτεραι τυγχάνουσι τῆς ξηρᾶς. κεφαλαγίας δὲ πλείους καὶ πλείονες βρωθεῖσαι μεθύσκουσιν. αἱ δὲ ξηραὶ ὠφελοῦσι διαῤῥοϊκοὺς καὶ αἱματοπτοϊκοὺς, στόμαχικοὺς, δυσεντερικοὺς, καὶ τὰ ἕδρας πάθη, καταπλασσόμεναι μετὰ κυδωνίου καὶ κηρωτῆς οἰναθίνης.
E μάλιστα δὲ αἱ καρυώτιδες ἐσθιόμεναι, ἀρτηριακὴν τραχύτητα ἰῶνται.

Περὶ Φοινίκων Θηβαϊκῶν.

Κεφ. ρνθ.

Ταῖς δὲ Θηβαϊκῇ ὁ ἀφέψημα πολὺν, παυστικὸν κατέσται, καὶ τὰς δυναμένας αἰανεῖς ποιεῖ, μετὰ ὑδρομέλιτος παλαιοῦ
F λαμβανόμενον· καὶ αὐταὶ βρωθεῖσαι, τὰ αὐτὰ ποιοῦσι. γίνεται δὲ καὶ οἶνος ἐξ αὐτῶν, τὰ αὐτὰ δυναμένους τῷ καρπῷ. καὶ καθ' ἑαυτὸ πολὺ τὸ ἀφέψημα αὐτῶν, καὶ αἱμορραγίζόμενον ἐκμυοῖ τὸ σῶμα. ὁ δὲ πυρῆνες τῶν φοινίκων καιόμενοι σὺν ὠμῇ χίτρᾳ, καθάπερ καὶ τὰ δάφνα πρό-
G τερον εἶτα σοιαθέντες οἴνῳ πλυνόμενοι, ἐπὶ τὰς κατακοπὰς τῶν βλεφάρων χρησμεύουσι, ἂν μὴ αὐστηρὸς ᾖ οἶνος, πάλιν τὸ αὐτὸ γίνεται. Δυνάμιν δὲ ἔχουσι συμπικὴν,

Alia lectio

παρεμπλαστικὴν, ποιοῦσθαι πρὸς τοὺς τὸ ὀφθαλμοῖς φλυκτίδας, καὶ φυλλώματα, μίλφας σὺν ναρδίνῳ σὺν οἴνῳ δὲ γίλλουσι καὶ ἐπαφῶσι ῥωμάτων, καὶ ἀποπλάσσουσιν ἕλκη. βύπτεται δὲ μάλιστα τὰ ἀπ' Αἰγύπτου, ἢ ἐκ τῶν χαμαιζήλων φοινίκων.

V. μίλφους
V. ἐπαφῶσι
V. τὰ ἀπὸ Αἰγύπτου ἢ χαμαι-

Περὶ Φοίνικος ἐλάτης. Κεφ. ρι'.

Φοίνιξ δέ ἐστιν ἐλάτην ἢ σπάθην καλοῦσι, τὸν ἐκφυόμενον ὑπὸ τὸν καρπὸν τῶν φοινίκων ἀκμὴν ἀνθούντων. χρῶνται δὲ αὐτῷ οἱ μυρεψοὶ εἰς τοὺς τῶν μύρων σύνθετους· ἔστι δὲ αὐτοῦ κράτιστος ὁ βαρὺς, εὔφυτος, σαρκῶδης, λιπαρὸν ἔχων τὸν χυμόν. Δύναμιν ἔχει στυπτικὴν, ἐφιστᾷ τὰ ῥεύματα τῆς ἕλκης. χαλασμοὺς τε ἄρθρων σὺν ἀλφίτοις μαλάγμασι μιγεὶς καὶ καταπλάσμασιν ὠφελεῖ· καὶ καταχύσματα καὶ τύμματα ἀποιοῦται, καὶ ὑπαιθρίους ἀγλῶσσους, μιγνύμενος τοῖς ἁρμόζουσι τῶν καταπλασμάτων. μελαίνει δὲ καὶ τείχας τὸ ἀφέψημα αὐτοῦ, σμηχόμενον σὺν τοῖς ἐπιζώμασι. πυριζόμενον δὲ, ἰσχιαδικοῖς καὶ τοῖς ἐκ πλαδίγγων καὶ σπλάγχνα ἁρμόζει, κοιλίαν τε καὶ ὑστέραν ῥυματιζομένων ἴσχιον ἀπαλεῖ δὲ σὺν ῥητίνῃ καὶ κηρῷ ὀπτηθεῖσα, καὶ ἑψηθεῖσα ἡμέρας εἴκοσι, φώκας ἰᾶται. καὶ ὁ ἐκπιεζόμενος δὲ ἀπ' αὐτῆς καρπὸς, ἐλάτη καλεῖται, ἀπ' ἐνίων δὲ βόεσσος· καὶ αὐτὸς στυπτικὸς ὢν τὰ αὐτὰ δρᾷ τῇ σπάθῃ, χωρεῖς τῆς ἐν τοῖς μύσεσι δυσχρησίας, καὶ τὸ ἐξηρθρίον δὲ τῶν πρέμνων λιχνεῖ καὶ αὐτὸ προσφάτου βιβρωσκόμενον καὶ ἀφεψόμενον, ποιεῖ πρὸς ὅσα καὶ ὁ βόεσσος.

V. ἰσχιῶσιν
V. χαλάσματα ἄρθρων
V. ἰσχιαδικοῖς καὶ τοῖς ἐκ πλαδίγγων
V. ἀπὸ σπλάγχνων
V. ἀπὸ ἢ καὶ ῥητίνῃ σὺν κηρῷ ὀπτηθεῖσα ἡμέρας κ. ἑψηθεῖσα
Al. βόεσσος.
In v. desunt ἢ ἐκπιεζόμενος
Ald. βόεσσος. al. βοεσσος.

Περὶ Ροᾶς. Κεφ. ρια'.

Ροα πᾶσα βύπτει, βύσσει μάλιστα, ἄνθος· τούτων μὲν τὸ ἡμερικὸν βύσσει μαλακώτερα, δριμείαν ποιεῖ ἡδονὴν ἐν τοῖς στόμαχοις, καὶ πνευματοῖ. ὅλον ἐπὶ μὲν τῶν πυρεσσόντων ὄχλον ἄγει· ἡ δὲ ἐξ αὐτῆς καυσουμένῳ στομάχῳ συνήδεται, ἐν ὀξυπυρετοῖς δὲ ἀπεχθεστέρα καὶ οὐρητικωτέρα. ἄσμος δὲ, ἐκ στυπτικῆς ἡ δὲ οἰνώδης μέσον ἔχει δύναμιν· ἡ δὲ ὀξεῖα ὁ πυρὸν ξηραίνεις ἐν πλίνθῳ ἐν ὀπτῷ ἀσάμενος προσοφήσασι ἐκ συνεφώμενος, χιλίαις ἐν στομάχου ῥεύμασι ἴσχυσιν.

V. πνευματοῖ
V. ἀπὸ ἢ καὶ οὐρητικωτέρα
V. ἀπὸ ἢ καὶ ἐν ὀπτῷ ἀσάμενος προσοφήσασι ἐκ συνεφώμενος
Al. ἀσσμος. al. ἄσσμος. & σίμος
Marc. in quodam vetusto codice legitur σίμος.

& spiracula cutis obstruentem, ad oculorũ pustulas, staphylomata, ciliorumq; defluuia addito nardo efficacem. Supercrescentem carnem cum vino reprimunt, & vlcera ad cicatricẽ perducunt. Omnium verò aptissimi sunt Ægyptij nuclei, qui ex humilibus palmis decerpuntur.

De Palma elate. Cap. CL.

Palma, quam nonnulli elaten aut spatham appellant, fructus palmarum adhuc florentium inuolucrum est. Eo vnguentarij in vnguẽtorum spissamenta vtuntur. Optima habetur odorata, astringens, ponderosa, præclusa, interna parte pinguis. Vis ei astrictoria, qua vlcera depascentia sistit, laxatosque articulos cómittit, si trita malagmatis & cataplasmatis ammisceatur. Prodest & precordijs ac stomacho imbecilli, necnon & iecinoris affectibus, conuenientibus mista cataplasmatis. Eius decoctum subinde affrictum capillos denigrat. Potui verò datum, renum, vesicæ, aliorúmque viscerum vitijs confert: alui vteríque fluxiones sistit. Ipsa verò scabiẽ sanat diebus viginti, si adhuc tenera cũ resina & cera decocta imponatur. Porrò qui sub ea continetur fructus elate etiam appellatur, & à nonnullis borassus. Ipsiusmet astrictorius cũ sit, spathæ quoque præbet effectus; nisi quòd ad vnguenta non æquè est vtilis. Cęterùm alba quoque caudicis medulla tum recens comesta, tum decocta ad eadem facit, ad quæ etiam borassus.

De Malo Punico. Cap. CLI.

Malum Punicum omne iucúdi est saporis, stomachoque vtile, sed vix vllius alimenti. Attamen ex his dulcia stomacho vtiliora habentur: sed circa eum calorem aliquantulum gignũt, inflationésque pariunt: qua ex causa febricitantibus haudquaquam conueniunt. Acida verò æstuanti stomacho auxiliantur, magisque contrahũt, ac fœliciùs vrinam cient: sed ori ingrata sunt & astringẽdi vi prędita. Vmota medias vires obtinent. Acidorũ nucleus in sole siccatus, & obsoniis inspersus ac cum ijs etiã decoctus, aluum stomachique fluxionem sistit.

Aqua verò cœlesti maceratus, sanguinem excreantes potu iuuat, & ad infessus dysentericorum profluuióque laborantium accommodatur. Porro succus ex acinis ipsis expressus si coquatur melli admixtus, pervtilis fuerit ad oris, genitalium & sedis vlcera, necnon ad digitorũ pterygia, nomas & quæ in vlceribus excrescunt, itemq; ad aurũ dolores & narũ vitia: maximè verò, si ex acidi punici granis exprimatur.

vel luxuriosi excalcarationes

A ἀπὸβεραχὶς ἢ ὲν ὀμβείῳ ὕδατι, αἱμοπτοϊκοὶς ὠφελεῖ πινόμενος, ἢ εἰς ἐγκαθήσματα δυσεντερικὰ ἢ ῥοϊκὰ ἁρμόζει. βύχεπον ἢ ὃ ἀπόθλιμμα τῶ πυρίων ἐψηθὲν ὲ μιχθὲν μέλιτι, τοῖς τε κατὰ στόμα τὰ ἢ αἰδοίῳ ἢ ἕδρᾳ ἕλκη, ὲ περύγια τὰ ὲν δακτύλοις, νομάς τε ὲ ἐπιῤῥοχὰς

B ὲ ὠταλγίας ἢ τὰ ὲν μυκτῆρσι, καὶ μάλιστα τῆς ὀξείας.

De Cytinis. Cap. CLII.

Huius flores, qui etiam cytini vocantur, & ipsi quoque astringunt, siccant & cohibent: cruenta vulnera glutinant, & quas Punicum præstat vtilitates. Eorum decoctum ad gingiuas humore flaccidas dẽtesq; mobiles colluitur, & ramices ex intestini prolapsu cataplasmatis inditum agglutinat. Cæterùm sunt qui memoriæ tradant toto anno lippitudinem nõ passuros, qui tres quantumuis exiguos cytinos deuorauerint. Ex iis velut ex hypocisthide succus elicitur.

Πεεὶ Κυτίνων. Κεφ. ριβ'.

Τὰ ἢ αἴθη αὐτῆς, ἃ ὲ κύτινα καλοῦνται, ὲ αὐτὰ συμπτικὰ ὲ ξηραντικὰ ὲ κατασαλπτικά εἰσι, καὶ σταιμων κολλητικά, ἁρμόζοντα πρὸς ἃ ἢ ῥοά. ὃ ἢ ἀφέψημα αὐτῆ, ἄλλως σπλαδνίοις ἢ ὀδόντων στομάτων ῥόγκλυσμα, καὶ κήλλημάτι ἐπιτεθὲν ἐξερχηλικοῖς ὲ καταπλάσματι. ἱστοροῦσι δέ τινες, μὴ ὀφθαλμιᾶν πρὸ ὅλου τὸ ἔτος τοὺς κύτινα πίνοντας πρὸς κυάθους ὡς ὅτι ἐλαχίστους· χυλίζουσι ἢ ὡς ἡ ὑποκιστὶς.

C

V. αἰφθαλμιᾶν: γὰρ δὴν Vet. inferit ὑγιᾶ

De Malicorio. Cap. CLIII.

Et ipsa quoque Punici putamina, quæ Sidia nonnullis appellantur, astringendi vim habent, & quos cytini præbent vsus. Radicum autem decoctum latas ventris tineas potu pellit & enecat.

Πεεὶ Σιδίων. Κεφ. ριγ.

D Καὶ τὰ λέπη ἢ τῆς ῥοᾶς, ἃ τινες σίδια καλοῦσι, συμπτικὴν ἔχοντα ἢ αὐτὰ δυνάμιν, πρὸς ὅσα ἢ κύτινοι ἁρμόζουσι. τὸ ἢ ἀφέψημα τῆ ῥιζῶν, ἕλμινθας πλατείας πολὺν ἐκπιάσαι καὶ ἀποκτεῖναι.

Galaëmata vocat.

V. λημίζει

Quidam vetustus codex Matth. inuh

De Balaustijs. Cap. CLIIII.

Balaustium syluestris punicæ flos est, cuius complura sunt genera: reperitur enim candidum, rutilum & colore rosaceo. Domesticæ mali punicæ cytino simile est, & ex eo quoque succus elicitur hypocisthidis modo. Vis ei astrictoria, eadem efficiens quæ hypocisthis & cytinus.

Πεεὶ Βαλαυσίων. Κεφ. ριδ'.

B Βαλαύσιον ἔστιν αὐτὸς ἀγρίας ῥοιᾶς· εἴδη δ' ἔστιν αὐτοῦ πλείονα· εὑρίσκεται γὰρ ἢ λευκὴ καὶ πυῤῥὸν καὶ ῥοδόχρουν· ἔοικε δὲ κυτίνῳ ῥοιᾶς. χυλίζεται δὲ ὡς ἡ ὑποκιστίς. δύναμιν δ' ἔχει συμπτικὴν, ποιεῖ δὲ πρὸς ἃ καὶ ἡ ὑποκιστὶς καὶ ὁ κύτινος.

Orib. παρατρωμ. al. χυλίζουσι καὶ παρατρωμ. V. inferit καὶ.

De Myrto. Cap. CLV.

MYRTVS satiua nigra medicinæ vtilior quàm candida: & in eo ipso genere accõmodatior montana: fructum tamen inefficaciorẽ habet. Vis tum ipsi myrto, tũ etiam fructui astrictoria. Ac fructus quidem seu viridis, seu etiam aridus in cibo datur sanguinẽ excreantibus, vesicæq; erosione laborantibus. Virétib' baccis expressus succus eosdẽ effect' exhibet, stomacho vtilis est; vrinámq; ciet: prodest cũ vino à phalágio demorsis & à scorpione ictis:

Πεεὶ Μυρσίνης. Κεφ. ρνέ.

F ΜΥΡΣΙΝΗ ἡ ἥμερος, πρὸς μὲν τὴν ἰατρικὴν χρῆσιν, ἡ μέλαινα τῆς λευκῆς ἁρμοδιωτέρα. καὶ τούτης μᾶλλον ἡ ὀρεινή, τὸ μὲν τοι καρπὸν ἀποπώτερον ἔχει. δύναμις δὲ αὐτῆ καὶ τῆ καρπῶ συμπτική. δίδοται δὲ ὁ καρπὸς χλωρός τε καὶ ξηρὸς ἐσθιόμενος ἀμυσταλοιχοῖς καὶ τοῖς διακορμάροις τῆ κύστι. καὶ ὁ ἐκ τῆ χλωρᾶς δὲ μύρτων ἐκθλιβέντων χυλὸς τὰ αὐτὰ ποιεῖ, δύσπεπτος ὢν καὶ ὑρητικὸς. ἁρμόζει δὲ φαλαγγιοδήκτοις καὶ σκορπιοπλήκτοις σὺν οἴνῳ.

Codex Vicentinus inscribit περὶ ἀχλὺος μυρσίνης, illas ἐκεῖ μυρσίνας ἢ μυρσινεῶνα.

ἐς τὸ ἀφέψημα τῆ τοῦ καρποῦ βάπτῃ ῥίζας ἑψηθεὶς ἢ σὺν οἴνῳ, καὶ καταπλασθεὶς, πὰ ἐν ἀκροτηρίοις ἕλκη θεραπεύει· μύρτης τὸ φύλλον καταπλασθεὶς, φλεγμονὰς ἴσχει· ἐπὶ ὀφθαλμοῖς παρηγορεῖ, καὶ τοὺς ἀγρίλωπας ἢ ὑπερπλάτεις). καὶ ὁ ἐξ αὐτῆς ἢ μυρσίνης οἶνος, ὅταν ἡλιβάτου τοῦ καρποῦ ᾖ ὅτι μάλιστα ἀφεψηθέντος, ὀξίζει γὰρ ὁ μὴ οὕτω σκληθεὶς, ἀκραίπαλός ἐστι τοῦτον πίνοντος, πλὴν πρὸς ὅσα καὶ ὁ καρπός. ἕλκη θέματά τε μήτρας τοῦτον πιόντος, καὶ δακτυλίῳ, καὶ ῥοιικαῖς ἁρμόζει. σμήχει ἢ ᾗ πίτυρα. ᾗ ἀχῶρας, καὶ ἕλκη θήματα, τείχας τε ῥαφὰς ἐπέχει. μίγνυται ἢ καὶ λιπαρᾶς, ὥσπερ καὶ ὅ ἐκ τῶν φύλλων αὐτῆς σκληθέντος ἔλαιον. ἐστὶ δὲ τῶν φύλλων ἢ ἀφέψημα εἰς τε τὰ ἑλκηθέματα ἁρμόζει, καὶ τοὺς τὰ χαλαρὰ ᾗ ἀσυμπώρωτα ἄρθρα, καὶ τοὺς ἀσυμπώρωτα καταγέντα. ὠφελίμως καὶ τὰ τμηθέντα. σμήχει ἢ ἐς ὑφοὺς, καὶ τοὺς ὠὰ πυρρόοωπα ἐλκυματίζεται, καὶ μελασμοὺς τείχει, καὶ ὁ ἐξ αὐτῶν δὲ χυλὸς τὰ αὐτὰ ποιεῖ· αὐτὰ ἢ τὰ φύλλα λεῖα καταπλασσόμενα σὺν ὕδατι, ἁρμόζει τοῖς καθύγροις τῶν ἑλκῶν, καὶ ῥυπαζομένοις τόποις πᾶσι, καὶ κηλιακοῖς· ἔλαιόν ὀμφακίνον γὰρ ἢ ῥοδίνου ὀλίγου ἐστὶν οἶνον μεμιγμένον, καὶ ἕρπησι, ᾗ ἐρυσιπέλασι, διδύμοις τε φλεγμοναῖς καὶ ὀπισθοπόσι ᾗ κονδυλώμασι· ξηρὰ ἢ λεῖα πτερυγίοις καὶ παρωνυχίοις χρήσιμος· καταπλάττεται, ἐστὶ καθύγροις μεγάλαις ᾗ μικραῖς, καὶ ὅτι καρδιακῶν φίλα τοῦ ἱδρῶτας· καὶ αὐμῶν ἢ ἐστὶ ὠμὰ μὲν χηρωτῆς, πυρικαυστὰ καὶ πτερύγια καὶ παρωνυχίας ἰᾶται. χυλίζεται ἢ τὰ φύλλα καταχεόμενα οἴνου παλαιοῦ, ἢ ὕδατος ὀμβρίου, ἐστὶ ἐκθλίβεται). ἡ ἢ χρῆσις αὐτῶν πρὸς φάτνου ὄντος ξηραντικὴ γὰρ δυνάμεως καὶ ἀδυνατεῖ.

A Fructus quoque decoctum capillũ tingit. Is ipſe cum vino ſubferuefactus & impoſitus, vlcera in extremitatibus corporis nata ſanat. Cum tenuiſſimo verò polẽtæ polline impoſitus, oculorum inflammationes lenit: quin & ad ægilopas illinitur. Vinũ porrò myrtites, quod expreſſo & aliquantum feruefacto fructu B fit, (aliter enim paratum aceſcit) præſumptum crapulam arcet, & ad eadem ad quæ fructus ipſe valet. Vtile quoque ipſum in deſeſſionibus vuluarum & ſedis procidentię, itémque fœminis fluxione vuluæ laborantibus: detergit etiam furfures, vlcera capitis manantia & papularum eruptiones: fluentes quoque C capillos continet. Additur & in emplaſtris lenibus quæ liparas vocant, veluti etiá quod ex ipſius foliis conficitur oleum. Quin & foliorum decoctum ad inſeſſus conuenit: eóque laxati & ægrè coëuntes *ſolidſcuntur* articuli, itémque fracta quæ non *ferruminatio-ni repugnãtia* cõferbuere, vtiliter fouentur. Vitiligines quoque emaculat: ad aures purulentas, denigrandóſque capillos infunditur. Sed & eorum ſuccus eadem efficit. Ipſa verò folia trita & ex aqua illita humidis vlceribus & partibus omnibus fluxione laborantibus, cœliacíſque proſunt. Siquidẽ admiſto oleo omphacino aut exiguo roſaceo cũ vino, valent ad herpetas, eryſipelata, teſtium inflammationes, epinyctidas & condylomata. Arentia verò folia trita, paronychijs & pterygijs, itémque alis feminibúſque humẽtibus, adeóque tetrum virus ſpirantibus vtiliter inſperguntur, & cardiacorũ ſudores cohibent. Cæterùm cremata aut etiam cruda, cum cerato ambuſtis, pterygijs & paronychijs medẽtur. Exprimitur & foliis ſuccus affuſo vino vetere aut aqua cœleſti, cuius recentis vſus eſt. Nam exiccatus ſitum contrahit, viréſque amittit.

Περὶ Μυρτιδάνου. Κεφ. ριϛ'.

De Myrtidano. Cap. CLVI.

Τὸ μυρτιδάνον λεγόμενον, ὀπίφυτόν ἐστιν αἰώμαλον καὶ ὀχθώδες καὶ ὁμόχρουν· οἷον χεῖρες περὶ τὸ τοῦ μυρσίνου περέμνον· σύφλιγμα μᾶλλον τοῦ μυρσίνου· ἀποπλύνει ἢ καὶ πότοις καὶ μέλιτι οἴνῳ αὐστηρῷ, αἱ ἁπλασθεῖσαι εἰς ῥο-

Quod myrtidanum dicitur, id eſt quod myrto adnaſcitur, inæquabile, verrucoſum intumeſcénſque & cõcolor: quod perinde quaſi manus myrti caudicẽ amplectitur. Magis quàm myrtus aſtringit. Tuſum verò & vino auſtero addito coactũ in pa-

ſtillos, ſiccatúmque in vmbra reponitur. Efficacius porrò eſt tum fructu tum folio, cerato, peſſis, inſeſſionibus & cataplaſmatis admiſtum, vbi conſtringendum aliquid eſt.

A χίονας ὁ σκιᾷ ξηραίνεται. δραστικώτερον δὲ ὅσῳ τοῦ καρποῦ καὶ τοῦ φύλλου, μιγνύμενον κηρωτῇ καὶ πιττοῖς, ἐγκαθίσμασί τε & καταπλάσμασι τοῖς συψεως δεομένοις.

De Ceraſiis. Cap. CLVII.

Περὶ Κερασίων. Κεφ. ρνζ'.

CERASIA bonam quidem aluũ faciunt, ſi recentia ſumantur: at ſicca eadem aluum ſiſtunt. Gummi verò ceraſorũ cũ vino diluto ſumptum diuturnæ tuſſi medetur, colorem quoque cõmendat, viſum exacuit & appetentiam inuitat. Ex vino etiam potum calculoſis prodeſt.

B ΚΕΡΑΣΙΑ καὶ αὐτὰ μὲν χλωρὰ λαμβανόμενα, διαχεῖλια τυγχάνει ξηρὰ δ' ἴσχει χοιλίαν. ὁ δὲ κόμμι τῶν κερασίων ἔνια χρονίαν ἰᾶται, λαμβανόμενον μετὰ κράμματος, ὄγχους τε καὶ ὀξυδορκίας καὶ ὄρεξιν ποιεῖ· ὠφελεῖ δὲ καὶ λιθιῶντας μετ' οἴνου πινόμενον. V. γινόμενα. Quidem καὶ μᾶλλον μὲν τὰ χλωρά.

De Siliquis. Cap. CLVIII.

Περὶ Κεράτων. Κεφ. ρνή.

SILIQVÆ recentes quidem ſumptæ ſtomacho inutiles ſunt, aluúmque ſoluunt. Eædem ſiccatæ ſiſtunt, ſtomachóque vtiliores ſunt, ac vrinæ ciẽdæ vi præditæ: ſed præcipuè quæ vinaceis condiuntur.

C ΚΕΡΑΤΙΑ χλωρὰ μὲν λαμβανόμενα, κακοστόμαχα τυγχάνει καὶ κοιλίας λυτικὰ· ξηραινόμενα δ' ἴσχει κοιλίαν, διστομαχώτερα ὄντα καὶ διουρητικὰ μᾶλλον δὲ τὰ ἐκ τῶν ἐμφύλων σκωλήκων.

De Malo. Cap. CLIX.

Περὶ Μηλέας. Κεφ. ρνθ'.

CVM omnis mali, tũ verò maximè coronęæ, folia, flores & germina aſtringunt: fructui verò immaturo quidẽ aſtringendi vis ineſt, maturo, nõ itẽ. Quæ verò mala verno matureſcunt tempore, bilem gignunt, toti neruoſo generi infeſta ſunt, inflationéſque pariunt.

D ΜΗΛΕΑΙ πᾶσαι τὰ φύλλα καὶ τὰ ἄνθη καὶ οἱ βλαστοὶ, σύφοροι. μᾶλλον δὲ αἱ κυδωνίαι. καὶ ὁ καρπὸς ἔτι ὢν μὴ, συμπλοκὴν καὶ δίψος ποιεῖ δηλονότι· ὑπόχυμος. τὰ δὲ ἔαρος ἀκμάζοντα μῆλα, χολοποιά, ἄλλα τε τῆς ἰδιαζούσης πάντα, ἐμπνευματοῦται.

De Cotoneis. Cap. CLX.

Περὶ Κυδωνίων μήλων. Κεφ. ρξ'.

Cotonea ſtomacho vtilia, vrinam cient: verùm toſta mitiora euadunt proſúntque cœliacis, dyſentericis, ſanguinem excreantibus & cholera laborantibus, præſertimque cruda. Quin & aqua in qua hæc ipſa macerata fuerint potui data, ſtomachi vétriſve fluxione infeſtatis cõuenit. Crudorum eorundem ſuccus aſſumptus orthopnoicis opitulatur: decocto ſedes & vulua fouentur, ſi procidát. Cotonea verò quę in melle condita ſunt, & ipſa vrinam mouent: mel autem illorum conſtipantem conſtringentémque vim ſibi aſciſcit. Quæ porrò cum melle decoquuntur, ſtomacho quidem vtilia ſunt atque ori grata, ſed minùs conſtringunt. Cruda eadem cataplaſmatis adiiciuntur ad cohibendam aluum: itémque contra ſtomachi euerſionem & æſtum, mammarum inflámationes, ac lienes in ſcirrhum induratos, atque condyloma-

E Τὰ δὲ κυδώνια, δύσστομαχα, αἱρητικά. ὀπτηθέντα δὲ πρεσοπέττερα γίνεται, χρήσιμα κοιλιακοῖς, καὶ δυσεντερικοῖς, καὶ ἐμπτυικοῖς, καὶ χολερικοῖς, μάλιστα ὠμά. καὶ ὁ ἀπόβρεγμα αὐτῶν ἁρμόζει πρὸς στόμαχον ἢ χειλίδα ῥεύμασι ζοιδήσεις δὲ ποτὸν. ὁ δὲ χυλὸς ἐμβαλὼν αὐτῶν λαμβανόμενος, ὀρθοπνοικοῖς ὠφελεῖ. ὁ δὲ ἀφέψημα, πρόπτωσιν ὑστέρας ἐπιδεσμεῖται. τὰ δὲ ὀπτὰ τῶν μήλων πικρότερα, καὶ αὐτὰ μὲν οὐρητικά· ὁ δὲ μέλι τὴν αὐτῶν αἱρεθὲν λαμβανόμενον δυνάμεις στυπτικὴν γὰρ καὶ συστολικὴν γίνεται. τὰ δὲ σὺν τῷ μέλιτι ἑψόμενα, δύσπεπτα μὲν καὶ δύσπνοα, ἧττον δὲ στυπτικά. τὰ δὲ ὠμὰ καταπλάσμασι μίγνυται πρὸς στόμωσιν χοιλίας, στομάχου ἄνοδον, πύρωσιν, μαστοὺς φλεγμαίνοντας, σπλῆνας σκιρρωθέντας, κονδυ- V. γίνεται. V. ἢ ἀπὸ τοῦ μέλιτος.

λώμαλα. Γίνεται ὴ καὶ οἶνος ἐξ αὐτῶν κυ-
προμήλων καὶ σκληβομήλων, τοῖς ὀλί-
γοις μέλιτος ξέστου ἑνὸς, ἐπὶ ὀξίζοντι ἁρμό-
ζει ὴ τοῖς τὰ εἰρημένα πάσχουσι. καὶ χρῖ-
σμα ὴ ἐξ αὐτῶν σκευάζεται ὃ καλοῦσι μή-
λινον, ᾧ χρώμεθα ὁπόταν συμβαίνῃ
ἐλαίου δεηθῆναι. σκληρὰ δὲ δεῖ τὰ
ἀληθινὰ μικρὰ δι' ὅλου καὶ εὐφερῆ καὶ
εὐώδη ὀσμήν. τὰ ὴ λεγόμενα στρούθια καὶ
μεγάλα ἧττόν ἐστιν εὔχρηστα. τὰ δὲ ἄνθη
αὐτῶν ξηρά τε καὶ χλωρὰ καταπλά-
σμασιν εὔκαιρα, τοῖς τὰ σύψεως χρείαν
ἔχουσι, καὶ τοῖς ὀφθαλμῶν φλεγμονὰς,
καὶ τοῖς αἵματος ἀναγωγάς, κοιλίας τε
ῥόσιν καὶ ἐμπιλώσεις φορᾶν ἁρμόζει μετ'
οἴνου πινόμενα.

Quidam ἀμύγδαλα quæ propriè tenera & pumila vtilia: obiurgat & laburnida ἐκλεγει.

Pal. cod. & Ald ῥόσιν Pal. φορὰς

Περὶ Μελιμήλων. Κεφ. ρξα'.

Τὰ ὴ μελίμηλα κοιλίαν μαλάσσει,
καὶ θηρία ἐκπυάσσει. κακοστόμαχα ὴ καὶ
καύσου ποιητικά. καλοῦσι ὴ τινὲς τῶν
γλυκύμηλα.

Περὶ Ηπιρωτικῶν μήλων. Κεφ. ρξβ'.

Τὰ ὴ Ηπιρωτικὰ λεγόμενα, Ῥωμαι-
σὶ δὲ ὀρβικουλάτα, δύστομαχα, κοιλίας
σκληρὰς, οὖρων τροχλητικά. ἀποκόττει
μᾶλλόν τι τῶν κυδωνίων ὄντα.

V ἀρβικουλάτα

V. non habet οὖρων.

Περὶ ἀγελομήλων. Κεφ. ρξγ.

Τὰ ὴ ἄγρια ἔοικε τοῖς ἡμερινοῖς σύψεως
μετέχειν. δεῖ ὴ τοῖς τὰ σύψεως χρείαν ἔχουσι, μᾶλ-
λον ἐστέοις ἅπασι χρῆσθαι.

V ἡμερινοῖς pro quo forte legendum ὠμοτέροις.

Περὶ Περσικῶν μήλων. Κεφ. ρξδ'.

Τὰ ὴ Περσικὰ μῆλα δύστομαχα,
δυσκοίλια τὰ πέπονα. τὰ ὴ ἔνωμα, στυπτι-
κὰ κοιλίας. ξηραινόμενα ὴ, καὶ στυπτικώ-
τερα γίνονται. καὶ ὃ ἀφέψημα ὴ αὐτῶν
ξηρῶν λαμβανόμενον, στόμαχον καὶ κοιλίας
ῥεύματα ζοιδίῳ ἴσχουσιν.

Περὶ Αρμενιακῶν. Κεφ. ρξε'.

Τὰ ὴ μικρότερα, καλούμενα ὴ Ἀρ-
μενιακὰ, Ῥωμαιστὶ δὲ πραικόκια, δύστομα-
χότερα τῶν προειρημένων εἰσίν.

Alb. μικρὰ

Περὶ Μηδικῶν. Κεφ. ρξς'.

Τὰ ὴ Μηδικὰ λεγόμενα ἢ Περσικὰ
ἢ κιδρόμηλα, Ῥωμαιστὶ δὲ κίτρια,

ta. Fit etiamnum ex ipsis vinum tu-
sis expressisq; addito, quò diutiùs
perennet, ad succi sextarios sede-
cim mellis sextario vno: alioquin
acorem contraheret. Prodest autē
ad eadem omnia quæ modò dicta
sunt. Fit & oleum ex his quod me-
linum vocatur: quo quidem vtimur
quoties oleo astringente opus ha-
bemus. Cæterum coronea elegi o-
portet vera ac germana, qualia pa-
ua rotunda & odorata sunt. Quæ
verò strvthia & magna dicuntur,
minùs vtilia censentur. Eorum flo-
res sicci æquè ac virides cataplas-
matis accommodantur, quæ astri-
ctionem desiderāt: ac etiamnū va-
lent ad oculorum inflammationes.
Contra sanguinis reiectiones, alui
profluuium, menstruumque impetus,
vtiliter in vino bibuntur.

De Melimelis seu musteis. Cap. CLXI.

Melimela ventrem molliunt, &
ab eo animalia expellūt, stomacho
negotium exhibent, cystuosaq; sunt.
A nonnullis porro, quasi dulcia ma-
la, glycymela nuncupantur.

De Epiroticis malis. Cap. CLXII.

Epirotica mala, quę Latinè orbi-
culata dicūtur, stomacho vtilia sunt:
sed aluum sistunt, vrinásque cuocāt,
malis tamen cotoneis inefficacio-
ra sunt.

De Syluestribus malis. Cap. CLXIII.

Syluestria mala vernis similia sūt,
& astringūt. Ad ea porrò quę astri-
ctione opus habent, iis omnibus vtendum quę minùs matura fuerint.

De Persicis malis. Cap. CLXIIII.

Persica mala stomacho vtilia sunt,
& aluum quoque bonam præstant,
si matura fuerint. Immatura verò
eandem cohibent, sed siccata vehementiùs. Sumptum eorundem
siccorum decoctum in stomachum
ventréq; decūbētes fluxiones sistit.

De Armeniacis. Cap. CLXV.

Minora quæ Armeniaca, Latinè
præcoqua dicūtur, stomacho quàm
antedicta vtiliora sunt.

De Medicis. Cap. CLXVI.

Medica Persicáve aut Cedro-
mela, quæ Latinè Citria dicuntur,

etiam vulgo cognita sunt. Est enim arbor omnibus anni tẽporibus fructifera, alijs atque alijs malis vicissitudine perpetua subnascentibus. Malum vero ipsum oblongum est, rugosum, aureo colore, cum grauitate odoratum: ac pyri semen habet. Id in vino bibitum venenis resistit, aluum subducit, decocto aut succo colluto suauitatem oris facit: editur verò maximè à mulieribus contrà malaciam. Arcis quoque vestiarijs impositum, vestes ab erosionis vitio vindicare creditur.

De Pyro. Cap. CLXVII.

PYRORVM multa sunt genera: quæ quidem omnia astringunt, proindéque conuenienter addũtur in repellentia cataplasmata. Siccatorum decoctum, & ipsa quoque cruda si sumantur, aluum sistunt: cęterùm ieiunos efficaciter lædunt.

De Pyro syluestri. Cap. CLXVIII.

Achras Pyri syluestris genus est, quod tardè matureſcit. Vim habet magis quàm pyrum astrictoriã: quò fit vt ad eadem conueniat: astringunt & ipsius folia. Vtriusque pyrorum generis ligni cinis ijs efficaciter proficit, quos fungi strangulant. Sunt & qui dicant, innoxios reddi fungos, si cum ijs syluestria pyra coquantur.

De Mespilis. Cap. CLXIX.

MESPILVS arbor, quæ à nonnullis Aronia vocatur, spinosa est, foliis oxyacanthæ: fructum fert exiguo malo similem, suauem, qui quidem tria continet intus ossicula, à quibus ipsum quoque nõnulli tricoccon quasi triplici grano prædituꝫ appellant: tardè matureſcit: esitatũ astringit, stomachum adiuuat, aluúmque cohibet.

De altera Mespilo. Cap. CLXX.

Mespili genus alterum in Italia nascitur, quod epimelida nonnulli, setanium alij nominant. Arbor est malo similis, nisi quòd foliis est minoribus. Fructum hoc quoque genus profert rotundum, esculentum, vmbilico latiore, leuiter astringentem, quique tardè matureſcit.

A πᾶσι γνώσιμος· φύεται γάρ ὅτι καρποφορεῖ δι' ὅλου τοῦ ἔτους ἐπ' ἄλλοις καὶ ἄλλοις. καὶ τὸ μῆλον ὀλίγιστος, ἐρυθρωδέστερον, χρῶτα τὸ χρόα, διαδήλους μὲν βάσεις, σπέρμα ἔχον ἀπίου ἴσους. Δύναται δὲ ἐχῖνος πιὼν ἐν οἴνῳ, αὐτοὺς ἐργῶν θανατώσιμος, κοιλίαν τε ὑπάγει ἀγλῶς. Ἀλείμμα τέ ἐστι πρὸς διαδύσεις τέμαλος. τὸ ἄφεψμα, καὶ ὁ χυλὸς αὐτῆς βιβρώσκει. δι' ἁλίσας δὲ ὑπὸ γυναικῶν πρὸς τὴν τῶν στόμων φυλακὴν δέ τι καὶ ἰσχνότερον ἀκτῆ δίκτι ἄβρωτα, ὀδοντήλυθα τιβωτίοις.

B

Περὶ Ἀπίου. Κεφ. ρξζ'.

V. cod. caput de mespilo hoc loco reponit

ΑΠΙΟΝ δὲ πολλὰ εἴδη. πᾶσαι δὲ φύσεις ὀλίγον εἰς τὰ διαχρυστικὰ κέκραται. τὸ δὲ ἄφεψμα αὐτῆς ξηρανθείσης, καὶ αὐτὰ λαμβανόμενα ὠμὰ, κοιλίαν ἰσχνὸν ἐλαφίζει δὲ ἀδιόμενα τοὺς πόρους.

V. μίσυος ad Orib. ἀπίου

Περὶ Ἀχράδος. Κεφ. ρξη'.

Η δὲ ἀχράς εἶδός ἐστιν ἀγρίου ἀπίου, βραδίως πεπαινομένη. Δύναται δὲ ἔχῖ συμπίνοντος ἀπίου. ὅθεν πρὸς τὰ αὐτὰ ἁρμόζει. σύφει δὲ καὶ τὰ φύλλα αὐτῆς. πίνει δὲ καὶ ξύλου αὐτῆς τέφρα, βοηθεῖ δὲ ἀργῶς τοῖς ὑπὸ μυκήτων πνιγομένοις. φασὶ δέ τινες ὅτι κἂν συνεψήσωσί τις ἀχράδας μύκησιν, ἀβλαβεῖς αὐτοὺς γίνεσθαι.

V. ἀχλὶς

V. κατωτέρω

V. τῶν ἑπόν. ἴδιον καὶ τοῦτο

C D

Περὶ Μεσπίλου. Κεφ. ρξθ'.

In v. hic inseritur caput ante ult.

ΜΕΣΠΙΛΟΝ τὸ δένδρον, ὃ πρὸς οἰόνιος ἀρωνία καλεῖται, ἀκανθῶδές ἐστιν, ὅμοιον τοῖς φύλλοις τῆς πυξακάνθης, καρπὸν φέρον μικρῷ μήλῳ ὅμοιον τὸν ὠδύ, ἔχοντα τρία ὀστάρια ἐνόντα, ἀφ' ὧν καὶ τρίκοκκον τινὲς αὐτὸ ὀνομάζουσι, βραδίως πεπαινόμενον. σύφει δὲ βιβρωσκόμενον, δυσεντερίαν τε ἴσχει καὶ κοιλίας ἐγκρατεῖς.

Al. τῆς ἀνθους ἐκκαίδε καρπὸν φέρει μικρὸν

Pal. v. inserit πλατεῖ ἴσχυρα τὸν τυθήμενα

V. οὐ τὸ addit

V. τοῦ !

V. ἀπὸ τοῦ σύφει δὲ τὸ ἀκόλουθον ἕως ἐνοχλοῦσι

Περὶ ἑτέρου Μεσπίλου Κεφ. ρ'.

Μεσπίλου δὲ καὶ ἕτερόν ἐστιν εἶδος ὃ Γαλλία γινώσκουσι, ὃ ἔνιοι ἐπιμηλίδα καλέσαν. οἱ δὲ, σητάνιον ὀνομάζουσι. δένδρον ἐστὶ μήλῳ ὁμφερὲς καὶ τοῖς φύλλοις, ὅτι μὴ μικρότερον. ἔχει δὲ καρπὸν καὶ τοῦτο στρογγύλον, ὡρύσιμον, πλατὺν ἔχοντα τὸν πυθμένα, ὑποσύφελα, πεπαινόμενον βραδίως.

E F G

Al. ἴσως καὶ Pal. V. μηλίς ista lego ex cod. Pal. sed vulg. exempl. non habent μὴ

V. c. hic πλατεῖ καὶ hoc loco caret & priores mespili fructibus in præcedenti capite attribuit

Περὶ Λωτοῦ. Κεφ. ροά'.

ΛΩΤΟΣ ὁ δένδρου, φυτόν ἐστι μέγιστος. καρπὸν φέρει μείζονα πέπερεως γλυκὺν, εὐβρώσιμον, εὐστόμαχον, κοιλίας στυπτικόν. τῶν δὲ ῥισμάτων τοῦ ξύλου τὸ ἀφέψημα πινόμενον καὶ ἐγχυζόμενον βοηθεῖ δυσεντερικοῖς καὶ γυναικείοις ῥοϊκοῖς. ξανθίζει δὲ καὶ τρίχας, καὶ ἐπιχριόμενον ψωριῶσι.

Mare. legisse videtur ἐμέσιμον.

Περὶ κρανίας. Κεφ. ροβ'.

ΚΡΑΝΙΑ δένδρον ἐστὶν ἀδρὸν, καρπὸν φέρον ὡς ἐλαίας, ἐπιμήκη, χλωρὸν δὲ ὠχρόν, πεπαινόμενον δὲ ξανθόν, ὑπόκρεων δῦν, εὐδιάλυτον, εὐφορητὸν, ἁρμόζοντα πρὸς κοιλίας ῥόσιν καὶ δυσεντερίας, σωτήριον καὶ εἰς ἔψημα, καὶ εἰς ἕψησιν. καὶ ὀμφακὶς δὲ ὡς ἐλαία· ὁ δὲ χλωρὸς φύλλων ἐκπρὸ κατομένων, ἁρμόζει πρὸς λιχῆνας καὶ ἁλφούς.

And. Lacun. legit in vetusto codice χλωρὸν μὲν φύλλον ὑπὸ τῶν ἀκρίδων κατεσθιόμενον τοῖς λιχῆσι τὸν παρόμοιον ἐπιφέρει. Cæterùm exemplar habet pro ἀκρίδων, ἀκροποδῶν

Περὶ ΟΥ'ων. Κεφ. ρογ'.

ΟΥΑ τὰ μηλίζοντα καὶ μήπω πέπειρα τμηθέντα καὶ ξηρανθέντα εἰς τήλιον, ταλπικά ἐστι τῆς κοιλίας ἐφεδρίσματα. καὶ ὃ ἐξ αὐτῶν ὑγρὸν ὑγιάζει ὑγιαθέντων· αἱ δὲ ὀφίτων λαμβανόμεναι, καὶ ὃ ἀφέψημα αὐτῶν πινόμενον, ὃ αὐτὸ ποιεῖ.

V. αἱ δὲ ὀφίτου

Περὶ Κοκκυμηλέας. Κεφ. ροδ'.

ΚΟΚΚΥΜΗΛΕΑ δένδρον ἐστὶ γνώριμον, οὗ ὁ καρπὸς εὐδώδιμος, κεχυτόμαχος, κοιλίας μαλακτικός. τῶν δὲ Συριακῶν, καὶ μάλιστα τῶν ἐν Δαμασκῷ γινομένων, ὁ καρπὸς ξηρανθεὶς, εὐστόμαχος καὶ κοιλίας ταλπικός. τὸ δὲ ἀφέψημα τῶν φύλλων ἐν οἴνῳ αὐστηρῷ ἐγχυζόμενον καὶ ἀναλαμβανόμενον, κιονίδα καὶ ὄλα καὶ παρίσθμια ῥεύματι ζόμενα στέλλει. τὰ αὐτὰ δὲ πέπειρος καὶ ὁ τῶν ἀγρίων κοκκυμήλων καρπὸς, πέπειρος ξηρανθεὶς· ἐψηθεὶς δὲ μὴ ἐψήματος, εὐστόμαχός ἐστι καὶ ταλπικώτερος κοιλίας γίνεται. τὸ δὲ κόμμι τῶν κοκκυμηλέων ἐστὶ κολλητικὸν, λίθων θρυπτικὸν πινόμενον σὺν οἴνῳ αὐστηρῷ· ὑγιάζει λιχῆνας τοὺς ὑπὸ παιδίων ἀναπλαθέντας.

Mare. ex Epicteta legit ἐγχυζόμενον.

V. ἐχίνου καρπὸν

Add. Cæsium. περιπλασσόμενον

Περὶ Κομάρου. Κεφ. ροε'.

ΚΟΜΑΡΟΣ δένδρον ἐστὶ παρόμοιον κυδωνίᾳ, λεπτόφυλλον, καρ-

Cap. hoc in vet. desideratur. Alibi legitur post caput de amygdalis.

De Loto. Cap. CLXXI.

LOTVS arbor, stirps est bene magna: fructū verò fert pipere maiorem, dulcem, edulem, stomacho aptum quique aluum sistit. Ramentorum ligni decoctū & potū & infusum, dysenthericis fœminisq; fluxione vuluæ laborantibus auxilio est: rufat quoque capillos, eosdémque defluentes continet.

De Corno. Cap. CLXXII.

CORNVS fortis arbor est, fructū ferens oliuæ modo oblongum, primùm quidem viridem, deinde per maturitatē flauum aut cerinū, esculentum, astringentem, alui profluuio ac dysenteriæ salutarem, siue sapa conditus, siue aliter in cibo exhibeatur. Oliuę quoq; instar in muria seruatur. Sanies verò quā virentia folia dum vruntur exudant, lichenibus conuenienter illinitur.

De Sorbis. Cap. CLXXIII.

SORBA luteum colorem referētia, si nondum matura dissecta soléque siccata fuerint, aluum in cibo sistendi vim acquirunt. Ex iisdem molitis farina polentæ loco sumpta ac ipsorum etiam decoctum potum idem præstant.

De Pruno. Cap. CLXXIIII.

PRVNVS nota arbor est, cuius fructus esculentus est, sed stomachum malè habet, aluúmque mollit. At Syriacarum, & earum maximè quæ Damasci nascuntur fructus exiccatus stomacho vtilis est, aluúmque astringit. Decoctum foliorum ex vino paratum, vuam, gingiuas, tonsillásque fluxione laborātes ore subinde colluto reprimit. Præstat idem syluestrium prunorū fructus post maturitatē exiccatus. Cū sapa verò decoctus stomacho vtilior & ad cohibēdam aluum aptior euadit. Cæterùm gummi prunorū agglutinandi vim habet, & in vino potum calculos comminuit. Ex aceto verò illitum lichenas infantium sanat.

De Arbuto. Cap. CLXXV.

ARBVTVS arbor est cotoneæ malo assimilis, tenui cortice fru-

ctum proferés pruni magnitudine, nuclei expertem, cui memacylo cognomen eſt, quique vbi maturuit ſubfuluus aut rubicundus conſpicitur, in eſu aceroſus: ſtomacho is aduerſatur, capitiſque dolorē excitat.

De Amygdalo. Cap. CLXXVI.

AMYGDALÆ amarę radix ſi trita decoquatur, maculas in facie à ſolis ardore contractas tollit. Ipſa quoq; amygdala illita eadē præſtāt: appoſita verò menſes cient: & capitis doloribus auxiliantur, fronti téporibúſve inducta cum aceto & roſaceo. Valent & ad epinyctidas ex vino, itemq; ad putreſcētia vlcera, herpetas, canúq; morſus cū melle. Porrò comeſta dolores adimunt, aluum emolliunt, ſomnum faciunt, vrinámque cient. Proſunt etiánum ad ſanguinis reiectionem, ſi cum amylo & menta ſumantur. Ex renibus verò & pulmonum inflammatione laborantibus conferunt cum aqua pota, aut in eclegmate cum reſina terebinthina. Vrinæ difficultate affectis atque calculoſis in paſſo opitulatur: itémque eclegmate cum melle & lacte hepaticis, tuſſi & coli inflationibus, nucis auellanæ magnitudine. Quinæ ſenæve ſi præſumantur, ebrietatem arcent. Enecant & vulpes cum quapiā eſca deuoratę. At Gummi ipſius arboris aſtringit, calfacit, & contra ſanguinis reiectionem potum auxilio eſt: cū aceto verò illitum, impetigines in ſumma cute tollit. Tuſſi diuturnæ cum vino diluto potum medetur: calculoſis verò cum paſſo bibitum prodeſt. Cæterùm dulcis & cibo idonea amygdala, quantū ad efficaciam ſpectat multò quàm amara eſt inferior: attamen & ipſa extenuandi, vrináſque ciendi vi pollet. Amygdalę verò quę virides cum ſuo putamine deglutiuntur, humida ſtomachi vitia emendant.

De Piſtaciis Cap. CLXXVII.

PISTACIA, quæ certè quidē in Syria gignūtur, pineis nucibus ſimilia, ſtomacho amica ſūt. Siue porrò edātur, ſiue trita ex vino bibātur, contra ſerpentiū morſus auxiliātur.

De nucib⁹ inglādib⁹. C. CLXXVIII.

NVCES regiæ, quas nōnulli Perſicas vocant, in cibo ſumptæ, tó-

A πὸν ἔχει ὡς κεκαυμένου μέγεθος, ἀπύρηνον, μεμάκωλα καλούμενον· πεπεμμένα δὲ ὑπόξουθον ἢ ἐρυθρὸν, εὐθὺς φαίνεται, ἐν ὄξει ἀχρωστὶς, καὶ στόμαχον δὲ καὶ κεφαλὴν λυπεῖ.

Flor. Κεκαυμένου. In cod. Pal. non legitur ἢ ἐρυθρὸν. Dodonæus ſuſpicatur legendū ἀχρωστὶς

Περὶ Ἀμυγδαλῆς. Κεφ. ροϛ'.

B ΑΜΥΓΔΑΛΕΑΣ πικρᾶς ἡ ῥίζα ἀφεψηθεῖσα λύει, ἐφήλεις τὰς ἐν προσώπῳ σὺν καθαρσίῳ. Ἐ αὐτὰ δὲ τὰ ἀμύγδαλα καὶ ἁπλᾶ σὺν πηγανοσιλίμματι ἢ ἄλλῃ καταμιλίᾳ, καὶ πρὸς φθορὰς βοηθεῖ καὶ ἁπλᾶ σὺν μετώπῳ ἢ χροπάφοις μετ' ὄξους· καὶ ῥοδίνῃ, καὶ τοῖς ὑπονυκτίδας σὺν οἴνῳ· τοῖς ἢ σπασμοὺς καὶ ἕρπητας καὶ κυνόδηκτα, σὺν μέλιτι· ἀθήματα δὲ ὄντα αἰώδινα, κοιλίας μαλακτικά, ὑπνωτικά, οὐρητικά, καὶ πρὸς αἵματος ἀναγωγὴν μετὰ ἀμύλου λαμβανόμενα· πρὸς ἢ νεφριτικοὺς ἢ δυσεντερικοὺς, σὺν ὕδατι πινόμενα ἢ ἐκλείχόμενα σὺν ῥητίνῃ τερεβινθίνῃ. δυσουριῶσι ἢ ἢ λιθιῶσι σὺν γλυκεῖ βοηθεῖ, καὶ ἡπατικοῖς καὶ βηξὶ καὶ κόλου ἐμπνευματώσεσι, σὺν μέλιτι ἢ γάλακτι ἐκλείχόμενα, καὶ ῥύσει πεπεμμένα τὸ μέγεθος ἔσθιόμενα· ἐσθιόμενα· κτείνει ἢ καὶ ἀλώπεκας ἕρωδιὸν σὺν οἴνῳ. τὸ ἢ κέμμι· αὐτῆς φύλλα θερμαίνει, καὶ βοηθεῖ πρὸς αἵματος ἀναγωγὴν πινόμενον. σὺν ὄξει ἢ ἐπιχειρούμενον, λέπρας ἐπιπολαίους αἴρει· ἰᾶται καὶ βῆχα χρονίαν, μετ' ἀμάμπους πόλιν. λιθιῶσι ἢ ὠφελεῖ σὺν γλυκεῖ πινόμενον. ὁ ἢ γλυκὺς ἐδώδιμος ἀμυγδαλὴ, καταπότων ἐστὶν ὡς πρὸς ὑστερικὰς ἢ πάσας. ἐ αὐτὸ ἢ λεπτυντικὸν, οὐρητικὸν, βραχύλιθα ἢ σὺν τῷ λέπει τὰ ἀμύγδαλα χλωρὰ, στομάχου πλάδον ἀποκλίνει.

Flor. Κεκαυμένου. Al. κεκαυμένου ἀφεψῆ τὸ μετὰ τοῦ καταπλασσομένου μιλ. Marcellus I. V. ποιοῦσι καὶ φθορὰς μικράς. V. σὺν ὕδατι. V. λιθιῶσι V. τοῦτον κεκαυμένον. V. ἀπολαμβανόμενα Marcellus legit in quodam codice κτείνει ἢ καὶ ἰχνεύσας καὶ ἀλώπεκας. V. ἄνυδρα Al. λέπρας ἐπιφύσεις ἀμμοῦ κρύσταλλος τοῦτ' ἀμάμπου

Περὶ Πιστακίων. Κεφ. ροζ'.

ΠΙΣΤΑΚΙΑ τὰ μὲν ἡμερώμενα ἐν Συρίᾳ, ὅμοια τροβίλοις, βύτομαχα. ἐ ἀθήματα ἢ ἢ πόμενα ὠφελεῖ οἴνῳ λέπρα, ἕρπητοδήκτους βοηθεῖ.

Ναυσ. Ἐκφλοι. nouimus. In v. ἡμερώμενα τὰ ἡμερώμενα.

Περὶ Καρύων βασιλικῶν. Κεφ. ροη'.

ΚΑΡΥΑ βασιλικὰ, ἃ ἔνιοι Περσικὰ καλοῦσι, ἐσθιόμενα, δύσπεπτα,

ad fluxiones, nomas & tonsillarum inflammationes. Sed augetur eius vis adiectis, alumine scissili, galla, myrrha & croco: insuperque fructu tamaricis, iride atque thure. Immatura autem mora siccata contusáque, rhois vice obsonijs ammiscetur, cœliacósque iuuant. Radicis verò cortex decoctus in aqua & potus aluum soluit, latas ventris tineas expellit, & ijs auxiliatur qui aconitum hauserint. Folia trita cum oleo imposita, ambustis igni medentur. Pl. contrà Coctа verò in aqua pluuia cum vitis ficíque nigræ foliis, capillum tingunt. Succus foliorum cyathi mensura potus, à phalangio demorsis opitulatur. Corticis autem & foliorum decocto dentes aptissimè in dolore colluuntur. Cæterùm radix circa messem circunfossa & incisa dat succum, qui quodammodo concretus postridie reperitur. Is ad dentium dolores efficax est: tubercula discutit, aluúmq; purgat.

De Sycomoro. Cap. CLXXXI.

SYCOMORVM aliqui etiã sycaminũ vocant: cuius fructus Sycomoron quoque propter ignauum, infirmúmque saporem appellatur. Est autem arbor magna, fico similis, largo succo abundans, foliis mori: fructum ea ter quatérve anno profert, non è summis ramis, vt ficus, sed è caudice ipso, caprifico similem, grossis dulciorem, sine granis interioribus: quique non maturescit, nisi vngue ferróve scalpatur. Nascitur plurima in Caria, Rhodo, aliísque locis non multi tritici feracibus: vbi propter fructus perennitatem in rei frumentariæ penuria iuuamentum affert. Est porrò fructus aluo vtilis, & perquàm exile præbet alimentum, stomachóque aduersatur. Liquorẽ verò fundit arbor primo vere, priusquàm fructum proferat, lapidis ictu summo cortice desquamato: si enim frangantur altiùs, nihil quicquã emittit. Spongia aut vellere lachryma colligitur, quæ siccata & in pastillos coacta fictili vase reponitur,

Περὶ Συκομόρου. Κεφ. ρπά.

ΣΥΚΟΜΟΡΟΝ, ἔνιοι δὲ καὶ συκάμινον λέγουσι. καλεῖται δὲ καὶ ὁ ἀπ' αὐτῆς καρπὸς συκόμορον, ἀπὸ τοῦ ἄτονον τῆς γεύσεως. δένδρον δέ ἐστι μέγα, ὅμοιον τῇ συκῇ, πολύχυλον σφόδρα, τοῖς φύλλοις ἐοικὸς μορέᾳ. φέρει δὲ καρπὸν τρὶς καὶ τετράκις τοῦ ἔτους, οὐκ ἀπὸ τῶν ἀκρεμόνων ὡς ἡ συκῆ, ἀπὸ δὲ τοῦ τελέχους ὅμοιον ἐλατῷ. γλυκύτερον ὀλιγόνου, οὐκ ἔχοντα δὲ κεγχραμίδας, μηδὲ πεπαινόμενον δίχα τοῦ ὀπτιλιαθῆναι ὄνυχι ἢ σιδήρῳ. φύεται δὲ πλεῖστον ἐν Καρίᾳ καὶ Ῥόδῳ, καὶ ἐν τοῖς οὐ πολυπύροις τόποις· βοηθεῖ δὲ ἐν ταῖς σπορίμοις, ἅμα τοῦ διωσκεῖν τοῦ καρποῦ ἔστι δὲ ὀλίγιστος ὁ καρπὸς, ἄτροφος, κακοστόμαχος. ὀπίζεται δὲ τὸ δένδρον πρὶν καρποφορῆσαι ἔαρος φθῆναι, τοῦ φλοιοῦ ἐξεπιπαλῆς λίθῳ βληθέντος. βαθύτερον γὰρ βληθὲν, οὐδὲν ἀνίησι. συλλέγεται δὲ ἀπόζον, ἢ ἐπὶ ἔριφ δ' δάκρυον, καὶ ξηρανθὲν καὶ ἀναπλασθὲν, ἐν ἀγγείῳ ὀστρακίνῳ ἀποτίθεται.

A πρὸς ῥύματα, καὶ νομὰς, καὶ παιδίων φλεγμαίνοντα. ὀπτίζεται δὲ καὶ ἡ δύναμις αὐτοῦ τῶν ἀμυγδάλων συμπλεκείσης σμύρνης, καὶ κηκίδος, καὶ σμύρνης, καὶ κρόκου ἔτι. δὲ καὶ μυρίκης καρποῦ καὶ ἴριδος, καὶ λιβανωτοῦ. τὰ δὲ ἄωρα μόρα ξηρὰ κοπέντα, ἀνὰ ῥοὰς τοῖς ὄψοις μίγνυται, καὶ B κοιλιακοὺς ὀνίνησιν. ὁ δὲ τῆς ῥίζης φλοιὸς συνεψηθεὶς ὕδατι καὶ ποθεὶς, κοιλίαν λύει, καὶ πλατεῖδα ἕλμινθα ἐκπίνασι, καὶ Al. ὑπνο τοῖς ἀκόντιον πεπωκόσι βοηθεῖ. τὰ δὲ φύλλα ἁλῶσι σὺν ἐλαίῳ καταπλασθέντα, πυρίκαυστα ἰᾶται. ἐψηθέντα δὲ ἐν ὀμβρίῳ ὕδατι, ἕως ἀμπέλου καὶ συκῆς μελαίνης φύλλοις, βαπτίζῃ τρίχας. ὁ δὲ χυλὸς τῶν C φύλλων φαλαγγιοδηκτοῖς δρίγη. ποθεὶς κυάθου πλῆθος. τοῦ φλοιοῦ δὲ καὶ τῶν φύλλων τὸ ἀπόζεμα, ἀφαίκλυσμα ὀδόντων ὄντων ὀδονταλγίας. ὀπίζεται δὲ περὶ ♑ πυρμητὸν τῆς ῥίζης τρυπῶντος καὶ ἐκκοπίσης, διείσκεται γὰρ τῇ ὑστεραίᾳ. ὀπὸς δὲ ὁ ἐκ τοῦ κόμμεος D ὀδοντάλγιας ποιεῖ, καὶ φύματα διαφορῶν καὶ χιλίας καθαίρει.

Περὶ Συκομόρου. Κεφ. ρπά.

ΣΥΚΟΜΟΡΟΝ, ἔνιοι δὲ καὶ τὸ συκάμινον λέγουσι. καλεῖται δὲ καὶ ὁ ἀπ' αὐτῆς καρπὸς συκόμορον, ἀπὸ τοῦ ἄτονον τῆς γεύσεως. δένδρον δέ ἐστι μέγα, ὅμοιον τῇ συκῇ, πολύχυλον σφόδρα, τοῖς φύλλοις ἐοικὸς μορέᾳ. φέρει δὲ καρπὸν τρὶς καὶ τετράκις τοῦ ἔτους, οὐκ ἀπὸ τῶν ἀκρεμόνων ὡς ἡ συκῆ, ἀπὸ δὲ τοῦ τελέχους ὅμοιον ἐλατῷ. γλυκύτερον ὀλιγόνου, οὐκ ἔχοντα δὲ κεγχραμίδας, μηδὲ πεπαινόμενον δίχα τοῦ ὀπτιλιαθῆναι ὄνυχι ἢ σιδήρῳ. φύεται δὲ πλεῖστον ἐν Καρίᾳ καὶ Ῥόδῳ, καὶ ἐν τοῖς οὐ πολυπύροις τόποις· βοηθεῖ δὲ ἐν ταῖς σπορίμοις, ἅμα τοῦ διωσκεῖν τοῦ καρποῦ ἔστι δὲ ὀλίγιστος ὁ καρπὸς, ἄτροφος, κακοστόμαχος. ὀπίζεται δὲ τὸ δένδρον πρὶν καρποφορῆσαι ἔαρος φθῆναι, τοῦ φλοιοῦ ἐξεπιπαλῆς λίθῳ βληθέντος. βαθύτερον γὰρ βληθὲν, οὐδὲν ἀνίησι. συλλέγεται δὲ ἀπόζον, ἢ ἐπὶ ἔριφ δ' δάκρυον, καὶ ξηρανθὲν καὶ ἀναπλασθὲν, ἐν ἀγγείῳ ὀστρακίνῳ ἀποτίθεται.

V. ἀπὸ τῶν

V. ἐστι καὶ ἐν ἀνθ.

Vulg. πολύκαρπον Pal. ita distinguit πολύχυλον, σφόδρα τοῖς φύλλοις ἐοικὸς μορέᾳ V. τρὶς ἢ τετράκις

V. ἐλάττονον

Vulg. καρποφορῆσαι

Δύναμιν δὲ ἔχει ὁ ὀπὸς μάλακτικὴν, Α
κολλητικὴν τραυμάτων, διαφορητικὴν τῶν
δυσπέπτων. πίνε) δὲ καὶ συνηγείᾳ) πρὸς
ἑρπετῶν δήγματα & ἰσχιαδικοὺς πόνους,
στομάχου τε ἀλγήματα καὶ φθείριας.
βαρέως δὲ περιδυνίζεται ὁ ὀπός.

Περὶ Σύκου τῆς Κύπρου. Κεφ. ρπϐ'. B

Γίνεται δὲ καὶ ἐν Κύπρῳ εἶδος ἄλλο συκαμίνου φέρον· πέλεια γάρ ἐστιν, συκαμίνῳ τὰ φύλλα ἔοικε. τὸν δὲ καρπὸν ἔχει τὸ μέγεθος κοκκυμήλων, καὶ γλυκύτερον. τὰ δὲ ἄλλα πάντα ὅμοια ἐστὶ τοῖς προειρημένοις.

Περὶ Σύκων. Κεφ. ρπγ'.

Σῦκα πίπτοντα ἀπαλά, καὶ κοσμάχα, κοιλίας λύοντα· ῥᾳδίως δὲ ἐξ C
αὐτῶν ῥυσμὸς ἵσταται). ἐξαιμοῖ τε καὶ ἱδρῶτας προκαλεῖται, ἀδιψα δὲ καὶ σβεστικὰ θερμασίας. τὰ δὲ ξηρὰ ξύφιμα, θερμαντικά, διψητικώτερα, δυσκοίλια, ἄδηπα δὲ ῥύσεσι τομάχου καὶ κοιλίας. χρήσιμα δὲ ἀρτηρίᾳ καὶ κύσει & νεφροῖς εὐθέλα, χεῖρον ἐκ μακροσωμίας κεκεχρωσμένοις, καὶ D
ἀθμαλίκοις καὶ ἐπιλαπίκοις & ὑδρωπικοῖς. αἱ ἀκαθαίρτως δὲ & τὰ ὀπὸ φαγόντι, ἀποζεσθέντα σὺν ὑσσώπῳ & πόσιμα· ἁρμόζει δὲ καὶ παλαιοῖς βήξι, καὶ τοῖς ἐκ πνεύμονα χρονίοις πάθεσι, κοιλίαν τε μαλάσσει κριθίνῃ μετὰ νίτρου καὶ κόκκου βαπτόμενα. ὁ δὲ ἀφέψημα αὐτῶν, E
ταῖς ἐκ πνεύμονος ἀρτηρίαις καὶ παρίσθμια φλεγμοναῖς ἁρμόζει εἰς ἀναγαργάρισμα. καὶ εἰς τὰς ὠμπλάσεις δὲ μίγνυται, καὶ εἰς γυναικείας πυέλους μετὰ πήλινος ἢ πιτυσσήνης· σὺν πηγάνῳ δὲ ἀφεψήματα, σκώληκα ἔξω ἔλκους κτείνει. καταπλασθέντα ὁ ἐφθὰ λάβρα, διαφορᾷ σκληρίας. F
παρωτίδας, δοθιῆνας μαλάσσει, φύγεθλα πεπαίνει, καὶ μᾶλλον σὺν ἴριδι ἢ νίτρῳ ἢ ἀσβέστῳ· ὁ δὲ ὠμὰ ὁ κοπέντα σὺν οἷς εἶπον, τὰ αὐτὰ δρᾷ· σὺν σίλφῃ δὲ ἕρπητας, πλεῦρα αἰ ἀκαθαίρει· μετὰ χαλκάνθου δὲ, τὰ ἐν κνήμαις ῥεύματα, δυσαλγῆ καὶ κακοήθη ἰᾶται. ἐψηθέντα δὲ ἐν οἴνῳ καὶ μιγέντα ἀφαδίῳ καὶ κριθῇ ἀλόβρῳ, ὑδρωπικοὺς ὠφελεῖ· καταπλασθέντα δὲ μιγέντα κηρωτῇ, G

Vim habet is liquor emolliendi, vulnera conglutinandi, & ea discutiendi quæ ægrè maturantur. Bibitur etiam, necnon & illinitur cõtra serpentium morsus, in scirrhum induratos lienes; stomachi dolores atque perfrictiones. Celeriter verò toredinem sentit.

De fico Cypria. Cap. CLXXXII.

Gignitur & in Cypro arbor specie differens: quippe quæ vlmus cùm sit, folia sycamini refert: fructum verò gerit prunorum magnitudine, & quàm pruna ipsa dulciorem. Cætera omnia antedictis similia sunt.

De ficubus. Cap. CLXXXIII.

FIci maturæ recentes stomachũ lædũt, aluúmq; soluũt: sed cõtracta ab ijs alui fluxio facilè cohibetur: papulas euocant, sudoréq; mouẽt: sitim sedãt, caloréq; restinguũt. Siccæ verò sũt alibiles & excalfactoriæ: sitim magis afferũt, aluóq; sunt vtiles: at stomachi aluíq; rheumatismis cõtrariæ: gutturi autẽ, arteriæ, vesicæ, ac renibus magnificè vtiles: nec nõ & ijs qui ex lõga valetudine decolorati sunt, anhelatoribus, comitialibus atq; hydropicis. Feruefactæ cũ hyssopo & potẽ, quæ pectore continentur expurgant: veteri tussi ac diuturnis pulmonũ vitijs conueniunt, aluúmque molliunt cum nitro & cnico tusæ, deinde manducatæ. Ipsarũ decoctum arteriæ ac tonsillarum inflammationibus gargarizatu prodest. Quin & cataplasmatis ex hordeacea farina miscetur, itémque in muliebres fotus cũ fœnogræco aut ptissana. Cæterùm cũ ruta coctæ ad tormina infunduntur. Coctæ, deindéque tritæ ac impositæ, duritias discutiũt, parotidas & furunculos emolliũt: panos maturãt, efficaciúsque, addita iride, nitro aut calce viua. Crudæ quoque si cum antedictis tundantur, eadem efficiunt. Cum malicoriop, rervgia repurgant. Cum atramento sutorio, medentur ægrè sanabilibus maligníque tibiarum fluxionibus. Quin & in vino deferuefactæ, addito absinthio & hordeacea farina, vtiliter hydropicis illin ũtur. Cremataq; & cerato admistæ,

V. καὶ τοκέων ἀλγήματα ἢ φθίσια.

Hoc de ficu Cypria caput non habet codex Florentinus Fortè, quòd desit.

V. μαλάσσει γὰρ ἐξ ἀσπλήν.

Sic Serapio. Vulg. ex ordeo

V. πλευρῖτιν

V. ἀλεξιφάρμακα

Plinius καὶ καὶ μάλιστ legisse videtur.

V. τὰ ἐν κνήμαις ῥεύματα ἢ καὶ ἐν μασχάλαις ἢ καὶ ἐν ἀγκῶσι δυσγενῆ.

V. δὲ μιγέντα

V. vlcera cum malo punico vel arundine

V. cum fluxionibus

perniones sanat. Quòd si crudæ terátur, & liquido sinapi exceptæ auribus indátur, sonitus tinnitúsq; sanat. Porrò tã sylvestris quàm satiuæ fici lacteus succus coaguli modo lac cõtrahit, coagulatúmq; aceti modo dissoluit. Idem corpora exulcerat, ora vasorum reserat, aluum soluit, & vterum relaxat cum trito amygdalo potus: menses quoque ciet appositus cum oui luteo aut cera Tyrrhenica: podagricorum cataplasmatis cum farina fœnigræci & aceto vtilis: lepras verò, lichenas, maculas à Solis ardore contractas, vitiligines, psoras vlceráque capitis manantia cum polenta expurgat. Instillatus plagæ, percussis à scorpione, venenatorum ictibus & canis morsibus auxiliatur: dentium dolori prodest lana exceptus, & in eorum cauis additus: denique formicosam verrucá tollit, carne quæ in ambitu est adipe circumlita.

formicationes

De Ficu sylvestri. Cap. CLXXXIIII.

Hæc eadem præstat succus è teneris sylvestris fici cauliculis, quandiu lacteo liquore prægnant, neccdum oculus egerminauit. Tùm enim hi tusi exprimuntur, & succus siccatus in vmbra reponitur. Porrò & liquor & succus ad exulceratoria medicamenta vsurpantur. Decocti verò cum bubulis carnibus ficulnei furculi efficiunt, vt hæ faciliùs percoquantur. Lac quoque redditur maiore soluẽdi vi prædictum, siquidem inter coquendum ficulneo eiusmodi furculo spathæ loco moueatur.

De Grossis. Cap. CLXXXV.

Grossi, quæ à nonnullis erinei nominantur, coctæ & illitæ collectionem omnem, strumásque emolliunt. Crudæ verò cum nitro & farina impositæ, formicationes thymósque tollunt. Quin & hæc eadem ipsa folia possunt. Cum aceto autem & sale illita, vlcera in capite manantia, furfures & epinyctidas sanant. Ijs quoq; ficosę scabręq; genæ perfricantur. At nigræ ficus folijs ramulísve vitiligines albæ perunguntur. Faciunt quoque aduersus canum morsus cum melle,

A "χμίτλας ἰᾶται. λῦσαι δὲ ὠμὰ σὺν νάπυϊ ὑγρῷ αἰγαληφθέντα καὶ ἐντεθέντα εἰς ὦτα, ἤχους καὶ "συρισμοὺς θεραπεύει. ὁ δ' ὀπὸς τῆς ἀγρίας καὶ τὸ ἡμέρου συκῆς, πηχλώδης ὢν γάλακτος ὡσαύτως ἡ πτύα, λύει δὲ καὶ τὸ πεπηγὸς ὡσαύτως τὸ ὄξος· ἕλκωτικός τε σωμάτων καὶ διαστομωτικὸς καὶ-

B λίας τὰ λυλικὰ, καὶ ὑσίρας διαχαλαστικὸς, μετὰ ἀμυγδάλου λεῖος πινόμενος. καὶ ἐμμηνίων ἀγωγὸς ποσθείσης σὺν ὠῷ λελειωμένη, ἢ χρῷ Τυρρηνικῷ· πεδαγρικῆς τε καταπλάσμασι χρήσιμος μετὰ "τηλίνου ἀλόης καὶ ἴξους· σμήχει δὲ λέ-

C πρας καὶ λιχῆνας, ἐφηλίδας, ἀφοὺς, ψώρας, ἀχῶρας σὺν ἀλφίτῳ· καὶ σκληροπληκλοις, καὶ τῆς πλευρῆς ἕλκεσι ξύμμυος, καὶ ἰοβόλοις, καὶ κυνοδήκτοις βοηθεῖ· καὶ ὀδοντιλγίας ὠφελεῖ ἐνεὶς διαληφθείς, καὶ εἰς τὸ βρῶμα ἐνιθέμενος. καὶ μυρμηκίαν αἴρει, σὺν ὀπῷ τῆς ἐπὶ κύκλῳ σαρκός.

D Περὶ Ἀγρίας συκῆς. Κεφ. ρπδ'.

Τὰ αὐτὰ δὲ καὶ ὁ χυλὸς ποιεῖ τὸν ἀπὸ τῆς ἀγρίας συκῆς ἁπαλῶν κλάδων, πήγνυται δὲ ἐν τῷ ἡλίῳ ὀλίγον· ἐπιτίθεται δὲ τοῖς ὀφθαλμοῖς βεβλαμμένοις. κυπαίρισσοι δὲ ἐκφλίουσι, καὶ ὁ χυλὸς ξηραινόμενος ἐν σκιᾷ ἀποτίθεται. λαμβάνει δὲ καὶ εἰς ἕλκωσιν δυνάμεως ὅ, τι ὀπὸς καὶ ὁ χυλός. αἱ δὲ "κρέδαι βοείοις κρέασι καθεψόμεναι, εὐέψητα ταῦτα ποιοῦσι. καὶ ὁ γάλα δὲ λυλικώτερον τῇ ἐψήσει κινούμενον αὐτὸ ἀναθήγει αὐταῖς τὰς δρεπανίδας.

Περὶ Ὀλωθρῶν. Κεφ. ρπε'.

E Οἱ δὲ ὄλωθροι, ἅπερ δὲ ἔνιοι ἐρινεοὶ καλούμενοι, ἐφθοὶ καταπλασθέντες, πᾶσαν συρροφὴν καὶ χοιράδας ἐκμαλάσσουσιν. ἀμοὶ δὲ μυρμηκίας καὶ ῥύμους, σὺν νίτρῳ καταπλασθέντες καὶ ἀλφίτῳ· αἴρουσι. "καὶ τὰ φύλλα δὲ τὰ αὐτὰ δύναται.

F σὺν ὄξει δὲ καὶ μέλιτι "καταπλασθέντα, ἀχῶρας, πίτυρα καὶ ἐπινυκτίδας ἰᾶται)· πρὸς ἀμ-

G βλῶσιν δὲ αὐλοῖς καὶ τὰ συκώδη καὶ βαλάνου ἔλεφάρων. καὶ λευκὴ δὲ καταπλασσομένη) τοῖς τὰ μελαίνης συκῆς φύλλοις ἢ "τοῖς κλάδοις. "ποιεῖ καὶ ὑπὸς τὰ κυνόδηκτα σὺν μέλιτι,

Al. χμίτλας

Marc. legit αἴρει;

Ruell. ἀπὸ τῆς ἀγρίας καὶ ἡμέρου συκῆς

Vulg. misquè

V. πτύα καὶ τὸ ἴξος

Vulg. lauatis

Vulg. lauatis

V. ἀπὸ

V. & Ald. κρέδαι

V. addit σὺν συρροφῇ ἁπάσῃ.

Quidam carent his vsque ad οὐδὲ.

Marc. legit πᾶς κρέας; V. ex his habet πᾶσι κρέασι

V. hæc vsque ad δηχθέντας omittere.

καὶ πρὸς τὰ κηλία. αἰάγρωσι δὲ οἱ ὄλυ- A & ad vlcera quæ faui, Græcis ceria,
θοι καὶ ὁσᾶ σὺν μήκωνος ἀγρίας φύλ- vocantur. Groſſi cum papaueris
λοις, δρυπίας τε σὺν κηρῷ διαλύουσι· σὺν ſyluestris folijs oſſa extrahunt: fu-
ὀξυβάφῳ δὲ καὶ οἴνῳ καταπλασθέντες, πρὸς runculóſque cum cera diſcutiunt.
μυγαλῆς δήγματα & σκολοπένδρας ἁρ- Cæterùm cum eruo ac vino impo-
μόζουσι. ſitæ, contra muris aranei morſus &
ſcolopendræ venena proſunt.

Περὶ Κονίας τῆς συκῆς. Κεφ. ρπς'.

De Lixiuio ficus. Cap. CLXXXVI.

Γίνεται δὲ καὶ κονία, ἀγρίας συκῆς καὶ B
ἡμέρου καιόντων τὴν κλάδων σὺν τοῖς τέφραις·
πολύκροκον δὲ αὐτὴν δεῖ παῤῥὶν & πεπαγῆναι·
ἁρμόζει δὲ καὶ πρὸς τὰ καυστικὰ, καὶ γαγ- V. καὶ
γραινόμενα· ἀναπαθαίρει γὰρ καὶ αἰαλίσκει V. ἀλ καὶ
τὰ περιττά· χρῆται δὲ αὐτῇ δεῖ, καθάπερ
βρέχοντας συνεχῶς καὶ ἐπιπλάττοντας. ἐφ' ὧν
δὲ εἱλκυόντας, ὡς ἐπὶ δυσεντερικῶν καὶ V. Π καὶ ἰλκ.
παλαιῶν ῥευμάτων, & κάλπων ὑπονέμων καὶ
μεγάλων καθαίρει γὰρ & πολλὰ καὶ ἕρπει, C
καὶ συμφύει ἐοικότως τοῖς σπλάγχνοις. & πολί-
ζει δὲ πρὸς αἵματος ἐκθρόμβωσιν καὶ πτώ-
σεις, ῥήγματα, ἀποσπάσματα, σὺν ὕδατος κυ- V σὺν ὕδατι ἑφθ
άθῳ προσφάτως διυλισμένη, καὶ ζωϊκὰ μι- πρ. ὑφ' ἑαυτῆς διυλισμένης
γμάτος ὀλίγου. χυλιάσεις τε καὶ δυσεντερι-
κοῖς, καθ' ἑαυτὴν κυάθου πλῆθος ἐπιπλεῖ- In v. desunt hæc verba βραδὺ δι-
δόμενον· καὶ τοῖς νευρικοῖς δὲ & ἀποσμα- δράσκει
σι σύγχρισμα ἁρμόδιον σὺν ἐλαίῳ, ἱδρῶ- D
τας κινοῦσα. καὶ πρὸς γύψου πόσιν & φα-
λαγγίων δήγματα πίνεται· πτέρχοισι δὲ
τὰ αὐτὰ καὶ αἱ λοιπαὶ κονίαι, μάλιστα δὲ
ἡ δρυΐνη· * κυπρικαὶ δὲ εἰσι πᾶσαι.

Περὶ Περσέας. Κεφ. ρπζ.

De Perſea. Cap. CLXXXVII.

V. ἐστὶ δὲ καὶ δ' ΠΕΡΣΕΑ δένδρον ὄζον· ἐν Αἰγύ- PERSEA arbor eſt in Ægypto
πτῳ, καρπὸν φέρον ἐδώδιμον, βύσσμα χον ἐφ' οὗ καὶ τὰ λεγόμενα κρανοκόλαπα φαλάγια εὑίσκεται, μάλιστα δὲ ἐν Θηβαΐδι. Δύναμιν δ' ἔχει πὶ φύλλα F
λεῖα * ὀπτὰ πάλτόμενα ξηρὰ, αἱμορραγίας ἐπέχειν. τοῦτο δὲ ἱστόρησάν τινες ἐν Περσίδι αἰσχρετικὸν εἶναι, μεταπεσὸν δ' εἰς Αἴγυπτον, ἀλλοιωθέντα καὶ ἐδώδιμον γενέσθαι.

fructũ ferens cibo idoneum, ſtomacho vtilem: in quo phalangia cranocolapta nomine reperiuntur, præſertim verò in Thebaide. Arida folia trita & inſperſa ſanguinis eruptionem ſiſtendi vim habẽt. Hanc arborẽ prodidere nonnulli in Perſide quidem exitioſam eſſe: tranſlatam verò in Ægyptũ natura mutata in cibos receptam.

Περὶ Ἰβεριδος. Κεφ. ρπη'.

De Iberide. Cap. CLXXXVIII.

* ΙΒΕΡΙΣ ἥτοι καρδαμαντικὴ ἔχει πὶ G
φύλλα παρόμοια καρδάμῳ, ὧν ἔασι βλαστήσεις. * μῆκος δὲ ὅσον πηχυαῖον ἢ ἔλαττον. φύεται δὲ ἐν ἀγρω-

IBERIS, ſiue cardamantica, folia habet naſturtij, vere virentiora. Caulis longitudo cubitalis eſt, plus minúſve: locis incul-

tis naſcitur, Æſtate porrò lacteum florem promit, ac tum quoque efficacior eſt. Radices binas habet naſturtio ᵛ ſimiles, calfaciendi & adurendi vi præditas. Ipſæ enim iſchiadicis vtiles, ſi cum axungia ſuilla ſalſa emplaſtri modo quaternis horis impoſitæ fuerint: deinde verò in balneum deſcendatur: ac poſtea oleo ac vino cum lana locus affectus perungatur.

Primi libri finis.

A γόνος τόπους. ἡ ἐχις δὲ χαλασικὸν οὖδος παραβάλλει, καὶ πότε ὄξει δριμυτέρου. ἔχει δὲ δύο ῥίζας παρεμφαίας ναρδάμῳ, θερμαντικὰς καὶ καυστικάς· αἱ δὲ ἀγαθαὶ αἱ ῥίζαι παρὰς ἰσχιαδικούς, σὺν λίπει ὑείου τεθερειχυμένου, ὡς ἐμπλάστροδος θηρίαξ καθ' ἑκάστην μίσγεις ὡρῶν τρισὶ B ἄρων ἕπτα ἐν βαλανείῳ ἐμβαπτίζεσθω, καὶ ἐλαίῳ μεῖτ' ἐρίῳ τοῖς τόποις ἐπιχριέσθω.

Τέλος τοῦ βιβλίου πρώτου.

PEDACII DIOSCORIDIS ANAZARBAEI De medica materia Liber secundus.

ΠΕΔΑΚΙΟΥ ΔΙΟΣΚΟΡΙΔΟΥ ΑΝΑΖΑΡΒΕΩΣ Περὶ ὕλης ἰατρικῆς βιβλίον δεύτερον.

IANO ANTONIO SARACENO, LVGDVNÆO, INTERPRETE.

IN priore, amantiſſime Aree, libro qui quidem primus eſt eorum quos de medicinali materia cõpoſuimus, de aromatibus, oleis, vnguentis, arboribus & naſcentibus ex eis liquoribus, lachrymis ac fructibus diſſeruimus. In hoc autem ſecundo agemus de animantibus, melle, lacte, adipe, frugibus, inſupérque de oleribus: hiſque ſubnectemus quæ inter herbacea acri prædita ſunt facultate, propterea quòd cum ipſis cognationem habent: qualia ſunt allia, cepæ, ſinapi: idque ne congenerum vires diſiungantur.

De Echino marino. Cap. I.

ECHINVS marinus ſtomacho vtilis eſt, bonam facit aluum, vrinámque ciet. Huius teſta ſi cruda torreatur, vtiliter ſmegmatis, hoc eſt, detergentibus medicamentis admiſcetur, quæ ad pſoras idonea ſunt. Cremata verò eadem, vlcera ſordida expurgat, eáque reprimit quæ in vlceribus ipſis excreſcunt.

A ΕΝ μὲν τῷ πρώτῳ βιβλίῳ, φίλτατε Ἄρεε, ὅπερ πρῶτόν ἐστι τῶν περὶ ὕλης ἡμῖν συντεταγμένων, πεποιήμεθα τὸν περὶ ἀρωμάτων, καὶ ἐλαίων, καὶ μύρων, καὶ δένδρων, καὶ τῶν γινομένων ἐξ αὐτῶν ὀπῶν τε καὶ δακρύων, καὶ καρπῶν λόγον· ἐν δὲ B τούτῳ δευτέρῳ ὄντι, ἐπελευσόμεθα περί τε ζώων καὶ μέλιτος καὶ γάλακτος καὶ στέατος καὶ τῶν λεγομένων στοιχείων, ὑπὸ δὲ λαχάνων, ὑποτάξαντες αὐτοῖς ὅσα δριμέα τῇ βοτανικῇ κέκρικε δυνάμει, δηλοῖ δὲ συγγένειαν ἔχειν αὐτά, ὡς καὶ τὰ σκόροδα καὶ τὰ κρόμμυα, καὶ τὰπυ· ἵνα μὴ διαζευχθῇ τῶν ὁμογενῶν ἡ δυνάμις.

Περὶ Ἐχίνου θαλασσίου. Κεφ. α'.

ΕΧΙΝΟΣ θαλάττιος, δυσόμαχος βυκοίλιος, ὑρητικός· ὃ δὲ ὄστρακον ὠμὸν, μίσγεται χρησίμως· ὀπτηθὲν, τοῖς ποιοῖς τὰ ψώρας ἁρμόζουσι σμήγμασι κεκαυμένον τε καθαίρει τὰ ῥυπαρὰ ἕλκη, καὶ κατατίλλει τὰ ὑπερσαρκοῦντα. V. non legit inf.

Περὶ τῦ χερσαίου ἐχίνου. Κεφ. ϛ'.

Καὶ τῦ χερσαίου δὲ ἐχίνου ὃ δέρμα καὶν, σὺν ὀμφακίας μετὰ πίσσης ὑγρᾶς κατακαόμενον ἁρμόζῃ· ἡ δὲ σὰρξ σκελετευθεῖσα καὶ πινομένη μετ' μέλιτος ἢ ὀξυμέλιτος, βοηθεῖ νεφριτικοῖς, & τοῖς ὑπὸ σάρκα ὕδρωψι, καὶ σπασμώδεσιν, ἐλεφαντιῶσι, καὶ χάλαις· ξηραίνῃ δὲ καὶ τοὺς καδὶ τὰ σπλάγχνα ῥεύματα πισμοὺς. καὶ τὸ ἥπαρ ὃ αὐτὸ ξηρανθὲν ἐπ' ὀστράκου ἡλιοκαυοῦς, καὶ ἀποτεθὲν, σὺν τοῖς αὐτοῖς ὁμοίως ἁρμόζῃ διδόμενον.

Vulg. μετὰ ἐξυμέλ.

Ver. & Ald. ἀλεφαντιῶσι

Περὶ Ἱππόκαμπου. Κεφ. γ'.

Ἱππόκαμπος, θαλάσσιόν ἐστι ζῶον μικρόν, οὗ καέντος ἀναληφθεῖσα ἡ τέφρα πίσσῃ ὑγρᾷ ἢ ὀξυγγίῳ ἢ ἀμαρακίνῳ μύρῳ, καὶ καταχριωθεῖσα, ἀλωπεκίας ἀνασῴζῃ.

V. ἰᾶται

Περὶ Πορφύρας. Κεφ. δ'.

Πορφύρα καυσα δυνάμιν ἔχει ξηραντικὴν, σμηκτικὴν ὀδόντων, ὑπερσαρκωμάτων τε καθαιρετικὴν, ἰαίνεσθαι ποιητικὴν ἑλκῶν, ἀποπυωτικήν.

V. caret his quæ conclusa sunt.

Περὶ Κήρυκων. Κεφ. ε.

Τὰ αὐτὰ δὲ ποιοῦσι καὶ οἱ κήρυκες καίτες τοιοὶ δὲ μᾶλλον καυστικοί εἰσι δι' ἣς ἁλῶν αὐτοὺς πλήσας ἐν ὠμῇ χύτρᾳ καύσῃ, ἁρμόζουσι πρὸς σμῆξιν ὀδόντων καὶ κατακαύματα ὅτι πλατύτητες, ἐᾶν δὲ δεῖ ἀποσκληθῆναι τὸ φάρμακον μετὰ δὲ τὴν ἀπόλουσιν τῦ κατακαύματος αὐτόματον ἀποπίπτει. γίνεται δὲ ἀσβεστος ἐξ αὐτῶν, ὡς ὑποδείξομεν ἐν τῷ περὶ ἀσβέστου λόγῳ.

V. bis caret.

V. addit καὶν

Flor. caret hac periodo.

Περὶ Ἰονίων. Κεφ. ϛ'.

Ἰονία δὲ καλεῖται τὰ ὅτι τῶν κηρύκων καὶ πορφύρων μέσα, περὶ οἷς ἡ ἕλιξ ἐστὶ τῦ ὀστράκου· καίεται δὲ ὁμοίως δυνάμιν ἔχοντα καυστικωτέραν τῶν κηρύκων καὶ τῆς πορφύρας, διὰ τὸ πιέζειν αὐτῶν τὴν φύσιν. αἱ δὲ σάρκες τῶν κηρύκων, δύσπεπτοί καὶ εὐστόμαχοι· χειλίαν δὲ οὐ μαλάσσουσι.

Hermol. Barb. ποιοῦσι Κέντα

V. λάσιον

Περὶ Μυάκων. Κεφ. ζ'.

Μύακες διαφέρουσι τῶν Πωντικοί. καίεται δὲ ὁ αὐτὸ δρᾶσι τοῖς

De terrestri echino. Cap. II.

Terrestris erinacei corium combustum, alopecijs cum pice liquida commodè illinitur. Assiccata caro & cum melle aut aceto mulso epota, renum vitijs auxilio est: itémque aquæ intercuti, conuulsionibus, elephantia laborantibus & malo corporis habitu præditis, quos cachectas vocant: viscerum quoque fluxiones exiccat. Quin & eiusdem iecur fictili solibus perusto arefactum atque reconditum ad eosdem vsus pari modo vtiliter exhibetur.

De Hippocampo. Cap. III.

Hippocampvs marinum est animalculum: cuius cremati cinis liquida pice vel axungia aut amaracino vnguento exceptus, & illitus, alopecias emendat.

De Purpura. Cap. IIII.

Purpvra vsta vim habet exiccandi, dentes abstergendi, excrescẽtes luxuriantésve carnes cohibendi, vlcera repurgãdi & ad cicatricem perducendj.

De Buccinis. Cap. V.

Eadem præstant buccina concremata, sed maiorem adurendi vim habent. Quòd si quis ipsa sale expleta in olla cruda cremauerit, dentifricijs conueniunt, ambustísque vtiliter illinuntur. Sinendum verò medicamentum vt in testæ modum induretur: siquidem post obductam vulneri cicatricé sponte sua decidet. Fit etiam ex ipsis viua calx, quemadmodum in tractatu de calce demonstrabimus.

De Cionijs. Cap. VI.

Cionia vocantur buccinorum purpurarúmque mediæ partes, circa quas testæ volumen clauiculatim intorquetur: Simili verò modo cremata buccinis purpuráq; magis causticam vim habẽt, quoniam apprimendi naturam obtinent. At buccinorũ carnes & ori gratæ sunt, & stomacho vtiles: sed aluũ haudquaquam molliunt.

De Mytulis seu musculis. Cap. VII.

In Mytulorum genere laudatissimi Pontici. Cremati eundũ cum

buccinis effectum præbent. Priuatim verò plumbi modo eloti oculorum medicamentis cum melle vtiles habéntur: quippe qui genarum crassitudines absumunt, oculorum albugines exterunt, & cætera quæ aliter pupillis caliginem offundũt. Eorundem caro ad canis morsus vtiliter imponitur.

De Tellinis. Cap. VIII.

TELLINÆ recentes aluo vtiles, sed maximè ius earum. Sale verò conditæ ac vstæ & ad læuorem contritæ, tandémque cum cedria instillatæ, euulsos palpebrarum pilos renasci non patiuntur.

De Chamis. Cap. IX.

QVIN & chamarum aliarúmq; conchularũ in exigua aqua decoctarum ius aluum ciet: id verò cum vino assumitur.

De vnque. Cap. X.

ONYX siue vnguis conchylij tegumentũ est, ei simile quo purpura integitur. Is in lacubus nardiferis Indiæ reperitur: quapropter & conchylijs nardum depascentibus odoramenta resipit. Colligitur verò posteaquàm æstiuis squalloribus lacus inaruerunt. Præstantissimus qui è mari rubro defertur, subalbidus ac pinguis. Babylonicus nigrescit, atque minor conspicitur. Ambo verò si suffiantur, vehementem expirant odorem: sed quádantenus castoreum redolent. Hi porrò suffitu etiamnum comitiales, fœminásque vuluæ strágulatu oppressas excitant. Poti verò aluum perturbánt. Cæterùm cõchyliũ ipsum vstũ, eadé quæ purpura & buccinũ efficit.

De Cochleis. Cap. XI.

COCHLEA terrestris stomacho vtilis est, & ægrè corrumpitur. Laudatissima Sardonia, Africana, Astypalæica, & quæ in Sicilia & Chio gignitur, necnon & quæ in Ligurię Alpibus, pomatias, quasi opercularis, cognominata. Marina quoque stomacho idonea est, faciléque aluo excernitur. Fluuiatilis autem virosa est. Syluestris verò quæ vepribus frutetísque adhærescit, quámq; nonnulli sesilon aut seselita nominant, aluũ stomachúmque turbat, & vomitiones excitat.

virus habet Pl.

A κάρυξη. ἰδιαίτερον δὲ πλυθέντες ὡς μάλιστα, χρησιμεύουσιν εἰς τὰ ὀφθαλμικὰ σὺν μέλιτι· ἐκβήκοντες παχύτητας βλεφάρων, καὶ σημήχοντες λεύκωμα, καὶ τἆλλα ἐπισκοποῦντα τοῖς κέρασι· ἡ δὲ σὰρξ αὐτῶν κυνοδήκτοις ἐπιβάλλεται ὠφελίμως. Aluum mouet. V. circa finem.

B Περὶ Τελλίνων. Κεφ. η'.

ΤΕΛΛΙΝΑΙ δὲ παραὶ βύσσιλιν μάλιστα εἶ ὁ ἐξ αὐτῶν ζωμὸς παρχεραὶ εἶ ἥκιστα καὶ ῥύπτουσι λῷστα, καὶ μετὰ κεδρίας ἐπισταζόμεναι, τοὺς ἐκπλοκίσαντας τῶν βλεφάρων θρίχας οὐκ ἐῶσιν αὖθις φύειν. V. an omittit.

Περὶ Χηλῶν. Κεφ. θ'.

C ΚΑΙ ὁ ἐκ τῶν χηλῶν δὲ καὶ τῶν ἄλλων κογχυλίων ζωμὸς, κοιλίαν κινεῖ ἐλόμενος μετ' ἀλίγου ὕδατος· μετ' οἴνου δὲ λαμβανόμενος.

Περὶ Ὄνυχος. Κεφ. ι'.

ΟΝΥΞ ἐστὶ πῶμα κογχυλίου, ὅμοιον τῷ τῆς πορφύρας· διεισκήθυον δὲ τὴν D Ἰνδίαν, καὶ τοῖς ναρδοφόροις λίμναις. δίδωσι δὲ ἀρωματίζειν νεμομένοις τὸν κογχυλίον τοῖς ναρδοῖς· συλλέγεται δὲ, ἐπειδὰν ἀπὸ τῶν αὐχμῶν αὐαχθῶσιν αἱ λίμναι· διαφέρει δὲ ὁ ἀπὸ τῆς ἐρυθρᾶς κεκμιζόμενος, ὑπόλευκος ὢν καὶ λιπαρός. μέλας δὲ ὁ Βαβυλώνιος καὶ μικρότερος. ἀμφότεροι δὲ εὐώδεις θυμιώμενοι, καστορίζοντες ποσῶς τῇ ὀσμῇ· ἐμίεσαν δὲ καὶ οὗτοι τὸν θυμιαθέντες ταῖς ὑστερικαῖς πνιγμοῖς, καὶ ὑπολιποψυχικοί· πολῦται δὲ κοιλίαν ταραττόμενον. αὐτὸ δὲ τὸ κογχύλιον καίει, πιεῖν ὅσα καὶ ἡ πορφύρα καὶ ὁ κήρυξ. Vulg. quodammodo

Περὶ Κοχλίων. Κεφ. ια'. Par. περὶ τῶν χερσαίων

F ΚΟΧΛΙΑΣ χερσαῖος βύσσομαχος, δύσφθαρτος ἄριστος δὲ ὅ, τι τὸ Σαρδῶνι, καὶ Λιβύη, καὶ Ἀσπαλία, καὶ Σικελία, καὶ Χίῳ γινόμενος, καὶ ὁ τὸν τῆς Λιγυείας Ἄλπεσι πωμοειδὴς καλούμενος. καὶ ὁ θαλάσσιος δὲ βύσσομαχος εὐέκκριτος· ὁ δὲ πεπάμενος βεμφὸς. καὶ ὁ τοῖς ἀκάνθαις καὶ τοῖς θαμνίσκοις παρεσκελλημένος ἄγελος, οὓς τινες σεσίλους ἢ σεσίλιτα καλοῦσι, παρακλινὲς ὄντι κοιλίας καὶ στομάχου, ἐμετικούς. V. addit, ἀπαλὸν δὲ ἐστιν καὶ λιπαρόν. V. addit, ἀπαλὸν δὲ ἐστιν καὶ λιπαρόν. Par. tantùm σεσίλους καὶ σεσίλιτα.

Δυνάται δὲ πάντων τῶ ὄστρακα κεκαυμένα θερμαίνειν καὶ ἰσχναίνειν λέπρας, ἀλφούς, ὀδόντας· ἄλλως δὲ τοὺς ἐν ὀφθαλμοῖς καὶ λευκώματα, καὶ ἐφήλεις, καὶ ἀμβλυωπίας, μετὰ τῆς σαρκὸς ὅλοις κεκέντρις καὶ λελειωμένοις ἐπιχρίεσθαι σὺν μέλιτι ἀπόκαθαίρουσιν. ὠμοὶ δὲ σὺν τοῖς κελύφοις κεκλασμένοι, ἐξικμάζουσι τὰ ὑδρωπικὰ οἰδήματα· καὶ ὅση ἀφίσανται φλεγμονὴ πρὸς ἀποκαθάρσεις τοῦ ὑγροῦ. καὶ ποδαγρικὰς δὲ φλεγμονὰς παραύουσι, καὶ σκόλοπας ἕλκουσιν ὁμοίως καὶ τὰ πεπλασμένα. καὶ ἔμμηνα ἄγουσι λεῖοι προστεθέντες. αἱ δὲ σάρκες αὐτῶν λεῖαι σὺν σμύρνῃ καὶ λιβανωτῷ καταπλασθεῖσαι, τραύματα καὶ μάλιστα τὰ ἐν τοῖς πέρασι κολλῶσι, καὶ τοὺς ἐκ μυκτήρων αἱμορραγίας σὺν ὄξει λαβόντες ἐπίχριστοι ζῶσαν ἢ σάρξ κατεσθίουσα, τὸ Λιβυκὸν μάλιστα, ὀδύνας σταματοῦσι παυτί· μετὰ δὲ τοῦ ὀστράκου ὅλος βιβρὶς δὲ μετ' οἴνου καὶ σμύρνης πόλις· ὀλίγος, κωλικοὺς ἀναπείθει καὶ κύστεως ὀδύνας. ἀναπλᾶ δὲ τείχας ὁ χέρσαιος, ἐάν τις βελόνῃ κατὰ τῆς σαρκὸς αὐτοῦ φέρων τὸ τριχίσματος γλοιώδη τρόπον ἀπάπτῃ τῆς τριχός.

Περὶ Καρκίνων. Κεφ. ρδ'.

ΚΑΡΚΙΝΩΝ ποταμίων κελείων ἢ τέτρα κοχλιαρίων δυοῖν πλῆθος, σὺν ὑδρομέλιτι ῥίζης κοχλιαρίῳ ἑνὶ καὶ οἴνῳ πόλιος ὑπὲρ ἡμέρας γ'. βοηθεῖ λυσσώδεσι δήγμασι· σὺν δὲ μέλιτι ἐφθῷ, ῥαγάδας τοῖς ἐν ποσὶ καὶ τοῖς ἐν δακτυλίῳ καὶ χειμῶνας, καὶ καρκινώματα πρόσηρξ· λεῖοι δὲ ὠμοὶ σὺν χαλκῷ ὀπίῳ πόλιος, βοηθοῦσι δήγμασιν ἑρπετῶν, φαλαγγίων, σκορπίων πληγαῖς· ἐφθοὶ δὲ σὺν ζωμῷ ἐσθιόμενοι, φθισικοῖς ὠφελοῦσι, καὶ τοῖς λαγωὸν θαλάσσιον πεπωκόσι· φθίσεις δὲ μὴ ὠφέλουσι καὶ προστεθέντες, σκορπίους κλείουσι. δύνανται δὲ τὰ αὐτὰ καὶ ὁ θαλάσσιος, πλὴν ἧττον τούτων ἐνεργοῦσι.

Περὶ Σκορπίου χερσαίου. Κεφ. ργ'.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ χερσαῖος ὠμὸς, λεῖος ἐπιτεθεὶς, βοήθημα τῆς ἰδίας πληγῆς γίνεται· εὑρίσκει δὲ καὶ ὀπτηθεὶς πρὸς τὸ αὐτό.

Crematæ omniũ testæ calfaciendi vrendique: lepras, vitiligines ac dentes etiam extergendi vi possunt: oculorum verò cicatrices & albugines, maculas à sole contractas, ac visus hebetudines emendant, si totæ cum sua carne vstæ & contritæ illinantur. At crudæ cum suis calicibus impositæ hydropicorum tumores discutiunt, neq; priùs amouentur, quàm omnis exhauriatur humor. Sed & podagricas inflammationes leniunt, ac impactos etiam corpori aculeos similiter impositæ euocant: menses quoque tritæ & appositæ ciunt. Porrò carnes earum tritæ, & cum myrrha ac thure illitæ, tum vulnera alia, tum maximè quæ neruis inflicta sunt conglutinant: tritæ in aceto sanguinis è naribus eruptiones cohibent. Viuæ caro, & maximè Africanæ, deuorata stomachi dolores mitigat. Tota verò cum testa sua trita & cum vino ac myrrha exigua quantitate bibita, colicos dolores vesicæque cruciatus sanat. Terrestris fluentem pilum glutinat & cohibet, si quis traiectæ per carnem ipsius acus mucroni hærentem viscidum lentorem pilo admouerit.

De Cancris. Cap. XII.

CANCRORVM fluuiatilium exustorum cinis duùm cochleariũ mẽsura cũ gentianę radicis cochleario vno ac vino triduo potus, à cane rabioso demorsis euidẽter opitulatur. Ex melle verò cocto rimas pedum sedísque, perniones & carcinomata lenit. Triti crudi, potíque ex asinino lacte, contra serpentium phalangiorúmque morsus & scorpionum ictus auxiliantur. Decocti autem & ex iure suo sumpti phthisicis prosunt, iísque qui leporem marinum hauserint. Triti cum ocimo & admoti, scorpiones necant. Possunt eadem marini, sed minore quàm illi efficacia.

De Scorpione terrestri. Cap. XIII.

TERRESTRIS scorpio crudus, tritus & impositus, suę plagę remedium est: estur quoque tostus in eundem vsum.

Δυνάται] Sic Ald. cod. Goup. Vulg. πάντων τὰ ὄστρακα κεκαυμένα θερμαίνειν καὶ ἰσχναίνειν λέπρας, ἀλφούς, ὀδόντας· ἄλλως δὲ τοὺς ἐν ὀφθαλμοῖς καὶ λευκώματα, καὶ ἐφήλεις, καὶ ἀμβλυωπίας, μετὰ τῆς σαρκὸς ὅλοις κεκέντρις καὶ λελειωμένοις ἐπιχρίεσθαι σὺν μέλιτι ἀποκαθαίρουσιν. ὠμοὶ δὲ σὺν τοῖς κελύφοις κεκλασμένοι, ἐξικμάζουσι τὰ ὑδρωπικὰ οἰδήματα· καὶ ὅση ἀφίσανται φλεγμονὴ πρὸς ἀποκαθάρσεις τοῦ ὑγροῦ. καὶ ποδαγρικὰς δὲ φλεγμονὰς παραύουσι, καὶ σκόλοπας ἕλκουσιν ὁμοίως καὶ τὰ πεπλασμένα. καὶ ἔμμηνα ἄγουσι λεῖοι προστεθέντες. αἱ δὲ σάρκες αὐτῶν λεῖαι σὺν σμύρνῃ καὶ λιβανωτῷ καταπλασθεῖσαι, τραύματα καὶ μάλιστα τὰ ἐν τοῖς πέρασι κολλῶσι, καὶ τοὺς ἐκ μυκτήρων αἱμορραγίας σὺν ὄξει λαβόντες ἐπίχριστοι ζῶσαν ἢ σάρξ κατεσθίουσα, τὸ Λιβυκὸν μάλιστα, ὀδύνας σταματοῦσι παυτί· μετὰ δὲ τοῦ ὀστράκου ὅλος βιβρὶς δὲ μετ' οἴνου καὶ σμύρνης πόλις· ὀλίγος, κωλικοὺς ἀναπείθει καὶ κύστεως ὀδύνας. ἀναπλᾶ δὲ τείχας ὁ χέρσαιος, ἐάν τις βελόνῃ κατὰ τῆς σαρκὸς αὐτοῦ φέρων τὸ τριχίσματος γλοιώδη τρόπον ἀπάπτῃ τῆς τριχός.

Καρκίνων] In margine scholion vetus, τὰ γλάσσαι καὶ οἱ ποταμοὶ ἔνυδροί εἰσιν ἢ καὶ ζωμὸ ἐδιάβρυσι.

ἐφθοὶ δὲ] Al. ἐφθαὶ δὲ

Σκορπίου] Marc. διὰ σκορπίου

De Scorpione marino. Cap. XIIII.

Marini scorpionis fel cõuenit ad oculorum suffusiones, albugines & hebetudines.

De dracone marino. Cap. XV.

DRACO marinus exectus & impositus, ictus spinæ suæ qua ferit medela est.

De Scolopendra. Cap. XVI.

SCOLOPENDRA marina in oleo decocta & peruncta pilos detrahit: contactu verò pruritus excitat.

De Torpedine. Cap. XVII.

TORPEDO marina in diutinis capitis doloribus imposita, doloris vehementiam mulcet. Eadem sedem euersam prociduám ve coörcet.

De Vipera. Cap. XVIII.

VIPERÆ caro cocta & in cibo sumpta claritatem oculis affert, ad neruorum vitia proficit, increscentésque strumas reprimit. Detracta autem cute, caput & caudam, quoniam carne vacant, amputari oportet. Fabulosum enim est quod præcipitur, vt extremarum partium certa vtrinque mensura præcidatur. Reliquum verò (exemptis interaneis) corpus elotum & in frustra sectum ex oleo & vino cum salis exiguo & anetho discoquitur. Aiunt porrò ijs qui viperinas carnes esitauerint, pediculos procreari: quod falsum est. Insuper verò referunt nonnulli, qui ijs vescantur longam senectutem adipisci. Sal ex ijs ipsis ad eadem conficitur, sed non est perinde efficax. Viua autem vipera in ollam nouam demittitur, adijciúntúrque salis triti caricarúmque itidem tritarum an. sextarij singuli, mellis cyathi VI. mox ollæ operculum luto oblinitur. Sic ea in fornace torrentur, donec sal in carbones redigatur. Is postea ad læuorem tritus recondítur: ac interdum quò iucundiùs ori sapiat, spica nardi aut folij seu malabathri momentum immiscetur.

Περὶ Σκορπίου θαλασσίου. Κεφ. ιδ'.

Τοῦ δὲ θαλασσίου σκορπίου ἡ χολὴ ἁρμόζει πρὸς τὰς ἐν ὀφθαλμοῖς ὑποχύσεις καὶ λευκώματα καὶ ἀμβλυωπίας.

Περὶ Δράκοντος θαλασσίου. Κεφ. ιε'.

Ὁ ΔΡΑΚΩΝ θαλάσσιος ἀναπυρῶδης καὶ ὀδοντώδης, ἰάσιμά ἐστι πρὸς τὴν ἐκ τῆς ἀκάνθης αὐτοῦ πληγήν.

Περὶ Σκολοπένδρας. Κεφ. ιϛ'.

Ἡ ΣΚΟΛΟΠΕΝΔΡΑ θαλασσία ἑψηθεῖσα ἐν ἐλαίῳ καὶ καταχριομένη, ψιλοῖ τρίχας· φανεῖσα δέ, κνησμοὺς ἐργάζεται.

Περὶ Νάρκης. Κεφ. ιζ'.

Ἡ ΝΑΡΚΗ θαλασσία ὀδοντωθεῖσα ἐπὶ χρονίαις ὀδύναις τῆς κεφαλῆς, παραύτικα σφοδρὰς τὰς ἀλγήσεις· καὶ ἕδρᾳ δὲ ἐκπεπτωκυίᾳ ἢ καὶ ἀποπτουσῶν φλεγμὴ παραθεῖσα.

Περὶ Ἐχίδνης. Κεφ. ιη'.

Ἡ ΕΧΙΔΝΗ ἀφ' ἑψηθεῖσα καὶ ἐναλισθεῖσα, ἐξυδρηκὸς ποιεῖ τὰς ὄψεις, ἢν πρὸς τὰ νυσταλέα ἁρμόζῃ, καὶ τὰς αὐξομένας χοιράδας ἴσχει· δεῖ δὲ ἐκδειρᾶσαι αὐτὴν, ἀποκόψαι, κεφαλὴν καὶ οὐράν, διὰ τὸ ἐν αὐταῖς ἄσαρκον. μυθώδης γὰρ ἡ περὶ τοῦ μέσου ἀποκοπὴ τῶν ἄκρων· τὸ δὲ λοιπὸν πλυνάμενα καὶ τριμαχίσαντας, ἑψεῖν μετ' ἐλαίου καὶ οἴνου καὶ ἁλῶν ὀλίγων καὶ ἀνήθου φασὶ δεῖν τοὺς προσφερομένους φθείρας * ἡμνᾶν· ὅταν δὲ ἕψωσι πεπονηκέναι δεῖν ἔνιοι καὶ μακροχρονίους γίνεσθαι τοὺς ἐσθίοντας αὐτάς. καταπυάζουσι δὲ καὶ ἄλες ἐξ αὐτῶν πρὸς τὰ αὐτά, * πλὴν οὐχ ὁμοίως ἰσχυρόν. καθίενται δὲ ἐχίδνα ζῶσα εἰς κεραμεῖον χύτραν, ἧς μέσῃ αὐτῆς ἁλῶν, ἰχάδων τριμμένων, ἀνὰ ξέστης ἑ. * μετὰ μέλιτος κυάθων ϛ'. ἐπιχρίεται πηλῷ ὁ πῶμα τῆς χύτρας, καὶ ὀπτᾶται ἐν καμίνῳ, ἄχρις οὗ ἀνθρακωθῶσιν οἱ ἄλες· μετὰ δὲ ταῦτα λεπτοτριβηθέντες ἀποτίθενται, οἱονεὶ μιγνύμενον τοῖς * θύμου χίαις αὐξῆς ναρδοστάχυος, ἢ φύλλου, * ἢ μαλαβάθρου βραχίος.

A

B

C

D

E

F

G

V. addit καὶ πυδίχου.

Marc. πλατάνιστος

Quidam add. καὶ Υδατοπύκι

Ruellius legit ἑ.

V. ἢ μακαζάθου, ἢ οὔλου ξυλοχίου, al. ἢ μαλαβάθρου φυλλου βραχίος

Περὶ Ὄφεως γήρως. Κεφ. ιθ'.

Γῆρας ὄφεως ἐψηθὲν ἐν οἴνῳ, ὀσφρημά ἐστιν ὠτηλγίας ἐσχόμενον, καὶ ὀδοντάλγίας διακλυζόμενον. μίσγουσι δὲ αὐτὸ καὶ εἰς ὀφθαλμικὰς δυνάμεις· μάλιστα δὲ ὃ τῆς ἔχεως.

Περὶ Λαγωοῦ θαλαττίου. Κεφ. κ'.

Λαγωὸς θαλάσσιος ἔοικε μὲν μικρᾷ τυφλῷ· δύναται δὲ λῖπος καταπλασθεὶς καθ' ἑαυτὸν καὶ μετὰ ἀκαλύφης πείσας ψιλοῖ.

Περὶ Λαγωοῦ χερσαίου. Κεφ. κα'.

Τοῦ δὲ χερσαίου λαγωοῦ ὁ ἐγκέφαλος, ἵππος βιβρωσκόμενος ὠφελεῖ ζῶσιν ἐξ ὕπνου γινομένους· καὶ ὀδοντιάσεις ὅταν παίδων ὀδοντιζόμενος καὶ ἐκπίπτοντας. ἡ δὲ κεφαλὴ αὐτοῦ καυθεῖσα καὶ καταχριστεῖσα μετὰ σίαπος ὄξους, ἀλωπεκίας θεραπεύει. ἡ δὲ πτυὰ πιθεῖσα μετὰ ἡμέρας τρεῖς μετὰ τὸ ἄφεδρον, ἀτόκους εἰς ἰσορρέπει· ἐπέχει δὲ καὶ τὸ ἐκ μήτρας ῥεῦσιν, καὶ κοιλίας. ὠφελεῖ δὲ καὶ ὀπτιληπτικοὺς, καὶ πρὸς τὰ θανάσιμα μετ' ὄξους πινόμενα. μάλιστα δὲ πρὸς χαλαζίας θρόμβωσιν καὶ ἐχιδνῶν δήγματα. τὸ δὲ αἷμα αὐτοῦ θερμὸν καταχριόμενον, ἐφηλίδας καὶ ἀλφοὺς καὶ φακοὺς θεραπεύει.

Περὶ Τρυγόνος θαλασσίας. Κεφ. κβ'.

Τρυγὼν θαλασσίας ὁ κέντρον, ὁ δὲ ἀπὸ τῆς οὐρᾶς αὐτῆς πίπτων ἀνεγραμμένοις ταῖς φολίσι, ὀδόντα πονοῦντα παραυτίκα θρύπτει καὶ ἀποβήσσει.

Περὶ Σηπίας. Κεφ. κγ'.

Σηπίας ἐψηθείσης μέλαν βιβρωσκόμενον δυσπεπτον, κοιλίας μαλακτικόν. τὸ δὲ ἀπ' αὐτῆς ὀστρακον χριματισθὲν εἰς κολλύρια ἁρμόζει πρὸς πτερύγια καὶ τραχύτητας βλεφάρων· καὶ ὑπὲρ τὸ ἰδίῳ ὀστράκῳ, ἄλγεις δὲ τὸ πλακοῦντες αὐτῆς ἀποσῇ, σμήχει λῖπος, ἀφροῖς, πίτυρα, ὀδόντιας, ἐφηλίδας· μίγνυται δὲ εἰς τὰ ὀφθαλμικὰ πλυθὲν· παύει δὲ καὶ πρὸς λευκώματα κτηνῶν ἐμφυσώμενον· καὶ περύσια ἐν ὀφθαλμοῖς τῆκει, σὺν ἁλοὶ λῖπος προσαγόμενον.

De Anguium senecta. Cap. XIX.

Anguinæ vernationis membrana in vino si decocta fuerit, dolori quidem aurium infusa, dentium verò doloribus collutione, auxilio est. Miscetur & ipsa in oculorum medicamenta, sed præcipuè quæ viperæ maris est.

De Lepore marino. Cap. XX.

Lepvs marinus loligini paruæ similis est. Is tritus tũ per se, tum cum vrtica (marina) adhibitus, deglabrandi vim obtinet.

De Lepore terrestri. Cap. XXI.

Terrestris leporis inassatum cerebrũ si mandatur, tremoribus prodest ex pauore obortis: infantium quoque dentitiones tũ affrictu tum cibo adiuuat. Exustum ipsius caput & cum adipe vrsino aut aceto perunctum, alopecijs medetur. Porrò coagulum post triduum a mẽstrua purgatione potum, sterilitatem facere, adeoque omnem partus spem intercipere perhibetur. Vuluæ etiãnum aluique fluorẽ sistit. Comitiales quoque iuuat, & contra venena ex aceto bibitũ prodest: præsertim verò aduersus lac in grumos cõcretum, viperarúmque morsus. Cæterùm sanguis eiusti calidus illinatur, maculas a sole contractas, vitiligines, lentiginẽsque sanat.

De Pastinaca marina. Cap. XXII.

Pastinacæ marinæ radius, qui quidẽ ipsius cauda reflexis squamis enascitur, dentis dolorem mitigat: siquidem illum & comminuit & ejicit.

De Sepia. Cap. XXIII.

Sepiæ coctæ atramentũ in cibo sumptũ, ęgrè concoquitur, aluum emollit. Ipsius verò testa in collyria efformata, scabris genis perfricãdis accommodatur. Vstum verò intra propriã testam quod ipsa testa concluditur, donec id quod ᵛcrustosum est abscedat, posteaque tritum, exterit vitiligines, furfures, dentes & maculas à sole contractas. Porro elotum in medicamenta oculorum additur. Facit & præclarè iumentis ad oculorum albugines, si insuffletur. Pterygia quoque oculorum absumit, cum sale tritum & adhibitum.

ᵛ scabrosum seu rubellum

De Mullo. Cap. XXIIII.

MVLLVS frequenter in cibo ſumptus, viſus hebetudiné facere creditur. Quòd ſi crudus diſſectúſque imponatur, marini draconis ac ſcorpionis, itémque aranèi ictibus medetur.

De Hippopotami ſeu fluuiatilis equi teſticulo. Cap. XXV.

HIPPOPOTAMI teſticulus exiccatus & ad lzuoré tritus, contra ſerpentium morſus ex vino bibitur.

De Caſtorio, ſeu fibri teſtibus. Cap. XXVI.

Fiber animal eſt ancipitis vitæ, quod plerunq; cũ piſcibus & cancris vitam in aquis degit. Auxiliantur quoque ipſius teſtes contra ſerpentium venena. Sternutamenta etiamnum mouent, ac in vniuerſum multiplices vſus obtinent. Siquidem duabus drachmis cum pulegio pori mẽſes cient, & partus ſecundáſque eijciunt. Ex aceto verò contra inflationes, tormina, ſingultus, exitialia venena, priuatímque ixiam bibũtur. Lethargicos & alio quocunque veterni genere correptos cum aceto & roſaceo irrigati excitant. Sed & olfactu & odoris ſuffitu eadem præſtant. Proſunt & tum potu, tum etiá illitu ad tremores, conuulſiones, omniáque neruorum vitia: ac in ſumma calfactoriá vim habent. Porro teſtes ſemper eligito, qui ſint ex vno ortu cõnexi, (fieri enim nõ poteſt vt gemini folliculi in vna membrana coniuncti reperiãtur) liquore intus veluti ceroſo, odoris grauis, ac viroſo guſtu, acri & mordaci, friabili: quíque naturalibus tunicis perpetuò diſtinguantur. Ipſum fraude corrumpunt nonnulli, ammoniacũ aut gummi cum ſanguine & caſtorio ſubactum in folliculum infundentes, & ita exiccantes. Vanum eſt autem quod narratur, animal ipſum, dum à venatoribus vrgetur, teſtes ſibi auellere & abijcere: fieri enim nequit ipſos vt attingat, quippe qui ſint velut in ſue ſubſtricti. Cæterùm diuiſa pelle liquorem melleum vnà cum ipſum continente tunica excipere oportet, atque ita ſiccatũ reponere.

Περὶ Τείγλης. Κεφ. κδ'.

ΤΡΙΓΛΑ συνεχῶς ἐαθιομένη ἀμβλυωπίας δοκῇ καὶ ἀκοὰς ἰσχνὴν παρέχειν. ὠμὴ δὲ ἀναμαθεῖσα καὶ ὀλίγον ἐλαίου, θαλασσίου δράκοντος καὶ σκορπίου καὶ ἀράχνης δάγματα ἰᾶται. Ποτὶ δάγματα

Περὶ Ὄρχεως ἱπποποτάμου. Κεφ. κε'.

ΟΡΧΙΣ ἱπποποτάμου ξηραθεὶς καὶ λεανθεὶς, πινόμενος μετ' οἴνου σφοδρὸς ἐρπετῶν δάγματα.

Περὶ τῶν τοῦ κάστορος ὄρχεων. Κεφ. κς'.

*Κάστορος ὄρχις (ζῴων ἐστὶν ἀμφίβιον, τὸ πλεῖστον ἐν ὕδασι, σὺν ἰχθύσι καὶ καρκίνοις, τρεφόμενον) ποιεῖ μὲν καὶ σφόδρα ἐρπετά. ἔστι δὲ καὶ φαρμακὸς, καὶ καθόλου πυκνὸν ἔχει τὸ χεῖσθαι πολὺν μὲν ὑγρὸν, παχεῖ γλίσχρον < πλῆθος δυοῖν, ἐμμελῆ καὶ, ἐμβρυα καὶ δύστοκα ἐκβολή. πίνεται δὲ σὺν ὄξει καὶ σφόδρα ἐμπλάσματα ὠφελεῖ, φρόφος, λυγμοὺς, θανάσιμα φάρμακα, ἰξίαν ἀναλαμβάνει δὲ ἐν τοῖς ληθαργικοῖς, καὶ τοῖς ὅπως δήποτε καταφερομένοις, ἐμβρεχόμενος σὺν ὄξει καὶ ῥοδίνῳ, καὶ ὀσφραινόμενος. καὶ ὑποθυμιώμενος ὁμοίως αὐτὰ ποιεῖ· ἁρμόζει δὲ καὶ θύμοις καὶ ἀποπνοιῶν, καὶ πρὸς τὰ νευρώδη, πυρώδεσί τε καὶ συνεχομένοις. καὶ καθόλου θερμαντικὴν ἔχει τὴν δύναμιν. ἐκλέγου δὲ ἀεὶ τοῖς συνεζευγμένους ὄρχεις ἐκ μιᾶς ἀρχῆς (ἀδύνατον γὰρ δύο φύσεις ἐζευγμένας εἰς ἓν ὑμένι εἶναι) καὶ τὸ εἴδος· ἔχουσι γὰρ ὑποῤῥοδίας βαρύοσμοι, βρομώδεις, δριμεῖς, δακνώδεις, ὀπτεσθαι, ἀλλὰ φραττόμενοι τὰ συνεχῶς φυσικοῖς ὑμέσι. δολοῦσι δέ τινες αὐτὸ, ἀμμωνιακὸν ἢ κόμμι συμπεφυρμένον αἵματι καὶ κασταίῳ ἐγχέοντες εἰς φύσαν καὶ ξηραίνοντες. μάτην δὲ λέγεται ὅτι διωκόμενον ὑπὸ τῶν ζῴων ἀποτέμνεται τοῖς ὀδοῦσι καὶ ῥίπτει· ἀδύνατον γάρ ἐστιν ἅψασθαι αὐτῶν, προεκπιπτόντων ὥσπερ ὑός. δεῖ δὲ διελόντας τὸ δέρμα κομίσασθαι σὺν τῷ περιέχοντι ὑμένι τὸ ὑγρὸν, ὃν μελιττώδες, καὶ ὅταν ξηράνωσιν ἀποτίθεσθαι.

V. incipit ἡ δὲ κάστορος ὄρχις ἰσχὺν δὲ ζῴων, quasi hoc caput continuum cum proximè præcedenti facerit.

V. διαφέρον. ἰχθύσι]

V. quidã caret hac tota clauſula.

V. ὀσφραίνῃ

Vulg. exempl. ποιῆσαι potiùs dare.

Περὶ Γαλῆς καταιμάτου. Κεφ. κζ.

ΓΑΛΗ καπνισθεῖσα καθεφθεῖσα, καὶ δίχα τοῦ ἰοῦ ἐκλειπτικὴ ἐστι καὶ ξηρανθεῖσα ἐν σκιᾷ πόμα ἐρπετοῦ ἐνεργέστερον ὄφεως βοηθήματος, πωθεῖσα μετὰ οἴνου ⊲ ὁ πλήθος, & τοξικὸν ἀντιφάρμακον ὁμοίως λειφθεῖσα. ἡ δὲ χιλία αὐτῆς χρεία πληθεῖσα καὶ ἐκλειπτικὴ, ἠρισθικοῖς καὶ ἐπιληπτικοῖς βοηθεῖ πινομένη. ὅλη δὲ καυθεῖσα ἐν χύτρᾳ, ποδαγρικὰς ὠφελεῖ, τῆς τ' ὄφρυος καὶ τριχορρυούσης μετ' ὄξους. Τὸ δὲ αἷμα αὐτῆς καταχριόμενον, χειράγρια βοηθεῖ· ὠφελεῖ δὲ καὶ ὀπιληπτικούς.

Vulgo καὶ λεῖον

Περὶ Βατράχων. Κεφ. κη'.

ΒΑΤΡΑΧΟΙ αἱ πιφαρμακοὶ εἰσιν ἑρπετῶν πομάτων, ζωμευθέντες ἐν ἁλὶ καὶ ἐλαίῳ, ᾧ ζωμῷ λαμβανομένῳ ὁμοίως· καὶ τρὸς χρονίους τῶν τενόντων ἀποστάσεις· καίοντες δὲ καὶ ὀπιπαθέντες, αἱμορραγίαν σίλλουσι. καὶ ἀλωπικίας ἠραμβύουσι σὺν πίσσῃ ὑγρᾷ κατα χριόμενοι. τῶν δὲ χλωρῶν βατράχων τὸ αἷμα ὀπισθιζόμενον, κωλύει τὰς ἐκ μελαγχίτιδος ἀπὸ τῶν βλεφάρων σείχας φύειν· ὠφελοῦσι καὶ ὀδοντοαλγίας στομιζόμενοι ὕδατι καὶ ὄξει, καὶ διαπλυζόμενοι.

Περὶ Αἰλούρου. Κεφ. κθ'.

ΑΙΛΟΥΡΟΣ νεαρὸς βιβρωσκόμενος, ζωφελεῖ ὅτι καὶ βοηθάλιος· ταριχευθεὶς δὲ, ἄτροφος ἀρτηρίας· ἡ καθαίρει & εὐπλαθῆ καὶ καταπλαθεῖσα διὰ τῆς ἕδρας· τὸ ταριχηθὲν, σκόληκας ἐκβάλλει. & ἡ ἐξ αὐτοῦ ὑγρασία ἐν ἀρχῇ δυσεντερικοῖς εἰς ἔκκαθαρσιν, καὶ ἀγαγοῦσα τοὺς ῥευματισμοὺς εἰς τὰ ὀπίσθια. & ἐγκλυζομένη δὲ, ἰσχιαδικοὺς θεραπεύει.

Vulgo καὶ ταριχευθὲν

Vulgo addit ἐκ

Περὶ Σμαρίδος. Κεφ. λ'.

ΣΜΑΡΙΔΟΣ περιχρισθεῖσα ἡ κεφαλὴ καυθεῖσα, ἕλκη σήπει ὑποσαρκώδη, καὶ νομὰς ἵστησι, & ἥλους, καὶ θύμους ἀναιρεῖ· σκορπιοπλήκτοις τε καὶ κυνοπλήκτοις ἡ σὰρξ ἁρμόζει, καθάπερ πᾶς ταρίχος.

Loc. ex veteri addit καὶ λῶν

Leg. κυνοδήκτοις.

Περὶ Μαινίδος. Κεφ. λα'.

ΚΑΙ τῆς μαινίδος δὲ καφαλὴ καυθεῖσα λεῖα, ταῖς ἐκ δακτύλῳ τιλωμέναις

A *De Muſtela vulgari ſeu domeſtica. Cap. XXVII.*

MVSTELA quæ in domibus noſtris oberrat, flammis ambuſta & exemptis interaneis ſale inueterata, tandémque in vmbra ſiccata, binis drachmis in vino pota cõtra ſerpentium genus omne præſentaneo eſt remedio. Toxico ſimili ſumpta modo reſiſtit. Eiuſdem ventriculus coriandro fartus inueteratúſque, ijs qui à venenatis beſtijs commorſi fuerint, & comitialibus potu auxiliatur. Tota verò in olla cõcremata, podagricis cõfert, cinere ex aceto illito. Cęterùm ipſius ſanguis peruncto ſtrumis opitulatur, ac comitialibus itidem prodeſt.

B

C

De Ranis. Cap. XXVIII.

CONTRA omnium ſerpentium venena pro antidoto ſunt ranæ, cum ſale & oleo è iure decoctæ, ſi ius ipſum itidem ſorbeatur. Valent & ad diuturnos tendinum abſceſſus. Vlcæ vero & inſperſæ, profluentis ſanguinis impetum ſiſtunt: quin D & ſanant alopecias, cum pice liquida illitæ. At viridium ranarum ſanguis inſtillatus euulſos palpebris pilos renaſci prohibet. Decoctæ etiãnum in aqua & aceto dentium dolores collutione leniunt.

De Siluro. Cap. XXIX.

SILVRVS recens in cibo ſumptus probè nutrit, & bonam facit aluũ: ſale verò conditus, vix alimentum vllum ſubminiſtrat. Arteriã tamen expurgat, vocíque ſplẽdorem affert. Impoſita verò ſaliti caro, aculeos & infixa corpori ſpicula extrahit. Ipſius quoque muria dyſentericis circa principia conuenit ad inſeſſus: quippe quæ fluxiones ad ſumma cutis eliciat. Quin & iſchiadicis infuſa medetur.

E

F

De Smaride. Cap. XXX.

SMARIDIS ſalitæ caput exuſtũ tritúmque, excreſcentes in vlceribus carnes cohibet, nomáſque compeſcit: clauos thymóſque abſumit. Caro, quemadmodum & ſalſamentum omne, prodeſt à ſcorpione ictis, & à cane demorſis.

G

De Mæna. Cap. XXXI.

MÆNÆ quoque caput vſtũ, tritúmque ſi inſpergatur, calloſas

sedis rhagadas emendat. Ipsius vero garum, in ore putrescentia vlcera collutione sedat.

De Gobio. Cap. XXXII.

GOBIVM recentem si in suillum ventriculum immiseris, & consuta rima in duodecim aquæ sextariis, donec duo supersint decoxeris, excolatúmque ius ac sub diuo refrigeratum potui dederis, aluum citra perturbationem subduces. Porrò impositus ijs qui à canibus serpétibúsve demorsi fuerint auxiliatur.

De salsamento quod omotarichon appellatur. Cap. XXXIII.

QVEM omotarichum vocant, cõditanei thunni cato est. Hęc sũpta ijs auxiliatur, quos vipera, præter dicta, momorderit. Sed oportet vinum quamplurimum subinde cogatur haurire, ita vt vomitione reddatur. Ad eadem maximè conuenit, ad quæ & cætera quæ in alimentorum genere sunt acria. Canũ quoq; morsibus vtiliter imponitur.

De Garo. Cap. XXXIIII.

GARVM omne quod è piscibus carnibúsque sale maceratis eliquescit, nomas cohibet & morsis à cane medetur. Dysentericis quoq; & ischiadicis infunditur: illis quidẽ, vt intestinorum vlcera compescat atque coerceat: his verò, vt intestina ipsa, quamuis minimè exulcerata, ad infestantes coxam humores euacuandos stimulet ac prouocet.

De Recentiũ piscium iusculo. C. XXXV.

RECENTIVM piscium ius, modò per se, modo ex vino potum, aluum subducit. Peculiariter autẽ ad hũc vsum præparatur e phycidibus, scorpionibus, iulidibus, percis & aliis saxatilibus teneris, nec virus resipientibus. Coqui vero debent simpliciter in aqua, additis oleo, anetho & sale.

De Cimicibus. Cap. XXXVI.

CIMICES qui in cubilibus enascũtur, numero septeni cum fabis in cibos additi, & ante accessiones deuorati, quartana laboratibus auxilio sunt. Quin & citra fabas deuorati, demorsis ab aspide prosunt. Vuluæ strangulatione affectas olfactu reuocant. Cęterùm sanguisugas cum vino aut aceto poti pellunt.

Περὶ κωβιοῦ. Κεφ. λβ'.

ΚΩΒΙΟΝ πεπτὸν ἐὰν ἐμβάλῃς εἰς ὑείαν κοιλίαν καταῤῥάψας, καὶ ἑψήσας τὸ μὲν ὕδατος ξέστῃ ιϛ'. ἄχρι δυοῖν ξεστῶν, καὶ διηθήσας καὶ ἁλισθήσας ποτίσῃς, κοιλίαν ἀταράχως κάτω ἄγει. καὶ καταπλασθὲν δέ, καὶ τοῖς ἔξω κινωδύνοις ὠφελεῖ.

Περὶ Ὠμοταρίχου. Κεφ. λγ'.

Ο Δὲ ὠμοτάριχος λεγόμενος, σάρξ ἐστι θύννου πεπαρειχυμένου. βοηθεῖ δὲ λαμβανομένοις τοῖς ἔξω ἐχίδνης, τ' καλουμένης ὀφεως, δηλονότι· δεῖ δ' ὡς ὅτι πλεῖστον προσφέρειν οἶνον αὐστηρὸν πίνειν πολύν, καὶ ἐμεῖν. εἰς τε τὰς δριμυφαγίας μάλιστα ἁρμόζει, καταπλάττειν δὲ καὶ ὅπου κινοδύκτων ὠφελίμως.

Περὶ Γάρου. Κεφ. λδ'.

ΓΑΡΡΟΝ δὲ πᾶν ὃ ἐκ παντοίων ἰχθύων καὶ κρεῶν, καταπλαττόμενον νομὰς ἔφυσα, καὶ κινοδύκτους ἰᾶται· ἐνίοτε δὲ καὶ ὅτι δυσεντερικοῖς, καὶ ἰσχιαδικοῖς· ἐφ' ὧν μὲν ἵνα τὰ εἰλκωμένα· ὅταν δὲ σὺν, ἐφ' ὧν δὲ ἵνα τὰ αἰσθανόμενα ἐρεθίσῃ.

Περὶ Ζωμοῦ τῶν ἀπὸ τῶν ἰχθύων. Κεφ. λε'.

ΖΩΜΟΣ δὲ ὁ ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν ἰχθύων, χιλίας ἔστ' ἀγωγός, ποτὲ μὲν καθ' ἑαυτὸν πινόμενος, ποτὲ δὲ μεῖξαι οἶνῳ ἰδίως δὲ σκυβάζεται πρὸς ταῦτα ὁ ἀπὸ τῶν φωκίων, καὶ σκορπίων, καὶ ἰουλίδων, καὶ πορκίδων, καὶ τῶν ἄλλων πετραίων ἁπαλῶν καὶ ἁβρωμένων, λιτῶς μὲν ὕδατος, καὶ ἐλαίου καὶ ἀνήθου.

Περὶ Κόρεων. Κεφ. λϛ'.

ΚΟΡΕΙΣ ⓐ ἀπὸ κλίνης σὺν ⓑ βρώμασι μετὰ κυάμων ⓒ ἀριθμὸν ζ', καὶ καταπινόμενοι πρὸ τῶν ἕκτων πυρετῶν, ὠφελοῦσι τοὺς τριταίους. καὶ ἀσπιδοδήκτους δὲ ἅμα τῷ κυάμῳ καταπόντες ἱστορικῶς δὲ πυρετώδεις αἱ καλοῦσιν οἱ σοφοὶ ὀνόμασι· σὺν οἴνῳ δὲ ἢ ὄξει πολλοῦ, βελέλλας ἐξάγουσι

A ραγάδας· καταπλαττόμενα ἀφίστησι· δὲ καὶ γάργαρα αὐτῆς τῷ στόματι σπιδόνας ἀφανίζει ἐμπαίουσι.

B

C

D

E

F

G

V. nonnulli extant quæ hãc periodum omittũt.

Mar. legit κατατιλλόμενα. Leg. οἷον τὰ Vulg. Ἑλκώσεις

V. quidam Ἑλκώσεις. Cora. Ἑλκώσεις V. ἰλιοδίνια

Lacuna legitur ἀπὸ τῶν ἄλλων πετραίων ἁπαλῶν καὶ φωκίδων πλὴν τῶν ἰουλίδων

V. addit καὶ γραθίδων

Aretæus Semb. non simpliciter interpretatur, sed parũ ac leuiter, velut iusculo brassicæ, piscẽ soluendum coqui solent.

In altero codice hæc vox deest. Goup.

δυσουρίαν τὰ παιόνιον σὺν ὑδρομέλιτι πρὸς οὐρητικῷ πόρῳ λῦσαι.

Al. ὑδρίων

Περὶ Κανθαρίδων. Κεφ. λζ'.

ΟΝοι ὑπὸ τῶν ὑδρίων, ζῶά εἰσι πολύποδα, σφιγγόμενοι καὶ θιγόντα ἑαυτὰ εἰς πάφας τὴν χεῖρα. οὗτοι πολῦντες σὺν οἴνῳ βοηθοῦσι δυσουρίᾳ τε καὶ ἐκ πέρω. ἀφελκύσαντες ὑμεναὶ μέλιτος στομαλγικοὺς ὠφελοῦσι. καὶ τοὺς αἰγιλωπας ὑ λῦσι σὺν ῥοδίνῳ θερμοθέντες σὺν κηλύφῳ ῥοᾶς καὶ ὄξα λίπτουσι, ἀφιᾶσιν.

V. ad marg. εἰς πόρον

Περὶ Σίλφης. Κεφ. λη'.

ΣΙΛΦΗ ΣΤΗΣ ὑπὸ τοῖς ἄρτοκοπείοις βύσκομένης τὰ ὄτα ῥιζώματα σὺν ἐλαίῳ, ἢ ἐλάδματα, ἢ ὄξα ζώματα, ὠτολογίας παύει.

Περὶ πνεύμονος θαλασσίου. Κεφ. λθ'.

ΠΝΕΥΜΩΝ θαλάσσιος τοῦ σφαγέντος λειανθεὶς, ποδαγρικοῖς ἐπιχριόμενος καὶ χειμετλιῶσι ὠφελεῖ καταπλασσόμενος.

Περὶ Χοιρείου πνεύμονος. Κεφ. μ'.

Ο Δὲ χοίρειος καὶ ἄρνειος καὶ ἄρκτειος πνεύμων, τὰ ἐκ τῶν ὑποδημάτων παθήματα τὰ ὑπὸ πνεύμονι ἀφλέγμαντα τηροῦσιν.

Περὶ Γυπὸς πνεύμονος ἀλωπέκος. Κεφ. μα'.

Καὶ ὁ τῆς ἀλωπέκος πνεύμων ξηραινόμενος καὶ πινόμενος, ἀσθματικοὺς ὀνίνησι. καὶ ὅ τι περ ἡ αὐτῆς πακὴν καὶ ἕλκυθρον, ὠτὸς πόνον παύει.

Περὶ Ἥπατος ὀνείου. Κεφ. μβ'.

ΗΠΑΡ ὄνου ἐσθιόμενον ὀπίσω, ἐπιληπτικοὺς ὠφελεῖ πόσις ἢ λαμβανόμενον.

Περὶ Αἰδοίου ἄρρενος ἐλάφου. Κεφ. μγ'.

ΑΙΔΟΙΟΝ ἄρρενος ἐλάφου σὺν οἴνῳ πολὺν λῦσιν, τοῖς ὑπὸ ἐχιδνῶν δηχθεῖσι βοηθεῖ.

Περὶ Ὀνύχων ὄνου. Κεφ. μδ'.

Add. περιτίθησι

ΟΝΥΧΕΣ ὄνου καέντες καὶ πολέντες ὅτι ἡμέρας ἑπτὰς πλῆθος κοχλιαρίων δύο, ἱστοροῦνται ὅτι ἐπιληπτικοὺς ὠφελοῦσι. ἐλαίῳ ἢ φυσηθέντες, χειρώδας διαφορεῖσι. * ὅτι πλασθέντες ἢ, χιμέτλας διαπλάσουσι.

A Tritī verò & vrinariæ fistulæ impositi, vrinæ difficultati medentur.

Pl. strangurie

De Millepedis. Cap. XXXVII.

MILLEPEDÆ quę sub vasis aquarijs reperiũtur, animalcula sunt multorum pedum, quæ quidem cõtacta manibus, in globulos sese contrahunt. Hæ ex vino potę, vrinę difficultati ac regio morbo auxiliãtur. B Illitæ verò cum melle, angina correptis prosunt. Tritæ & in cortice mali punici addito rosaceo calfactę ad dentium dolores efficaciter instillantur.

De Blatta. Cap. XXXVIII.

C BLATTÆ eius quæ in pistrinis reperitur interanea trita cum oleo dolores aurium instillatu mitigant.

De Pulmone marino. Cap. XXXIX.

PVLMO marinus recẽs tritus, pernionibus, podagrãque laborantibus opitulatur.

De Pulmone suillo. Cap. XL.

D SVILLVS, agninus, vrsinúsque pulmo impositu, attritus à calceamentis contractos ab inflammatione tuentur.

De Pulmone vulpino. Cap. XLI.

Quin & vulpis pulmo si arefactus bibatur, suspiriosos adiuuat. E iusdem verò adeps liquefactus infususque, auris dolorem sedat.

De Hepate asinino. Cap. XLII.

ASINI iecur inassatum esu comitialibus prodest: verùm id ieiunos sumere oportet.

De masculi cerui Genitali. Cap. XLIII.

F GENITALE cerui maris tritum ex vino potum, à vipera demorsis auxiliatur.

De asinorum Vngulis. Cap. XLIIII.

G VNGVLÆ asinorum vstæ ad dies multos cochlearibus binis potę, comitialibus prodesse narrantur. Oleo verò subactæ, strumas discutiunt: insperſę quoque, pernionibus medentur.

De equorum lichenibus. Cap. XLV.

LICHENES equorũ calli sunt circa genua & vngulas in earũ partiũ flexu indurati. Ii triti & in aceto poti comitialibus mederi traduntur.

De Caprinis vngulis. Cap. XLVI.

CAPRINARVM vngularũ cinere perunctæ ex aceto alopeciæ sanantur.

De Caprino iecore. C. XLVII.

QVÆ è caprino iecore dum inassatur destillat sanies, inũcta prodest luscioſis qui Græcis nyctalopes dicũtur. Quin & siquis vaporé eius dũ coquitur oculis apertis excipiat, vtilitatẽ percipit. Sed & tostum in cibo ad eadem prodest. Cæterùm aiunt comitiales eius esu, hircini verò maximè, deprehendi.

De Aprino iecore. Cap. XLVIII.

Aprinũ iecur recens si arefactum teratur, ex vino potum contra serpentium iumentorúmque morsus auxilio est.

De canis rabidi iecore. C. XLIX.

Iecur canis rabioſi tostum & ab ijs quos momorderit in cibo sũptũ, atque pauoris periculo liberare creditur. Vtũtur autẽ ad præcautionẽ etiã canis qui momorderit canino dẽte: hunc scilicet folliculo ex aluta inditũ pro amuleto brachio adalligant.

ab aqua pauoris imm.

De Iecore mergi. Cap. L.

Mergi iecur assiccatum & potum ex hydromelite binis cochlearibus, secundas pellit.

De Veteribus soleis. Cap. LI.

EX veteribus calceamentis coria combusta ac trita & insperſa, ambusta igni, intertrigines, necnon & calceamentorum attritus sanant.

De Gallinis. Cap. LII.

GALLINÆ dissectę & adhuc calẽtes appositę, serpentiũ morsibus auxiliantur: sed in ipsarum locum alias subinde sufficere oportet.

De Gallinarum cerebro. Cap. LIII.

Earũ cerebellum in vino bibendum datur contra venenatarum bestiarum morsus: sanguinis etiamnum eruptiones à cerebri meninge inhibet. Quę verò in gallinacco interna ventriculi parte substernitur mẽbrana cornu instar firma ac pellucida, quæque inter co-

A Περὶ Λιχήνων ἵππων. Κεφ. μέ.

ΛΕΙΧΗΝΕΣ ἵππων, εἰσὶ δὲ τύλοι καὶ ἐπιγραφὴν ἔχ. ἐτυλωμένοι παρὰ τοῖς γόνασι καὶ παρὰ τὸ ὁπλαῖς πολέμιοι λῷοι μὲν ὄξος, ὀπιλημένιας ἱερροῦν θεραπεύει. Mire cert' Dioscoridi Ald. τετυλωμένοι ὀπλαῖς V. adscripserat sic τύλοις

Περὶ Αἰγῶν οὐρῶν. Κεφ. μς'.

B ΟΙ δὲ τῶν αἰγῶν οὐραχες καπῆς, ἀλωπεκίας κεκλαχρισμένοι σὺν ὄξει θεραπεύουσι.

Περὶ Ἥπατος αἰγός. Κεφ. μζ'.

Τῶν δὲ ἥπατος τὸ αἰγὸς ὀπτωμένου ὁ ἀπορρέων ἰχὼρ ἐγχριόμενος, γυναῖκα λωφᾷ ἁρμοζόμ. καὶ τὸ ἀτμίδα δέ τις ἐναυθίσας αὐτῶν δι' αὐλοῦ αἴρει τοῖς ὀφθαλμοῖς, ὠφελ- Samb. legit αὐγαζόμενος ται. ἁρμόζει δὲ καὶ ἐαδιόμενον ὀπτὸν πρὸς τὰ αὐτά. φασὶ δὲ C ὀπτὰ πικροὶ ἐλέγχειν, φαγόντας, μάλιστα τὸ τράγου ἧπαρ.

Περὶ Ἥπατος κάπρου. Κεφ. μή.

Τὸ δὲ τοῦ κάπρου ἧπαρ ναῷ καὶ ξηρὸν λῷον σὺν οἴνῳ πινόμενον, ἑρπετῶν καὶ *κτηνῶν δήγματα ὠφελεῖ. Ald. πλινθ. Cor. πινὸν

Περὶ Ἥπατος κυνὸς λυσσῶντος. Κεφ. μθ.

D Κυνὸς λυσσῶντος ἧπαρ βιβρωσκόμενον ὀπτὸν καὶ τοῦ δηχθέντος καὶ αὐτὸ, ἀπειλουμένους ὑδροφοβίας τηρεῖ πιεζόμενον. χρὴ δὲ εἰς περιφυλακὴν καὶ τοῦ κυνόδηκτος δαπίδος, ὑπὸ δεσμοῦ εἰς κυστίδα καὶ περιάπτοντας τοῦ βραχίονι.

Περὶ Ἥπατος αἰθυίας. Κεφ. ν'.

Αἰθυίας ἧπαρ σκελετευθὲν καὶ πολὺν μὲν E ὑδρομέλιτος κοχλιαρίων δυοῖν πλῆθος, ἐκβοηθεῖ δύπτερα. Duo veteres codices hoc caput non habent, licet vt alia huius generis stare possit.

Περὶ Καπυμάτων. Κεφ. να'.

ΤΑ δὲ ἀπὸ τῶν καπυμάτων παλαιὰ δέρματα, κεκαυμένα δὲ λῷα καὶ πλα- Corn. κεκαυσμ. ανόμενα, πυρίκαυστα δὲ παραβλήματα δὲ τὰ ἐξ ὑποδημάτων θλίμματα θεραπεύει. F

Περὶ Ἀλεκτορίδων. Κεφ. νβ'.

ΑΛΕΚΤΟΡΙΔΕΣ αἱ ἀκλαθεῖσαι καὶ ὀπτηθεῖσαι ἐνθερμοι, τοῖς ἑρπετῶν δήγμασι βοηθοῦσι· δεῖ δὲ συνεχῶς ἐσθίειν. In margine: ἀντὶ τοῦ αἱ δηκτικῶν ἐστι πτηνῶν. Scholio recens.

Περὶ Ἐγκεφάλου ἀλεκτορίδος. Κεφ. νγ'.

Ο δὲ ἐγκέφαλος αὐτῶν ἐν πόματι θηλυδρύοις σὺν οἴνῳ δίδοται, καὶ τοὺς ἐκ μήνιγγος G αἱμορραγίας ἴσχει. τοῦ δὲ ἄρρενος τὸ κατὰ τὰ ἔντερα ἐπικείμενον τῇ κοιλίᾳ κεφαλοειδὲς, ἀποδεδεγμένον δὲ Scriptura sic in veteribus distincta est vt hic sit totum capitis cuius hic est finis. ἀπὸ τοῦ κεφαλοειδὲς ἄρτι. Coup.

ἐν ταῖς ἐψήσεσι ξηραινθέν, ἁρμόζει σαρκοῖς, λῷον μετ' οἴνου πινόμενον. ὁ δὲ ζωμὸς τοῦ νοσαχοῦς, μάλιστα διδοὺς ὀδυνηφάσεως χάριν φαυλοτήτων καὶ ὅπου τὴν κοιλίαν σκυβαλώδεις. Ὁ δὲ τοῦ παλαιοῦ ἡμιεχθυόνου, διδόται πρὸς καθαρσιν κοιλίας. ἐξελόντας δὲ τὰ ὀστᾶ, δεῖ ἀποτυμβαλλειν ἁλας, καὶ καταῤῥαίνοντας ἑψεῖν μετ' ὕδατος ξεστῶν κ'. καὶ ἀφαιρεθέντος εἰς κοτύλας γ' διδόναι πρὸ ἀφροδισιασθέντι. ἔνιοι δὲ συνέψουσι κραμβῃ θαλασσίαν, ἢ λινόζωστιν, ἢ κνίκῳ, ἢ πολυπόδιον. ἄγαν δὲ παχὺς ὢν ὁ, γλισχρότερος, μᾶλλον ἁρμόζει πυρετοῖς χρονίοις, ἀθμασιν, ἀρθριτικοῖς, ἐμπνευματουμένοις σαρξίν.

Cornet Gal. & Paulo legu ἀπὸ περίττου.

Coralgiis

Vide inter Dios. notha quæ huius capitis calci adiiciuntur.

Περὶ Ὠοῦ. Κεφ. νδ'.

Ὠὸν τὸ ἁπαλόν, ξηραίνει τε ῥοφηθέν, καὶ τὰ ἁπαλὰ τὰ σκληρύνει. ἢ λέκιθος αὐτοῦ χρισθεῖσα τοῖς ὀφθαλμοῖς τοῖς ὠδυνίας, ὀπῇ θεῖσα σὺν χρόκῳ καὶ ῥοδίνῳ τοῖς τε ἕδεσι καὶ δακτύλιον φλεγμονὰς καὶ κονδυλώματα, σὺν μελιλώτῳ μετὰ ῥοῦ ἢ κηκίδος τηγανισθεῖσα, καὶ βρωθεῖσα, ἴσχει κοιλίαν, καὶ καθ' ἑαυτὸ δὲ ὀπτηθὲν συνέχει.

Flor. corr. sed vtui esse verum docet.

Potui supponitur

Περὶ Λευκοῦ τοῦ ὠοῦ. Κεφ. νε'.

Τὸ δὲ λευκὸν αὐτοῦ ὠμὸν ὂν ψύχει, ἐμπλαττόμενον ἐπιῤῥεῖ ἐπὶ ὀφθαλμοὺς φλεγμονὰς τε ὀφθαλμῶν καὶ πᾶν αἷμα τί ὀπτικὸν ἐᾷ φλυκταινοῦσθαι. πρόσχημα δὲ ποιεῖται πρόσωπά τε αἰθόμενα τῇ, αἰγιλώπα δὲ ὄντα ῥυμπτόμενα σὺν λιβανωτῷ καὶ τοῦ μετώπου πλήθυοντα φλεγμονὰς τε ὀφθαλμῶν πρὸς ἠέλιον αἱ ἀλῶσαι μετὰ ῥοδίνου καὶ οἴνου καὶ μέλιτος ὠμὸν ὂν ῥυφηθέν, αἱμορροΐδας δύσμασι βοηθεῖ. ἀκροχολιᾶσι δὲ πρὸς κύστεως δυσμοὺς καὶ ἕλκωσιν νεφρῶν καὶ τραχυσμοὺς τραχείας ἀρτηρίας, καὶ αἵματος ἀναγωγὰς καὶ καταῤῥοὰς καὶ θώρακος ῥευματισμοὺς ἁρμόζει.

Hæc caput in vetustis libris cum superiore confundebat Goup.

V. Plin. Nasum, alias sanguinem.

V. ἀποπλήκτους.

Περὶ Τεττίγων. Κεφ. νς'.

Τέττιγες ὀπτοὶ ἐσθιόμενοι, τοῖς περὶ τὸν κύστιν δυσμοῖς βοηθοῦσιν.

A quendum excoriari solet, arefacta tritáque & in vino pota stomachicis confert. Ius autem pulli simpliciter paratum potissime datur ad tẽperandos prauos vitiosósque humores, & ijs quibus æstuat osventriculi. At ius è vetere gallinaceo datur ad aluum deiiciendã. Exemptis porrò interaneis in eorum locũ sal immittendus est, demúmque consuto vẽtre gallinaceus in aquæ sextarijs xx. discoquẽdus, dum tres heminæ supersint. Totum verò id sub dio refrigeratum exhibetur. Sunt qui marinam brassicam, mercurialem, cnicum aut filiculam simul incoquant. Cæterùm crudos crassósque, lentos ac viscosos & atros humores educit. Prodest ijs quos longæ diuturnæq; tenent febres, suspiriosis, arthriticis, inflationéque stomachi laborantibus.

Hæc periodus præterm. apud Ruellium.

De Ouo. Cap. LIIII.

Ovvm molliculũ plus alit quàm sorbile, itemq; durũ plus quàm molle. Est ipsius luteum contra dolores oculorum vtile, tostum cũ rosaceo & croco. Sedis autẽ inflammationibus & condylomatis prodest, addito melilloto. Cum rhois semine aut galla trixum in sartagine & in cibo sumptum, aut etiam per se exhibitum, aluum sistit.

De Oui cãdido seu albumine. C. LV.

Crudum oui candidum refrigerat, cutis spiramenta occludit, & oculis infusum eorum inflammationes lenit: ambustis confestim illitũ, quominus erumpant pustulæ prohibet: faciem a Solis adustione tuetur: cum thure anacollematis vice fronti inductũ, fluxiones arcet cõpescitque: oculorum inflammationes lana exceptum, additis rosaceo melle ac vino, mitigat. Quòd si crudũ sorbeatur, contra hæmorrhoidis serpentis morsus auxiliatur: exiguo verò calore tepens prodest contra vesicæ rosiones, renũ exulcerationé asperæ arteriæ scabritias, sanguinis reiectiones, destillationes ac thoracis rheumatismos.

De Cicadis. Cap. LVI.

Cicadæ si assatæ edantur, doloribus vesicæ succurrunt.

Vt infra in pusillo

De Locustis. Cap. LVII.

V. Margarias

LOCVSTÆ sustitu difficultates vrinę adiuuant, præsertim quę fœminas malè habent: est autem earũ caro inutilis. At quæ locusta asiracos aut onos dicitur, sine pẽnis est, grandioribus membris dum recens est. Hęc assiccata si ex vino bibatur, contra scorpionis ictus magnoperè confert. Cęterum hac eadem abunde vescuntur Afri, qui Leptin incolunt.

De Ossifrago. Cap. LVIII.

VENTRICVLVS eius auis, quem Latini ossifragum appellãt, paulatim potui datus, calculos fertur per vrinam expellere.

De Galerita. Cap. LIX.

GALERITA auicula est parua, apicem in vertice pauonis modo gestans. Hæc assa & in cibo sumpta colicos adiuuat.

De Hirundine. Cap. LX.

HIRVNDINIS pullos qui primo partu exclusi fuerint si crescente Luna dissecueris, in eorum ventre lapillos inuenies: è quibus duos, vnum quidem colore varium, alterum vero purum & vnicolorem accipies. His priusquã terrã attigerint iuuenæ corio aut cerui na pelle inclusis & brachio aut collo ad alligatis comitiales recreabis: plerunque etiã penitus sanitati restitues. Ipsę vero hirundines in cibo sumptę, velut & ficedulæ, acié oculorũ exacuunt. Tam pullorum quam matrũ in olla fictili combustarum cinis cum melle oblitus, oculis claritatẽ affert: confert & perunctus, angina laborantibus: itémque prodest ad vuæ ac tonsillarum inflamationes. Cæterùm & ipsę & pulli si exiccentur & drachmæ vnius pondere ex aqua bibantur, his succurrunt qui angina conflictantur.

De Ebore. Cap. LXI.

ELEPHANTINI dentis ramentũ, vnguium reduuias curat impositum. Vim porrò astringẽdi obtinet.

De Talo fusillo. Cap. LXII.

SVIS talus combustus dum è nigro albescat, tũmque tritus ac potus, inflationibus coli ac diuturnis torminibus medetur.

A Περὶ Ἀκρίδων. Κεφ. ζ'.

ΑΚΡΙΔΕΣ νεοττοὺς ὀρνιθείους, δυσεντερίας μάλιστα τοὺς ὑπὸ τῶν ἐντέρων ὠφελοῦσι· τὴν δὲ σάρκα ἀχρήστως ἔχουσι. ἡ δὲ λεγομένη ἀκρὶς ἀσίφακός ἐστιν ὄνος, ἄπρεπὴς ὅλη καὶ μεγαλόκωλος, τοῦ σώματος ξηροτέρα οὖσα· σφόδρα δὲ σκορπιοδήκτοις ὠφελεῖ πινομένη σὺν οἴνῳ. χρῶνται δὲ αὐτῇ καταχόρως οἱ Λεπτὶν οἰκοῦντες.

Hæc periodus cæteræ vulgatæ codices Aldinus in nostra retulit, quam tamẽ & Ruellius & Marcellus expressêrunt. Aldi ἐξεχόμενα. V ἐπιζεχόμενα. Forte σαγηνευόμενοι.

Περὶ Φοίνικος. Κεφ. η'.

ΦΟΙΝΙΞ τὸ ὄρνεον, ὁ Ῥωμαῖοι καλοῦσιν ἀσίφραγον. τούτου ἡ χιλία καὶ ὁλίγον πλειζόμενον, λίθους ἐξερράγη ποιεῖν οἶδε.

V. Perperam ἀσιφαγον.

Περὶ Κορυδαλλοῦ. Κεφ. θ'.

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ὀρνίθιόν ἐστι μικρόν, ἔχον κατὰ τῆς κορυφῆς ὑπόφοινιν ὥσπερ ταὼς. οὗτος ἕρπητας ὀπῶν, καὶ λιθικοὺς ὠφελεῖ.

Vulg. ex. ταὼς addit verò V. ἢ χαλκοπάρῳος.

Περὶ Χελιδόνος. Κεφ. ι'.

ΧΕΛΙΔΟΝΟΣ νεοττοὺς, οὓς ἂν τῆς πρώτης νεοττοποιΐας, αἰχμὴν μὴ τῆς σελήνης αἰτιμήσῃ, διῶρυξ ἐν τῇ χαρᾷ λίθους, ἐξ ὧν δύο λαβών, ἕνα ποικίλον, καὶ τὸν ἕτερον καθαρόν, περὶ τὸν ὄπτιφαῦσαν τῆς γῆς ἐνδύσας εἰς δέρμα δαμάλεως ἢ ἐλάφου, καὶ περιάψας βραχίονι ἢ τραχήλῳ, ὑπολιπτικοὺς ὠφελήσῃς. πολλάκις δὲ καὶ πνιγηρῶς ἀποκαταστήσῃς. βιβρωσκόμενοι δὲ ὥσπερ αἱ συκαλίδες, ὀξυωπίας εἰσὶ φάρμακον. καὶ ἡ ἀπ' αὐτῶν δὶ τίφρα, καὶ ἡ τῶν μητέρων καῦσις ἐν χύδρᾳ μετὰ μέλιτος χειρίζουσα, ὀξυδορκίαν ποιεῖ. ἁρμόζει δὲ καὶ συναγχικοῖς ἀφαιρουμένη, καὶ πρὸς σταφυλὴν καὶ παιδικὰς φλεγμονὰς σκελετευθεῖσα δὶ αὐτῶν καὶ τὰ νεοττοὶ, σὺν ἀγχικοῖς ὠφελοῦσι πυέμενα μὲθ' ὕδατος πλῆθος < α'.

Περὶ Ἐλέφαντος. Κεφ. ια'.

ΕΛΕΦΑΝΤΟΣ ὀδόντος ῥίσμα, παρωνυχίας καταπλασθὲν ἀφαιρεῖ. Δύναμιν δὲ ἔχει συντηκτικήν.

V add. σὺν τῷ κηκιδικῷ ξύσματι.

Περὶ Ἀστραγάλου ὑός. Κεφ. ιβ'.

ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΣ ὑὸς κεκαυμένος μέχρις ἂν μέλανος γένηται λευκὸς, καὶ λεῖος πολύς, ἐμπλάσσει κόλον καὶ τροφοὺς χρονίους ἰᾶται.

Περὶ Ἐλάφου κέρατος. Κεφ. ξγ'.

ΕΛΑΦΟΥ κέρας κυαθιαῖον ὃ πεπλυμένον, ἁρμόζει πινόμενον πλῆθος δυοῖν κοχλιαρίοιν ἁιμοπτοϊκοῖς, δυσεντερικοῖς, κοιλιακοῖς, ἰκτερικοῖς, κύστεως ἀγνήμασι μετὰ τραγακάνθης, ῥοϊκοῖς δὲ γυναικὶ μετὰ ὑστρὸς ὃ παιδὸς ἁρμόζοντος. καίεται δὲ ἐν κεράμῳ κεκαλυμμένῳ κοπρίνοις ὠμοῖς χύτρα ἀσφαλισαμένη πηλῷ, ἄχρις οὗ λευκὸν γένηται. πλύνεται δὲ ὡς καδμία. ὃ δὲ τοιοῦτον ἁρμόζει πρὸς τὰ ἐν ὀφθαλμοῖς ἕλκη καὶ ῥύμασι καὶ ὀδόντας πεπονηρευόμενον σμήχει· ὠμὸν δὲ θυμιᾶται, ἑρπητικὰ διώκει· ἀπόζεσθὲν δὲ μετ' ὄξους καὶ διαχλυζόμενον, παρηγορεῖ ὀδυνωμένοις.

Περὶ Καμπῶν. Κεφ. ξδ'.

ΚΑΜΠΑΙ αἱ ὅτι τὴν λαχανῶν θυνωύμεναι, ἀσφαλιούμεναι σὺν ἐλαίῳ, ἀδήκτους ἀπὸ τῶν ἰοβόλων φυλάττει λέγονται.

Περὶ Καυθαρίδων. Κεφ. ξε'.

ΚΑΝΘΑΡΙΔΕΣ εἰς ἀπόθεσιν ὠθοῦνται αἱ ἀπὸ τῶν σίτων, ἃς βαλὼν εἰς ἀγγεῖον ἀγγεῖον, καὶ τὸ στόμα ἀσφαλώσας ὀθονίῳ λεπτῷ, καθαρῷ, ἀσκὸν πάχρεφον ἀτμῷ ζέοντος ὄξους θρίμματος, καὶ ἕως αἱ πτερυγῶσι κρέμασον εἶτα διαπίεσας λίνῳ, ἀπόθου. ἐνεργέστατοι δέ εἰσιν αἱ ποικίλαι, καὶ μηλίνας ὅτι καρποῖς ζώνας ἔχουσαι [ἐν ταῖς πτέρυξι ὅτι μίσχους τὸ σῶμα, ἁδραί, ἐμπίμπλοι, ὡς αἱ σίλφαι. ἄτονοι δέ εἰσιν αἱ μονόχρωμοι.

Περὶ Βουπρήστου. Κεφ. ξς'.

Ὡσαύτως δὲ ἀποτίθενται καὶ αἱ βουπρῆστες, εἶδος οὖσαι καυθαρίδων, καὶ αἱ πιτυοκάμπαι· καὶ αὗται δὲ ὅτι πυκνοῦ ἐπικαυσθῶσι, θερμασταὶ διὰ φωτιᾶς φαίνονται ὅτι βέλτιον ἀποτίθενται. δύνανται δὲ αὐτῶν χιὼν, σηπτική, ἑλκωτική, θερμαντική· ὅθεν μίγνυνται φαρμάκοις τοῖς τὰ καρκινώδη καὶ λέπρας καὶ λειχῆνας ἀγρίους θεραπεύουσι. ἄγουσι δὲ καὶ ἔμμηνα, πεσσοῖς μαλακτικοῖς μιγνύμεναι. ἔνιοι δὲ ἰσόρροπον τοῖς καυθαρίσι καὶ ὑδρωπικοῖς βοηθεῖν, μιγνύμεναι αἰτιδόσει, ὡς οὖρον

De Cornu ceruino. Cap. LXIII.

COrnu cerui vſtum ac lotum ſi binûm cochlearium menſura bibatur, confert ſanguinem excreantibus, dyſentericis, cœliacis, regio morbo, & veſicę doloribus cũ tragacantha: fœminis item fluxione vuluæ laborantibus, cum liquore ei affectui accõmodato. Porrò tuſum & crudo fictili luto circumlito inditum vritur in fornace donec albeſcat, ac deinde cadmiæ modo eluitur. Tale verò oculorum vlceribus atque fluxionibus ſalutare eſt: affrictum quoque dentes expurgat. Cæterùm crudum ſi accendatur, odore ſerpentes fugat. In aceto verò feruefactum ſi ore colluatur, interiorũ dentium dolores mitigat.

De Erucis. Cap. LXIIII.

ERVCÆ quę in oleribus gignuntur, à venenatarũ beſtiarũ morſibus eos ferũtur tutos præſtare qui ipſis ex oleo peruncti fuerint.

De Cantharidibus. Cap. LXV.

CANTHARIDES quæ in frumentis leguntur, ad recondendum idoneæ ſunt. Eas in vas nõ picatum immittito, ac ipſius oſculũ raro puróque linteo obligatũ circumuertito ad vaporẽ feruentis aceti quàm acerrimi, tandiúque inuerſum fictile contineto, donec illæ ſuffocẽtur: tandẽ lino tranſfixas reponito. Porrò efficaciſſimæ ſunt quæ variæ viſuntur, luteáſque habent in pennis tranſuerſas lineas, quæque oblongo ſunt corpore, craſſæ, & blattarũ modo præpingues. Sed inefficaces & imbecillæ, quæ vnius ſunt coloris.

De Bupreſti. Cap. LXVI.

Simili modo reponũtur & bupreſtes, quę ſunt è cantharidum genere, itémque pinorum erucæ. Sed & hæ ſupra cribrum ſuſpenſum feruenti cinere pauliſper intoſtæ reconduntur. Vis ipſarum communis ſeptica, exulceratoria, & excalfactoria: qua de cauſa medicamentis admiſcentur, quibus carcinomata, leprę & impetigines ferę curantur. Menſes quoque cient, peſſis emollientibus additæ. Porrò nonnulli cantharidas antidotis admiſtas etiam hydropicis auxiliari prodiderunt, quippe quæ vrinas mo-

moueant. Alij ipsarum alas ac pedes ijs qui illas hauserint pro antidoto esse tradiderunt.

λκινούσας. Φ ὃ τὰ πτερὰ αὐτῶν καὶ τοὺς πόδας πῖς ποιῶν αὐτὰ ἀπαφάρμακον αἰτίγραλαι.

De Salamandra. Cap. LXVII.

SALAMANDRA lacertę genus est, iners, variũ, quódque frustra creditum est ignibus non vri. Vim habet septicam, exulcerantem, ac denique calfactoriam. Additur in medicamenta septica lepras abolentia, quemadmodum & cantharis: ac simili quoque modo reponitur. Vsta verò, pilos cum oleo abolet. Cæterùm exenterata, detractis pedibus & capite, in melle seruatur ad eundem vsum.

Περὶ Σαλαμανδρας. Κεφ. ξζ'.

ΣΑΛΑΜΑΝΔΡΑ εἴδός ἐστι σαύρας· ἔστι δὲ κοχλιὰς, ποικίλον, μάτιον πεφυκὸν μὴ κάεσθαι. Δυώαμιν δὲ ἔχει σηπτικὴν, ἑλκωτικὴν, θερμαντικήν. μίγνυται δὲ σπυλαῖς καὶ λεπρώσεσι· ὡς ἡ κάμψαι εἰς, καὶ ἀποπῆται ὁμοίως. ψιλοῖ δὲ καὶ τρίχας *παχεῖσα μετ' ἐλαίου. φυλάσσεται δὲ καὶ ἐν μέλιτι ἐξεντερωθεῖσα, τῆς πόδας καὶ τῆς κεφαλῆς ἀφαιρεθέντας, εἰς τὸν αὐτὸν χρῆσιν.

V. Ὡς ἔνιοι σαῦροι

Orib. add. ἢ ἰκτεριῶσι συμφέρει

De Aranèo. Cap. LXVIII.

ARANEVS, quem holcum aut lycon, id est, raptorem aut lupum alij nominant, cum emplastro subactus & linteolo inductus, ac fronti aut temporibus impositus, tertianos circuitus persanat. Tela eius apposita sanguinem sistit, & vlcera quæ summam cutem occuparunt ab inflammationis iniuria vindicat. Est & alterũ aranei genus, quod candidam, tenuem, densámque telam orditur. Hoc aluta inuolutum, & de lacerto suspensum, quartanis circuitibus mederi narratur. Decoctum autem ex rosaceo & infusum, aurium doloribus auxiliatur.

Περὶ Ἀράχνης. Κεφ. ξη'.

ΑΡΑΧΝΗ τὸ ζῶον, ὃ ὁλκὸν ἔνιοι ἢ *λύκειον καλοῦσι, συμμαλαχθεῖσα σὺν νίτρῳ, καὶ ἐμπλασθεῖσα εἰς ὄθονιον, περιτεθεῖσα μετώπῳ ἢ κροτάφοις, τριταίκὰς ἀποδιώκει ῥιγοδείας. τὸ δὲ ὕφος αὐτῆς ὑπὸ τὴν ὀθόνιον αἷμα ἵστησι, καὶ ἀφλεγμάντα τηρεῖ τὰ ὑπόλοιπα τῶν ἑλκῶν. ἔστι δὲ καὶ ἕτερον εἶδος ἀράχνης, καλαμοβιώτην τῶν ὑγρῶν λευκὸν, λεπτὸν δὲ πυκνὸν· ὃ ἱστὸν δὲ ἐνδετόμενον εἰς κυτίδα, καὶ περιαπόμενον βραχίονι, τεταρταίκὰς περιόδους θεραπεύει. σὺν ψιμυθίῳ δὲ ῥοδίνῳ, ὠταλγίας βοηθεῖ ἐγχριόμενον.

V. non habet

De Lacerta. Cap. LXIX.

LACERTÆ caput tritum & impositum, aculeos & omnia corpori infixa extrahit. Sed & formicantes verrucas & pensiles, quas acrochordonas vocant, clauósque tollit. Iecur ipsius dentium cauernis inditũ, dolores eximit. Tota verò dissecta & imposita, ictos à scorpione leuat.

Περὶ Σαύρας. Κεφ. ξθ'.

ΣΑΥΡΑΣ ἡ κεφαλὴ λεῖα θαπτηθεῖσα, σκόλοπας ἐξάγει καὶ πάντα τὰ ἐμπεπηγότα. αἵρει δὲ καὶ μυρμηκίας, καὶ ἀκροχορδόνας, καὶ ἥλους. τὸ δὲ ἧπαρ αὐτῆς ὀπτηθὲν τοῖς τῶν ὀδόντων ῥώμασιν, ὀδόντων πόνους. ὅλη δὲ ἀναχαθεῖσα, καὶ ἐπιτεθεῖσα, σκορπιοπλήκτους κουφίζει.

De Sepe. Cap. LXX.

SEPS, quam nõnulli lacertã Chalcidicam vocãt, ex vino pota, quos momorderit ijs medetur.

Περὶ Σηπός. Κεφ. ο'.

ΣΗΨ, ὃν ἔνιοι σαύραν ἐπάλεξ Χαλκιδικὴν, ὃ ὀίνῳ πωθεῖσα, τοὺς ὑπ' αὐτῆς δηχθέντας ἰᾶται.

Lacuna reperit in vetustiss. codice, πρὸς τὰ ὑποκαλλία

De Scinco. Cap. LXXI.

SCINCVS quidam in Ægypto, alius in India, alius ad mare Rubrũ gignitur. Est & alius qui apud Libyam Mauritaniæ fluuium reperitur. Est verò crocodilus terrestris sui generis, qui addito nasturtio sit-

Περὶ Σκίγκου. Κεφ. οα'.

ΣΚΙΓΚΟΣ ὁ μὲν τὶς ἐστιν Αἰγύπτιος, ὁ δὲ Ἰνδικὸς, ἄλλος δὲ τῇ Ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ γινόμενος· ἕτερος δὲ ἐν τῇ Λιβύῃ τῆς Μαυρουσιάδος διείσκεται. ἔστι δὲ κροκόδιλος χερσαῖος, ἰδιόφυὴς, παραχυόμενος ὁ

Vulg. Λυδίᾳ

κεφαλὴν. Φασὶ δὲ δύναμιν ἔχειν πολὺν τὸν ὠδὲ πως ὑφεῖσι αὐτοῦ μέρος, ὅσον ⊲ πλῆθος μετ' οἴνου, ὀρμητικὸν ποιεῖν τὰ ἀφροδίσια· ἀποπαύεσθαι δὲ τοῦ ὀπίσω τῆς παρορμίας, φακοῦ ἀφεψήματι μετὰ μέλιτος πινομένου, ἢ ἀφιδάκνης σπέρματι μετ' ὕδατος μίγνυσθαι δὲ καὶ αὐτοὺς.

le conditur. Aiunt porrò partem eá quæ renes amplectitur, drachmæ pondere in vino poram, venerem accendendi vim habere: attamen lentis decocto cum melle, aut semine lactucæ cũ aqua poto intensam illam veneris cupiditatẽ inhiberi. In antidota quoque additur.

Περὶ τῶν τῆς γῆς ἑτέρων. Κεφ. οβ'.

De Terreni vermibus. C. LXXII.

ΓΗΣ ἕτερα λφα ὀπτηθέντα, νιτρῶν ἀποκόπτας κολλᾷ, λύει δὲ καὶ ῥιγετους· ἐψηθέντα δὲ σὺν χλωρῷ τεφαι, ἀφαλγέστους ὦτων ἐγχριόμενα θεραπεύει σὺν ἐλαίῳ δὲ καὶ ἐγχόμενα τοὺς ὀδοντιασμοὺς ὑς, ὀδοντιάσεις βοηθεῖ· ἄγει δὲ καὶ οὖρα λφα πινόμενα σὺν γλυκεῖ.

Lacuna legit in vetustiss. cod. ex. σὺν ὕδατι καὶ χλωρῷ τεφαι

TErreni vermes triti & impositi, præcisos neruos glutinant, ac tertianas quoque soluunt. Decocti verò cũ anserino adipe & instillati, affectis auribus medentur. In oleo autem decocti si oppositæ auriculæ infundantur, dentiũ doloribus præstant auxilium. Triti quoque & cũ passo epoti vrinas ciunt.

Περὶ Μυγαλῆς. Κεφ. ογ'.

De Mure araneo. Cap. LXXIII.

ΜΥΓΑΛΗ αἰσχιδιῶσα καὶ ὀπτηθεῖσα, ἄκος ἐστὶ τῶ ἰδίου δήγματος.

MVs araneus dissectus & impositus contra suos morsus remedio est.

Περὶ Μυῶν. Κεφ. οδ'.

De Muribus. Cap. LXXIIII.

ΜΥΣ τοὺς καλουμένους αἰσχιδιῶσας σκορπιοπλήκτοις ὠφελίμως ἐπιτίθεσθαι ὁμολογεῖται· ἑρωδιοῦ δὲ ὀπλοις ὑπὸ παιδων, αἰσχηραίνει τὸ ἐν τοῖς στόμασιν αὐτῶν σίελον.

MVres domesticos dissectos scorpionum ictibus vtiliter imponi est in confesso: si verò inassati à pueris in cibo sumantur, ipsorum oris saliuam exiccare.

Περὶ Γάλακτος. Κεφ. οε'.

De Lacte. Cap. LXXV.

ΓΑΛΑ κοινῶς μὲν πᾶν, βύχυμον, ἔμφιμον, μαλακτικὸν κοιλίας, φυσοντικὸν στόμαχον καὶ ὀντέρων· ἐδαρέστερον μέντοι τὸ ἐαρινὸν τοῦ θερινοῦ, καὶ τὸ ἀπὸ χλωρᾶς νομῆς μᾶλλον ὅτι μαλακτικὸν κοιλίας. ἔστι δὲ καλὸν γάλα, τὸ λευκὸν καὶ ὁμαλὸν τῇ παχύτητι, καὶ συστρεφόμενον, ἐπειδὰν ὀπτηθῇ ὀνυχι. τὸ δὲ αἴγλον ἧττον κοιλίας ἅπτεται, διὸ τὰς αἶγας τὸ πλέον συφοῦσθαι νομῇ χρῆσθαι, δρυὶ καὶ σχίνῳ, καὶ θαλίᾳ, καὶ τερμίνθῳ· ὅθεν καὶ δύσοσμον τυγχάνει. τὸ δὲ προβάτειον ὅτι παχύ τι καὶ γλυκὺ καὶ πόλυ λιπαρὸν, οὐχ οὕτω δὲ εὐστόμαχον. τὸ μὲν τοῦ βοὸς καὶ ὄνου καὶ ἵππειον, δύσκοιλιώτερα· τὸ δὲ προβατικὸν. πολὺ δὲ γάλα κοιλίας καὶ στόμαχου ἀναστρεπτικὸν, ὅπου ἐστὶ νομὴ σκαμμωνίας, ἢ ἐλλεβόρου, ἢ λπόζωστις, ἢ κληματὶς. ὡς καὶ ἐν τοῖς ἰουλίνοις ὄρεσιν ὑφ' ἡμῶν ἱστόρηται· αἱ γὰρ αἶγες νεμόμεναι τοῦ λευκοῦ ἐλλεβόρου τὰ φύλλα,

In manuscripto codice legit Matthiolus ουσικὸν.

Codex quidam antiquus τραχὺ sed nullo sensu. Gesn. Vnus omittit.

Aldinus, χείσιμον ἢ παρακμαστικὸν.

Forte abstinent vi & amara labra. Gesn.

Lacuna est defleui Pl.

mùm erumpunt depascentes & ipsæ cuomunt, & lac quoque reddũt euertendi stomachi vim habẽs atque nauseosum. Potrò decoctum lac omne, & id quidem maximè a quo silicum ignitorum vi portio tenuior exhausta est, ventrem astringit ac omnibus in vniuersum internis exulcerationib⁹ auxiliatur, præsertim vero gutturis, pulmonis, intestinorum, renum, ac vesicæ. Quin & contra summæ cutis pruritus, papularum eruptiones & vitiatos corporis succos recens exhibetur cum melle crudo, addito sale & exigua aqua dilutum. Minùs verò inflat quodcunque semel feruefactũ est. Cæterùm decoctum cum calculis ad dimidias alui fluxiones vlceratione comitatas adiuuat.

De Sero lactis. Cap. LXXVI.

Lac quodcunque implicitũ habet sibi serum, quod quidem à lacte diuisum redditur ad purgationem efficacius. Exhibetur porrò quibus citra acrimoniam deiectionẽ moliri volumus, vti melancholicis, comitialibus, atque in lepra, elephantiasi & papularum toto corpore eruptionibus.

De Schisto lacte. Cap. LXXVII.

Diuiditur autem lac omne, si fictili nouo ferueat, & siculneo ramo recens desecto moueatur, ac posteaquam bis térve efferbuerit, affundantur aceti multi totidem cyathi quot sunt heminæ lactis: ita enim disiedit serum ab eo quod caseosum est. Sed oportebit vt ne lac feruendo circunfundatur, inter coquendum continenter spõgia ex frigida fictilis labrum detergere, sextariúmque argenteum frigidæ aquæ plenum demittere. Bibitur porro serum heminis per interualla singulis vsque ad quinas, ita vt intercedentibus spatiis potantes deambulent. Lac autem recens etiá efficax est contra rosiones & inflammationes à medicamentis exitialibus factas, vti a cantharide, pityocampa, salamandra, aut buprestc, auripigmento, dorycnio, aconito, aut ephemero. Ad hoc vero priuatim bubulũ maximè cõfert. Gargarizatur & ad oris ac tonsillarum

A κατὰ τὴν τοιαύτην ἐκβλάσησιν αὐτῶν, αὐτὸ ἐμοῖσι· καὶ ὁ γάλα αἰσχροποιὸν τὸ μαχρὸν ἢ τανύας γίνε) . ἐψηθὲν δὲ πολὺ γάλα τὸ γλυκὺ πιὸν γίνε) χιλίας· καὶ μάλιστα τὸ διαφορήσεως κύκλῳ ἐξικμαθὲν, καπὼς δὲ ἢ παῖς ὁ τὸ ἐλκώσεσι ξουθῷ, μάλιστα δὲ βρίζῃ, πνεύμονος, ὀστέ-

B ρων, νεφρῶν, κύστεως, καὶ τοῖς τοὺς τῆς ἐπιφανείας κιγκροὺς, ἐξανθήματα, ἢ κακοχυμίας, δίδο) νεαρὸν μὲν μέλιτος ὠμοῦ καὶ ὕδατος σὺν ἀλὶ ἀκεραθέντος ὀλίγου, μιγνυμένων καὶ ἁλῶν. ἀφυαστήσει δὲ γάνε) ἀποζεσθὲν ἅπαξ. τὰ δὲ τῆς χιλίας μὲν ἐλκώσεως ῥύματα, ἄχρις ἡμίσεως τῆς

C κύκλῳ ἐψηθὲν ὠφελῇ.

Περὶ Ὀρροῦ γάλακτος. Κεφ. οε'.

Ἐχῃ δὲ πολὺ γάλα τὸ διαπεπλεγμένον τῷ ὄρρον ᾽, ὃς χιζόμενος τοῖς καθαροῦ add. κιγκλίσω βουνώδεσι ζήεται. διδόμενος ἐφ' ὧν δὲ- V. ἀμιζα χαδριμώτητος ἔκκρισιν βουλόμεθα ποιῆσαι, ὡς ὅτι μελαγχολικῷ, ὅτι λεπρικῷ, ὅτι

D λέπρας, ἐλεφαντιάσεως, καὶ ἐξανθημάτων τῷ τοῦ ὅλου τὸ σῶμα.

Περὶ Σχιστοῦ γάλακτος. Κεφ. οζ'.

*Σχίζεται δὲ πολὺ γάλα ζεσταινόμενον ἐν καινῇ χύτρᾳ κεραμίᾳ, ἢ κινούμενον κλάδῳ συκίνῳ νεοτμήτῳ, καὶ μετὰ τὸ ζέσαι δὶς ἢ τρὶς ὑπερβάλλεται ὀξυμέλιτος κύα-

E θος, τοῖς ἑκάστῃ κοτύλῃ τ γάλακτος· αὐτῷ γὰρ διαλείπει ὁ ὀρρὸς τῆς τυρώδους. δεῖσθαι δὲ τοῖς τὸ μὴ ὑποζέειν τὸ γάλα, ἐν τῇ ἐψήσει ἀποσκῷ ἐκ τοῦ χυτροῦ σύνεχῶς ἀποφαῖν τὸ χεῖλος τῆς χύτρας, καὶ ξέσσειν ἀργυρέῳ πλήρωμα ὕδατος ψυχροῦ καθιέναι. πεπίζε) δὲ ὁ ὀρρὸς ἐν ὀξυφώμα-

F τος κατὰ κοτύλην ἄχρι πίντε κυτυλῶν, ἐν δὲ τοῖς μεταξὺ διαφώμασι περιπατεῖτωσαν ⓐ πάντες. ποιεῖ δὲ τὸ τοιοῦτον γάλα καὶ τοῖς τοὺς ἀπὸ τῆς ξηρασίμων φαρμάκων δυσμοὺς καὶ πυρώσεις, ὡς κανθαρίδος ἢ πιτυοκάμπης, ἢ σαλαμάνδρας, ἢ βουπρήστεως ἢ * ὑοσκυάμου, ἢ

G δρυκνίου, ἢ ἀκονίτου, ἢ ἐφημέρου. τοῖς δὲ τὸ μάλιστα τὸ βοεῖον συμφερῶς ἰδίως ἁρμόζον. διαχλύζε) δὲ καὶ πρὸς ἑλκώσεις στομάτων καὶ παραθημονίας εἰς αἰδοιοφύσεα.

V C hæc ita, hæc eodem sensu ἀπὸ τοῦ ποιεῖν κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ἀνάγουσι τοῖς ποιεῖ, καὶ τὰ γάλα αἰσχροποιὸν τὸ γυναῖκον καὶ ὑπερκαθαίρει καὶ ταινίας ποιεῖ ἐκκρίνεσθαι προσπαθεῖ ζέον. V. inserit, λευκὸν ac deinde præfixit.

τὸ antiquo Codice prom. inuenit Goupyl. interpr.

ἰδίως ὄξος ἀλφιτοκλυζόμενον, οὖλα καὶ ὀδόντας κρατεῖ. τοὺς ὑπὸ τῆς χοιλίας μὴ ἐλκώσεως ῥευματισμοὺς καὶ τενεσμοὺς τοῦ βάτειον ἢ βόειον ἢ αἰγεῖον ἔψησιν, ἐψηθὲν ἀλφὶ κεχλάκων ἐγκλύζειν δὲ καὶ ἐαυτὸ καὶ μετὰ πλατάνης ἢ χονδρου χυλοῦ, ἰκμὰς τοῦ αὐτοῦ πλὴν τοῦ ἑτέρου δίζου ἐγκλύζεται ὑπὸ μήτρα εἰλκωμένη.

A exulcerationes. Asininum verò peculiariter ore collutum, gingiuas dentésque stabilit. Fluxiones autem alui vlceratione comitatas ac teneſmos, ouillum, bubulum, aut caprinum candentium silicum ope decoctum, sistit. Quinetiam per se & cum hordeacea ptissana aut halicæ cremore infusum, rosiones in-

B testinorũ magnoperè mitigat: exulceratæ quoque vuluæ infunditur.

Περὶ Γυναικείου γάλακτος. Κεφ. οὐ.

De Lacte muliebri. C. LXXVIII.

Τὸ δὲ τῆς γυναικὸς γάλα γλυκύτατόν ἐστι καὶ εὐφωνώτατον· ὠφελεῖ δὲ θηλαζόμενον σωμάτων δύξει καὶ φθίσιν· ἁρμόζει δὲ πρὸς λαγωοῦ θαλασσίου πόσιν. μιγὲν δὲ λιβανωτῷ λείῳ, ἐστάζεται τοῖς ἐκ πληγῆς αἱματωθεῖσιν ὀφθαλμοῖς· ἐὰν παλαιρικοὺς ὠφελεῖ, σὺν μηκωνείῳ καὶ κηρωτῇ καταχριόμενον. ἄλλοι δὲ τῶν γάλακτων πληκτικοῖς, κηπάικοῖς, σκληρωματικοῖς, ὀπισθοτονικοῖς, τοῖς τὸ νωτιαῖον πάσχουσι, πυρέττουσι, κεφαλαλγοῦσιν· εἰ μή πού τις καθάρσεως ἕνεκά τις προσφέρῃ τὸ ἀμνὸν ὡς ὑποδιδάσκουσί δέ τινες τὸν πρωτότοκον κυνὸς γάλακτι ψιλωθῆναι πείσας καταχρῆσθαι, ἐὰν θανασίμων φαρμάκων ἀντιφάρμακον πολύ, καὶ τεθνεώτων ἐμβρύων ἐκβόλιον.

C inſtillatur. Podagricis quoque vtile est, cum meconio & cerato illitum. Cæterùm lac omne contrariũ ſpleneticis, hepaticis, vertiginosis, cõmitialibus, neruorũ vitio laborantibus, febres habentibus & capite dolẽtibus: nisi si quis purgationis gratia, vti demonſtratum est, ſchistum exhibeat. Sunt qui narrent lac primiparæ canis perunctum pilos abolere, ac potum contra venena antidoti vicem obtinere, necnon & mortuos fœtus eiicere.

D

Περὶ Τυροῦ νεαροῦ. Κεφ. οβ'.

De Caſeo recenti. Cap. LXXIX.

ΤΥΡΟΣ νεαρὸς δίχα ἁλὸς ἐσθιόμενος εὔφθιμος, εὐστόμαχος, εὐανάδοτος, σαρκῶν πεπτικός, κοιλίας μᾶλλον πικρός· διαφέρει δὲ αὐτὸς παρὰ τὴν τῆς γάλακτος φύσιν, ἀφ' οὗ σκυβάλεται. ἐψηθεὶς δὲ καὶ ἐκθλιβεὶς, εἶτα ὀστηθεὶς, σαλπικὸς γίνεται κοιλίας· ὠφελεῖ δὲ καταπλασσόμενος ὀφθαλμῶν φλεγμονὰς καὶ ὑποχύσεις. ὁ δὲ νεαρὸς, * διὰ εὐφθίτερος ἐσθιόμενος καὶ πρὸς καθάρσεις σαρκὸς ὀπτιδέστερος, καὶ εὐστόμαχος, λυπεῖ κοιλίαν καὶ ἔντερα. ὁ δὲ παλαιότερος, κοιλίας σαλπικός. καὶ ὁ ἐξ αὐτοῦ ὀρρὸς, κυνῶν εὐφθιμώτατος.

E distribuitur: corpus auget, aluúmque moderatè mollit: alius tamẽ alio præstantior est, pro natura lactis è quo conficitur. Decoctus autem & expressus, dein maſſatus, aluum sistendi vim acquirit: prodest verò impositus oculorũ inflammationibus atque sugillatis. At qui recens

V. annium alegmas. F salitus est, si comedatur, minùs alimenti præbet, ad minuendum corpus idoneus est, stomacho aduersatur, aluũ denique & interanea offendit. Vetustior aluum sistit. Cæterùm quod è caseo manauit serum canes quàm optimè alit.

Περὶ Ἱππάκης. Κεφ. πʹ.

De Hippace. Cap. LXXX.

Η δὲ καλουμένη ἱππάκη, τυρός ἐστιν ἵππειος, βρομώδης, καὶ πολύοσφος, αἰδοιοῦται τοῦ βοείου. ἔνιοι δὲ ἱππάκην ἐκ πήγεσθαι τοῦ ἱππείου πιτύου.

Quod hippacen vocant, caseus G est equinus, qui quidem virus redolet, at magnoperè alit, bubulo proportione respondens. Sunt tamen qui equinum coagulum hippacen appellauerint.

De Butyro & eius fuligine. Cap. LXXXI.

LAVDABILE paratur butyrũ è lacte pinguissimo, quale ouillũ est: fit & ex caprino, agitato in vasis lacte, donec pingue separetur. Molliédi facultate præditũ est, vimque habet oleiunde & largiùs epotum & aluum relaxat, & contra venena, si detur oleum, vsurpatur. Cum melle affrictum, dentitiones adiuuat, gingiuarum pruritus in infantibus & oris vlcera emendat. Foris verò illitum corpus reddit habitius, & à pĩdracijs tuetur atque conseruat. Est & efficax contra inflammationes ac duritias vulux, quod certè quidem neque putidum neque vetustum fuerit: ad dysenterias quoque & coli vlcerationem infunditur. Denique in suppuratoria medicamenta vtiliter additur: maximè verò in neruorum, meningum, vesicæ ac cerebris vulneribus.. Illud ipsum replet, purgat, & carnẽ creat: necnon & ab aspide commorsis impositũ prodest. Recẽs etia opsonijs pro oleo ammiscetur, vti & placentis adipis vice. Colligitur verò è butyro fuligo hunc in modum: In lucernam nouam infusum butyrum accendito, & vbi operculaueris, fictili in modum siphunculi facto & supernè quidem angusto, ima verò parte foramina clibani instar habẽte cremari sinito: ac vbi primũ absumptum fuerit butyrũ, aliud subinde affundito, dum fuliginis quantum desideras coaceruaueris: tandem penna deradito, ac vtitor. In medicamentis oculorum vim habet exiccandi & adstringendi: fluxiones verò cohibet, & vlcera celeriter ad cicatricem perducit.

De Lanis. Cap. LXXXII.

LANÆ succidæ molles è collo feminibúsque, laudatissimæ. Subueniunt inter initia vulneribus, cõtusis, desquamatis, humidis, & ossiũ fracturis aceto & oleo aut vino imbutæ. Siquidẽ liquores facilè cõbibunt quibus immerguntur, & propter adhærẽtes sordes (œsypum vo-

Α Περὶ Βουτύρου καὶ τῆς ἀπ' αὐτοῦ λιγνύος.
Κεφ. πα'.

ΒΟΥΤΥΡΟΝ σκυδάζεται καλῶς ἐκ τοῦ λιπαρωτάτου γάλακτος. ζωῶδες δέ ἐστι τὸ τοιοῦτον βάτιον γινόμενον δὲ ἐκ τῶν αἰγείων, οἷον ἀγελείους κινοῦντες τὸ γάλακτος, ἕως χωρισθῇ τὸ λίπος. ἔχει δὲ δυνάμεως μαλακτικῆς, ἐλαιώδους· ὅθεν καὶ λείας τὰ ἕλκη πλείονι πολὺ ἐστὶ τὸ θεραπεύοντα μὴ παρόντος ἐλαίου χρησιμεύει. μιγὲν δὲ μέλιτι καὶ ὀδοντοφθόροις, ἐδωδὰς ὀφελεῖ, καὶ οὖλων ὀδαξισμοὺς ὅτι παίδων καὶ ἄφθας. ἐξωθεῖ δὲ καὶ σπλάγχνων, ὄντερον καὶ ἀψυκτικῶν τὴν σῶμα. πινόμενον δὲ καὶ τοῖς φλεγμοναῖς καὶ σπληνὸς ὀξέσι τὸ μὲν δυσεντερίαις, μηδὲ παλαιῷ. πρός τε δυσεντερίας καὶ πρὸς κώλου ἕλκωσιν ἐγκλυζόμενον πυοποιοῖς τε μίγνυται χρησίμως καὶ μάλιστα ὅταν τῶν νεύρων καὶ μηνίγγων ἐστὶ κύστεως καὶ κεφαλῆς πληγαῖς καὶ καθαιρῇ καὶ σαρκοῖ, καὶ ζωοῦ ὑποθὲν ἀσπίδος δηχθέντος ὠφελεῖ μίζον δὲ καὶ τοῖς ὀπτοῖς ἀντὶ ἐλαίου τὸ παρὸν, ἐν οἷς πίμπασιν ἀντὶ σιαλοῦ. Σωλῆνα δὲ καὶ λιγνύν ἐκ τοῦ βουτύρου τοιοῦτον τὸν τρόπον εἰς λύχνον καινὸν ἐγχέας τὸ βούτυρον ἄνωθεν, καὶ πώμασας ἀγγείῳ κεραμεῷ σωληνοειδεῖ ἄνω κάτω τὰ αὐλῶνι, πρόμαζα δὲ ὅταν τὸν ὑπὸ πόδας ἔχοντι ὥσπερ ἐν κλίβανοι, ἵνα καίεσθαι· ὅταν δὲ ἀναλωθῇ τὸ ἐνὸν βούτυρον, ἄλλο ἐπιχέ, καὶ ποιεῖ τὸ αὐτό, ἕως ἂν ὅσον πλῆθος βούληῃ αἰθαλώσῃς εἶτα ἀποσύρον πτερῷ καὶ χρῶ. Δύναμιν δὲ ἔχει εἰς τὰ ὀφθαλμικὰ ξηραίνει καὶ ἀποσύφει ἐφίζησι δὲ τὰ ῥεύματα, καὶ τὰ ἕλκη ἀπαλοῖ παχέως.

Περὶ Ἐρίων. Κεφ. πβ'.

ΕΡΙΑ οἰσυπηρὰ ἄμεινα τὰ ἁπαλά, ἐκ τοῦ τοῦ πρόσθεν καὶ τῶν μηρῶν. ἁρμόζοντα ἐν ἀρχῇ πρὸς τραύμασι, θλάσμασι, ἀποσύρμασι, πλινθώμασι, ὀστῶν κατάγμασι, βρεχόμενα ὄξει καὶ ἐλαίῳ ἢ οἴνῳ· δύναται γὰρ ὅτι τῶν ἐμβρυγμάτων καὶ μαλακτικὰ ἀφ' ὧν

Mart. legit μαλακτικῆς.

Locus legit κωλικὰ.

Mart. legit κύστεσι κεφαλαῖς.

Β

Ρ

V. non legit

V. ἀποσυρεῖ

C

οἴσυπος· ποιεῖ καὶ πρὸς κεφαλαγίας καὶ A cant) emolliendi vim habent. Efficaces quoque sunt ad capitis, stomachi & alius cuiusuis partis dolores, si cum aceto & rosaceo imponantur.

Περὶ Ἐρίων κεκαυμένων. Κεφ. πγ'.

Τὰ δὲ κεκαυμένα ἔρια, δυνάμει ἔχει ἁπλᾶ φαρμακώδη, ὑπαναθρωπίσματα καλῶς ποιεῖ, ἀπαλωτικὰ ἑλκῶν. καιόμενα δὲ καθαρὰ διαφορήσεις ἐν ἁμῇ χύτρᾳ, ὥσπερ τὰ λοιπά. B τὴν δὲ αἰπὺν ὄιων καὶ χρανίδες καιόμεναι) θαλασσίας πορφύρας. πρὸς δὲ σὺν τῷ ῥοΐνῳ διαφορήσεις ποιοῦσι τὰ ἔρια καὶ μέλιτι δὶς ὀσμηθέντες, καὶ οὐκ ἐῶσι σήπεσθαι. ἄλλοι δὲ διαφορητικὰς ὀβελίσκους ὅτι πλατυτέρους ποιοῦσι μεταξὺ ἀλλήλων διεχούσας ἀπ' ἀλλήλων, καὶ ὅταν ἡμίκαυτος χάδαξος διαδίαν ἴχρας, καὶ ἐν C πόλιον λύτας τὰ ἔρια διεξαμένα καὶ βεβρεγμένα ἐλαίῳ οὕτως, ὡς τε μὴ ἀποστάζειν, καὶ πάλιν χάδαξος, καὶ ἔρια· οὕτω δὲ ὑπτιθέντες, ἐκ τῆς διαδίας χύσεως ὑποφαπίσουσι, καὶ ἔνια δὲ αἴρουσι. καὶ εἴ τι λίπος ἢ πίττα ἐκ τῆς διαδίας ἐπορρεῖ, σώζεται ἐσώτατα καὶ ἀποπλύνται. πλύνεται δὲ D εἰς τὰ ὀφθαλμικά, ὅταν κεφαλὴν κρατῇ ὕδατι τεθερμασμένῳ, καὶ καταξαινομένῳ βύτινον ταῖς χερσὶ, καὶ μὴ τὸ ἀποκαθαίρεσθαι ἀποχολοῦν τὸ ὑγιεινὸν, καὶ ἄλλου ὑπτιχέοντος, ἕως πάλιν αἱ καταξαινόμενοι καὶ τύπτοντες) ἄχρις αἱ ἔρια ἀποσχήμονα τῇ ἡλικίᾳ μὴ δύκῃ, ποσῶς ἢ σύφῃ. E

Περὶ Οἰσύπου. Κεφ. πδ'.

Οἴσυπος ἢ λέγει) ὃ ἐν τῇ οἰσυπηρᾷ ἐρίων λίπος. ὃ καθαιρόμενος οὖσπος· λαβὼν ἔρια μαλακὰ οἰσυπηρὰ ἐκ πλύνου· ἐσρυθμισμένα, χλιαρῷ ὕδατι, ἅμα ἐκθλίβων πάσῃ τὴ ῥυπαρείᾳ, εἰς καλὸν εἰς κεραμεῖον πλατύστομον, καὶ ὑπτιχίας ὕδωρ αἰσχῇ· ἀρυτῆρι· παρασείων ραδαίως, ἕως αἱ ἀφρὸς ἢ ξύλῳ αἰσαπέρασι βύτινος, μήχρις αἱ ὁ πολὺς ἀφρὸς καὶ ῥυπαρὸς συλλεγῇ, εἶτα καταῤῥαίνε θαλάσσῃ καὶ ὅτε καθαρὸν τὸ ὑπτιχόμενον λίπος, αἰσαλείμβανε εἰς ἕτερον κεραμεοῦν ἀγγεῖον, ὑπτιχίας τε ὕδωρ εἰς τὸ κεραμεῖον, πάλιν παράσσε καὶ καταῤῥαίνε τῇ θαλάσσῃ τὸ ἀφρὸν, καὶ αἰσαλείμβανε καὶ τὸ αὐτὸ ποίει, ἕως αἱ μηκέτι ἀφρὸς ἐφίσῃ) δὲ ἀποπλυ-

Lucrum ex vocis codice addit κερδαντικὸν, lucrum facit.

V. addit καὶ

V. & Ἀλίνητον μαλακὸν sed quo sensu, non video.

De Lanis vstis. Cap. LXXXIII.

Crematæ verò lanæ crustas inducendi, carnis excrescentias cohibendi, vlceráque ad cicatricem perducendi vim habent. Porrò mundę & carptæ in fictili crudo cęterorum more vruntur: quin & ad eundem modum lanæ marina purpura infectæ tomenta cremari solent. Nonnulli verò cum sordibus lanas carminant, quas posteaquàm melle irrigarunt, similiter vrũt. Alij in fictili oris patuli verucula inter se distãtia disponunt, ac tenues tædarũ assulas insternũt: supra has verò lanas ipsas componunt carptas & oleo ita imbutas, vt ne tamen deitillẽt, rursúmque assulas & lanas vicissim intersternunt: tandem leuiter tædas succendunt, vtúmque cineré tollunt. Quòd si qua pinguitudo aut pix è tęda defluxit, simul & semel collecta reconditur. Cæterùm lauatur ille lanarum cinis ad oculorum momenta, in fictili labello addita aqua & manibus vehemẽtiùs conturbata: cúmque subsederit cinis aqua effúditur, ac rursum affunditur alia, pariterq; cõturbatur: tãdiuq; id fit, donec is admotus linguæ minimè mordeat, sed quodãmodo astringat.

De OEsypo. Cap. LXXXIIII.

OEsypum dicitur, è succidis lanis collecta pinguitudo: quã sic præparabis. Lanas sumito molles, succidas, radicula non curatas, & aqua calida eluito, simúlque sordiem omnem exprimito. Hãc in labellum oris ampli conicito, ac vbi aquã affuderis, ligula grandiorive cochleari magno impetu refundito exalto demittens, dũ spumescat: aut rude lignea validiusculè cõturbato, dum multa & sordida spuma colligatur, deinde marina respergito. Ac vbi consederit quod supernatabat pingue, in alterũ vas fictile recipito: & affusa in labellum aqua hanc denuò agita, túmque marina spumam perfundito, ac demum excipito. Atque hoc tantisper facito, dum consumpta pinguitudine non amplius spuma

ſpuma ſuperſit. Collectũ porrò œſypũ vbi manu ſubegeris, cõfeſtim, ſi qua inſedit ſpurcitia, hác tollito: gutta tímq; excluſa priore aqua aliá affundito, & manu miſceto, donec ad motũ linguę œſypũ minimè mordeat, ſed quodámodo aſtringat, ac pingue, purũ, cándidumq; appareat: tandé in fictili vaſe ita condito. Verùm hæc omnia æſtiuo Sole fiant. Nonnulli excolatum pingue frigida aqua eluunt, & manibus, non ſecus atq; ceratũ mulieres, confricát: ita enim candidius redditur. Alij poſtquam lanas lauerũt, ſordéſque expreſſerunt, has in lebete lento igni ex aqua decoquunt, & collectũ pingue quod ſupernatat aqua, vti dictũ eſt, eluunt, excolatúmque in fictilẽ patellam, quæ calidá aquam contineat, lineo panno operculant, & Solì exponũt, donec ſat craſſum cándidúmque euadat. Nonnulli denique poſt biduum effuſa priore aqua, aliam affundũt. Præſtantius eſt, è lanis radicula non curatis, lęue, lanarum ſuccidarũ virus olens, quódque, dum in concha cum aqua frigida manu fricatur, albeſcit, nihilque in ſe durum aut compactum habet: veluti quod cerato aut adipe adulteratur. Porro vim habet excalfaciendi, emolliẽdi, & vlcera explendi: maxime verò ſedis, ac vuluæ cũ meliloto & butyro: in vellere appoſitum, partus & menſes cuocat: valet & ad vlceratũ aurium, tum etiá gẽitalium, cum anſerino adipe. Eſt & efficax ad arroſos ſcabioſóſq; oculorum angulos, itémq; genas calloſas ac ciliorũ defluuio laborates. Cæterùm in teſta noua torretur œſypum, dum in cineres redactũ pinguitudinem amittat. Ex ipſo quoq; fuligo colligitur eo quo demõſtrauimus modo, quæ ad oculorũ mẽdicamenta conuenienter additur.

alterne quaque die

De Coagulo. Cap. LXXXV.

LEPORIS coagulum ternũm obolorum pondere ex vino, confert ad venenatarum beſtiarũ morſus, itémque cœliacis, dyſentericis, ac fœminis fluxione ab vtero laborantibus: quin & in grumos concreto ſanguini, ac eiuſdem à pectore reiectionibus auxiliatur. Poſt menſtruam purgationem (& paulò ante coitum) vuluæ cum bu-

A λῶδες δ' λίπος. ἰὸν μὲν τοι δυτρηµένον οἴσυπον τῇ χειρὶ µαλάξας, παραχρῆµα αἰαιρῶ εἴλυα ἐχθαιρόµενα, τραχίζον τὸ πρῶτον ὕδωρ καὶ ἄµυδρον ὑπεχέων, ἔπειτα κινῶν τῇ χειρὶ, ἄχρις αὖ προσαλοιφὸς ἐπὶ γλώσσῃ µὴ δάκνῃ, ποσῶς δ' σύφῃ, λιπαρὸς καὶ καθαρὸς ἔπειτα λευκὸς φανῇ· ὕστερον δὲ ἀπολύσας εἰς ἀγγεῖον κεραµεοῦν. ἐν ἡλίῳ δ' θερµῷ γινέσθω πάντα. ἔνιοι δὲ διαθύσαντες τὸ λίπος, πλυνοῦσιν ἐν ὕδατι ψυχρῷ καὶ χερσὶν ἀνατρίβοντες, ὡς τὴν κηρωτὴν αἱ γυναῖκες· γίνεται δ' ὁ τοῦτος λευκότερος. ἢ δ', πλυνοῦσιν ἅπαντα ἔστιν ἃ καὶ ἐπιθλίβουσιν τὸ ῥύπον, ἔψουσι µὲν ὕδατος ἐν λέβητι πυρὶ κούφῳ, καὶ τὸ ἐφιστάµενον λίπος ἀφαιροῦντες, πλυνοῦσιν ὕδατι, ὡς πρόσθεν εἴρηται· καὶ διυλίσαντες εἰς λεπτὸν κεραµεοῦν ἔχον ὕδωρ θερµὸν, λινῷ τε ῥάκει περιπετάσαντες, ἐάσασιν ἐν ἡλίῳ, µέχρις αὖ αὐτάρκως παχὺς καὶ λευκὸς γένηται. ἔνιοι δὲ καὶ δύο ἡµερῶν ἀποχέουσιν τὸ πρῶτον ὑδωρ, καὶ ὕστερον ἔστιν ὅτε χέουσιν. ἔστι δὲ ὄϊον ὁ ἀγρώστιος, καὶ λῶς, ὅταν ἐρίων οἴσυπον πρῶν, ἀνατριβόµενός τε µὲν ὕδατος ψυχροῦ σὺν µύαξι, καὶ λευκαινόµενος, καὶ οὐδὲν ἔχων σὺν ἑαυτῷ σκληρὸν ἢ συνεκτικὸς· ὥστε καὶ ὁ δολιχόµυρος κηρωτῆς ἢ σέαπι. δύναται δὲ ἔχειν θερµαντικὴν, πληρωτικὴν ἕξιν, µαλακτικὴν· µάλιστα τῶν περὶ δακτύλιον καὶ ὑστέρην σὺν µελιλώτῳ καὶ βουτύρῳ. καὶ ἔµβρυα, καὶ ἔµµηνα ἐν ἐρίῳ προστιθέµενος ἄγει, ὡρός τε πάσῃ ὠσὶ καὶ ὀφθαλµοῖς σὺν χλωρείῳ σέαπι. ποιεῖ δὲ καὶ εἰς φαγεδαινώδεις ἕλκεσι καὶ φαγεδαίνας, καὶ βλέφαρα τετυλωµένα καὶ τριχόρροα ποιοῦντα. καίεται δὲ ἐπ' ὀστράκου καινοῦ, µέχρις αὖ τεφρωθῇ· ἀποβάλλει τὸ λίπος· σωµάσσεται δὲ καὶ λιγνὺς ἐξ αὐτοῦ, ὡς ὑπεδείξαµεν, ἁρµόζουσα πρὸς τὰ ὀφθαλµικά.

Lacuna legit nunc Sylv. Aetius habet παρὰ δὲ

B

C

D

E

F

Περὶ πτυέλου. Κεφ. πέ.

ΠΤΥΑ λαγῶ ἁρµόζει σὺν οἴνῳ ὀλκὴ βραχόλου πρὸς ἡµιοδύκτους καὶ λιακὰς καὶ δυσεντερικὰς πρὸς ῥοικὰς γυναῖκας, πρός τε αἱµατίους θρόµβωσιν, καὶ αἰσχρὰς τὰς ἐκ θώρακος. προστιθεµένη τε µετὰ καθαρσιν τῇ µήτρᾳ µετὰ βυ-

Lacuna ex vet. cod. addit σὺν ὀξυκράτῳ &c.

G

V. non agnoscit.

τέρου σύλληψιν ποιῆ· πινόμενον δὲ φθείρει ἔμβρυα, μετὰ δὲ τὴν ἄφεδρον ἀτοκίους ὄντιν. ἡ δὲ τοῦ ἵππου νῶτα εἰσὶν ἱππάκη καλουμένη, ἰδίως ἁρμόζει πρὸς κοιλιακῶν καὶ δυσεντερικοῖς. ἐρίφου δὲ καὶ ἀρνὸς καὶ νεβροῦ· καὶ δορκάδος καὶ πλατυκέρωτος καὶ δόρκου, καὶ ἐλάφου, καὶ μόσχου καὶ βουβάλου, ὁμοίαν ἴσχουσι δύναμιν, ἁρμόζουσαν πρὸς ἀκονίτου πόσιν εἶναι λαμβανόμενα, καὶ πρὸς γάλακτος πῆξιν μετ' ὄξους. ἡ δὲ τοῦ νεβροῦ ἰδίως μὴ τὰς καθάρσεις ποιησαμένου ὅτι πρὸς ἡμέρας, ἀτοκίου ὄντιν. ἡ δὲ τῆς φώκης ἔοικε κατὰ τὴν δυναμιν κατασείειν· δοκεῖ δὲ ἁρμόζειν μάλιστα ὀπισθοπληξὶ καὶ ὑστερικαῖς πιεῖν μεμιγμένον δραχμὰς ξ' ὕδατι εἰ ἔστι φώκης, ᾧ ἔστιν πόδας λαβὼν πτύας ζώου νεκροῦ, μάλιστα δὲ ἀρνός, καὶ ὑπὸ χίας ὕδωρ, ἕως ἂν βραχὺ χρόνον, εἶτα μετὰ ταῦτα ὑπόχυσον τὸ ἀπόβρεγμα τῆς πτύας τῆς φώκης· ἡ γὰρ ἀληθινὴ ἐξυδατοῦται ταχέως· ἡ δὲ μὴ τοιαύτη, διαμένει ὁμοία. λαμβάνεται δὲ ἐκ τῆς φώκης πτύας μήπω δυναμένων σωμήχεσθαι τῷ σκύμνῳ. κοινῶς δὲ πᾶσα πτύα πίπτει μὴ τὰ διαλελυμένα· λύει δὲ τὰ συνεχῶτα.

A tyro appositum conceptionem adiuuat: potum verò idem partus enecat, & à purgatione menstrua præstat mulieribus vt ne concipiant. At equi coagulum, nonnullis hippace dictum, priuatim cœliacis dysentericísque cõuenit. Hœdi verò, agni & hinnuli dorcadis, platycerotis, dorci ac cerui, itémque vituli ac bubali coagula similibus sunt prædita viribus: siquidem contra haustum aconitum ex vino, & ad concretum lac ex aceto cõuenienter assumũtur. Priuatim autem hinnuli coagulum subditum à purgationibus ad triduum, conceptum impedit. Verùm marini vituli coagulum pares castorco vires obtinet: maximè verò comitialibus & vuluę strágulationibus in potu conferre creditur. Porrò marini vituli coagulum hoc experimẽto deprehenditur. Sumito alicuius alterius animantis, præcipuè verò agni, coagulum, & affusa aqua paulisper dimittito: tùm postea aquâ in qua illud maduerit vituli marini coagulo superinfundito. Quod enim sincerum ac legitimum fuerit, illico in aquam liquescet: quod tale non fuerit, simile sibi permanebit. Excipitur autem vituli marini coagulum, catulis qui nondũ vnà cum matribus natare possunt. Cæterùm in vniuersum coagulum omne dissipata cogit, & coagulata soluit.

Περὶ γίατος. Κεφ. πς'.

De adipe. Cap. LXXXVI.

ΣΤΕΑΡ πρὸς μὲν τὰ περὶ μήτραν ἁρμόζει τὸ νεαρὸν, χλιαρὸν ἢ ὀρνίθιον, καὶ ἅλα ἀλῶν πεπαισμένον· παλαιούμενον δὲ ὑγιεινὸν τὸ ἁλισμένον καὶ τὸ πρὸς χρόνον μεταβεβληκὸς εἰς δριμύτητα. πρόσφατον ὑὸς λαβόντι τούτων καὶ ἐξυμενίσας, ἔμβαλε εἰς λοπάδα κεκαλυμμένην κεραμέαν, ἧς τοσοῦτον χωρεῖσθαι ἢ ὅσον δεῖ μέλλον θεραπεύεσθαι. εἶτα λαὸς εἰς ἐξύστειον ἥλιον τὸ ἀγγεῖον κεκαλυμμένον ἐπιμελῶς, τὸ ἀποτακέμενον ἀπόλει εἰς ἕτερον ἀγγεῖον ὀστράκινον, ἕως ἂν πᾶν διαπνεύσῃ, τοῦτο δὲ εἰς κατάψυχρον ἀπόθου τόπον καὶ χρῶ. ἔοικε δὲ αὐτὴ ἡλίου ὕδατος θερμοῦ ἐπιρρίπτειν τῇ λοπάδι, ἢ ὅτι λεπτὴ καὶ μαλακὴ αἰθριαῖς. ἔστι δὲ καὶ ἄλλος

ADEPS anserinus aut gallinaceus recens, & sine sale inueteratus, ad vuluę vitia proficit. At sale cõditus, quique acrimoniam vetustate contraxit, vuluæ inimicus est. Horum quempiam recentẽ membranulis exẽptis in nouam fictilem ollam conijcito, quæ duplo tantundem capiat, quantum est eius adipis quem curari oporteat. Dein vbi acerrimo Soli vas diligenter operculatum exposueris, eliquescentem inde humorẽ in alterum fictile vas excolato, dum quidquid est adipis absumptum fuerit: mox eum liquorem loco vehementer frigido ad vsum recondito. Sunt qui insolationis vice supra calidam aquam, aut super tenui & elanguida pruna ollam collocant. Est & alia

curandi ratio huiusmodi: exemptis membranis teritur adeps, & in ollam coniectus eliquatur, insuper aspersо minuti salis momento: deinlineo colo transfusus reponitur. Talis porrò in ea medicamenta vtiliter additur, quę lassitudines & fatigationes leuant.

De suillo & vrsino adipe.
Cap. LXXXVII.

Suillus autē & vrsinus adeps hoc curantur modo: Sumito recentem ac præpinguē, qualis is est qui renibus detrahitur, & in largiorem aquam cœlestem quàm frigidissimā exemptis pelliculis immittito, manibúsque terito, ipsum accuratè fricans ac veluti distringens: deinde vbi noua aqua subinde ablueris, in ollam fictilē duplę capacitatis indito: atq; affusa aqua quæ adipem superet, supra leues prunas pōnito, & spatha miscето. Postquam verò eliquatus fuerit, ipsum colo in aquam transfundito, finitóq; refrigescere: tùm diligenter excluſa guttatim omni aqua, in ollā aliam priùs elotā rursum demittito, & infusa aquā sensim eliquato. Inde detractū, vbi fæcem paulisper subsidere permiseris, in pilam spongia madefactā defūdito. Ac vbi cōcreuerit, detractis quę in imo resident sordibus, tertiò tandē citra aquā eliquato, & trāslatū posteà in pilam repurgatumq; in fictile vas inijcito, quod operculatū loco per quàm frigido reponito.

De seuo hircino, ouillo & ceruino.
Cap. LXXXVIII.

Hircinum, ouillū, insupérq; ceruinū seuū ità curare oportet: Ex his quodlibet sumito, quale antè dictū est, & lotū; tunicis, vt in suilli mentione dictū est, exemptis, indito pilæ vti subigatur & molleſcat, atque affusa paulatim aqua fricato, dū neque sanguinolētum quicquam excernatur, neque pinguitudo supernatet, sed illa nitida limpidáq; spectetur. Postmodū vbi in fictilem ollam conieceris, ac insuper aquam addideris vt supereminеat, leui prunæ indito & agitato. Vbi verò totū liquatum fuerit, ac translatum in aquam refrixerit, iterum in loco fictili eliquato, & quæ antè diximus

A Τῶν ὑῶν λιπαρίας ἀφαιροῦσι· μετὰ τὸ ἐξυρμυσθῆναι τὸ σὰρξ λεαίνῃ), καὶ εἰς λεπάδα ἐμβληθῇ τέτρατον, ἀλὸς ὀλίγου καὶ λεπτοῦ· περιστιμπλασθέντος εἶτα ὀλίγῃ ῥάκους λιπῶ διυλισθὲν ἀποπλύνῃ). ἀφιλίζῃ τὸ ἔλαιον εἰς τὰ ἄκρα.

Περὶ Στέατος ἐλαίου καὶ ἀρτέου.

Τοῦτο σέατος tractatio in antiquis libris vno capite comprehensa est. Goup.

B Κεφ. πζ'.

Ὑσὶν δὲ τὸ ἄρσεν λιπαίνεται ὕστερον λοιπῶν· τὸ πρόσφατον δὲ καὶ ἀπὸ μέλανος εἶναι τὸ λιπαρώτατον, εἰς ὕδωρ δὲ ψυχρὸν ὅμβριον ὡς ὅτι ψυχρότατον ἐξυμένιστον, καὶ βύσσε ἢ χερσὶν ὀπτιμέλως αἰωρίζειν αὐτὸ καὶ σείειν· ἀναψύχων εἶτα ἑτέρῳ ὕδατι πολλάκις ἀποκλύσας, δὸς εἰς χύτραν καινὴν τὸ διπλάσιον χαρῶσαν ὀπτιχίας τὸ ὕδωρ ὡς ὑποδέχειν ἑξάπους, ἵνα ὅτι κύφης ἀνθρακιᾶς, καὶ κινῇ ἀσάλευτον· ὅταν δὲ ζεχῇ, ἀποθέσας αὐτὸ δι' ἠθμοῦ εἰς ὕδωρ τὸ ἑάσας ψυχεῖναι, πάλιν ἑφεψήσαντα ἐπιμελῶς ἀπόδος εἰς τὴν χύτραν καινοπλυμένην, ὀπτιχίας τὸ ὕδωρ τέτρεως. καὶ κρύπλασον, μικρόν τι ἑάσας τὸν ῥύπα ὑποστῆναι, καὶ χύσας εἰς ῥύπλον πινθμένα ἀποκλύσας· ὅταν δὲ παγῇ, διελόμενος, καὶ τὸ ἐν ᾧ πυθμένι πρὸς ἀκαθαρσίαν ἀφελὼν, τέτρον ἐκ ῥίτου χωρεῖς ὕδατος, ἐπικαρώσας εἰς ῥύπλον· καθαρίσας τε ἔμβαλε εἰς κεραμεῖν ἀγγεῖον, ἐπιμείσας ἀπόθου εἰς κατάψυξιν τόπου.

Περὶ Στέατος προβείου ἐπιβατίου καὶ ἐλαφείου. Κεφ. πη'.

Τράγλον δὲ καὶ προβάτιον, ἔτι δὲ καὶ ἐλάφειον, παραπλησίως οὕτως λευκὸν, οἷον προβείου), σὰρξ οἰουδιποσοῦν αὐτῶν καὶ πλευρὰς, ἐξυμένιστας τε ὡς προείρηται ὅτι τὸ ὑείου, δὸς εἰς ῥύπλον μαλθακτὸν, καὶ πέπτε κατ' ὀλίγον ὕδωρ ὀπτιχίαν, ἄχρις αὖ μήτε αἱματώδη ἀκρίνηται, μήτε λίπος ὑπιστλέῃ, λαμπρὸν τὸ χρῶμα. λοιπὸν ἐμβαλὼν αὐτὸ εἰς κεραμεᾶν χύτραν, καὶ προσεπιδὺς ὕδωρ ὅσον τὸ ὑποδέχειν, ἵνα ὅτι κύφης ἀνθρακιᾶς καὶ κινῇ. ὅταν δὲ παχῇ ἄπαν, καταψύσας αὐτὸ εἰς ὕδωρ ἢ ψύξας, πλυνὰς τὸ πλὺ χύτρας, ἐν ᾗ διετέθη τέτε, καὶ τὸ αὐτὸ

τοῖς περιφερομένοις πολ. τ' δὲ πέπον χωρὶς ὕδατος τήξας, εἰς τετριμμένῳ ψιάθῳ ἀπόθεσον, καὶ ψυχῇ ἀπόλιθσον, ὡς ἐλέγετο ὅτι τῷ ὑείου.

A similiter facito. Tùm vbi tertiò citra aquam liquefeceris, in pilam liquore perfusam excolato, refrigeratúmque, vti de suillo dictum est, recondito.

Περὶ ἰάπος βοείου. Κεφ. πθ'.

De seuo bubulo. Cap. LXXIX.

Καὶ τῷ βοείου δὲ ἰάπος ἐξυμθμιστέον ὃ νεφριτῶν καὶ θαλάττῃ πλαγίᾳ πλυτέον· εἶτα εἰς ὅλμον ἐμβλητέον καὶ κοπτέον ὀλιμελῶς, ἐπιῤῥαινομένης τῆς θαλάττης· ὅταν δὲ ἀφαλυθῇ ἄπαν, ἐμβλητέον αὐτὸ εἰς χύτραν κεραμέαν, καὶ θαλασσαν ὅτι χυτέον ὅσον ὑπερέχει· μὴ ἧττον ἐπιθαμῶς, ἑφεπέον τὸ ἄγχος αὖ πλὴ ἰδίαν ὀσμὴν ἀποβάλῃ. εἶτα πρὸς μίαν μναῦν Ἀττικὴν ἕ ἰάλος, κηροῦ Τυῤῥηνικοῦ ὁλκὰς τέτταρας ἐμβλητέον καὶ δικτητέον ἀφαιρετέον δὲ τὸ περιαθημένον ἐκ τοῦ πυθμένος ἀκαθαρσίας, καὶ εἰς λοπάδα καινὴν ἀποθετέον. εἶτα εἰς ἥλιον καθ' ἡμέραν κεκμηκὸν ἀνεστοπασμένον, ὅπως ἀπολυχθῇ, καὶ δυσωδίαν ἀποβάλῃ.

The bubulo quoq; seuo renibus maximè detracto eximendæ pelliculæ, ipsúmque aqua marina ex alto petita eluendum: mox in pilam coniectum diligenter tundendum aspersa maris aqua. Cùm verò totum dissolutum fuerit, in fictilem ollam immittendum, & affusa aqua marina quæ non infra dodrantem superemineat, coquendum, donec proprium odorem amiserit. Deinde ad singulas seui Atticas minas, ceræ Tyrrhenicæ quaternæ drachmæ injiciendæ. Excolatum, detracta quæ in fundo resident immunditie, in ollam nouam reponendum: tandem opertum Soli quotidie exponendum, vt putido odore abolito ad candorem reducatur.

Περὶ ἰάπος ταυρείου, πανθηρείου, καὶ λεοντείου. Κεφ. ϙ'.

De adipe taurino, pantherino ac leonino. Cap. XC.

Τὸ δὲ ταύρειον ἀκατάλυτον οὕτω. λαβὼν καὶ τοῦδε τὸ πρόσφατον καὶ νεφριτῶν ἐκπλυνε ποταμίῳ ῥεύματι, ἐξυμθμίσας τε δὲ εἰς χύτραν κεραμέαν καινὴν, ἀλὸς ὀλίγον ἐπιπάσας, καὶ τῆξε· εἶτα εἰς ὕδωρ διαυγὲς ἀπόθησας, ὅταν ἀρχὴν λαμβάνῃ πήξεως, ταῖς χερσὶ πάλιν ἐκπέψων σφοδρῶς πλυνὸν, ἕ μὲν ἀποχεομένου ὕδατος, τῷ δὲ ἐπιχεομένου, ἄγχος αὖ πλυθῇ καλῶς· καὶ πάλιν εἰς χύτραν ἐμβάλλων ἕψε μετ' οἴνου ἴσου ἡδύνδες. εἶτα ἐξαίρας ἀπὸ τοῦ πυρὸς πλὴ χύτρας, ἔασον πυκερυῶσαν ὅ ἐστιν ἐνθάδε· τῇ δὲ ἑχομένῃ ἔασι τὸ τῆς δυσωδίας ὑπολίπηται, ἀπελθόντος ὃ περιφερομένου εἰς ἑτέραν χύτραν καινὴν, περιστέπασον οἴνου ἡδύνδες· καὶ τὰ αὐτὰ τοῖς περιφερομένοις ποίει, ἕως ἂν ἀπαντῶν πλὴ δυσωδίαν ἀποβάλῃ. τίθεται δὲ καὶ χωρὶς ἁλῶν ἐπ' οὐσίας ὀφθήσεσι, νέα ἐξ οὗτος ὑπολιμπάνηται· γάρ τι μᾶλλον τὸ ὕστερον σκευασθὲν ἐκ ἀχρὸν λευκόν. ὡσαύτως δὲ καὶ πάρδαλιν σκευαστέον καὶ λέοντος,

Taurinum verò seuum sic curari debet: Hoc quoque recens ac renibus euulsum profluente amnis aqua abluito, detractisque tunicis in ollam fictilem nouam indito, & inspersо exiguo sale liquefacito: deinde in aquam pellucidam excolato. Ac vbi concrescere cœperit, iterum manibus valdè confricando eluito, aqua subinde effusa refusáq; dum probè lotum fuerit. Rursum in ollam coniectum cum pari modo vini odorati decoquito. Et cùm secundò efferbuerit, sublata ab igni olla ibidem seuum pernoctare sinito. Postridie siqua graueolentia supersit, in alteram ollam nouam translatũ odorato vino perfundito, ac eadem quę priùs facito, donec omne odoris virus euanuerit. Liquatur & sine sale, ad nonnullos præsertim affectus, quibus sal aduersari solet: sed ita præparatum non magnopere albescit. Eodem quoq; modo pátherina & leonina,

aprugna, camelina & equina, hiſq; ſimilia pinguia præparari oportet.

Quomodo pingue odoramentis imbuendum ſit. Cap. XCI.

Vitulinum autem ac taurinum pingue, nec non ceruinum, atque etiam huius animalis medulla odoramentis imbuuntur hunc in modum: Pingue quod odoratum reddi debet, demptis membranis quo diximus modo elotum, ac vino odorato nulla maris aqua diluto feruefactum tandem ab igne tollito, ac imbi pernoctare ſinito. Tum altero eiuſdem generis vino ac eadem qua priùs mẽſura affuſo, ipſum colliquato, & accurate defæcato: mox nouem eius heminis iunci Arabici drachmas ſeptem adijcito. Quòd ſi ipſum flagrantioris odoris fieri voles, quadraginta floris eiuſdem drachmas ſuperaddito, cum palmæ, caſſiæ & calami totidẽ ſingulorũ drachmis: aſpalathi & xylobalſami ana drachma vnã: adde & cinnamomi, cardamomi, nardi, ana vnciã vnã. Omnia verò minutius cõtũdãtur: deinde affuſo vino odorato vas operculatum ſupra carbones firmiter collocato, ac ter omnia conferuefacito, túmque vas ab igni ſemotum pernoctare ſinito. Poſtridie vino effuſo, nouóque generis eiuſdẽ addito, ter ſimili modo conferuefacito atque dimittito. Manè verò exempto pingui vinum effundito, & abluto vaſe, purgatóq; quod imo ſubſidens hæſerat, ipſum eliquato: poſtremò excolatum ad vſus recondito. Hoc eodem modo imbuitur odoramentis quod anteà curatum eſt. Verùm antedicta pinguia in ſequentẽ modum priùs inſpiſſari par eſt, quò facilius odoramentorum vires in ſe recipiant. Itaque aſſumens quodcunque horum volueris, cũ vino feruefacito, ſimul immiſſo myrti ramulo, ſerpyllo ac cypero, inſupérque aſpalatho exactius tuſo. Aliqui tamen ad hunc vſum vno duntaxat horum contenti ſunt. Cũ autẽ tertiò efferbuerit, leniter exemptũ & linteo trãsfuſum, odoramẽtis, vti demõſtratũ eſt, imbuito. Sed & adipes ita quoq; priùs inſpiſſantur. Adipẽ quẽcunq; volueris recentem, ſanguinis expertem,

A Σύαγρειον τε καὶ καμήλειον καὶ ἵππειον καὶ τὰ ὅμοια.

Hæc verba quæ ad capitis finem ſequuntur, non leguntur in antiquis codicibus, & habẽtur tamẽ apud Seraptonẽ. Hoc caput & quod proximè ſequitur, non habẽtur apud Oribaſium.

Πῶς δεῖ σίαρ ἀρωματίζειν. Κεφ. ϟά.

Ἀρωματίζειν δεῖ σίαρ μόσχου καὶ ταύρου, ἔτι δὲ ἐλαφείου, καὶ μυελὸν τοῦδε τοῦ ζώου ὡσαύτως τοῦτον τὸν τρόπον· ἐξυμενίσας τὸ μὴλιν εὐωδιαζέσθω, καὶ πλυνάς ὡς τοῦ εἰπομεν, καὶ ζέσας οἴνῳ ἀγαλασίσῳ τε καὶ βώδῃ, εἶτα αἰσελαιμος καὶ σινηκτερεῦσαν ἀφεὶς· ἔπειτα οἶνον ἐκ τοῦ αὐτοῦ γλεύους ὀπτιχέων, ἔσοντα τοῦ πλήθους ὅσος ἐπὶ τὸ ἔμπροσθεν δόθεις, καὶ τύξας ἀφυλίσας τε ὀπτιμελῶς, ὡς τοῦ κοτύλας σινέα τοῦ σίαρος ἔμβαλε ὀρίνου Ἀραβικῆς ὀλκὰς ζ'. ἐὰν δὲ εὐωδέστερον ποιῆσαι ἐθέλῃς, τῶν αὐτῶν ὀλκὰς μ'. ὡς ὅσα πόδες ἢ καὶ φοίνικος καὶ κασίας καὶ καλάμου τοῦ ἴσας ὀλκάς· ἄσσα λεπτύνας τε καὶ ξυλοβαλσάμου ὀλκὰς ἀνὰ οὐγγίαν μίαν· μίξον δὲ καὶ κινναμώμου καὶ καρδαμώμου καὶ νάρδου ἀνὰ οὐγγίαν μίαν· πλύνε δὲ ἔσω ὁλοχερέστερα κεκιμένα. εἶτα ὀπτιχὶ οἶνον εὐώδη, καὶ ὑσσῴδι ἔσω· αἰθράκων πεπυρωμένων τὸ ἀγγεῖον, καὶ σύζεσον τρεῖς, ἄρας τε ἀπὸ τοῦ πυρὸς ἔασον σύνεκτερεῦσαν αὐτό· τῇ δὲ ἐχομένῃ ἀπόχεε οἶνον, καὶ ἄλλον ὀπτιδοῦς τοῦ αὐτοῦ γλεύους, συζέσον ὁμοίως ἕως τρεῖς, καὶ ἄφες. τοῦ δὲ αἰσελαίμου τὸ σίαρ, ἀπόχυσον οἶνον· ἐκ πλυνάς τε τὸ ἀγγεῖον καὶ καθάρας τε τοῦ σὺν τῷ πυθμένι καὶ τύξας διυλίσας τε αὐτό, ἀπόδου καὶ χρῶ. ἀρωματίζεται δὲ καὶ ὁ πλεσπάδμων αὐτοῦ τρόπον. τοῦ συφεται δὲ τὰ τοῦ φρυπτὰ σίαπα· τοῦς ὃ ῥᾳδίως δέξασθαι τὴν τῶν ἀρωμάτων δύναμιν οὕτω· λαβὼν αὐτῶν ὅ, τι ἂν βούλῃσι, ζέσον ἅμα οἴνῳ, συγκαθεὶς μυρσίνης κλάδον, ἔρπυλλόν τε καὶ κύπειρον, ἔτι δὲ ἀσπάλαθον ὁλοχερέστερον κοπέντα. ὕσας δὲ ἐνὶ τούτων ἀρκεῖται· τῇ χρήσει. ὅταν δὲ εἰς πεῖσιν αἰάζεσθαι, ἀνελόμενος τοῦ ἐκ καὶ δι' ὑδρίης ὑλίσας, ἀρωμάτιζε ὡς δεδήλωται. ἔτι δὲ καὶ οὕτω τοῦ συφεται τὰ σίαπα· κόψας ὅ, τι ἂν αὐτῶν ἐθέλῃς, τοῦ σφαιρωτὸν δὲ καὶ ἀμιγὲς αἵματος,

Vitulinum autem ac taurinum pingue, nec non ceruinum, atque etiam huius animalis medulla odoramentis imbuuntur hunc in modum: Pingue quod odoratum reddi debet, demptis membranis quo diximus modo elotum, ac vino odorato nulla maris aqua diluto feruefactum tandem ab igne tollito, ac imbi pernoctare ſinito. Tum altero eiuſdem generis vino ac eadem qua priùs mẽſura affuſo, ipſum colliquato, & accurate defæcato: mox nouem eius heminis iunci Arabici drachmas ſeptem adijcito. Quòd ſi ipſum flagrantioris odoris fieri voles, quadraginta floris eiuſdem drachmas ſuperaddito, cum palmæ, caſſiæ & calami totidẽ ſingulorũ drachmis: aſpalathi & xylobalſami ana drachma vnã: adde & cinnamomi, cardamomi, nardi, ana vnciã vnã. Omnia verò minutius cõtũdãtur: deinde affuſo vino odorato vas operculatum ſupra carbones firmiter collocato, ac ter omnia conferuefacito, túmque vas ab igni ſemotum pernoctare ſinito. Poſtridie vino effuſo, nouóque generis eiuſdẽ addito, ter ſimili modo conferuefacito atque dimittito. Manè verò exempto pingui vinum effundito, & abluto vaſe, purgatóq; quod imo ſubſidens hæſerat, ipſum eliquato: poſtremò excolatum ad vſus recondito. Hoc eodem modo imbuitur odoramentis quod anteà curatum eſt. Verùm antedicta pinguia in ſequentẽ modum priùs inſpiſſari par eſt, quò facilius odoramentorum vires in ſe recipiant. Itaque aſſumens quodcunque horum volueris, cũ vino feruefacito, ſimul immiſſo myrti ramulo, ſerpyllo ac cypero, inſupérque aſpalatho exactius tuſo. Aliqui tamen ad hunc vſum vno duntaxat horum contenti ſunt. Cũ autẽ tertiò efferbuerit, leniter exemptũ & linteo trãsfuſum, odoramẽtis, vti demõſtratũ eſt, imbuito. Sed & adipes ita quoq; priùs inſpiſſantur. Adipẽ quẽcunq; volueris recentem, ſanguinis expertem,

maris aqua

V. ſic Interp. οἶνον χνοῦ τοῦ αὐτοῦ γλεύους ὀπτιχέων, ἔσοντα τοῦ πλήθους, ὅσος &c.

V. addit καὶ καὶ anas

cruſtaſtulis ſuo.

Hiũ caret, vetus exemplar vſque ad ῥ᾽ ἄφες.

V. ἐρεσεῖν

V. καὶ habet.

τά τε ἄλλα ἔχον ἃ πολλάκις εἴρηται), ἐμβαλὼν εἰς λοπάδα καινὴν ὀστρακίας τὸ οἶνον λευκὸν εὐώδη πηχαίου, ὡς ὑπερέχειν δακτύλους ὀκτὼ, σύζεσον ἐλαφρῷ πρὸς πυρὶ, ἕως τὴν σύμφυτον ὀσμὴν ἀποδῷ, καὶ μᾶλλον ἀνίζῃ. εἶτα καθελὼν τὸ ἄγγος καὶ ψύξας, αὖελλε σίαπεως μνᾶς β'. καὶ βαλὼν εἰς λοπάδα, προσεπίδυσε τι τοῦ αὐτοῦ οἴνου κοτύλας δ'. καὶ λεπίνῳ καρπῷ, ᾧ τοῖς ξύλοις οἱ αὐλητικοὶ χρῶνται), κεκομμένου μνᾶς δ'. ἕλκε πυκνὸν κύφωνι διηνεκῶς κινῶν. ὅταν δὲ τὴν στακτώδη ἀποφορὰν ἀποδῷ πᾶσαν, διύλισας αὐτὸ ψύχε. καὶ λαβὼν ἀσσα λάθρα κεκομμένου μνᾶν μίαν, ἀμύρακίνου δὲ ἄθρους μνᾶς τέτταρας, οἴνῳ φύσασον παλαιῷ, ᾧ ἔασον μίαν νύκτα πιεῖν. τῇ δὲ ἐχομένῃ εἰς χύτραν κεραμέαν χοινικιαῖαν χαλκῆν καθὼς αὐτὰ ᾗ τὸ σίαπ. τροσατρόδος δὲ καὶ χοὰς ἥμισυ οἴνου, καὶ σύζεσον ἀπὸ ὅλου. ὅταν δὲ πάντων τὴν συμμιξιν τὴν δύναμιν καὶ τὴν ὀσμὴν ἀπολάβῃ τὸ σίαπ, καθελὼν αὐτὸ καὶ διυλίσας, *πῆξον ᾗ ἀπόδου. ἐὰν δὲ βιωδέστερον ποιῆσαι θέλῃς, μίσητι σμύρνης τῆς λιπαρωτάτης ὁλκὰς η'. οὕτω διθύμους πολυτελῆ. Τὸ δὲ ὁριστὸν καὶ χίνδον σίαπ ᾧ τινες αὖ βιωδιαθῆ λαβὼν οἴνου ἥμισυ αὐτῶν τετραπυμβύου κοτύλας δ'. καὶ καθεὶς εἰς ὀστρακίνην χύτραν, τρόσμιξον ἐρυσισκήπτρου ᾗ ξυλοβαλσάμου, ἔτι δὲ φοίνικος ἐλάτης καὶ καλάμου ὁλοχεροῦς κεκομμένα ἀνὰ < ις'. ἐπιδυσὶ τι οἴνου Λεσβίου παλαιοῦ κύαθον ἀ. θὲς ἐπ' αἰθρακιᾶς καὶ σύζεσον ῥῖς. εἶτα ἀμελόμενος ἀπὸ τοῦ πυρὸς τὸ ἀγγεῖον, ᾗ ἐάσας ψυγῆναι τὰ ἐν αὐτῷ ἡμέρας μίαν καὶ νύκτα, τῇ ἐχομένῃ πῆξον αὐτὰ, ᾗ διὰ ῥάκους λινοῦ ᾗ καθαροῦ *χύλισον εἰς καθαρὸν ἀγγεῖον. ὅταν δὲ πυκνῇ, ἀμελόμενος κόψας τὸ προφρημένον εἰς κεραμοῦν ἀγγεῖον βάλε καινόν, καὶ πωμάσας γεγυμωμένῳ, ἀπόθου εἰς κεκαλυμμένον τόπον ψυχρόν. χρῶνται δὲ τούτοις δραστέον εἰς χλιαρὸν ὕδωρ ᾗ πήγνυται. ἔνιοι δὲ τρὸς τὴν σύστασιν αὐτῶν καὶ τηλεῦ πῆξιν, βραχὺ κηροῦ Τυρρηνικοῦ μίσγουσι. ταῖς δὲ αὐταῖς δόσεσι ἀρωματίζουσι καὶ τὸ ὕδωρ, ἄρκεύθου τε καὶ τὰ ὅμοια.

A aliásque habentem notas quas sæpe retulimus vbi contuderis, in ollam nouam mijcito: & infuso vino albo odorato vetere quod digitorum octo altitudinem superet, igni lento conferuefacito, donec odorem natiuum depoſuerit, ac vinum potiùs redoleat. At vbi depoſito vaſe refrixerit, duas adipis minas eximito,

B & in ollam mittito, adijcitóque vini eiuſdem heminas quatuor, ſeminis loti (eius inquam, cuius ligno tibiarum artifices vruntur) tuſi minas quatuor, ac lento igni identidem agitando coquito. Cùm autem adipoſam graueolentiam omnem penitus depoſuerit, excolatum refrigerari ſinito. Tùm ſumi-

C to aſpalathi tuſi minam vnam, amaracini floris minas quatuor, ac vino vetere ſubigito, ſinitóque noctem vnam combibere. Poſtridie in ollam fictilem nouam tricongialem ea ſimúlque adipem demittito, & addito vini dimidio congio ſimul omnia feruefacito. Pòſt vbi ſpiſſamentorũ omnium vim & o-

D dorem adeps aſciuerit, igni detractum excolatúmque refrigerato ac reponito. Quòd ſi odoratiorẽ reddere volueris, myrrhæ pinguiſſimæ drachmas octo vino multorum annorum dilutas, ammiſceto. Gallinaceum autem & anſerinum adipem ita poſſis odoribus imbuere. Cuiuſuis eorũ curati heminas qua-

E tuor ſumito, & olla teſtacea excipito: ac eryſiſceptri, xylobalſami, inſupérq; palmę elatæ, & calami exactè tuſi ana drachmas XII admiſceto, adiectóque vini Lesbij veteris cyatho vno prunis admouerto, ac ter cõferuefacito: mox vaſe ſublato ab igne, quæ in eo ſunt diem vnam noctémque refrigerari ſinito.

F Poſtridie liquata per pannum lineum mundum in vas nitidum excolato. Vbi verò coierit adeps, concha exemptũ in fictile vas nouum conijcito, quod arctè operculatum loco perquàm frigido reponito. Cæterùm hæc hyberno tempore peragẽda ſunt: neque enim æſtate

G adeps cõcreſcit. Sunt qui quò facilius omnia coeant atq; cõcreſcant, cerę Tyrrhenicæ momentum admiſcent. Eadem verò arte ſuillus adeps & vrſinus, cæteríque id genus odoramentis imbuuntur.

In aliis cod. hæc verba ſic legit Goupyl. ἀπὸ δὲ τοῦ διυλίσαι καὶ τηλεῦ ἕνεκεν τοῦ συμμίσσειν. Sed vulgatam lectionem rectam esse, nonnihil oſtendit. V. τὴν συμμίσσειν omiſit.

Quomodo adeps ſampſuchi odore imbuatur. Cap. XCII.

Porrò ſampſuchi odore adeps imbuitur hoc modo: Bene curati adipis, præſertímque taurini, minam vnam ſumito, & ſampſuchi maturi accuratè contuſi ſeſquiminam miſceto, atque inſperſo largiore vino offas conformato, quas in vaſe operto repoſitas pernoctare ſinito. Matutino in fictilem ollam iectas affuſa aqua leuiter coquito: cúmque ſuum odorem adeps exuerit, ipſum excolatum ac probè operculatum noctem totam quieſcere ſinito. Poſtero die paſtillum eximito, ac deterſa ſorde quæ fundum petierat, iterum ſampſuchi contuſi, vti dictum eſt, ſeſquiminam aliam adijcito, ſimilitérque in offas cogito. Alijs quoque quæ antè diximus peractis, decoquito & colo traijcito: ac detracta ſi qua fundo hæſit ſpurcitia, loco perfrigido reponito.

A Πῶς σαμψυχίζεται ὃ στέαρ.

Κεφ. ϛβ'.

Σαμψυχίζεται ὁ στέαρ ὅτω· λαβὼν τῦ καλῶς πεπραπεδωμένου ὅσον μνᾶν μίαν (ἔστω δ' μᾶλλον ταύρειον) & σαμψύχου ἀξέμου πεπλασμένου ὀβολοῦ μνᾶν μίαν ἥμισυ μῖξον, καὶ μαζίδας ἀνάπλασον, ὀπτήσας ἀνθράκων δαψιλέστερον οἴνου, εἶτα ἀποψήσας αὐτὰς εἰς ἀγγεῖον καὶ σκεπάσας, ἐάσον νυκτερεῦσαι. τῇ δ' εἰς κεραμέαν χύτραν ἐμβαλὼν, καὶ ὕδωρ ἐπιχέας, ἕψει κούφως. ὅταν δὲ τὸ ἰσχὰν ὁσμὴν ἀποβάλῃ τὸ στέαρ, διύλισας αὐτὸ καὶ ἐάσας μέναι ὅλην τὴν νύκτα πεπωμασμένον καλῶς, τῇ ἐπιούσῃ αἰρέμενος τὸν ἔγχυτον, καὶ προσαποψύξας τοῦ ὑπὸ τῷ πυθμένι ῥυπαρείας, μίξον πάλιν σαμψύχου κεκομμένου, ὡς εἴρηται, ὀβολοῦ μνᾶν μίαν ἥμισυ, καὶ ὡσαύτως ἀνάπλασον μαζίδας, πιὼν καὶ τὰ ἄλλα ἃ προεῖπον. ὅτι πᾶσι δὲ ἑψήσας καὶ διύλισας, ἀφελοῦ εἴ τις ἐν τῷ πυθμένι ῥυπαρεία ὑπάρχει, ἀπόθου δὲ καταψύχειν τόπῳ.

De adipe anſerino & gallinaceo. Cap. XCIII.

At ſi quis incuratum adipem anſerinum, gallinaceum, aut vitulinum à putredine tueri velit, ita faciendum eſt. Ex his aſſumptum recentem quemuis adipem diligenter eluito, & ſupra cribrum in vmbra perflandum aëri exponito: ac vbi ſiccatus fuerit, in linteum mundum inijcito, & manibus vehementer exprimito: dein lino traiectum vmbroſo in loco ſuſpendito, & poſt multos dies noua charta inuolutũ loco perfrigido recondito. In melle quoq; aſſeruata pinguia imputria permanent.

Περὶ στέατος χοιρείου καὶ ὀρνιθείου.

Κεφ. ϛγ'.

Εἴ τις ἀθεράπευτον στέαρ ἢ χήνειον ἢ ὀρνίθιον ἢ μόσχειον θέλοι τις ἄσηπτον διατηρῆσαι, οὕτω ποιήσει αὐτό· λαβὼν παρόστατον ὁπόσον αὐ βούλει, ἔκπλυνον ἐπιμελῶς, & διαψύξας ὅτι κοσκίνῳ ἐν σκιᾷ, μετὰ τὸ ξηρανθῆναι ἔμβαλε εἰς ὀθόνην καθαρὰν, καὶ τῇ χειρὶ ἐκπίεσον βιαίως, εἶτα λίνῳ διείρας κρέμασον ἐν τόπῳ σκιερῷ· μετὰ δὲ ἡμέρας πολλὰς χαρτῷ ἀποδήσας χάρτῃ, ἀποθησο ἐν καταψύχρῳ τόπῳ. ἄσηπτα διαμένει καὶ ἐμέλιτι ἀποτεθέντα.

v. αὖ

After hoc loco ἰχμαῖον, codd. ſenſu. Gaup.

Adipum vis. Cap. XCIIII.

Vim habent adipes omnes excalfaciendi, molliendi atque rarefaciendi. Taurinus tamen adeps, itémque bubulus ac vitulinus quodammodo aſtringunt: ad hos proximè accedit leoninus, quem aiunt etiam inſidiantibus reſiſtere. Elephantinus verò ac ceruinus peruncti, ſerpentes fugant. At caprinus aſtringentior: qua ex cau-

Στεάτων δυνάμεις. Κεφ. ϛδ'.

Hoc caput coniunctum eſt cum ſuperioribus in antiquis libris. Gaup. Ald. αἰγαμελαίου, ſed male.

Δύναμιν δ' ἔχει τὰ στέατα πάντα θερμαντικὴν, μαλακτικὴν, ἀραιωτικήν. τὸ μὲν ταύρειον σύφει πως, καὶ τὸ βόειον, καὶ τὸ μόσχειον· καὶ τὸ λεόντειον δὲ παραπλησίως τούτοις· φασὶ δ' αὐτὸ καὶ αὐτοφάρμακον τοῖς ἐπιβουλεύουσιν εἶναι. τὸ δὲ ἐλεφάντειον καὶ ἐλαφεῖον, ἑρπετὰ διώκει καταχριόμενον. τὸ δ' αἰγεῖον, συμπεπτικώτερον ὂν

δυσεντερικοῖς δίδοται σὺν ἀλφίτῳ ἢ ῥοῖ καὶ τυρῷ καθεψόμενον, εἴλκυζέται τε μετὰ πτισάνης χυλῷ. διατιθεῖ δὲ καὶ φθισικοὺς ἐσ ῥοφήμασιν ὁ ἐξ αὐτῶν ζωμός, καὶ τοῖς καθαρίδας πεπωκόσιν ὠφελίμως δίδοται. Ὁ δὲ πρόλοπ ἀφαλυκώτερον ὄν, βοηθεῖ ποδαγρικοῖς, φυρασθὲν σὺν αἰγὸς σπυράθοις καὶ κρόκῳ, καὶ ὀπισπηθὲν. καὶ Ὁ προβάτιον ὂν ἀναλογεῖ τούτῳ. ὕειον δὲ ἀναλογεῖ τοῖς περὶ ὑστέρας καὶ ἕδραν· ὃ καὶ πυρικαύσεσι ἁρμόζει. τὸ δὲ παιδίον ὕειον ὡς ὅτι πραγματικώτερον, θερμαίνει καὶ μαλάσσει· οἶνῳ δὲ πλυνθὲν ἁρμόζει πλευριτικοῖς, σὺν τέφρᾳ ἢ ἀσβέστῳ αἰγαληφέι, ἐσ προς οἰδήματα καὶ φλεγμονὰς καὶ σύριγγας. Ὁ δὲ ὄνειον φασὶν ἀλεῖς ὀμάχρους ποιεῖν. χήνειον δὲ καὶ ὀρνίθειον πρὸς παιδαγωγίαν, καὶ ὅτι ῥήξεις χηλῶν, καὶ προσώπων ὑπομέλανας, καὶ ὠταλγίας ἁρμόζει. Ὁ δὲ ἄρκτειον δοκεῖ περιφυεῖς τοῖς ἀλωπικοῖς, καὶ χειμετιῶσιν ἁρμόζει· τὸ δὲ τοῦ ἀλώπεκος σπαρ. πρὸς ὠταλγίας· τὸ δὲ τῶν πολιῶν ἰχθύων ὀξυδερκὲς ἐγχριόμενον, ἀπὸ ἀκτὶς τοῦ ἡλίου, καὶ μέλιτι μιγὲν. Ὁ δὲ τῆς ἐχίδνης, πρὸς ἀμβλυωπίας, ἔτι ὑποχύσεις ἐνεργεῖ, μιγὲν κεδρίᾳ καὶ μέλιτι Ἀττικῷ, καὶ ἐλαίῳ παλαιῷ ἴσον· ἐκβληθείσας δὲ τὰς τοῦ μαλακίου ῥίζας, πρὸς τὰς ῥίζας κεῖσθαι χρὴ καθ' ἑαυτὸ πρόσφατον, ἐξιτήλους ποιεῖ.

In alt. scriptũ est ωφιτ ὅπως sed vulgata scriptura melior est. Goup.

V. ἀλωπεκίας

Περὶ Μυελῶν. Κεφ. ϛϚ'.

Μυελὸν δὲ κεφάλειός ἐστιν ἐλάφου, εἶτα μόσχου, καὶ μετὰ τοῦτον ταύρου, εἶτα αἰγὸς καὶ προβάτου. συνίσασι δὲ ἥρωες τὴν συνεγκέφαλον τῷ φθινοπώρῳ. τοῦτο δὲ τοῖς ἀνθρωπείοις κρειοῖς, αἱμαλωπὶς δὲ οἱονεὶ σὰρξ εὐθρυπτος ἐν τοῖς ὀστέοις εὑρίσκεται. ἔστι δὲ δύγνωστος, ἐὰν μήτις αὐτὸν ἐξορύξας ἴδῃ, καὶ ἀποθῆται· ἀπόλιες δὲ εἰσὶ μαλακτικοὶ, ἀραιωτικοὶ, *ἡρακτυλικοὶ, πληρωτικοὶ ἑλκῶν. ὁ δὲ ἐλάφου περιχρισθεὶς καὶ θηρία διώκει. διαπλάσσεται ὁ προσφατος μαλαχθεὶς ὡς σίαρ *καθεψόμενον ὕδατι ἐκλεγομένου τοῦ ὀστέου, εἶτα δι' ὀθόνης ὑλισθεὶς, καὶ ὡσαύτως πλυνθεὶς, ἄχρις οὗ τὸ ὕδωρ καθαρὸν γένηται, εἶτα διηθούμενον ἐν λινῷ ἐκθλίβεται, καὶ ἀποτίθεται εἰς ἀγγεῖον ὀστράκινον. ἔστι δὲ καὶ ἐκ τῶν ἐν τοῖς ἄκροις τῶν ὀστῶν ἐκλαμβάνειν τὸν μυελὸν, ἐκ τῶν ἐν τοῖς μέσοις ὀστοῖς ἐνόντων. ἔστι δὲ καὶ ἐκ τῶν ἐν τοῖς ἄκροις τῶν ὀστῶν ἐκλαμβάνειν τὸν μυελὸν, ἐκ τῶν ἐν τοῖς μέσοις ὀστοῖς ἐνόντων.

Vetus scriptura est, & quæ adhuc est in antiquis libris ἐξορύσσας. Goup.

sa cum polenta, rhoë & cáseo decoctus dysentericis exhibetur, & cum ptissanæ succo infunditur. Ipsorum quoque ius phthisicis in sorbitione prodest, ac ijs etiamnum qui cantharidas hauserunt vtiliter datur. Hircinus porrò, vt qui validissimè discutiat, podagricis auxiliatur cũ caprinis baccis & croco subactus & impositus. Sed & huic quoque ouillus proportione respondet. Suillus autem ad vuluæ fedisque vitia accõmodatur: & igni quoque ambustis conuenit. Idem sale conditus & quàm vetustissimus excalfacit & emollit: vino verò lotus, pleuriticis prodest. At cinere aut calce exceptus, tum œdematis, tum inflammationibus ac fistulis conuenit. Asininum autem tradunt cicatrices corpori concolores reddere. Porrò anserinus & gallinaceus muliebribus malis conueniũt, nec non etiam ad labiorum rimas, ad curandam faciei cutem, & contra aurium dolores. Vrsinus verò alopecijs capillos restituere creditur, ac pernionibus quoque subuenit. At vulpinus medetur auriũ doloribus. Fluuiatilium autem piscium adeps inunctis oculis claritatem affert, si quidem in sole liquatus mellique admistus fuerit. Viperinus verò cõtra oculorum hebetudines ac suffusiones etiam efficax est, additis cedriæ, mellis Attici & olei veteris æquis partibus. At pilos abolet alis euulsos, si recens ac per se ad radicũ vestigia illinatur.

De Medullis. Cap. XCV.

EX medullis laudatissima est ceruina: mox vitulina: post hác taurina, deinde caprina & ouilla. Colliguntur verò æstatis ea parte quæ autumno proxima est: alijs enim anni temporibus sanguinis concrementum, & veluti caro friabilis in ossibus reperitur: sed neque facilè dignoscitur, nisi ab eo qui ipsam ossibus extraxerit atque reposuerit. Omnes porrò medullæ molliunt, rarefaciunt, ad apotherapiam valent, & vlcera explent. Ceruina verò peruncta, venenatas quoque bestias fugat. Curatur autem recens selectis ossibus adipis in modum: nam & affusa aqua primùm subigitur, deinde per linteũ excolatur, ac similiter eluitur, donec aqua pura con-

ſpiciatur. Poſtmodũ in duplici vaſe liquatur excepta ſorde penna, ſi qua innatet, & in pilam transfunditur: poſteaquam verò coierit, fæce quæ ſubſidet accuratè derasa, in fictili vaſe nouo reponitur. Quòd ſi libet incuratam recondere, eadem omnia facito, quæ de gallinaceo & anſerino adipe demonſtrauimus.

De omni fellis genere. Cap. XCVI.

FEL omne recóditur hoc modo: Acceptum recens, vbi os folliculi lino præligaueris, in aquam feruentem deponito, cãdiúque dimittito, dum quis trium ſtadiorum ſpatium conficeret: dein exemptum ſiccato loco vmbroſo ac minimè humecto. Sed quod ad oculorũ medicamenta placebit adijcere, lineo filo deligatũ in lagenulam vitream quæ mel habeat, immittito, & circa lagenulæ oſculũ obligato fili principio, operculum addito atque recondito. Omnia porrò fellis genera acria ſunt & excalfaciunt: maioris tamen minoríſve efficaciæ ratione inter ſeſe differunt. Siquidem præſtantioris effectus eſſe videntur fella marini ſcorpij, piſcis qui callionymus dicitur, marinæ teſtudinis & hyænæ: itémque perdicis, aquilæ, gallinæ candidæ, & capræ ſylueſtris: quod quidé priuatim confert ad incipientes ſuffuſiones, caligines, argema & genarum ſcabritias. Ouillo, hircino, ſuillo, atque etiam vrſino taurinum efficacius. Omnia verò aluum ad deiectioné inuitant, præſertim infantibus, ſi quis eo intinctum lanæ tomentum ſedi admoueat. Priuatim taurino anginoſi cum melle perunguntur, ac ſedis vlcera etiam perſanantur, & ad cicatricem vſque perducuntur. Medetur & purulentis auribus, earúmque fracturis cũ lacte caprino aut muliebri: earundem verò ſibilo, cum porri ſucco inſtillatum. Admiſcetur quoq; vulnerarijs emplaſtris & circumlitionibus quæ cõtra venenata parantur. Phagedænicis etiam vlceribus, ac pudendi ſcrotique doloribus ex melle prodeſt. Lepras etiamnum ac furfures cũ nitro aut terra Cimolia exterit

A πίνειν, ἐπὶ δὲ διπλώματι ἔριον, ἐπαναληφθείσης πέρᾳ τῆς ἐπιπεφυκυίας ῥιπίας, καὶ διυλισθεὶς εἰς ὑάλους, μετὰ τὰ παχύτατα ἀποθέσθαι τὸ ὑγρὸν ἀκλείῳ καινῷ, ἀπιξυσμένης ὀπτιμαλῶς τῆς ἐντοσάθμης. εἰ δ' ἀλεκτορίδιον ἀποθέσθαι βούλῃ, πίπτει πάντα, ὡς ὅτι τοῦ ὀρνιθείου καὶ χηνείου σίατος ἐπεδείξαμεν.

B Περὶ Χολῆς πάσης. Κεφ. ϛϚ'.

ΧΟΛΗ πᾶσα ἀποθλίβεται οὕτω· ὑγρὸν λαβὼν ἔριον προσφάτου, καὶ ἀποπλύνας τὸ σῶμα αὐτῆς λίνῳ, κρᾶσον εἰς ὕδωρ ζέον, ὅσον ἀπὸ χρόνου τοσοῦτον, ὅσον αὐτὸς ῥᾳδίως σταδίων δρόμον ἀνύσειεν εἶτα ἔξελὼν, V. ἀναλύσας.

C ξήραινε ἐν τόπῳ σκιερῷ καὶ αὐθέκτῳ. ἔπειτα εἰς τὰ ὀφθαλμικὰ λίνῳ ἀποδήσας, βάλε εἰς βυκίον ὑάλου ἔχον μέλι· καὶ τὸ ἄκρον τοῦ λίνου περιδήσας τῷ στόματι τοῦ βυκίου, πυκάσας ἀπόδου. εἰσὶ δὲ πᾶσαι αἱ χολαὶ δριμεῖαι, θερμαντικαὶ τὸ μᾶλλόν τε καὶ ἧττον κατὰ δύναμιν ἀπὸ ἀλλων ἀλλοφέρουσαι· δοκοῦσι δὲ ὅτι τι πάσχει ἡ, τι τοῦ θαλασσίου σκορπίου καὶ ἰχθύος τοῦ λεγομένου καλλιωνύμου, χαλκοῦς τε θαλασσίας καὶ ὑαίνης· ἔτι δὲ πέρδικος καὶ ἀετοῦ, καὶ ἀλεκτορίδος λευκῆς, καὶ αἰγὸς ἀγρίας· ἰδίως ἁρμόζουσι πρὸς ὑπογυμώσεις καὶ ἀχλύς, ἄργεμά τε καὶ τραχήλους. τῆς δὲ ταύρου καὶ τοῦ τράγου καὶ τῆς συὸς, ἔτι δὲ ἄρκτου ἐμπεφυκυίας τῇ ὄψει ἡ ταυρεία πᾶσαι δὲ προσφυμίαι πρὸς ἀφροχάρπασιν ἐργάζονται, καὶ μᾶλλον παιδίων, εἴ τις κροκίδα βάψας περιθείη τῷ δακτύλῳ. ἡ δὲ ταυρεία ἰδίως ὅτι συναγωγικὴν ἀφροχάρπασιν σὺν μέλιτι· ἀποθεραπεύει τε τὰ ὠὰ δακτύλῳ μίγεις οὐλάς. πυορροοῦντά τε ὦτα, καὶ ὅσα ἐστ' αὐτῶν ῥήξεις σὺν χαλκάνθῃ αἰγείῳ ἢ γυναικείῳ ὀξυζομένῃ· πρὸς δὲ συρίγμους, σὺν πρασίου χυλῷ· εἴς τε τὰς τραυματικὰς ἐμπλάστρους μιγνυμένη, καὶ θηριακὰς περιεχούσας· καὶ πρὸς φαγεδαινικὰ ἕλκη καὶ ὀδυνώσας αἰδοίου καὶ ὀσχέου, σὺν μέλιτι· πρὸς δὲ λέπρας καὶ πίτυρα, σὺν νίτρῳ ἢ γῇ Κιμωλίᾳ σμῆγμα

Ald. κρυσταλλ. V. κρυσταλλικὰ.

Lacuna addiderit in ver. cod. ἀφροχάρπασιν

κεφάτιον. καὶ ἡ προβατεία δὲ πρὸς αὐτὰ καὶ ἡ ἀρχεία, ἐὰν διέτρηται δὲ τυγχάνοιεν. ἐκλελιχμένη δὲ ἡ ἀρχεία ὀπιλιπαθικοὺς ὠφελεῖ. ἡ δὲ τῆς χελώνης πρὸς συνάγχας καὶ τοὺς ὀπὶ τῶν παίδων νομὰς ἐν τόμαι. ἐστὶ δὲ ὀπιλιπαθικῆς ἐστὶ δὲ ἴσα ταῖς ῥισὶν· αἱμὸς δὲ ἀγρίας ἰδίως νυκτάλωπας θεραπεύει ἐγχριόμενος. καὶ ἡ τοῦ τράγου δὲ ὃ αὐτὸ ποιεῖ, θύμιά τε αἴρει, καὶ τοὺς ὀπὶ τῶν βλεφάρων ἐξεφυλιδωμένους ἐπαφρίδας καὶ τοὺς χειρομένους καταφέλλει. ἡ δὲ ὕεια πρὸς τὰ ἐν ὠσὶν ἕλκη καὶ πρὸς τὰ λοιπὰ πάντα ὠφελίμως παραλαμβάνεται.

A potentissimè. Ouillum & vrsinum contra eadem pollent, sed inefficaciora sunt: ac vrsinum quidem eclegmate seu linctu comitiales adiuuat. At verò fel testudinis valet ad anginas & in ore infantiũ nomas: idem naribus inditum comitialibus prodest. Syluestris capræ felle perunctо peculiariter luscioſi sanãtur. Hircinum idem præstat, thymiáquè abolet, & luxuriantes elephanticorum extuberationes illitu reprimit. Suillum autem contra aurium vlcera cæteráque omnia vtiliter assumitur.

Περὶ Αἱμάτων. Κεφ. ϛζ'.

De sanguinis variis generibus. Cap. XCVII.

Quidam vtuntur hoc. ἄμα ἐδίν ψυχοι ὅτι. χρῆ ται ἐείφω &c.

Αἷμα χήνὸς καὶ ἐείφου καὶ νήσσης αὐτοδότοις χρησίμως μίγνυται. φάσσης δὲ καὶ πυγάργου καὶ τετραόνος καὶ καπριδίκης, εἰς προσφάτους ὀφθαλμῶν ῥώσεις καὶ ὑποσφράσεις αἵματος ἢ νυκτάλωπας ἐξαιρεῖται· ἰδίως δὲ τὸ τῆς τετραόνος, αἱμορραγίας τε ἐν μυκτῆρσιν ἐπέχει. τὸ δὲ τῆς τράγου ἢ αἰγὸς καὶ ἐλάφου ἢ λαγωοῦ, ὑπὸ τραύματος λαμβανόμενοι, δυσεντερίας καὶ κοιλιακὰς ῥύσεις ἐφίστησι· μετ' οἴνου δὲ πολὺ πρὸς τοξικὰ ποιεῖ. τὸ δὲ τῶν λαγωῶν θερμὸν καταχριόμενον, ἐφηλίδας καὶ φακοὺς θεραπεύει. καὶ τὸ ἀπὸ τῶν κυνῶν δὲ πολύ, λυσσοδήκτοις καὶ τοξικὸν πεπωκόσιν αἴρει. τὸ δὲ τῆς χερσαίας χελώνης πολύ, ὀπιλιπαθικοῖς ἰσορρεῖται ἁρμόζειν. θαλασσίας δὲ χελώνης σὺν οἴνῳ καὶ πιτύᾳ λαγωοῦ καὶ κυμίνῳ πινόμενον, ἁρμόζει πρὸς θηριοδήγματα καὶ φρυνίου πόσιν. ταύρου δὲ αἷμα διαφορεῖ καὶ μαλάσσει σκληρίας καταπλασσόμενον μετὰ ἀλφίτων. τὸ δὲ τῶν ὀχευτῶν ἵππων, σηπεδόνας μίγνυται. τὸ δὲ τοῦ χαμαιλέοντος, πέλας ὑλεως ὀπὶ τῶν βλεφάρων πεπίεσται· καὶ τὸ τῶν χλωρῶν βατράχων ὁμοίως. γυναικὸς δὲ τὸ ὀπιμήνιον περιαλφόμενον καὶ ἐπορβαινόμενον, ἀσυλλήπτους δοκεῖ ποιεῖν γυναῖκας· ποδαγρικὰς δὲ ὀδύνας καὶ ἐρυσιπέλατα καυφίζει καταχριόμενον.

B Sanguis anseris, anatis & hœdi vtiliter in antidota miscetur. Palumbi autem, turturis, columbæ ac perdicis, recentibus oculorũ vulneribus, ijsdem fugillatis seu sanguine suffusis, ac luscioſis illinitur. Peculiariter verò columbæ sanguis erumpẽtem è meningibus sanguinem inhibet. Hirci autem, capræ, cerui & leporis sanguis inflatus fartagine & assumptus, dysenterias & cœliacorum profluuia sistit. In vino verò potus contra toxica efficax est. Leporinus calens adhuc illitus, faciei maculas à Solis ardore contractas & lentigines emendat. Caninus commodè propinatur à cane rabioso demorsis, iisque qui toxicum hauserint. Testudinis terrestris epotum sanguinem tradunt prodesse comitialibus. Marinæ autem testudinis cum vino, leporis coagulo & cumino potus, contra venenatarum bestiarum morsus & hausta rubetæ venena conuenit.

F Taurinus cum polenta impositus, duritias discutit, emollítque. At equorum admissariorum sanguis in septica seu erodentia pharmaca additur. Chamæleonis autem, timilitérque viridium ranarum sanguine palpebrarũ pilos aboleri creditum est. Menstruus verò fœminæ sanguis existimatur circumlitu præstare ne concipiant mulieres, itémque si eum ipſæ supergrediantur. Cæterum leuat illitus podagræ dolores, & erysipelata.

De simo. Cap. XCVIII.

ARMENTALIS bouis fimus, si recens admoueatur, inflammationes ex vulneribus lenit: foliis autem inuoluitur, & cinere feruenti calefit, atque ita imponitur. Simili quoque modo applicitus vice fotus, coxédicis cruciatus compescit. Ex aceto verò illitus, duritias, strumas & panos discutit. Priuatim verò bouis masculi fimus prolapsum vterum suffitu restituit: accéti quoque nidore culices abiguntur. Caprarum, præsertimque in montibus degentium, baccæ ex vino bibitæ regium morbum emendant: cum aromatibus verò porę, menses ciúr, & partus euocant. Siccæ tritæque & cum thure in vellere appositæ, fluxum muliebrem cohibent, aliásque sanguinis eruptiones ex aceto compescunt. Vstæ & cum aceto aut oxymelite illitæ, alopecijs medentur. Cum axungia verò adhibitæ, podagricis sunt auxilio. In aceto aut vino decoctę, serpentium morsibus, herpetibus, erysipelatis & parotidibus imponuntur. Quin & ischiadicis vstio earum ope administratur vtiliter hunc in modum: In eo cauo quod est inter pollicem & indicē, qua parte pollex carpo committitur, lana oleo imbuta priùs substernitur, ac deinde singulatim imponuntur fimi caprini feruentes pilulæ, donec sensus per brachium ad coxendicem perueniat, dolorémque mitiget: atque adustio eiusmodi, Arabica appellatur. At verò stercus ouillum ex aceto impositum sanat epinyctidas, clauos, thymos & pensiles verrucas: itémque ambusta igni cerato rosaceo exceptum. Aprugnum autem aridum in aqua aut vino potum, sanguinis reiectionem sistit, ac diuturnum sedat lateris dolorem: sed ad rupta & conuulsa ex aceto bibitur, luxatis verò exceptum cerato rosaceo medetur. Porrò tam asinorum quàm equorum fimum, siue crudum, siue crematum addito aceto sanguinis eruptiones cohibet. Armentinorum verò qui herba pascuntur siccum fimum, insuccatum vino, mox bibitum, à scorpione ictis magnoperè auxiliatur.

A Περὶ κοπράτου. Κεφ. ϙθ'.

ΑΠοπατος βοὸς νομάδος τετράφαλος ὀπτηθεὶς, φλεγμονὰς τοῖς ἐκ τραυμάτων τραύμ. ἐπιλήσσει· ὁ φύλλοις καὶ θερμαῖς ὀπτηθεὶς ὀπτὴ θερμασπιδιᾶ, καὶ ἕλκεσι ὀπτηθείς. ἡ ἰχνάδος ὁ πυρία τραυματικὴ ἡ τοιαύτη ὀπτήσεις σὺν ὄξει ὁ καταπλασθεῖσα, σκληρίας καὶ χειράδας ἀφαλύει καὶ φύμαθλα. ἰδίως ὁ ἄρρενος βοὸς βόλβιτον, ὑστέραν προπεπωκυῖαν ὑποθυμιώμενον ἀποκαθίστησι· διὸ καὶ ὁ κώνωπας θυμιᾷ. αἰγῶν ὁ σύραθοι μάλιστα ἑφθοὶ πινόμενοι σὺν οἴνῳ, ἴκτερον ἀποκαθαίρουσι· σὺν ἀρώματι δὲ πεπτοῦσι ἔμμηνα κινοῦσι, καὶ ἔμβρυα ἐκβάλλουσι· ξηραὶ δὲ λεῖαι σὺν λιβανωτῷ προσπτηῖσαι ἐν ἱερίῳ, γυναῖκα ῥᾳδίως ἐπίσχουσι, καὶ τὰς δυσὶ αἱμορραγίας σὺν ὄξει ἐπιλύουσι· καυσαι δὲ, ἀμφιπυρίας διαπυήσουσι, μετ' ὄξους ἢ ὀξυμέλιτος καταχριόμεναι· σὺν ὀξυγγίῳ δὲ καταπλασσόμεναι, ποδαγρικοῖς ὠφελοῦσιν. ἐφθηῖσαι ὁ μετ' ὄξους ἢ αὖος, ὀπτηθεῖσαι πρὸς ἑρπητῶν δήγματα καὶ ἕρπητας, καὶ ἐρυσιπέλατα, καὶ παρωτίδας. καὶ ὀπτὴ ἰσχιαδικῶν ὁ ἡ δι' αὐτῶν καῦσις ὠφελίμως παραλαμβάνεται ἔστιν ὃν τρόπον· ὀπτὴ τὸ μεταξὺ μέρος τοῦ αἰτήχρου, συνεχίζον ὁ δὲ καρπῷ κεῖται, προϋποκλίνειον ἐλαίῳ βεβρεγμένον, ὀπτὴ καταμίμου πρόβατον πιείσῃ, ἄχρις αὖ ἡ αἴσθησις ἅμα τοῦ βραχίονος ὀπτὴ ὃ ἰσχίον ἔλθῃ καὶ παύῃ. καλεῖται δὲ ἡ τοιαύτη καῦσις Ἀραβική. ἡ τραχήλων δὲ ἀφοδὸς σὺν ὄξει καταπλασθεῖσα, ὀπτυγκλίδας, ἥλους, θύμους, ἀκροχορδόνας ἰᾶται· πυρίκαυσα δὲ χηραῖτῃ ῥοδίνῃ λῆθλεῖσα. οὖς ὁ ἀγρίου ξηρὰ μὴ ὕδατος ἢ οἴνῳ πωθεῖσα, αἵματος αἰσαγγίῳ ἴσχει, καὶ χρόνιον ἄγημα πλευρᾶς τραύμ. ῥήγματα ὁ ᾗ ἀποσμήχει μεθ' ὄξους κινεῖ τρέμματα δὲ ἀναπλάσσει αἰσαλοφθεῖσα χηραῖτῃ ῥοδίνῃ. ὄνειον δὲ καὶ ἡ τῶν ἵππων, αἱμορραγίας ἴσχει, ὠμή τε ἐπὶ κακωμένῃ ὄξει μιγεῖσα· ἡ δὲ τῶν ἐξ ἀγέλης ὄνων πεφάγου, ξηρὰ χυλισθεῖσα ἐν οἴνῳ καὶ πωθεῖσα σκορπιοπλήκτοις σφόδρα βοηθεῖ.

Lorma legit, στόμωσι

V. infra de ὄνῳ

σεσιτραῖς ἢ ἀλφιτολικωτέρα καὶ κνισ-
κωτέρα, χρήσιμος ἐμπλασθεὶς μετὰ μελιτος
σὺν ὄξει δι' ὅλου, χοιράδας διαφορεῖ. αἴθρα-
κάς τε καὶ ἐρυσίπελας σὺν μέλιτι καὶ λινοσπέρ-
μῳ, καὶ ἐλαίῳ λεῖα ποιεῖ. πυρίκαυσά τε
ἀμβροδιᾷ. καὶ ἡ τῶν ἀλεκτορίδων δὲ
τοῦτο ποιεῖ, ἀσθενέστερον μέντοι· πλὴν
ἰδίως πρὸς μύκητας θανασίμους καὶ
κώλου ἀλγήματα ἁρμόζει, μετ' ὄξους
ἢ οἴνου πινομένη. πελαργοῦ δὲ, σὺν ὕ-
δατι πεθεῖσα ὑπτιληπτικοῖς ἁρμόζειν
πιστεύεται. γυπὸς δὲ τὸ θυμιαθεῖσα, ἔμ-
βρυα ἐκβιάσειν προσδιδόται. μυὸς,
λεῖα σὺν ὄξει ἀλωπεκίας καταχριομένη
θεραπεύει· σὺν λιβανωτῷ δὲ καὶ οἰνο-
μέλιτι πινομένη, λίθους ἐκκρίνει· πρὸς-
πλάσματα δὲ παιδίοις τὰ μυόγδαλα, χι-
λίασι πρὸς ἔκκρισιν ἐρεθίζει. κυνὸς δὲ ἡ
ἐν τοῖς * κυνοκαύμασι ληφθεῖσα, ξηρὰ
πινομένη μεθ' ὕδατος ἢ οἴνου, χιλίᾳ ἐ-
φίστησιν. ἡ δὲ τῶν αἰθιόπων πρόσφατος
καταπλασθεῖσα, ἀφλέγμαντα μετὰ τῶν
προσκολλᾶν φυλάττει τὰ τραύματα·
ξηρὰ δὲ μετὰ μέλιτος διαχριομένη, ἐ-
πὶ συναγχικῶν βοηθεῖν προσδίδοται.
ἡ δὲ τοῦ χερσαίου χροκοδείλου, διαμέ-
ζει ὅτι τῶν γυναικῶν, πρὸς εὐχροιαν
καὶ σίλβωσιν * τοῦ προσώπου. καλλίστη
δὲ ὅτι ἡ * λεπτοπάτη καὶ εὐθρυβής,
κύφη τε ὥσπερ ἄμυλον, ταχέως τε χω-
λευομένη ὑπὸ ὑγροῦ· διαστειβεῖσά τε
* ὕποξις καὶ ζυμίζουσα τὴν ὀσμήν. δο-
λίζοισι δὲ αὐτὴν, φάσεις ὁρύζῃ τρέ-
φοντες, καὶ τὴν ἄφοδον ὁμοίαν οὖσαν
πωλοῦσιν. ④ δὲ, ἄμυλον ἢ κυνο-
λίαι φυράσαντες, καὶ * χροίζοντες ἀγχόνῃ
δι' ἀραιοῦ κοσκίνου, εἰς ὀλίγον ἀπηδοῦσι· τὸ
ξηρανθὲν ὡς σκωλήκια πωλοῦσιν αὐτὰ
τοῦτο.*

Columbinum; quoniam vehementiùs & excalfacit & vrit, hordeaceæ farinæ vtiliter admiſcetur, & ex aceto quidem, ſtrumas diſcutit: carbunculos verò emarginat cum mel le, lini ſemine & oleo tritum: necnon etiam ambuſtis igni medetur. Gallinaceum hæc eadem, ſed ineficaciùs præſtat. Priuatim tamen contra lethales fungos & coli cruciatus confert, ſi ex aceto aut vino bibatur. Ciconiæ verò fimum ex aqua potum, comitialibus prodeſſe creditur. At vulterinú ſuffumigatú, partum excutere traditur. Murinú autem tritum cum aceto & illitum alopecijs medetur: cum thure verò & mulſo potum, calculos expellit. Sed & ſubditæ infantibus muſcerdæ aluum ad deiectionem ſtimulant.] Caninum ſtercus, quod per caniculæ ardores exceptum fuerit, aridum cum vino aut aqua potum, aluum cohibet. At humanum recens impoſitú, vulnera ab inflammatione vindicat, ſimul & agglutinat. Siccum verò cum melle perunctum; anginoſis auxiliari traditur. Terreſtris autem crocodili fimum mulieribus confert ad colorandam illuſtrandámque faciem. Optimum verò quod candidiſſimum & friabile, amyli modo leue, in humore ſtatim eliqueſcēs, quódque cum teritur ſubacidum eſt, fermentúmque redolet. Sunt qui id vēdant adulteratum fimo non diſſimili ſturnorum, quos oryza paſcunt. Alij amylum aut cimoliam ſubigunt, & inducto paululum anchuſæ colore per rarius cribrum in tabulas exprimunt, mox illud qualecunque eſt vermiculorum ſpecie ſiccatú pro terreſtris crocodili ſtercore vendunt. [Cæterùm humanum ſtercus ſiccú cum melle ſubactum, & gutturi impoſitum, quemadmodum & caninum, anginoſis opitulari inter arcana reperimus.]

V. κύσιν πυρός.

Sic Gonp. Vulg. ἐκ τῆς ὀφρύος

Pl. cum toto toto de- ſunt ſermonis ſpecies.

V. χοίζοντες ἐν ὀλίγῳ ὕδατι ἀγχόνῃ δι' ἀραιοῦ κοσκίνου

Περὶ οὔρων. Κεφ. ϟθ'.

De vrinis. Cap. XCIX.

ΟΥΡΟΝ ἀνθρώπου ὃ ἴδιον ποθὲν πρὸς ἐχίδνης δήγματα ἁρμόζει, καὶ πρὸς θανάσιμα καὶ ἀχρόμιους ὕδρωπας, καὶ πρὸς * δῆξιν τῶν θαλασσίων ἐχιδνῶν, καὶ σκορπίου θαλασσίου, καὶ δράκοντος, ἐπιτηρούμενον. ὃ δὲ κυνὸς,

HVMANAM vrinam ſuam cuique bibere prodeſt contra viperæ morſus & lethalia pharmaca, incipientémque hydropem. Marinorum verò echinorum, ac ſcorpionis itidé marini, draconiſque ictus conuenienter ea foueantur. Canina

rabidi

rabidi canis morſibus perfundendis idonea eſt: lepras quoque & prurítus nitro addito exterit. Sed vetus achoras, furfures, pſoras & feruidas eruptiones potentiùs extergit: quin & nomas, etiam genitalium, cohibet. Purulentis quoque auribus infuſa, pus earum ſupprimit: ſed & in maſticorio decocta vermiculos earũ abigit. At impubis pueri abſorpta vrina, orthopnoicis confert: decocta verò in æreo vaſe cum melle cicatrices, argema & caligines emendat. Quinetiam ex ea & ære Cyprio paratur gluten auro ferruminando idoneum. Quod autem in vrina ſubſidit, eryſipelata illitu mitigat. Feruefactum cum cyprino & appoſitum, vteri dolorem demulcet, vuluæ ſtrangulatione vexatas leuat, genas deterget, & oculorum cicatrices expurgat. Taurinum lotium cũ myrrha tritum & inſtillatum, dolores aurium lenit. Aprinum iiſdem viribus prędituin eſt: ſed peculiariter veſicę calculos potu cõminuit & expellit. Caprinum traditur ad aquã quę cutẽ ſubiit cum ſpica nardi & aquę binis cyathis quotidie bibitum vrinas & aluum ducere: inſtillatum verò, aurium mederi doloribus. Cęterùm nephriticos ferunt aſinino ſanari.

manulas.

De Lyncurio. Cap. C.

Lyncis vrinã, quã Lyncurium appellãt, ſimulatq; meiſtur lapideſcere fruſtrà creditum eſt: quare vana quoque eſt & inutilis quæ de eo fertur hiſtoria. Eſt enim quod à nõnullis vocatur ſuccinum pterygophorõ, ideò dictum quòd pennas ad ſe alliciat. Id potum ex aqua ſtomacho aluoq; fluxione laborãti conuenit.

De Melle. Cap. CI.

PRINCIPEM locum obtinet mel Atticum, quod ab Atticæ regionis monte Hymetto, in quo prouenit, Hymettium appellatur: mox quod è Cycladibus inſulis petitur: itémque quod è Sicilia, cognomine Hybłæum. Magis probatur dulcius & acre, odoratius, ſubflauum, minimè liquidum, ſed glutinoſum ac firmum, quódque dum trahitur [ob ſequacem lentitiam] in digitos veluti reſilit. Porrò abſtergendi vim habet, ora vaſorum aperit,

tenace.

Α ἐπόμπλημα κυνοδηκτοῖς· ἡ πρὸς λέπρας καὶ κνησμὸς σμῆγμα σὺν νίτρῳ. Τὸ παλαιὸν σκληρύνει τὰ χώρων, πιτύρων, ψώρας, καὶ ζεσμάτων· νομάς τε ἐπέχει, καὶ ἕλκη ἀηδίους, ἐγκλυζόμενον καὶ ὑπὸ πυρρόοδον στηθῶν· ἐκ δὲ καλλῆ δὲ καὶ τοῦ ἐκ αὐτῆς σκώληκας, ἐφύδωρ ἐκ σιδίοις ῥόας. Τὸ δὲ

Β ἀφόρου παιδὸς καταῤῥοφούμενον, ὀρθοπνοίαις ἁρμόζει· ἐψηθὲν δὲ ἐν χαλκῷ σὺν μέλιτι, οὐλὰς καὶ ἄρθεμα καὶ ἀχλὺς ἀποσμήχει· καθαιρεθάζει δὲ καὶ αὐγὰς καὶ τὰ Κυπρίῳ χαλκῷ ἁρμόζουσα ὅτι τὴν χρυσίου κόλλαν. Ἡ δὲ ὑποσταθμὴ τοῦ οὔρου καθαιρεθῆσα, ἐρυσιπελατώδη παυεῖ· ἀιάζεσθῆσα

C δὲ σὺν κυπρίνῳ καὶ προσθεῖσα, ὀδύνας ὑστέρας παύει, ὑστερικὰς πνιγμονὰς κουφίζει, ἕλκεα τε ἀποσμήχει καὶ οὐλὰς ἐν ὀφθαλμοῖς ἀποκαθαίρει. Τὸ δὲ ταύρειον σὺν σμύρνῃ λειανθὲν καὶ ἐνασθὲν, ὠτολογίας παρηγορεῖ· καὶ τὸ συάγριον δὲ τὴν αὐτὴν ἔχει δυνάμεως. ἰδιαίτερον δέ τι

D ἐν κύστει λίθους θρύπτει καὶ ἐκκρίνει πινόμενον αἰγὸς δὲ, ὕδρωπα τε ὑπὸ ῥῆγα πινόμενον μετ' νάρδου κάχρος καθ' ἑκάστην ἡμέραν σὺν ὕδατι κυάθων πλέθρος β'. ἀγλὺν οὖρα κινεῖ· κοιλίαι, ἰᾶται δὲ καὶ ὠταλγίας ἐνασταζόμενον. ὄνου δὲ, παραδίδοται νεφριτικοὺς ὑγιάζειν.

Περὶ Λυγκουρίου. Κεφ. ρ'.

E Τὸ δὲ τοῦ λυγκὸς, ὃ δὴ λυγκούριον καλεῖται, ἀμφισβητεῖται λιθοῦσθαι πεπίστευται· διὸ καὶ μυθεύεται ἔχειν τὴν ἰσχύν. ἔστι δὲ τὸ καλούμενον ὑπ' αὐτῶν ἤλεκτρον πτερυγοφόρον. ὕδωρ πολὺν σὺν ὕδατι, στομάχου καὶ ῥεύματα ζεμένη χιλίοις ἁρμόζει.

Περὶ Μέλιτος. Κεφ. ρα'.

F ΜΕΛΙ πρωτεῖα τὸ Ἀττικὸν, ἀπὸ τοῦ ὄρους τοῦ Ὑμηττίου καλούμενον, εἶτα τὸ ἀπὸ τῶν Κυκλάδων νήσων, καὶ τὸ ἀπὸ τῆς Σικελίας σιμβλίον καλούμενον. ἔστι δὲ δεκιμώτερον τὸ γλυκύτερον καὶ δριμύ, διαυδίστερον, ὑποξανθὸν, οὐχ ὑγρὸν, ἕλκυμον δὲ καὶ ὕπνον, καὶ ὁ τῶν ἑλκυσθείσῃ ἀναπέχον ὡς ὅτι ἂν δάκτυλον. Δυνάμιν δὲ ἔχει σμηκτικὴν, αἰασμητικὸν,

ὑγρὰν τραχηλικήν. ὄθεν ἁρμόζῃ ἕλκεσι ῥυπῶδεσι καὶ κύλπους ἐγκλυζόμενον. ἐφθὸν ὃ καὶ ὀπτηθὲν, πυρικαυμὰ τὰ ἀφεστῶτα σώματα, λέχηνάς τε θεραπεύῃ ἐπιτιθέμενον μετ' ὀπὸς ὑσσώπου ὑγρᾶς καὶ ἁλαζονιόμενον· ἥπερ καὶ τοὺς ἐν ὠσὶ καὶ ἀγκύλας σὺν ὄξει ῥοπαλοειδέσι λεπίσι ἐκτιλλομένους χλιαρὸν. καὶ φθεῖρας δὲ κόνδυλος φθείρῃ καλαζονιόμενον λεπτοῖς ὄρμοις τὰ τοὺς μὴ ἐκ τριχομᾶς ἀποκλείσῃ, μαλαττομένης δὲ πολλῷ μᾶλλον, μαλιστα ἀπὸ βαλανείου ἐφ' ἡμέρας λ'. ἀποσκοτοῖ δὲ καὶ τὰ ἐπισκοτοῦντα τῇ κόρῃ, καὶ πρὸς ὠρύγιον δὲ πρόσθεμα δὲ συναλγοῦντα ἀποχριόμενον καὶ ἀναλαριζόμενον θεραπεύει· καθ' ὃ καὶ ὕδρα, δὲ ἔνδον ἁρμόζῃ, δὲ ἔξω ὑπὸ ἔρπητῶν δηδηγόσι· καὶ πρὸς μύρμηκος πόσιν μετὰ ῥοδίνου θερμὸν λαμβανόμενον καὶ πρὸς μύκητας καὶ λυσσοδήκτους ἐκλιχμώμενον ἢ πινόμενον· ἔστι μέλοι δὲ ὠμὸν, φυσώδεις κοιλίας, δὲ βηχὸς ἐρεθιστικὸν, ὅταν ἀξηφρισμένῳ δεῖ χρῆσθαι, πρωΐθεν δὲ τὸ ἐαρινὸν, εἶναι δὲ θερινὸν δὲ χλιερινὸν παχύτερον ὂν χεῖρον, καὶ ἐξανθήσεις ποιοῦν.

Adde Marcellum ex quorundã exemplarium fide & ductu de morbis Alex. Mar. epitomes

V. παχύτερον χεῖρον καὶ ἐκπυρηνίζεσθαι ποιοῦν.

Πεϱὶ Μέλιτος ἐν Σαϱδωνίᾳ. Κεφ. ϱϚ'.

Τὸ δὲ ἐν Σαϱδωνίᾳ γινόμενον μέλι, πικϱὸν διὰ τὴν τῶν ἀψιθίων νομήν· ἁρμόζει δὲ πϱὸς ἐφηλίδας καὶ σπίλους τοὺς ἐν πϱοσώπῳ καλαζονιόν.

Trãs hæc sequẽtia capita in veteri codice cum superiore coniuncta sunt.

Πεϱὶ Μέλιτος Ποντικοῦ. Κεφ. ϱγ'.

Γίνεται δὲ καὶ ἐν Ηϱακλείᾳ τῇ Ποντικῇ καλά πινες καιϱοὺς διά τινων αὐτῶν ἰδιότητα μέλι· ὃ τοὺς φαλώσεις ἐξίστησι μετὰ ἐφιδϱώσεως. Συνδοῦσι δὲ πίσσομελι ἐαδίοσις καὶ ταϱίχεσι, καὶ οἰνόμελι πίνουσι, ὁσάκις αὖ ἐμέσωσι τὰ αὐτὰ πϱοσφεϱόμενοι. ἔστι δὲ ϑϱεπτὸν, δὲ πλαρμοὺς καὶ τὴν ὄσφϱησιν κινοῦν. θεϱαπεύει δὲ ἐφύλλιν, καὶ ἁλαζονιαθὲν μετὰ κόστου. μετὰ δὲ ὄξους, πελιώματα αἴϱει.

Πεϱὶ Σακχάϱεως Μέλιτος. Κεφ. ϱΝ'.

Καλεῖται δέ τις καὶ Σάκχαϱις εἶδος ὃν μέλιτος τὸ Ἰνδικὸν πϱοσγόνου καὶ τῇ εὐδαίμονι Ἀϱαβίᾳ, διειλημμένον ὅτι τῷ καλάμῳ, ὃ μοιον τῇ συτίσῃ ἁλὶ, καὶ ϑϱαυόμενον ὑπὸ τῶν ὀδόντων καθάϱσιν ἀγει· ἔστι δὲ

humores euocat: qua ratione in sordida vlcera sinúsque commodè infunditur. Decoctũ atque impositũ, disiunctas diuulsásve partes agglutinat: lichenibus quoque medetur, coctũ cũ liquido alumine & illitum. Itémque aurium sonitui & dolori cum sale fossili trito tepidum instillatur: pediculos ac lendes illitum enecat: verpis seu curtis gládem quę citra circunciſionẽ nudata sit in integrum restituit, si melle præputiũ à balneo potissimũ ad dies triginta emolliatur: depurgat quę pupillis tenebras offundunt: gutturis etiamnum ac tõsillarum inflammationibus & anginis medetur, seu illitum, seu etiá gargarizatum. Vrinas quoque ciet, tussique auxiliatur, & ius quos serpẽtes momorderint: itémque contra haustum meconium, si cũ rosaceo calidũ assumatur. Quin & cõtra fungorum maleficia & rabiosi canis morsus delinctũ potúmve proficit. Attamẽ crudum, aluum inflat & tussim irritat: qua de causa despumato vtendum est. Cæterùm primas tenet vernũ, deinde æstiuũ. Hybernum verò, quippe quod sit crassius, deterius censetur, papulisque cutem exasperat.

De Melle Sardoo. Cap. CII.

Quod in Sardinia gignitur mel, amarum est: quoniam apes inibi absinthio vescantur. Tum à Solis ardore contractis, tum & aliis faciei maculis conuenienter illinitur.

De Melle Pontico. Cap. CIII.

Heracleæ in Ponto quibusdã anni temporibus ex propria quorundam florum vi mel conflatur, quod quidẽ eos qui edêre de mentis statu dimouet, cũ sudoris copiosi profusione. Sed iuuantur, si rutã & salsamenta esitarint, mulsúmque ebiberint, eadémque toties resumpserint, quoties vomitione reiicientur. Acre autem est, & olfactu sternutamenta mouet. Cum costo illitum, maculas à sole contractas emendat, at cum sale, fugillata tollit.

De Sacchara. Cap. CIIII.

Est & quoddã mellis cõcreti genus, quod saccharum nominatur, quódque in India & fœlici Arabia in arundinibus reperitur, consistentia sali simile, ac dentibus etiam salis modo fragile. Est

illud aluo idoneum & ſtomacho vtile, ſi aqua dilutum bibatur: vexatę verò veſicæ renibúſque auxiliatur: quin & illitum ea diſcutit quæ pupillis tenebras offundunt.

De Cera. Cap. CV.

CERA optima eſt ſubfulua, ſubpinguis, odorata & halitum quadantenus melleũ referens, inſupérque pura & natione Põtica aut Cretica. Secundum locum obtinet exalbida & ſuapte natura pinguis. Cándida vero redditur hoc modo: In eo genere quæ cándidior putiórque fuerit cõciſá in ollá nouá trásfundito, & affuſa quanta ſatis ſit aqua marina ex alto petita coquito, inſperſo etiamnũ nitri momẽto. Cũq; iterũ tertióve efferbuerit, remota olla refrigerari ſinito. Tũ verò cerę paſtillũ eximito, deraſáq; ſorde ſi qua fortè adhæſit, alia addita aqua marina ſecundò coquito: cúmque cera denuo, vti demonſtratum eſt, inferbuerit, vas ab igne ſumnouẽto, ac nouę ollulę fundũ priùs frigida madefactum leniter in cerá demittito, paululũ duntaxat ſuſpẽſa manu intingẽs, vt ipſius q̃ minimum detrahatur, quò facilius per ſe cõcreſcat. Sublato fundo orbiculum primum auferto, iterumq; vaſis imum aqua refrigeratũ in cerá immittito, idéque tantiſper facito, dum cerá totá exceperis. Tandem filo lineo traiectos orbiculos ita ſuſpendito, vt ne inter ſe cõtingát, ac interdiu quidẽ ipſos aſſiduè ad ſolem irrorato, noctu verò Lunæ exponito, dum perfectè albeſcant. Quòd ſi cerá candidiſſimá fieri volueris, identidem eá recoquito: cętera verò omnia eodẽ modo peragito. Nec deſunt qui pro marina ex alto petita, in muria acerrima ſemel aut iterũ antedicto modo decoquunt: deinde laguncula tenui ac rotunda anſam habente eximũt, poſteà orbiculos ſuper dẽſa herba diſpoſitos inſolant, donec cándidiſſima euaſerit. Præcipiunt verò munus id vere obeundum, quando ſol remiſſa vehementia humidum rorem ſubminiſtrat, vt ne videlicet cera liqueſcat. Porrò vim habet cera omnis excalfaciendi, emolliendi, ac vlcera mediocriter explendi. Additur etiam in ſorbitiones dyſentericis: ac eius deglutita

Α βηχείλιον, βύσμαχον, διεξὴν ὕδατι καὶ πολυωφελῶς πύου κενεκαθάρτου ἢ νεφρῶν καθαίρει δ' καὶ τὰς χεῖρας ἐπισχιδῆ ἐπιζειόμενον.

Περὶ Κηροῦ. Κεφ. ρε'.

Β ΚΗΡΟΣ ἄριστος ἐστὶν ὁ ὑποπύρρος καὶ ὑπολίπαρος, ὑώδης τε καὶ ποσὶ μελιῶδη ἀποφορὰν ἔχων, ἔπειτ' ὁ καθαρὸς καὶ λιπὴς Πολιτικὸς ἢ Κρητικός. ὁ δὲ ἐκλευκος, τῇ φύσει δ' λιπαρὴς, δι' ὑπερβολὴν λευκαίνεται δ' χρόνῳ ὕστερον, καὶ ἀκρίσας αὐτῷ τὸ λευκὸν καὶ καθαρὸν, ἐμβαλὲ εἰς χύτραν καινὴν, καὶ ἐπιχέας θαλάσσης πελαγίας τὸ αὐτάρκες, ἑψεσόμενον πρόσεμπάσαι· ὅτι δ' αἰαζέσῃ δὶς ἢ τρὶς καθαιρῶν τὸν χύτραν καὶ ἑάσας ψυχθῆναι, αἴρει τὸ βορίσκον, C ἀποξύσας εἴ τις περὶ αὐτὸν ὑπάρχῃ ῥυπαρεία, ἔψει ἐκ δευτέρου δὶς θαλάσσιον ὕδωρ ἐπιδοὺς· αἰαζέσῃς δ' πάλιν τὸν κηρὸν ὡς δεδήλωται, ἀνελὼν τὸ ἀγγεῖον ἀπὸ τοῦ πυρὸς, καὶ λαβὼν κηνοῦ χηρίδιον τὸ πυθμένα, περιελίσσει ὕδατι ψυχρῷ, κάλως παρὰ τὸν κηρὸν, ἀκροθιγῶς ἐμβάπτων, πρὸς τὸ βάρος τι αὐτῷ ἀφέλκεσθαι, καὶ καθ' ἑαυτὸν πήγνυσθαι. ἀνελόμενος δ' τὸν πρῶτον κυκλίσκον ἀφαιρεῖ, καὶ ἐκ δευτέρου κάλως τὸν πυθμένα ψυχρῷ ὕδατι. καὶ τὸ αὐτὸ ποιῶν, ἕως ἂν ἅπαντα ἀναλάβῃς. λοιπὸν λίνῳ δίμιτῳ τοὺς κυκλίσκους διεξιὼν ἀπ' ἀλλήλων κρέμασον. ἡμέρας μὲν εἰς ἥλιον συνεχῶς ἐπιδουλίζων αὐτοὺς· νυκτὸς δ' ὑπὸ τὴν σελήνην τίθει, ἕως ἂν λευκὰ γένηται· εἰ δ' ἄγαν τις θέλει λευκοὺς ποιῆσαι, τοὺς μὲν λοιποὺς ὡσαύτως ἐνεργείτω, ἑψείτω δ' πλείονας χρόνους· πίνει δ' αὐτὴ πελαγίας θαλάσσης, ἐν ὀλίγῃ δριμυπάτῃ ἕψουσι προσρηθέντες δ' τὴν ἅπαξ ἢ δὶς εἶτα αἱρεσιώτῃ λαγηνίῳ λεπτῷ καὶ εὐφερεῖ, λαβὼν ἐν ἐκπώματι ἐμβαλὲ εἶτα κυκλίσκια ὀπὴ πόας πυκνῆς ἐπιθέντες ἡλιάζουσιν, ἕως ἂν λευκώτατοι γένηται. παραγινόμενοι δὲ ἔαρος ὅτι τάχιστα ἔρχεσθαι, ὅτι καὶ ὁ ἥλιος τῇ σφοδρότητι αἴρεται, καὶ νοτίδα παρέχει, πρὸς τὸ μὴ τήκεσθαι. Δύναμιν δ' ἔχει πᾶς κηρὸς θερμαντικὴν, μαλακτικὴν, πληρωτικήν τι μετρίως μέντοι· λέγεται δὲ ῥοφήμασιν ὅτι πρὸς δυσεντερικοὺς· καὶ ἀπὸ-

V. addit καὶ κατοχὴν fortè ἐν στόμαχον

V. κηρὸς ἰμὰς μάλιστα, sed ſchoſion eſt.

V. κλίνουσι.

λμος ὁ μεγέθη κεχρειάζα δίκα, οὐκ ἐᾶ τυρεῦσθαι διὰ τὴν πιθανότητα τοῦ γάλακτος.

Περὶ Προπόλεως. Κεφ. ρε'.

Προπόλει τῇ ξανθῇ καὶ διώδει καὶ κυρακιζούσῃ. μαλακήν τε ἐν τῷ ὑπορρίπτῳ, καὶ μαστίχης δίκην ἑλκομένην. ἔστι δὲ θερμαντικὴ ἄγαν καὶ διαπαστικὴ, καὶ σκληρῶν ἑλκυστική. αἴρει δὲ καὶ ὀγκοὺς παλαιοὺς ὑποθυμιωμένη. αὖρά τε καὶ λειχῆνας ἐπιπλασθεῖσα διαίρει. ἔστι δὲ καὶ περὶ τοῖς στόμασι τῶν σμιλείων φύσει κηρώδης.

Orib. σύγκειται.

Περὶ Πυρῶν. Κεφ. ρϛ'.

Πυροὶ πρὸς ὑγιείας χρῆσιν ἄριστοι, οἱ πρόσφατοι καὶ πλείους ἡδρηκότες τῇ χρόᾳ μηλίζουσιν· εἶτα μὴ πολὺν οἱ τελειωθέντες, λεπτομυῖοι δὲ ὑπό τινων σταφυλῖνοι· ὠμοὶ δὲ ὧν χρωθέντες, ἕλμινθας προκαλοῦνται. μασηθέντες δὲ καὶ καταπλασθέντες, ὠφελοῦσι κυνοδήκτους· ὁ δὲ ἐκ τῆς σμιδάλεως αὐτῶν γινόμενος ἄρτος, εὐπροφωτεύτατός ἐστι τῶν συγκομιστῶν. ὁ δὲ ἐκ τῶν σταφυλίνων ἀλεύρων, κουφότερος καὶ διαπαστικώτερος. τὸ δὲ ἐξ αὐτῶν ἄλευρον, σὺν ὑσσωπίνου χυλῷ καταπλασθὲν πρὸς ὑδρωπικοὺς ῥυσμοὺς, καὶ πρὸς ἐμπνευματώσεις ἐντέρων. σὺν ὀξυμέλιτι δὲ φακοειδῆ αἴρει. τὸ δὲ πίτυρον σὺν ὄξει δριμεῖ ἐφθὸν, λέπρας ἀφίστησι καταπλασσόμενον θερμὸν, καὶ πάσης φλεγμονῆς ἐν ἀρχῇ καταπλασμα σύμφορον. μετὰ δὲ πηγάνου ἀφεψήματος ἐφθὸν, μαστοὺς καταρρώγασι παυεῖ, καὶ ἐχιοδήκτοις ἁρμόζει, καὶ προφυομένοις· ἡ δὲ ἐκ τῶν ἀλεύρων ζύμη, θερμαντικὴ οὖσα καὶ ἐπισπαστικὴ, ἰδίως τὰ σκληρὰ τῶν ἕλκεων λεπύνει, καὶ τὰ σκίρρα φύματα, καὶ ὀδόντας σὺν ἁλσὶν ἐκπίπτειν ποιεῖ. αἱ δὲ τῶν στεμφύλων πυρῶν ἄλευρον, ἰσοβόλοις ἁρμόζει καταπλατόμενον ἐν ὄξει ἢ οἴνῳ· ἐφθὸν δὲ τρόπον κόλλης καὶ ἐκλελεγμένον, αἱμοπτοϊκοῖς ὠφελεῖ καὶ πρὸς ῥῆξας, καὶ ἀρτηρίας πρὸς χυσμοὺς, σὺν ἡδυόσμῳ καὶ κουμμύρῳ ἐφθὸν ποιεῖ· καὶ ἡ ἐξ αὐτῶν τῶν πυρῶν γύρις ἐφθεῖσα σὺν μελικράτῳ, ἢ ὑδρελαίῳ, πρὸς ἅλγη φλεγμονῆς. καὶ ὁ ἄρτος σὺν μελικράτῳ ἑφθὸς δὲ ὠμὸς καταπλασσόμενος, πᾶσαν φλεγμονὴν πραΰνει,

Vulg. exemplo. mutant.

Vetustus codex teste Lacuna habet χανθιώντας.

V. αἱμοπτοϊκοῖς

milij magnitudine grana decē lac in nutricibus in caseum cogi densarive prohibent.

De Propoli. Cap. CVI.

Propolis vsurpanda flaua, odorata, styracem referēs, in summa ariditate mollis, & mastiches modo ductilis. Vim autē obtinet vehemēter excalfaciendi, attrahēdi, & aculeos quoque corpori infixos extrahendi. Sed & in vetere tussi suffita auxiliatur, & lichenas impositā tollit. Cæterùm circa aluearium oscula reperitur, cerę natura similis.

De Tritico. Cap. CVII.

OPTIMA è tritici generibus ad secūdę valetudinis vsum habētur, quæ recentia & perfectè adulta colorē luteum referunt: hæc sequūtur trimestria, quæ nonnullis sitania nominantur. Itaque cruda illa in cibo sumpta teretes lūbricos gignūt: cōmanducata verò & impositā cōmorsis à rabioso cane auxiliantur. Confectus eorum similagine panis, pleniùs alit q̄ cibarius: qui verò fit è trimestrium farina, leuius alimentū præstat, facileq; in mēbra digeritur. Farina eorum cū hyoscyami succo cataplasmatis instar imponitur aduersus neruorū fluxiones & intestinorū inflationes: lentigines autē ex aceto mulso tollit. Furfures in acri aceto decocti & calētes adhibiti lepras remouent, suntq; contra omnē incipientē inflāmationem vtile & accōmodatū cataplasma. Cocti verò cum rutę decocto luxuriātes turgentéve māmas cōpescūt, & morsis à vipera, torminosisq; cōueniunt. Farinaceū fermentum, calfaciendi extrahēdiq; vi prędituin, priuatim callos in plantis pedū extenuat, & tum alia tubercula, tum etiā furūculos ex sale maturat atq; aperit. Porrò è sitanio tritico farina, cōtra venenatorum ictus ex aceto aut vino cōmode imponitur. In glutini verò modum decocta si delingatur, sanguinē reiicientibus opitulatur. Cōtra tussim & exasperatā arteriā cum mēta & butyro decocta efficax est. Ipsius autē tritici pollen si ex aqua mulsa aut hydrelæo decoquatur, omnem discutit inflāmationem. Sed & panis tum crudus, tum etiam coctus ex aqua mulsa impositus, inflammationem omnem demulcet:

quippe qui plurimùm emolliat & quadatenus refrigeret, maximè verò si herbis, succiue quibusdá ad id accõmodatis ammiſceatur. Vetus autem panis & aridus tũ per ſe, tum quibusdá admixtus, alui profluuia ſiſtit. Recens verò muria maceratus & impoſitus, lichenas inueteratos ſanat. At gluten quod è ſimilagine aut polline cõficitur ad glutinãdos libros, ſanguinẽ reijcientibus prodeſt, ſi liquidius ac tepidũ cochlearis menſura ſorbendũ exhibeatur.

De Hordeo. Cap. CVIII.

HORDEVM optimum eſt candidum & purum, ſed minùs quàm triticum alit: ptiſſana tamen ob cremorẽ quẽ inter coquẽdum reddit, plus aliméti præbet, quàm polenta ex eodẽ hordeo facta. Eſt autẽ illa efficax contra acrimonias atque arteriæ aſperitates & exulcerationes: ad quas itidẽ conuenit triticea ptiſſana, quæ quidẽ & plus alit & potẽtiùs vrinas mouet. Lactis verò vbertatẽ præſtat, ſi cum fœniculi ſemine decocta ſorbeatur. Vriná porrò ciet hordeum, abſterget, flatulẽtum eſt, ſtomacho aduerſatur, & œdemata cõcoquit ac maturat. At verò ipſius farina cũ ficubus & aqua mulſa decocta, œdemata & inflammationes diſcutit: quin & duritias concoquit cum pice, reſina & ſimo colũbino. Cũ meliloto verò & papaueris calycibus, ijs doloré eripit q ex latere dolẽt: aduerſus inteſtinorũ inflationes, cũ lini ſemine, fœnogręco & ruta imponitur. Strumas cũ pice liquida, cera, impubis pueri vrina & oleo ad cõcoctionẽ perducit: & cũ myrto aut vino, aut pyris ſylueſtrib⁹, aut rubo, aut malicorio alui profluuia ſiſtit: podagricis inflãmationibus cum cydonio malo aut acero prodeſt. Decocta in acri acero malagmatis in modum, quod ex eadem hydrelæo ſubacta conficitur, & calens appoſita, lepris medetur. Farinæ verò cremor ex aqua cum pice & oleo decoctus, puri mouendo accõmodatus eſt. Ille idẽ ex aceto elicitus ſi cum pice coquatur, cõtra fluxiones articulorum prodeſt. Cęterum hordeacea polenta cohibet aluum, inflammationẽ ſque mitigat.

De Zytho. Cap. CIX.

Ex hordeo zythum paratur, quod

A μαλαγματικώτερος ὑπάρχων, καὶ πρὸς ὑπο-
ψύχων, μιτρὶς πίσαις ἢ χυλοῖς ποιῶν. ὁ δὲ πα-
λαιὸς & ξηρὸς καθ' ἑαυτὸν & μιγεὶς ποιῶν,
ἴσχει χιλίαν ῥεῦσιν. ἄμμῳ δὲ βραχεῖ ὁ πρό-
σφατος καὶ ἁπλανεῖς, παλαιοὺς λθ-
χνῶσιν ἰάται. κόλλα δὲ ἡ γιγνομένη ἐκ τοῦ σε-
μιδάλεως ἀπὸ ζύμεως τοῦ τῶν βιβλίων
B κόλλησιν, ἁρμόζει ἐπὶ αἱμοπτοϊκοῖς ὑγρο-
τέρα καὶ χλιαρὰ καταρρόφειν, κο-
χλιαρίου πλήρης.

Lacuna addit aliquot dies in vulg. excep. desideratur.

Hæc verba ad caput usque calcem non leguntur in altero codice manuſcripto. Gon. p. Vulg. ex γίνεσθαι

Περὶ Κριθῆς. Κεφ. ρθ'.

KΡΙΘΗ δὲ ἀρίστη ἡ λευκὴ καὶ καθαρά, Vulg. ἀλευκοτάτη
ἀτροφωτέρα δὲ πυρῶ. τὸ μὲν τοι γινόμε-
νον ἐξ αὐτῆς ἀφέψημα ἥκιστα τροφιμώτέ-
C ρον, διὰ τὸ ἐν τῇ ἕψήσει χύλωσιν ποιεῖσθαι δὲ
πρὸς τοὺς δριμυτέρους καὶ τοὺς ἐκ περιτταίας
βαχύτητας & ἑλκώσεις, πρὸς ἃς καὶ ἡ πτυ-
είνη πλείστην ἁρμόζει, τροφιμωτέρα δὲ οὖ-
ρητικωτέρα εὖσα. καθαπτικὴ δὲ καὶ χολῆς
συνεφηθῆσα μαράθρου σπέρματι, καὶ ῥο-
φυλιδίῳ. ἔστι δὲ οὐρητική, σπερματική, φυσατώ-
D δης, κακοστόμαχος, συμπεπτικὴ οἰδημά- Vulg. ἐκτικὴ
των. διαφορεῖ δὲ ἄλφους αὐτῆς μετὰ σύ-
κων καὶ μελικράτου ἑφθεῖσα οἰδήματα καὶ Vulg. ἐπισκέψεως
φλεγμονὰς συμπίσσει δὲ καὶ σκληρίας
μετὰ πίσσης καὶ ῥητίνης καὶ ἀφίξεως κόπρου
συὸς μελιλώτῳ δὲ & κωδίαις αἰγωδυνίαν
παρέχει τοῖς πλευρικοῖς ἄλγεσι. κολλα πλά-
E στῳ δὲ καὶ πρὸς ἐμπυημαίνοντας ἕλκη,
μετὰ λινοσπέρμου καὶ τίλεως καὶ πηγάνου
μετὰ δὲ πίσσης ὑγρᾶς καὶ κηροῦ καὶ οἴνου
παλαιοῦ ἀφθόνου καὶ ἐλαίου, χειρῶδες
ἐκπλάσσει. σὺν μύρσίνῃ δὲ, ἢ οἴνῳ, ἢ ἀχράδι- Hæc omnia ait Lacuna in codice vetuſtiſſimo cum copula legi loco diſiunctiuæ particulæ. Mar. legunt καὶ
σιν, ἢ βάτῳ, ἢ σηδίοις, κοιλίας ῥεύματα ἵ-
στησι· σὺν κυδωνίῳ δὲ ἢ ὄξει, ποδαγρικὰς
F φλεγμονὰς ὠφελεῖ· ἑφθὴ δὲ μετὰ ὄξους
δριμέως ὅσον ξύσπονδον λύσις, καὶ θερμὸν
ἐπιπλάσμασι, λέπρας ὑγιάζει. χυλωθεὶς
δὲ ὕδατι σὺν ὕδατι, καὶ ἑφθεὶς σὺν
πίσσῃ καὶ ἐλαίῳ, πυοποιεῖ ὄντι· σὺν ὄξει δὲ
χυλωθεὶς καὶ ἑφθεὶς μετὰ πίσσης, πρὸς τὰ
τῶν ἄρθρων ῥεύματα ἁρμόζει. τὸ δὲ ἀπ'
αὐτῆς * ἄλφος χιλίας σαλπικὸν, καὶ
G φλεγμονὰς προσῳδυνικόν.

Περὶ Ζύθου. Κεφ. ρθ'.

Ζῦθος σκευάζεται ἐκ τῆς κριθῆς. ὅστι

δὲ διουρητικὸς, καὶ νεφρῶν καὶ κύστεως ἀπτικὸς, καὶ μάλιστα μελιτίτου καὶ κακοήθους πνευματικός τε καὶ ἡμικρανικὸς κακοχυμίαν, καὶ ἐλεφαντιάσεως ποιητικός. βέργης δὲ καὶ ὁ ἐλεφὰς γινόμενος βραχύβιος αὐτῷ.

Περὶ Κούρμεος. Κεφ. ρό'.

Καὶ ὃ καλούμενον ὑπὸ τινων κοῦρμι, σκευαζόμενον ὑπὸ σίκερα τῆς κριθῆς, ᾧ καὶ αὐτὶ οἴνου πόματι πολλάκις χρῶνται, κεφαλαγικός ἐστι καὶ κακόχυμον, καὶ τὴν ὕδρωπα βλαπτικόν. σκευάζεται δὲ καὶ πυρῶν τοιαῦτα πόματα ὡς ἐν τῇ πρὸς ἑσπέραν Ἰβηρίᾳ καὶ Βρεττανίᾳ.

Περὶ Ζέας. Κεφ. ρια'.

Ζέα διττή· ἡ μὲν γὰρ ἁπλῆ, ἡ δὲ δίκοκκος καλεῖται, ἐν δυσὶν ἐλύτροις ἕνα σπέρμα ἔχουσα συνεζευγμένον τὸ σπέρμα ἔστι δὲ εὐφυϊμωτέρα μᾶλλον κριθῆς, θύσιμος. ἀφορωτέρα δὲ πυρῶν ἀρτοποιικωτέρα.

Περὶ Κεγχρου. Κεφ. ριβ'.

Κρίμνον ἀδρότερόν ἐστι τῆς κατεργασίας ἕνεκα ἀλήθοντος γινόμενον ἐκ τῆς ζέας καὶ πυρῶν, ἧς δ' ὁ πολὺς γίνεται ἔστι δὲ ἰσχνὰς εὐφυὲς καὶ εὐκατέργαστον. φαλακρώτερον δὲ κοιλίας τὸ ἀπὸ τῆς ζέας μᾶλλον προφωλίσης.

Περὶ Ολύρας. Κεφ. ριγ'.

Καὶ ἡ ὄλυρα ὑπὸ τῶν αὐτῶν ἤθους ἐστὶ τῇ ζέᾳ, ἀσθενεστέρα δὲ κατὰ ποσὸν ἐκείνης· ἀρτοποιεῖται δὲ καὶ αὐτὴ. καὶ κρίμνον ἐξ αὐτῆς ὡσαύτως γίνεται.

Περὶ Ἀθήρας. Κεφ. ριδ'.

Gal. add. ἀπὸ τῆς ὀλύρας

Ἀθήρα ὑπὸ μὲν τῆς ὀλυρεσμένης εἰς ἔλαττον ζέας σκυβαλώδης ἐστὶ· δύσπεπτον ὡς πολὺ μᾶλλον ὑγρὸν, παιδίοις ἀρμόδιον. ποιεῖ δὲ καὶ εἰς τὰ κατάπλασματα.

Περὶ Τράγου. Κεφ. ριε'.

Τράγος τὴν μὲν ἰδέαν μικρῷ τι χονδρώδει ἔοικεν· ἀσθενέστερος δὲ τῆς ζέας, ὅσῳ πολὺ ἔχει τὸ ἀχυρῶδες. δύσπεπτος καὶ δυσκατέργαστός ἐστι, καὶ κοιλίας μαλακτικός.

Gal. μαλακτικὸς τυγχ.

Περὶ Βρώμου. Κεφ. ριϛ'.

Βρῶμος καλάμης ἐστὶ, πυροῖς ὅμοιος καὶ τοῖς φύλλοις, γένασι δὲ διαλλάσσει. καρπὸν δὲ ἔχει ἐπ' ἄκρῳ ὥσπερ ἀκρίδας δύο ὠλὰς, ἐν οἷς τὸ σπέρμα χρήσιμον εἰς

A quidem vrinas cit, renes ac neruos tētat, sed meningas potissimùm offendit: inflationem parit, vitiosúmque succū creat, & elephántiasin inducit. Ipso verò macerātū ebur obsequiosū & operi tractabile redditur.

De Curmi. Cap. CX.

Fit & ex hordeo potus, quē Curmi nominant, eóque sæpenumerò pro vino vtuntur. Verùm dolorē capitis infert, prauúmque succum gignit, ac neruos lædit. Parantur & similia potus genera ex tritico quēadmodum in Iberia Occidentali & Britannia.

De Zea. Cap. CXI.

Zea duorum est generum: vna quidem simplex est, altera à binis granis dicoccos appellatur, quæ quidem in geminis vtriculis semen coniunctum habet. Plus quàm hordeum alit, ori grata: in panificia verò digesta minùs quàm triticū alit.

De Crimno. Cap. CXII.

Crimnon crassior est quæ inter molēdum fit è zea triticoq; farina, ex qua quidem puls conficitur. Abundè alit & facilè conficitur, sed aluum vehementiùs astringit, si zea ex qua fit priùs tosta fuerit.

De Olyra. Cap. CXIII.

Eiusdem cū zea generis est & olyra, verū q̄ illa minùs aliquáto nutrit. Attamē in panes quoq; cogitur, ex eaq; similiter crimnō factitatur.

De Athera. Cap. CXIIII.

Athera ex zea tenuissimè molita paratur. Est autē sorbitio liquidę pulticulę instar, infātibus cōuenies. Est etiamnum & dolorē sedantibus, & pus mouentibus cataplasmatis efficax.

De Tragō. Cap. CXV.

Tragos formam quidem habet chondro simulem: sed multò minùs quam zea nutrit, quòd aceris multū habeat: quare ægrè quoque conficitur, aluúmque mollit.

De Auena. Cap. CXVI.

Avena tum culmo, tum etiá foliis triticum imitatur: sed geniculis distinguitur. In cacumine verò dependentes veluti paruulas locustas bipedes gerit, in quibus semen continetur, æquè vt hordeum

ad cataplasmata vtile. Quin & ex ipso puls conficitur, alui fistendæ vi prædita. Eius verò cremor tussientibus sorbitione prodest.

De Oryza. Cap. CXVII.

ORYZA frumentacei generis est, quæ palustribus & vliginosis locis nascitur. Mediocriter alit, aluúmque supprimit.

De Chondro. Cap. CXVIII.

CHONDRVS fit è zea quæ dicoccos appellatur: potentiùs verò quàm oryza & alit & aluum cohibet, sed stomacho longè vtilior. Decoctus in aceto illitúsque, lepras tollit, & vngues scabros pellit, ac incipientibus ægilopijs medetur. Eius decoctum dysentericis dolore vexatis infusum idoneum est.

De Milio. Cap. CXIX.

MILIVM frugibus cæteris minùs alit: in panes verò coactum aut pultis instar præparatum aluum sistit & yrinam cit. Tostum verò & in sacculos inditum, fotu torminibus aluíque doloribus est auxilio.

De Panico. Cap. CXX.

PANICVM, quod alij melinen appellant, è cerealibus est seminibus, milio simile: eodémque modo in ciborum vsum venit, & ad eadem quoquè valet: attamen milio & minùs nutrit, & minùs astringit.

De Sesamo. Cap. CXXI.

SESAMA stomacho nocet, & animæ grauitatem facit, si quando commanducata dentium commissuris inhæserit. Admota verò, nernorum crassitiem discutit, aurium fracturis & inflammationibus, ambustis item & coli doloribus ac cerastæ morsui medetur. Capitis autē dolores ex ardore contractos cum rosaceo lenit. Sed & herba in vino decocta eadem præstat, sed maximè oculorum inflamationibus doloribúsque prodest. Ex ipso quoque semine fit oleū, quo Ægyptij vtúntur.

De Lolio. Cap. CXXII.

LOLIVM, quod è Græcis plerique zeram, nónulli thyaron appellãt,

A κατα πλάσματα ζα, ὡς ἡ κριθή. καὶ πόλτος ὁ ἐξ αὐτῆς γινόμενος καλλιτικὸς κοιλίας. ὑπνῶδες ἐξ αὐτῆς χυλὸς ἐσθιόμενον ἀφίζει.

Περὶ Ὀρύζης. Κεφ. ριξ'.

ΟΡΥΖΑ τῆς σιτηρᾶς ἐστιν εἶδος. φυσικὴν ἐλάσιον πόσεως καὶ ὑγρᾶς. ἔφιμος ὁ μυτερὸς καὶ κοιλίας καλλιτικός.

B Περὶ Χόνδρου. Κεφ. ριη'.

Ο Δὲ χόνδρος γίνεται ἀφ' ὧν τῆς καλαμώδης διχόκκου ζέας. ἐσθιόμενος ὁ ὄρυζης, τ' γεννωτικώτερος κοιλίας. δύσπεπτος ἧττον μᾶλλον. αἵρει δὲ καὶ λέπρας σὺν ὄξει ἐφθεὶς ἐπαλαχρίεται, καὶ λεπρὰς ὄνυχας ἀφίησι. τὸ αἰγιλώπια ἀρχόμενα θεραπεύει. ἔγκλυσμά τε τὸ ἀφέψημα αὐτῆς τοῖς μετὰ δυσεντερικοῖς δύνασι. Orib. συναγωγ.

Περὶ Κέγχρου. Κεφ. ριθ'.

C ΚΕΓΧΡΟΣ ἀσφωτέρα τῶν λοιπῶν σιτηρῶν. ἀρτοποιηθεῖσα δὲ, ἧττον ὥσπερ πολτὸς σκληρὰ θρεῖσα κοιλίαν ἵστησι. θερμὴ δὲ χυλὸς φωνῆεσα δὲ καὶ ἁλισθεῖσα εἰς σκέλη κοιλ πνευμωδίαν, σφύξεων καὶ τῶν ἄλλων D ἀλγημάτων ἐστὶ βοήθημα. V σπέρμα αὐτοποιηθὲν ὁ σπόρος καὶ ἀνίστησι, θερμὸν ποιεῖ δυσεντερικοῖς ἀγιλώπια ἀρχόμενα θεραπεύει. ἔγκλυσμα τὸ σπέρμα πνευμωδίας σφύξεων καὶ τῶν ἄλλων ἀλγημάτων βοήθημα.

Περὶ Ἐλύμου. Κεφ. ρκ'.

ΕΛΥΜΟΣ, ὃν ὁ μελίνην, τῆς σιτηρᾶς ἐστὶ σπερμάτων, κέγχρῳ ὁμοίως αὐτὸς σιτοποιούμενος καὶ τοὺς ὃ αὐτὸ ἁρμόζουσα, ἀψοφώτερος μὲν ἐστὶ τῆς κέγχρου καὶ ἧττον συστολικός. E

Περὶ Σησάμου. Κεφ. ρκα'.

ΣΗΣΑΜΟΝ κακοστόμαχον, καὶ δυσωδίας στόματος ποιητικόν, ὁ πόσιν βιβρωσκόμενον ἐμμείνῃ μεταξὺ τῶν ὀδόντων καταπλασθὲν ὁ διαφορᾶ τὰς ἐν νόσοις παχύτητας, καὶ τὰ ἐν ὠσὶ φλεγμονὰς, ἔ φλεγμονὰς ὑ πυκάσας, ἔ κύλων ἀγγήματα, ὑ χειρὸς δῆγμα θεραπεύει. σὺν ῥοδίνῳ ὁ κεφαλῆς ἀγγήματα ἐξ ἑκάστου χυλοῦ μυδῆται. ἡ ὁ πᾶσα καταψηθεῖσα ἐν οἴνῳ, ὠφελεῖ αὐτὰ παραπλησίως. μάλιστα ὁ φλεγμοναῖς ὀφθαλμῶν καὶ πρὸς οἰδήμασιν ἁρμόζει. γίνεται ὁ καὶ ἔλαιον ἐξ αὐτοῦ, ᾧ ἡ Αἰγύπτιοι χρῶνται. G

Περὶ Αἴρας. Κεφ. ρκβ'.

ΑΙΡΑ, ἣν ὁ ὕαρεξ. αἵρα ἡ γινομένη ἐν τοῖς πυρίνοις ἀγεθεῖσα, δυνάμει

ἔχῃ τὰς ἑλκώσεις σηπτικὴν νομήν, καὶ σηπεδόνας, καὶ γαγγραίνης, μετὰ ῥαφανίδων καὶ ἁλῶν καταπλασσόμενον· καὶ λέπρας ἀγρίους καὶ λειχῆνας σὺν θείῳ ἀπύρῳ καὶ ὄξει θερμῷ πολλάκις σὺν κόπρῳ περιστερᾶς καὶ λινοσπέρμῳ ἐφοῦλιν· ἐκ οἴνου, χιονίδας ἀφανίζει, καὶ τὰ δύσπεπτα ῥήγνυσι. ἰσχιαδικούς τε σὺν μελικράτῳ ἐφθῇσα καὶ καταπλασσομένη ὠφελεῖ σὺν ὀξυκράτῳ ἢ σμύρνῃ, ἢ κρόκῳ, ἢ λιβανωτῷ· ἐπιθυμιωμένη, συνεργεῖ ταῖς συλλήψεσιν.

V. addit ἢ πολλάκις ἢ κυμίνῳ pro ὀξυκράτῳ

quódque inter triticeas segetes nascitur, molitum, nomas, putrescétia vlcera & gangrænam emarginandi vim habet, si cum raphanis & sale imponatur. Feros verò lichenas & lepras cum sulphure viuo & aceto sanat. At cum fimo columbino & lini semine decoctum in vino, strumas discutit: & quæ ægrè maturantur rumpit. Ischiadicis cum aqua mulsa decoctum & adhibitum prodest. Quod si cum polenta, myrrha, croco aut thure suffiatur, conceptiones adiuuat.

Περὶ Ἀμύλου. Κεφ. ρκγ΄.

De Amylo. Cap. CXXIII.

ΑΜΥΛΟΝ ὠνόμασται, ἀπὸ τοῦ χωρὶς μύλου καταβάζεσθαι. ἄριστον δέ ἐστι τὸ σταβαζόμενον ἐκ πυροῦ σιτηρίου, Κρητικοῦ ἢ ἢ Αἰγύπτιον. σταβάζεται δὲ ἐκ πυροῦ σιτηρίου καθαροῦ, βρεχομένου πεντάκις τῆς ἡμέρας, εἰ δυνατὸν ᾖ καὶ ἡ κυκλὸς ὅπως ᾖ μαλακὸς γλιχώδης), δεῖ τρανῶς τὸ ὕδωρ ἐκχεῖν χωρὶς τοῦ κυκλοῦ, ἵνα μὴ συνεκκλύζηται τὸ νοσῶδες. ἐπὶ τοῦ τοιούτου μαλακωτάτου γλιχώδους, ἀποχέας τὸ ὕδωρ πεῖθε τοῖς ποσὶν, εἶτα ὕδωρ ὀστρακίου ῥίψον· εἶτα αἰωρήσας τὸ ὑφισάμενον πίτυρον ῥηθῷ, καὶ τὸ λοιπὸν διηθήσαντας ἐμβαλεῖν εἰς ὀλιγίστην, διυλίσαντάς τε βύθιον ψυχῆναι ὅτι κεκαυμένοις ἐπὶ κεραμίδων ἐν ἡλίῳ ὀξυτάτῳ· ἔνιοι μὲν καὶ ἐπ' ὀλίγον μείνῃ, ὀξίζει· τοῖς δὲ τοῖς ὀφθαλμῶν ῥεύμασι καὶ κοιλότησι καὶ φλυκταίναις· χίλιοι δὲ ἐν αἵμασιν αἰαγωγαῖς πινόμενον, καὶ τοῖς ἐκ τῶν ὀρθοπνοϊκῶν· μίσγουσι δὲ καὶ χαλκανθῳ ἐς τραυματισμούς· σταβάζουσι δὲ καὶ ἐν ζεστοῖς βραχίοσιν ἐς πλυθείσης τοῖς μίαν ἢ δύο τέφραν ἢ ὑείαν, καὶ ταυτὸν ζωπυρίσαντες ἀφὶ ἑ χειρῶν καὶ ξηράναντες ἐν ὀξυτάτῳ ἡλίῳ, ὡς προείρηται· τὸ δὲ πτισθὲν ἄλευρον μόνον τοῖς ἰατρικὴν χρῶσιν, πρὸς ἃ τὰ λοιπὰ βύθιον.

A quódque inter triticeas segetes nascitur, molitum, nomas, putrescétia vlcera & gangrænam emarginandi vim habet, si cum raphanis & sale imponatur. Feros verò lichenas & lepras cum sulphure viuo & aceto sanat. At cum fimo columbino & lini semine decoctum in vino, strumas discutit: & quæ ægrè maturantur B rumpit. Ischiadicis cum aqua mulsa decoctum & adhibitum prodest. Quod si cum polenta, myrrha, croco aut thure suffiatur, conceptiones adiuuat.

De Amylo. Cap. CXXIII.

AMYLVM appellatum ab eo est, quòd sine mola fiat. Optimum quod è trimestri paratur tritico, natione Creticum aut Ægyptiacum. C Conficitur verò ex tritico eiusmodi puro quinquies die, ac si fieri potest, etiá nocte aqua perfuso: atque vbi emollitum fuerit, sensim aquá citra agitationem effundi oportet, vt ne simul vtilior succus excludatur. At vbi mollissimum euasisse cōstiterit, diffusa aqua pedibus calcari D oportet: deindéque infusa alia teri. Tádē innatātes furfures incerniculo tollendi: reliquú verò colo traiiciendū, moxq; vt excolatum fuerit, super tegulis nouis ardētissimo sub sole siccari densarique oportet. Náque si paulisper vdum máserit, acescit. Porrò contra oculorum fluxiones, E caua vlcera, & pustulas efficax est. Sanguinis etiánum reiectiones potu cohibet, & exasperatas fauces lenit: lacti quoque & obsonijs admiscetur. Paratur & amylum ex zea macerata elotáque ad vnum aut alterum dié, & massæ triticeæ in modum manibus subacta, tádemq; feruentissimo in sole, vti dictum est, F exiccata. Sed huiusmodi amylum ad vsum medicum ineptum est: ad reliqua verò idoneum.

praestantius.

Περὶ Τήλεως ἀλεύρου. Κεφ. ρκδ΄.

De Fœnigraci farina. Cap. CXXIIII.

ΤΗΛΙΣ, καὶ ὁ ἐκ τῆς τήλεως ἄλευρον, μαλακτικὴν καὶ διαχυτικὴν ἐχέτω δύναμιν· καταπλασσόμενον δὲ λῶον σὺν μελικράτῳ· ἐφθὸν, ποιεῖ τοὺς φλεγμονὰς τοὺς ἐντὸς καὶ ἐκτός. σὺν νίτρῳ δὲ καὶ ὄξει λῶον καταπλασθὲν, σκληρύνει μηροῦ.

V. addit ἢ κόκκου ἁμαξοῦ ἀλεύρου.

V. addit ἐφθὸν Vocem

Locum legitio v. ἐκτός

FOENVM GRÆCVM ipsiusq; farina molliendi ac dissipádi, discutiendive vim habent. Hæc tenuiter G contrita cum decocta aqua mulsa imposita, aduersus tam internas quam externas inflammationes efficax est. Cum nitro verò ex aceto trita & imposita, lienem extenuat.

Decoctum autem fœnigręci, fœminarum malis ex inflámatione præclusionéve vuluæ ortis infessu subuenit. Eiusdem in aqua decocti cremor expressus, capillos, furfures & achoras purgat. Cũ adipe verò anserino pessi vice subditur, ad emollĕdos dilatádosq; locos muliebres. Porrò viride cum aceto, imbecillibus exulceratisq; locis accõmodatum est. At ipsius decoctum prodest aduersus tenesmos, fœtidamq; dysentericorum proluuiem. Cæterùm quod ex eo exprimitur oleum, cum myrto capillos expurgat, & genitalium cicatrices exterit.

A τὸ δὲ ἀφέψημα αὐτῆς ἕλκη σῆπον εἰς τὰ γυναικεῖα, ὅσα καὶ τὰ φλεγμονὰς, ἢ μύσιν συνίστασθαι. σμήχει δὲ καὶ τείχας καὶ πίτυρα, καὶ ἀχώρας τὸ ἀπόβλημα αὐτῆς σὺν ὕδατι ἐψηθέν. σὺν στέατι δὲ χηνείῳ προσθὲν αἴτιον πταυσμοῦ, μαλάσσει δὲ αὐθρῦνον πως τοὺς τῇδε τιλυόμενον τόπους. χλωρὸν δὲ μετ' ὄξους, ἀποδοτὸν τόποις καὶ ἑλκωθεῖσιν ἁρμόζει. τὸ δὲ ἀφέψημα αὐτῆς, πρὸς τενεσμοὺς, καὶ δυσώδη ὑποχωρήματα δυσεντερικά. τὸ δὲ ἀπ' αὐτῆς ἔλαιον, μετὰ μυρσίνης σμήχει τείχας, ὕλας τε ταῖς οὐ λείοις.

V. horum vtique ad finem cap. nihil habet: non sum ausus aspernanda.

Marc. legit ἀφεψήματος.

De Lino. Cap. CXXV.

LINVM vulgo notum est: cuius semen easdẽ quas Fœnumgræcum vires habet: quippe quod discutiat & emolliat omnẽ intus foriscq; inflámationem, cum melle, oleo & aqua exigua decoctũ, aut melle cocto exceptum. Emendat & crudũ vitia cutis in facie ab insolatione, ac varos cum nitro & ficubus impositum. Cũ lixiuio verò parotidas duritiasq; discutit: herpetas & fauos cũ vino decoctũ expurgat. Vngues scabros remouet cum pari modo nasturtij & mellis. Educit quoque quę intra pectus hærent, cum melle eclegmatis vice sumptum, ac tussim etiã lenit. Stimulat & venerem, si melli & piperi placentę modo admixtum largiùs sumatur. Quin & eius decoctũ aduersus intestinorum ac vuluæ erosiones, itemq; ad euocanda alui excrementa infunditur. Vuluæ deniq; inflammationibus, ęquè ac fœnigræci semen infessu, perquàm est vtile

C ΛΙΝΟΝ γονόεμον. δύναμιν δὲ ἔχει τὸ σπέρμα τὴν αὐτὴν τῇ τήλει, διαφορεῖσθαι καὶ μαλάσσειν πᾶσαν φλεγμονὴν ἐντός τε καὶ ἐκτὸς, σὺν μέλιτι καὶ ἐλαίῳ ἢ ὕδατι ὀλίγῳ ἐφθὸν, ἢ ἑφθῷ μέλιτι ἀναλφθὲν· αἴρει δὲ ἐφήλεις ὠμὸν ἢ ἑφθὸν σὺν νίτρῳ καὶ σύκοις· σὺν χυλίσματι δὲ, παρωλίδας καὶ σκληρίας διαφορεῖ· ἕρπητάς τε σὺν οἴνῳ ἑφθὸν καὶ κηλίδας ἐκκαθαίρει. ὄνυχάς τε λειαίνει ἀφίσταται σὺν καρδάμῳ ἴσῳ καὶ μέλιτι· αἱ ἀγλαὶ δὲ καὶ τὰ ἐκθώρακος, σὺν μέλιτι αἵματι ἐκλείχθεν λαφθὲν, καὶ βῆχας πτισικοὺς παραμιγὲν δὲ καὶ πρὸς ἀφροδισία, μετὰ μέλιτος καὶ πεπέρεως αἵματι κοπῆς πολὺ λαμβανόμενον. καὶ ὁ ἀφέψημα δὲ αὐτοῦ εἰς πρόσπασμα καὶ ὑστέρας δῆγμοὺς, καὶ ἐκκαυμοὺς ὀφθαλμάτων, καὶ φλεγμονὰς ταῖς ἐν μήτρᾳ εἰς ἔγκλυσμα, ὥσπερ τὸ τῆς τήλεως ὀνίνησι.

Alij fabdidit habet

V. deest

V. deest inscriptio

De Cicere. Cap. CXXVI.

CICER satiuum bonã facit aluum, vrinã ciet, flatus gignit, coloris bonitatẽ cuti conciliat, menses partúsq; expellit & lac auget. Imponitur verò, & maximè cũ eruo decoctum, ad testium inflámationes & myrmecias: itemq; ad scabiẽ, vlcera capitis manátia & lichenas, necnon & ad cacroía malignaq; vlcera cum hordeo & melle. Alterum porrò ciceris genus arietinum appellatur. Vtrunq; verò cit vrinas, dato cum rore marino aduersus morbum regium & hydropẽ eorũ decocto. Lę-

Πεϱὶ Ἐϱεβίνθου. Κεφ. ϱκϛ'.

ΕΡΕΒΙΝΘΟΣ ὁ ἥμερος, διχύλιος, ὑρρηϊκὸς, πνευμάτων γεννητικὸς, διχροίας εὐεπιποίητος, καὶ αμυλώδων ἀγωγὸς καὶ ἐμβρύων, καὶ γάλακτος γεννητικὸς· καὶ ἁπλάστατα δὲ μάλιστα σὺν ὀρόβοις ἑφθὸς, πρὸς ὄρχεων φλεγμονὰς καὶ μυρμηκίας, πρός τε ψώρας, καὶ λειχῆνας, καὶ τὰ καρκινώδη ἕλκη καὶ κακοήθη, σὺν κριθῇ καὶ μέλιτι. Κεῖται δὲ τὸ ἕτερον αὐτοῦ εἶδος, κριός. ἀμφότεροι δὲ εἰσὶ διουρητικοὶ, διδοὺς ὑδρωπικοῖς πρὸς ἵκτερον καὶ ὕδρωπα τὸ ἀφέψημα αὐτοῦ σὺν λιβανωτίδι.

V. in margine, καὶ περὶ ἀκτέμονος.

V. inserta, εἰσὶ φυλλοειδεῖς ἀκανθώδεις, ἑλίκας μικρὰς καὶ στρογγύλας.

ελάπιθοι· ἢ καὶ κύστιν εἰλκωμένην καὶ νεφρούς. πρὸς δὲ μυρμηκίας καὶ ἀκροχορδόνας νεομηνίας ὅσης, ἕνιοι ἑκάστης ὀξυχόου ἐρεβίνθου φακοειδὲς ἀφέντες καὶ ἀφέντα, εἰς τι ὀθονίου ἀποδήσαντες αὐτὸ, ῥίπτειν εἰς τοῦπίσω κελεύουσιν, ὡς ἂν ἐπιπεσοῦσαι τὰς ἀκροχορδόνας γῆ) δι' ὑγρίου ἐρεβίνθου ὅμοιος τοῖς φύλλοις ὢν πικρόν, ὀσμὴν δριμεῖαν, τῷ καρπῷ δὲ φέρων παρὸς ὅσα καὶ ὁ ἤμερος.

A dút quoque exulceratã veſicã & renes. Sunt qui myrmeciarũ & penſiliũ verrucarũ extuberationes eminentiáſve ſingulas prima luna grano ciceris alio atque alio tangat, cáque grana in linteolo deligata abijci poſt ſe præcipiát, quaſi verrucæ hac arte decidant. Eſt & ſylueſtre cicer, folijs ſatiuo ſimile, odore acri, ſed ſemine diſcrepans: quod quidẽ eadem quæ ſatiuum præſtat.

retrorſum

B

Περὶ Κυάμου Ἑλληνικοῦ. Κεφ. ρκζ'.

De Faba Græca. Cap. CXXVII.

ΚΥΑΜΟΣ Ἑλληνικὸς πνευματώδης, φυσατώδης, δύσπεπτος, δυσέντερος. ἔπειτα δὲ σὺν μέτρῳ θερμοῦ καὶ ψυχροῦ ἐσθιόμενος ὑπὸ σιτίων ὀξυκράτῳ καὶ σὺν ὄξει λέπει ἐκθιόμενος, δυσεντερίας καὶ κοιλιακὰς ῥύσεις ἐπέχει· καὶ πρὸς ἐμέτους ὑπὸ βοῶν ἐδόμενος χλωρὸς γινόμενος ὑπὸ ἀφυστότερος ἢ πρῶτον ὕδατος καὶ τὴν ἕψησιν ἀποχειμάζει. ὁ δὲ χλωρὸς καὶ κακοστομαχώτερος καὶ φυσωδέστερος. ὁ δὲ ἄβρυον αὐτοῦ κυάμου καταπλασθὲν καθ' ἑαυτό τε καὶ σὺν ἀλφίτῳ, ἃς ἂν πληγὰς φλεγμονὰς πραύνει· καὶ ὑλὰς ὁμοχρόους ποιεῖ, καὶ μαστοὺς χονδριοῦντας καὶ φλεγμαίνοντας ἀφίστησι γάλακτι σβέννυσι. σὺν μέλιτι δὲ καὶ τηλίνῳ ἀμβώνας ὀδόντας καὶ παρωτίδας καὶ ὑπώπια διαφορᾷ σὺν ῥόδῳ τε καὶ λευκῷ ἐπιτιθέμενος τοῖς λευκοῖς ὀφθαλμοῖς πρεπόντως καὶ καταφυλώματα καὶ οἰδήματα γελᾷ· φυραθὲν δὲ σὺν οἴνῳ, συγχύσεις καὶ πληγὰς ὀφθαλμῶν καθίστησιν· εἴς τε αἰγιαλώλημα ῥυπαίνοις χρεὶς τὰ λέπη μασθοῖς, ἐπιτιθέμενα) καὶ τὰ μείωπου. καὶ διδόμενα φλεγμονὰς ἕψησιν ἐν οἴνῳ θεραπεύει· καὶ τοῖς ἐφηβαίοις δὲ τὰ παιδία καταπλασσόμενος, ἀνήβους ἐπὶ πολὺ τηρεῖ σμήχει δὲ καὶ ἀφοράς. τὰ δὲ λέπη καταπλασσόμενα, λαὶ ἐκπεπληθυσμένας ῥίχας ἀφοῦς καὶ ἰχνὰς καὶ ἀσκυδάζει. μετὰ δὲ ἀφίπου καὶ ὄξους καὶ ῥοδίνου καταπλασθέντα πυγαῖα, χειράδας διαφορεῖ, καὶ ἕρια βάπτει τὸ ἀφέψημα αὐτῶν. ἔστι δὲ καὶ πρὸς ἕλκη ἀπὸ τῶν βδελλῶν αἱμορραγίας, λελεπισμένος εἰς δύο διαιρεθεὶς, καθ' ὃ προσπέφυκεν, ἐπέχει· προσπούλωμος καὶ τὸ ἥμισυ μον.

Goup. Hæc verba non legebantur olim in veteribus codicibus: quemadmodum intelligi poteſt ex veteri codice, Serapione, interprete antiquo, & Hermolao. Quæ autem aſteriſcis ſunt, ſtudioſus quiſpiam ex Galeni coloſſeis tranſtulit. In quo ſcriptore hæc legúntur, καὶ μετὰ ταῦτα ἐπὶ μὲν τοῦ ἰχῶρος καὶ τὸ ψύχος. Ex quibus verbis Dioſcoridem facile emendari poteſt. Antigraphi hæc inſcripſere, & præcedentia non habent, adeoque mihi ſuſpecta ſunt.

C

D

E

F

G

Aldus.

FABA Græca inflationem parit, flatulenta eſt, ægre concoquitur, ac tumultuoſa inſomnia facit: ſed tuſſi confert, carnémq; gignit, media calidi frigidiq; natura. Decocta in poſca & cum ſuo cortice eſitata, dyſéterias & cœliacorũ profluuia ſiſtit, & cõtra vomitiones in cibo idonea eſt. Minùs vero flatulenta euadit, ſi prior aqua inter coquendũ abiiciatur. At viridis & plus negotij ſtomacho faceſſit, & plus flatuum gignit. Porrò fabæ lomentum & per ſe & cum poléta impoſitum, inflámationes ab ictu mitigat, & cicatrices cõcolores facit: mámas etiánum grumoſo lacte turgẽtes inflámationeq; laborantes adiuuat, & lac quoq; extinguit. Cũ melle autẽ ac fœnigræci farina furunculos, parotidas & ſub oculis luores diſcutit. Cũ roſa verò, thure oniq; candido, procidẽtes oculos, eorúmque ſtaphylomata tumoréſque reprimit. Subactum vino, ſuffuſiones & ictus oculorum recreat. Cõmanducata ſine cortice faba frõti, ſiſtendæ fluxionis gratia, anacollematis inſtar imponitur.

ſingillas

Teſtium inflámationes in vino decocta ſanat. Pueris verò circa pubis regionẽ adhibita, ipſos diu impuberes cõſeruat. Vitiliginẽ quoq; purgat. Corticibus autem illiti qui poſt euulſionem renaſcũtur pili, ieiuni graciléſque efficiuntur. Iidem cum polenta, aluminе ſciſſo & vetere oleo impoſiti, ſtrumas diſcutiũt: quin & eorum decocto lanæ inficiuntur. Cæterùm faba dẽpto cortice bipartito ſecta, qua quidẽ parte ex natura coaluit, ad ſanguinis eruptiones ab hirudine excitatas imponitur: illas nanque dimidiata ſupprimit, ſi qua parte alteri cohærebat, apprimatur.

retrorſum

ſtrigoſi

De Faba AEgyptia. C.CXXVIII.

Ægyptia faba, quá nonnulli Põticá vocãt, in Ægypto quidem magna copia prouenit, sed & in Asia quoq; & Cilicia paluſtrib⁹ locis inuenitur. Folijs vero habet amplũ instar petasi seu galeri, caulẽ cubitalem, digiti crassitudine: floré roseũ, dupla papauerini floris amplitudine. At vbi defloruit, vtriculos gerit folliculis similes, in quib⁹ faba paululũ supra operculũ instar bullę prominet. Ciboriũ aut cibotiũ ideò nominatur, quasi loculamẽtũ, q̃ ferat eiusmodi faba, ipsa humenti glebæ indita atq; ita in aquam demissa. Radix autẽ subiacet harundinis radice crassior: quę cocta crudaq; estur, & collocasia nominatur. Faba quoq; ipsa virens comeditur: sed exiccata nigrescit, & Græcá magnitudine superat. Vi porrò habet astringendi, stomachũq; iuuat. Quãobrẽ dysenterics cœliacisq; conuenit inspersa earũ farina polẽtę vice: sed & in pultẽ quoq; redacta exhibetur. Efficaciores aũt sunt cortices, si decocti in vino mulso ternũ cyathorũ mensura ꝓpinẽtur. Cęterũ ad auriũ dolorẽ facit quod in carũ medioviride spectatur, gustu amarum, si cum rosaceo coctum instilletur.

De Lente. Cap.CXXIX.

Lens frequenti cibo acié oculorũ obtundit, ægrè concoquitur, stomachum lædit, eumq; & intestina inflat: sed aluũ cum cortice comesta sistit. In eo genere pstat quę facillimè coquitur, quæq; nihil atri in maceratione reddit. Vim porrò habet astringẽdi: qua ex causa aluũ cohibet, si detracto antè cortice accuratè discoquatur, prima aqua inter coquendum effusa (quippe primum ipsius decoctũ aluum soluit.) Insõnia verò tumultuosa excitat, neruosis partibus, pulmoni capitiq; cõtraria. Melius autẽ cõtra fluxiones alui suo fungetur munere, addito cũ aceto intubo aut portulaca, aut beta nigra, aut myrti baccis, aut punici tegmine, aut rosis siccis, aut mespilis sorbisve, aut pyris palmulisve Thebaicis, aut malis coroneis, aut cichorio, aut plãtagine, aut gallis integris, quæ quidẽ post coctura abiiciũtur, aut deniq; rhoẽ qui obsonijs inspergitur. Verùm cum ea diligenter acetũ percoqui debet: alioqui aluum

Περὶ Κυάμου Αἰγυπτίου. Κεφ. ρκη'.

Ὁ δὲ Αἰγύπτιος κύαμος, ὃν ἔνιοι Ποντικὸν καλοῦσι, πλῆθος μὲν γίνεται ἐν Αἰγύπτῳ, καὶ ἐν Ἀσίᾳ δέ, καὶ ἐν Κιλικίᾳ ἐν τοῖς λίμναις βλαστάνει. ἔχει δὲ φύλλον μῆλα ὡς πίτασον, καυλὸν δὲ πηχυαῖον, σφόδρα δάκτυλον τὸ πάχος· ἄνθος δὲ ῥοδόχρουν, διπλάσιον μήκωνος· ὅταν δὲ ἀπανθήσῃ, φέρει φυσικὰ σφενδάμνου πλείονα θυλακίσκια, ἐν οἷς κύαμος μικρὸς ὑπόλευκος τὸ χρῶμα ὡς πομφόλυξ. καλεῖται δὲ καὶ χωρίτης, καὶ κιβώριον, ἀπὸ τοῦ τὴν φύσιν τοῦ κυάμου γίνεσθαι αὐτῷ ἐν ὑδατώδει τόπῳ ἐν ἰκμαδώλῳ, ὅταν τὸ εἰς τὸ ὕδωρ ἀφιέμενον. ῥίζα δὲ ὑπέστι παχυτέρα καλάμου· βιβρωσκομένη ἐφθὴ τε ὠμή, κολοκασία καλουμένη. ὁ δὲ κύαμος διβρώσκει μὲν ὑγρὸς ξηραινόμενος δὲ μᾶλλον, δύσπεπτος δὲ μείζων ὑγιεινοῦ· ἔχων δύναμιν συντικὴν δὲ δυσόμαχον. ἁρμόζει δὲ δυσεντερικοῖς δὲ κοιλιακοῖς τὸ ὅλον αὐτοῦ ἄβρυον ἐπιπασσόμενον ἀλεῖ ἀμφίτου. ἢ πολιοποιούμενοι δὲ δίδου. τὰ δὲ λέπη μᾶλλον ποιεῖ ἐνόμενα ἐν οἰνομέλιτι, δὲ πάσσεται πλῆθος κυάθων ξηρῶν. δὲ ὠτῶν ὠτιαίου δὲ ποιεῖ τὸ ἐν μέσῳ χλωρὸν αὐτοῦ, πικρὸν δὲ τῇ γεύσει, λεῖον σὺν ῥοδίνῳ συνεφθὲν καὶ ἐγχεόμενον.

Περὶ Φακοῦ. Κεφ. ρκθ'.

Φακὸς διβρωτικός μᾶλλος συνεχῶς, ἀμελυκοπὸς, δύσπεπτος, κακοστόμαχος, πνευματαιωτικὸς τεμαίχου καὶ εἰλεῶνα, χιλίας δὲ σαλικὰς, σὺν ᾧ λέπει ἐσθιόμενος· ἀγαφέρει δὲ αὐτὸ ὁ ἕψανος καὶ μηδὲν αἰσθητὸν ἐπιφέρει τῇ ἀγχροχῇ μᾶλλον. Δύναμιν δὲ ἔχει συντικήν. ὅθεν κοιλίαν ἵστησι, φροντολεπισθεὶς καὶ ἑψηθεὶς ἐπιμελῶς, τὸ πρῶτον ἐν ᾧ ἀφίησι ὕδατος ἀποχεόμενον. λυτικὸν δὲ κοιλίας τὸ πρῶτον ἀφέψημα αὐτοῦ. ἔστι δὲ δυσπέπτου, ἀήθεις πρὸς τὰ ῥυπώδη καὶ πνεύμονα καὶ κεφαλήν. βέλτιον δὲ τὸ ἴδιον ἔργον ἀποδίδωσι πρὸς τὰ ῥεύματα τῆς κοιλίας, μετιέσης αὐτὸν μὲν ὄξυς στέρεως ἢ αἰδράχης, ἢ σευτλίου μέλανος ἢ μύρσινον, ἢ σισύμου, ἢ ῥόδου ξηροῦ, ἢ μεσπίλων, ἢ ὄων, ἢ ἀπίων Θηβαϊκῶν, ἢ κυδωνίων μήλων, ἢ κιχωρίου, ἢ ἀρνογλώσσου, ἢ κηκίδων ὁλοκλήρων, αἷς πᾶσι μὲν τὸ ἕψημα ῥίπτου), ἢ ῥοοῖς τοῖς ἐπὶ τοῦ ὄλα. δεῖ δὲ τὸ ὄξος ἐπιμελῶς συλλαβεῖν αὐτοῦ· εἰ δὲ μή, πα-

V. codex de faba caput non habet

V. ut mox.

V. caremi.

Vulg. mendose. Al. ἀφαιματικὸς

Cornarius perperam σκληρόν.

V pro his ἐσθιόμενος ἢ ξηρανθὲν, ἢ ἀφεψηθὲν, ἢ ἀφεψήσας, ἢ ἀφεψήσεως, ἢ ἀφεψήσεως ἢ &c.

ράπη τ̃ χειλίαν. ℈ αἱ ἀφροπὴν δι' ὀμφάχου
V. ἀφριλεπιοδῆλες ἁλάχηλα φακοὶ ἡ κηλα-
πηθῶσες ὑφῆσι πρηπορῆ. δι' ἡ ποδάγρας
σὺν ἀμφίτῳ ἐφῆς κεκλεφθεὶς ἡ κηλαπλα
σθεὶς. μ̃ δι' μήλης κόλπους κοιλᾶ. ἐξα-
ρας ἀφιρρήπη, ℈ ἕλκη αἱ ἀκροχάρη· σὺν ὄξη
δι' ἐφθῆς σπληρώματα ἡ χειράδας διαφορῆ σὺν μήλωπῳ ἡ πυδωνίῳ, ὀφθαλμῶν φλεγμονὰς καὶ δακτυλίων θεραπευῆ, ῥοδίνῳ μιγνυμένη· ἐπὶ ἡ τ̃ μέζονα ἐν δακτύλῳ φλεγμονὴν ℈ κολπῶν μεθόνων, σὺν σταφίσι ἡ ῥοδίνῃ ξηροῖς ἀφεψήματος μιγνυμένη ℈ μήλου· πρὸς νομὰς ἡ γαγγραινικὰς ἐμάσας, ἡ καὶ θεραπαίνας μιγνυμένης. πρὸς δὲ φλυκταίνας καὶ ἕρπητας καὶ ἐρυσίπελατα καὶ χίμετλα, ὡς προείρηται. πρὸς δὲ χονδριώδεις μαστοὺς ℈ παρηγανισμένης, ἐφόμενος ἐν θεραπείῃ ἁρμόζῃ κεκλαπλασθείς.

A

B

C

Ald. χιμώνας

Περὶ Φασιόλου. Κεφ. ρλ'.

ΦΑσίολος φυσώδης, πνευμάτων κινητικός, δυσπεπτος. ἐψηθεὶς ἡ χλωρὸς ἡ ἐσθιόμενος, κοιλίας μαλακτικός· πρὸς δὲ ἐμέτους ὠφέλιμος.

D

Περὶ Ὀρόβου. Κεφ. ρλα'.

ΟΡΟΒΟΣ χοιρώδης θαμνίσκος, στενόφυλλος, λεπτός, ἔχων σπερμάτια ἐν λοβοῖς, ἐξ ὧν ζέσας ἡ καθόμενον ὄροβον ἀλίζουσι ἡ ἔστι ἡ καρηβαρικός, κοιλίας παρεκτικὸς εἰ βρωθείη, αἷμα τε δι' ὕδρωπα αἴρει· ὕδως ἡ λιπαυγῆ ἐφθὸς παραληφθέντος. σκυβάζει ἡ τ̃ ὀξ αὖθ ὄροβον ὕστερον ἐκλείχας τὸν βῆχας ἡ λθυχείς, ῥᾳδίως ὕδατι αἱ αφυρῶν, ἐάσας τι ἐφ' ἱκανὸν συμπῆξαι, φρύξις ἄγχεις αὖ σπιρράζῃ ὁ φλοιός. εἶτα ἀλήσας ℈ δυσεντερίας κοσκίνῳ λεπτῷ, ἀπόζες. ἔστι ἡ βύκκιλιον, ἀρτικὸν, βυζοειδὲς ποιητικὸν πλεονασθὲν δι' ἐν ῥωστῇ ἡ ἐν πόλῃ, μ̃ τρόφων αἷμα αἴρῃ δυσεντερίας ἡ κύστεως· καθαίρει δι' ἕλκη σὺν μήλῃ, ἡ φακοὺς ἡ ἐφήλεις ἡ σπίλους, ἡ τὰ λοιπὰ σώματα· νομαῖς τε ἴσχει ἡ σκληρώματα, ἡ γαγγραίνας ἡ σκληρίας μηδαμοῦ ἰᾶται ἐν μαστοῖς. ἡ θηριώδη ἡ αἴθρακας ἡ χηρία σπιρρήπη· φυραθεὶς ἡ σὺν οἴνῳ, κυνόδηκτα καὶ ἀνθρωπόδηκτα ἡ ἐχιόδηκτα θεραπεύῃ κεκλαπλασμένος· σὺν ὄξει ἡ, δυσουρίας καὶ στραγγουρίας ἡ ἡπατικοὺς παύει. ἁρμόζει δὲ καὶ τοῖς αἰδοίοις, καρύου μέγεθος φρυγίου λεφθὲν σὺν μήλου ἡ ὀφθάλμασι σὺν μήλῃ ἡ ἀφέψημα αὐτῆς καταντλούμενον, χίμετλα καὶ κοσμικὸν τὸν ἐν σώματι θεραπεύει.

E

Ald. χιμώνας

cõturbat. Cõtra ſubuerſionẽ ſtomachi decorticata lẽtis grana xxx. deuorataq; ꝓſũt. Decocta quoq; lẽs cũ polẽta impoſitaq; podagras lenit. Sinus verò cũ melle glutinat, vlcerũ cruſtulas circũquaq; rũpit, & vlcera quoque ipſa repurgat. At ex aceto diſcocta, duritias & ſtrumas diſcutit. Cũ melilo-to. a. vel cotoneo malo medetur inflãmationib⁹ oculorũ ac ſedis, ammixto roſaceo. Sed in maioribus ſedis inflãmationib⁹ ampliſq; finib⁹, cũ putamine punici aut roſis ſiccis adiecto mel le decoquitur. Valet quoq; ad nomas quę in gagrenã euaſerũt, ſimiliter vſurpata, aut ẽt adiũcta maris aqua. Ad puſtulas. a. herpetas, eryſipelata & pniones, quo antè dictũ eſt modo. Cęterũ cõtra mãmas grumoſo lacte turgentes nimiumq; diſtẽtas, decocta in aqua marina & impoſita auxiliatur.

De Phaſiolo. Cap. CXXX.

PHASIOLVS flatulẽtus eſt, flatuſq; ciet, & ęgrè concoquitur. Quòd ſi viridis coquatur, in cibo aluũ emollit & ad vomitiones ciẽdas idoneus eſt.

De Eruo. Cap. CXXXI.

ERVVM exiguus eſt frutex omnib⁹ cognit⁹, anguſto folio, tenuis, in ſiliqs parua gerẽs ſemina, è quib⁹ farina fit eruina dicta, quæ q.dẽ ad medẽdi vſũ eſt accõmodata. Eruũ porrò capiti oneroſũ eſt, aluũq; turbat ſi comeſtũ fuerit, & ſanguinẽ quoq; cũ vrina ducit. Boues. a. ſaginat, ſi elixũ apponatur. Parandę verò eruinę farinę ratio hęc eſt: huberiora cãdidaq; grana deligito & aqua ꝓmiſcẽdo reſpgito: ac vbi ſufficiẽter cõbibere ſiueris, tũ demum torreto dũ cortex diſrũpatur: poſtea molita & tenui cribro pollinario creta reponito. Huiuſmodi farina bonã ꝑſtat aluũ, vrinã ciet, ac meliorẽ colorẽ cuti cõciliat. Quòd ſi in cibo potúve largiꝰ aſſũpta fuerit, ſanguinẽ cũ torminib⁹ ꝑ aluũ & veſicã educit. Vlcera cũ melle purgat: lẽtigines, ſolares maculas, ac nęuos ẽt toto corpore emẽdat: nomas, carcinomata & gãgrẽnas ſerpere nõ patitur. Quĩ & mãmarũ duritias emollit, ac ferina vlcera, carbũculos & fauos emarginat. Cũ vino. a. ſubacta & impoſita, canũ, hominũ viperarũq; morſib⁹ medetur. Vrinæ quoq; difficultates, tormina & teneſmos ex aceto mitigat. Cõuenit & ijs q; alimẽtũ ex cibo non ſentiũt toſta & ad nucis magnitudinẽ cũ melle ſũpta. Cæterũ erui decocti aqua, perniones & pruritus in vniuerſo corpore, fouendo ſanat.

De Lu-

De Lupino. Cap. CXXXII.

LVPINVS satiuus notus est: cuius farina cum melle delincta, aut ex aceto pota, lumbricos enecat. Ipsi quoque lupini macerati, ita tamen vt minimè suam deposuerint amaritudinem, eadem in cibo efficiunt. Sed & eorum decoctum eadem præstat. Cum ruta verò ac pipere potum, lienosis prodest. Eodem ipso gangrænas, fera vlcera, incipientem scabiem, vitiligines, maculas, papularum ac pituitæ eruptiones & vlcera capitis manantia fouere vtile. Quin & illud ipsum mẽses ac partus detrahit, cũ myrrha & melle subditum. Purgat verò farina cutem, liuoréſque emendat, & inflammationes sedat cum polenta & aqua. Ex aceto autem coxendicum cruciatus lenit. Panos verò ac strumas in aceto decocta & imposita loco mouet, atque carbunculos circũquaque rumpit. Ipsi quoque lupini aqua cœlesti decocti, dum in cremorem lentescant, facié abstergunt: & cum chamæleonis nigri radice cocti, pecorũ scabiem sanant, si modò illa tepente decocto abluantur. Porrò radix in aqua decocta & epota, vrinas pellit. Lupini verò ipsi edulcati, si triti ex aceto bibantur, stomachi fastidium leuant, & cibi auiditatem faciunt.

De lupino syluestri. Cap. CXXXIII.

Est & syluestris lupinus satiuo similis, sed omni modo minor: qui quidem quę satiuus eadem præstat.

De Rapo. Cap. CXXXIIII.

ELIXA rapi radix alit, inflationes parit, laxam ac prẽhumidam carnem gignit, venerémque stimulat. Ipsius verò decocto podagræ pernionésque fouentur. Sed & ipsa trita & imposita prodest. Quòd si excauata radice, rosaceum ceratum intra ipsam feruẽti cinere liquefiat, remedium fiet ad vlceratos perniones efficax. At verò cymę manduntur elixæ, & vrinã cient. Semen theriacis & antidotis quæ dolorem leuant idoneum est. Potum idẽ contra lethália medicamenta salutare est, ac venerem quoque concitat.

A Περὶ Θέρμου. Κεφ. ρλζ'.

ΘΕΡΜΟΣ ἥμερος γνώριμος· οὗ ὁ ἄλευρον σὺν μέλιτι ἐκλειχόμενον, ἕλμινθας ἐκλυάσει. καὶ αὐτὸ δὲ ἀποβραχέντες, καὶ ἔμπαιρον ἐσθιόμενοι, τὰ αὐτὰ ὀρέσει. καὶ ὁ ἀφέψημα αὐτῶν τὰ αὐτὰ ποιεῖ μετὰ πηγάνου καὶ πεπέρεως πινόμενον.

V. ἐσθίειν. Lacuna verò legit in veteri, & vt ipse vult inuenit in proprio codice, ἀλλ' ἥμερον ἐμοῦ ἔξω πινόμενον ἐκμανδάνει ὑφαιρεῖ.

B ὄζει καὶ σπληνικοὺς ὠφελεῖ. ἐπινυκτίδα τε χαλεπὰς ὄσι χρίσαντι, καὶ θηλωμάτων, ψώρας ἐρυθρὰς, λέπρας, ἀπόλιας, ἐξανθήματά τε καὶ ἀχῶρας. ὁ δὲ αὐτὸ καὶ καταμηνίων καὶ ἐμβρύων ἀποπτωτικὸν, μετὰ σμύρνης καὶ μέλιτος ὑποτεθέν. καθαίρει δὲ τὰ ἄλευρα χρῶτα καὶ πελιώματα, καὶ φλεγμονὰς τοῖς σὺν ὀξυκράτῳ καὶ ὕδατι σὺν ὄξει δι' ἰσχάδας πεπηγόσι καὶ φύμασι. χοιράδας δὲ μεταβάλλει σὺν ὄξει ἐφθὸς καὶ καταπλασθὲς, καὶ αἵματα ἐκῤῥήγνυσι. μὴ ὕδατος δὲ ὑμβείου ἐφθὸν ἀγρίου ἄγει· χυλώσεως, σμήγμασι τρόσωπον· μετὰ δὲ χαμαιλέοντος ῥίζης τῶν μέλανος ἐφθὸν πινόμενον, καὶ βάπτον ψώρας ἰᾶται, ἐκλειουμένων τῷ ἀφεψήματι χλιαρῷ. ἡ δὲ ῥίζα ἐφθεῖσα σὺν ὕδατι καὶ πολίζει, οὖρον κινεῖ. οἱ δὲ ἀποπλυκανθέντες λάροι σὺν ὄξει πολύτες στομάχου ἄσιτον παρεύουσι, καὶ αἰορεξίαν ἰῶνται.

Dras. addit. μετὰ μέλιτος. V. περπεραν μέλανος

Περὶ Θέρμου ἀγρίου. Κεφ. ρλη'.

Γίνεται δὲ καὶ θέρμος ἄγριος, ἐμφερὴς τῷ ἡμέρῳ, καὶ τῇ πόᾳ δὲ μικρότερος, πάντων ὅσα καὶ ὁ ἥμερος.

V. μικρότερον

Περὶ Γογγύλης. Κεφ. ρλθ'.

ΓΟΓΓΥΛΗΣ ἡ ῥίζα ἐφθὴ εὔφορος, πνευματώδης, σαρκὸς πλαδαρᾶς ἀνιαλική, ἀφροδισίων προκλητική. ὁ δὲ ἀφέψημα αὐτῆς, πλαδαρὰς καὶ χαμαίτλων ὄζει κατάπλασμα. καὶ αὐτὴ δὲ λεία καταπλασθεῖσα ὠφελεῖ. εἰ δέ τις ἐκλύσαι τὸ ῥίζαν, χηρωτὴν ῥοδίνην ἐν αὐτῇ ὀπὸν ἀρμοσάσθω τῇ χειρὶ, καὶ περὶς τὰ εἰλκωμένα χαμαίτλα. ὃ ἐξ αὐτῆς ἀκάνθας βιβρώσκεται ἔφθης, ἔστι δὲ διουρητικός. ὁ δὲ αὐτὸς εἰς αὐτὸν καὶ θηλυκὰς αἰδοίων ὕδατος.

Ald. πνευματικὴ

V. χαμαίτλα ἰᾶται. cætera desunt. Alius, καὶ αὐτὸ ποιεῖ πολύ

V addit. ἐν αὐτῇ ῥίζῃ τὸν ὀπὸν ἀπὸ τῆς ῥίζης τοῦτο. Cætera desunt.

κοιλῆ ὑγρὰ τῆς θαλάσσης πολύν, πέφορμα καὶ πρὸς ἀφροδίσια. ὁ δὲ μυελὸς δὲ ἀτροφωτέρα γίνεται βιβρωσκόμενον. ὁ δὲ ῥιζὸς τὸ ἐρέθισμα αἴρει λαμβανόμενος.

V. caret. etsi flatibus congruat.

Περὶ Γογγύλης ἀγρίας. Κεφ. ρλέ.

Ἡ μὲν τῆς ἀγρίας γογγύλη φύεται ἐν ἀρούραις, θάμνος πηχυαῖος ὁ ὕλος, πολύκλαδος, ἐξ ἄκρου λεῖος, φύλλα ἔχουσα λεῖα, δακτύλου ὁ πάχος, ἢ καὶ μείζονα· καρπὸν δὲ ἐν λοβοῖς κεκλυκώδη. ἀνειλίττεται δὲ τὸ περικάρπιον, ἔσωθεν ἄλλος καφαλοειδὴς ἐστὶ λοβὸς, ἐν ᾧ σπερμάτια μέλανα, θρανσθέντα δὲ λευκὰ ἔνδοθεν. μίγνυται δὲ σμήγμασι τοῖς πρὸς τὸ πρόσωπον καὶ τὴν ἄλλου χρωτός, ὅσα δ' ἀλεύρων γίνεται θερμαίνει, ἢ πυελίσαν ἢ ἀείσαν ἢ ὀρόβινον.

Dod. caput hoc corruptum suspicatur. V. quidem μέλανα. V. λείας non habet.

Alter. flatib.

Περὶ Βουνιάδος. Κεφ. ρλϛ'.

Βουνιάς, καὶ ταύτης ἡ ῥίζα ἐφθὴ φυσώδης ἐστὶν. πέττει δὲ ξύφιμος· ποιεῖ δὲ σπέρμα αὐτῆς ἀνενεργὲς τὰ θανάσιμα προσπινόμενον. μίγνυται δὲ καὶ αἰθιοπικὸς· ὁμοίως δὲ καὶ ταύτης ἡ ῥίζα.

Περὶ Ραφανίδος. Κεφ. ρλζ.

Alter. ἰσχνοῖς V. alii δίχνοις

Ῥαφανὶς, καὶ αὕτη πεπαμένη θερμαντικὴ καὶ θερμαντική, εὔστομος, οὐκ εὔστομαχος. ἐρεθιστικὴ δέ ἐστι καὶ οὐρητική, θηριάλιος, εἴ τις αὐτὴν ἐπὶ λαμβάνοι μᾶλλον συντρίβουσαν τῇ αἰθόνῃ. προσθιομένη δὲ μετεωρίζει τὴν τροφήν· ἁρμόζει δὲ καὶ τοῖς ἐμοῦ μέλλουσι προσθιομένη. ἀκριβοῖ δὲ καὶ τὰς αἰθόνας· ἐφθὴ δὲ πολὺ λαμβανομένη βήσσησι χρονίοις, καὶ τοῖς πάλαι θηριῶσι τὸ θώρακι. ὁ δὲ φλοιὸς αὐτῆς μετ' ὀξυμέλιτος λαμβανόμενος, ἐμετικώτερος, ἁρμόζει ὑδρωπικοῖς. καὶ ταῖς πλαδαραῖς δὲ βύπτεσι καὶ σπληνικοῖς. σὺν μέλιτι δὲ νομὰς ἐφίστησι, καὶ ὑπώπια αἴρει. βοηθεῖ καὶ ἰχνοδήκτοις, καὶ ἀμφιπεπίας διαστήμασι φακὰς ἀποσμήχει σὺν αἴρῳ ἀλεύρῳ. δοκεῖ δὲ τοῖς ὑπὸ μυκήτων πνιγομένοις βιβρωσκόμενος ἢ πινόμενος, καὶ ἔμμηνα ἄγει. τὸ δὲ σπέρμα αὐτῆς ἐμετικὸν, οὐρητικὸν, σπληνικὸς καθαρτικὸν, πινόμενον μετ' ὄξους· συναγχικοῖς τε βοηθεῖ ἀφεψηθὲν σὺν ὀξυμέλιτι θερμῷ

Gallic. παρὰ ἀμ Caius textus probat. Lamb.

Cæterùm muria conditũ rapum in cibo sumptũ, minus quidẽ alimenti sufficit, attamẽ appetentiá restituit.

De rapo syluestri. Cap. CXXXV.

Syluestre rapũ in aruis nascitur, frutex cubitali altitudine, ramosus, in cacumine læuis, folijs quoque lęuibus, radice digitali crassitudine, aut etiam maiore. Fructũ verò gerit in siliquis calyculatis. Apertis autẽ fructus inuolucris intus alia spectatur siliqua capitis specie: qua quidẽ paruula semina nigra continentur, quæ tamen fracta intrinsecus alba conspiciuntur. Cęterùm admiscetur in smegmata, quib' ad detergẽdá cutẽ in facie reliquóq; corpore vtuntur: quæ quidẽ ex lupinorum, trifici, lolij aut erui farina fiunt.

De Buniade. Cap. CXXXVI.

Buniadis quoque radix elixa flatus gignit, minus verò nutrit. Semen ipsius præbibitum venena reddit inefficacia: ob id etiam in antidotos additur. Sed & huius radix muria conditur.

De raphano, seu radicula. Cap. CXXXVII.

Radicula quoque ipsa flatus gignit & excalfacit: ori quidem grata, at stomacho minimè cõmoda: ructus præterea mouet, atq; vrinas ciet: aluum quoq; bonam facit, si quis ipsam summo cibo sumpserit, quippe quæ tùm distributionem magis adiuuet: præsumpta verò cibum suspendit: quare & ante cibum vomituris conuenit: quin & sensuum aciem excitat. Elixa verò si sumatur, valet ad eos qui tussi diuturna infestantur, quique crassiores succos in pectore cumulant. At cortex ipsius ex aceto mulso sumptus, vomitiones potẽtiùs mouet, hydropicis accõmodatus: impositus etiánum lienosis est vtilis. Cum melle verò nomas sistit, & sub oculis sugillata tollit. Auxiliatur & à vipera commorsis, necnon & alopecias densat, atque lentigines cum loliacea farina exterit. Est & auxilio tam cibo quàm potu ijs qui à fungis strangulantur, menstruáque pellit. Semen vomitiones excitat, vrinas ejicit, & lienem ex aceto potum extenuat. Decoctum anginosis cum aceto mulso calente

gargarizatu prodeſt, & contra ceraſtę morſum ex vino potum auxiliatur. Cæterùm ex aceto illitum gangrænas etiam valenter emarginat.

De radicula ſylueſtri. Cap. CXXXVIII.

Radicula ſylueſtris, quam Romani armoraciam vocant, folia habet ſatiuæ ſimilia, ſed quæ ad lampſanam propiùs accedant. Radix eſt gracilis, longa, ſubaeris. Porrò tam folia quàm radix olerum vice decoquuntur. Excalfacit autem, vrinam ciet, æſtuoſáque eſt.

De Siſere. Cap. CXXXIX.

SISER vulgo cognitum: cuius radix elixa ori grata eſt, & ſtomacho vtilis: vrinam cit & appetētiam inuitat.

De Lapatho, ſiue rumice. Cap. CXL.

EST è lapathi generibus quoddá quod oxylapathum vocant, in paluſtribus naſcens, durum ac ſummis foliorum partibus aliquantulú acuminatum. Alterum vero hortēſe, priori diſſimile. Tertium genus eſt ſylueſtre, paruũ, plantagini proximũ, molle & humile. Eſt & quartum, quod nonnulli oxalidem, alij anaxyrida aut lapathum appellant. Cuius folia ſylueſtri & exiguo lapatho ſimilia, caulis minime grandis, ſemen acutum, rubens, acre, in caule & agnatis appendicibus emicans. Omnium porro decocto olere aluus emollitur. Crudum vero illitum melicęridas addito roſaceo aut croco diſcutit. At ſylueſtris lapathi, oxylapathi & oxalidis ſemen ex aqua aut vino vtiliter bibitur cōtra dyſenterias, cœliacorū affectus, ſtomachi faſtidium, & ſcorpionis ictum. Quòd ſi quis in potu præſumpſerit; nihil incōmodi ex illius ictu percipiet. Radices autem ex aceto coctæ, aut etiamnum crudæ impoſitæ, lepras, impetigines & ſcabroſos vngues curāt: ſed antè locus nitro aut aceto in Sole perfricandus eſt. Quin & earum decoctum pruritus corporis ſedat, vice fotus affuſum, aut in ſolia balnearú additum. Aurium quoque dolorem leniunt, itémque dentium, ſi in vino coctæ colluantur. Strumas etiam parotidáſque ſimiliter coctæ in vino & impoſitæ diſcutiunt: aceto verò decoctæ lienem extenuant. Quin &

εἰς ἀναγαργάρισμα. καὶ πρὸς κεράσου δῆγμα σὺν οἴνῳ πινόμενον βοηθεῖ. ὅτι πλαθὲν δὲ μετ' ὄξους καὶ γαγγραίνας διόπονους ἀνέχαρίσατο.

Περὶ Ραφανίδος ἀγρίας. Κεφ. ρλή.

Ῥαφανὶς ἀγρία, ἣν Ρωμαῖοι ἀρμοραχίδα καλοῦσι, φύλλα ἔχει ὅμοια τῇ ἡμέρῳ, πρὸς τὰ τῆς λαμψάνης μᾶλλον· ῥίζα δὲ ἰσχνή, μακρή, ὑποδρίμυς· λαχανεύεται τά φύλλα καὶ ἡ ῥίζα ἐφθά· ἔστι δὲ θερμαντικὴ, οὐρητικὴ, καυστικὴ τῶν δήξεων.

Περὶ Σίσαρι. Κεφ. ρλθ'.

ΣΙΣΑΡΟΝ γνώριμον, οὗ ἡ ῥίζα ἕφθη, εὔστομος, δύστομαχος, οὐρητικὴ, ὀρέξεως διεγερτική.

Περὶ Λαπάθου. Κεφ. ρμ'.

ΛΑΠΑΘΟΝ, ὃ καὶ αὐτὸ ὀξυλάπαθον λέγεται. φύεται δὲ ἐν ἕλεσι, σκληρὸν καὶ ἄκρα ἔχον τὸ δὲ πρὸς κορυφὴν, ἧττον ὅμοιον τῷ πρώτῳ. ἄλλο δέ ἐστιν ἄγριον, μικρὸν, πρόμοιον ἀρνογλώσσῳ, μαλακὸν, ἁπαλόν. ἔστι δὲ καὶ τρίτον εἶδος αὐτοῦ, ὃ ἔνιοι ὀξαλίδα ἢ ἀναξυρίδα ἢ λάπαθον καλοῦσιν, ᾧ φύλλα ὅμοια τῷ ἀγρίῳ καὶ μικρῷ λαπάθῳ, καυλὸς δὲ μέγας, καρπὸς ὑποξύς, ἐρυθρὸς, δριμὺς, ὅτι τῷ καυλῷ καὶ τοῖς παραφυάδων. πρὸς ταῦτα δὲ τὸ λάχανον μαλάσσει κοιλίαν ἐφθόν. ὠμὸν δὲ καὶ πλασσόμενον, μελικηρίδας σὺν ῥοδίνῳ ἢ κρόκῳ διαφορεῖ. τὸ δὲ σπέρμα τῆς ἀγρίας καὶ τοῦ ὀξυλαπάθου καὶ τῆς ὀξαλίδος, πινόμενον ὠφελίμως μὲν ὕδατος ἢ οἴνου, πρὸς δυσεντερίας καὶ κοιλιακὰς διαθέσεις, καὶ ἄσιτον στόμαχον, καὶ πρὸς σκορπίου πληγήν. ἐὰν δὲ προπίοι τις ὕδατι πιστεύσας πληγείς, αἱ δὲ ῥίζαι αὐτῆς ἐφθαὶ σὺν ὄξει ἐὰν ὠμαὶ καὶ ἅπλαθεῖσαι, θεραπεύουσι λέπρας, λειχῆνας, ὄνυχας λεπρούς. δεῖ δὲ προανασκάπτειν τὸν τόπον εἰς νίτρῳ ἐὰν ὄξει. θεραπεύει δὲ καὶ κνησμοὺς τὸ ἀφέψημα αὐτῶν ἐπιπλασθὲν ἢ λουθὲν μεμιγμένον. παρηγορεῖ δὲ ὠταλγίας καὶ ὀδονταλγίαν ἐφθεῖσα σὺν οἴνῳ καὶ ὀξυκλυζόμενα, διαφορεῖ καὶ χοιράδας καὶ παρωτίδας ἐφθαὶ σὺν οἴνῳ καταπλασθεῖσαι. καλλύνει δὲ, σὺν ὄξει καὶ σὺν

V. Crateuas. illud caput tribuit. Vulg. exēpl. non habent V. adde Hip. κραμβ. quo modo & Lacuna ex vet. cod. reſtituit. Add. L. cuius ex v. c. εἰς βορὸν

Addit Lacuna ex v. c. ἢ ὄμφ.

V codices aliqui iſta ſic legūt· λάπαθον δὲ μέγα ὃ ἔνιον χλωρομον καὶ ἐν ὄρεσιν ὅμοιον. καὶ τὸ δυνάμει τοῦ μικροῦ. ἐφάσαν δὲ οἱ ὑφοῦντες καυλὸν μὲν ὅμοιον δὲ καὶ παλάθῃ μελικηρίδας σὺν χόρτῳ διαφορεῖ· ἡ δὲ ῥίζα Lacuna ex v. c. ita diſtinguit, σκληρὸν καὶ ἄκρα ὀπτόν.

V addit μαλθακὸν ἀναμιγνὺς ἔχει ἡ ὑπερκοιλίαν.

Cat. ex αἱμωδίαν. Orib. ἐὰν τοῦ ὅμοιον τῷ περὶ τὰ οὖς legēdum ſubſcribit Plin. Ald. ξυτῷ

Lacuna ex vet. cod. addit ἀγρίου

V. χρῶνται ἐν μάγμασι, καυλὸς ἀπόξυς. Ald. ἀπόξυς, καρπὸς ὑποξύς

Ald. οἱ παραφυάδες

V quidam σὺν χόρτῳ

V. inſert συνέτριμμα

Sic legit Lacuna ex v. c. ſed vulg. exemplar tantum ἀλειμμένον

Verba hæc vetus epitome Dioſc. ad verbū reponit in cap. de ſylueſtri lapatho, & tranſpoſita aſſignat.

δίσμαλα δέ τινες χρῶνται ταῖς ῥίζαις πρὸς χοιράδας, περιαπτοντες τῷ τραχήλῳ. ἱστᾶσι καὶ ῥοῦν γυναικῶν πρηστικῶς λῦσαι. ἀφεψηθεῖσαι δὲ σὺν οἴνῳ καὶ πινόμεναι, ἰκτερικοὺς ἀποκαθαίρουσι, καὶ λίθους τοὺς ἐν κύστει θρύπτουσιν, ἐμμηνά τε ἄγουσι, καὶ σκορπιοπλήκτοις βοηθοῦσιν. A

V. λιθοτριβεῖς
V. λιθοπλῆκτ.

ad strumas nonnulli radicibus vinculo ex ceruice suspensis amuleti instar vtuntur. Sistunt & fluxũ muliebrem tritæ atque subditæ. Cum vino autem decoctæ ac bibitæ regio morbo laborantes persanant, calculos vesicæ comminuunt, menstrua cient, & à scorpione ictis auxiliantur.

Περὶ Ἱππολαπάθου. Κεφ. ρμά'. B

De Hippolapatho. Cap. CXLI.

De hippolapatho Gall. codex silet. V. epitome ἀδηστίαν τραχείας διαῤῥοίας.

Ἱππολάπαθον λέγουσιν εἶναι μέγα ἐν ἕλεσι ἡμερώμενον. Δύναμιν δ' ἔχει τὴν αὐτὴν τοῖς πρόσθεν εἰρημένοις.

Hippolapathum olus est magnũ, in paludibus nascens. Easdem autẽ vires habet, quas antè dicta lapathi genera.

Περὶ Λαμψάνης. Κεφ. ρμβ'.

De Lampsana. Cap. CXLII.

V. ἡμερίτης νάπυς. In veteri hic caput est circi Bononiens. Goup.

ΛΑΜΨΑΝΗ λέγουσιν εἶναι ἄγριον, ἐυφημότερον καὶ βύσμαχώτερον τοῦ λαπάθου. οὗ τὰ φύλλα καὶ ὁ καυλὸς ἐσθίεται ἑφθά. C

LAMPSANA sylvestre olus est, quod quidẽ plus quàm lapathũ alit, stomachóque est vtilius. Huius folia cauléque in cibo coquuntur.

Περὶ Βλίτου. Κεφ. ρμγ'.

De Blito. Cap. CXLIII.

ΒΛΙΤΟΝ, λαχανεύεται καὶ τοῦτο. ἔστι δὲ βύσμαλον, οὐδεμίαν ἔχον φαρμακώδη δύναμιν.

BLITVM quoq; estur oleris modo. Est autem aluo vtile, nullius medicamẽtosę facultatis particeps.

Περὶ Μαλάχης. Κεφ. ρμδ'.

De Malua Cap. CXLIIII.

ΜΑΛΑΧΗ ἐδωδιμωτέρα μᾶλλον ἢ κνηστὴ τῶν χερσαίων· κακοστόμαχος δὲ καὶ βύσμαλλον, καὶ μᾶλλον εἰ καυλοί· σύντριμμα δὲ καὶ κύστει ὠφέλιμοι. D

MALVA satiua cibo magis est idonea, quàm quæ locis incultis nascitur. Stomacho autem aduersatur, bonámq; facit aluum: sed multò magis caules, qui quidem intestinis ac vesicæ sunt vtiles. Vim porrò habent folia cruda, cum salis exiguo commanducata & ex melle illita, persanandarũ ægilopum. Verùm cum est inducenda cicatrix, ijs demùm citra salem vtendum. Illita quoque malua contra apum vesparúmque ictus est efficax. Quòd si quis ipsa cruda trita cum oleo antè perungatur, ab ijs minimè ferietur. Cum vrina autem adhibita, vlcera in capite manantia, furfurésque sanat. Cocta verò folia trita & ex oleo imposita, ambustis & erysipelatis prosunt. Eius ipsius decoctum insessione vuluas emollit: quin & ad intestinorũ, vuluæ sedisque rosiones commodè infunditur. Ius autem cum radice sua decoctę contra venena omnia valet, si à sorbentibus córinuò renouatur. Est & remedio contra phalangiorum morsus, atque lac euocat. Cæterùm semen addito sylvestris loti semine potum è vino, vesicæ cruciatus lenit.

Quidem inserit τὰ αὐθέρια καὶ ἑφθὰ πρὸς χυμῶν γενέσεις ἰσχνοῖ, τὰ φύλλα δ' ἐν ὄξυτοις ἐσθίεται.

Ἐδώδιμον τὸ ἔχει τὰ φύλλα ὠμὰ κεπαπλασθέντα καὶ μετ' ὀλίγων ἡδῶν μαστιχίζοντα αἰγιλώπια ἀμασηθῆναι σὺν μέλιτι. πρὸς μὲν τοι τὴν ἀπὸ λώσης δίγα τοῦ ἡδῶν χρηστέον αὐτῇ. ποιεῖ καὶ πρὸς μελιατῶν καὶ σφηκῶν πληγὰς καὶ ἁπλῶς ἀσινοῦ μὴν καὶ περιχρίσῃ δέ τις αὐτὰ ὠμὰ λεῖα σὺν ἐλαίῳ, ἀπλήκτους ἕξει μύας. μετ' οὔρου κεχαπλασθεῖσα, ἀχῶρας καὶ πίτυρα ἰᾶται. ἑφθὰ δὲ λεῖα τὰ φύλλα καὶ σὺν ἁλεύρῳ ἐπιθέμενα, πυρίκαυστα ἐρυσιπέλατα ὠφελεῖ. τὸ δὲ ἀφέψημα αὐτῶν, μαλακτικὸν ἕδρας κατάσημα ὑστέρας, εἰς τε ἐνείμασα πρὸς δυσμὰς ἐντέρων καὶ μήτρας καὶ διαχωλύσεων ἡμίσεια. ὁ δὲ ζωμὸς σὺν ταῖς ῥίζαις βοηθεῖ ἐφόλμοις πᾶσι τοῖς θανασίμοις, ἐξεραῖς δὲ διὰ συνεχοῦς πίνοντας. ὠφελεῖ δὲ καὶ φαλαγγιοδήκτους, καὶ γάλα κάθαρσιν. ὁ δὲ καρπὸς μετ' ὄξους λωτῆς ἀγρίᾳ σπέρματος, πινόμενος μετ' οἴνου, τὰ περὶ κύστιν ἀλγήματα παραύει. E F G

V. ἀπὸ τῆς παλαιᾶς. Sic Dodonæus.

Vsculus

De Atriplice. Cap. CXLV.

ATRIPLEX, quam nonnulli chrysolachanō, quasi aureū olus vocant, cognitum olus est: & duorū quidē generū: vnū enim est syluestre, satiuum alterū. Coctū id oleris instar estur, aluúmq; mollit: panos verò discutit, siue crudum, siue coctum illinatur. Semen autē ex aqua mulsa potū, regio morbo medetur.

De Brassica. Cap. CXLVI.

BRASSICA satiua bonam facit aluum, si modò leuiter feruefacta edatur. Nam percocta aluū sistit: multò verò magis bis cocta, quæq; in lixiuio cocta fuerit. Æstiua autē stomacho aduersatur, & acrior est. At quę in Ægypto nascitur, propter amaritudinē non estur. Quibus obtusior est oculorū acies, ac tremulis in cibo auxiliatur: itémque summo sumpta cibo noxas ex crapula largioréq; vini potu pellit atq; restinguit. Eius verò cyma stomacho quidem vtilior, sed acrior, & ad ciendá vrinam validior. Eadem sale cōdita stomacho inimica est, aluúmque cōturbat. Porro brassicæ crudæ succus cum iride ac nitro deuoratus, aluum emollit: potus autē è vino, à vipera cōmorsis opitulatur. At cum fœnigræci farina & aceto, prodest podagricis & articulario morbo laborantibus. Cōfert quoq; illitus sordidis ac vetustis vlceribus. Per se verò naribus infusus, caput expurgat. Quin & menses extrahit cū loliacea farina subditus. Illita per sese folia, aut cum polenta trita, valēt ad quasuis inflammationes & œdemata: quin & erysipelata, epinyctidas lepráſque sanát. Cum sale verò carbunculos erumpūt: retinēt & fluentes capillos. Eadē cocta melle addito, valent aduersus depascētes gangrænas: cruda verò si ex aceto comedátur, lienosis prosūt. At cōmanducata ita vt deglutiatur succus, votem interceptá restituút. Cæterùm ipsius brassicæ decoctū potu aluum mensésq; ciet. Flos autē post puerperium in pesso subditus, cōceptionem impedit. Semé, eius præsertim quæ in Ægypto nascitur, potú lumbricos expellit, ac in antidota quoque theriaca additur: sed & faciei cutem lentiginésque expurgat.

A Περὶ Ἀτραφάξιος. Κεφ. ρμέ.

ΑΤΡΑΦΑΞΙΣ, οἱ δὲ χρυσολάχανον, λάχανον γνώριμον. διττόν, τὸ μὲν ἄγριον, τὸ δὲ ἡμερούμενον. λαχανεύει δὲ ὡς ἕφθη. ἔστι δὲ χυλίας μαλακτικόν. καὶ ἁπλᾶ σὺν μέλιτι ἐπιτιθέμενον ὠμὸν τὰ ἐφθὰ, φύματα διαφορῆσαι. ὁ δὲ καρπὸς αὐτῆς πινόμενος μετὰ

B μέλιτος πέπερι, ἑτέρου θεραπεύει.

Περὶ Κράμβης. Κεφ. ρμϛ'.

ΚΡΑΜΒΗ ἡ ἥμερος διχῶς ἐστίν, ἀγρία τε καὶ ἡμερουμένη. καὶ θερμαινομένη δὲ καὶ λίαν ἕψηται, καὶ μᾶλλον ἡ δὶς ἑψηθεῖσα, εὐκοιλίαν ἐμποιεῖ, καὶ κοσμάζει δὲ καὶ δριμύτερα ἡ θερμή. ἡ δὲ ἐν Αἰγύπτῳ, διὰ πικρίαν

C ἄβρωτος. ἀμβλυωπεῖν δὲ ποιεῖ καὶ βραδύτερον ἐσθιομένη, καὶ ἐὰς ἐκ κραιπάλης δὲ οἴνου καὶ κύβων σθένος ἔχει μεμεθυσμένων. ὁ δὲ ἐξ αὐτῆς χυμὸς εὐστομαχώτερον μὲν, δριμύτερον δὲ καὶ θρεπτικώτερον. παρηχεῖ δὲ, καὶ κοσμάζει καὶ χυλίας ζωμαντικόν. ὁ δὲ χυλὸς αὐτῆς ὠμῆς μὲν ἴριδος δὲ νίτρου καὶ λα-

Sic Lacuna ex antiquo codice. At vulg. exempl. habent ἁμύς.

D πτόμενος, κυλίδι μὲν λειπῇ· μετ' οἴνου δὲ πολὺς, ἐχιοδηκίοις βοηθεῖ· σὺν τηλίνῳ δὲ μέλιτι δὲ ὄξει, ποδαγρικοῖς δὲ ἀρθριτικοῖς, ἕλκεσί τε ῥυπαροῖς ἐπιπλασσόμενος καὶ παλαιοῖς ἁρμόζει· ἐγχριόμενός τε καθ' ἑαυτὸν τρίσι, κεφαλὴν καθαίρει· μετ' ὀξέος δὲ ἁλεύρου τροχισκοὺς, καὶ λαμύνια ἄγει· τὰ δὲ

E φύλλα καὶ ἁπλασσόμενα καθ' ἑαυτὰ ἢ μετ' ἀφίτων λεπτῶν, πολὺς πρὸς πᾶν φλεγμονὴν δὲ οἰδήματα. καὶ ἐρυσιπέλατα δὲ καὶ ἐπινυκτίδας δὲ λέπρας ἰᾶται μεθ' ὑγιοῦς δὲ ἄνθρακας περιῤῥήσσει· ἡ δὲ καὶ ῥύσιν τῶν ἐν κεφαλῇ θριχῶν· ἐφόλωμα δὲ καὶ μογιόμενα μέλλει, πρὸς νομὰς καὶ ἐγχρισθεῖσα πάσσει· ὠμὰ

F δὲ ἐσθιόμενα μεθ' ὄξους, σπλῆνας ὠφελεῖ. ἑψομένου δὲ, φωνῆς ἀποκοπὴν καθίστησι τοῖς χυλοῖς καταπινομένου. καὶ τὸ ἀφέψημα δὲ αὐτῆς, κυλίδι καὶ ἕλμινθι καὶ πτόμενον. καὶ τὸ αὐθις ἀπὸ τοῦ ἀποκλύσιον τροχίσκοις ἐν πόσει. τὸ δὲ σπέρμα μᾶλλον δὲ ἐν Αἰγύπτῳ γινόμενον πινόμενον, ἕλμιν-

G θας ἐκβάλλει μίσγει δὲ καὶ εἰς ἀντιδότους θηριακάς. πρόσωπον δὲ ἀποκαθαίρει δὲ φακούς. οἱ δὲ καυλοὶ χλωροὶ καθέντες σὺν τοῖς ῥί-

Sic vetustus quidam codex quem secuti sunt Ruellius & Serapio. At vulg. exempl. πεπεμμένοι legunt.

At verò virentes cauliculi cum ra-

ζας, ἢ ἀναληφθέντες σίαπι χειρείῳ παλαιῷ, πλευρᾶς χρόνια ἀγήματα ὀδυνῶντες παύουσιν.

Περὶ Κράμβης ἀγρίας. Κεφ. ρμζ'.

Κράμβη ἀγρία φύεται ἐν ὀρεσιπλήσιον ἐν παραθαλασσίοις καὶ κρημνώδεσι τόποις, ἐοικυῖα τῇ ἡμέρᾳ, λευκοτέρα δ' ἐστὶ καὶ δασυτέρα καὶ πικρά. τὸ δὲ κίνημα αὐτῆς ἐν κονίᾳ ἐφθὸν οὐκ ἄοσμον.

Δύναμιν δ' ἔχει τὰ φύλλα κατάπλασσόμενα κολλητικὴν τραυμάτων, καὶ διαφορητικὴν οἰδημάτων τῶν ἀπὸ φλεγμονῆς.

V. c. ἀπὸ θαλασσοκράμβης. Hipp. παράλιον quoque vocabat.

Περὶ Κράμβης θαλασσίας. Κεφ. ρμή'.

Ἡ δὲ θαλασσία λεπτοτέρα κράμβη, ἐλάττων τοῦ πολλοῦ τῆς ἡμέρου, ἔχουσα φύλλα πολλά, λεπτά, ἴσην τροχίλῃ ἀριστολοχίᾳ ὁμοία· ἐκ πίφυκε δ' ἕκαστον αὐτῶν ὀλίγου κλωνίον ὑποῤῥόδινον ἐξ ἑνὸς μέσου, ὡσαύτως χιόνος ἔχει δ' καὶ ὀπὸν λευκὸν, ὃν πολλοῦ. ἔστι δὲ τῇ γεύσει ὑφάλμυρος καὶ πόσῳ ἔμπικρος, λιπαρὰ δὲ τὴν σύστασιν. ἕλκη δὲ πόα, [κακοήθη, δριμέα,] κοιλίας λυθείσας ἐφθὴ βρωθεῖσα. συνέψουσι δὲ αὐτῇ ἔνιοι διαφορητικὰ τὰ λιπαρὰ τῶν ἰχθύων.

Περὶ Τευτλου. Κεφ. ρμθ'.

ΤΕΥΤΛΟΝ διττόν ἐστιν, ὧν ὁ μὲν μέλας σκληρότερον καὶ λίας σταφυλῆς ἐφθὸν καὶ μᾶλλον ῥίζα. τὸ δὲ λευκὸν, εὐκοίλιον. ἀμφότερα δὲ κακόχυμα διὰ τὸ ἐν αὐτοῖς νιτρῶδες. ὅθεν ὁ χυλὸς αὐτῶν καθαίρει κεφαλὴν μετὰ μέλιτος, καὶ ὠταλγίας ὠφελεῖ. ὁ δὲ τῶν ῥιζῶν καὶ τῶν φύλλων ἀφέψημα, πετύρων καὶ κονίδων σκληρῶν, καὶ χαλάσης τραχύνει καταῤῥεόμενον. ὁμοίως δὲ τοῖς φύλλοις κατάπλασσε δεῖ ἀλφοὺς προσκνησῶντας, καὶ ἀλωπεκίας κατακναθείσας, καὶ τὰ νεμόμενα ἕλκη. ἐφθὸν δὲ ἐξανθήματα καὶ πυρίκαυσα καὶ ἐρυσιπέλατα ἰᾶται.

V. ἀπαλῶν μὲν ὄντων.

Περὶ Ανδράχνης. Κεφ. ρν'.

V. addit τὸ σκοτῶν.

ΑΝΔΡΑΧΝΗ δύναμιν ἔχει συμπλοκὴν καὶ κατάπλασσομένη μετὰ ἀφίτου, καθαρῶς ἀγήματα τὰ ἐφθαλμῶν φλεγμονὰς καὶ τὰ ἀγάγγια· καὶ στομάχου πυρώσεις

A dicibus cremati, ac fuillo adipe peruetusto excepti, diuturnos laterum dolores impositi mitigant.

De brassica syluestri. Cap. CXLVII.

Syluestris brassica vt plurimùm locis maritimis præruptísque nascitur: satiuæ similis, sed cãdidior, hirsutior & amara. Huius cyma in lixiuio cocta ori non est insuauis. Illita verò folia vulnera conglutinandi, ac tumores inflammationésque discutiendi vim habent.

De brassica marina. Cap. CXLVIII.

Quæ brassica marina dicitur, à satiua prorsum dissidet: quippe quæ folia ferat multa ac tenuia, aristolochiæ rotundæ similia. Horum verò singula à ramulis rubẽtibus exeunt, singulari, velut hedera, pediculo. Porrò albo prædita est succo, sed minimè copioso. Gustu autem est vtcunque salso & quadantenus amaro: pingui verò substantia. Tota porrò herba stomacho inimica & acris est, aluúmque vehementissimè soluit, si cocta edatur. Sed propter acrimoniam nonnulli pingues carnes vnà cum ipsa concoquunt.

De beta. Cap. CXLIX.

BETA duûm est generum, è quibus nigra, ac ipsius maximè radix, cum lente decocta valentiùs aluum inhibet: candida verò aluo est idonea. Vtraque porro propter nitrosum quem in se habet humorem, praui est succi. Inde tamen fit, vt earum succus cum melle naribus inditus purget caput, & aurium doloribus opituletur. Decoctum verò radicum ac foliorum furfures lendésque deterget, & pernionis fotu mitigat. At crudis foliis vitiligines illum oportet nitro antea perfrictas, itémque alopecias priùs derasas, ac depascentia quoque vlcera. Cæterùm cocta, papularum eruptionibus, ambustis & erysipelatis medetur.

De Portulaca. Cap. CL.

PORTVLACA vim habet astrictoriam. Imposita cum polenta capitis doloribus, ac tum oculorũ, tum cæteris quoque inflammationibus: itémq; stomachi ardoribus,

& erysipelatis, ac vesicæ denique cruciatibus auxilio est. Pro cibo vero sumpta, détium stuporem, & stomachi ac intestinorũ æstuationem fluxionémque demulcet. Erosione tentatos renes & vesicam adiuuat, ac veneris impetus exoluit. Simili effectu prodest eius succus epotus, etiam in febribus efficax. Valet & diu multúmque cocta, contra teretes lumbricos, cruentam excreationẽ, ac dysenteriam: itémque ad hæmorrhoidas & sanguinis eruptiones, nec non & aduersus sepis morsus. Sed & oculorum medicamentis vtiliter admiscetur, ac intestinis fluxione laborantibus, erosíve vluis infunditur. Quin & ad capitis dolores ab æstu obortos cum rosaceo aut simplici oleo irrigatur. Erumpentes quoque in capite papulas cum vino exterit. Vulneribus denique quæ ad syderationem spectant, cum polenta imponitur.

A καὶ ἐρυσιπέλασι, καὶ κύστεως ἀλγήμασι βοηθεῖ· βρωθεῖσα δὲ αἱμοδίδυ, καὶ τυμάχου καὶ ἑτέρων πύρωσιν καὶ ῥυμιασμὸν παύει καθ' ὑγρόν· ἡφθοὺς τε διακριμένους καὶ κύστιν εὖ διαλύσει· καὶ τὰς τῶν σπερμάτων ὁρμὰς ἐκλύει· πυρετοῖς δὲ καὶ ὁ χυλὸς αὐτῆς ὀπτηθεὶς πινόμενος, καὶ ἐν πυρετοῖς ποιεῖ. καὶ τοὺς ἕλμινθας τροχίλους, αἵματός τε πλύσεις καὶ δυσεντερίας, καὶ πρὸς αἱμορροΐδας, καὶ αἱμορραγίας, πολύφθορος γενομένη. καὶ πρὸς σηπεδόνα. καὶ εἰς τὰ ὀφθαλμικὰ δὲ χρησίμως μίγνυται, ἔγκλυσμά τε ἕδη ἑτέραν ῥυμαλιζομένων. ἢ *** δαξομένης μίτρας· καὶ πρὸς τοὺς ἐξ ὑγρασίας κεφαλαλγίας, σὺν ῥοδίνῳ ἢ ἐλαίῳ ἔμβρεγμα. πρός τε τὰ ἐν κεφαλῇ ἐξανθήματα, σὺν οἴνῳ σμῆγμα· πρός τε βαύματα ἢ σφακελίζοντα, σὺν ὄξει καθαπλασσομένη.

B

C

Antiqui libri habent δαξομένης. Group.

* Περὶ Ἀνδράχνης ἀγρίας.

D Κεφ. ρνά.

Ἀνδράχνη ἄγρια λεγομένη, ἔχει κοῦπα *πλατύτερα φυλλάρια πρὸς τὴν ἀνδράχνης, ἢ δασέα. φύεται δὲ πετρώδεσι τόποις. ἔστι δὲ ὅτι καὶ ἐν κήποις. φύλλα ἔχει ὁμοία ἐλαίᾳ, μικρότερα ἢ πολλῷ, πλείονα δὲ καὶ ἁπαλά. κυλία ἐρυθρά, ἀπὸ μιᾶς ῥίζης πολλά, θέρους γλυκέα καρπούμενα. μαραίνεται δὲ εὐχύμως καὶ γλίσχρα καὶ ὑφάλμυρα. Δύναμιν δὲ ἔχει θερμαντικὴν, δριμεῖαν, ἑλκωτικὴν, χοιράδων ἀποφορητικὴν, σὺν ἀλεύρῳ καταπλασσομένη.

E

Sic Ald. Pand. habet.

Περὶ ἀσπαράγου. Κεφ. ρνβ'.

F Ἀσπάραγος πέτραιος ἢν μυακάνθαν καλέσι, γεύεσιμος. οὗ τὸ *καυλίον ἑφθὸν, καὶ βρωθὲν, χυλίαν μαλάσσει καὶ οὖρα κινεῖ. ἡ δὲ ῥίζαν τὸ ἀφέψημα πινόμενον βοηθεῖ δυσουρικοῖς, ἰκτερικοῖς, νεφριτικοῖς, ἰσχιαδικοῖς· φαλαγγοδήκτοις δὲ μετ' οἴνου ἀφεψόμενον. καὶ ὀδοντολγέσι δὲ, κατακυμένου τοῦ ἀφεψήματος ἕως τοῦ στόματος ὀδόντι. ποιεῖ δὲ τοὺς τὰ αὐτὰ καὶ τὸ σπέρμα πινόμενον. φασὶ

Marc. ἀγρίαν. Sic Ald. et Par. μυακανθαν.

De Portulaca syluestri. Cap. CLI.

Portulaca syluestris cognominata, foliolis est quàm antè memorata crassioribus atque densis. Locis petrosis nascitur: interdum & in hortis. Folia verò habet oleæ, sed minora multò, verùm plura eáque tenera: cauliculos rubicundos, ab vna radice frequentes, in terram inclinatos: qui quidem commanducati succulenti percipiuntur, viscidi, & subsalso gustu. Vim obtinet calfactoriam, acrem & exulcerantẽ: ac strumas quoque cum axungia imposita discutit.

De Asparago. Cap. CLII.

Asparagvs in petrosis natus, quem myacanthum vocãt, vulgaris est notitiæ. Huius cauliculus leuiter decoctus, & pro cibo sumptus, ventrem mollit, vrinámq; ciet. Radicum autem decoctum epotũ, ęgrè incientibus, regio morbo laborantibus, nephriticis & ischidiacis auxiliatur: itidémq; morsis à phalangio, siquidem ex vino decoquatur. Sic & dolore dentium infestatis proficit, si modò decoctũ super affecto dente cõtineatur. Semen quoq; potũ ad eadẽ valet. Aiũt

δὲ καὶ τοὺς κύνας πίνοντας τὸ ἀφέψημα αὐτῶν ἀποθνήσκειν. εἶναι δὲ ἱστοροῦσιν ὅτι ἐάν τις κριοῦ κέρατα συγκόψας καταρύξῃ, φύεται ἀσπάραγος. ἐμοὶ δὲ ἀπίθανον. A & canes si asparagorum decoctum hauserint, emori. Asparagum quoque altilem nasci prodidere nonnulli, si quis arietis cornua contusa defoderit: quod tamen mihi probabile non est.

Vetus manuscriptus addit.

Ὁ μὲν τοῦ ἀσπάραγος οὗτος, θάμνος ἐστὶ πολύκλαδος, φύλλα ἔχων πολλά, μακρά, ὅμοια μαράθρῳ· ῥίζα στρογγύλη, μεγάλη, ἔχουσα κάδυλον. οὗτινος ὁ καυλίον λειούμενον μετὰ οἴνου λευκοῦ, παύει B Φρενίτιδας. ἕφθος δὲ ἢ ὀπτὸς λαμβανόμενος, παύει στραγγουρίας, καὶ δυσουρίας, καὶ δυσεντερίας· ἡ δὲ ῥίζα αὐτοῦ ἐψηθεῖσα σὺν ὄξει ἢ οἴνῳ, παύει στρόμματα. ἐφθὴ δὲ μετὰ σύκων καὶ ἐρεβίνθων λαμβανομένη, ἰᾶται ἴσχιαν. καὶ παύει ἰγμὰς, καὶ στραγγουρίαν. σβεσθεῖσα δὲ, καὶ τὸ ἀπόζεμα αὐτῆς πινόμενον, παύει C ἀπόκλυσιν καὶ ἄγγειον.

Autem asparagus, frutex est ramosus, foliis numerosis, longis, fœniculo proximis: radice rotunda, grandi, tuberculum habēte. Huius cauliculus ex vino albo tritus, renum dolores sedat. Coctus autem assúsve asparagus in cibo sumptus, vrinæ stillicidium difficultatémque ac dysenteriam mitigat. Eiusdem radix in aceto aut vino decocta luxatos artus mulcet. Cum ficubus autem ciceribúsve decocta, sumptáque, regium morbum sanat, & coxendicum cruciatus, vrinæque stillicidium leuat. Cæterùm amuleti ratione alligata radix, itémque hausta ipsius decoctum, partum impediunt, sterilitatémque inducunt.

Nonnulli codices hæc aliquanto latiùs inscribunt, alius quidam paucioribus.

Περὶ Ἀρνογλώσσου. Κεφ. ρνγ'.

De Plantagine. Cap. CLIII.

Ἀρνόγλωσσον διττόν ἐστι· τὸ μὲν μικρόν· τὸ δὲ, μεῖζον ἔχει δὲ τὸ μὲν μικρὸν φύλλα στενότερα καὶ μικρότερα, καὶ μαλακώτερα, καὶ λεπτότερα, καὶ λεπτόπορα. καυλίον δὲ γωνιῶδες ἔχει μέχρι τῆς γῆς, αἰθῆ ὠχρά· ὃ δὲ σπέρμα ἐπ' ἄκρων τῶν καυλῶν. Τὸ δὲ μεῖζον, εὐερέστερον, πλατύφυλλον, λαχανώδες· καυλὸς δὲ ὀκτὼ τούτου γωνιώδης, ὑπόρυθρος, ὕψος πήχεως, ἐκ μέσου μέχρι κορυφῆς σπέρματι περιεχόμενος λεπτῷ. ῥίζαι δὲ ὑπόφαιοι ἁπαλαί, δασεῖαι, λευκαί, πάχος δακτύλου. φύεται δὲ τόποις πίλμασι καὶ φραγμοῖς καὶ ἐνύδροις τόποις. δύσχρηστότερον δὲ τὸ μεῖζον. Δύναμιν δὲ ἔχει τὰ φύλλα ξηραντικήν, συμπτικήν· ὅθεν καὶ καταπλασσόμενα πρὸς πόμφα τε καὶ καχηθῆ καὶ φλεγμονὰς ἐρυσιπελατικὰς καὶ ἀκανθώδη ψώρα ἁρμόζει· ἔχει δὲ καὶ αἱμορραγίας, νομὰς, ἄνθρακας, ἕρπητας, ἐπινυκτίδας· ἀπουλοῖ καὶ ἕλκη χρόνια καὶ ἀνώμαλα, καὶ τὰ χλοάσματα ἰᾶται, καὶ κόλπους πρασσόμενα· καὶ τὰ κινόδηκτα καὶ πνευματώσεις φλεγμονὰς, πρόσωδας, φύματα, χειράδας· ἔτι δὲ αἰγίλωπα σὺν ἁλὶ ὀπτὰ πλασσόμενα ὠφελεῖ. ἔφθὰ δὲ τὰ λαχανώδη μετ' ἁλῶν καὶ ὄξους λαμβανόμενα, δυσεντερικοῖς D Plantago duûm est generû: minor enim vna est, maior altera. Ac minor quidem, foliis prædita est angustioribus, minoribus, molioribus, læuioribus ac tenuioribus: cauliculis verò angulosis ad terram inclinatis: floribus autē pallidis, ac semine summis caulibus emicante. Ac maior, & amplior lætiórque est, & latifolia, in oleris vsum apta. Caulis huic angulosus, subruber, cubiti altitudine, à medio ad verticem tenui semine circundatus. Radices subiacent teneræ, hirsutæ, candidæ, digitali crassitudine. Nascitur in paludibus, sepibus ac locis vliginosis. Maior porrò, efficacior est. Vim habēt folia exiccatoriam & astringentem. Quare omnibus malignis, elephantiasin comitantibus fluxioni opportunis, sordidisq; vlceribus illita conueniunt. Cohibent & sanguinis eruptiones, nomas, carbunculos, herpetas, & epinyctidas. Vetera quoque & inæqualia vlcera cicatrice obducunt, Chironia sanant, & sinus agglutinant. Morsibus canis, ambustis igni, inflammationibus, parotidibus, panis, ac strumis quoque & egilopijs cum sale imposita prosunt. Coctum verò olus cum sale & aceto sumptum, dysentericis

fistulæ & sanguinis profluuia

Sūt antigrapha, in quibus periodus hæc μεῖζον usque ad χλοάσματα deest. sed retinenda sunt omnia.

Al. λαχανωδέστ.

V. μεῖζα

cœliacísque subuenit. Datur & in locum betæ, cum lenticula coctum. Exhibetur & herba decocta ad aquam intercutẽ, cui leucoplegmatiæ nomen est, post sicciorum alimentorum esum, ita tamen vt media cibis interueniat. Comitialibus quoque & suspiriosis data proficit. Foliorum succus oris vlcera repurgat, si subinde colluatur. Cum cimolia, aut cerussa erysipelatis medetur: fistulis infusus auxilio est: prodest & ad aurium dolores atq; ophthalmias, seu instillatus, seu in collyria additus. Sanguinantibus quoque gingiuis, & sanguinem supernè reijcientibus potu confert: clystere verò dysentericis infunditur. Contra tabem datur in potu, aduersus strãgulationes vuluæ subditur in vellere, quemadmodum & si vulua rheumatismo laboret. Semen ex vino potũ, alui profluuia & sanguinis excreationes sistit. Decocta radix seu colluta, seu cõmanducata, dentium dolores sedat. Eadem cum folijs, ad vesicæ renúmque vlcera in passo datur. Cæterùm ferunt ternas radices cum vini ternis cyathis, & aquæ pari modo tertianis febribus, itémque quaternas quartanis auxiliari. Sunt & qui radice vinculo è collo suspensa amuleti instar vtantur, ad strumas discutiendas.

Plin. sequalium putrefcentium.

De Sio. Cap. CLIIII.

SIVM aquaticum, frutex est pusillus, qui in aquis inuenitur, rectus, pinguis, folijs hipposelino similibus, sed minoribus & aromatici odoris: quæ quidem seu cocta, seu cruda esu calculos rumpunt & eijciunt: vrinas quoque ciẽt, ac menses & partus extrahunt, dysenteriçísque in cibo prosunt. De eodem Sio agés Crateuas, herbam esse tradit fruticis specie, exiguam, folijs prædictam rotundis, quàm mentæ maioribus, nigris, pinguibus, & ad erucam accedentibus.

De Sisymbrio. Cap. CLV.

SISYMBRIVM (alij serpyllum syluestre vocant) in solo inculto nascitur, mentæ hortensis similitudine, sed latioribus folijs, arque odoratius: quod quidẽ coronis inferitur. Calfaciendi vim habet:

A καὶ χιλιαχοῖς ἁρμόζῃ. δίδοται δὲ καὶ μεθ' ὕδατος αὐτὴ στύπτειν συνεφόμενον. ὑπὲρ τοὺς λευκοφλεγματίας, μεθ' ὑδροφαγῆσαι μίσον δίδοῦ· ἡ πόα ἐφθὴ ποθεῖσα καὶ ἐπιπλασσομένη, καὶ ἀνθρακιαῖς διδομένη. ὁ δὲ χυλὸς τῶν φύλλων λαβὰ τὰ ὠτα καθαίρει, συνεχῶς σὺν μέλιτι ἐγχυζόμενος. σὺν δὲ κιμωλίᾳ ἢ ψιμυθίῳ, ἰᾶται τὰ ἐρυσιπελατώδη σὺν ἰσχάδι τινὶ ἐγχυζόμενος ὠφελεῖ, καὶ πρὸς ὠταλγίας, καὶ ὀφθαλμίας ἐνταζόμενος ὁ χυλός, ἢ καλλυσμοῖς μισγόμενος. καὶ πρὸς ἕλκη αἱμαλοῦντα, καὶ πρὸς αἷμα ἀναγόντως πινόμενος. καὶ πρὸς δυσεντερικοὺς ἐγκυζόμενος. πίνεται δὲ καὶ πρὸς φθίσιν ἢ πρὸς ὑστερικὰς πήγας. πρὸς πάντα δὲ ἐρίῳ, καὶ ὑστέρᾳ ῥευματιζούσῃ. καὶ ὁ καρπὸς ἢ πινόμενος μεθ' οἴνου, ἕως τῆς χειλίας ῥευματισμοὺς, καὶ πύσεις αἱμάτων ἐπέχει. ἡ δὲ ῥίζα ἀφεψηθεῖσα ἢ ἐγκαλυζομένη καὶ διαμασωμένη, ὀδοντοπαλγίας παύει. πρὸς δὲ τὰ τῶν νεφρῶν ἕλκη καὶ νεφροῖς, δίδοται ἡ ῥίζα καὶ τὰ φύλλα μεθ' γλυκέος. φασὶ δὲ ῥίζας τρεῖς πεπεῖσαι μετ' οἴνου κυάθων τριῶν, καὶ ὕδατος ἴσου, τεταρταίῳ βοηθεῖν· τεσσαρσὶ δὲ τεταρταίους ῥίζας. ἔνιοι δὲ καὶ τὸ δίσμασι χρῶνται τῇ ῥίζῃ πρὸς χειμῶνας, καὶ ἀφροδισίων.

Hæc vsq; ad Δηλῶσαι in v. margine reperiũtur.

Locus hic suspectus est Marcello.

V. addit, ψιλοῖς ἢ

Pro his ad finem vetus codex hoc offert: καὶ καλλυσμοῖς μισγόμενος ὁ χυλὸς ὁ δὲ καρπὸς πινόμενος μεθ' οἴνου πρὸς κοιλίας ῥευματισμοὺς, ἕως τοσοῦτος ὁμοίως ῥίζα δίδοται μεθ' οἴνου αὐθημερὸν δοῦναι ἢ ἐνδιαλεῖπε χρόνον τὸ μὲν πρὸς χειμῶνας διαμένον. Sambuco à scriolo caposcriuendum ea regiõ addita videntur.

V. codex πρὸς χειμῶνας διαφέρων.

Περὶ Σίου. Κεφ. ριδ'.

E ΣΙΟΝ δὲ τὸ ὕδατον. θερίζεται δὲ τοῖς ὕδασι θαμνίον ὀρθὸν, λιπῶδον, φύλλα ἔχον πλατέα, ἱπποσελίνου ἐοικότα, μικρότερα δὲ καὶ ἀρωματίζοντα. ἄνθος ἐνθήμενα ἐφθά τι καὶ ὠμά, λίθους θρύπτει καὶ ἐκκρίνει· ὑρᾶ τε κινεῖ, καὶ ἔμβρυα καὶ ἔμμηνα ἄγει, δυσεντερικοῖς τε χρήσιμα βρωθέντα. Κραπώνας δὲ ἱστορεῖ περὶ αὐτοῦ οὕτω. πόα θαμνοειδὴς ὀλίγη, ἔχουσα φύλλα παραφερῆ, μείζονα ἡδύοσμου, μέλανα, πεπεφυσμένα. θύζουσι.

F

Quidam codices in margine ἀζόμενα, alius ἀδόσμου cum epitome

Quidam addunt πλατέα.

V. addit κνιφώδη. Sic & Orib.

Περὶ Σισυμβρίου. Κεφ. ριε'.

G ΣΙΣΥΜΒΡΙΟΝ (ἃ δὲ ἕρπυλλον ἄγχειον καλέουσι) τὸ χέρσιον φύεται, ἔοικε δὲ ἡδυόσμῳ κηπαίῳ, πλατυφυλλότερον δὲ καὶ θυωδέστερον, τῇ φυσικῇ δυνάμει.

Quidam vetustè caput hoc, in libro tertio locat quadragesimum nonũ. Alij prorsus excludunt. Sed sequens tantùm terminẽt cum titulo simplici σισύμβριον. Alij ἄγχιον. Orib. μέγα Orib. ἄδηλα

ἀρμόζει δὲ πρὸς στραγγουρίας καὶ λιθιάσεις τὸ σπέρμα· σὺν οἴνῳ πινόμενον· καὶ στρόφους καὶ λυγμοὺς παύει. τὰ δὲ φύλλα ὑπιπλάσσεται πρὸς κεφαλαγίαν καὶ τὰ πρόσωπα καὶ τοὺς μετώπους· πρός τε σφηκῶν πληγὰς καὶ μελιττῶν. ἵησι δὲ καὶ ἐμέτους πολλούς.

V. ubi hæc omittit.

A ac semen quidem ex vino potum, ad vrinæ stillicidia & calculos conuenit, itémque tormina & singultus sedat. Folia verò contra capitis dolorem fronti ac temporibus imponuntur. Valent & aduersus vespatum apúmque ictus. Cæterùm vomitiones quoque potu cohibét.

Περὶ ἑτέρου Σισυμβρίου. Κεφ. ριϛ'.

Σισύμβριον ἕτερον, οἱ δὲ, καρδαμίνην, οἱ δὲ, καὶ ὕπον αὐτὸ καλοῦσιν· ὕδρός ἐστι πόα, κατὰ τὰ αὐτὰ τοῖς σίοις γινομένη. καρδαμώλῳ δέ τινες λέγουσι, διὸ καὶ ἐσχέναι καρδάμῳ τὴν γλῶσσαν. φύλλα ἔχει μὲν πρῶτον στρογγύλα, ἀναφερῆ, αὐξόμενα δὲ σχίζεται ὡς τὰ τῆς βιζώμου. ἔστι δὲ θερμαντικὴν, οὐρητικόν. βιβρώσκεται δὲ καὶ ὠμόν. ἀποκαθαίρει δὲ καὶ φακοὺς, καὶ ἕφηλα· καταπλασθέντα δὲ ὅλης τῆς νυκτὸς, ἑωθεν δὲ ἀποκλυσθέν.

V. al. ἀναφυῆ, & quidem rectius ex Sambuci sententia.

Quidam χλωρὸν ὠμόν.

B *De Sisymbrio altero. Cap. CLVI.*

Sisymbrium alterũ sunt qui cardaminen, alij sion etiam appellant. Est verò herba aquatica, quæ in ijsdẽ quibus sion locis prouenit, Cardamine ideò nonnullis dicta, quòd gustu cardamum, id est, nasturtium, repræsentet. Folia primùm rotunda prodeunt: augescẽtia verò erucę C modo finduntur. Porrò excalfacit, vrinas mouet, ac crudum etiamnũ estur. Purgat etiam lentigines, ac vitia cutis in facie à Solis ardore contracta nocte tota impositum & matutinò detractum.

Περὶ Κεφάλου. Κεφ. ριζ'.

Κριθμον ἡ δὲ, κρίταμον δαμωνὶς ἐστὶ βοτάνιον, ἀμφιλαφὲς, παχὺ πῆχυν τὸ ὕψος. φύεται δὲ πετρώδεσι καὶ θαλασσίοις τόποις, φύλλοις παχέσι πλείοσι λιπαροῖς καὶ ὑπολεύκοις, ἴοις τῆς ἀνδράχνης παραπλήσιοις, πανικυλίοις μέν τισι καὶ ὀπτιμακάροις, ἀμυελίζουσι δὲ πρὸς τιλμὸν γεῦσιν, αὐθη λευκοῖς, ἁβρὸν δὲ καρπὸν ὡς σὺν λιβανωτίδος μεγέθει, εὐώδη, στρογγύλον, ὃς ξηρανθεὶς διίσταται· καὶ ἔνδον ὡς πυρὸν ἔχει τὸ σπέρμα· ῥίζας δὲ δακτύλου τὸ πάχος πρὸς ἃ τέσσαρας, εὐώδεις, ἡδείας. δύναται δὲ ὁ καρπὸς καὶ ἡ ῥίζα, καὶ τὰ φύλλα σὺν ἁφεψηθέντα οἴνῳ καὶ πινόμενα, κοιλιῶν δυσεντερῶσι καὶ ἰλιγγιῶσι καὶ σκοτωμένοις· λαχανευόμενα ἐσθίεται τε καὶ ὠμὰ ἐσθίεται, καὶ ἁλισχύεται εἰς ἅλμην.

Vulg. exempl. πλατύφυλλος. V. ad oram addit δαμωνίον, ἄλλο παχύτερον & post λευκοῖς subiicit, τοῦτο δὲ αὐθέκαστον παρὰ τοῖς Orib. addit μείζονα Vulg. exempl. πυρὸν

V omittit.

Lacuna est in vet. cod. ἡ ῥίζα ἐμπλάσσει καὶ ἡ ἀποφλοιωθεῖσα ῥίζα πρὸς ποδάγρας.

C *De Crithmo. Cap. CLVII.*

Crithmon, seu, vt alij, Critamon, fruticosa est herbula, foliis vndique densa, cubiti fermè altitudine, in petrosis & maritimis nascens, foliis referta pinguibus & albicantibus, portulacæ folia referentibus, crassioribus tamen atque longioribus, salsóque gustu. Flores verò gerit candidos, ac fructum ceu libanotidis mollẽ, odoratum, rotundum, qui quidem siccatus dehiscit, intúsque ceu tri- rumpitur
tici granum habet: radices autẽ digiti crassitudine tres aut quatuor, odoratas, & iucundi saporis. Porrò radix, semen & folia, incocta vino, potu ægrè meiẽtibus, & regio morbo laborantibus auxiliantur, mensésque cient. Cæterùm crithmon crudũ coctúmve estur oleris in modum, ac in muria quoque seruatur.

Περὶ Κορωνόποδος. Κεφ. ριη'.

Κορωνόποδος τρόμενος βοτάνιον καὶ ὃ ἑδάφους ἑρπόμενον, κατεμμαλισμένον τὰ φύλλα· λαχανεύεται δὲ καὶ τοῦτο ἐφθὸν ῥίζαν λεπτὴν ἔχον, συμπίνον, ἐναντιοῦται πρὸς κοιλιακοὺς πόνους. γίνεται δὲ ἐν χέρσοις τόποις, καὶ ἐν χώμασι καὶ ἐν ταῖς ὁδοῖς.

De Coronopode. Cap. CLVIII.

Coronopvs oblonga herbula est, humi strata, cui folia sunt per ramos
incisuris diuisa: arque hæc quidem oleris quoque modo cocta estur. Radicem porrò habet tenuem, astringentem, quæ cœliacis in cibo præclarè facit. Cæterùm prouenit locis incultis, in aggeribus, & seeus vias.

De Sonchо. Cap. CLIX.

SONCHI duo genera: vnum quidem agreſtius atque ſpinoſius: alterum tenerius mollíuſve & eſculentum. Caulis angulosus eſt, intus cauus, interdum & ſubrubens: folia in ambitu per interualla inciſa.

Vis vtriuſq; refrigeratoria, & modicè ſubaſtringens: vnde æſtuanti ſtomacho, & inflammationibus impoſiti proſunt. Succus ſtomachi roſionem ſorbitione mitigat, & lac euocat. In vellere autem appoſitus, ſedis ac vuluę inflammationibus opitulatur. Tam herba quàm radix impoſita ictis à ſcorpione auxiliatur. Eſt verò etiam tertius ſonchus itidem tener ac mollis, arboreſcés, latiſque conſtans folijs, quę quidem caulem in ramos exeuntem diſtinguunt: ſed & hic ad eadem pollet.

De Seride. Cap. CLX.

SERIS duûm eſt generum, ſylueſtris & ſatiua. Ex his ſylueſtris ea eſt, quæ & picris & cichorium appellatur: altera quæ hortenſis eſt, & latioris eſt folij, & ori gratior. Et hęc quidem rurſum genere duplex eſt: ſi quidem vna eſt lactucæ ſimilior, & latifolia: altera eſt anguſtiore folio & amarulenta. Omnes porrò refrigerant, aſtringunt & ſtomacho ſunt vtiles. Coctæ aluum ſiſtunt, ſi cum aceto ſumantur. Imprimis verò ſylueſtres, ſtomacho meliores. Quandoquidem in cibo ſumptæ diſſolutum æſtuantémque ſtomachum ſolantur. Impoſitæ verò cum polenta, ac per ſe quoque, cardiacis ſunt vtiles: podagris itidem & oculorum inflammationibus auxilio ſunt. At herba cum radice illita, percuſſis à ſcorpione ſubuenit, & eryſipelatis cum polenta medetur. Cæterùm earum ſuccus cum ceruſſa & aceto locis ijs commodè illinitur, quæ refrigerationem deſiderant.

De Condrilla. Cap. CLXI.

CONDRILLA, quam etiam cichorion aut ſerin appellant, folia, caulem & flores, gerit cichorij ſimilitudine: qua ex cauſa nonnulli ſeridis ſylueſtris ſpeciem eſſe pronunciarunt. Verùm tenuior tota eſt. Circa ipſos autem

A

Περὶ Σόγχου. Κεφ. ριθ'.

ΣΟγχοι δύο εἴδη· τὸ μὲν γὰρ ὄντιν ἀγριωδέστερον καὶ ἀκανθωδέστερον· τὸ δὲ, τυφερώτερον καὶ ἐδώδιμον. καυλὸς ἔχει γωνιοειδὴς, ἐνίοτε καὶ ὑπέρυθρος· φύλλα ἔχει ὅμοια ἁβροσήμῳ ἐχόμενα πλευρηδόν. Δύναμις δὲ αὐτῶν ἐστὶ ψυχικὴ, μετρίως ἀποφύουσα· ὅθεν τοῖς μὲν στόμαχον καυσουμένοις καὶ φλεγμοναῖς καταπλασσόμενοι ἁρμόζουσιν. ὁ δὲ χυλὸς καταῤῥοφούμενος, δυσεντερίαν στόμαχου καταπαύει· καὶ γάλα καταστέλλει δὲ οὐ μείω, δακτύλοις καὶ μίτραις φλεγμοναῖς βοηθεῖ. ἡ δὲ πόα καὶ ἡ ῥίζα καταπλασθεῖσα σκορπιοπλήκτοις ἀρήγει. ὁ δὲ ἕτερος σόγχος, ὁ καὶ τυφερὸς, δενδρώδης ἐστὶ, καὶ πλατύφυλλος· τὰ δὲ φύλλα ὁλόλευκα καυλὸν· καὶ οὗτος δὲ τὰ αὐτὰ ποιεῖ.

B

C

D

Περὶ Σέριος. Κεφ. ρξ'.

ΣΕΡΙΣ διττή, ἡ ἀγρία καὶ ἥμερος· ὧν ἡ μὲν ἀγρία, πικρὶς, ἡ καὶ χιχώριον καλουμένη· ἡ δέ ἐστι καὶ πλατυφυλλοτέρα, καὶ βύτομωτέρα τῆς κηπευτῆς. καὶ ταύτης ἔστιν εἴδη δύο· ἡ μὲν γάρ τις ὅμοιά ἐστι θριδακινοειδεστέρα καὶ πλατύφυλλος· ἡ δὲ, στενόφυλλος καὶ ἐμπικρος πᾶσα ἔστι σπληνικὴ, ψυκτικὴ καὶ βυτόμωχος. ἐσθίει δὲ καὶ κιλλίαν ἐφησὶ, μεθ' ὕδατος λαμβανόμενα. καὶ μάλιστα αἱ ἄγριαι βυτομωχοῦσι· βρωθεῖσαι γὰρ ἀποσιωπᾶ τὸ στόμαχον πλησμονῆσι καὶ καυσούμενον. καταπλασσόμεναι δὲ σὺν ἀλφίτοις, καὶ καθ' ἑαυτὰς, καρδιακοῖς εἰσὶ χρήσιμοι· ποδάγραις καὶ ὀφθαλμῶν φλεγμοναῖς βοηθοῦσι. ἡ δὲ πόα καὶ ἡ ῥίζα καταπλασθεῖσα, σκορπιοπλήκτοις ἀρήγει· καὶ ἐρυσιπέλασι σὺν ἀλφίτοις ἁπλῶς σὺν ἁμμιθίῳ· ἡ δὲ ὀξὺς ἐστὶν ὁ χυλὸς αὐτῶν· ὑποτιθέντος τοῦ ψύχους στομάχου.

E

F

Περὶ Κονδρίλλης. Κεφ. ρξά.

ΚΟΝΔΡΙΛΛΗ (οἱ δὲ, ἡ τὸ χιχώριον καλοῦσιν ἢ σέριδα) τὰ μὲν φύλλα καὶ τὸν καυλὸν, ἃ καὶ αὐτὴ ἔχει χιχορίῳ ὅμοια. ὅθεν καὶ εἶδος αὐτὸ τινὲς εἶπον σέριδος ἀγρίας, λεπτότερα δὲ ὅλον τὸν

G

V. addit ἀκάνθου ἰχνος.

Sic Ald. ac in Pariſ. deſiderantur.

Vide exempl. Lugdunenſe.

V. ἀποτίθεται.

V. κορυφὴ

χλωναείθης αὐτῆς βύρισκέται κόμμι. ὅ- A ramulos gũmi reperitur mastiches
μοιον μαστίχῃ, μεγέθη κυαμιαῖα· ἃ πνα simile, fabæ magnitudine: quod
τρίψαντα μετὰ σμύρνης λεῖα ἐν ἐγο- quidem cum myrrha tritum, & in
νίῳ μίγδος ἐλαίας, ἔμπαστα ἄγει. ὁ δὲ πόα linteo oliuę instar appositum, men-
σὺν τῇ ῥίζῃ κοπεῖσα, εἰς ἐγχύσεις αὐά- ses trahit. Herba verò cum radice
πλασιν μιγνυμένου μέλιτος· οἱ πίνες tusa melle adiecto diuiditur in pa-
διεθέντες καὶ νίτρῳ μιγέντες, ἀλφοὺς ἀ- stillos: qui quidem diluti admixto
ποσμήχουσιν. αἰμορροΐδας δὲ καὶ τείχας B nitro vitiligines emaculant. Sed &
κόμμι· καὶ ἡ ῥίζα δὲ τρίφατος ποιεῖ εἰς gummi pilos glutinat, ac ipsa quoq;
τὰ αὐτά, βαπτομένης εἰς αὐτλὸν βελό- radix recēs eadem præstat, si intin-
νης, καὶ προσαγομένης τοῖς θριξίν. ἁρ- cta eius succo acus pilis admoueatur. Contra viperas etiam ex vino
μόζει δὲ καὶ πρὸς ἕλκη, σὺν οἴνῳ πινομέ- pota proficit. Quin & ipsius succus
νη. καὶ χειλίαν ἴσχυσιν ὁ χυλὸς αὐτῆς ἐφ- cum vino, aut per sese decoctus at-
θεὶς σὺν οἴνῳ καὶ πολεῖς, καὶ καθ' αὑτόν. que potus, aluum sistit. Est porrò &
V. quidam non legit. ἔστι δὲ καὶ ἕτερον εἶδος κονδρίλλης, ἰφύλλον C aliud condrillæ genus, folio cir-
ὃ ἔχει περιερρωμένον, τρόμηκες, ὅπτι γῆς cumroso, oblongo & humi strato,
ἐρρωμένον. καυλὸν δὲ ὁποῦ μεστὸν· ῥίζαν caule verò succi pleno: radice te-
Orib. lib. 2. Synop. δὲ λεπτὴν, ἔπακμον, χύφλιν, τρογ- nui, vegeta, leui, rotunda, flauescen-
γύλλιν, ἰσόξανθον, ὁποῦ μεγίστη. Δυνά- te, succosa. Caulis & folia concoquendi vim habēt. Succus verò in-
μεν δὲ ἔχει ὁ καυλὸς καὶ τὰ φύλλα πε- commodos palpebrarum pilos re-
πτικόν. ὁ δὲ ὀπὸς, τείχων τὴν ἐν βλεφά- plicat. Cęterùm in lętis cultisque a-
ρεσιν ἀναχολλητικός. φύεται δὲ ἐν γεώδεσι D gris prouenit.
καὶ ἐργασίμοις χωρίοις.

Περὶ Κολοκύνθας. Κεφ. ρξϛ'.

V. carere. ΚΟΛΟΚΥΝΘΑ [ἐδώδιμος] ὠμὴ καὶ ἀπλαθεῖσα λεῖα, οἰδήμασι [καὶ
V. quidam carēt. ἀποπυήσεσι] πραΰνει. ὃ δὲ ξέσμα αὐτῆς
In scripris ξέσμα. Sed leue est differimé, inquit Goupylus. παιδίοις σιριῶσιν ὠφελίμως κατ' ὄγκρεισμα-
τος καὶ ἀπλάστου. ἡ πρὸς ὀφθαλμοῦ φλεγ- E
μονὰς ἡ ποδαγρικὰς ὁμοίως. ὁ δὲ χυλὸς
V. caret. τὴν ξυσμὸν βλιβέντων, ἰπρὸς ὠπαλγίας
καθ' ἑαυτὸν ἢ μετὰ ῥοδίνου ἐγχριόμε-
νος ὠφελεῖ· ἡ πρὸς καυσουμένου ὑπο-
φαίνει ἐγχριόμενος ὠφελεῖ· ὅλης δὲ αὐ-
τῆς ἀποζεσθείσης καὶ ἐκβλιβείσης ὁ χυ- F
λὸς πινόμενος μετὰ μέλιτος βραχίος καὶ
νίτρου, κοιλίαν λύει κούφως. καὶ εἴ τις κοι-
λίαιτο αὐτλῷ ὠμῷ, ἐγχέας τὸ οἶνον καὶ
V. codex διὰ ἐκθερμήσας, κεράσας τὸ πίνειν πρὸς, μα-
λακτικὴ κοιλίᾳ κούφως.

Περὶ Ἡμέρου σίκυος. Κεφ. ρξζ'.

ΣΙΚΥΣ ἥμερος βηχίλιος, βύσσμαχος, G ψυκτικὸς, οὐ φθείρμενος, κύστει ἁρμό-
διος, ἀναπτυκτικὸς λεπτυσμῶν ὀσφραν-
όμενος· καὶ τὸ σπέρμα αὐτοῦ μετρίως ἐρ-
ρητικὸν, ἁρμόζον σὺν γάλακτι ἢ γλυκεῖ

ramulos gũmi reperitur mastiches simile, fabæ magnitudine: quod quidem cum myrrha tritum, & in linteo oliuę instar appositum, menses trahit. Herba verò cum radice tusa melle adiecto diuiditur in pastillos: qui quidem diluti admixto nitro vitiligines emaculant. Sed & gummi pilos glutinat, ac ipsa quoq; radix recēs eadem præstat, si intincta eius succo acus pilis admoueatur. Contra viperas etiam ex vino pota proficit. Quin & ipsius succus cum vino, aut per sese decoctus atque potus, aluum sistit. Est porrò & aliud condrillæ genus, folio circumroso, oblongo & humi strato, caule verò succi pleno: radice tenui, vegeta, leui, rotunda, flauescente, succosa. Caulis & folia concoquendi vim habēt. Succus verò incommodos palpebrarum pilos replicat. Cęterùm in lętis cultisque agris prouenit.

De Cucurbita. Cap. CLXII.

CVCVRBITA esculenta cruda trita & imposita, œdemata & absessus mitigat. Ramentum ipsius infantium capitis ardore, quá siriasin vocant, laborantium sinciputi vtiliter adhibetur. Similiter quoque podagricis & oculorũ imponitur. Succus inflammationibus verò è strigmentis tusis, aurium doloribus tum per se, tum etiam cum rosaceo infusus auxiliatur. Valet itidē illitus ad perustam ardoribus corporis superficiem. Vniuersæ autem decoctæ & expressæ succus cũ melle exiguo & nitro potus, leuiter aluum soluit. Quin & si quis vinum in ipsam crudam & excauatam infusum, ac dio expositum, posteáque dilutum ieiunus biberit, leuiter aluum emolliet.

De Cucumere satiuo. Cap. CLXIII.

CVCVMIS satiuus aluo stomachóque vtilis, refrigerandi vim obtinet, si modò non corrumpatur, ac vesicæ prodest: olfactu verò defectos animo recreat. Sed & ipsius semen modicè vrinas cit, & cum lacte aut passo, vesicæ

veſicæ exulcerationibus ſubuenit. Cæterùm eiuſdem folia cum vino impoſita, canum morſus ſanant; ex melle vero, epinyctidas.

De Pepone. Cap. CLXIIII.

IPSA quoque peponis caro in cibis vrinas mouet: oculi verò inflammationes impoſita lenit. Eius verò ramentum infantium ſiriaſi laborantium ſincipiti imponitur: ac fronti quoque anacollematis vice adalligatur ad inhibendas oculorũ fluxiones. Porrò ſuccus cum ſemine adiecta farina ſiccatus in ſole, facié ſmegmatis vice purgat, illique nitorem conciliat. Cæterum ſicca radix ex mulſa drachmæ pondere pota, vomitiones mouet. Quòd ſi quis placidè ac citra moleſtiam vomere à cœna voluerit, oboli bini ſatisfecerint. Sanat quoque cũ melle impoſita capitis vlcera concreta in modum faui, quæ ceria vocant.

De Lactuca ſatiua. Cap. CLXV.

LACTVCA ſatiua ſtomacho vtilis, modicè refrigeratoria, ſomnum concilians, aluum emolliens & lac euocãs. Verùm decocta, magis alit. Stomachicis autem illotã eſſe proderit. Epotum verò ipſius ſemen venerem aſſiduè ſomniantibus opitulatur, & concubitum arcet. At ipſæ in cibo frequentiores, claritati oculorum officiunt. Muria etiã condiuntur. Cæterùm cum in caulem exierunt, vim quandam adipiſcuntur ſucco lactique ſylueſtris lactucæ ſimilem.

De Syluestri lactuca. Cap. CLXVI.

Syluestris autem lactuca ſatiuę ſimilis eſt, ſed ampliore caule prædita, foliiſque cãdidioribus, gracilioribus & aſperioribus, guſtu verò amara, ac viribus aliquatenus papaueri ſimilis: quam ob cauſam nonnulli etiam lacteum eius ſuccũ meconio permiſcent. Succus obolorũ duũm pondere cum poſca epotus, aquoſa per aluum expurgat. Quin & oculorum argema & caliginem exterit: efficaciter quoque cum lacte muliebri contra eorundem aduſtiones ſungitur. In ſumma ſomnum facit, & doloris leuamentum præſtat. Menſes quoque trahit,

A ποιεῖ δὲ καὶ τὰ φύλλα αὐτῆς οὕτω καταπλασθέντα, κυνοδηκλα ἰᾶται. σὺν μέλιτι δὲ, ἐπινυκτίδας. Quidem obiter ad latus folij extremi. Qui ego ſic ſcripſi à mihi.

Περὶ Πέπονος. Κεφ. ρξδ'.

H δὲ τοῦ πέπονος σὰρξ ἐν αὐτῇ οὐρητικὴ ἐσθιομένη καταπλασθεῖσα δ', ὀφθαλμῶν φλεγμονὰς παύει. τὸ δ' ῥάμμα αὐτοῦ σκιρτῶσι παιδίοις ἐπὶ τοῦ ῥάμματος ἐπιτίθεται, καὶ ῥυμματίζουσιν ὀφθαλμοῖς αἰτὶ ἀναλλήματος ἐπὶ τὸ μετώπιον, ὁ δὲ χυλὸς σὺν τῷ σπέρματι μιγεὶς ὑδρῳ καὶ ξηρανθεὶς εἰς πλίνθους, σμῆγμα γίνεται ῥυπτικὸν καὶ λαμπρωτικὸν τοῦ προσώπου. ἡ δὲ ῥίζα ξηρὰ πωθεῖσα σὺν ὑδρομέλιτι ἕλκη, ἐμέτους κινεῖ· εἰ δέ τις τοῦ μέσου ἀπὸ δείπνου ἐμέσαι θελήσειε, ἀρκέσουσιν ὀβολοὶ β'. ὑγιάζει δὲ καὶ κηρία καταπλασθέντα μετὰ τοῦ μέλιτος.

Περὶ Θριδάκων ἡμέρων. Κεφ. ρξε'.

ΘΡΙΔΑΞ ἥμερος διυπνιωτική, ἀποψύχουσα, ἀνατατική, κοιλίας μαλακτική, γάλακτος καταστατική. ἐψηθεῖσα δὲ γίνεται εὐφημωτέρα. ἄπλυτος δὲ ἐσθιομένη, σωματικοῖς ἀρμόζει. τὸ δὲ σπέρμα αὐτῆς πιόμενοι, τοῖς συνεχῶς ὀνειρώττουσι βοηθεῖ. καὶ σπερμοῦσίαν ἀποτρέφει. αὐταὶ δὲ συνεχῶς ἐσθιόμεναι, ἀμβλυωπίας εἰσὶ ποιητικαί. τεθειχόνται δὲ ἐν ἅλμῃ ἐκκαυλίσασαι δ', ἔχουσί τι πλησιάζον τῇ τοῦ χυλοῦ καὶ ὑποῦ δυνάμει τῆς ἀγρίας θριδάκος. V. addit ἀποψύχουσα. V. ἀναστατική

Περὶ ἀγρίας Θριδάκος. Κεφ. ρξς'.

Hδὲ ἀγρία θριδὰξ ἔοικε τῇ ἡμέρᾳ, καυλωδεστέρα δ', καὶ τοῖς φύλλοις λευκοτέρα, καὶ ἰσχνοτέρα καὶ τραχυτέρα ὑπάρχουσα· πικρὰ δ' ἐστὶ τὸν γλῶσσαν· ἐμμείσγεται δ' καπὶ ποσὶν τῇ δυνάμει μήκωνι, ὅθεν καὶ ὀπὸν αὐτῆς ἔνιοι μίσγουσι τῷ μηκωνίῳ. καθαίρει δ' μετ' ὀξυκράτου πωθεῖς ὀπὸς δυσὶ ὀβολοῖν ὀλκὴ, ὑδατώδη τε καὶ λίαν ἀποκαθαίρει δ' καὶ ἄργεμα καὶ ἀχλύν· πιεῖν δὲ τοὺς ὑπὸ κόπου ἐγχειρεῖν σὺν γυναικείῳ γάλακτι. ἔστι δὲ καθόλου ψυκτικὴ καὶ ἀποδυνωτική· ἄγει δὲ ἐμμηνία· Vulg. comp. τῇ μήκωνι Vulg. quod ſuperius ſcripſi τῇ δυνάμει Ven. Comp. codices μετ' ὀξυμέλιτος

πολίζει· ἢ καὶ πρὸς σκορπιοπλήκτους καὶ φαλαγγιοδήκτους. Ὃ δὲ σπέρμα ὥσπερ ὃ τῆς ἡμέρου πολύν, ὀνειρωγμοὺς καὶ στυφουσίαν ἀποτρέφει. Διώκεται δὲ καὶ ὁ χυλὸς πρὸς τὰ αὐτά, ἀσθενέστερος μόνον. Ἀποτίθεται δὲ ὁ ὀπὸς εἰς κεραμίους ἀγγείοις πρεσηλιαζόμενος, ὥσπερ καὶ τὰ λοιπὰ χυλίσματα. Περὶ Γιγγιδίου. Κεφ. ρξζ'.

ΓΙΓΓΙΔΙΟΝ, ⓐ δέ, λεπίδιον, φύεται πλῆθος ἐν Κιλικίᾳ τε καὶ Συρίᾳ βοτάνιον σφόδρα μόνον φυλίνῃ ἐοικὸς ἀγρίᾳ, λεπτοτέρα δὲ καὶ πικροτέρα· ῥίζιον λευκόν, πικρίζον. λαχανεύεται δὲ ὠμόν τε καὶ ἑφθόν, καὶ παρεσκευασμένον ἐσθίεται. ἔστι δὲ δύσπεπτον, οὐρητικὸν καὶ τὸ ἀφέψημα αὐτοῦ πινόμενον μετὰ οἴνου, κύστει χρήσιμον.

Περὶ Σκανδυκος. Κεφ. ρξη'.

ΣΚΑΝΔΥΞ, καὶ τοῦτο ἄγριον λάχανον, ὑποδριμύ, καὶ ἔμπικρον, ἐδώδιμον ἑφθὸν καὶ ὠμὸν ἐσθιόμενον, διγκίλιον καὶ δύσπεπτον. τὸ δὲ ἀφέψημα αὐτοῦ κύστει χρήσιμον καὶ νεφρῶν πόνοις καὶ ἥπατι.

Περὶ Καυκαλίδος. Κεφ. ρξθ'.

ΚΑΥΚΑΛΙΣ, ἔνιοι δὲ δαῦκον ἄγριον καλοῦσι, καυλίον ὃ ἐστι σπιθαμιαῖον ἢ καὶ μεῖζον, ὑπόδασυ· φύλλα ἔχον μαράθῳ ὅμοια· πολυσχιδῆ, δασέα. καὶ ἐπ' ἄκρου σκιάδιον λευκὸν, διῳδὲς. λαχανεύεται δὲ καὶ ἑφθὸν καὶ ὠμόν τε καὶ ἑφθὸν ἐσθιόμενον. ἔστι δὲ διουρητικόν. Περὶ ΕΥΖΩΜΟΥ. Κεφ. ρο'.

ΕΥΖΩΜΟΝ, τοῦτο ὠμὸν πλῆθος βρωθὲν στυφουσίαν πρόρμᾳ. καὶ τὸ σπέρμα δὲ αὐτοῦ τὸ αὐτὸ ποιεῖ· οὐρητικὸν ὑπάρχον καὶ πεπτικὸν καὶ διγκίλιον. χρῶνται δὲ καὶ σπέρματι αὐτοῦ καὶ εἰς τοὺς ὀρτύγας· ἀποπίνει δὲ αὐτὸ πρὸς τὸ πλεῖον ἓξ δραχμὰς ἀφ' ἡλίου δύντος χρόνον, ὅσον φυρᾶσαι τὸν ἄλικα, καὶ οἰναπλάσαντες ἐγχίσκους. Γίνεται δὲ καὶ ἄγριον βοτάνιον, μάλιστα ἐν τῇ κατὰ πλάτος ἠπείρῳ Ἰβηρίᾳ· οὗ τὸ σπέρματι δὲ αὐτοῦ σπάνιος ⓑ τῇδε ἀνθρώπου χρῶνται. ἔστι δὲ διουρητικώτερον καὶ δριμύτερον πολλῷ τοῦ ἡμέρου.

Περὶ Ωκίμου. Κεφ. ροα'.

ΩΚΙΜΟΝ γένεσιν βιβρωσκόμενον πολύ, ἀμβλυωπὲς ἐστι. Καὶ δὲ καὶ

& contra ſcorpionum ictus phalangiorúmque morſus bibitur. Semen æquè ac ſatiuæ potum libidinum imaginationes in ſomno compeſcit, venerémque inhibet. Succus ad eadem valet, ſed minùs efficax. Cæterum ipſius lac, cæterorum qui expreſſione eliciuntur ſuccorum inſtar, antea inſolatum in nouis fictilibus reponitur.

De Gingidio. Cap. CLXVII.

GINGIDIVM, quibuſdam Lepidium, cópioſiſſimum in Cilicia & Syria naſcitur, herbula ſylueſtri quidem paſtinacæ ſimilis, tenuior tamen & amarior, radicula candicante & ſubamara. Oleris inſtar crudum coctum conditúmve eſtur, ſtomacho vtile & vrinæ ciendæ vi prædituin. Quin & ipſius decoctum ex vino potum, veſicæ prodeſt.

De Scandice. Cap. CLXVIII.

SCANDIX, ſyueſtre quoq. olus eſt, ſubacre, amarum, atque eſculentum. Siquidem crudum coctúmve eſtur, aluo ſtomachóque vtile. Eius verò decoctum potu, veſicæ, renibus & iocinori prodeſt.

De Caucalide. Cap. CLXIX.

CAVCALIS, quam nonnulli ſylueſtrem daucum appellant, cauliculus eſt dodrantalis aut etiam maior ſubhirſutus, foliis fœniculo ſimilibus, quæ ſunt multis diuiſa inciſuris & hirſuta: candida in cacumine vmbella, eáque odorata. Et hæc quoque planta, cruda coctáve oleris modo eſtur, vrinámque ciet.

De Eruca. Cap. CLXX.

CRVDA eruca coitum largiore cibo concitat: ac ipſius quoque ſemen eiuſdē eſt effectus. Vrinas mouet, concoctionē iuuat, aluóque eſt accōmodata. Semine in condiēdis obſonijs vtuntur: quod vti diutius perennet, aceto lactéve ſubactum in paſtillos digerunt, atque ita reponunt. Naſcitur & ſylueſtris eruca, maximè in Iberia quæ Occidentē ſpectat, ac ipſius ſemine loci illius incolę pro ſinapi vtuntur. Eſt porrò quàm ſatiua ad mouēdam vrinam efficacior & multò acrior.

De Ocimo. Cap. CLXXI.

OCIMVM vulgo notum: copioſiore cibo acié oculorum hebetat.

Aluum autem emollit, flatus mouet, vrinas ciet,& lac euocat: ægrè tamen conficitur. Impositum cum polentæ polline, rosaceo & aceto, inflammationibus auxilio est, vt & draconis marini & scorpionis ictibus. Per se vero cum vino Chio, prodest oculorum doloribus. Succus oculorum caligines discutit, fluxionésque reficcat. Semen verò potum conuenit atram bilem gignentibus, ægrè meientibus, inflatisque: olfactu in nares attractum, subinde sternutamenta mouet: id quod & herba ipsa efficit: verum oculos comprimi oportet vrgente sternutamento. Eam fugiunt nonnulli ac edere quoque verentur: quòd commanducata & in sole posita vermiculos gignat. In cibum verò receperunt Afri, quia si feriantur à scorpione qui ocimum ederint, incolumes conseruentur.

Α λίας μαλακτικόν, πνευμάτων κινητικόν, ὑρητικόν, γάλακτος προκλητικόν, δυσεντερίαν ἰᾶται, καὶ ἐπιπλασσόμενον δέσει μετὰ φύτου πτισάνης, καὶ ῥοδίνῳ καὶ ὄξει, φλεγμοναῖς βοηθεῖ, καὶ δρακόντος θαλασσίου καὶ σκορπίου πληγῇ καθ' ἑαυτὸ δὲ σὺν οἴνῳ Χίῳ, πρὸς ὀφθαλμῶν ὀδύνας ὀ χυλὸς αὐτοῦ ἀποκαθαίρει ἀχλῦς ἅμα καὶ ὀφθαλμοῖς, καὶ τὰ ῥεύματα ξηραίνει. Τὸ δὲ σπέρμα πινόμενον, ἁρμόζει τοῖς μέλαιναν χολὴν ἐρεύγουσι καὶ δυσουρήσασι καὶ πνευματουμένοις. Ποιεῖ δὲ καὶ πλαρμοὺς πλείονας, ὅταν ἀσύμβολον δι' ὀσφρήσεως· ἐν ἡ πόᾳ ἢ ὃ αὐτὸ ποιεῖ συμπιέζειν ἢ σβύειν ὀφθαλμοὺς διὰ ὄπτικος ἢ πλαρμοῦ. Φυλάσσονται δέ τινες αὐτὸ καὶ οὐκ ἐσθίουσι, ἀφ' ὧν μαίνεσθαι καὶ πηδᾶν ἐν ἡλίῳ σκωλήκια φασίν. Λίβυες δὲ καὶ προσοφλίσκουσιν, ὅτι ἂν φαγόντας αὐτὸ ἢ πληγῆτε ὑπὸ σκορπίου, ἀπείρους ἀφ' ἑαυτῶν ποιοῦσιν.

Ale οἱ ἐλαιῶνες αὐτὸ πάμφυτον. quam vocem emendarunt Hermolaus & Ruellius

Marth. μαυρ χολὴν

V. πάλιν

De Orobanche. Cap. CLXXII.

Περὶ Ὀρεσβάγχης. Κεφ. ροβ'.

OROBANCHE cauliculus est subruber, duos ferè dodrantes altus ac interdum etiá maior, foliis subpinguibus, hirsutus ac tener, floribꝰ præditus subalbidis, aut in luteum vergentibus. Radix subest digiti crassitudine, perforata cum caulis arriditate flaccescit. Inter legumina quædá si nascatur, ea suffocare creditur: vnde & cognomen accepit. Estur autem oleris instar cruda, & in patinis asparagi modo decocta. Cæterum leguminibus incocta, horum coctionem accelerare perhibetur.

Ruellius iuxta Plinium ornithogalum, sua folia.

Ὀροβάγχη καυλίον ἐστὶν ὑποῤῥυθρον, λεπτόν, ὑπόλευκον, ὡς διαπάλαιον, οἷον τὸ δὲ μῆκος, φύλλοις ὑποπίονσι, ἐνδασυ, πυφερόν· αὐξησιν ὑπολευκοις ἢ μιλίζοισι κεχρημένον. ῥίζα δὲ ὕπεστι δακτύλου τὸ πάχος, καὶ κατατετρημένη ὥσπερ τὸν καυλὸν ξηραινόμενον. δοκεῖ δὲ φυόμενον ἐν ἀσπερίοις ποιεῖ πόλιν αὐτά· ὄθεν καὶ τὴν ὠμὸν καὶ ἑφθὸν, ὡς λεπάδος ὡς ἀσπάραγος ἐσθιόμενον· καὶ ὀσπρίοις συνεψηθὲν, ταχὺν αὐτὰ δοκεῖ ἑψεῖν.

Aldi. κατατετρημένη

De Barbula hirci. Cap. CLXXIII.

Περὶ Τραγοπώγωνος. Κεφ. ρογ'.

TRAGOPOGON seu tetrapogon, quem alij comen vocant, breui caule est, foliis croci, radice longa, dulci, nigro super caulem calyce: è cuius summo prolixa erumpit lanugo, a qua sibi nomen asciuit. Est vero herba ipsa esui apta.

Τραγοπώγων ἢ τετραπώγων, ᾧ δὲ, κόμην καλοῦσι, καυλὸς βραχὺς φύλλα κρόκῳ ὅμοια· ῥίζα μακρὰ, γλυκεῖα. ὅπερ ἐστὶ τοῦ καυλοῦ κάλυξ μέγας· ἐξ ἄκρου καρπὸς μέλας, ἀφ' οὗ καὶ τὸ ὄνομα ἔσχηκεν. ἔστι δὲ ἡ πόα ἐδώδιμος.

Quidam ἀνίσχει

De Ornithogalo. Cap. CLXXIIII.

Περὶ Ορνιθογάλω. Κεφ. ροδ'.

ORNITHOGALON cauliculus est tener, tenuis, subalbidus, circiter duos dodrantes altus, tribus aut quatuor in cacumine mollibus agnatis:

Ὀρνιθόγαλον καυλίον ἐστὶ ξυφερὸν, λεπτὸν, ὑπόλευκον, ὡς διαπάλαιον, αὖω τοῖς φυάδας ἔχον τρεῖς ἢ τέτταρας, ἁπαλὰς·

ἀφ' ἂν αὐξη ἔξωθεν μὲν βολβοειδὴς, λεῦκοις ριζίοις ἐπὶ γαλακτίζουσα· καὶ μεταξὺ αὐτῶν κεφάλιον ὡς κέγχρου ἐστὶ τετμημένον, μεθ' ἁλὸς συντριφθὲν ὡς μελάνθιον· ῥίζα ἡ βολβώδης· ἐσθιομένη ὠμή τε καὶ ἑφθή.

A è quibus flores prodeunt, qui foris quidē herbacei, at vbi expāsi sunt, lacteꝰ visuntur, ac inter eos capitulum canchrvos modo incisum emicat: quod cum pane affatur, veluti melanthiū. Radix est bulbosa, quæ cruda coctáque in cibos venit.

Περὶ Τύβης. Κεφ. ροέ.

ΤΥΒΗ ῥίζα ἐστὶ σφαιροειδὴς, ἄφυλλος, ἄκαυλος, ἀπόξυλος· ἔαρος ὀρυττομένη, ἐδώδιμος δέ ἐστιν ὠμή τε καὶ ἑφθὴ ἐσθιομένη.

B TVBER radix est orbiculata, sine folijs, sine caule, flaccescēs. Vere effoditur, ac seu crudā seu cocta, esui apta est.

Locum addit ex [illegible] codice ꝙ Dioscoridis

Περὶ Σμίλακος. Κεφ. ροϛ'.

ΣΜΙΛΑΞ κηπαία, ἧς ὁ καρπὸς λόβια· ἔστι δὲ οἱονεὶ ἀσπάραγος καλουμένη· φύλλα ἔχει κισσῷ ὅμοια, μαλακώτερα καὶ πυκνοτέρους ἢ λεπτοὺς· καὶ ἕλικας ἀσθενεῖς πλεγομένους τοῖς παρακειμένοις θαμνίοις· αὐξάνεται δὲ τὸ ἐφ' ἑκάστου, ὡς τε καὶ σκιὰν ποιεῖσθαι. καρπὸν δὲ φέρει ὅμοιον τῇ μακρᾷ πόᾳ ἢ ἐλάσσονα, ἐν οἷς σπέρματα ὅμοια τοῖς τῆς ἐρυσίμου· οὐκ ἴσης δὲ οὐδὲ μίας ἡ χρόα· ἀλλὰ ποικίλλονται. λαχανεύεται δὲ εἰς βρῶσιν ὁ καρπὸς, ἑψόμενος σὺν τῷ σπέρματι ὡς ἀσπάραγος· οὐρητικὸς ὢν καὶ δυσεντερικός.

C SMILAX hortensis, cuius fructus lobia, (quasi siliquulas dicas) & à nonnullis asparagus nominatur, folia habet hederæ, sed molliora: caules tenues, clauicularum instar sese propinquis fruticibus implicantes: qui quidem in tantum adolescunt, vt topiarij operis attegias seu cameras opacēt. Fructum autem profert fœnigręci, sed longiorē & insigniorem, intra quem semina concludūtur renum similia, non æquali quidem colore, sed ex parte rutescētia. Is porro fructus, seu potiùs siliqua cum semine, asparagi modo elixa oleris instar estur. Vrinā verò ciet, & grauia tumultuosáque somnia facit.

Hoc suspicatur Dioscoridem ex c. [illegible] similace hauri perperam hoc translatum.

Περὶ Μηδικῆς. Κεφ. ροζ'.

ΜΗΔΙΚΗ ἔοικε μὲν ἄρτι φυομένῳ ἰφύλλῳ τῷ ἐν χερρονησείοις τροφάδην, τριφυλλοτέρα γίνεται, καυλοὺς ἀνίσους τριφύλλῳ ὁμοίους, ἐφ' οἷς ὁ σπέρμα τοῦ αὐτοῦ φυτοῦ φακοῦ τὸ μέγεθος, ἐπιγραμμένον· ὡς κεγχρίον. ὅταν ξηρανθῇ, μίγνυται ἡδύσματος χάριν τοῖς ἁρτυτοῖς ἁλσί. χλωρὴ δὲ καταπλασθεῖσα, ὠφελεῖ πρὸς ψύξεως δεόμενα. ὅλη δὲ τῇ πόᾳ χρῶνται κτηνοτρόφοι αὐτῇ ἀγρώστεως.

D Is sorte fructus, seu potiùs siliqua cum semine, asparagi modo elixa oleris instar estur. Vrinā verò ciet, & grauia tumultuosáque somnia facit.

De Medica. Cap. CLXXVII.

MEDICA dum recens erumpit, trifolio in pratis nascenti similis est: tandem vero folia contrahit, caules edens trifolij, quibus semen adnascitur lentis magnitudine, siliquis intortis inclusum. Id siccatum, sali condimentario ad saporis iucūditatem admiscetur. Idem viride impositum ijs prodest, quibus refrigeratione opus est. Cæterùm herba tota pro gramine vtuntur qui iumenta pecoráque pascunt.

E

F

Περὶ Ἀφάκης. Κεφ. ροη'.

ΑΦΑΚΗ θαμνίον ἐστὶ φυόμενον ἐν ἀρούραις, φακοῦ ὑψηλότερον, λεπτόφυλλον· τὰ δὲ ἐπ' αὐτῇ φυόμενα μείζονα τῶν φακοῦ, τριεκπυκνὰ τὸν σπερμάτων τριῶν ἢ τεττάρων, μεγάλων καὶ μικροτέρων φακοῦ. Δύναμιν δὲ ἔχει τὰ σπερμάτια συμπλοκήν. ὅθεν ἕψοντες καὶ ῥοῦμα κοιλίας καὶ στόμαχου, φρυπτόμενα καὶ ἐφθόμενα καὶ ἐφόμενα, ὥσπερ φακός.

G

De Aphaca. Cap. CLXXVIII.

APHACA frutex est exiguus in aruis nascēs, altior lenticula, folijs tenuibus. Folliculos fert quam lenticula maiores, quibus exigua semina nigra terna quaternáve, minora lenticula, continentur. Hęc astringendi vim habent: quare frixa, fresa elixáve, lentis more, fluxiones alui stomachique sistunt.

De Porro. Cap. CLXXIX.

PORRVM capitatum inflationes facit, praui est succi, somnia tumultuosa parit, vrinam ciet, bonam facit aluum, extenuat, oculorum aciem hebetat, mẽses trahit: sed exulceratam vesicam renésque lædit. Cum ptissana verò coctum alitérve in cibo sumptum, eorum quæ intra thoracem hærent excreationé adiuuat. At coma in aqua maris & aceto cocta ad insidendum in vuluæ præclusione ac duritia vtilis habetur. Porrum autem bis aqua mutata coctum, frigidáque maceratú dulcescit, multóque minùs inflat. At sectiuum & acrius est, & astrictionis nonnihil obtinet: quare expressus ab eo succus cum aceto, addito thure aut manna, sanguinis profluuium sistit, maximè si naribus erumpat. Veneré item stimulat, & ad omnia thoracis vitia cum melle pro eclegmate vsurpatur: elicatum quoque contra tabem efficax est, ac spiritalem etiam canaliculam purgat. Sed si frequentiùs comedatur, visus obscuritatem inducit, ac stomacho etiã nocet. Succus ex melicrato potus, contra venenatarum bestiarum morsus auxilio est. Sed & ipsum quoque porrum impositú prodest. Quin & succus aurium doloribus & sonitui succurrit, cum aceto, thure, lacte aut rosaceo instillatus. Folia verò varos tollunt, cũ rhoë obsoniorum imposita, epinyctidásque sanant: ac vlcerum quoque crustas ex sale illita emarginant. Cęterú seminis bunæ drachmæ cũ pari myrti baccarũ pondere potę, veteres sanguinis supernè reiectiones cohibẽt.

De Ampelopraso. Cap. CLXXX.

Ampelopraſum ſtomacho quàm porrum magis aduersatur: sed plus quoque excalfacit, vrinásq; vehementius ciet: menses quoque pellit. Quin & contra bestiarum morsus in cibo conuenit.

De Capa. Cap. CLXXXI.

CÆPA longa acrior est quàm rotunda, itemq; rutſa quam candida, & sicca quam viridis seu recens, & cruda quam assata, aut sale condita. Sunt tamẽ omnes mordacitatis participes, inflationéſq; faciunt, appetentiam inuitant, attenuant, sitim gignunt, nauseam pariunt, expurgant denique, aluóque sunt vtiles. Tum excrementis alijs viam aperiunt, tum & hæmorrhoidas reserant.

A Περὶ Πράσου. Κεφ. ροϑ'.

ΠΡΑΣΟΝ κεφαλωτὸν, φυσωδες, καὶ ὀχυμον, δυσπεψον, οὐρητικὸν, δικχίλιον, λεπτυντικὸν, ἀμβλυωπίας ποιητικὸν, καὶ σκωληκίων ἀγωγὸν, βλαπτικὸν, κύστεως ἐλκωμάτων & νεφρῶν συνιζηθὲν ἢ πλειόνων & ἕρωδιὸν ἄλλως. καὶ ἀγᾷ τὰ ἐκ θώρακος. ἡ δὲ κόμη αὐτοῦ ἐν θαλάσσῃ καὶ ὄξει, εἰς ὑγκάθισμα χρησιμεύει πρὸς μύσιν καὶ σκληρίαν ὑστέρας. ἀπογλυκαίνει δὲ καὶ ἀφυσσότερον γινὲν δυσὶν ὕδασιν ἑψηθὲν, καὶ ἀποβρεχὲν ὕδατι ψυχρῷ. ὁ δὲ κάρπος δριμύτερος, ἔχων τι καὶ σύνεσιν· ὅθεν αἷμα ὁ χυλὸς σὺν ὄξει, & μᾶλλον ὅταν μυκλήρων φερόμενον, μέλιτος ἢ λιβανωτοῦ μιγνύμενος· ἀφεδρίσιά τε παρεμμένει καὶ πρὸς τὰ ἐν θώρακι πτύσματα σὺν μέλιτι αἵματος ἐκλείχεται πρὸς, καὶ πρὸς φθίσεις ἕρωδιὸν καθαίρει δὲ καὶ τὰ ἀρτηρίας. ἐαθιόμενον δὲ συνεχῶς ἀμαυρωτικὸν ὄψεως γίνεται· νάκισμα δὲ ἔστιν. ἀρήγει δὲ ἐνθηριοδήκτοις σὺν μελικράτῳ πινόμενος ὁ χυλός· καὶ αὐτὸ δὲ καταπλασσόμενον ὠφελεῖ. κοπὲν καὶ ὠπαλγίας ὁ χυλὸς καὶ ἦχος, σὺν ὄξει καὶ λιβανωτῷ καὶ γάλακτι ἢ ῥοδίνῳ ἐνσταλείς· αἴρει δὲ καὶ ἰόδηκτα τὰ φύλλα μετὰ ῥοῦ τοῦ ὅτι τὰ ὄψα καταπλασθέντα, καὶ ὀπισυκλίδας ἰᾶται, ἐχάρας τὰ ἀρρήκτῳ σὺν ὀξυμέλιτι ἐπιπλασσόμενον. ἢ μύτα τοῦ σπέρματος ἕως β'. μετὰ μύρτων ἴσων πόσει δοθεῖσα, τὰ χρονίους αἱμαγωγὰς τοῦ αἵματος ἐπίσχουσιν.

Περὶ Ἀμπελοπράσου. Κεφ. ρπ'.

Ἀμπελόπρασον, κακοστομαχώτερον τοῦ πράσου, δριμυτικώτερον δὲ καὶ ὑρηνικώτερον, καὶ ἀμυσίων ἀλωγόν. θηριοδήκτοις δὲ ἐνδεδεμένον ἀρωγόν.

Περὶ Κεφαλῆς. Κεφ. ρπά'.

ΚΡόμμυον δριμύτερον τὸ μακρὸν τοῦ στρογγύλου, & τὸ ξανθὸν τοῦ λευκοῦ, & τὸ ξηρὸν τοῦ χλωροῦ, & τὸ ὠμὸν τοῦ ὀπτοῦ & παρηρῶ. ἔστι δὲ ἅπαντα δηκτικὰ καὶ πνευματώδη, ὀρέξεως ἐκκλητικὰ, λεπτυντικὰ, διψώδη, διουρητικὰ, ἀποκαθαρτικὰ, βηχίλια, αἱματομιγῆ ἐκκρίσεων τοῦ ἄνω καὶ αἱμορροΐδων.

αὐτὰ βραχέως δὲ τεσσάρων λεπιδούμενα καὶ εἰς ἔλαιον ἐμβαπτόμενα. ὁ δὲ χυλὸς ἐξαιρέθεις σὺν μέλιτι βοηθεῖ ἀμβλυωπούσιν, ἀχλύσεσι, νεφελίοις, καὶ ἀρχομένοις ὑπογχεῖσθαι, καὶ συναγχικοῖς ἀφαιρεθεὶς κινᾷ τε καταμήνια καὶ ἄγει, ἐγχυτίς τε καθαρτικὸς ἀφ' ἑνὸς ῥινὸς κεφαλῆς κωνοδήκτοις δὲ κατάπλασμα μὲθ' ὕδατος καὶ πηγάνου καὶ μέλιτος σὺν ὄξει δὲ ὑπὸ ἡλίῳ καταχρισθεὶς ἥφους ἰᾶται· μεθ' ὕσσου δὲ κατὰ ὀδόντων ψωροφθαλμίας παύει, καὶ ἰσχίους σὺν ὑδρομέλιτι σὺν ὀρίνδῃ ὑγίασι, πρὸς δὲ τενεσμοὺς καὶ ὑπὸ δημάτων χρήσιμος· καὶ πρὸς ῥῶσιν κοιλίας ἢ δυσκοίαν καὶ συριγμοὺς, καὶ πυρέττουσι τὰ ὦτα. καὶ πρὸς τοὺς ἀπολύψεις τοῦ ὑδάτων τὰ ὑπὸ τοῖς ὠσὶν ἁρμούς· καὶ πρὸς ὑδρωπικίας τὰ ἐκτὸς ὀμφαλοῦ· τάχιστα γὰρ ὑδροποιοῦσι πρόσκαυσις τείχας. ἔστι δὲ ὁ χρόμμυον κεφαλὴν πλέον βρωθέν, ἐμφυσᾷ δὲ οὐρητικώτερον γινόμενον, πλέον δὲ ἑφθὸν ἐμφυσᾷ· καὶ καταπλασθὲν σὺν σταφίδι ἢ σύκῳ, φύματα πέττει καὶ διαῤῥήσσει.

A Subduntur verò pro balanis corticibus nudatæ & oleo immiſſæ. At ſuccus ex melle inunctus oculorum hebetudinibus, argemis, nubeculis & incipientibus ſuffuſionibus auxiliatur. Anginoſi itidem eo perunguntur. Sed & menſes ciet atque pellit, ac infuſus caput per nares expurgat. Canis morſibus cum ſale ruta & melle imponitur. Cum aceto autem in ſole perunctus, vitiligines ſanat: & cum pari ſpodio, ſcabras lippitudines ſedat. Varos quoque cum ſale reprimit. Contra calceamentorum attritus cum adipe gallinaceo vtilis eſt. Valet etiamnum ad alui profluuium, & auditus grauitatem auriúmque ſonitus emendat. Ad putulentas aures, itidémque interceptam aquam eliciendã prodeſt. Quin & alopecijs affrictus celerius quam alcyonium pilos euocat. Portò cæpa copioſius ſumpta, capitis dolores ciet, coctáque potentius vrinas pellit. Largiùs verò per aduerſam valetudinem eſitata, quantumuis cocta, lethargum accerſit. Cæterùm cocta & cum vua paſſa aut fico impoſita panos ſeu tubercula maturat & rumpit.

Περὶ Σκορόδου. Κεφ. ρπβ'.

De Allio. Cap. CLXXXII.

ΣΚΟΡΟΔΟΝ τὸ μὲν ὄντως ἥμερον καὶ κηπευτὸν, καὶ τοῦτο τὸ Αἰγύπτιον μονοκέφαλόν ἐστιν ὥσπερ τὸ πρᾶσον, γλυκὺ, ἐμπύρευμον, μικρόν. τὸ δὲ λοιπὸν πολύκρανον, λευκόν. καλοῦσι δὲ τὰς ἐν αὐτῷ ῥάγας ἄγλιθας. ἔστι δὲ καὶ ἄλλο ἄγριον, ὀφιόσκορδον καλούμενον. δύναμιν δὲ ἔχει δριμεῖαν, θερμαντικὴν, διαπτικὴν, διουρητικὴν, φυσώδη, καὶ κοιλίας ταραχτικὴν ξηραντικὴν τοῦ αἵματος, δίψος ποιητικὴν καὶ ἐμπυρευματώσεως, ἑλκωτικὴν ὀπτασίας, ὀμμάτων ἀμβλυωπικὴν. [πρὸς αὐτὰ δὲ ποιεῖ καὶ ὁ ὀφιόσκορδον βίβρωσκόμενον, ὃ καὶ ἐλαφοσκόρδον λέγεται]. βιβρωσκόμενον ἕλμινθας πλατείας ἐξάγει. καὶ ὕδρα καταγέν, ἐχιοδήκτοις τε καὶ αἱμορροοῦσιν ἁρμόζει ὡς οὐδὲν ἕτερον, λαμβανομένου οἴνου σὺν ξηρῷ, ἢ σὺν οἴνῳ λεανθὲν καὶ πολύ. καταπλάσσεται δὲ

E Allium quoddam eſt ſatiuum & hortenſe: quod quidem in Ægypto, porri modo, ſingulari capite reperitur, dulce, parium ac purpuraſcens: alibi vero multiplici capite ſeu nucleo coagmentatum viſitur, atque cãdidum: ac eiuſmodi quidẽ nucleos ſeu ſpicas, aglithas Græci nominãt. Eſt & aliud ſylueſtre, quod ophioſcorodon, quaſi anguinum allium, appellatur. Vim porrò acrem obtinet allium, excalfacit, mordet, flatus pellit, aluum turbat, ſtomachum exiecat, ſitim gignit, inflationemq; facit, ſummã corporis cutẽ exulcerat, & oculorum aciem eſu hebetat. Eadem præſtat eſitatum ophioſcorodon, quod & elaphoſcorodon, quaſi ceruinum allium, nuncupatur. Sed & latas quoque tenias in cibo pellit allió, vrinaſque detrahit: morſis à vipera & hæmorrhoo maximè ſi quid aliud confert, dum modò continuò poſt vinum ſuperbibatur, aut ipſum è vino teratur ac in potione ſumatur. Quin & in eoſ-

a V interponit ἐ χρῶτι
V. cæteri carent: V caret vſque ad ταῦτα.
Drag. δὲ ἢ καὶ φαλακρίας, καὶ ἀποπλανᾷ τὰ ὄμματα ἢ ἀφαιρεῖται τὴν ὄψιν λαθραίως τὴν ἀφὴν ἢ ἀφαιρεῖται τὴν ὄψιν. Add Aldi ἐφ' ὕδατος.

Lacuna in cod. vetibus aliquot. Ita Ruell. Λευκόιον δὲ τὸ μὲν ἥμερον ἐν κήποις γινόμενον, ὅ τινες τὸ Αἰγύπτιον καλοῦσι, μονοκέφαλόν ἐστι καὶ ἄλλο ἄγριον ὀφιόσκορδον καλούμενον ἔχει δύναμιν θερμαντικὴν διαπτικὴν διουρητικὴν φυσώδη &c.

Orib. λευκόιον καὶ λεῦσον

Vulg exemp. omittunt vſque ad χαλεπόν.

Al μὲν πολυκέφαλον

Vetus omittit vſque ad διαπτικὴν.

V. Goupyli δύναται οὖν αὐτὸ θερμαίνειν, & ita deinceps.

Vulg excepl. carent.

Pariſ ouarida

Vulg excepl. ποιεῖται, ἐμπυρεύματα ἐπιπολάζοντα ἐν τῷ σώματι.

Sic v. c. quem ſecutus eſt Ruell.

V. Goupyli καὶ ἐπὶ τοῦτο ἐπιφέρεται

Concluſi non habentur in vulgatis exemplaribus Prohibet vero Cotaeus exemp. Ἐλαφοσκόρδου, αἱ δὲ ἀκτῖνες διαπλάσσουσι δὲ λεπρὰ καὶ ἐπιπολάζοντα φύματα καὶ ἐπιπολάζοντα ἐν τῷ σώματι ἐπιπολάζοντα ἐν τῷ σώματι, διαπτικὸν, διαπλάσσει, συναγωγὰς ποιεῖται ἐπιπολάζοντα ἐπιπολάζοντα, ξηραντικὸν συναγωγὴν ἢ ἐπιπολάζοντα ἐπιπολάζοντα.

Reſtituo fortaſſe ἐπιπολάζοντα, vel ὑφ' ἑαυτοῦ ἐπιπολάζοντα.

dé vſus,& cõtra canis rabioſi morſus vtiliter imponitur. In cibo verò ſumptum contra mutationes aquarũ proficit, [fauces expediẽdo,eaſdémque aſperas leniẽdo] voci ſplẽdorem affert,veterẽ tuſſim crudum coctúmve in cibo lenit.Potum autẽ cum origani decocto,pediculos ac lendes enecat.Combuſtum ac melle ſubactum illitumque,oculorũ ſugillationibus & alopecijs medetur: ſed in alopecijs curandis vnguentũ præterea nardinũ additur. Cũ ſale verò& oleo ſanat papularũ eruptiones. Vitiliginem quoque,lichenas, lentigines,vlcera capitis manantia, furfures ac lepras cum melle eximit.At cum thure & tęda decoctũ ac in ore detentum, dentium dolorem imminuit.Cum ficulneis foliis & cumino,cõtra muris aranei morſus imponitur. Comæ decoctũ fœminarum deſeſſionibus additum, menſes ſecundáſque partus extrahit.In eundem quoque vſum ſuffumigatur.Cæterùm factum ex eo & oliua nigra intritum, quod myrtoton vocant, eſu vrinam cit, ora venarum patefacit , ac hydropicis quoque eſt vtile.

De Scordopraſo. Cap.CLXXXIII.

NASCITVR· Scordopraſon porri magnitudine,allij & porri qualitatum particeps: quapropter mixtas quoque vires obtinet,eadẽ præſtans quę allium pariter ac porrum, ſed efficacia minore. Coctum id porri modo dulceſcit, & in olerum vicem tranſit.

De Sinapi. Cap. CLXXXIIII.

SINAPI ſeu napy eligito non magnoperè aridum,& valdè rufum atque plenũ, quódque fractum internè viride ac veluti ſuccoſum & glaucum conſpiciatur.Tale ſiquidẽ recẽs ac tempeſtiuum habetur. Ad calfaciendum,attenuandum, attrahendúmque efficax eſt. Commanducatum autem valet ad pituitam capitis eliciendam. At ſuccus ex aqua mulſa, contra tonſillarum præduros tumores,veterẽſque & calloſas arteriæ ſcabritias gargariſatu prodeſt. Ipſum verò ſinapi tritum & naribus admotum ſternutamenta ciet. Comitialibus quoque auxiliatur,& vuluæ ſtrãgulatu oppreſſas

Λ ιατρός τε ζωῦπα καὶ ὅτι τὴν λυσσώδη τῶν
ὠφελίμως. βιβρωσκόμενον δὲ καὶ ταῖς
βοὶς ξενισμοὺς τὴν ὑδατῶν ἁρμόζει, ἀρ-
τηρίας λαμπρύνει, καὶ βῆχας χρονίας πα-
ρηγορεῖ, ὠμόν τε καὶ ἑφθὸν ἐσθιόμενον φθεί-
ρας ἢ καὶ κόνιδας φθείρει σὺν ἀφεψήμα-
τι ἐλαίου πινόμενον. καὶ ἐν δὲ καὶ μέλιτι V in margine καὶ
Β φυρασθὲν, λειχῆνα καὶ ἀγριωπίας ἰᾶται ἀλωπεκίας ἰᾶται
καταχριόμενον. ἔστι δὲ τὴν ἀγριωπικὴν σὺν ναρδίνῳ μύρῳ * καὶ ἀγρίῳ καὶ ἐλαίῳ,
ἐξανθήματα θεραπεύει· ἀφίστησι γὰρ καὶ
ἰώδεις καὶ λειχῆνας καὶ φακοὺς· ἀχῶρές
τε καὶ πτύρα καὶ λέπρας σὺν μέλιτι.
μετὰ δαδίου ἢ καὶ λιβανωτοῦ ἐμφθὲν, ὀδον-
C ταλγίαν ἀμάσσεται σὺν ταῖς σταμ- Al. διαμασσόμε-
νοις, sed mendoſa.
πουφίζει· μυγαλῆς τε ὀδὼν καταπλα-
σμα σὺν συκῆς φύλλοις καὶ κυμίνῳ. τὰς ἢ
κόμης ὃ ἀπόζεμα, εἴ καθίσμα ἐμμηνίων
καὶ ὑστέρων ἀγωγόν· τοῖς ὃ αὐτὸ ἢ καὶ ὑ-
ποθυμιᾶται. ὃ ἢ ἐξ αὐτῆ καὶ ἡ μελαίνης
ἐλαίας γινόμενον πεῖμμα, καλούμενοι ἢ-
D * μύρτον, οὖρον κινεῖ καὶ ἀναστομοῖ· χρή- Al. μυρσινῆς
σιμον ἢ καὶ ὑδρωπικοῖς ἐστίν. V

Περὶ Σκορδοπράσου. Κεφ. ρπγ'.

ΣΚΟΡΔΟΠΡΑΣΟΝ φύσει ὡς πράσον μέγα, μετέχει τῆς τῦ σκόρδου καὶ τῦ πράσου ποιότητος· ὅθεν καὶ τὴν δύναμιν μικτὴν ἔχει, ποσῷ ὅσα καὶ τὸ σκόρδον καὶ τὸ πράσον· ἀνάλογον μάλιστα λαχανεύεται ἢ εἰς βρῶσιν ὡς τὸ πράσον ἑψόμενον καὶ ἀποχλυκαινόμενον.

Περὶ Σινήπεως. Κεφ. ρπδ'.

ΣΙΝΗΠΙ ἤτοι σίναπυ, σκληρὸν τὸ μὴ κα- Al. σίνηπι καὶ σίναπυ
τάξηρον καὶ κατάπυρρον, ἁδρόν, ὅλον ὁ
F δὲ θλασθὲν, ἔνδοθεν χλωρὸν ἐξ οἰονεὶ ἔσ- V. non habet.
χυλον, γλαυκόν· πρόσφατον δὲ καὶ ἀ-
κμαῖον τὸ τοιοῦτον. Δύναται δὲ θερμαί-
νειν, λεπτύνειν, ὀπτασάσθαι, ἀποφλε-
γματίζειν ἀθροισθὲν. μιγὲν δὲ ὁ χυ-
λὸς αὐτῦ· ὑδρομέλιτι, τοὺς αὐχένας V. μετὰ μέλιτος
καὶ τὰς χρονίους παχύτητας τῆς ἀρτηρίας
ἐκτυλοῦσι, διαγλαρίζοντος ἁρ-
μόζει· πρόσκειται ἢ τοῖς μυκτῆρι λόγοις,
πρὸς ἁρμοὺς κινεῖ· ὀπτὸν λιπόψυχοις τε βοη-
θεῖ, καὶ ὑστερικῶς πνιγμὸν διεγείρει.

dine, cui pauci adnascuntur ramuli: circa vero ipsum eorum fructus est, summa sui parte modice latus: quo semen includitur exiguum, nasturtio simile, discifi effigie, veluti intractum compressumve, vnde & nomen accepit. Flos albicat. Nascitur in semitis, parietibus ac sepibus. Semen acre, excalfaciés: bilem vtrinque tam supernè quam infernè extrahit, acetabuli mensura potũ. Prodest & ischiadicis infusum: potu sanguinẽ educit, internósq; abscessus rumpit. Menses quoque ciet, & partus necat. Porro alterum etiam thlaspi recensent Crateuas, quod aliqui Persicum sinapi vocant, latis foliis & radicibus magnis: quod & ipsum ischiadicorum infusionibus admiscetur.

A μείζον· ὥσπερ φυάδας ὀλίζας ἔχοντα· καὶ τὸν ὅλον αὐτοῦ καρπὸν ὑποπλατυὴ ἐξ ἄκρου· ἐν ᾧ σπέρμα πονηρὸν ἐμφερὲς καρδάμῳ, δισχιδὲς, οἱονεὶ σὺν τετριβασμένον, (ἐξ οὗ καὶ τὸ ὄνομα ἔσχηκεν) κύπρος ἢ ὑποπλατυκοι. τὸ ὅλον δὲ καὶ ὅπου τοιχῶν καὶ ὅπου φρίσσῃ φυόμενον· σπέρμα δριμὺ, θερ-

B μαντικόν· χολὴν αἴρει τε καὶ κάτω καθαίρει, τὸν ἐν πλευρῖτιν ὀξυδαφοῦς· ἐκκλύζεται ἢ δι' ὕρου ἰσχιαδικοὺς· ἄγει ἢ καὶ αἷμα πολὺ, καὶ ἕλκη ἐντὸς ἀπόσασις ῥήγνυσι· κινεῖ ἢ καὶ καταμήνια, καὶ ἔμβρυα φθείρει. Ἱστορεῖ ἢ Κρατεύας καὶ ἕτερον θλάσπι, ὅ τινες Περσικὸν σίναπι καλοῦσι, πλατύφυλλον δὲ

C μεγαλόῤῥιζον· καὶ τοῦτο δὲ μίγνυται τοῖς κατὰ ἰσχιάδα ἀφέδροις.

Vetus scriptura ἢ τὸν ἐν πλευρῖτιν ὀξυδαφοῦς ἐκκλύζεται ἢ δι' ὕρου ἰσχιαδικοὺς ἄγει ἢ καὶ αἷμα πολὺ καὶ ἕλκη ἐντὸς ἀπόσασις ῥήγνυσι κινεῖ ἢ καὶ καταμήνια καὶ ἔμβρυα φθείρει.

Περὶ Δράβης. Κεφ. ρπζ.

D ΔΡΑΒΗ ἡ πόα πήχεως ἔχουσα ὕψος, ῥαβδοις λεπτὰς. περὶ ἑκάτερα ἢ τὰ φύλλα ὥσπερ λεπιδία, ἁπαλώτερα δὲ καὶ λευκότερα· ἐπ' ἄκρου ἢ σταφιδοειδῶς πως· ἄκρις, ἔχουσα αἴγλην λευκὴν. ταύτης ἡ πόα σωτήριος τῇ πλησμονῇ, μάλιστα ὁ ἐν Καππαδοκίᾳ· οὗ καρπὸς αὐτῆς ξηρὸς αἰτὶ πιπέρεως μίγνυται τοῖς κατοψήμασιν.

Forte ἀκρὶς. Vulg. κατὰ, ut & Cretum Matthiolo legi placet.

Περὶ Ερυσίμου. Κεφ. ρπη'.

E ΕΡΥΣΙΜΟΝ φύεται κατὰ τὰς πόλεις, καὶ οἰκήπεδα, καὶ κήπους· φύλλα ἢ ὅμοια βύζωμῳ ἀγρίῳ ἔχει· καυλία ἱμαντώδη, αἰθομενίζοντα· ἐπ' ἄκρων δὲ λοβοὶ κερατοειδεῖς, ἰσχνοὶ ὡς τήλιδος· ἐν οἷς σπερμάτια μικρὰ, καρδάμῳ κατὰ πλησίασ, πυρώδη καὶ τὴν γεῦσιν. ποιοῦσι τὰ

F πρὸς θώρακος ῥεύματα σπασμὸν, ἐμπύους, βῆχας, ἵκτερον, ἰσχιάδας, ἑλκόμενον· σὺν μέλιτι. πίνεται καὶ πρὸς τὰ θανάσιμα φάρμακα. καταπλασσόμενον ἢ μὲθ' ὕδατος ἢ μέλιτος, ὠφελεῖ καρκινώματα κρυπτὰ, σκληρίας, παρωτίδας, διδύμων ἢ μαστῶν φλεγμονὰς. λεπτύνει· τέ καὶ κα-

Aldi καὶ ἰσχιάδα ἢ σὺν μέλιτι πίνεται &c.

G θόλου θερμαίνει· διαχέει τε ἐν· δύναται εἰς τὰ ἕλκη ἐγκλείσματα, ὥσπερ βραχὺν ὕδατι καὶ φωκῆν, ἢ σὺν δόνι εἰς ὄξυνον καὶ ὀπὸν ὄξους καθεψόμενος.

Vulg. exempl. ἐγκλείσματα

Περὶ Πεπέρεως. Κεφ. ρπθ'. A De Pipere. Cap. CLXXXIX.

ΠΕΠΕΡΙ δένδρον ἰσορῆται φυόμενον ἐν Ἰνδίᾳ, βραχύ· καρπὸν δ' αἴνιττον, καλαμίσκοις μὲν τοῖς μηκωνίοις καὶ λοβοῖς, ὅσον δύο μακρὰ πίνακες· ἔχον δ' ἐντὸς κέγχρῳ παραπλήσιον, ὃ μέλλον ἴσασθαι τέλειον πίπερι. ὅσον κὴ τὸν οἰκείοις καιροῖς ἀναπλώμενον, βοτρυηδὸν αἴνιττον, κόκκους φέρειν ἔοικε· τοῦτον δ' ἐνίοτε ὁμφακώδη, οἵ τινες εἰσὶ τὸ λευκὸν πίπερι, βλητικῶτερον μάλιστα εἰς τὰ ὀφθαλμικὰ καὶ αἰτιοδότους καὶ θηριακὰς δυνάμεις. ἔστι δ' ὁ μὲν μακρὸς ὅτι πλατύτερος τοῦ ἀνθρακώδους, καὶ ὑποπύρρου, μᾶλλον δ' ἄνευρος, καὶ ὀπτοπόδους εἰς τὰς αἰτιοδότους καὶ θηριακὰς δυνάμεις. ὁ δ' ἧττον μέλας, ἥδιον καὶ δριμύτερον τοῦ λευκοῦ, καὶ εὐστομώτερον, καὶ μᾶλλον μᾶλλον ἀρωματίζον, εὐχρηστότερόν τι εἰς τὰς ἀρτύσεις. τὸ δὲ λευκὸν καὶ ὁμφακίζον, ἀνθενέστερον τοῦ προφρίμματος. συλλέγουσι δὲ τὸν καρπὸν ἐν πλήρεσι, μέλασι, μὴ σφόδρα ῥυσοῖς, μὴ σφοδρῶς δὲ ὠμοῖς· ἐπεὶ δὲ καὶ μὴ πυρωθὲν ὠμὸν ἐσθίεται δὲ τὸ τῶν μέλανι ἄσηπτον, κενὸν καὶ κοῦφον, ὃ καλοῦσι βρῶμα. Δύναμιν δ' ἔχει κατὰ θερμαντικήν, οὐρητικὴν, πεπτικὴν, ἐπισπαστικὴν, διαφορητικὴν, σημαντικὴν τοῦ τὰς χρόας ὑποκαπνοῦντων. ἁρμόζει καὶ ῥίγεσι παροδικοῖς, πυρέμασί τε καὶ συγχεόμενον καὶ θηριοδήκτοις δρήγει. ἀλήκει καὶ ἔμβρυα· δοκεῖ δὲ καὶ ἀτοκίαν ἐν μὴ σωτοκίαις προϊστάμενον βηξί τε καὶ πᾶσι τοῖς κατὰ θώρακα πάθεσιν ἁρμόζειν, ἔνιοι δὲ καὶ ποτήμασι λαμβανόμενον. Ὁ σὺν ἄγχουσι ἁρμόζει, διαχεόμενος σὺν μέλιτι καὶ τροφοῖς λύει πυόμενα μὴ δάφνης φύλλων ἀπαλῶν· ἀποφλεγματίζει δὲ σὺν σταφίδι διαμασηθὲν· αἰώδωνόν τε ὄζει καὶ ὑγιεινόν· καὶ ἕρεξιν κινεῖ. πίνεται τὸ σὺν ὀργείῳ μιγνύμενον εἰς βάμματα. αἱαλοφθὲν δὲ πίνεται, χολερικὰς διαφορεῖ. σμήχει δὲ ἀλφοὺς σὺν νίτρῳ· φώγνυται δὲ ἐπ' ὀστράκου κεκαυμένου ἐπ' αἰθρίᾳ

Lacuna ex vet. addit. restituta.

Lacuna legit in v. c. δὲ ὁ μὲν μακρὸς, ἢ καὶ βραχὺ ὑποπύρρου, ἧττον δὲ ἄνευρος καὶ ὀπτοπόδους εἰς τὰς αἰτιοδότους καὶ θηριακὰς δυνάμεις Deest in Ald.

V. addit ἀγχόμενον atque ita legit etiã Marcellus, vt & Serapio.

Marcellus ὑπὸ παλαιὰν ἢ ὑγιεινὸν, accisso quæ redundare videtur lege.

PIPER breuis arbor esse traditur in India nascens, quæ quidem fructum promit inter initia oblongum siliquarum instar, quod longum piper est. Is habet intus aliquid tenue ac milio simile, quod tandem in perfectum piper euadit. Et ille quidem suis temporibus dehiscens paudénsque sese, racemos emittit grana ferentes, qualia nouimus: è quibus nonnulla acerba & immatura piper faciunt candidum, aptissimum remedijs oculorum, antidotis & iis medicaminibus quæ contra venenatas bestias parantur, theriaca vocant. Est porrò longum, intensa mordacitate præditum & subamarum, quoniam immaturum: antidotis itidem & theriacis medicaminibus accommodatum. At nigrum albo suauius est, acrius, otique gratius ac magis aromaticum, propterea quòd tempestiua maturitate collectum est: quin & ad condimenta vtilius est. Candidum verò, quippe quod in acerbum vergat, antedictis infirmius & inefficacius est. Eligito grauissimum, plenum, nigrum, non valdè rugosum, sed recens ac minimè furfurosum. Reperitur etiamnũ quoddam in genere nigri, nutrimento defectum, cassum seu inane ac leue, quod brasma nominatur. Vim habet communiter omne piper excalfaciendi, vrinam ciendi, concoquendi, attrahendi, discutiendi, detergendique ea quæ pupillis tenebras offundunt. Cõuenit etiam, seu potum seu illitum, febrium rigoribus per circuitum repetentibus, ac venenatarum quoque bestiarum morsibus auxiliatur, & partus extrahit. Creditur & statim à concubitu subditum, spem partus adimere. Quin & tussi omnibúsque pectoris vitijs linctu potúve succurrit. Anginis item conuenit cum melle perunctum, ac tormina discutit potum cum lauri foliis tenellis. Manducatum vero cum vua passa, pituitam è capite prolicit. Dolores quoque sedat, valetudinem tuetur, & appetentiam mouet. Sed & concoctionẽ adiuuat ad intinctus additum. Exceptum verò pice, strumas discutit, ac vitiligines etiam ex nitro emaculat. Torretur autẽ fictili nouo super pru-

nis, eodem quo in cremanda lente fit modo agitatum. Cæterùm non est huius arboris radix, vt aliqui existimauere, zingiber, quemadmodum paulò post ostendemus. Attamen piperis radix costo similis est, gustantium ora calfacit, saliuámque ciet. Eadem cum aceto imposita, itémque pota, lienem imminuit. Capitis etiam pituitam elicit commanducata cum semine pediculatis herbæ, quam staphidem agriam vocant.

De Zingibere. Cap. CXC.

ZINGIBERIS sui generis planta est, quæ plurima in Troglodytica & Arabia nascitur. Huius herba virente cocta ad multa, perinde atque nos ruta, vtuntur, propotismatis ac pulmentis eam admiscentes. Radiculas habet paruas, cyperi modo, candicantes, sapore piper imitantes ac odoratas. Eligito quæ teredinem minimè senserint. A quibusdam tamen ob id condiuntur, quòd celeriter cariem sentiant, ac fictilibus in Italiam asportantur, cibis idoneæ, si modò cum suo condimento assumantur. Vim porrò habet zingiber calfacientem, concoquentem, aluum leniter emolliétem, ac stomacho etiam vtilem. Est & efficax aduersus ea quæ pupillis caliginem offundunt. In antidota quoque additur, ac in vniuersum piperis vires quadátenus æmulatur.

De Hydropipere. Cap. CXCI.

HYDROPIPER apud aquas maximè stagnantes lenitérve fluentes gignitur. Caulé edit geniculatú ac solidum, circa quem alarum sunt concauitates, ac folia menthæ similia, sed maiora, delicatiora cádidioráque, gustu acria piperis modo, citra tamen vllam odoris gratiã. Fructũ verò gerit in surculis paruis propè folia erumpétem, & racematim cohærentem, qui & ipse acris est. Vim habent folia cum semine imposita œdemata veteréque durities discutiendi, & sub oculis sugillata emendandi. Siccata verò & tusa, salsis & obsonijs pro pipere admiscentur. Cæterùm radicem habet paruam, nullius in medicina vsus.

De Ptarmica. Cap. CXCII.

PTARMICA exiguus frutex est, surculos habens paruos, multos

A χων, κινούμενον ὡς φακή. ἡ δὲ ῥίζα αὐτῆ ὁμοία ἐστὶ ζιγγίβερι, καθάπερ ἔνιοι ὑπέλαβον· ὡς τὰ πολλὰ δηλώσομεν. ἔοικε μὲν πεπέρεως ῥίζα, θερμαίνουσα πως γλῶσσαν καὶ ὑγρὰ παρασκευάζουσα πίνοντι· σὺν ὄξει δὲ καὶ μέλιτι καταπλασσομένη καὶ πινομένη ἀποφλεγματίζει δὲ καὶ σταφίδος ἀγρίας μακρῆσαι.

B

Περὶ Ζιγγίβερεως. Κεφ. ρς'.

ΖΙΓΓΙΒΕΡΙΣ ἴδιον ἔθνος φυτοῦ, γινόμενον ἐν τῇ Τρωγλοδυτικῇ Ἀραβίᾳ πλῆσον, οὗ χρῶνται τῇ χλόῃ εἰς πολλά, καθάπερ ἡμεῖς τῷ πηγάνῳ, ἔμφορτες εἰς τὰ ποτισμοὺς καὶ ἐφάμιλλα μυλοειδῆ. ἔχει δὲ ῥίζια μικρὰ ὥσπερ κυπείρου, ὑπόλευκα, παραπλήσια τῇ γλυκεῖ, καὶ βιώδη· ἐκλέγου δὲ τὰ ἀπρόβρωτα. νέα ἐνίοις μύσταις ἐμπίπτει ἀφὸ ὃ βούπτιον, καὶ ἀφανίζει τὰς κόρας εἰς πελίας, ἐὰν ἐμβρυσωθῇ εἰς βρῶσιν λαμβάνεται δὲ μὴ ταχέως. Δυνάμιν δὲ ἔχει θερμαντικὴν, πεπτικὴν, μαλακτικὴν χολίας διαφυκῶς, διὸ καὶ χρηστὸν καὶ τοῖς τὰ διαστροφὰς τῶν κόρας μίγνυται καὶ αἱ πάσσοντες, ἢ καθόλου παρέοικέ πως τῇ τοῦ πεπέρεως δυνάμει.

C

D

Περὶ Ὑδροπεπέρεως. Κεφ. ρς'.

ΥΔΡΟΠΕΠΕΡΙ φύεται μὲν μάλιστα τοῖς στάσιμοις ὕδασιν ἢ διαυγέσι ῥείθροις· καυλὸν δὲ αἰνῆσι γονατώδη, στρογγύλον, τοῖς ὀπὶ μακάλαις καὶ φύλλα ἐστὶ πανόμοια, μείζονα δὲ καὶ πυφερώτερα καὶ λιπώτερα, θρυμμία ὑπὸ τῇ γλώσσῃ ὥσπερ τὰ πίπερι, οὐ μὴν ἀρωματίζοντα καρπὸν δὲ ἔχει ὅτι χλωρίζοντα μικρὸν ὑπὸ φύμενον τοῖς τὰ φύλλα, στάχυϊ δὲ ὁμοιούμενον, θρυμμίον καὶ αὐτόν. Δυνάμιν δὲ ἔχει τὰ φύλλα σὺν τῷ καρπῷ καταπλασσόμενα, οἰδήματα ὑγρὰ χρονίους σκληρίας διαφορᾶν, ὑπαυγάσματα τε ἀποκαθαίρειν· ξηραινόμενα δὲ ἐν κοπίδι, μίγνυται αἵτινι πεπέρεως ἀγροῖ ἐν τροσυφάμασι, ῥίζαν δὲ ἔχει μικράν, ἄχρηστον.

E

F

G

Περὶ Πταρμικῆς. Κεφ. ρξβ'.

ΠΤΑΡΜΙΚΗ θαμνίον ἐστὶ, κλάδους ἔχον μικρούς, πολλούς, ἐξοφρᾶς,

Aldrouan.

V. ἐν ἀγρῷ

V. καὶ ῥίζα ὁμοία

Vt non ignobilis

Al. inconspicua

Al. mandrolla, alias dracunculus

ὁμοίους ἀβροτόνῳ· περὶ οὓς φύλλα ὀλιγόμε-
κη, ἐοικότα τοῖς τῆς ἐλαίας, πολλὰ ἐπ' ἄ-
κρῳ ἔχ ὥσπερ ἀνθεμίδος κεφάλιον μικρόν,
στρογγυλοειδές, ὀριμον καὶ πάνοσμον, ἐρε-
τικὸν πάρμου· ὄζει καὶ ὠνόμασται. Δύ-
νανται δὲ κατάπλασσόμενα μετὰ φύλλων
καὶ αὐτῶν, ἐπισκήπτα αἴρει· καὶ ἔτι αὐτῶν,
πάρμοις συνεργάζεται καλῶς. φύεται δὲ ἐν
ὀρεινοῖς καὶ πετρώδεσι τόποις.

Περὶ Σπόγγου. Κεφ. ρξγ'.

ΣΠΟΓΓΙΟΝ γνώριμόν ἐστι, ᾧ οἱ ἐρεοπλύται χρῶνται πρὸς καθαρσιν τῶν ἐρίων. οὗ ἡ ῥίζα δριμεῖα καὶ σύρπτικὴ βοηθεῖ ὑπαπτικοῖς, βηξὶν, ὀρθοπνοίαις σὺν μέλιτι, κοχλιαρίου πλῆθος λαμβανομένη, καὶ λίαν τὸ ἔντερον ἀγεῖ. φύει δὲ πέτραις καὶ πατάρεως ῥίζη λιθοῖ, λίθους θρύπτει, καὶ ἄζουρα ποιεῖ· καὶ σκληρὰ ἐπιῤῥωσθέντα τόπον πρασσιδίου δὲ ἔμπλαστα ἀγεῖ, καὶ ἔμβρυα φθείρει ἐνεργῶς. σὺν ἀφίτῃ δὲ καὶ ὄξει καταπλασθὲν, λέπρας αἴρει· διαφορᾷ καὶ τὰ φύματα σὺν ἀλφίτοις χριθίνοις καὶ οἴνῳ ἑψηθὲν, μίγνυται δὲ καὶ κολλυρίοις ὀξυδερκέσι καὶ μαλάγμασι· καθ' δὲ καὶ πάρμοις. καὶ εἰς ῥῖνας δὲ ἐγχόμενον λέπρας μετὰ μέλιτος, καθαίρει διὰ τῶν μυκτήρων. Περὶ Κυκλαμίνου. Κεφ. ρξδ'.

ΚΥΚΛΑΜΙΝΟΣ φύλλα ἔχει ὅμοια κισσῷ, πορφυρᾶ, ποικίλα, κάτωθεν δὲ καὶ αὐτῶν κιλλίσιν ἐπολεύκοις καυλὸν δὲ τετραδάκτυλον, γυμνόν· ἐφ' οὗ ἄνθη ῥοδοειδῆ, πορφυρίζοντα· ῥίζαν μέλαιναν στρογγυλοειδῆ, ὁμοίαν σκίλλῃ, ἐπιπλατυτέραν. ἣ πίνεται μετ' ὑδρομέλιτος, ἀγεῖ φλέγμα καὶ ὕδωρ κάτω· καὶ ἔμμηνα δὲ καὶ πρόωρα καὶ ἐπιλοχείαν. φασὶ δὲ ὅτι αὐ ἐμβληθῇ τῇ ῥίζαν ἐγκύμων γυνὴ, ἐξαμβλωθήσεται αὐτίκα. ἔστι δὲ ὀξυτόκιον ἐπιπλοκῆς πίνεται δὲ πρὸς τὰ θανάσιμα μετ' οἴνου, καὶ μάλιστα πρὸς λαγῶοὺ θαλάσσιον· ἔστι δὲ ἑρπετῶν ἐστὶν ἀντιφάρμακον καταπλασσόμενον μετὰ σύκου καὶ τὸ οἶνῳ μιχθὲν· κηλῖδας δὲ ἐλλέβορον πρὸς δραχμῶν πλῆθος, πινόμενος μετὰ γλυκέος ἢ μιγαράπου ὑδαρῶς. καταπλάσσει δὲ διὰ τοῦ οἴνου θερμῶ· οὐ πρόσκαιρον ⟨ ⟩ πίνεται, καὶ

A & teretes, abrotono ſimiles: circa quos folia ſunt oblonga, oleaginis proxima multáque, ac in cacumine capitulum vti anthemidis, paruum, rotundum, acri odore, ſternutamẽta ciens, vnde etiam nomen accepit. Valent folia cum floribus illita ad delenda ſub oculis ſugillata: flores autem ſternutamenta efficaciſ-
B ſimè mouent. Naſcitur in montoſis ſaxoſiſque locis.

De Struthio ſeu radicula.
Cap. CXCIII.

STRVTHIVM vulgo notum, quo fullones purgandis lanis vtuntur. Huius radix acris eſt, vrinámque ciet: auxiliatur iocineroſis, tuſſi & orthopnœæ, ſumpta cum melle co-
C chlearis menſura, & aluum quoque ſubducit. Eadem cũ panace & capparis radice calculos frangit, & cum vrina expellit, lienémque in ſcirrhum induratum liquat. Subdita verò menſes trahit, & partus efficaciter enecat. Cum polenta autem & aceto illita, lepram emendat. Di-
D ſcutit & panos, cum farina hordeacea & vino decocta. Miſcetur præterea collyriis exacuendæ oculorũ aciei dicatis, itémque malagmatis. Sternutamenta etiam facit, atque per os purgat trita cum melle ac naribus infuſa.

De Cyclamino. Cap. CXCIIII.

CYCLAMINVS folia habet hederæ ſimilia, purpurea, varia, infra
E ſupráque maculis albicantibus diſtincta: caulem verò quaternum digitorum, inanem ac nudum: in cuius ſummo flores emicant roſarum effigie, purpuraſcentes. Radix nigra rapo proxima & aliquantum lata. Quæ quidẽ cum hydromelite pota picuitá aquoſáque detrahit, ac mẽ-
F ſes pota ſubditáve ciet. Tradunt ſi prægnans mulier radicem eã tranſgrediatur, abortum fieri. Sed & adalligata partum accelerat. Cõtra venena, præſertimque leporis marini, ex vino bibitur. Impoſita quoque, contra ſerpentiũ ictus remedio eſt: & addita in vinum, ebrietatem repræſentat. Regium verò morbum diſcutit tribus drachmis pota cum paſſo aut mulſa dilutiore: Sed bibẽtem oportet cubiculo calido miniméque ventis expoſito recumbere,
G pluri-

pluribus contectum ſtragulis, quò facilius exudet. Qui verò elicietur ſudor, colore felleus inuenietur. Eius etiam ſuccus cum melle naribus infunditur ad purgandum caput, & ſedi in vellere ſubditur ad deijcienda alui excrementa. Idem illitus vmbilico & imo ventri ad coxas vſque, aluum emollit, abortúmque facit. Quin & ſuffuſis heberioribúſque oculis oblitus cum melle ſuccus prodeſt. Miſcetur & medicamentis abortum inferentibus. Idem cum aceto illitus prociduam ſedem reſtituit. Exprimitur verò tuſa radice ſuccus, & ad mellis craſſitudinem decoquitur. Radix autem ipſa cutem purgat, eruptiones papularum reprimit, ac vulneribus ex acero tũ per ſe, tum etiam cum melle, medetur. Lienem quoque impoſita liquat & abſumit. Contractas etiã à ſole maculas & alopecias emendat. Sed & ipſius decoctum fotu, luxatis, podagrę, capitis vleuſculis atque pernionibus idoneum & accommodatum eſt. Quòd ſi in oleo vetere feruefacta fuerit, illito oleo cicatrix inducitur. Ipſa quoque radix excauata oleo impletur, & cineri feruenti imponitur, addito interdum cerę Tyrrhenicæ momento, vt ſtrigmenti modo viſcoſus fiat illitus, perquá vtilis pernione laborãtibus. Cæterùm radix ſcillæ modo conciſa reponitur: traditúrque etiam ad amatoria aſſumi tuſa, ac in paſtillos diuiſa. Naſcitur verò locis vmbroſis, maximéque ſub arboribus.

De Cyclamino altera. Cap. C X C V.

Cyclaminus altera, quam nonnulli ciſſanthemon aut ciſſophyllon vocant, folia fert hederæ, ſed minora: caules craſſos, geniculatos, quíque circa vicinas arbores capreolorũ modo ſeſe voluũt. Flores viſuntur candidi, odorati. Fructus verò vuæ acinorum inſtar, corymbis hederæ ſimilis, mollis, ac ſapore aliquantulũ acris, atq; lętus: radix ſuperuacua. Naſcitur locis aſperis. Huius fruct⁹ drachmę vnius põdere potus cum vini albi cyathis duob⁹ ad quadraginta dies, lienẽ liquat, ac per vrinas & aluũ abſumit.

Α πλείοσιν ἱματίοις τῶν ἐδωδῆς ἵν' ὅπως ἱδρώσῃ· ὁ δ' ἀποκρινόμενος ἱδρὼς, χολώδης βλεπόμενος τῇ χροιᾷ. ἐγχυματίζεταί τι ὁ χυλὸς αὐτῆς μετὰ μέλιτος εἰς τὰς ῥῖνας πρὸς καθαρσιν κεφαλῆς· ἢ ᾧ δακτυλίῳ ἐν ἐρίῳ προσίησι πρὸς κοιλιῶν ἀποπωμάτων· κατα-

Caracus. Ὑπερῴου

Β πλασμὸν δὲ ἰχῶρ, κηλίδας μελαίνας, καὶ σκληρώσεις ἐργάζεται· ἢ πρὸς ὄψεις ὑπερεχυμένους ἢ ἀμβλυωπικοὺς ὀφθαλμοὺς ἐγχριόμενος ὁ χυλὸς σὺν μέλιτι ἁρμόζει. μίγνυται δὲ εἰς τὰ φθόρια. ἕδρᾳ δ' προποτοῦσα σὺν ὄξει καὶ ἀγριόμενος ὁ χυλὸς καθίστησι. χυλίζεται δὲ ἡ ῥίζα κοπτομένη δὲ

Lacuna ex vet. cod. παρέπτα

V. προπίνουσαν

C ἐκθλιβομένη, ἑψομένου τοῦ χυλοῦ ἀγριμωπώδης συνίσταται. ῥύπτει δὲ χρῶπα ἡ ῥίζα, καὶ ἐξανθήματα σκληρά, καὶ φαύματα μεθ' ὄξους λαβὼν ἑαυτὴν τι καὶ μετὰ μέλιτος ἰᾶται. καὶ ἀπολαυομένη δὲ καὶ σπλῆνα τήκει· ἀποκαθαίρει δὲ καὶ ἔφηλιν καὶ ὑπωπιάσεις θλασθέν· δὲ καὶ πρὸς τραύματα δὲ πεδάγρας, καὶ

V. non legit.

D λὰ ἐν κεφαλῇ ὑγρὰ δὲ χειλάτα τὰ ἀφέψημα αὐτῆς καταπλούμενον. αὐτή τι δ' ἐλαίῳ παλαιοῦ αἰαζεσθεῖσα, ἀποπλασθεῖσα καὶ χριομένη δ' ἐλαίῳ. ἐγκαιομένη δὲ πληθεῖσα δ' ἐλαίῳ, καὶ πίνεται ὅτι θερμοποσίας· προσεμβάλλεται δὲ ἐνίοτε καὶ κηρῷ Τυρρηνικοῦ ὀλίγῳ, ὡς γλοιώδες

Hæc vſque ad ὑγρὰ δὲ in vetuſto quodã exemplari deſiderantur.

E ἡμέρᾳ κατάχρισμα ἄριστον χειμερινῶν. ἀποδίδοται δὲ ἡ ῥίζα τμηθεῖσα ὡς ἐπὶ σπίλλα. ἱστορεῖται δὲ καὶ πρὸς φίλτρα αὐτὴν λαμβάνεσθαι κοπεῖσαν αἰαπλασθεῖσάν τε εἰς ἐγχύσεις. φύεται δὲ εἰς συσκίους τόπους, μάλιστα δὲ ὑπὸ τὰ δένδρα.

Περὶ ἑτέρας Κυκλαμίνου. Κεφ. ρϛέ.

F Κυκλάμινος ἑτέρα, ἣν ἔνιοι κισσόφυλλον καλοῦσι· φύλλα ἔχει κισσῷ ὁμοίοις, ἐλάσσονα δέ. καυλοὺς παχεῖς, γονατώδεις, περιελισσομένους τοῖς παρακειμένοις δένδρεσιν ἕλικος δίκην· ἄνθη λευκὰ, βαθέα· καρπὸς δ' ὡς ῥάγες σταφυλῆς, ὅμοιος κισσῷ μελανός, δρυμοῖς ἐν τῇ τύσσῃ

Hoc alterius cyclamini caput in quibuſdam exemplaribus deſideratur.

V. λευκοῖς

Addit Lacuna ex v. cod. λευκὰς, χλωρὰ δὲ Goupylus eſſe ſcribit in veteri veſtigia diuerſim corruſdam ſcripturæ. ſed vulgatam, quippe quæ optimum habeat ſenſum, veram eſſe exiſtimat.

G ἡρέμα, ἕλικος ῥίζα ἀγρίου· φύεται δὲ ἐν τραχέσι χωρίοις. ταύτης ὁ καρπὸς ὅσον < μία τὸ πλῆθος πυρῆνας μετ' οἴνου λευκοῦ κυάθων β' ἐπὶ ἡμέρας μ', σπλῆνα τήκει δι' ὕρων καὶ κοιλίας διαπομπεύοντα.

πίνεται δὲ καὶ πρὸς ὀρθόπνοιαν. καὶ τὰς ἐκ τοκετῶν καθαίρει πεθεῖσα.

V. alii φακοπρίσεις μεγάλας.

Περὶ Δρακοντίου. Κεφ. ρϛ'.

V. addit, λόβοι ὑφίσι, οἱ δὲ πτερυγώδεις καὶ τὰ μὲν ἐκτεταμένα πεπλατυσμένα ἐξ ἑνὸς χείλους, οἱ δὲ εἰς ἕνα ἐκ τῶν τριῶν ἐπὶ τὰς περιφερείας συλλεγόμενα φύλλα, ὡς ἐπὶ δοκοῦ ἀπομεμαγμένα πέμφιξ.

ΔΡΑΚΟΝΤΙΟΝ ἔχει φύλλα κισσοειδῆ, μεγάλα, ποίλοις ἔχοντα λόβοις· καυλὸν δ' ὀρθὸν, δίπηχυν, ποικίλον, ὄφεως εἰδῆ, ἔχοντα πέρφυρον τοῖς ποίλοις, βακτηρίας τὸ πάχος· καρπὸς δὲ ἐπ' ἄκρου βοτρυώδης, χρώματι τὸ μὲν πρῶτον χλοώδης, πεπάνθεὶς δὲ χροιζων, ὅτι δάκτυλον τὸν μέσον· ῥίζα ποσῶς στρογγύλη, βολβοειδὴς, ὁμοία ἄξῳ, φλοιὸν ἔχουσα λεπτόν. φύεται δὲ συσκίοις· περὶ φραγμοὺς καὶ αἱμασιάς. Δύναμιν δ' ἔχει ὁ καρπὸς χυλιωθεὶς καὶ ἐγχυματισθεὶς μετ' ἐλαίου εἰς τὸ οὖς, ὠταλγίαν παύει· εἰς δὲ τὰς ῥῖνας προστιλλόμενος ἐν ἐλαίῳ, πολύποδα ἀναιρεῖ καταχριόμενος δὲ, φύλλα τὰ καρπικὰ μαλάττει. πολλοὶ δὲ ὅσον λ'. κόκκοι μετὰ ὀξυκράτου, ὀξαμβλύνουσι· καὶ τὸν ὄμφαλὸν δὲ φασὶ μετὰ μέλιτος τὰς ἀναθύσεις, τὸν ἄρτι σεσφλιμμένον ἐμβρύων φθαρτικὸν εἶναι. ἡ δὲ ῥίζα θερμαντικὴ οὖσα, βοηθεῖ ὀρθοπνοίαις, ῥήγμασι, ἀπάσμασι, βηξὶ, καπάρῳ· καὶ τὰ ἐν θαλάσσῃ ὑγρὰ· διαναγαγὰ ποιεῖ, ἐφ' ἧπέρ τι καὶ ὀπὴ μετὰ μέλιτος καὶ καθ' ἑαυτὴν βιβρωσκωδέστερον. ξηρὰ δὲ λεῖα σὺν μέλιτι ἐκλείχθεῖσα. ἔστι δὲ οὐρητικὴ, ὁρμᾶς τε πρὸς συνουσίαν ἐγείρει, πινομένη μετ' οἴνου· καὶ ἕλκη κακοήθη καὶ φαγεδαινικὰ μετὰ βρυωνίας λευκῆς σὺν μέλιτι λειωθεῖσα ἀναπλάττει καθαίρει καὶ ἀπουλεῖ. καὶ κολλύρια ἐξ αὐτῆς ἀναπλάττεται πρὸς συρίγγας, καὶ ἐμβρύων κομιδήν. φασὶ δ' ὅτι καὶ εἰ ἀγκτρίνη τις ἅψαιτο τὴν χεῖρα τῇ ῥίζῃ, ἀπὸ ἐχίδνης ἀδηλος μένει· ἀποκαθαίρει δὲ καὶ διφθοὰς σὺν ὄξει καταχριομένη. τὰ δὲ φύλλα λεῖα ἐπὶ τῶν νεοτρώτων αὐτὰ μόνων ἐπιτιθέμενα ἁρμόζει· καὶ πρὸς χίμετλα, ἑφθέντα ἐν οἴνῳ καὶ ἐπιτιθέντα· τυρός τε σπειλοῦμενος τοῖς φύλλοις, ἄσηπτος διαμένει. ὁ δὲ χυλὸς τῆς ῥίζης ἁρμόζει πρὸς νεφέλια, καὶ λευκώματα καὶ ἀχλύς. λαμβάνεται δὲ ἡ ῥίζα καὶ πρὸς τὰ ἐν ὑγείᾳ χρῆσιν, ἐφ' ἧπέρ τε καὶ ὠμὴ ἐσθιομένη.

Bibitur & ad orthopnœam: ac potus quoque reliquias à partu purgat.

De Dracontio seu dracuncula. Cap. CXCVI.

DRACVNCVLVS folia fert hederacea, magna, candidis notata maculis: caulem verò rectum, duûm cubitorum, versicolorem, anguis effigie, maculis respersum purpureis, baculi crassitudine. Fructus est in summo racemosus, colore primùm quidé herbaceo, sed cùm ematuruit ad croceum vergéte, sapore mordax. Radix quadantenus rotunda, bulbosa, aro similis, tenui vestita cortice. Nascitur in vmbrosis, circa sepes ac macerias. Expressus è semine succus cũ oleo in aurem infusus, dolorem auris mitigandi vim habet. Naribus etiam ex vellere inditus, polypum absumit. Sed & carcinomata illitu sistit. Eius autem grana xxx si in posca bibantur, abortum inferunt. Quin & odorem aiunt, posteaquam flaccidi flores emarcuerũt, recens conceptos fœtus enecare. At radix calfaciendi vi prædita succurrit orthopnoeæ, ruptis, conuulsis, tussi atqué destillationi. Pectori etiam hærentes humores facit excreabiles, siue elixa tostáve cum melle aut per se edatur, siue ipsa trita ex melle delingatur. Vrinam quoque ciet, ac venerem excitat è vino pota. Quin & vlcera maligna & phagedænica cum bryonia alba & melle trita expurgat, & ad cicatricem perdúcit. Ex ea quoque efformantur collyria ad fistulas, extrahendólque partus. Aiunt & qui manus radice perfricuerit, à viperæ morsu tutum & illæsum existere. Ex aceto denique illita, vitiligines emaculat. Folia verò trita recentibus vulneribus linamentorum vice conuenienter imponuntur: itidémque pernionibus, si priùs in vino decocta fuerint. Sed & caseus foliis inuolutus a putredine seruatur immunis; Succus autem radicis ad nubeculas, albugines, oculorúmque caligines conuenit. Ipsa vero radix etiam ad sanorum vsus, nimirum in cibos, cocta crudáq; oleris vice recipitur.

Quin & Gymneſiarum inſularum, quas Baleares vocãt, incolæ coctam radicem cum melle multo placentarum loco in conuiuijs apponunt. Cæterùm radicem meſſibus effodi, lotámque & fruſtatim conciſam, ac lino traiectam ſiccari in vmbra, atque ita recondi oportet.

A Καὶ δὲ ἐν τῇ Γυμνησίσι νήσοις, καλυμέναις ὑπ' Καλλαρίοιν, ἐφθὴν τὴν ῥίζαν μιγνύντες μέλιτι πολλῷ, ἐν τοῖς συνδείπνοις ἀντὶ πλακούντων προτιθέασιν. ἀποξηραίνουσι δὲ τὴν ῥίζαν ἐν πυραμητῷ ὀρύξαντες καὶ πλύναντες καὶ κατατέμνοντες. ἐπείρασι δὲ λίνῳ καὶ ξηραίνουσιν ἐν σκιᾷ.

De Aro. Cap. CXCVII.

B Περὶ Ἄρου. Κεφ. ρϛζ'.

ARON apud Syros lupha vocitatũ, folia emittit dracunculi, ſed & minora & minus maculoſa: caulem dodratalem, ſubpurpureum ac piſtilli forma, in cuius ſummo fructus eſt in croceum colorem inclinans. Radix alba, dracunculi radici proxima: quæ itidem decocta eſtur, quippe quæ minùs acris ſit. Folia verò ad eſum condiuntur, & arida per ſe decocta manduntur. Radix, ſemẽ & folia eaſdem cum dracunculo vires obtinent. Priuatim tamen radix cum fimo bubulo podagricis impoſita prodeſt. Cæterùm eodem quo dracunculi radix modo reconditur, ac in ſumma ob mitiorem qua prædita eſt acrimoniam eſui aptior eſt.

Ἄρον δὲ καλούμενον τροφὴ Σύρων λούφα, φύλλα δμοια τοῖς τοῦ δρακοντίου, μικρότερα δὲ καὶ ἀσπιλότερα· καυλὸν σπιθαμιαῖον, ὑποπόρφυρον, ὑπόξανθον. ἐφ' οὗ ὁ καρπὸς κροκίζων ῥίζα λευκὴ παρὸς τὸ τοῦ δρακοντίου, ἥτις καὶ ἐσθίεται ἐφθὴ, ἧττον δριμεῖα. παρεκτείνει δὲ καὶ φύλλα εἰς βρῶσιν, καὶ ξηρὰ ἑψόμενα ἐσθίεται.

C Δύναμιν δὲ ἔχει ἡ ῥίζα καὶ τὸ σπέρμα καὶ τὰ φύλλα τὴν αὐτὴν τοῦ δρακοντίου. ποιεῖ δὲ ἡ ῥίζα καὶ ἀπλανασμὸν σὺν χολῇ· ὅτι ποδαγρικοῖς. ἀποτίθεται δὲ ὡς ἡ τοῦ δρακοντίου. καὶ καθόλου ὅτι μὲν ἀπὸ τοῦ μὴ λίαν δριμὺ ἐδώδιμος.

D

V inſcribit. alias dracontias mouet.

Vulg. exempl. κρείττερα

V ἀσπιλότερα.

V. ὑποπορφυρίζει

Orib. V. παραφυὰς

V. quidam (λευκὴ) non habet

V. ἡ ἐμμονὴ λάπαθ.

V. non habet.

Hæc verba non ſequuntur in manuſcriptos: ſed ea exprimunt interpretes. Al. ἀδιάμιστος.

De Ari ſeu ariſaro. Cap. CXCVIII.

Γερὶ Ἀρείσαρου. Κεφ. ρϛη'.

ARISARVM exigua herbula eſt, cuius radix oliuæ magnitudinem implet. Eſt ea maioris quàm aron acrimoniæ: vnde illitu nomas ſiſtit. Ex eadẽ collyria concinnantur, ad fiſtulas efficacia. Cæterùm impoſita inditáve, cuiuſlibet animalis genitale agit in perniciem.

Ἄρισαρον ἔστι μικρὸν βοτάνιον, ῥίζαν ἔχον ὡς ἐλαίας. ἔστι δὲ δριμυτέρα τοῦ ἄρου· ὄθεν τομαὶ ἴσχει κατὰ πλανασμόν. χαλκύεια τε παρὸς σύριγξας σὺν ἐργῷ ἐξ αὐτῆς γίνεται. φθείρει δὲ καὶ αἰδοῖον παντὸς ζώου σὺν πηλῷ τεθεῖσα.

E

Al. δριμύτερα.

De Aſphodelo, ſeu haſtula regia. Cap. CXCIX.

Περὶ Ἀσφοδέλου. Κεφ. ρϛθ'.

ASPHODELVS planta eſt pleriſque omnibus cognita, foliis magni porri, caule verò leui (anthericon appellant) cuius in cacumine flos emicat. Radices ſubiacent oblongæ, teretes, glandibus ſimiles, guſtu acres, & calfaciẽdi vi prẽditæ. Hę bibitę vrinas mẽſtruáq; cõcitãt. Medẽtur & lateris doloribꝰ, tuſſibꝰ, cõuulſisatq. ruptis, drachmę põdere in vino potę. Vomitiones verò adiuuat aſphodelꝰ, luſorij tali magnitudine in cibo ſumptꝰ. Vtiliter etiá tribꝰ drachmis datur à ſerpẽte demorſis: ſed vulneribus ex morſu folia, radicem ac flores ex vino illini oportet.

Ἀσφόδελος φυτὸν τοῖς πλείστοις γνώριμον, φύλλα ἔχων παρόσον μεγάλῳ ὅμοια· καυλὸν δὲ λεῖον, ἔχοντα ἐπ' ἄκρου ἄνθος καλούμενον ἀνθερικόν. ῥίζαι δὲ ὑπόκεινται ὀθνειώδεις, στρογγύλαι, βαλάνοις ὁμοίαι, δριμεῖαι κατὰ τὴν γεῦσιν, καὶ τὴν δύναμιν θερμαντικαί. χυμοὶ δὲ καὶ ὕπνον καὶ ἔμμηνα, πολιτικὰ ἰᾶται. πλευρᾶς δὲ ἀγήματα καὶ βῆχας, καὶ ἀποσήματα, καὶ ῥήγματα < ἀπλῶς τὴν ῥίζης ἐν οἴνῳ πινομένης· ποιεῖ δὲ καὶ βδέμα τέρητος ὅσον ἀχράδος βρωθεὶς· καὶ ἑρπετοδήκτοις δίδοται ὠφελίμως ὅσον < γ'. ὁ πλῆθος καταπλάττεται δὲ διὰ τοῦ ῥίγματος τοῖς τε φύλλοις καὶ τῇ ῥίζῃ καὶ τοῖς ἄνθεσι σὺν οἴνῳ.

F

V. πλείστοις

V. χυμοὶ δὲ

V. πολιτικὰ

V. ἀγήματα

V. ῥήγματα

V. πολιτικὰ

Ald. σὺν ὀξέϊ. Ruell. legisse videtur. Ald. σὺν ὀξέϊ. V. in marg. quod expressit Barbarus. V. καρφὶς, al. καρφὶ. V. ἐλαίδι. In v. desiderantur hæc ad finem usque.

& τὰ ῥυπαρὰ & νεμύδια ἕλκη & μαστῶν καὶ διδύμων φλεγμονὰς καὶ φύματα & δοθιῆνας, συλλαβὼν ῥιζομάζης πυγὸς οἶνῳ τῷ ῥίζῃ. πρὸς δὲ τὰς προσφάτους φλεγμονὰς μετ' ἀφίπυ. ὁ δὲ χυλὸς τῆς ῥίζης προσλαβὼν οἴνου παλαιοῦ γλυκέος, καὶ σμύρνης καὶ κρόκου, συνεφθὸν ὅτι τὰ αὐτὰ, ἔλκεσιν γήρασι ὀφθαλμοῖς φάρμακον· καὶ πρὸς ὦτα πυορροοῦντα. καθ' ἑαυτὸν, καὶ σὺν λιβανωτῷ καὶ μέλιτι, καὶ οἴνῳ, καὶ σμύρνῃ χλιαινόμενος ἁρμόζει· ὀδοντιάσεις τε καθ' ἑαυτὸν εἰσχυθεὶς ὁ χυλὸς ὃν αἰτιᾶται ὠτα, παραυτὰ. καῦσαι δὲ ἡ ῥίζα τὰ τέφρας ὅτι πλεονάζουσα, ἀφιστᾷ τρίχας· ἐφθεὶς δ' ἔλαιον εἰς κεκαυμένας τὰ ῥίζας ὅτι πυρὸς, εἰλκωμένας χειμῶνας καὶ πυρίκαυστα ἐπαλφάμενον ὠφελεῖ, & ὠτηγμοῦ βοηθεῖ, εἰς χεόμενον εἰς τὰ οὖς. ἀφέψεται λευκὴ πεσσαρεσφέτα σὺν ὀξυμέλι σὺν ἁλίσι, καταχριωθεῖσα ἡ ῥίζα σμήχει. ὁ δὲ καρπὸς καὶ τὰ ἄνθη, κατ' ἐξοχὴν σκολοπένδραις καὶ σκορπίων αἰτιφάρμακόν ἐστιν, σὺν οἴνῳ πινόμενα· καθαίρεται δὲ καὶ τὰ κοιλίαν.

A Ité ſordidis ac depaſcétibus vlceribus, mammarú ac teſtiú inflámationibus, tuberculis furunculiſque radix vna cum vini fæce decocta: recentibus autem inflammationibus ex polenta, auxiliatur. At ex radicis ſucco, additis vetere vino dulci, myrrha & croco, ita vt ſimul omnia decoquantur, illinendis fit B oculis vtile cum primis medicamentum. Idem ad purulentas aures per ſe, & cum thure, melle, vino ac myrrha tepefactus prodeſt: dentium verò dolores mitigat, oppoſitæ auriculæ per ſeſe inſtillatus. Cinis autèm è cremata radice, alopecias illitu denſat, capillóve replet. Oleum verò in excauatis radicibus igni decoctum, exulceratis C pernionibus & igni ambuſtis inunctione conducit, & aurium dolori infuſum auri auxiliatur. Porrò vitiliginem albam, ad ſolem linteolo antè perfrictam, illita radix emaculat. Cæterùm ſemen & flores, ſi in vino bibantur, præ cæteris omnibus egregiè ſcolopendræ & ſcorD pionum ictibus aduerſantur: ſed & violenter aluum deijciunt.

Hoc caput præmittè ſequenti poſtponitur in Aldino exemplari.

Περὶ Βολβοῦ ἐδωδίμου. Κεφ. σ'.

De Bulbo eſculento. Cap. CC.

Βολβος ἐδώδιμος γνώριμος πᾶσιν, οὐ ἐσθίομεν· δύσμαχος, εὐχείλιος, πυρρὸς, καὶ ἀπὸ Λιβύης κομιζόμενος· ὁ δὲ πικρὸς καὶ σκιλλώδης, εὐστομαχώτερος, & πεπτικός. πάντες δὲ δεμεῖς καὶ θερμαντικοί· καὶ τοὺς σφυγμοὺς ἐγείροντες, παχύνοντες γλῶσσαν καὶ παρίσθμια, τροφοί, σαρκῶν ἡμπτικοὶ, ἐμπνευματοῦντες· ποιοῦσι δὲ καὶ καταπλασθέντες τοὺς τρόμμακας, ἡλώσεις, σύλπας, καὶ τοὺς τὰς τῆς ἕδρας ὀδύνας, γαγγραίνας τε καὶ ποδάγρας σὺν μέλιτι καὶ καθ' ἑαυτούς. ἢ τὰ ὑπὸ τῶν ὑδρωπικῶν οἰδήματα καὶ κυνόδηκτα, ὁμοίως σὺν μέλιτι καὶ πεπέρει λείῳ καταπλασθέντες· ἐπέχουσι ἱδρῶτας, καὶ τομαίχων ὀδύνας παύουσι· καὶ πίτυρα καὶ ἀχῶρας ἀποσμήχουσι σὺν ὄξει νίτρῳ. καθαίρουσι δὲ καὶ ὑπέρια καὶ ἰούλους, καθ' ἑαυτοὺς ἢ σὺν οἴνῳ λευκῷ, καὶ φακοὺς ζωὸν μέλιτι ἢ ὄξει.

Bvlbvs eſculentus quo veſcimur, vulgo cognitus eſt. Stomacho & aluo vtilis rufus, quíque ex Africa defertur. Amarus verò & ſcillæ ſimilis, ſtomacho aptior eſt, & concoctionem adiuuat. Bulbi autem omnes acres ſunt & excalfactorij. Venerem ſtimulant, linguam & tonſillas exaſperant, plurimum nutriunt, & carnem augét: verùm inflationes pariunt. Illiti verò efficaces ſunt ad luxata, contuſa, infixa ſpicula & articulorum dolores: itémque ad gangrænas & podagras, cum melle ac per ſe. Valent & ad hydropicorum œdemata & canum morſus, cum melle ac pipere trito ſimiliter impoſiti. Sudores ijdem compeſcunt, ſtomachíque dolores mitigant. Quin & furfures vlceráque capitis manantia cum toſto nitro abſtergunt. Sub oculis fugillata varóſque per ſe, aut ex oui luteo, itémque lẽtigines cum melle vel aceto, emẽdant.

Locus in vet. cod. legit σὺν ὀξυμέλιτι. Plin. cum vino aut cremore, coll.

Fractis etiam auribus vnguibúsque contusis ex poléta medentur. Ficos ijdẽ tollunt in calidis cineribus torrefacti, & cum vitis mænarum capitibus impositi. Cremati verò & cũ alcyonio permixti, cõtractas à sole maculas & cicatrices nigras in sole illiti emaculãt. Faciunt & ad rupta, si cum aceto elixi edantur. Cæterùm ab ipsorũ largiore cibo cauendũ, quoniã genus neruosum tẽtant.

De Bulbo vomitorio. Cap. CCI.

Bulbus, quem vomitorium vocãt, folia habet lori modo flexiliora, multóq; longiora quàm esculentus: radicem tamen bulbo similem, sed cortice nigro vestitam. Ea radix per se comesta, itémq; ipsius decoctum potum, vesicæ vitijs medentur, ac vomitiones mouent.

De Scilla. Cap. CCII.

SCILLA vim habet acrem & vrentem. Attamen assata ad plurimos vsus accõmodatur. Farina verò subacta lutóve oblinitur, & in clibanum conijcitur, aut prunis obruitur, donec ambiens crusta sufficienter intosta fuerit. Hac detracta, nisi scilla prorsus mollis ac tenera euaserit, iterum noua farina subacta lutóve obducetur, & eadẽ quæ priùs fient. Enimuerò quæ non sic assata fuerit, interanei noxam infert, maximè si intrò sumatur. Torretur & in olla operculata, atque in furnum demissa. Ex ea verò sumitur quod intimum est meditullium, direptis exterioribus tunicis. Sed & concisa elixatur, mutata sæpius aqua, tantisper dum in ipsa aqua neque amaritudo neque acrimonia percipiatur vlla. Denique & in vmbra siccatur frustatim confecta, linóque traiecta modicis interuallis, vt ne segmina seu taleolæ sese inuicem contingãt. Et his quidem scillæ segmẽtis ad oleum, vinum & acetum scilliticũ vtimur. At verò ad pedum rimas interna pars crudæ scillæ in oleo feruefacta, aut cum resina dissoluta imponitur. A vipera autẽ demorsis in aceto decocta vice cataplasmatis adhibetur. Ad singulas porrò tostæ scillæ partes adiectis octonis triti tostique salis, cochlear vnum aut alterum ieiunis exhibemus, emolliendæ alui gratia.

Περὶ Βολβῶν ἐμετικῶν. Κεφ. σά.

Βολβὸς, ὁ καλούμενος ἐμετικὸς, ἔχει τὰ φύλλα ἱμαντωδέστερα, καὶ πολλῷ μακροτέρα τῶν ἐδωδίμου· ῥίζαν δὲ ὁμοίαν βολβῷ, ἀλλ' ὑπὸ φλοιὸν μέλανα. αὐτὴ δὲ ἐσθιομένη καθ' αὑτὴν, καὶ τὸ ἀφέψημα αὐτῆς πινόμενον, τὰς τε κύστεις ἰᾶται, καὶ ἔμετον κινεῖ.

Περὶ Σκίλλης. Κεφ. σό.

ΣΚΙΛΛΑ δύναμιν ἔχει δριμεῖαν καὶ πυρωτικήν· πολυχρηστεῖ δὲ γοῦν ὀπτηθεῖσα. ταρίχῃ δὲ ἢ πηλῷ τὰς ἐπιπλάστους, καὶ δίδοται εἰς κλύσμον, ἢ αὐθαζῶν ἐγκρύπτεται μέχρις αὖ ὀπτηθῇ ἱκανῶς τὸ περικείμενον ταῖς· ἃ ταῦτα ἐξαιρεθέντες, εἰ μὴ τάχιστα γένοιτο, ἕτερον ταῖς ἢ πηλὸν περιπλάσαντες, τὰ αὐτὰ ποιήσομεν· ἢ γὰρ μὴ ὕστερον ὀπτηθεῖσα, βλαβερά τ' δόσιν, πρὸς τὰ σπάθια μᾶλλον προσφερομένη. ὀπτᾶται δὲ ἐν χύτρᾳ πεπωμασμένη καὶ καθειμένη εἰς κλύσμον. λαμβάνεται δὲ αὐτῆς ὁ μεσαίτατον τῶν ἔξωθεν ταῦτα ἐξαιρεθέντων, καὶ ἕψεται ἐν ὑδρομέλιτι, ἕτερα τὰ ὁπτηθέντα, ἄχρις ἂν μὴ πικρὸν ἢ δριμὺ γεύηται τὸ ὕδωρ, καὶ ξηραίνεται ἐν σκιᾷ· τμηθεῖσα, καὶ διαιρεθεῖσα λεπτὰ, ὡς μὴ ἄπεσθαι δυνήσεσθαι τόμους. τῇ μὲν ἓν τμητῇ, εἰς ἔλαιον, καὶ οἶνον, καὶ ὄξος σκιλλιτικὸν χρώμεθα. πρὸς δὲ ῥαγάδας τὰς ἐν ποσὶ, τὸ ἔνδον τῆς ὠμῆς σὺν ῥητίνῃ ἕψειν, ἢ σὺν τῇ ῥητίνῃ τηκτὸν, ὑποτίθεται. ἐχεφόνεσι δὲ καὶ ἐπίπλασμα, ἑψηθεῖσα σὺν ὄξει. τῆς γὰρ ὀπτῆς πρὸς ἓν μέρος τῆς σκίλλης, σεσηκλεαδώτης ἀλφῶν ὀπτῶν μέρη ὀκτὼ, διδόμεν κοχλιάριον ἓν ἢ δύο πίστει τοῖς μάλαξιν εἰλίας.

Marc. ἡ καὶ πρὸς

εἰς ποτήματά τε καὶ ἀρωματικὰς δυνάμεις, καὶ ἐφ' ὧν ὕδρωπας κινῆσαι θέλομεν, καὶ ὑδρωπικοῖς, καὶ στομαχικῶν οἷς ἐπιπολάζει τὰ σιτία, καὶ ὅτι ἐκτήρου, φρονιμάκῳ, βηχῶσιν χρονίως, ἀδρομαλικῷ, αἱμοπτοϊκῶν. αὐτὴ ῥιζὴ ἢ ἀλκὴ πρωτόλου σὺν μέλιτι ἐπιλειχθεῖσα. ἡ συνεψηθεῖσα δὲ τῷ μέλιτι, καὶ βυρρώσεται πρὸς τὰ αὐτὰ, μᾶλιστα πτισθεῖσα συνεργοῦσα. ἄγει δὲ ἡμιωβολιαίου καὶ χιλίαι. ἐφθὴ δὲ πρὸς τὰ αὐτὰ ποιεῖ, ὁμοίως λαμβανομένη. φυλάττεσθαι δὲ καὶ αὐτῆς τὴν δόσιν δεῖ, ἐφ' ὧν ἕλκωσίς τις ἐστὶν ἐντός. καὶ πρὸς ἀκροχορδόνας ποιεῖ ἡ χύμευσις ἐγχριομένη ἐπὶ πολύ. Conclusa in vetusto codice omittuntur. ὃ δὲ ἀπόμαγμα τῆς αὐτῆς λαμβανόμενον εἰς ὑγρὰ δὶ μέλιτι καὶ βρωθὲν, ἡμιωβολιαίου καὶ χιλίαι. ἔστι δὲ καὶ ἐξιφάρμακον ἄλλη πρὸ τῶν θυρῶν κρεμαμένη.

A In potiones quoque & aromaticas compoſitiones addita, ijs prodeſt quibus vrinã ciere volumus, itémque hydropicis & ſtomachicis quibus innatat cibus, regio morbo laborantibus, torminoſis, tuſſi vetere infeſtatis, ſuſpirioſis & ore ſanguinem reijcientibus. Pondus verò ternûm obolorum ex melle delingi ſat eſt. Coquitur & in melle eſtúrque in eoſdem vſus, concoctionem plurimùm adiuuans. Strigmenti verò in modum viſcida recrementa aluo detrahit. Sed & elixa ſimili ſumpta modo, eoſdẽ præbet effectus. Veruntamen cauendus ipſius vſus ijs quibus eſt interna quæpiam exulceratio. Quin & toſta ad penſiles verrucas & pernionem efficaciter illinitur. Ipſius verò ſemen tritum, carica aut melle exceptum atq; deuoratum, aluum emollit. Eſt & tota pro foribus ſuſpẽſa contra malorum medicamentorum noxiam remedio.

B

C

Περὶ Παγκρατίου. Κεφ. σγ'.

Vetuſtior caret, εἴ τι καὶ ἄλλο V. non habet.

ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ, ὃ ἔνιοί τε σκίλλαν ὀνομάζουσι, ῥίζα ὅτι βολβῷ μεγάλῳ ὁμοία, ὑπόπυρρος ἢ ὑπόπορφυρος, πικρὰ καὶ πυρώδης τὴν γεῦσιν. φύλλα χρίνῳ ὅμοια, μακρότερα δέ. ἔχει δὲ δύναμιν τὴν αὐτὴν τῇ σκίλλῃ, καὶ σκευασίαν, καὶ δόσιν, ποιοῦσαν ὅτι τῶν αὐτῶν παθῶν διαφορᾶ μέν τι τῆς σκίλλης ἡ τούτου δυνάμις. ὀθνεῖον γὰρ χυλιζομένη ἡ ῥίζα τούτου, μιγνυμένη τε ὀξυβάπτῳ ὑδάτῳ, καὶ ἀναπλαττομένη εἰς δρόσους, διδοῦ σὺν ὑδρομέλιτι πλευριτικοῖς καὶ ὑδρωπικοῖς ὠφελίμως.

D

E

De Pancratio. Cap. CC III.

PANCRATIVM, quod etiam aliqui ſcillam (puſillam) appellãt, radice eſt magno bulbo ſimili, ſubrufa aut ſubpurpurea, amaro feruidóque guſtu, folijs lilij, ſed longioribus. Scillæ vires & præparationẽ eandem habet, ac eodem quoque pondere ad eoſdem affectus efficaciter exhibetur. Attamen huic mitior quam ſcillæ facultas ineſt: quõ fit vt & huius radicis ſuccus expreſſus ad crui farinam admixtus in paſtillos digeratur: qui quidem vtiliter ex hydromelite ſpleneticis hydropicíſque dantur.

Περὶ Καππάρεως. Κεφ. σδ'.

ΚΑΠΠΑΡΙΣ θάμνός ἐστιν ἀκανθώδης, ὅτι γῆς γεγραμμένος, ἀκανθώδεσι καμπτοειδέσιν ἔχων ὡς βάτος φύλλα στρογγύλα, μηλέᾳ κυδωνίᾳ ὅμοια· καρπὸν δὲ ὡς ἐλαίας, ὃς ἀνοιχθεὶς λευκὴν τὴν ἔσω αὐγὴν· οὗ πεσόντος, ὠὸν εἴσεται τι οἷον βάλανος ὀπιμήκης, ὅταν ἀνοιχθῇ ἔχει κόκκους ὡς ἄρροιας, μικροὺς, ἐρυθροὺς· ῥίζας ξυλώδεις καὶ μεγάλας, πλείστας. φύεται πυκνότατα ὀρεσί τε καὶ λεπτοχείοις τόποις, καὶ νησοις, καὶ οἰκοπέδοις. πεφυκὸς δὲ ἐκ παλαιᾶς αὐτῆς ὁ καρπὸς

F

G

De Cappari. Cap. CC IIII.

CAPPARIS frutex eſt aculeatus, per terram in orbẽ ſtratus. Spinas vt rubus habet in hami modũ aduncas: folia mali cotonea, rotunda: fructum vero oliuæ inſtar: quĩ cum dehiſcens panditur, florem promit candidũ. Hoc verò dilapſo nonnihil glandis oblongæ figura inuenitur, quod apertũ grana tanquam punici mali, exigua rubentiáque intra ſe oſtendit. Radices lignoſæ ſunt, grandes ac numeroſæ. Aſperis plerunq; locis, tenuiq; ſolo, in inſulis domorũq; areis naſcitur. Porrò caulis ipſi⁹ ac fruct⁹ cibi gra-

tia ſale condiuntur. Aluum autem turbat, ſtomacho aduersatur, ſitimque gignit. At cocta tamen ſi edatur, ſtomacho quam cruda vtilior. Fructus drachmarum duarum pondere ex vino potus ad dies quadraginta, lienem abſumit: quippe qui vrinam trahat, cruentúmq; alui excrementum educat. Epotus itidem iſchiadi & paralyſi ſuccurrit, itémque ruptis & conuulſis: mẽſes quoque ciet, ac pituitam capite detrahit. Quin & dentium dolorẽ ſedat ex aceto decoctus, colluto inde ore. Radicis autẽ cortex aridus, tum ad antedicta valet, tum etiam quoduis vetus, ſordidum & calloſum vlcus expurgat. Splenẽticis quoque cum hordeacea farina imponitur. Sed & dente demorſa radix, eius dolori auxiliatur: & cum aceto trita, vitiligines albas exterit. Denique radix foliáque trita duritias ſtrumáſque diſcutiunt: aurium verò vermiculos infuſus ſuccus enecat. Porrò capparis Africa, præſertimque quæ apud Marmaridas appellatos naſcitur, vehemẽter inflat. Apula vomitum facit: quæ autem è Rubro mari & Arabia defertur, acerrima: ſiquidem in ore puſtulas excitat, & gingiuas oſſe tenus exeſt: quapropter eſt cibis inepta.

De Lepidio. Cap. CCV.

LEPIDIVM, quod aliqui gingidium vocant, herbula vulgo nota, quæ muria cum lacte conditur. Vis foliorum acris & exulcerans: quapropter iſchiadi per quam eximium eſt ac ſingulare remedium, ſi trita cum helenij radice ad quartã horæ partem imponatur. Lienoſis ſimili modo prodeſt: ac lepras quoque tollit. Radix autem adalligata collo, dentium dolores compeſcere ac inhibere creditur.

De Ranunculo. Cap. CCVI.

RANVNCVLI, quod aliqui apium agreſte nominant, plura quidem ſunt genera: at vis tamen omnibus vna, acris ſcilicet ac vehemẽter exulcerans. Ac vnũ quidem coriandri foliis conſtat, ſed latioribus, ſubalbidis & pinguibus: flore luteo, interdũ purpureo. Caulis minimè craſſus eſt, ſed cubitum altus,

A πὸς εἰς ϛρῶσιν. ϛαράπλ ἡ κιλίας, ἡ κηκεσόμαχός τι ὅτι ϗ διψώδης· βρωθεῖσα ἡ ἐφθή, εὐστομαχωτέρα τῆς ὠμῆς. ὁ μὲν οὖν καρπὸς αὐτῆς ἀπολιῶσα πίνϛ, ὁλκὴ δυοῖν < μετ' οἴνου πινόμενος ἐπὶ ἡμέρας μ'· ἀ-
γλὴ ἡ ὕδρον ϗ· ἔχει χώρημα αἱματῶδες. ἰ- V. διαχωρη
χαδὶ τὲ ϵ πϱαλύσϵ βοηθεῖ πινόμενος ὁ
B καρπὸς, ϗ ϱωϱὸς ῥήγμαϵι ϗ ἀπάσμαϵι· ἐμμηνά τε ἄγλ ϗ ἀποφλεγμαίνϵι. ϗ ὀ-δόντων πόνον παύϵ ὁ καρπὸς σὺν ὄξϵι ἐψόμενος ϗ ἔχει κλυζόμενος. τῆς δὲ ῥίζης ὁ φλοιὸς ξηρὸς, ϱωϱός τε τὰ ϱοφρημένα ἁρμόζϵ, ϗ αἱ ἀκαθάρϵ πϵρὶ χρόνιον ϵ ῥυπῶν ϵ τετυλωμένον ἕλκος. κϵίαπλά-
C σει ἡ καὶ ἐπὶ τ καλπικῶν σὺν ὠμῇ λύσϵ· δακνομένη τὲ ὦ πονᾶ ὀδόντι βοηθεῖ· ἀλφοὺς τε λευκοὺς ἀποσμήχϵ σὺν ὄξϵι λαβ. τὰ δὲ φύλλα ϗ ἡ ῥίζα λειανθέντα, σκληρίας καὶ χειράδας ἔχει φορᾷ. σκώληκας τιθεῖς ἐν ὠσὶν ὁ χυλὸς ἐγχυμαλιθεὶς κϵῖϵ. Ἡ μέν τοι Λιβυκὴ κάππαρις, ἡμιωμένη ἡ κϵῖται Μαργαρίτας λεγομένας, ἐμπνευματοῖ ἰσχυρῶς. ἐμετικὴ ἡ τυλχανὼ ἡ ἐν Ἀπυλίᾳ. ἡ ἐκ τ Ἐρυθρᾶς θαλάσσης ϗ Λιβύης, δριμυτάτη, φλυκταίνουσα τὸ σῶμα, ϗ κατιαθίουσα πὰ ὅλα ἄχρι γυμνώσϵως· ὅθεν ϱὸς ϱῶσιν ὄϛι
D αἰϵπιτήδϵος.

Lacuna in vetuſtis codice le-. ge διασπωσαν

Alias αἵτε τε

E Περὶ Λεπιδίου. Κεφ. σὲ'.

ΛΕΠΙΔΙΟΝ, ὃ ἔνιοι γιγλίδιον καλοῦσι, γνώριμον βοτάνιον, παριχνύμενον εἰς ἁλμησίας μϵτ' ἀλεκίδος. Δύναμις δ' ἐϛὶ τ φύλλων δριμεῖα ἔχουσα ἰσχνόν. ὅθεν ἰσχιαδικὸν ἐϛὶ ἐπίπλασμα ἀμυντικώτατον, λεῖον σὺν ἐλαίῳ ῥίζη ἐπιλϵιόμενον ϱὸς τέτϱατον ὥ-
F ρας. ϗ ἐπὶ καλπικῶν ὁμοίως ἀφίϛησι· ϗ ϵ λέπρας. ἡ ῥίζα δακϵὶ ὀδόντων ἀγήματα πϱάττϵι, πϵριαπλομένη τοῖ τραχήλου.

Cornelius ὑδάσσϵ

Περὶ Βατραχίου. Κεφ. σϛ'.

BATPAXION, ὃ ἡ, στάλινον ἄγριον καλοῦϛι πολλὰ πλείονα μϵν ὄϛι εἴδη. δυνάμϵις δ' ὁμοία, δριμεῖα ϗ ἄγλυ ἐλ-
G καλική. ἔχϵι δὲ ϵ μὲν αὐτῶν, φύλλα ὅμοια κοσίῳ, πλατύτϵρα ἡ ϗ ὑποπόλιον ϗ λιπαρά· αἰϑὸς μήλινον, εἶϵι τὸ πορφυροῦν καυλὸν ἡ ὑ πηχῦν, [ὕψος ἡ ὅλον πήχεως.]

V. hæc ad finem omittit.

V. non habet cõclusionem neque quod sequitur

Lacuna legit ῥίζαν μικραὶ λευκὴν μικραὶ ἔχουσαν ἀ-

πο φύσεις ὡς ἑλλέβορου· φύεται δὲ πρὸ ἀρεί-

Orib. γονατώδη ἔχουσαν. Plinio foliosius. V. πολύφυλλον Forte Σαρδόνιον

φυεις. Εστι δὲ ἕτερον εἶδος χλωρώδέστερον καὶ μακροκαυλότερον, ἐλλόμασ ἔχον πλείους τῶν φύλλων, πλῆσον ἐν Σαρδονίᾳ γινόμενον, δριμύτατον, ὃ δή τινες σίλινον ἄγριον καλοῦσι· τὸ δὲ τρίτον σφόδρα μικρὸν καὶ δύσοσμον,

Dodonæus restituit ὃ καὶ Addit Ald τὸ ἄνθος Cor. χλωρόν. Roell & Marc. inter τὰ φύλλα & τὸ, οἱ καυλοὶ, καὶ αὐτὰ videtur legisse. Sic & habetur in notis Ald. cod.

ὃ αὖθος χρυσῷ ὅμοιον. τὸ τέταρτον ἐοικὸς τούτῳ, αὐθος γαλακτίζον. Δύναμιν δὲ ἔχει τὰ φύλλα ἕλκη οἱ καυλοὶ ἀπαλοὶ καθαπλασθέντες, καὶ σαπτικὴν καὶ ἐξαρωτικὴν μετὰ πόνου· ὄνυχας λεπτοὺς καὶ φύμας ἀφίστησι, καὶ στίγματα ἐξαίρει, καὶ μυρμηκίας καὶ ἀκροχορδόνας καὶ ἀλωπεκίας, πρὸς ὀλίγον

V. addit χλωρά.

καταπλασθέντα· ἐφύμνια δέ, καὶ τὸ τέλειον χαμαιπίτυων ἐστὶ χλιαρόν. καὶ ῥίζα πεσσομένη κινεῖ, ξηρὰ λεῖα προσφερομένη τοῖς μυκτῆρσι· καὶ ὀδόντων λύσεις κινεῖ σὺν ὄξει πεσσομένη, ἀφίστησι δὲ τοὺς αὐτούς.

Περὶ Ἀνεμώνης. Κεφ. οζ.

ΑΝΕΜΩΝΗ διττή, καὶ μὲν ἀγρία, καὶ ἥμερος· καὶ τῆς ἡμέρου, καὶ μὲν τις φοινικοῦ φέρει τὸ ἄνθος καὶ δέ, κυάνεον καὶ γαλακτίζοντα, καὶ πορφυροῦν. φύλλα δὲ κορι-

Alter χλοάνθη, quam interpretati Serapio & Hermolaus secuti sunt.

ανδρῷ, λεπτομερέστερα πρὸς τῇ γῇ· καυλία χλοώδη, λεπτά, ὑφ' ὧν τὰ ἄνθη ὡσαύτως μήκωνος, καὶ μέσα κεφάλια μέλανα, καὶ κυανίζοντα· ῥίζα κατὰ μέγεθος ἐλαίας καὶ μείζων, οἱονεὶ γόνασι διειλημμένη. καὶ δὲ ἀγρία κατὰ πάντα μείζων τῆς ἡμέρου, καὶ τοῖς φύλλοις πλατυτέρα καὶ σκληροτέρα. τὴν τε κεφαλὴν βραχυτέραν ἔχει· αὖθος φοινικοῦν, ῥίζα λεπτὰ δὲ πλείω. καὶ δέ τις ἔχει φύλλα μέλανα, δριμυτέρα οὖσα.

V. quidam addit Δύναται, φλεγμονὰς ἰᾶται.

Δύναται δὲ ἔχειν δριμύτητα ἀμφότερα· ὅλου ὁ χυλὸς τῆς ῥίζης αὐτῆς εἰς χοιρείς, πρὸς κεφαλῆς καθαρσιν ἁρμόζει. μασηθεῖσα δὲ ἡ ῥίζα, φλέγμα ἄγει· ἐφθεῖσα δὲ ἐν γλυκεῖ καὶ κολλητικῷ, ὀφθαλμιῶν φλεγμονὰς ἰᾶται· καὶ τοῖς ἐν ὀφθαλμοῖς οὐλὰς καὶ ἀμβλυωπίας ἀποσμήχει, αἱματοῦται δὲ καὶ τὰ ῥυπαρὰ τῶν ἑλκῶν τοῖς φύλλοις καὶ οἱ καυλοὶ συνεφθέντες πιαστικὴ καὶ ἰαθρομένα. γάλα κεῖα ἀσὰ ἐν προσθέτῳ δὲ ἔμμηνα αἴρει· καταπλασθεῖσα δὲ, λέπρας ἀφίστησιν. Ἔνιοι δὲ

V. quidam putant hæc ad finē vsq; illegitimè ascripta & expositioni quandā esse.

A Radice nititur exigua, candida & amara, adnatis ceu capillamentis, hellebori modo, fibrata: iuxta fluēta nascitur. Alterum est lanuginosius, longioréque caule, pluribus foliorum incisuris, plurimum in Sardinia proueniēs, acerrimum, quòd etiam syluestre apium appellant. Est & tertium valde paruum & odore graui, flore aureo. Quartum simile huic, flore lacteo. Folia & caules tenelli vim habent illitu exulcerandi, & vsque adeò vrendi, vt etiam crustas cum dolore inducat. Quare scabros vngues auferūt, psoras remouent, stigmata delēt: itémque formicationes ac pensiles verrucas & alopecias ad breue tempus C imposita tollunt. Quin & repente eorum decocto perniones fouētur. Radix verò sicca tritáque, sternutamenta ciet, naribus admota: dentium quoque dolores appensa leuat, ipsos tamen rumpit.

De Anemone. Cap. CCVII.

D ANEMONES duūm est generū: syluestris quidem vna, satiua altera. Et in satiuæ quidem genere est quæ phœniceos flores habeat, altera quæ candicantes, aut lacteos, aut purpureos. Harū folia coriandro similia, sed proximè terram scissa tenuiùs. Cauliculi lanuginosi, tenues, in quibus flores veluti papaueris, & in medio capitula nigra aut cærulea: radix oliuæ magnitudine, aut etiá maior, veluti geniculis distincta. At syluestri amplitudo prius maior quàm satiuę, foliisque est latioribus ac durioribus: capite oblongiore, flore phœniceo, tenuib⁹ ac plurib⁹ radiculis. Est & quædam folijs nigris, quæ quidem acrior est. Vis vtriusque acris: qua de causa ipsius F radicis succus naribus infusus valet ad purgandum caput. Commanducata verò radix, pituitam trahit. Decocta autem in passo & imposita, medetur oculorum inflammationibus: sed & cicatrices eorundē ac hebetudines emendat, sordidáque vlcera expurgat. Cæterùm folia & caules si cum ptissana decoquantur, & in cibo sumantur, lactis G fœcunditatem præstat: subdita autem in pesso menstrua ciunt. Illita quoque, lepras eximunt. Sunt qui

neſciétes ab anemone ſyluestri diſtinguere argemonen dictam & papauer rhœas (de quo inter genera papaueris agemus) propter florum in puniceo colore conuenientiam, cupatorium errore ducti argemoniam appellent. Veruntamen tum argemone, tum & rhœas minùs saturato puniceo colore visuntur, & vtraque serius floret. Quinetiam argemone croceum gustuq; admodum acrem liquorem reddit: rhœas verò, candidiorem & acrem. Insuper vtrique intermedia sunt capitula syluestris papaueris similia, nisi quòd argemones quidem capitulum supernè latiusculum est, rhœadis autem aliquantò angustius. At anemones genera nequoliquorem reddunt, neque capitula calycéve habent, sed velut asparagi cacumen. Denique & in aruis cultive illa plerunque nascuntur.

De Argemone. Cap. CCVIII.

ARGEMONE tota quidem syluestri papaueri similis est: sed folium habet quale anemone, diuisum: florē in cauliculo puniceum: caput quale papauer rhœas, sed oblongius & summis partibus latum: radicem rotundam: liquorem verò reddit croci colore & acrem. Illita folia argema & nubeculas expurgant, inflammationésque compescunt.

De Anagallide. Cap. CCIX.

ANAGALLIDIS duo sunt genera, quæ flore distant. Nam quæ cæruleo est flore, fœmina dicitur: mas, quę phœniceo. Fruticesſũt exigui, in terra iacentes, quibus folia in quadrangulis cauliculis pusilla, subrotunda, ad folia helxines accedẽtia: fructus rotundus. Vtraque porrò vim habet mitigãdi, inflammationes arcendi, adactos corpori aculeos extrahendi, & nomas cohibendi. At succus earum capitis pituitam gargarizatu euocat, & naribus infusus dentium dolorem lenit, si in narem dolenti denti oppositam immissus fuerit. Emendat & argema cum melle Attico, & oculorum hebetudini opitulatur. Sed & morsis à vipera prodest, ex vino

A μὴ δυνάμενοι διορίζειν ἀπὸ τ ἀγρίας ἀνεμώνης τὴν λεγομένην ἄργεμώνιλλον καὶ τ Alter ἀργεμῶνα
ροιάδα μήκωνα (περὶ ἧς ἐν τ μήκωνι ἱστορήσομεν,) διὰ τὸ τὴν αὐτὴν ὁμόχροιαν, φοινικῶν ὑπάρχειν, πλατυσῶν) τ ἀργεμώνην βύπαστέριον ὀνομάζοντες. πλείω τῆς ἀγριομήνης ἤτριον ἔχει τὸ φοινικῶν ὅτι καὶ τ
B ροιάδος, ὀψιαίτερον δὲ αὐτὴ καὶ ἡ ἀργεμώνη αἴρουσι. καὶ ἡ μὲν ἀργεμώνη ὅπαν δριμύν στροχίζουσα, καὶ δριμὺν πρὸς τὸ γεῦσαι ἰσχυρῶς· ἡ δὲ ροιὰς, λιπαρώτερον καὶ δριμύν. ἀμφότεραι δὲ μεταξὺ κεφάλια μήκωνι ἀγρίᾳ πολλαπλήσια ἔχουσι, πλὴν ὅ μὲν τῆς ἀργεμώνης αὐλὼν ὑπόπαχύ, ὁ δὲ τ
C ροιάδος, ὑπόλεπτον. αἱ δὲ αἰσθήσεις ὅτι ὅπαν αὐταῖσιν, οὔτε κωδίαν ἔχουσιν, ἀλλ' οἱονεὶ ἀσπαράγου ἄκρον. ἐν ἀρούραις τὸ τὸ πλῆθος ἐκφύεται φύονται.

In altero legitur eadem lenitas emittere δὲ αἱμὰ τὴν αἰσθησιν. Vulg. exempt αἰσθήσεις V. codex τὸ Ν αὐτὴν αἴρουσιν ἰσχυρὰ ὁ· Vat. inter. ἀδὲ Par. καὶ ἀλλ

Περὶ Ἀργεμώνης. Κεφ. σή.

ΑΡΓΕΜΩΝΗ, ὅλον μὲν ὅμοιόν ἐστι ἄγριον ἀνεμώνης μήκωνι. ὁ δὲ φύλλον αἰσθήσεως
D ἔχει ὅμοιον, ἐξορμένον, ἀπ' αὐτοῦ φοινικοῦν, κεφαλὴν δὲ ἔοικε μήκωνι ροιάδι, ὀπτομηκεστέρᾳ δὲ καὶ πλατυτέρᾳ τὰ αὐτὰ μέρη ῥίζαν στρογγύλην. ὅπαν δὲ ἀμήσῃ στροχίζουσα, δριμύ. καθαίρει δὲ ἄργεμα καὶ νεφέλια. καὶ φλεγμονὰς παρηγορᾷ τὰ φύλλα· καὶ ἁπλᾶ τὰ σπάσματα.

V. codex τὸ Ν αὐτὴν αἴρουσιν ἰσχυρὰ ὁ· Vat. inter. ἀδὲ Par. καὶ ἀλλ

Περὶ Ἀναγαλλίδος. Κεφ. σθ'.

E ΤΗς ἀναγαλλίδος διττόν εἶδός ἐστι, διαφέρει αὐτὰ. ἡ μὲν γὰρ κυανέαν ἔχουσα τὸ αἶσθος, θήλεια λέγεται· ἡ δὲ φοινικοῦν, ἄρρεν. θαμνία δὲ ἐστι καὶ χαμαὶ ἑρπετὰ ἐστι γῆς, φύλλα ἔχοντα ὅτι τετραγώνων καυλίων μικρά, στρογγύλα
F [πρὸς τὰ τῆς ἑλξίνης,] καρπὸν στρογγύλον φέρει· εἰσὶ δὲ ἀμφότεραι πρὸς αὐτὴν καὶ ἀφλέγμονοι, σχεδόν τι ὅτι ἀσπάσιαι καὶ, νομὴν ἐφεκτικαί. ὁ δὲ χυλὸς αὐτῶν ἀναγλαφαιρούμενος, ἀποφλεγματίζει καὶ φαλακρόν· καὶ ῥινὶ ἐγχεόμενος, ὀδόντων πόνον παύει, ἐὰν εἰς ᾧ αὐτὴν εἰμένον μυξωτῆρα τοῦ ἀλγοῦντος ἐμβληθῇ· καθαίρει καὶ ἄργεμα μετὰ μέλιτος Ἀττικοῦ, καὶ ἀμβλυωπίας βοηθεῖ. ὠφελεῖ καὶ ἐχιδνήσεις μετ' οἴνου

In fine v. cod. margo habet, ἡ ἰσχὰς ἀναγαλλὶς καὶ ἡ πορφυρᾶ ἀναγαλλὶς καὶ ἡ κυανῆ. Hoc cap. in cod. vet. Cratevæ tribuitur. V. caret conclusi. χλωρὸν καὶ V. caret, vsque ad ἡ χαμαὶ.

Lacuna addit ex cod. v. ἡ ὑφαιμοῦς

πινόμενος, ἢ νεφριτικοῖς, ἢ ἡπατικοῖς. φασὶ δ' ἔνιοι τὸν μὲν ἔχοντα τὸ κυάνεον ἄνθος, προπίπτοντός δακτυλίου ἕλκειν· τὸν δὲ φοινικοῦν, ἐρεθίζειν καὶ καταπλαστέον.

γ. cod. quidã in extremo cap. καὶ Κρατεύας ὁ ῥιζοτόμος αἱ μελαινίδες ἀμφότεραι τραυματικαὶ φλεγμονῆς, σκολόπων ἀναστροφαί. Catac addit, καὶ Κρατεύας ὁ ῥιζοτόμος οἱ τὰ αὐτὰ καὶ τοῦτο ἀπεφήναντο.

Περὶ κισσοῦ. Κεφ. σλ'.

ΚΙΣΣΟΣ πολλὰς ἔχει διαφορὰς ἔν τε εἴδεσι, καὶ ὑμηκώμασι πᾶσι ῥᾴστοις. λέγεται δὲ ὁ μὲν τις λευκός, ὁ δὲ μέλας, ὁ δὲ τρίτος, ὁ καλούμενος. ὁ μὲν οὖν λευκός, φέρει τὸν καρπὸν λευκόν· ὁ δὲ μέλας, μέλαινα ἔχει κροκίζοντα, οὓς δή τινες καὶ ἰδίως Διονύσιον καλοῦσιν. ὁ δὲ ἕλιξ ἄκαρπός τε ἐστὶ, καὶ λεπτοὺς ἔχει τοὺς κλήματα, καὶ τὰ φύλλα λεπτὰ καὶ γωνιώδη καὶ ἐρυθρά. πᾶς δὲ κισσὸς δριμύς ἐστι, συμπτικὸς, καὶ νευρώδους ἁπτικός. ποιεῖ δὲ αὐτὸ τὰ μὲν αὐτὰ ἅπερ καὶ τοῖς δακτύλοις ληφθέντα καὶ πολύζωα ἐν οἴνῳ, πρὸς δυσεντερικούς. δίς δὲ τῆς ἡμέρας δεῖ πίνειν· καὶ πρὸς πυρίκαυσα δὲ ἁρμόζει σὺν κηρωτῇ λεαινθέντα. πρὸς δὲ ἀπαλοὺς τοὺς φύλλων σὺν ὄξει ἑψόμενα, καὶ ὠμὰ ἄρτῳ συνληφθέντα, κολλᾶται ἰῶσι. ῥυείσχυτον δὲ ὁ χυλὸς τοῦ φύλλου καὶ τὸν χυμὸν σὺν ἰρίνῳ, ἢ μήλῃ, ἢ νίτρῳ, ἐπὶ πρὸς τὰ χρόνια τῶν κεφαλῆς ἀγκύλματα ἁρμόζει, καὶ ἐπιβρέχει σὺν ὄξει καὶ ῥοδίνῳ· ὠτηγίας δὲ καὶ πυορροούσῃ ὠτὶ σὺν ἐλαίῳ ἰᾶται. τὸν δὲ μέλανα κισσοῦ ὁ χυλὸς καὶ οἱ κόρυμβοι πινόμενοι, ἀτονίαν ποιοῦσι, καὶ παρεμφαίνουσι τὸν σπέρμα πλεονάζοντες. λαμβάνει δὲ σφαιρία πέντε τοὺς κορύμβους θερμαινόμενα σὺν ῥοδίνῳ ἐν σιδίῳ, καὶ ἐνσταζόντα εἰς τὸ αὐτὸ κείμενον ὡς ἐπὶ ὀδοντάλγιας, τὸ δάκνημα παύει. μελαίνουσι δὲ καὶ τὰς τρίχας οἱ κόρυμβοι. καταπλάσσει δὲ τὰ φύλλα πρὸς πᾶν ἕλκος, ἐφθὰ σὺν οἴνῳ. καὶ καταπλασσόμενα, καὶ καυμάτα καὶ κόπῃ, καὶ ἐφηλίδας θεραπεύει ὡς προείρηται ἔφθα. κινοῦσι δὲ καὶ καταμήνια ὑποτιθέντες οἱ κόρυμβοι λεῖοι· καὶ πολύποδες δὲ μετὰ πηλοῦ καθαρσιν < πλῆθος, ἀπίκιον ὀξύ. καὶ ὁ μύελος δὲ τῶν φύλλων μέλιτι δεθεὶς καὶ προσθεὶς τῇ μήτρᾳ, ἔμμηνα ἄγει καὶ ἔμβρυα. ὁ δὲ χυλὸς σὺν ζόμβοις καὶ σὺν τοῖς ῥοῦσι δυσωδίας καὶ σηπεδόνας ἀνακαθαίρει. ὃ δὲ δάκρυον αὐτοῦ φλεγμονὴν πέπαυκε· καὶ

Byzantinus codex caret.

Al ἰχαλυβίμενον.

A potus, itémque nephriticis, hepaticis, atque hydropicis. Cæterùm aiunt nonnulli impositam eam quę cæruleum edit florem, sedis procidétiam retro agere: quæ verò phœniceum, eandem proritare.

De Hedera. Cap. CCX.

B HEDERA multas in specie differentias sortitur: summas autem genere tres. Est enim candida quędam, nigra altera, tertiáque quę vocatur helix. Et candida quidem, fructum fert candidũ: nigra, quam etiam vulgus Dionysiam vocat, nigrum aut croci æmulum. At helix fructum non gignit, tenues autem habet viticulas: folia vero parua, C angulosa & rubra. Porro hedera omnis acris est & astringẽs, neruosúmque genus tentat. Flores ternis digitis capti, & in vino poti, ad dysentericos faciunt: sed bis die potari oportet. Ijdem cum cerato triti, ambustis prosunt. Recentia autem molliáve folia ex aceto decocta, aut cruda cum pane detrita, lienem sanant. At succus foliorum & corymborum cum irino vnguento, melle D aut nitro contra veteres capitis dolores vtiliter per nares infunditur. Perfunditur & eo caput cum aceto & rosaceo. Dolentibus verò purulentisque auribus cum oleo medetur. Nigræ autem hederæ succus & corymbi epoti sterilitatem faciunt, mentémque turbant largiùs sumpti. Globosi vero corymborum acini quinque, triti calfactique cum rosaceo in Punici cortice, & in dolore dentium contrariæ auri instillati, dolorem mitigant. Denigrant & capillum corymbi. At folia in vino cocta, omni vlcerum E generi illinuntur. Ambusta quoque, etiá maligna, & maculas a sole contractas sanant, velut antè dictum est, decocta. Mouent & menses corymbi triti ac subditi. Ijdem post purgationes fœminarũ drachmæ pondere poti, spem conceptionis adimunt. Sed & pediculus foliorum melle irrigatus, & vuluæ inditus menses & partus extrahit. Succus autẽ instillatus, narium grauedinem emendat, & earundem putrida vlcera expurgat. Hederæ verò lachryma ptilothrum est: ac

illitu pediculos enecat. Radicum deniq; ſuccus in aceto potus, morſis à phalangio ſuccurrit.

De Chelidonia. Cap. CCXI.

CHELIDONIA maior caulem profert cubitalem, aut etiam altiorem, gracilem, qui quidem adnatos habet ramulos folijs refertos. Sunt autem ea ranunculi folijs ſimilia, at molliora tamen, & aliquantum colore glauco: flos verò ſecundum ſingula folia prodit, vti violæ albæ. Succus croceus eſt, acris, mordax, aliquantulum ſubamarus & graueolens. Radix ſupernè quidem ſingularis eſt, at infernè in multa crocea capillamenta fibratur. Fructus ceu corniculati papaueris, tenuis, longus, coni ſeu metæ figura, in quo exigua ſemina papaueris ſeminibus maiora cõcluduntur. Succus melli admixtus, & in æreo vaſe prunis decoctus, oculorum aciem adiuuat. Folijs verò, radice & fructu ineunte æſtate ſuccus exprimitur: qui quidem ſiccatus in vmbra digeritur in paſtillos. Radix cum aniſo ex vino albo pota, regio morbo medetur, itémque herpetibus, impoſita cum vino: ſed & commanducata dentium dolorem ſedat. Porrò creditur chelidoniæ nomẽ ſibi vendicaſſe, quòd primo ſtatim hirundinum aduentu erumpat, earundémque diſceſſu marceſcat. Sunt & qui tradiderint, ſi quis ex hirundinum pullis excæcatus fuerit, matres admota herba illius cæcitati mederi, adeóque viſum reſtituere.

De Chelidonia minore. Cap. CCXII.

CHELIDONIA minor, quam ſylueſtre triticum aliqui nuncuparunt, herbula eſt pediculis ab radice pendens, ſine caule, folijs hederę figura, ſed multò rotũdioribus ac minoribus, mollib⁹ & ſubpinguibus circũdata. Radices habet ex eodẽ callo complures, puſillas, in granorum tritici modũ aceruatim congeſtas, quarum tamen tres quatuórve in longitudinẽ protẽduntur. Cęterùm iuxta aquas paluſtriáq; loca naſcitur. Vim acrem obtinet, & anemones modo ſummã cutẽ exul-

A κτείνῃ φθεῖρας ἐπαλείφόμενον. ὁ δὲ πρὸς ῥιζῶν χυλὸς σὺν ὄξει· πολὺς, φαλαγγιοδήκτοις βοηθεῖ.

Lacuna ex vet. cod. reſtituit, σὺν ὄξει ὁ ἰατρὸς καὶ πολύς. V inſert, ἐλάσμασιν

Περὶ Χελιδονίης τῆς μεγάλης. Κεφ. σιά.

B ΧΕΛΙΔΟΝΙΟΝ μέγα καυλὸν αἴνησι πηχυαῖον, ἢ καὶ μείζονα, ἰσχνὸν, ἔχοντα περὶ φυάδας φύλλων μεσαί. φύλλα ὅμοια βατραχίῳ, πυφερώτερα μέν πως τὰ τῆς χελιδονίης καὶ ὑπόγλαυκα τῇ χρόᾳ. ἐκ δὲ ἑκάστου φύλλου αἴγλης ὥσπερ τὸ λευκόιον. χυλὸς δὲ χρωμώδης, δριμὺς, δηκτικὸς, ποσῶς ὑπόπικρος καὶ δυσώδης· ῥίζα αὖθι μὲν ἐστὶ μία, κάτωθι δὲ πλείονες, χροιὴν ἰδιῖς τὸ χρόαν. καρπὸς ἦ ὥσπερ τῆς κεραΐτιδος μήκωνος, λεπτὸς, μακρὸς ὡς κώνος, ἐν ᾧ σπερμάτια μείζονα μήκωνος. ταύτης ὁ χυλὸς μιγεὶς μέλιτι καὶ ἐψηθεὶς ἐν χαλκῷ ἐπ' ἀνθράκων, ἁρμόζει πρὸς ὀξυδορκίαν. χυλίζεται δὲ τὰ φύλλα καὶ ῥίζα καὶ ὁ καρπὸς δεχομένου θέρεος, καὶ ξηραίνεται ἐν σκιᾷ· καὶ ἀναπλάσσεται· ἡ δὲ ῥίζα πινομένη σὺν ἀνίσῳ καὶ οἴνῳ λευκῷ, ἰκτερικοὺς θεραπεύει καὶ ἕρπητας· καὶ καταπλασσομένη σὺν οἴνῳ. ὀδοντάλγιας τε παύει διαμασσομένη. δοκεῖ δὲ ὠνομάσθαι χελιδόνιον, ἐπειδὴ ἅμα ταῖς χελιδόσι φαινομέναις ἀναφύεται, ληγούσαις δὲ συμπροσκμάζει. τινὲς δὲ ἱστόρησαν ὡς ἐάν τις τυφλωθῇ τὴν τῆς χελιδόνος νεοσσῶν, αἱ μητέρες προσφέρουσαι τοῖς τέκνοις, ἰῶνται τοὺς πάρωσιν αὐτῶν.

Ita v. c. ac vulgata exẽplaria hîc καὶ. τῶν χροιὰν carent.

Lacuna legit in vet. cod. talis: δὲ σπουδαίρουσιν, ἐπειδὴ πορεύεσθαι τὰς τῶν χελιδόνων νεοσσοὺς· αἱ μητέρες προσφέρουσαι τοῖς τέκνοις τὸν χυμὸν τῶν πήρωσιν αὐτῶν.

Περὶ Χελιδονίης τῆς μικρᾶς. Κεφ. σιϐ'.

F Χελιδόνιον δὲ μικρὸν ἡ δὲ πυρὸν ἄ- Alii πίνουσι
γχει ἐκάλεσάν, βοτάνιόν ἐστιν ἐκ μίσχων ἀπηρτισμένον, ἀκαυλον, φύλλοις κισσειδέσι, περιφερεστέροις δὲ μᾶλλον καὶ μικροτέροις, καὶ πυφερωτέροις, καὶ ὑπολιπαρέσι περιεχόμενον· ῥίζας δὲ ἔχει ἐκ τοῦ αὐτοῦ μικρὰς, πολλὰς, ὥσπερ πυρὸς στοιχηδὸν μάλας. τρεῖς δὲ εἰσιν ἢ τέσσαρες αὐτῶν μακραὶ πεφυκυῖαι. φύεται δὲ πρὸ ὕδατος καὶ τέλμασιν. ἔχει δὲ τὴν δύναμιν δριμεῖαν, περιπλησίαν ἀνεμώνῃ, ἐλκοδόνῃ τὴν ὀπιφά-

G

Alius quidam, λειμῶνι V. λιμνοις

νειδω· ψώρας τε καὶ ὄνυχας λεπτύνει ἀφίστησιν. αἱ δὲ ῥίζαι χυλωθεῖσαι, χρήσιμοι εἰς μύσεις χυσίαν μετὰ μέλιτος πρὸς καθαρσιν κεφαλῆς.

cerat: psoras item & scabrós vngues eximit. Succus verò radicibus expressus, addito melle, ad purgandum caput naribus vtiliter infunditur.

Περὶ Ὀθόννης. Κεφ. οιγ'.

De Othonna. Cap. CCXIII.

Quidam codices vetusti vsque ad ἴσχει δέ, omnino cæteris carent.

Ὀθόννα· ⓓ μὲν φασι τὴν μεγάλου χελιδονίου χυλὸν εἶναι· ⓓ δέ, γλαυκίου· ⓓ δέ, τῆς κεραλίτιδος μίσχωνος τὴν αὐθέαν χυλόν. ἔνιοι δὲ μίγμα αἰαγαλλίδος τῆς κυανέας καὶ ὑοσκυάμου καὶ μήκωνος χυλῶν. ⓓ δέ, βοτάνης Τρωγλοδυτικῆς τινός, ἣν ὁμοίαν καλεῖσθαι, εἶναι χυλόν· γίνεσθαι δὲ αὐτὴν καὶ ἐν τῇ κατ' Αἴγυπτον Ἀραβίᾳ. ἔχει δὲ τὰ φύλλα ὁλόκληρα ἐμφερῆ, πολύτριχα ὡς πρὸς σπόνδυλα, ψαφαρά, ὀλιγόφυλλα. αὐξάνεται δὲ φέρει κρόκινον, πλατύφυλλον· ὅλην ἔδοξαν ἀνεμώνης αὐτὴν τινὲς εἶδος εἶναι. χυλίζεται δὲ καὶ εἰς τὰ ὀφθαλμικὰ ὅπου δεῖ ἀποκαθαίρειν, δάκνουσα, καὶ πήγνυσι τὰ ὑπερχεόμενα τοῖς κύρασιν ἀποσμήχουσα. φασὶ δέ τινα καὶ ὑγρασίαν ἀπορρεῖν τῆς βοτάνης, ἣν πλυνάντων καὶ χωνευσάντων τὸν λίθον, ἀναπλάσσουσι ἐγχύσεις πρὸς τὰ αὐτά. ἔνιοι δὲ φασιν αὐτὴν λίθον εἶναι Αἰγύπτιον ἐν τῇ Θηβαΐδι γινόμενον, χαλκόχρουν, μικρὸν τὸν μεγέθει, δάκνοντα τὴν γλῶσσαν μετὰ πυρώσεως καὶ ὕψους.

Othonna. ὀθόννη

Hæc verba sic leguntur in vetustissimis nostris: μίσχωνος μήκωνος χυλὸν, οἱ δέ. Sed vulgatam scripturam Goupylus meliorem esse censet.

OTHONNAM aiunt nonnulli maioris Chelidoniæ succum esse, quidam glaucij: alij floribus corniculati papaueris expressum succum: alij anagallidis cæruleæ hyoscyami & papaueris succorum mistura esse contendunt. Alij denique Troglodyticæ cuiusdam herbæ succum, quæ Othonna vocetur: nascique eam in eo Arabiæ tractu, qui ad Ægyptum spectat. Habet hæc folia erucæ proxima, crebrò perforata, & tanquam à tineis pertusa, squalore obsita, pauca: quare quidam anemones speciem esse existimauerunt. Ex ea succus expressus oculorum medicamentis conuenit, vbi expurgare opus est. Mordet enim, & quæcunque oculis caliginem offundunt abstergit. Tradunt & humorẽ quendam ex herba emanare, qui elotus, semotis lapillis, in pastillos ad eadem digeratur. Aliqui tamen affirmant lapidem Ægyptium esse, in Thebaïde nascentem, æreo colore, exigua magnitudine, gustu cum feruore quodam & astrictione mordaci.

Περὶ Μυὸς ὠτὸς. Κεφ. σιδ'.

De Myosotide, seu muris auricula. Cap. CCXIIII.

Μυοσώτιδα, ⓓ δὲ μυὸς ὠτίδα καλοῦσιν, ἀνίσους καυλοὺς ἀπὸ μιᾶς ῥίζης πλείονας, κατὰ γῆν θέρους τὰ κάτω γόνατα καὶ κοίλους· φύλλα δὲ τριμήκη καὶ στενά, ῥάχιν ἐπαρτημένην ἔχοντα, μελανίζοντα, λευκὰ δύο πεφυκότα ἐκ διαστημάτων, εἰς ὀξὺ ἀπολήγοντα. ἐκφύεται τε λεπτὰ καυλία ἐκ τῆς μαλακῆς· ἐφ' ὧν αἰθήλια κυανίζοντα μικρά, ὡς τὰ τῆς αἰαγαλλίδος· ῥίζα δὲ δακτύλου τὸ πάχος, ἴσχουσα πολλὰς ἀποβλαστήσεις. καλύλου δέ ἐστιν ὁμοία ἡ τοῦ σκολοπενδρίου, λειοτέρα δὲ καὶ ἐλάττων. ταύτης ἡ ῥίζα καταπλασθεῖσα ἀγριλώπια ἰᾶται. τινὲς δὲ καὶ τὴν ἀλσίνην μυὸς ὠτίδα καλοῦσιν.

Mathioli exemplar, τριμήκη ἢ μυρσινώδη.

Vetus hanc partem non legit alij continuè legunt.

Sic Ruellij codex at Parisijs.

MVRIS auricula, quam myosotida vocant, caules promit ab vna radice plures, aliquatenus infernè rubẽtes & concauos: folia oblonga, angusta, dorsi spinam elatam & eminulam habentia, nigricantia, per interualla assiduè geminata, & in mucronem desinẽtia. Prodeunt verò ex alijs tenues cauliculi, in quibus flosculi cærulei, parui, vt anagallidis. Radix digitali est crassitudine, multis fibrata capillamentis. Est denique, vt semel finiam, herba scolopendrio similis, sed læuior ac minor. Huius radix imposita ægilopas sanat. Sunt & qui alsinẽ myosotida vocitent.

De Isatide

De Isatide satiua, seu glasto. Cap. CCXV.

ISATIS satiua, qua lanarum infectores vtuntur, folium habet plantagini simile, verùm pinguius nigriúsque: caulem verò altitudine duos excedentem cubitos. Imposita folia œdema quoduis atque tubercula discutiunt, cruentáque vulnera glutinant. Erumpentem quoque sanguinem sistunt, & phagedænas, herpetas, erysipelata ac putrescentia vlcera sanant.

De Isatide syluestri. Cap. CCXVI.

Isatis syluestris, antedictæ similis est, sed folia fert maiora, quæ ad lactucæ folia accedunt: caules verò tenuiores, multifidos, quadantenus rubentes, è quorum cacumine folliculi multi linguarum figura dependent, in quibus semen: florem denique luteum ac tenuem. Eadem quæ & suprà dicta præstat, sed præterea lienosis tam pota quàm imposita auxiliatur.

De Telephio. Cap. CCXVII.

TELEPHIVM portulacæ simile est & foliis & caule: alas verò binas habet singulis foliorum geniculis inhærentes: ramuli seni septeníve à radice fruticant, foliis referti cæruleis, crassis, lentis atque carnosis: flores denique lutei sunt aut candidi. Vere nascitur in vitibus locísque cultis. Folia ad senas horas imposita, vitiliginem albam sanant: verùm posteà hordeaceam farinam adhibere oportet. Tollunt & vitiligines alphos dictas, ex aceto in sole illita: sed vbi inaruerint, abstergi ea oportet.

Libri secundi finis.

A Περὶ Ισατίδος ἡμέρου. Κεφ. σπ'.

ΙΣΑΤΙΣ ἥμερος, ἣ ⟨ω⟩ βαφὴς χρῶνται, φύλλον ἔχει ἀρνογλώσσῳ ἐμφερές· λιπαρώτερον δὲ καὶ μελανίτερον, καυλὸν δὲ ὀργυιαῖον. Δυνάμεις δὲ τὰ φύλλα καταπλασσόμενα πᾶν οἴδημα διαφορεῖ, καὶ φύματα καὶ ἕλκη τραύματα B καὶ κηλὰς αἱμορραγίας τε σίλλει, καὶ φαγεδαινικὰς, καὶ ἕρπητας, ἐρυσιπέλατά τε καὶ σηπεδόνας ἀφαπτόμενα.

V. caut.

V addit. ἀλείφει

Περὶ Ισατίδος ἀγρίας. Κεφ. σις'.

Marge: καὶ σφόν ὑπὸ τὸ κεφάλαιον τὸ ἡμερὸν ἀφαιρεῖ αἷμα τῶν.

Ισατὶς ἀγρία, παραπλησία τὴν ὄψιν τῇ προειρημένῃ, φύλλα ἔχει μείζονα τῶν τῆς θρίδακος. καυλοὺς δὲ λεπτοτέρους, πολυκλάδεις, ὑποῤῥόδους, ἔχοντας ἐπ' ἄκρῳ ὥσπερ θυλάκια γλωσσοειδῆ πολλὰ δοκοειδῆ, ἐν οἷς τὸ σπέρμα. αὐθος μίλινον, λεπτόν. Δύναται δὲ τὰ αὐτὰ τῇ προειρημένῃ, ὠφελοῦσα καὶ σπληνικοὺς πυρετοὺς καὶ καταπλασσομένη.

Epitom. addit, πολλοὶ δημῶν ἢ ἐχρησάμενοι τῶν.

Περὶ Τηλεφίου. Κεφ. σιζ'.

D ΤΗΛΕΦΙΟΝ, τοῦτο καὶ τοῖς φύλλοις καὶ τῷ καυλῷ ἔοικεν αὐδράχνῃ· μασχάλας ἔχει δύο πρὸ ἑκάστου γόνυ τῶν φύλλων ἐμφυομένας, ἀφ' ὧν κλωνία ς'. ἢ ζ'. ἀπὸ τῆς ῥίζης πλήρη φύλλων χυμωδῶν, παχέων τε καὶ γλίσχρων καὶ ⟨ὀρκωδῶν⟩, αὐξῆ μίλινα ἢ λευκά. φύεται δὲ ὡς ἄμπελοι καὶ πόαις ἐργασίμοις ἔαρος. θεραπεύει δὲ καταπλασσόμενα τὰ φύλλα ἕως ὥρας ἓξ λευκίλῳ· δεῖ δὲ μὴ ταῦτα ὠμῇ λύσαι χρῆσθαι. αἴρει δὲ καὶ ἀλφοὺς ἀλειφόμενα σὺν ὄξει ὡς πλείω. δεῖ μέν τι μετὰ τὸ ἀποξηρανθῆναι αὖτὰ ἀποφᾶν.

V. addit

Addit Matthiolus codex quidam add

Alter non habet hanc vocem, neque etiam ei Plinius expressit. V. autem λεγόμενα. Sed vulgatam scripturam reformarem vulcssii Goupylus, quid in telephio flores laues spectentur.

Τέλος τοῦ βιβλίου δευτέρου.

ΠΕΔΑΚΙΟΥ ΔΙΟΣΚΟΡΙΔΟΥ ΑΝΑΖΑΡΒΕΩΣ Περὶ ὕλης ἰατρικῆς λόγος τρίτος.

PEDACII DIOSCORIDIS ANAZARBÆI De medica materia Liber tertius.

IANO ANTONIO SARACENO, LVGDVNÆO, INTERPRETE.

ΕΝ μὲν τοῖς περὶ πόνου βελίοις, φίλτατε Ἀρῆε, παρεδώκαμεν περὶ ἀρωμάτων, καὶ μύρων, καὶ ἐλαίων, καὶ δένδρων, καὶ τῶν ἀπ' αὐτῶν καρπῶν τε καὶ δακρύων, ἔτι τε ζώων καὶ σπερμάτων καὶ λαχάνων, καὶ τῶν δριμύτητα κεκτημένων βοτάνων. ἐν δὲ τούτῳ τρίτῳ περὶ ἀρχόντι, περὶ ῥιζῶν καὶ χυλισμάτων καὶ βοτανῶν καὶ σπερμάτων, συμφύλων τε καὶ φαρμακωδῶν ἐπιλεύσομεν.

Περὶ Ἀγαρικοῦ. Κεφ. α'.

ΑΓΑΡΙΚΟΝ ῥίζα φέρεται σιλφίῳ ὁμοφυής, οὐ πυκνὴ τὴν ὑπόφασιν ὥσπερ ὁ σίλφιον, ἀραιὰ δέ ἐστιν ὅλη. ἔστι δὲ τὸ μὲν ἄρρεν, τὸ δὲ, θῆλυ· ὧν θῆλυ μὲν τὸ ἔχον κατὰ μέσας ὑπὸ φλοιὸν ἔντος. τὸ δὲ ἄρρεν, στρογγύλον ὅλον καὶ πυκνὸν ὅλον συμφυές. γλυκὺ δ' ἀμφότερα ὅμοια· καταρχὰς μὲν γλυκάζοντα, εἶτα δὲ ὑπαδότητα ἐμπικρα. γίνεται δὲ ἐν τῇ Ἀλαβανίᾳ τῇ Σαρματικῇ. λέγουσι δέ τινες, φυτὸν ῥίζαν εἶναι πίτυος ὄν, ἐν τοῖς γελέχεσι τῶν δένδρων τῆς σπόρου γίνεσθαι, ὥσπερ τὸν μύκητας. γίνεται δὲ καὶ ἐν τῇ τῶν Ἀσίαν Γαλατίᾳ καὶ Κιλικίᾳ ὀλίγον τῶν κέδρων, εὔθρυπτον μέντοι καὶ ἀσθενές. τὸ μὲν οὖν δυνάμιν ἔχει στυπτικὴν, θερμαντικὴν· ποιοῦν πρός τε τροφὰς καὶ ὠμότητας, ῥήγματά τε καὶ πτώματα. δίδοται δὲ δυσὶν ὀβολοῖς πλῆθος ἐν ὑδρομέλιτος μετ' οἰνομέλιτος, ἀπυρέτοις πυρέττουσι δὲ, ἐν μὲν ὑδρομέλιτι καὶ ἡπατικοῖς δὲ καὶ ἀσθματικοῖς, ἐν δὲ ἰκτερικοῖς καὶ δυσεντερικοῖς, καὶ νεφριτικοῖς· καὶ δυσπνοϊκοῖς καὶ ὑστερικοῖς πνιγὶ, καὶ κακοχροίαις

Quidam aiunt. Vulg. ἀγάλλει

Mate. ῥίζαν.

V. Diosc. Sic Orib.

Mat. ἐκβήματα

Mat. λοιπικοῖς

V. αὐτοῖς

RIORIBVS quidem libris, amantissime Aree, de aromatis, vnguẽtis, oleis, arboribus, earúmque fructibus & lachrymis: deindeque de animalibus, cerealibus, oleribus & acrimonia præditis herbis egimus. In hoc verò tertio de radicibus, succis, herbis & seminibus tú naturæ nostræ familiaribus, tum etiam medicamentosis disseremus.

De Agarico. Cap. I.

AGARICVM radix fertur silphij similis, non tamen densa summa facie, veluti silphium, sed tota rarior. Duo eius genera: mas inquã, & fœmina. Præfertur verò fœmina, quæ quidem rectas intus habet pectinum modo venas & quasi diuisuras. Mas autem rotundus est, & vndique congener ac sui similis. Sed est similis vtrique gustus: scilicet initio dulcis, mox vbi diffundi per os cœperit, in amaritudinem transit. Gignitur in Sarmatię regione, quæ Agaria dicitur. Sunt verò qui plantæ radicem esse affirment: alij vti fungos ex putredine nasci in arborum caudicibus. Nascitur & in Galatia Asiæ & Cilicia in cedris, sed friabile & infirmius. Porrò Agaricum astringendi calfaciendiq; vim habet: estq; efficax contra tormina, cruditates, rupta & casus ab alto. Datur verò binis obolis ex vino mulso febrim non sentientibus: febricitantibus autẽ, in aqua mulsa; itémque hepaticis, suspiriosis, arquatis, dysentericis, nephriticis, ægrè meientibus, ab vtero strangulatis, atque fœdo pallore decoloratis

drachmæ pōdere exhibetur: phthisicis autem ex passo: ac lienosis in aceto mulso. A stomachicis verò per se ita vt est, manditur ac deuoratur citra vllius liquoris sorbitionem: ac simili quoque modo datur acidum eructantibus. Sistit & sanguinis reiectiones, ternis obolis ex aqua sūptum. Facit & ad coxendicum articulorúmque dolores & comitiales morbos, si cum aceto mulso pari pōdere assumatur. Menses quoque ciet, ac inflatione vteri vexatis mulieribus pari modo vtiliter exhibetur. Soluit & rigorem horrorémve, datum ante febrilium accessionum initia. Sed & aluū purgat drachma vna aut altera, si cum aqua mulsa bibatur. Est & venenis pro antidoto, drachmæ vnius pondere cum diluta vini potione sumptum. Quin & serpentium ictibus ac morsibus tribus obolis ex vino potum auxiliatur. In summa internis omnibus vitijs subuenit, pro virium & ætatis ratione ptopinatum, his ex aqua, illis è vino, alijs ex aceto mulso, alijs denique ex aqua mulsa.

De Rha. Cap. II.

RHA, quod aliqui rheon vocant, prouenit in iis quæ supra Bosphorum sunt regionibus, ex quibus etiam affertur. Radix fotis nigra, cétaurio magno similis, sed minor ac intus rubicundior, sine odore, laxa seu fungosa & aliquantum leuis. Optimum habetur quod teredines non sensit, si gustatu cum astrictione remissa lentescat, & commáducatum, coloré reddat pallidum, & quodammodo ad crocum inclinátem. Id eporum facit ad inflationes, stomachi imbecillitatem, & omne genus dolores, ad conuulsiones, splencticos, hepaticos, nephriticos, torminosos, itémque aduersus vesicæ & pectoris vitia, distensiones hypochōdriorum, icterinos affectus, ischiadas, sanguinis excreationes, suspiria, singultus, dysenterias & cœliacorum affectus, contra febrium circuitus & venenatorum morsus. Dabis verò ad singulos affectus, eodem quo agaricū pondere & cum eisdem liquoribus: silicet febri carentibus, in vino mulso; febricitantibus autem, ex aqua mulsa: phthisicis, ex passo:

A < α'. διδόμεν φθισικῆς μὲν γλυκίας σπλενικῆς δὲ μέλ' ὀξυμέλιτος· καὶ στομαχικοῖς ὡς ἔστι λαμβανόμενον ἄνευ πόματος πινόμενον, μηδενὸς ὑγροῦ ἐπιῤῥοφεῖσθαι. ὁμοίως δὲ καὶ ὀξυρεγμιώσιν. ἵστησι δὲ καὶ αἵματος αἰμαγωγὰς, ἀλκὴ τριωβόλου μὲθ' ὕδατος λαμβανόμενον. ποιεῖ καὶ πρὸς ἰσχίων
B καὶ ἄρθρων διήκματα, καὶ ὀπισθοτονίας, μετ' ὀξυμέλιτος λαμβανόμενον τὸ ἴσον πλῆθος ἄλφι· ἢ ἐμμηνία, καὶ τὰ ἐμπνευματουμένας ὑστέρας γυναικὸς ὠφελίμως ὁ ἴσον δίδοται. κινεῖ δὲ καὶ βίγας πρὸ τῆς ὀπισθοτονίας διδόμενον καθαιρεῖ δὲ καὶ χολίαν < α'. ὁβ'. μὲ μελικράτου πινόμενον. ἔστι δὲ καὶ ζωτικὸν αὐτίδοτον μὲ
C χρώματος < μιᾶς ἀλκὴ λαμβανόμενον. καὶ πρὸς ἐρπετῶν δὲ πλῆγας καὶ δήγματα, ἀλκὴ τριωβόλου μετ' οἴνου πινόμενον βοηθεῖ· καὶ καθόλου πρὸς τὰ ἐντὸς παθήματα ἁρμόζει, πρὸς δυσεντερίαν καὶ κοιλιακὰς διδόμενον, οἷς μὲν μὲθ' ὕδατος, οἷς δὲ
D μετ' οἴνου, οἷς δὲ μετ' ὀξυμέλιτος· ἢ μελικράτου. V. additamentum

Περὶ Ῥᾶ. Κεφ. β'.

ΡΑ, ὃ δέ τινες καλοῦσι, ῥῆον γίνεται ἐν τοῖς ὑπὲρ Βοσπόρου τόποις, ὅθεν καὶ κομίζεται· ῥίζα ἐξωθεν μέλαινα, κεντρώδης ὃ μεγάλῳ ἐπιεῖα, μικροτέρα μὲν τὴν
E ἐντεριθήσεσι, ἄοσμος, χαύνη, σπόγγου φύσιν ἔστι δὲ αὐτῆ χρῆσις τὸ ἀτερηδόνιστον, ἐκλιχμῶντι τε μετ' ἰσχνῶν ὑγιῶς μὲ αἱμωδίας φύσεως, διαφορητικόν τι ἔνεργες καὶ χρονίοις ποσῶς ὃ χρώματι. Ποιεῖ δὲ πινομένη πρὸς ἐμπνευματώσεις, στομάχου ἀσθένειαν, δήγματα πάντων, σπάσματα,
F σπληνικούς, ἡπατικούς, νεφριτικούς, τορμινώδεις, τὸ πρὸς κύστιν τε καὶ θώρακα, καὶ ὅσαι χολερικῶν ὀποστάσεις, τὰ πρὸς ὑστέραν πάθη· ἰσχιάδας, αἵματος πτύσεις, βλαύματα, λυγμοὺς, δυσεντερίας, κοιλιακὰς διαῤῥοίας, καὶ σπειράδας, καὶ θηρίων δήγματα. δίδοται δὲ ὁμοίως τοῖς ἀγαρικοῖς πρὸς ἕ-
G καστον πάθος, τῇ αὐτῇ ἀλκῇ, καὶ ὑγροῖς χρώμενος· μετ' οἰνομέλιτος μὲν, ἀπυρέτοις· πυρέττουσι δὲ, μετὰ μελικράτου· φθισικοῖς, μετὰ γλυκίας,

Aliter ἀβρᾶ βλάπτει. V. minus ἐμπνευματ. Sed ab aliquo forte illa irrepserunt, Vulg. exempl. caret.

Dodon. Rheum legendum putat

V. addit. ῥαβαρβάρου vel Ῥᾶ.

Leonicus scribit additum v. c. καὶ μήκωνα quod non candit Plin. de rhacomoste (sic enim vocat) agens lib. 27. cap. 12.

V. delet. V. hus vſque ad ἥπατι caret. itemque Serapio.

σπλῆνικοῖς μετ' ὄξυμέλιτος· στομαχικοῖς δὲ A
ὡς ἔστι λῆμμα σώζουσι καὶ καταπινόμενον, μετὰ νάπυος ὑγροῦ ὑπερφυῶς ἀφελοῦσι. αἴρει δὲ καὶ πτερύγια καὶ λειχῆνας, μετ' ὄξους καταχριόμενον. καὶ φλεγμονὰς πάσας λῆγειν ποιεῖ, καὶ χοιράδας, σὺν ὕδατι καταπλασσόμενον. ἡ δὲ αἰσθησιν αὐτῆς δύναμις, συμπτικὴ μετὰ πάσης θερμασίας.

Περὶ Γεντιανῆς. Κεφ. γ'.

ΓΕΝΤΙΑΝΗ δοκεῖ μὲν ὑπὸ τοῦ πρώτου εὑρεθῆναι Γεντίου τοῦ Ἰλλυριῶν βασιλέως, ἀφ' οὗ καὶ τὴν ἐπωνυμίαν ἔσχηκεν. ἧς τὰ φύλλα τὰ μὲν πρὸς τῇ ῥίζῃ, κυρτὰ ἢ ἀρτηλίῳ ὁμοια, ὑποῤῥυθρα· τὰ δὲ ἐν μέσῳ τοῦ καυλοῦ, καὶ μάλιστα τὰ κατ' ἄκρον, ἐλαφρὰ μικρῶς. καυλὸς δὲ κενός, λεῖος, τὸ πάχος δακτύλου, ὁ δὲ ὕψος δίπηχυς, γόνασι διῃλημμένος, ἐν ἀφ' ἑκάστων μείζοσιν ὡσεὶ διπλασίοσι τὰ φύλλα· καρπὸν δὲ ἔχων ἐν κάλυξι πλατέσι, κοῦφον, ἀχυρώδη, ὅμοιον τῷ τοῦ σφονδυλίου· ῥίζαν μακράν, ὁμοίαν ἀριστολοχίᾳ τῇ μακρᾷ, πάχεϊ, πικράν. φύεται δὲ ἐν ὑψηλοτάτοις ἀκρωρείαις, καὶ συσκίοις τόποις καὶ ὑδρηλοῖς. Δύναμιν δὲ ἔχει ἡ ῥίζα θερμαντικήν, σπασμῶν βοηθεῖ δὲ θηριοδήκτοις πινομένη < β'. ὁ πλῆθος, μετὰ πιπέρεως καὶ πηγάνου, ἐξ οἴνου τῷ ἡμίσματος ὅσον < α'. ἡ δὲ ἐκ τοῦ ἐδωδίμου πλευρᾶς, καὶ πόμα ζα., ῥήγματά τε καὶ σπάσματα. ὠφελεῖ καὶ ἡπατικοῖς ἐξ οἴνου στομαχικοῖς, πινομένη μετ' ὕδατος. ἐν βοηθεῖ δὲ ἔμβρυα ἡ ῥίζα ὡς κολλύριον τοῖς στεγνοῖς μένη. ἔστι δὲ καὶ θαυματική, ὅτι ἡ μένη ὡς ὁ λύκιον, ἰσονόμων τὰ ἑλκώδη ἰᾶται, καὶ μάλιστα τὸ χύλισμα, καὶ ἐφ' ἑλκυσμοῖς ἐπιτήδειόν ἐστι φλεγμαινόντων. μίγνυται δὲ καὶ εἰς τὰ δρώμενα τοῖς κολλυρίοις ὁ χύλισμα αὐτῆς μηκωνίου. ἔστι δὲ ἀφῶν συμπτικὴ ἡ ῥίζα. χυλίζεται δὲ θλασθεῖσα καὶ βρεχεῖσα εἰς ὕδατι ὑπὲρ ἡμέρας ε'. εἶτα ἑψηθεῖσα εἰς τοῦ ὕδατι, ἄχρις οὗ ἐφέξωσιν αἱ ῥίζαι, καὶ μετὰ τὸ ψυχῆναι τὸ ὕδωρ διηθεῖται δι' ὀθονίου· καὶ ἕψεται ἄχρις οὗ γλίσχρον μελιτώδες τῇ συστάσει.

splenèticis ex aceto mulſo. At à ſtomachicis ita vt eſt mandetur, ac citra ſorbitionem vllam deuorabitur. Tollit quoque liuẽtia, lichenáſque cum aceto illitum: atque inflammationes omnes veteres ex aqua impoſitum diſſipat. Cæterùm ſumma ipſius vis, aſtringens eſt cum aliquanto calore.

B

De Gentiana. Cap. III.

GENTIANA primùm inuenta creditur à Gentio Illyriorũ Rege, à quo etiam cognomentum habuit. Huius folia, quę quidem proximè radicem ſunt, iuglandi plantaginiue ſimilia, ſubrubentia: quæ verò in medio ſunt caule, maximéq; quæ circa cacumen, paulùm diſſecta. Caulis inanis, læuis, digiti craſſitudine ac binũm cubitorum altitudine, geniculis diſtinctus, & maioribus ex interuallis foliis circunda- ſtatur. tus. Semen verò habet in calycibus latũ, leue, aceroſum, quod ad ſphódylij ſemen accedit. Radix longa qualis ariſtolochiæ longæ, craſſa & amara. Naſcitur in celſiſſimis montium iugis, locis vmbroſis aquoſiſque. Vis radici excalfactoria & detergens. Contra venenatarum beſtiarum morſus duabus drachmis cum pipere & ruta ex vino pota auxiliatur. Extracti ſucci drachma ad laterum dolores, caſus è ſublimi, rupta & conuulſa prodeſt. Hepaticis quoque & ſtomachicis pota cum aqua ſubuenit. Radix collyrij modo ſubdita, partus eiicit: impoſitáque vt lycium vulneraria eſt, & cuniculatim depaſcentibus vlceribus medetur: præcipuè verò ſucco, qui quidem oculis etiam inflammatione laborantibus illinitur. Miſcetur & ſuccus acrioribus collyriis pro meconio. Sed & radix vitiligines alphos dictas abſterget. Porrò extrahendi ſucci ratio hæc eſt: Contuſa radix ad dies quinque aqua maceratur, poſteà in eadem tantiſper decoquitur, dum extent emineántque radices: ac vbi refrixit aqua, linteo excolatur, móxque diſcoquitur ad mellis craſſitudinem,

C

D

E

F

G

V. delet. V. hus vſque ad ἥπατι caret. itemque Serapio.

Dalech. ἡμιόλια τὰ κατ' ἄκρον μικρὰ μικρότερα V. ἐπιμήκη κοινῶς

Ded. ἀμύλου legiſſe videtur.

Aliqui cod. omittunt. στομ. πρὸς ἡπατ. V. ἀνατομικοί, idem.

Dedisse ἐμπόδια

Alter, ἡ γρῆμμα, quæ lectio ſenſum rei conuenientem Goupylo habere videtur. alius πόμα.

V. κοινόν.

fictilique vase reconditur.

De Aristolochia rotunda. Cap. IIII.

ARISTOLOCHIA ex eo nomen accepit, quòd optimè puerperis opitulari credatur. In eius generibus quædam est rotunda, quæ fœmina vocatur. Folijs hæc est hederaceis, cum acrimonia odoratis, subrotundis, mollibus, cum multis ab vna radice germinibus. Sunt verò prælonga quasi sarmenta: flores cádidi pileolorú similitudine, in quibus quod rubicundum est grauiter olet.

De Aristolochia longa. Cap. V.

Longa autem Aristolochia mascula appellatur & dactylitis: folijs quàm rotunda oblongioribus, ramulis tenuibus, fermè dodrantalibus: flore purpureo, graueolente, qui vbi defloruit, pyro similis euadit. Rotundæ radix in orbem rapi modo conglobatur. Longæ verò, digiti crassitudinem implet, dodrãtalis aut etiam maior. Ambæ colore intus buxeo, gustu amaræ ac virosę.

De Aristolochia Clematitide. Cap. VI.

Est etiamnum tertia longa, quæ etiam clematitis, quasi sarmentosa seu sarmentitia, vocatur, ramulos habens tenues, folijs refertos subrotundis, minori semperuiuo similibus: flores rutæ: radices longiores, tenues, crasso aromáque redolente cortice vestitas: quæ priuatim vnguentariis ad vnguentorum spissamenta conducunt. Porrò cæteris quidem venenis resistit rotunda. At longa contra serpentes & venenata drachimæ pondere ex vino bibitur, atque etiam imponitur. Pota, pipere & myrrha additis, purgamẽta omnia post partum in vtero relicta, menses & partus ciicit. Eadem quoque efficit subdita in pessо. Sed & rotunda ad eadem ad quæ & anredicta est efficax. Ex abúdanti verò suspiritus, singultibus, horroribus, lieni, ruptis, conuulsis & lateris doloribus, pota cum aqua auxiliatur. Extrahit & impositа aculeos ac spicula, ossiúmque squamas remouet. Vlcera quoque putrida emarginat, sordidáque expurgat, & cauа cum iride ac melle explet.

A καὶ ἀποπλύνει τὸ ὑγρὸν ἀγλεῖον.

Περὶ Ἀριστολοχίας τροχίλης. Κεφ. δ'.

ΑΡΙΣΤΟΛΟΧΙΑ ἀνόμασται μὲν ἀπὸ τῆς ἀρίστων ἄρσεσι βοηθεῖν παῖς λοχείοις. ἔστι δὲ ἡμῶν τροχίλη, θήλεια καλουμένη. φύλλα ἔχει κισσοειδῆ, ἀνίδων μικρὰ δριμύστομος, ὑποστρόγγυλα, ἁπαλά, πολλοῖς βλαστοῖς ἐκ μιᾶς ῥίζης. πολλὰ δὲ κλήματα ὀπιμίκη. αὐθη λευκὰ, οἱονεὶ πιλίσκους. τὸ δὲ ἀνθος ἐρυθρὸν, δυσώδες.

Περὶ Ἀριστολοχίας μακρᾶς. Κεφ. ε'.

Ἡ δὲ μακρὰ Ἀριστολοχία ἄρρην καλεῖται καὶ δακτυλίτις, φύλλα ἔχουσα ἐπιμηκέστερα τῆς τροχίλης κλωνία λεπτὰ, εὐθὺς ἀπὸ ταμοῦς τὸ μέγεθος, ἄνθος πορφυροῦν, δυσῶδες, ὅπερ ἐξανθῆσαν ἀπίσω παραπλήσιον γίνεται ῥίζα δὲ τῆς μὲν τροχίλης, σφαιροειδὴς, στρογγυλοειδὴς ὁμοία. ἡ δὲ μακρᾶς, δακτύλου ἔχει τὸ πάχος, σπιθαμιαία ἢ ἐλάσσων. ἀμφότεραι δὲ πολλὰ πυξοειδεῖς ἔνδοθεν, πικραί τε τὴν γεῦσιν καὶ δριμεῖαι.

Περὶ Ἀριστολοχίας κληματίτιδος. Κεφ. ς'.

Ἔστι δέ τις καὶ τρίτη μακρά, ἥν τινες καὶ κληματῖτιν καλοῦσι, κλωνία ἔχουσα λεπτὰ, φύλλοις ὑποστρογγύλοις, αἰζοῦν μικρὸν ἐοικόσι πεδίπλεα, αὐθη ἐοικότα πηγάνῳ· ῥίζας μακρὰς, λεπτὰς, φλοιὸν ἐχούσας παχὺν καὶ ἀρωματίζοντα, ἰδίως χρησιμεύουσας μυροπώλαις εἰς τὰ τῶν μύρων συνθέσεις. πίνεται δὲ πρὸς λόγον τὰ δηλωθέντα φάρμακα ἡ τροχίλη, πρὸς δὲ τὰ ἑρπετὰ καὶ θανάσιμα ἡ μακρά. ἀλκὴ πυρμνὴ μεθ' οὗ ἡ κατάπλασμὰ· καὶ τὰ ὑπὸ φάρμακα ἕλκη καθαίρει· καὶ τὰ ὑπὸ ὄφεων δηχθέντα, πολλοῖς μετὰ πιπερίτεως καὶ σμύρνης. καὶ ὑπὸ πασῶν δὲ τρωθέντα, καὶ αὐτὰ δρᾷ. ἡ δὲ τροχίλη παῖς λοχείοις πρὸς ἄνω καὶ κάτω ἐφέλκεται. ἐκκρίνουσι δὲ βοηθεῖ ἀσθματι, λυγμῷ, ῥίγει, σπασμῷ, ῥήγμασι, ἀποσμασι, διήκμασι πλευρικοῖς, πολλοῖς μὲν ὕδασι. αἱ δὲ καὶ σκόλοπας, ἀκίδας τε πόδας ἐκ τῶν καταπλασθέντων ἀφίσησι· καὶ σπονδύλους ἐξελκύσασι, καὶ τὰ ῥυπώδη ἐξικμάζει ἕλκη· καὶ τὰ κοίλα πλήθει σαρκὸς ἴσα καὶ μέλιτι.

Lacuna ex v.c. supplenda

ομήχλ δὶ καὶ οὖλα καὶ ὀδόντας. δρᾶ δὶ καὶ A
ἡ κληματῖτις τοὺς τὰ αὐτὰ πεφυκότας ἐλκώ-
σεσι μέν τι τῇ δυνάμει τῶν τοιούτων
ῥιζῶν.

Περὶ Γλυκυῤῥίζης. Κεφ. ζ.

ΓΛΥΚΥΡΡΙΖΑ ἡμῶν πλείστη ἐν
Καππαδοκίᾳ, καὶ Πόντῳ· ἔστι δὲ θαμνί-
σκος, ῥάβδους ἔχων δίπηχεις, περὶ οὓς τὰ B
φύλλα πικρά, ἐοικότα σχίνῳ, λιπαρὰ καὶ
κολλώδη ἁλαμβάνῳ. τὸ δὲ ἄνθος ὑακίνθῳ
ὅμοιον· καρπὸς δὲ πλατέως σφαιρίων
μέγεθος, παχύτερος, λοβοὺς ἔχων ὡς φα-
κοῦ, πυῤῥούς, μικροὺς ῥίζαις μαράθου, πυ-
ξοειδεῖς ὡς ἡμπασίης, ἐσώτερον πυῤῥούς, γλυ-
κείας· χυλίζεται δὲ τὸ ῥίζωμα ὡσαύτως τῷ λύκιον. τοῖς C
δὲ τὸ χύλισμα τοῦτο παχύτητας ἀρτη-
ρίας· δεῖ δὲ αὐτὸ πηλοῦσθαι τῇ γλώττῃ ἀπο-
χυλίζοντα· ἁρμόζει δὲ καὶ πρὸς καῦσον σο-
μάχου, καὶ πρὸς τὸ δυσεντερικὸν καὶ ἅπαν-
θρωπίας τὸ κύστεως· καὶ νεφρίτιδας πι-
νόμενον μετὰ γλυκέος· ἀδιάφορόν τί ἐστιν ἀπο-
χυλίζοντα, καὶ βραυματικὸν τοῦτο χειμε-
νον, καὶ *τομαχικὸν διάφραμα ἀπύλουν. καὶ D
τὸ ἀφέψημα δὲ τῆς ῥίζης τοῦτο σφάττον
πρὸς τὰ αὐτὰ ἁρμόζει. τὸ δὲ ῥίζα ξηρὰ
λεπτοτριβηθεῖσα, πτερυγίοις καταπάσσε-
ται ὀδοντιδόκος.

Περὶ Κενταυρείου τοῦ μεγάλου. Κεφ. η'.

ΚΕΝΤΑΥΡΙΟΝ τὸ μέγα, ὃ δὲ ἰάρ- B
κλιον καλοῦσι, φύλλα ἔχει καρύᾳ βα-
λανικῇ ὅμοια, τετράπλευρα, χρώματι χλω-
ρὰ ὡς κεγχρώδης, τὸ δὲ περιφερὲς αὐτῶν ἐντέτ-
μηται ὥσπερ πρίων καυλὸν δὲ ἔχει ὡς λα-
πάθου δίπηχυν, ἔνιον τρίπηχυν, παραφυάδας
ἀπὸ τῆς ῥίζης ἔχοντα πολλὰς, ἐφ' ὧν κεφαλαὶ
ὅμοιαι μήκωνι, ἐν δὲ ταύταις ἐν τῷ περι- F
φερεῖ σπόρος κυανίζων· καρπὸς δὲ ὅμοιος κύ-
κνῳ, εἰς τρίμυθος ὥσπερ τὸ ἐλεώδιον τοῖς αὐ-
θαδεστέροις ῥίζαι παχεῖαι, τραχεῖαι, βαρεῖαι, πολὺ πάν-
χυς δύο, μετὰ χυλοῦ, δριμεῖαι μετ' ὀσμῆς
εὐώδους καὶ γλυκαίτητος, ἐσώθυρος φιλεῖ
δὲ λιπαρὰ γῆν, θαλλόν, καὶ δρυμοὺς καὶ πολ-
λοφα· πλεονάζει δὲ ἐν Λυκίᾳ καὶ Πισιδίᾳ G
σῳ, ἐν Ἠλείδι καὶ Ἀρκαδίᾳ καὶ Μεσσηνίᾳ, καὶ
περὶ Φολόην καὶ Λυκίαν καὶ Σμύρνην. ἁρ-
μόζει δὲ καὶ ῥίζα ῥήγμασι, ἀποσπάσμασι, πλευ-

Gingiuas denique ac dentes extergit. Creditur & clematitis ad eadē pollere: ſed efficacia tamen cedit antedictis.

De Glycyrrhiza. Cap. VII.

GLYCYRRHIZA, ſeu dulcis radix, plurima gignitur in Cappadocia & Ponto. Eſt vero frutex exiguus, ramis binûm cubitorum altitudine: circa quos folia ſunt denſa, lentiſci, pinguia tactúque glutinoſa. Flos eſt hyacinthi: fructus platani pilularum magnitudinis, aſperior, qui ſiliquas habet lentium modo rufas, & paruas: radices longæ, buxei coloris, vti gentianæ, ſubacerbæ ac dulces: è quibus ſuccus lycij modo elicitur. Eſt verò ſpiſſatus hic ſuccus ad arteriæ ſcabritias efficax: verùm oportet vt linguæ ſubditus eliqueſcat. Sed & æſtuanti ſtomacho ac thoracis & iocineris vitijs conuenit: necnon ad veſicæ ſcabiē ac renum vitia vtiliter ex paſſo bibitur. Idem eliquatus ſitim ſedat, illitúſque vulneribus accommodatur, atque commanducatus prodeſt oris affectibus. Quin & recentium radicum decoctum ad eadem conuenit. Arida verò radix ad lęuorem detrita, pterygijs commodè inſpergitur.

De Centaurio maiore. Cap. VIII.

CENTAVRIVM magnum, quod aliqui narden appellāt, folia habet nucis iuglandis, oblonga, viridi braſſicæ colore, ſerrata in ambitu: caulem verò, ceu rumicis, binū aut etiam ternûm cubitorum, multis ab radice adnatis, in quibus capita ceu papaueris, in rotunditate longiuſcula: flos cæruleus: ac ſemen cnico ſimile, veluti lanels floccis quibuſdam inuolutum. Radix eſt craſſa, ſolida, grauis, ad bina cubita, ſucci plena, cum quadam aſtrictione ac dulcedine acris, rubeſcens. Amat ſolum pingue & apricum, ac ſyluas & colles. Cæterùm copioſè naſcitur in Lycia, Peloponneſo, Helide, Arcadia & Meſſenia, atque circa Pholoen, Lyciā & Smyrnā. Cōuenit porrò radix ruptis, cōuulſis, pleu

V. δάφνης.
V. καρπὸς τετράπλευρος Ita & Orib.
Cæter. legunt τριπλεῦρος
V. addit ἐξωθεν.
Al. addunt τὸ πρῶτον
Addit Lacuna ex vet. glossario
Addit Matthioli καὶ μίσυ ἢ λεπρὰ καὶ ψωρικά
V. addit καὶ πρίασι
Vulg. κεντάμενα
V. omittit ποδὸς ῥίζης
V. ἐρυθρὸς.
Addunt nonnulli veteres ἡμίονος ἢ ἡμιόνειος ἵππος quam lectionem Stephanus Dioscoridi Hermolaus restituit

riticis, dyſpnœę, veteri tuſſi & ſanguiné excreantibus: ac ſiquidé abſit febris, in vino: ſin minus, ex aqua drachmis duabus trita exhibetur. Similiter quoque ad tormina & vuluæ dolores. Sed & derasa & in collyrij formam vuluæ ſubdita, mẽſes atque partus extrahit. Eadé ſuccus etiamnum præſtat. Eſt & illa vulneraria: ſiquidem recens tuſa, aut, ſi arida fuerit, antè macerata; deindéque tuſa, vulnera colligat & conglutinat. Quin & tuſam ſi quis ſimul cum carnibus coquat, carnes ipſæ cohæreſcent. Cæterùm Lyciæ incolæ ſuccum ipſius exprimunt, quo pro Lycio vtuntur. Vocata autem fuit Panacea, quoniam inflammationes omnes ſedat, ictuúmque impetus lenit: atque calculoſos, quibúſque ſubtillum eſt lotium iniectione ſanat. Legitur verò paulò ante Solis exortum, ſerena tempeſtate, per quam pleniora perfectioráque ſunt omnia.

A εἰλικοῖς, δυσπνοίᾳ, βηχὶ παλαιᾷ· αἱμοπτοικοῖς ἀπυρέτοις μεθ' οἴνου πυρέσσουσι δ', μεθ' ὕδατος < β'. πλῆθος τῆς ῥίζης λείας δραχμὴ δύο. τρώγεται ὁμοίως καὶ ὑσσώπου δράγμα τρία. ἄγει δὲ καὶ ἔμμηνα καὶ ἔμβρυα εἰς χῆμα κολλυρίου ξυσθεῖσα καὶ προσπλασθεῖσα τῇ ὑστέρᾳ· ὅ, τε χυλὸς τὰ αὐτὰ ποιεῖ· ἔστι δὲ καὶ θαυμαστικὴ, ὑγρὰ μὲν κοπεῖσα, ξηρὰ δὲ προβρεχεῖσα καὶ οὕτω κοπεῖσα. σὺν ἀλφίτοις δὲ καὶ κολλᾷ· καὶ τὰ ἐψήματα δὲ κρέα σὺν αὐτῇ, ἐάν τις αὐτὴν κόψας σὺν ἑψήσῃ. ⟨Ο δὲ⟩ οἱ Λυκίαι αὐτὴν χυλίζοντες, χρῶνται αὐτῇ ἀντὶ Λυκίου. ἔκλῃθη δὲ Πανάκεια, ἐπειδὴ πολλὰ τὰ φλεγμαίνοντα παθήματα, καὶ χρούσματα πληγῶν, γραφιδείας τε παῦλα ἐνέμασι, καὶ λιθιῶντας. σὺν ἀλφίτοις δὲ τοῦτο ἡλίου μέλλοντος ἀνατέλλειν, ὥρᾳ ἀνῇ ὅτε πλησθῶσι ἄπονοι.

Hæc ad finẽ vſque accreuere.

In vtroque veteſto codice addi & reſtaurat Goupylus hoc locum. τὰ ὑγρὰ μὲν κοπεῖσα· quam ſcripturam ab Hermolao receptus eſt.

De Centaurio minore.

Cap. IX.

Περὶ Κενταυρίου τοῦ μικροῦ.

Κεφ. θ'.

Centauriũ paruũ ſeu tenue, quod aliqui lithnæũ quaſi paluſtre vocãt, quoniã humẽcta riguáve amẽt loca, herba eſt hyperico aut origano ſimilis: cuius caulis dódrante altior eſt & anguloſus: flores ad lychnidis florum ſimilitudinẽ è puniceo colore in purpuram vergunt: folia minuta, quadantenus longiora, veluti rutæ: ſemen tritico ſimile: radix puſilla, læuis & ſuperuacua. Herba ipſa virens contuſa & impoſita, vulnera glutinat, vetera vlcera purgat & ad cicatricem perducit. Bilem autem humoréſque craſſos per aluum exigit, ſi decocta deuoretur. Ius verò decocti iſchiadicis conueniẽter infunditur: trahit enim ſanguinem, dolorémque leuat. At ſuccus oculorum medicamentis perquàm vtilis: quippe qui quę pupillis caliginem offundunt vnà cum melle diſcutiat. Vuluæ ſubditus menſes & partus extrahit: peculiariter verò neruorum vitiis cpotus prodeſt. Succi autem extrahendi ratio hæc eſt: Legitur herba ſemmẽ prægnás & diebus quinque (aqua) perfunditur, deindéque coquitur, dum vtique ſuperemineat: mox vbi refrixit,

D Κενταύριον τὸ μικρὸν, ὃ τινες λιμναῖον καλοῦσιν, ἐπειδὴ εὐύγρους φιλεῖ τόπους. πόα ὑσσώπῳ ἢ ὀρίγανῳ παραπλήσιος ὄζει, καυλὸν ἔχουσα ὑσσωπώδη, γωνιωμένον. αἱ δὲ τῶν φύλλων κόμαι μικραί, ὑσσωπίτιδι ὅμοιαι πυρρᾷ ῥίζα μικρὰ, ἄχρηστος, λεία. Αὕτη κοπεῖσα χλωρὰ ἢ κατάπλασθεῖσα, τραύματα συνάγει, ἕλκη καθαίρει παλαιὰ ἢ ἀπυλωτικὰ ἀφίστησι καὶ καθαίνουσι, ἀγαθὰ χειλίδας γελώδη καὶ παχέα. ἔγκλυσμά τε τὸ ἀφέψημα αὐτῆς, ὅπου τὴν ἰσχιαδικὴν ἄρμοσον· ἄγει αἷμα καὶ κυφίζει. ὁ δὲ χυλὸς τοῖς τε τὰ ὀφθαλμικὰ ξυρῶσι, ἀποκαθαίρων τὰ ὑπόσκοτα τῶν κόρων σὺν μέλιτι· καὶ ἐν τοῖς ἐμμήνοις ἀγωγὸς καὶ ἐμβρύων· πολεῖς δὲ, ἁρμόζει τοῖς περὶ τὰ νεῦρα παθήμασιν ἰδίως. Χυλίζεται δὲ ἡ πόα συλλεγομένη ἐγκύμων οὔσα ἐπὶ πέντε ἡμέρας ἑξῆς. εἶτα ἐφίησιν ἄχρις οὗ ὑσσώπου τὸ ὕδωρ. ἔπειτα τούτου ψυχθέντος,

Addit Lacuna ex v. c. ἢ λιπῖδι

Carnabáthon, quo modo habetur apud Plinĩ.

V. ἀπυρέτοις

Quidam addunt χειμῶνι ἢ ἰσχιαδικοῖς. quæ voces ignorat Marcellus.

Cæsc. τραύματα, quo modo legit Cornarius.

V. quidam addunt ἀποκλᾶ μαινομένοις.

Epitto καὶ τοῖς ἐπιμηνιοῦσι ἔστι καὶ ἀπὸ ἀλφίτων, ἢ ἄνευ.

ὑλίζεται δὲ ὀξυνίᾳ θλιβείσης τῆς πόας, καὶ πάλιν ἕψεται μέχρι μελιτώδους συστάσεως. ἔνιοι δὲ χλωρᾷ ἐγκόψαντα αὐτὸ κόπτουσι, καὶ θλίβουσι τὸν χυλόν, καὶ βάλλοντες εἰς κεραμεοῦν ἄγγος ἀκόπτουσιν, εἶτα πλίνθῳ συμπρέφουσι, κινοῦντες ἀεὶ ξύλῳ. καὶ ὃ ἐκπιπτόμενον ἀεὶ ξύοντες, καὶ τῷ ὑγρῷ μίσγοντες, σκεπάζοντές τε νυκτὸς ἐπιμελῶς· ἡ γὰρ δρόσος κωλυτικὴ τῆς τοῦ ὑγροῦ χυλοῦ συστάσεως καθίστηκεν. ὅσα μὲν οὖν ἐκ ξηρᾶς τοῦ ῥίζου ἢ τοῦ βοτάνου ἐγχυλίζεται, ἑψόμενα σκυάζεται, ὡς ἡ ἄγριπαν. ὅσα δὲ ἐκ φλοιῶν ὑγρῶν ἢ ῥίζων ἢ βοτανῶν ἐκθλιβομένων, ἐν ἡλίῳ συμπρέφονται, ὡς προείρηται. οὕτω καὶ τὰ ἄγαλλα καὶ μανδραγόρα καὶ ὄμφακες, καὶ τὰ ὅμοια τούτοις χυλίζεται. λύκιον μέλαν καὶ ἀψίνθιον καὶ ὑποκιστὶς καὶ τὰ ὅμοια τούτοις, ἑψόμενα συμπρέφονται ὃν τρόπον προείρηται.

Alii quoque V. illa eiciunt.

exprimitur & per linteolum excolatur. Expressum (reiecto spissamento) iterú coquitur, vsque dú mellis crassitudinem ascisca. Nonnulli eandem illam virentem prægnantémque semine contundunt, ex eáque succum exprimunt: quem fictili non picato inditum in sole lignea rude assiduè mouentes inspissant. Quòd si quid concretum vasi adhæresca, identidem deradunt, reliquóque liquori permiscent. Noctu verò diligenter operiunt: quoniam ros liquidos succos coire densarique prohibet. Quicunque igitur succi è siccis radicibus aut herbis eliciuntur, coctura præparantur, veluti gentianæ succus. Qui verò ex recentibus corticibus, radicibus herbisve expressis: ad solem, vti antè dictum est, inspissantur. Hoc modò è thapsia, mandragora, vuis acerbis, cæterisque id genus succus elicitur. At lycium, absinthium, hypocisthis, & consimilia, coctura, eo quo dictum est modo, coguntur & inspissantur.

Περὶ Χαμαιλέοντος λευκοῦ. Κεφ. ι'.

ΧΑΜΑΙΛΕΩΝ λευκός, ἰξίαν τοῦτον ἐκάλεσαν, ἀφ' οὗ ἐν τοῖς τόποις ἰξὸν θηρεύεσθαι πρὸς τὰς ῥίζας αὐτοῦ, ᾧ καὶ αἱ μαστίχας χρῶνται αἱ γυναῖκες. ἔχει φύλλα ὅμοια σιλύβῳ ἢ σκολύμῳ, τραχύτερα δὲ καὶ ὀξύτερα καὶ ἰσχνότερα τοῦ μήλανος· κανλὸν δὲ οὐκ ἔχει, ἀλλ' ἀφίησιν ἐκ τοῦ μέσου ἄκανθαν, ὁμοίαν ἐχίνου θαλασσίου ἢ κινάρᾳ· ἄνθη δὲ πορφυροειδῆ, ὥσπερ πίλους ἐκπαππουμένους· καρπὸν δὲ κόκκῳ παπαύσιον· ῥίζαν δὲ μὲν τοῖς θυμέλοις γεωλόφοις παχεῖαν, ἐν δὲ τοῖς ὀρεινοῖς ἰσχνοτέραν, λευκὴν ἀφ' βάθους, ἐσταρωματίζουσαν, βαρυοσμον, γλυκεῖαν, ἣν τις ποθῆσα ὀξυβάφου πλῆθος, ἄγει ἕλμινθα πλατεῖαν. λαμβάνεται δὲ σὺν οἴνῳ αὐστηρῷ μετὰ ὀρίγανου ἀποζέματος, καὶ ὑδρωπικοῖς δὲ ὀπτηδείως δίδοται σὺν οἴνῳ· ἰσχναίνει γὰρ αὐτούς· καὶ πρὸς δυσουρίαν δὲ ἀφέψημα αὐτῆς πίνεται· ἔστι δὲ καὶ θηριακή, σὺν οἴνῳ ποθῆσα. ἀποκτείνει καὶ κύνας καὶ ἴκτιδας, καὶ μύας, σὺν ἀφίτῳ πεφυραμένη, καὶ ὑδρελαίῳ διεθῆσα.

De Chamæleone albo. Cap. X.

CHAMÆLEONEM album ideò Ixian appellarunt, quòd quibusdam in locis viscum ad ipsius radices inueniatur, quo etiá pro mastiche vtuntur mulieres. Folia habet silybo aut carduo similia, sed chamæleonis nigri foliis asperiora, acutiora atque validiora. Caulem non promit: verùm ex medio spinam echino marino aut cinaræ similem erigit: flores verò emittit purpurascentes, capillorú figura, qui in pappos euanescunt: semen cnici simile: radicem in lætis quidem collibus crassam, in montosis verò graciliorem, in profundo albam, aliquatenus aromaticam, odore graui, dulcem. Hæc pota acetabuli mensura, latum ventris lumbricum pellit. Sumitur verò in vino austero cum origani decocto. Hydropicis quoque commodè drachma in vino datur: etenim eos extenuat. Ipsius quoque decoctum contra difficultatem vrinæ bibitur. Aduersatur & in vino pota virulentarum bestiarum venenis. Canes autem, sueísque ac mures occidit, subacta cum polenta, aquáque & oleo dilutæ.

Vterque Goupylus deiecit, vt diuersum.

De Chamæleone nigro. Cap. XI.

Chamæleon niger & ipſe foliis ſeolymo ſimilis eſt: ipſa tamen habet minora, tenuioráque ac rubro diſtincta. Caulem verò producit digitali craſſitudine, dodrantalem ac ſubrubrum: qui quidem vmbellam gerit, floréſq; ſpinoſos; tenues, hyacinthi æmulos & verſicolores. Radix eſt craſſa, nigra, denſa, interdú & exeſa: quæ quidem diſſecta flaueſcit, & commanducata mordendi vim habet. Prouenit in campis aridis cliuoſiſque, & maritimis locis. Radix trita, additis atramenti ſutorij exiguo, cedrino oleo & axũgia, pſoras tollendi vi pollet. Eadem vnà cum ſulphure ac bitumine in aceto decocta inunctáque, lichenas abſterget. Eius autem decoctũ collutione dentium dolores mitigat. Sed & cum pari pipere & cera oblitá radix, dẽtium doloribus auxiliatur. Fouentur & ea dentes in aceto decocta & affuſa. Dolentem quoq; dentem comminuit, ſi per ſtylũ calida illi adhibeatur. Maculas verò depurgat à ſole contractas, & vitiligines cum ſulphure emendat: ſepticis medicamentis admiſcetur, ac denique impoſita, phagedænica efferatáque vlcera ſanat & extirpat. Cæterùm vt vocetur chameleo, foliorũ varietate euenit. Nam pro locorum differentijs, hîc intenſè viridia, illic albicantia, aliubi cyanea, alibi denique rubra reperiuntur.

De Crocodilio. Cap. XII.

CROCODILIVM chamæleonis nigri figuram habet. Naſcitur autem in ſyluoſis, radice longa, leui, aliquantum lata, odore, vt naſturtij, acri. Feruefacta in aqua & pota radix, valet ad copioſum ſanguinem per nares pellendum. Datur & lienoſis, eos euidenter adiuuans. Sed & ſemen ei rotundum eſt ac duplex, veluti ſcutum, quod quidem vrinam ciendi vim habet.

De Dipſaco. Cap. XIII.

DIPSACVS quoque aculeatarum ſturpium generi aſcribitur. Caulem habet altum, ſpinis hortidum, & folia caulem amplectentia lactucæ foliorum æmula, bina in ſingulis geniculis, prælonga: quæ &

Α Περὶ Χαμαιλέοντος μέλανος. Κεφ. ια'.

Χαμαιλέων μέλας, καὶ αὐτὸς τοῖς φύλλοις σεσλίμῳ ἔοικεν. ἐλάττονα μὲν τὰ καὶ λεπτότερα καὶ διέρυθρα ἔχει τὸν καυλόν· ὃς πήχεος δακτύλου ὃ πάχος, σπιθαμαῖος, ὑπερφέρει· ἔχει σκιάδιον καὶ αὐτὸ ἀκανθώδη, λεπτά, ὑακινθίζοντα, πολυ-

Β κίλα· ῥίζα ὃ παχεῖα, μήκυνα, πυκνή, ἐνίοτε ὃ καὶ βεβρωμένη, χαλεπὴ ὃ ἐπισπάσασθαι, ἀλφὰ μαλαττομένη δηκτική. Φύεται δὲ ἐν πεδίοις ξηροῖς καὶ βυσσώδεσι τόποις καὶ παραθαλασσίοις. Δυνάμει ὃ ἡ ῥίζα λεία, μιγνῦσα αὐτῇ χηλιχαύθου ὀλίγου ἢ κεδρίνου ἐλαίου καὶ ὀξυκράτου, ψώρας ἐξαλείφει σμηκτὴ

C ὃ ἐὰν λειχῆνας, θεῖον ἐὰν ἄσφαλτον παρεσκευασμένα, καὶ σὺν ὄξει θεῖσα ὄξει ἐὰν καταχρισθεῖσα ἀγρυπνοῦντα ὃ τὸ ἀφέψημα αὐτῆς, ὀδόντων πόνους παύει· μεῖον ὃ πεπέρεως καὶ κηροῦ παρεμπλασσόμενον, τοῖς ἀγρύπνοις ὀδόντων βοηθεῖ. καὶ πυελοῦ ὃ δι' αὐτῆς οἱ ὀδόντες, καθεψηθεῖσης σὺν ὄξει καὶ

D κατὰ στόμα θλιβόμενα. παρεμπλασσομένη τε ἁλὶ γραφείῳ θερμῇ τοῖς ἀγρύπνοις ὀδόντι, φθείρει αὐτόν. ἔφελιν ὃ ἀπὸ καθαίρει δὲ ἀφοῖς μετὰ μέλιτος μίγνυσα ὃ τὴν δυσεμίαν τῶν σπλάγχνων. ἐπὶ φαγεδαινικὰ ἕλκη ἐπὶ τὰ θηριώδη καὶ παλαιούμενα, ἀσκυθάζουσα θεραπεύει. ὀνομάζεται ὃ χαμαιλέων, ἀπὸ

E τοῦ ποικίλου τῶν φύλλων· εὑρίσκεται ὃ χλωρὰ τὰ τοιαῦτα, ὑποπόλιον, κυανοειδῆ, ἐρυθρά, πολλαχοῦ τῆς τόπων διαφοράς. Περὶ Κροκοδειλίου. Κεφ. ιβ'.

ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΙΟΝ ὅμοιόν ἐστι τῷ μέλανι χαμαιλέοντι. Φύεται ὃ ἐν τόποις δρυμώδεσι, ῥίζαν ἔχον μακράν, ἁβρο-

F φερῆ, ὑποπλατυν, ὀσμὴν δριμεῖαν, ὀμοίως καρδάμῳ. Ἰσχύει ὃ ἡ ῥίζα ἑψηθεῖσα ἐν ὕδατι ἢ πινομένη, ἄγει πολὺ αἷμα διὰ ῥινῶν. δίδοται ὃ ἐν φλεγμονῇσι εὐαρμόστως ὠφελήσασα, καὶ τὸ πέπερμα αὐτῆς. δύναται δὲ καὶ διπλοῦν ὡς ἄπιος.

Περὶ Δίψακου. Κεφ. ιγ'.

G ΔΙΨΑΚΟΣ. τῶν ἀκανθωδῶν ἐστι καὶ αὕτη. καυλὸν ὃ ἔχει ὑψηλόν, ἀκανθώ-

δη, ὗ φύλλα περιφληφότα τὸν καυλόν, ἐμφερῆ θρίδακι, δύο καθ' ἕκαστον γόνυ, ἀπομήκη,

Manuſcripti recentiores addunt hæc ἀκμωδέστερα καὶ μέλανι Orib. ὃν ἐστι οὐδὲν ἀπὸ ἀξίας, ἀ πλείονος δὲ ἀκμωδίας ἐστὶν Μέσον.

Plinius

Vetus vſque ad (δρυμώδεσι) caret. Locus hic ſuppleri potest, ἐστὶ φύεται, δριμεῖαν, ὑποπλατυν, quæ lectio probata eſt veteri Interpreti & Hermolao Barbaro.

V. τὸ δὲ λεῖον. Corn. ὡς ὄξει legit Al. πανυφὶς quidam verò ſegun τὸ πανυφὶς V omittit. Iſti nonnulli adſcitia cenſent & ex Tordylij hiſtoria huc perperam tranſlata.

V caret.

V. ὑπομήκη.

ἀκανθώδη καὶ αὐτά, ὥσπερ πυὰς πομφόλυγας, ὑπὲρ μέσης τῆς ῥάχεως, ἔσωθέν τε καὶ ἔξωθεν ἔχοντα ἀκανθώδεις, κοιλίδας ἔχοντα ἀνὰ δύο μέρη τῶν φύλλων· ὥστε ὑδατοποτεῖν ἀπό τε δρόσων καὶ τῶν ὄμβρων· συλλέγουσι γὰρ ὕδωρ καὶ τὰ ἄνοιξα εἰλκύουσιν. ἐπ' ἄκρου δὲ τοῦ καυλοῦ καθ' ἑκάστην ἀπόφυσιν, κεφαλὴ μία ἐστὶν ὑπὸ ἔχινον, ὑποτομίαις, ἀκανθώδης ξηρανθεῖσα ὑπόλευκος φαίνεται). ἔχει δὲ ἡ σκωλήκια κατὰ μέσον τὸ σπερμίον διαρρεθέντα τὴν κεφαλήν. Ἡ ῥίζα δὲ τούτου σὺν οἴνῳ ἀφεψηθεῖσα, καὶ ποθεῖσα, κατὰ χρῶτος λαβοῦσα πάχος, καὶ ὑπὸ δακτυλίῳ ῥαφάδας καὶ σύριγγας ὑδατώδεις θεραπεύει. ἀποπλύνεσθαι δὲ δεῖ τὸ φάρμακον εἰς χύτραν πυξίδα. φασὶ δὲ καὶ μυρμηκιὰν αὐτὸ καὶ ἀκροχορδόνας ἅμα εἶναι. ἐν δὲ τῇ κεφαλῇ σκώληκας εἰς κυστίδα ἐνδομένους, καὶ ὡσαπτόμενοι παχέλαφ ἢ βεκχίνῳ, ἰσοσκιῶσιν παραχρῆμα θεραπεύει.

ipsa aculeata sunt, ac ceu quasdam bullas in dorsi medio intus foris que spinosas habent: concauos autem sinus, qua parte bina illa folia ad geniculum copulantur, quibus aquas ex rore & imbribus in sese colligunt: vnde & dipsaci, quasi sitientis, nomen traxit. At in cacumine caulis singulis surculis singula insunt capitula, echino similia, oblonga & aculeata: quæ quidé arefacta candida spectantur, diuisa verò per longitudinem in media medulla vermiculos ostendút. Huius radix è vino decocta tusáque, vlquedum sit cerati crassitudo, sedis rimas & fistulas immissa sanat. Verùm hoc medicamentum ænea pyxide recondédum. Aiunt & ipsum myrmecijs verrucísque pensilibus remedio esse. Cæterùm capitulorú vermiculi folliculo illigati, & collo brachióve appensi, quartanas febres excutere perhibentur.

Περὶ Ἀκάνθης λευκῆς. Κεφ. ιδ'.

Ἀκανθα λευκὴ φύεται ἐν ὄρεσι καὶ ὑλώδεσι τόποις, φύλλα ἔχουσα χαμαιλέοντι λευκῷ ἐμφερῆ, στενώτερα δὲ καὶ λευκότερα, ὑποδύστα, ἀκανθώδη· καυλὸν ὑπὲρ δύο πήχεις, δακτύλου τὸ μεγάλου ἢ καὶ μείζονος πάχος, ὑπόλευκον, κενὸν ἔνδοθεν. ἐπ' ἄκρου δὲ αὐτοῦ κεφαλὰ περίστασιν ἀκανθώδης, ἔχουσα θαλαμίσκους ἐμφερεῖς, πλὴν ἐλάσσονας καὶ ὑποτομάς· αἷς τὸ σπέρμα ὡς κέγχρος, στρογγυλώτερον δέ. Ταύτης ἡ ῥίζα πινομένη παύει πρὸς αἱμοπτοϊκοὺς, στομαχικοὺς, κοιλιακοὺς· σὺν ὄξει δέ τι κινεῖ, καὶ ἐπιπλάσσεται πρὸς ὀδόντων πόνους. καὶ τὸ ἀφέψημα δὲ αὐτῆς πρὸς ὀδοντολογίαν ποιεῖ ἰσχνυόμενον. τὸ δὲ σπέρμα πινόμενον, παιδίοις σπωμένοις βοηθεῖ. καὶ ἑρπετοδήκτοις. φασὶ δέ τινες ὅτι καὶ ἀποπλύνει ἐξ αὐτοῦ θηρία διωκεῖ.

Περὶ Ἀκάνθης Ἀραβικῆς. Κεφ. ιε'.

Ἀκάνθα Ἀραβικὴ ὁμοιοῦται τὴν φύσιν τῇ λευκῇ ἀκάνθῃ, στύφουσα καὶ πρὸς ῥοῦν γυναικεῖον, καὶ πρὸς αἱμαγωγὰ αἵματος, καὶ πρὸς τοὺς ἄλλους ῥεύματος· ἡ ῥίζα παραπλησίως δίδοται.

De Spina alba. Cap. XIIII.

Spina alba nascitur in mótibus & locis syluosis. Folia fert chamęleóntis albi, sed angustiora & candidiora, aliquantum hirsuta & aculeata: caulé supra bina cubita altum, pollicari aut etiam ampliore crassitudine, candicantem ac intus cauum: cuius in cacumine capitulú est spinosum echini marini æmulum, at minus & oblongum. Flores purpurei, in quibus semen ceu cnici, sed rotundius. Huius radix pota sanguinem excreantibus, stomachicis, cœliacisque confert: vrinam ciet, ac œdematis imponitur. Eiusdé decoctú ad dolorem dentium collutione efficax est. At epotum semen, conuulsis puerulis, & à serpente demorsis, auxiliatur. Sed & venenata animalia pro amuleto gestatum abigere traditur.

De Spina Arabica. Cap. XV.

Spina Arabica natura spinæ albæ similis esse creditur. Siquidem astringit: & ad fluxum muliebrem, sanguinis reiectionem, cæteráque fluxiones radix simili modo valet.

De Scolymo, seu carduo. Cap. XVI.

SCOLYMVS folia habet chamæleonis, & ſpinę quæ alba dicitur: at nigriora & craſſiora. Caulem edit longum, foliis obſitum, in quo capitulum eſt ſpinoſum. Radix ſubiecet nigra, craſſa: quæ ſuapte vi alarum reliquique corporis graueolétiam emendat, ſeu inſperſa, ſeu decocta in vino ac bibita. Copioſam enim vrinam fœtidámque expellit. Herba verò recens nata, ſi aſparagi modo elixetur, oleris vicem ſubit.

De Poterio. Cap. XVII.

POTERIVM Iones neurada vocant. Grandis eſt frutex, ramulis lõgis, mollibus, lori modo lentis ac flexilibus, tenuibus, tragacanthæ proximis: foliis vero paruis & rotũdis. Totus autem frutex tenui obducitur lanoſa lanugine, éſtque ſpinis horridus. Flores ſunt parui, candidi: ſemé verò guſtu odoratum & acre, ſed nullius vſus. Naſcitur in ſabuloſis locis, atque collibus. Radices ſubſunt binũm ternúmve cubitorum altitudine, firmæ ac neruoſę: quæ proximè terram reciſę, lachrymam fundunt gummi ſimilem. Tuſæ autem ac illitæ, præciſos neruos vulneráque glutinant. Decoctum quoque eius epotum, vitijs neruorum prodeſt.

De Acanthio. Cap. XVIII.

ACANTHIVM folia gerit ſpinæ albæ ſimilia, in ſummo verò eminentias aculeatas, araneoſa lanugine obductas, è qua collecta textáque veſtes bombycinis ſimiles fieri aiunt. Ipſa radix foliáque potu, opiſthotono laborantibus auxiliantur.

De Acantha ſeu acantho. Cap. XIX.

ACANTHA, ſeu herpacantha, (quaſi ſerpens ſpina,) naſcitur in hortis, petroſis ac humentibus locis. Folia habet lactucaceis latiora multò & longiora, erucæ diuiſura, nigricantia, pinguia ac læuia: caulé læuem, binũm cubitorum, digitali craſſitudine, propè verticem ex interuallis foliolis quibuſdam, ceu alueolis, circundatum oblongis,

Περὶ Σκολύμου. Κεφ. ις'.

Σκόλυμος φύλλα ἔχει χαμαιλέοντος καὶ τὸ λευκὸν ἀκάνθης λεγομένης, μελάντερα δὲ καὶ παχύτερα· καυλὸν αἰπεινὸν μακρὸν, πολύφυλλον, ἐφ' οὗ κεφαλὴ ἀκανθώδης· ῥίζα δ' ὑπόνιγρα μέλαινα παχεῖα, ἥς δυνάμεις ποιᾷ πρὸς τοὺς ἐγγενεῖς τοὺς τῶν μελαγχολικῶν καὶ τὸ λοιπὸν σῶμα δυσώδεις, καὶ καθαρτικὰ μᾶλλον, καὶ ἀφεψηθεῖσα σὺν οἴνῳ καὶ πινομένη. ἄγει δ' οὖρα πολλὰ καὶ δυσώδη. καὶ πρὸς ὀρθοφυῆ οὖσα, λαγχάνει δ' ἐφθὴ ὥσπερ ἀσπάραγος.

Περὶ Ποτηρίου. Κεφ. ιζ'.

ΠΟΤΗΡΙΟΝ, ἴωνες δ' ὀνομάζουσι καλοῦσι, θάμνος ὑπὲρ μέγας, κλῶνας ἔχων μακροὺς, μαλακοὺς, ἱμαντώδεις, λεπτοὺς, ἐμφερεῖς τραγακάνθῃ φύλλα, μικρὰ, πυκνὰ περιφερῆ. ὅλος δ' ὁ θάμνος πυκνός ἐστι λευκὸν χρῶμα ἐκπίδων, καὶ ἔστιν ἀκανθώδης. ἀνθεῖ μικρὰ, λευκὰ, καρπὸν δ' ὀλυνθώδη βώδυ καὶ δριμύν, ἄχρηστον. φύεται δὲ ἀμμώδεσι καὶ γυψόφοις χωρίοις. ῥίζαι δ' ὑπόνιγροι δύο ἢ τρεῖς, ἰσχυραὶ, νευρώδεις· αἱ δὲ τινες πρὸς τῇ γῇ ἀποτμηθεῖσαι, αἱμάσσουσι δάκρυον κόμμι ὅμοιον. κοπεῖσαι δὲ καὶ ὀπτὶ πλασθεῖσαι, νεύρων σχισμὰς καὶ τραύματα κολλῶσι. καὶ τὸ ἀφέψημα δὲ αὐτῆς πινόμενον, ταῖς περὶ νεῦρα ἄλγεσι πρόσφορον ἁρμόζει.

Περὶ Ἀκάνθου. Κεφ. ιη'.

ΑΚΑΝΘΙΟΝ ἐμφερῆ τὰ φύλλα ἔχει τῇ λευκῇ ἀκάνθῃ, ἐπ' ἄκρῳ δ' ἀκανθώδεις ἐξοχὰς, ἰσχνὰς δ' ἀραχνοειδεῖς ὄντι χροιᾶς. ἰοῦσι μελανθοῖ· καὶ ὑφ' ἓν πηδήματος, βαμβακοειδὴς γίνεται. ταύτης ἡ ῥίζα καὶ τὰ φύλλα ὀπισθοτονικοῖς βοηθεῖ, πινόμενα.

Περὶ Ἀκάνθης. Κεφ. ιθ'.

ΑΚΑΝΘΑ, ἣν ἑρπάκανθα, φύεται ἐν ψαθειδέσι, καὶ ἐν πετρώδεσι καὶ παρύδροις χωρίοις· ἔχει δὲ πλατύτερα φύλλα πολλῷ καὶ μακρότερα θριδακος, ἐρεσμένα ὡς τὰ τοῦ βύζωμου, ὑποπελιδνὰ, λιπαρὰ, λεῖα· καυλὸν λεῖον, δίπηχυν, πάχος δακτύλου, ἐκ δὲ διαστημάτων πρὸς τῇ κορυφῇ περιειλημένον φυλλαρίοις ποιοῖ, οἱονεὶ κυπελλίοις ὑποπίπτουσι,

A

B

C

D

E

F

G

Lacuna ex v. c. φύλλα ἔχει μ[ελάντερα δὲ καὶ παχύτερα· καυλὸν αἰπεινὸν μακρὸν, πολύφυλλον, ἐφ' οὗ κεφαλὴ ἀκανθώδης· ῥίζα δ' ὑπόνιγρα μέλαινα παχεῖα, ἥς δυνάμεις ποιᾷ πρὸς τοὺς ἐγγενεῖς τοὺς τῶν μελαγχολικῶν καὶ τὸ λοιπὸν σῶμα δυσώδεις, καθαρτικὰ μᾶλλον, καὶ ἀφεψηθεῖσα σὺν οἴνῳ καὶ πινομένη. ἄγει δ' οὖρα πολλὰ καὶ δυσώδη. καὶ πρὸς ὀρθοφυῆ οὖσα, λαγχάνει δ' ἐφθὴ ὥσπερ ἀσπάραγος.

V. absque ἐμφερῆ,

V. & Casaub. μελάντερα. Vulgata scriptura bona est. Coup.

V. ῥίζα ὑπόνιγρα μέλαινα ἢ ὑπόνιγρα μέλαινα forte ex schol. Casaub.

V. interponit ἢ

Sic Paulus V. quidam ἀνώδυνα

Deest in Ald.

V. δυσμενῶν

V. addit περὶ. Alter pro μικρὰ habet λεπτὰ

Alter ὑπὸ τὸν χρῶτα V. omittit conclus.

Sic Ald. cod. & Orib. Par. caret. Sic V. & Lac. vulg. ἰκμάδας

V. inserit πόνου ὁ καυλὸς περγαμ.

V. epit. addit περιπλέκεται Vulg. exemp. cõclusa non habent.

Al. γίνεται βαμβακοειδὴς. Quidam ad marginem, καὶ αἱ καρποὶ τῆς καυλοῦ ὀξύνας ἔχουσι βαφικὸν ἄδυ &c.

In extremo antiqui C. habet: ἔστιν ὁ ἴτριον πολυμελισσοτροφικὸν, ὃ λευκὸν ἀκανθοειδὲς τὸ φύλλα.

V. ἰρακάνθα & margo ἢ ἄκανθα λίαν.

V. παρύδρια

Caulem

Par. ὑακινθώδεσιν

V. λεῖον

V addit similiter

Alter ἀρώμενον, & V. non habet quæ sequuntur.

G. Hoc caput est commutatum cum superiore in veteribus libris. Quidam ἐχινοπέφυκεν οἷα ἡμερὶς ἀκάνθη

Non habet Orib.

V. caret iis quæ concludit suus

In altero vox Ἁρμαντικὴ deest: sed ea caret & Goup. vtrex Calceo intelligi potest, & res ipsa ostendit.

V. hac voce caret

V. caret

V addit τε, καὶ ὀπτὸς. Alter codex habet hæc verba adscripta, τὴν ποίαν ἀσθένειαν ἐπιφέρει ἴδιος Θεόφραστος ἐπιστεῖλε, quam scripturam Hermolaus expressit. Sed non esse Dioscoridis ex eo cognoscere licet, quòd Pintæus & Ver. interpretes eam non agnoscunt. Goup. V. codices habent ἀλγηδόνα. Matthæus ἐφ' ἕλκεσι valde.

Valg. exemplar χαλάδιον

Orib. addit τοῦτο καὶ

In altero codice adiectum μαγά.

A "hyacinthinis, è quibus flos prodit albus, semen oblongum ac luteum: caput verò thyrsi specie. Radices subiacent viscosæ, mucosæ, rufæ ac longæ: quæ quidem ambustis igni "luxatisque impositæ prosunt: potæ verò vrinam cient, aluúmque cohibent. Phthisicis quoque, ruptis & conuulsis subueniunt.

al. Spinosa

vel Stomachicis

B

De Acantha Syluestri. Cap. XX.

Est & syluestris acantha, carduo similis, aculeata, breuior satiua, éaq; quæ in hortis prouenit. Eius verò radix ad eadem ad quæ superior est efficax.

De Anonide. Cap. XXI.

C ANONIS, quam aliqui ononida appellant, ramos habet dodrantales ac etiamnum maiores, fruticosos, frequentibus geniculis cinctos, multis alarum cauis præditos, itémque capitulis rotundis: foliolis verò pusillis, tenuibus ceu léticulę, ad rutę aut pratensis loti folia accedétib⁹, subhirsutis, odoratis, nec iucundè oleutibus. Muria conditur antequam spinas producat, éstque cibis gratissima. Ramuli porrò spinis acutioribus, ac spiculorum instar solidis, horrent. Radix verò cándida est, quę excalfacit & extenuat. Huius cortex ex vino potus vrinam ciet, & calculos comminuit: idem "vlcerum crustas emarginat. Cæterùm radix decocta in posca, dentiũ dolorem collutione mitigat. (Huius quoque decoctum potum hęmorrhoïdas sanare creditur.)

al. margines vlcerum exedit

D

E

De Leucacantha. Cap. XXII.

LEVCACANTHA radice est cyperi, amara, & valida: quę quidẽ cõmanducata dentium dolorẽ sedat. Ipsius verò decoctum cyathis tribus ex vino potum, veteri laterum dolore vexatis, ischiadicis, ruptis & cõuulsis auxiliatur. Sed & epotus radicis succus eosdẽ præbet effectus.

De Tragacantha. Cap. XXIII.

TRAGACANTHÆ radix lata est & lignosa, ac supra terram etiam G eminet: à qua surculi humiles, robusti, latissimè fusi: & in ipsis foliola numerosa, tenuia, inter quæ acutei sesé ꝓferũt, quos ipsa occulũt, cãdidi, firmi rectiq;. Est & tragacántha,

lachryma

lachryma quæ ſuper reſecta radice concreſcit: quo in genere præſtat pellucens, læuis, gracilis, ſincera ac ſubdulcis. Vim porrò habet æquè ac gummi cutis ſpiracula obſtruendi. Huius autem increbuit vſus ad oculorum medicamenta, itémque ad tuſſim, exaſperatas fauces & vocem interceptam atque deſtillationes, cum melle in delinctu. Sed & linguæ ſubdita liqueſcere finitur. Bibitur quoque drachmæ põdere in paſſo macerata contra renũ dolorem & veſicæ roſionem, mixto cornu cerui vſto & eloto, aut ſciſſi aluminis momento.

De Eryngio. Cap. XXIIII.

ERYNGIVM eſt in aculeatarum ſtirpium genere: cuius folia primo germinatu muria condita in cibos oleris vice recipiuntur. Lata autem ſunt & extremo ambitu aſpera, guſtu aromatica. Sed vbi augeſcunt, circa complures caulium eminentias in ſpinas aculeantur, in quorũ ſummitatibus globoſa ſunt capitula ſpinarum acutiſſimarum durarúmque ambitu ſtellatim circumuallata. Horum color aliàs viridis, nunc pallidus, aliàs albus, interdum etiam cæruleus inuenitur. Radix oblõga, lata, in ſuperficie quidẽ nigra, intus vero albicans, pollicis craſſitudine: quę & ipſa odorata eſt, & aromaticũ quiddam reſipit. Naſcitur in campeſtribus & aſperis locis. Vim porrò habet calfactoriá: pota mẽſes vrináſque pellit, ac tormina inflationéſque diſcutit. Hepaticis quoque, venenatorum morſibus, & ijs qui venenum hauſerunt cum vino ſuccurrit. Bibitur verò vt plurimùm drachmæ pondere cum paſtinacæ ſemine. Cæterùm tum amuleti inſtar adalligata, tũ & illita diſcutere tubercula perhibetur. Pota verò cũ hydromelite radix, opiſthotonicis & comitialib⁹ medetur.

De Aloe. Cap. XXV.

ALOE folium habet ſcillæ ſimilitudine, craſſum, pingue, in rotũdo modicè latum, retrorſum pandum. Sed vtrinque habent folia ex obliquo ſpinulas raris interuallis prominentes, eáſque breues & quaſi decurtatas. Caulem verò profert antherico non diſſimilem,

A δάκρυον τῆς ῥίζης ἀποτμηθείσης ἐπισυναθροιζόμενον· ἧς διαφέρει ἡ διαυγὴς καὶ λεία καὶ ἰσχνὴ καὶ καθαρὰ καὶ ὑπογλυκεῖα. Cæt. omnes

Δύναμιν δ' ἔχει ὁμοίαν κόμμει πρὸς ἐμπλαστικά. χρῶνται δὲ αὐτῇ εἰς τὰ ὀφθαλμικά, καὶ πρὸς βῆχας, καὶ πρὸς τὰς τραχείας ἀρτηρίας δασὺ τηβεννικὰς, καὶ φωνῆς ἀποπτώσεις, καὶ ἁπτασμοὺς ἐν ἐκλείγματι

B μετὰ μέλιτος· ἀποχυλίζεται τε ὑποτηκόμενα τῇ γλώσσῃ, καὶ πίνεται δὲ ἀποβραχεῖσα ἐν γλυκεῖ < ά. πλῆθος, πρὸς νεφρῶν ὀδυνίῳ καὶ κύστεως δῆξιν, μετὰ μυττωτοῦ αὐτῇ κέρατος ἐλαφείου κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου, ἢ συπήνης ὀλίγης. vulg. A

Περὶ Ηρυγγίου. Κεφ. κδ'.

C HPYTION τῷ ἀκανθωδῶν ἐστιν· ἧς ἐν ἀρχῇ τὰ φύλλα λαχανεύεται εἰς ἁλμυρίας συνήθημα. ἔστι δὲ πλατία, δασέα ὥσπερ πίτυος, ἀρώματι ζοντα τῇ γεύσει· αὐξανόμενα δὲ ἀκανθοῦται καὶ πλείονας ἐξοχὰς κεκτῆται, ἐφ' ὧν ἐπὶ τὰ ἄκρα

D κεφάλια ἐστὶ σφαιροειδῆ ἀκανθώδη τοῦ ἐλίμματος ἄσπρα ἀσπὶς ὀξυπτέρυξι κυκλοῖ, σκληρά. ὧν τὸ χρῶμα χλωρὸν ἢ ὠχρὸν, ἢ λευκὸν, ἐνίοτε δὲ καὶ κυανοῦν θρίσκεται). ῥίζα δ' ἐπιμήκης, πλατεῖα, μέλαινα ἐκτὸς τὴν ἐπιφάνειαν, ἔνδοθεν λευκή, θαλλοῦσα μεγάλου τὸ πάχος, καὶ αὐτὴ βώδης καὶ ἀ-

E ρωματίζουσα φύει δ' ἐν πεδίοις καὶ ψαχίαις τόποις. Δύναμιν δ' ἔχει θερμαντικήν. πεπτικὴν ἀχλύος καὶ ὕδρας καὶ ἔμμηνα, φόφους τε καὶ ἐμπνεύματα πώσεις λυϊ· πάτικοῖς δὲ καὶ θηριοδηκτοῖς, καὶ θανάσιμα εἰληφόσιν, ἁρμόζει σὺν οἴνῳ, πίνεται δὲ τὰ πλῆκτα σὺν σταφυλίνου σπέρματι, < ά. ὁ πλῆ-

F θος. ἰσχραίνει δὲ ὅτι πεδιαπουλὴν καὶ κακοήθη πλασμονήν, φύματα διαφορῆσαι· ῥίζα δ' αὐτῆς πινομένη μετὰ ὑδρομέλιτος, ἀποπλανητικοὺς ἰᾶται καὶ ὀπισθοτονικούς. V. carca.

Περὶ Ἀλόης. Κεφ. κε'.

ΑΛΟΗ φύλλον ἔχει σκίλλῃ παραπλήσιον, παχὺ, λιπαρὸν, ὑπόπλατυ· ἐν δὲ περιφορᾷ, εἰς πτύπιον κλινόμενον. πρὸς ἑκάτερα δὲ τὰ μέρη ἔχει τὰ φύλλα ἐκ πλαγίων ἀκανθώδη, ἀραιῶς ἐξέχοντα, κυλλὰ, καυλὸν δὲ ἀφίησιν αἰθερικῷ ὅμοιον,

Vulg. exempl. deficit

Cæt. omnes, præter Cor.

ἄνθος δὲ λευκὸν· καὶ καρπὸν ἀσφοδίλῳ ὁμοιότατα. Καρύσσεται δὲ ὅλη, καὶ ἀποχλοιοῦται πυροπάτῃ· ἔστι δὲ μονόῤῥιζος, ὥσπερ πάστηλον ἔχουσα τὴν ῥίζαν. ἡμᾶται δὲ ἐν τῇ Ἰνδίᾳ πλείστη· λιπαρὸν, ἐξ ἧς καὶ τὸ ὀπίσημα κομίζεται. φύεται δὲ καὶ ἐν Ἀραβίᾳ καὶ Ἀσίᾳ καὶ ἔτι τισὶ τόποις ἀλιγανέσι τόποις καὶ νήσοις, ὡς ἐν Ἄνδρῳ οὐκ εὔχρηστος εἰς ὀπισμὸν, πρὸς ἣ κόλλησιν τραυμάτων ἀλυσιτέλεστος, λεία καταπλασσομένη. διαφέρει δὲ ὅτι τὸ εἶδος τοῦ χυλίσματος· τὸ μέν τι ψαμμῶδες, ὃ καὶ ὑποξάνθιζον τῆς καθαρωτέρας ἔοικεν εἶναι· τὸ δὲ, πιπαρίζον. ἐκλέγου δὲ τὸ καθαρὸν καὶ ἄδολον καὶ ἁλιπὲς, στίλβουσαν, ὑποξάνθιζον, εὔθρυπτον, πιπαρίζουσαν, ῥᾳδίως ὑγραινομένην, ὀπτεπαμένην τῇ πυρίᾳ· τὸ μὲν τι μέλανον καὶ δυσκατακλαστον ἀπεκλέγου. δολίζουσι δὲ αὐτὸ κόμμι· ὃ καὶ ἐλέγχεται γλίσχρον καὶ πυρίᾳ καὶ ὀσμῇ ὀπτόν· καὶ τῷ μὴ διαλύεσθαι μέχρις ἐλαχίστου φύσματος θλιβομένου ὑπὸ τῶν δακτύλων. ἔνιοι δὲ καὶ ἀκακίαν μίσγουσι. Δύναμιν δὲ ἔχει σταλτικὴν, ὑπνωτικὴν, ξηραντικὴν, πεπτικὴν τῶν σωμάτων, χυλίσας τὸ λευκὸν, καὶ σὺν μέλιτι ἀπὸ καθαρικὴν, κοχλιαρίου ϛ'. πλῆθος. μεθ' ὕδατος ψυχροῦ, ἢ γαλακτώδους πινόμενον· αἵματός τε ἀναγωγαὶ ἐπέχει· καὶ ἕτερον ἀπὸ καθαίρει μεθ' ὕδατος τριωβόλου, ἢ < α'. ὀλκῆς· ὁ ποτῷ. καὶ μετὰ ῥητίνης δὲ καταπινόμενον, ἢ ὕδατος ἢ μέλιτος ἐφθοῦ αἱ ἀλληφθεῖσαι, χοιλίδα λύει· δραχμῶν δὲ τριῶν πλῆθος τελείως καθαίρει· μεθ' ὑδρομέλιτος δὲ ταῖς ἄλλοις καθαρτικοῖς, πᾶσαν αὐτὰ κακοσμίαν παύει. ξηρὸν δὲ ἐπιπλάσσει, βαιμάλια κολλᾷ, καὶ ἐπουλοῖ· ἕλκη καὶ καταφίλλει. αἰδοῖα δὲ εἰλκωμένα ἰδίως θεραπεύει, καὶ ἐπαγώγια παίδων ῥηγίνας ἀδενολλᾷ. ἰᾶται δὲ καὶ κονδυλώματα καὶ ῥαγάδας χειραμβὰς σὺν γλυκεῖ οἴνῳ· αἱμορραγίας τε ἴσχει. βοᾷ δὲ αἱμορροΐδων, καὶ περίγια ἀπουλοῖ, αἴρει τε πελιώματα καὶ ὑπόπια σὺν μέλιτι· ψωροφθαλμίας τε καὶ κνωδῶν

florem album, & semen ceu hastulę regiæ. Est autē tota odore graui, & gustu amarissima. Vnica verò radice ceu palo in terram demisso nititur. Plurima in India præpinguisq; nascitur: ex qua etiá coactus succus importatur. Nascitur & in Arabia, Asia, ac in locis quibusdam maritimis & insulis, velut in Andro, non valdè eliciēdo succo idonea, sed ad conglutinanda vulnera sanè quàm vtilis, si trita illinatur. Duo sunt porrò succi genera: alterum arenosum, quod purissimæ veluti fæx & crassamentum esse videtur: alterū quod ad iecinoris imaginē vergit. Eligito pinguem, quæ nihil doli senserit, calculorū expertem, nitidam, subflauam, friabilem, iecinoris modo coactam, quæque facilè humescat, eximiæq; sit amaritudinis. Nigram contrà fractúque contumacem improbato. Sunt qui eam gummi adulterent: id quod gustu, amaritudine & odoris vehementia deprehenditur, eóque indicio quòd attrita digitis non ad minima vsque ramenta resoluatur. Neque desunt qui acàciam immisceāt. Vim habet astringēdi, somnum conciliandi, exiccandi, corpora densandi, aluum soluendi, stomachúmque repurgandi, si binûm cochlearium mensura ex aqua frigida, aut lactis instar tepida seu egelida bibatur. Sanguinis etiamnum excreationes sistit, & morbum regium emendat, ex aqua tribus obolis, aut drachmæ pondere, in potu. Deuorata verò cum resina, aut aqua vel melle cocto excepta, aluum soluit: ternûm autem drachmarum pondere, perfectè purgat. Sed & alijs purgantibus medicamentis admista, præstat vt minùs stomachum infestent. Sicca verò insperſa, vulnera glutinat, vlceráque ad cicatricem perducit cohibétque: eadem peculiariter exulceratis genitalibus medetur, & disrupta puerorum præputia agglutinat. Quin & condylomata rimásque sedis dulci vino ammixto sanat. Sanguinis ex hæmorrhoïdibus eruptiones sistit, prerygia ad cicatricem ducit, liuida & sugillata, hypopia dicta, ex melle tollit. Scabras quoque lippitudines, angulorúmque in oculis

V. δὲ λευκὸν.
V. δὲ καὶ.
Al. λεῖα
V. καθαρωτέρας
V. λιπαρὸν. Sic Orib.
Cæt. ἀποξάνθιζον
Al. διαλύεσθαι
V. non habet
V. his caret. Mare pro μασθῶν legendum suspicatur Cæsalp.
V. κνωδῶν καὶ ῥαγάδων. Vulg. κνωδῶν

prurigines mitigat. Dolorem capitis ſedat; ex aceto & roſaceo fronti ac temporibus illita. Sed & cum vino fluentem capillum continet: itidémque tonſillarum, gingiuarum cæterarúmque oris partium vitijs cum melle ac vino proficit. Cęterùm ad oculorum medicamenta torretur in munda & candente teſta, liguláque ſubinde verſatur, donec æqualiter toſta fuerit. Lauatur & aloë: atque id quod arenoſum ſubſidet, tanquam inutile ſecernitur: pinguiſſimum autē quódque læue eſt, recipitur.

De Abſinthio. Cap. XXVI.

ABSINTHIVM, bathypicron dictum, herba eſt vulgo cognita. Præſtantius in eo genere, quod in Ponto & Cappadocia in monte Tauro appellato naſcitur. Vim porrò habet calfaciendi, aſtringendi, concoctiones adiuuandi, bilioſáque detrahendi quæ ſtomacho & aluo inhæſerunt. Vrinam etiam cit, & crapulam in potu præſumptum arcet. Valet & aduerſus inflationes, itémque ad diſcutiendos ventris & ſtomachi dolores, cum ſeſeli aut nardo Celtico potum. Faſtidia quoque abſterget, arquatóſque ſanat ipſius madefacti diluti, vti & decoctum, quotidie tribus cyathis hauſtum. Sed & menſes trahit ſeu potum, ſeu etiam cum melle appoſitum. Contra fungorum ſtrangulationes conuenienter ex aceto bibitur. E vino autem ixię. necnon & cicutæ venenis aduerſatur, ac muris etiā aranei morſibus, itémque draconi marino. Anginæ eo cum melle & nitro perunguntur, vt epinyctides ex aqua. Ad ſugillata hebetioréque oculorum aciem ex melle illinitur, ſimilitérq; auribus ſanie manantibus. Quin & aurium dentiúmque dolores decoctum vaporis ſuffitu compeſcit. Decoctum vnà cum paſſo, veheméter dolētib⁹ oculis adhibetur. Imponitur & hypochondrijs hepatíq; diuturno dolore infeſtatis, tritū cū cerato cyprino: ſtomacho verò lōga valetudine laboráti, cū roſaceo. Admiſtis ficubus, nitro & loliacea farina, hydropicis lienoſiſq; ſubuenit. Vinū deniq; ex eo paratur quod abſinthite vocāt, preſertímq; in Propon-

A κοσμοις πρὸς ὑγρᾶς καὶ κεφαλαλγίας μεθ' ὕδατος καὶ ῥοδίνου, μετώπῳ καὶ προσώποις ἐπιχριόμενον· ἐπιχεῖ καὶ ῥεούσας τρίχας σὺν οἴνῳ καὶ στόμασι πρὸς παθήματα καὶ ἐν τῷ στόματι ἁρμόζει σὺν μέλιτι καὶ οἴνῳ φώγμοὺς δὲ καὶ εἰς τὰ ὀφθαλμικὰ ὅτι καθαρὸν καὶ δριμὺ ὀστράκου, Marc. ſi videtur legiſſe.

B μελαδημόμενον μύστρῳ, μίσγεις αὐ ὁμοίως πυρωθὲν. πλυνόμενον δὲ χωνευόμενον πολλαμμώδους ὡς ἀχρήστου, λαμβάνομένου δὲ τὸ λιπαρώτατον, καὶ λεῖον.

Περὶ Ἀψινθίου. Κεφ. κς'.

ΑΨΙΝΘΙΟΝ, βαθύπικρον, γνώριμος ἡ ποά. ἔστι δὲ αὐτῆς βέλτιον, ὃ ἐν V. addit. ex Ioſephi Marc. Barthol. Pontico

C Πόντῳ δὲ Καππαδοκίᾳ ἐν ὄρει τῷ καλουμένῳ Ταύρῳ γινόμενον. Δύναμιν δ' ἔχει θερμαντικὴν, συμπτικὴν, πεπτικὴν, καὶ ἀποκαθαρτικὴν τῶν ἐντὸς κοιτῶν τομάχου δὲ καὶ κοιλίας χολωδῶν. ἔστι δὲ ἐρπτικὸν καὶ ἀχροαίπαλον, προπινόμενον. ἢ πρὸς ἐμπνευματώσεις δὲ ἁρμόζει, καὶ κοιλίας καὶ τομάχου δυσπεψίας, πινόμενον μετὰ στεμφύλου ἢ ναρδου Κελτικῆς· δὲ αἱορεξίας καὶ ἰκτερικοὺς θεραπεύει τὸ ἀποβρεχθὲν αὐτῷ ἢ τὸ ἀφέψημα, καθ' ἑκάστην ἡμέραν λαμβανόμενον εἰς πλῆθος κυάθων τριῶν ἄγει δὲ καὶ ἔμμηνα, πινόμενόν τε καὶ προστιθέμενον μετὰ μέλιτος. πρός τε τοὺς ἀπὸ μυκήτων πνιγμοὺς ἁρ- Sic v. cuidam Interque Marc. ex Phn. vulg. exemplar. erant. V. vſque ad τριφύλλου hæc omnia.

E μόζει, σὺν ὄξει πινόμενον. σὺν οἴνῳ δὲ, πρὸς ἰξίας καὶ κώνωπος καὶ μυγαλῆς δήγματα, καὶ δράκοντα θαλάσσιον. συναγχικοῖς τε ἁφέψημα σὺν μέλιτι δὲ νίτρῳ, δὲ πρὸς ἐπινυκτίδας σὺν ὕδατι. πρὸς δὲ ὑπώπια, σὺν μέλιτι. καὶ πρὸς ἀμβλυωπίας, δὲ πρὸς ἰχωρροῦντα ὦτα ὁμοίως. καὶ ὁ ὑπαλλαμμὸς δ' αὐτοῦ ἢ ἀφεψήματος, πρὸς αὐτάγρια δὲ ὀδοντάγρια. V. cuius

F μὸν. ἢ ἀφεψόμενόν τε σὺν γλυκεῖ, κατάπλασμα ὀφθαλμῶν παθοδυνώντων ὅτι καταπλάσαι) ἢ δὲ πρὸς ὑπόχονδρια, δὲ ἧπαρ δὲ τομάχου ἐπαγωγὴ καὶ χρονίους πάροχθους, συνεκλειπομένους κηρωτῇ κυδωνίᾳ· πρὸς δὲ τομάχου, ῥοδίνῳ· ἁρμόζει καὶ ὑδρωπικοῖς, καὶ σπληνικοῖς, μετὰ σύκων, καὶ νίτρου, καὶ αἰείου ἀλεύρου. Σκευάζεται δὲ ἐξ αὐτοῦ καὶ οἶνος ὁ λεγόμενος ἀψινθίτης, μάλιστα τῶν Προπον- V. cuius

ῥίζα καὶ Θρᾴκιον, ᾧ πρὸς τὰ στροφώδη πάθη χρῶνται ὁ ἀπυρεξίαν· καὶ ἄμεινον ὄν, σκοπεῖσθαι ἐξ αὐτῆς ἥρως, ὑγιείας παυλικὸν δύ νομίζοντες· δεῖ δὲ καὶ τὰ ἐκπλανώμενον εἰς ταῖς κοιλίαις ἄδρωτα τηρῆν τὰ ἱμάτια. ἀμύθρωσί τε μετὰ ἐλαίου, κώνωπας κωλύειν ἅπασαν τὸ σώματος· ὃ δὲ μέλαν ᾧ χράφομεν ὦ ἀποβρέγματι αὐτῆς ὄρυχεν, ἄδρωτα μετὰ τηρῆν τὰ γράμματα. ἔοικε δὲ καὶ τὸ τῆς χυλίσματος ἔργα ποιῆν τὰ αὐτά. πλὴν εἰς ταῖς πόσεις ὐ δοκιμάζομεν αὐτὸ, καυχόμαχον καὶ κεφαλαλγὲς ὄν. ὃ δὲ χύλισμα ἀμύργῃ ἐμπλαστὸν καὶ μιγνύμενον δολοῦσι τινες.

V ad finē usque his caret, licet legitima sint.

Sic legit Goupylus ex vet. libris, quamuis vulgati codices habent χροὸς. Lacuna legit in vet. cod. ἔρυθρία.

Περὶ Ἀψινθίου θαλασσίου. Κεφ. κζ.

Ἀψίνθιον θαλάσσιον, ἅτινες ὴ καὶ Σεριφιον καλοῦσι, ὅσῳ πλεῖστον ἐν τῷ κατὰ Καππαδοκίαν Ταύρῳ ὄρει γινόμενον, καὶ ἐν Ταφοσίρει τῆς Αἰγύπτου. ᾧ αἱ Ἰσιακοὶ χρῶνται. ἔστι δὲ ἡ πόα λεπτόκαρφος, ἐοικυῖα ἀβροτόνῳ μικρῷ, πεπλησμένη σπερματίων, ὑποπίκρου, καυχώδους, βαρύοσμου, φύφουσα μετὰ ποσῆς θερμασίας· ἣ πρὸς ἐμφυτῖσα καθ' ἑαυτὸ, ἢ μετὰ ὀρύζης, καὶ ληφθεῖσα μετὰ μέλιτος, ἀσκαρίδας καὶ ἕλμινθας τρογγύλας κτείνει, ὑποστάζουσα κοιλίας καὶ φυσᾷ· δυνάμενον δὲ καὶ σὺν ὄξυμέλιτι, ἢ φακῇ καὶ ληφθεῖσα, τὰ αὐτὰ ποιεῖ. λιπαίνεται δὲ μάλιστα τὰ τετράβαλα νεμόμενα.

V. βαθύοσμον

V. addit μετὰ μέλιτος ἐλαιοσταγοῦς ἀλοίσας.

V. ἄνευ ἀγνοῦ

V. μορίῳ τετραπλῆ. Marc. legit ὀξυμέλιτι

V. τετραπλᾶ

V addit ὁ Κων σταντῖνος.

Περὶ Ἀψινθίου Σαντονίου. Κεφ. κή.

Ἔστι δὲ καὶ τέταρτον εἶδος ἀψινθίου, γινόμενον ἐν τῇ κατὰ Ἄλπεις Γαλατίᾳ πλῆθος· ὃ ὀνομαζόμενος Σαντόνιον καλοῦσι, ἐπωνύμως τῇ γινώσῃ αὐτὸ Σαρδονίδι χώρᾳ· ἔοικὸς ἀψινθίῳ, ἧττον μὲν οὔτε γε ἔναρμον, ὑποπίκρου ὄν, καὶ δυνάμενον τὰ αὐτὰ τῷ Σεριφίῳ.

Περὶ Ἀβροτόνου. Κεφ. κθ'.

ΑΒΡΟΤΟΝΟΝ, ἔστι ὴ αὐτῆς ὃ μὲν θῆλυ, θάμνος δενδροειδὴς, ὑποπόλιχνος. φύλλοις λεπτομερέσιν ὡσαῦτως Σεριφίῳ περὶ τὰ κλωνία, πλῆρες αἰθρίου, ἐπ' ἄκρων ἔχων κορυμβώδεις χρυσοειδεῖς θηρείας γινώμενον, ὠδῆς μετὰ βάρεως, πικρὸν τῇ

tide & Thracia: quo ad antedicta vtuntur, si febris abest. Adde quòd de ipso æstate propinant, corporibus bonam valetudinem præstare existimantes. Creditur & vestiarijs arcis inspersum absinthium, vestes à tinearum iniuria vindicare: itémque ex oleo perunctum, culices abigere, & à corpore arcere. Cæterùm atramentum librarium ex diluto eius temperatum, libros à musculorum erosione tuetur. Existimatur & expressi succus eosdem præstare effectus. Attamen potionibus improbatur, quòd stomacho sit inimicus, dolorémque capitis ciet. Sunt verò qui succum amurcæ decoctæ permistione adulterát.

De Absinthio marino. Cap. XXVII.

Absinthium marinum quidam Seriphium vocant: quod quidē copiosissimum in Tauro monte iuxta Cappadociam gignitur, & in Taphosiri Ægypti. Id Isiaci pro oleagino ramo præferre solenne habēt. Est autem herba prætenuibus surculis, abrotoni parui similitudine, minutulis referta seminibus, subamara, stomacho inimica, graueolens, & cum quadam calfactione astringens. Hæc per sese, aut cum oryza cocta, assumptáq; cum melle, ascaridas teretésq; lumbricos enecat, leuiter simul & semel aliū subducens. Sed & cum sapa aut lenticula decocta, eadē præstare potest. Cæterùm pecora hoc maximè pabulo pinguescunt.

hoc est, ijsdem fœtris mixtis.

De absinthio Santonico. C. XXVIII.

Est & tertiū absinthij genꝰ, quod copiosissimū in Gallia Alpibus finitima nascitur. Id patrio nomine Sātonicum appellát, tracto à Santonū regione, in qua gignitur, cognomēto. Absinthio est simile, attamē non adeò seminis fœcundum, verùm subamarum & eiusdem cum Seriphio facultatis.

De Abrotono. Cap. XXIX.

ABROTONVM duorum traditur generū: ac fœmina quidem frutex est arboris specie, cādicās, foliis circa ramulos Seriphij modo minutim incisis, floribꝰ refertos habēs in summo quasi corymbos auri fulgore, æstate prouenientes, iucūdi odoris cum grauitate quadā, at gustu

amaro. Hoc genus Siculum esse creditur. Alterum mas vocatur, sarmétosum, gracilibus ramulis, velut absinthium. Plurimum in Cappadocia gignitur, & Galatia Asiatica, atque in Syriç Hierapoli. Vtriusque semen seu feruefactum, seu crudum tritum, & ex aqua potum, orthopnœæ, ruptis, conuulsis, ischiadicis doloribus, vrinæ angustijs & mensibus commorantibus auxiliatur. Est & in vino potum exitialium venenorum antidotum. Rigore prehensis ex oleo vtiliter illinitur. Serpentes quoque tum substratu, tum etiam nidore fugat. Sed & contra morsus eorum cum vino bibitum prodest: priuatim verò pollet contra phalangiorum & scorpionũ ictus. Subuenit & oculorum inflammationibus, cum coroneo cocto aut pane impositum. Discutit quoque panos, cum farina hordeacea cruda tritum decoctúmque. Miscetur denique & olei irini compositioni.

A γλυσφ· δοκεῖ δὲ ὁ Σικελιωτικὸς εἶναι πολυτ. ὁ δὲ ἕτερον ἄρρεν καλεῖται, κληματώδες, λεπτόκαρπον· ὡς ἀψίνθιον. πλεῖστον δὲ ὁ Καππαδοκία γινᾶται καὶ Γαλατία τῇ κατὰ τὴν Ἀσίαν, καὶ ὁ Ἱεραπόλει τῇ κατὰ τὴν Συρίαν. Τούτων ὁ καρπὸς ἀποξυπόμενος καὶ ὠμὸς ἐκβὰς μὲν ὕδατος πινόμενος, βοηθεῖ ὀρθοπνοίᾳ, ῥήγμασι, σπάσμασιν, ἰσχιάσι, δυσουρίαις, ἐμμηνίων ἐπισχέσει. καὶ θανασίμων φαρμάκων ἐστὶν ἀντίδοτος, πρὸ μὲν σὺν οἴνῳ. σύγχρισμά τε ῥιγοῦσιν μετ' ἐλαίου ἐστί. διαπλάττεται δὲ καὶ ἕρπετα· στρωννύμενον καὶ θυμιώμενον. καὶ πινόμενον ὁ σὺν οἴνῳ ὠφελεῖ τοὺς δηχθέντας· ἰδίως δὲ ἁρμόζει ὅτι φαλαγγίων καὶ σκορπίων· βοηθεῖ δὲ καὶ ὀφθαλμῶν φλεγμοναῖς, σὺν ἐφθῷ κυδωνίῳ ἢ μετὰ ἄρτου καταπλασθέν. διαφορεῖ καὶ φύματα, μετὰ ὠμῆς λύσεως λαφὺν ἐφθέν. μίγνυται δὲ καὶ εἰς τὴν τοῦ εἰρινοῦ ἐλαίου σκευασίαν.

V. addit Dioscorides

Al. τοῦ λεπτοῦ

Quidam ἐμπλάττεται καὶ ὑπὸ πρὸ τοῦ. & subdit V. καὶ πρὸς σπασμοὺς καὶ ἰσχιάσεις καὶ δυσουρίας καὶ ἐμμηνίων ἐπισχέσεις.

De Hyssopo. Cap. XXX.

Περὶ Ὑσσώπου. Κεφ. λ'.

HYSSOPVM herba nulli non cognita, duũm est generũ: montanum enim quoddam est, hortense alterum. Laudatissimũ est, quod in Cilicia nascitur. Vim habet attenuandi & excalfaciendi. Decoctum cum ficis, aqua, melle & ruta, potu peripneumonicis, asthmaticis, diuturnæ tussi, distillationi & orthopnoëæ auxiliatur: itémque ventris animalia enecat. Idem præstat, si cum melle delingatur. Humores crassos per aluum extrahit eiusdem decoctum, cum oxymelite potum. Estur & cum viridibus ficis detritis ad subducẽdam aluum, sed valentiùs deijcit admisto nasturtio vel iride aut irione: meliorem quoque colorem cuti conciliat. Lieni verò ac hydropi cum fico nitróque illinitur: ex vino autem, inflammationibus. Discutit & fugillata, cum fetuente aqua impositum. In anginis cum decocto ficuum effic acissimè gargarizatur. Cæterùm cum aceto decoctũ, dentium dolorem collutione mitigat, & aurium inflationes vaporis suffitu discutit.

Ὑσσωπος πόα γνώριμος, διοπερ οὐ μακρὰ πρὸς ὄψιν, ἡ δὲ κοπάδιτις. ἀρίστη δέ ἐστιν ἡ ἐν Κιλικίᾳ γινομένη. Δύναμιν ἔχει λεπτυντικὴν, θερμαντικὴν ἀφεψηθεῖσα μετὰ σύκων καὶ ὕδατος, μίγματός τε καὶ πηγάνου, καὶ πινομένη, ἀρχομένοις περιπνευμονικοῖς, ἀσθματικοῖς, βηχὶ χρονίᾳ, καταῤῥοῇ, ὀρθοπνοίᾳ· κτείνει δὲ καὶ ἕλμινθας. σὺν μέλιτι δὲ ἐκλειχόμενον, ὁ αὐτὸ ποιεῖ. ἄγει δὲ καὶ παχὺν χυλὸν καὶ χολὰς ὁ ἀφέψημα αὐτοῦ, σὺν ὀξυμέλιτι πινόμενον· βιβρώσκεται δὲ καὶ μετὰ χλωρῶν σύκων λείων πρὸς ὑπαγωγὴν κοιλίας. σταφιδρότερον δὲ καθαίρει, μίγματος αὐτοῦ καρδαμώμου, ἢ ἴριδος, ἢ ἐρεσίμου πρὸς ποτὸν ὁ ἐν εὐχροΐᾳ. καταπλάσσει δὲ μετὰ σύκου καὶ νίτρου πρὸς σπλῆνα & ὕδρωπα· σὺν οἴνῳ δὲ, πρὸς φλεγμονάς. διαφορεῖ δὲ καὶ ὑπόπιτα σὺν ὕδατι ζεστῷ καταπλασθεῖσα. συνάγχοις δὲ ἀναγαργάρισμα μετὰ σύκων ἀφεψήματος ἄριστον. ὀδόντων τε πόνον πρᾳΰνει, σὺν ὄξει ἐφθεῖσα καὶ διακλυζομένη· λύει δὲ καὶ τοὺς περὶ τὰ ὦτα ἐμπνευματώσεις ἐπαλμισθεῖσα.

Περὶ Στοχάδος. Κεφ. λά.

ΣΤΟΙΧΑΣ νησῖταί μὲν καὶ αἱ περὶ Γαλατίαν νήσοις αἰπηρὰ Μασσαλίας, καλούμεναι ὑπὸ Στοιχάδων, ὅθεν καὶ τὴν ἐπωνυμίαν ἔσχηκε. φύεται λεπτόκαρπος ἐστὶν, ὁμοίαν ἔχουσα κόμην θύμῳ, μακροφυλλοτέρα μέν πως καὶ δριμεῖα σὺν τῇ γεύσει, καὶ ὑποπίκρος πως. ποιεῖ δὲ τὸ ἀφέψημα αὐτῆς καθάπερ ὁ ὕσσωπος πρὸς τὰ ἐν θώραξι. μίγνυται δὲ καὶ εἰς ἀντιδότους χρησίμως.

Περὶ Ὀριγάνου. Κεφ. λβ'.

ΟΡΙΓΑΝΟΣ Ηρακλεωτικὴ, οἱ δὲ κοτύλιλον καλοῦσι, φύλλον ἔχει ἐμφερὲς ὑσσώπῳ· σκιάδιον δὲ οὐ λεπτὸν, ἀλλ' ὡς ἂν διηρημένον, καὶ ἐπ' ἄκρων τῶν ῥάβδων τὸ σπέρμα πυκνόν. Ἔστι δὲ θερμαντικὴ ὅλην τὴν ἀφέψημα αὐτῆς σὺν οἴνῳ ποθὲν, ἁρμόζει θηριοδήκτοις· σὺν γλυκεῖ δὲ, τοῖς κώνωπι ἢ μυκητίσι πεπωκόσι· σὺν ὀξυμέλιτι δὲ, τοῖς πεπωκόσι γύψον ἢ ἐφήμερον. πρὸς δὲ τὰ σπάσματα καὶ ῥήγματα καὶ ὑδρωπας, μετὰ σύκου βεβρωσκομένη. ξηρὰ δὲ πεθεῖσα ὀξυβάφῳ πλήθους σὺν μελικράτῳ, μέλαινα καὶ χιλίαι ἄγει· ἐμμένουσά τε κινεῖ καὶ ὄνυξι θεραπεύει, στομαχικοῖς ἐκλείχομένη· κυνικοῖς δὲ καὶ φθόρας καὶ ἕκτηρον τὸ ἀφέψημα αὐτῆς ἐν λουτρῷ ὠφελεῖ. ὁ δὲ χυλὸς αὐτῆς χλωρᾶς οὔσης, καὶ πτερύγια καὶ κιονίδας καὶ ἄφθας θεραπεύει. καὶ σὺν ῥοῖς ἄγει, σὺν ἐλαίῳ δὲ ἐγχυματίζόμενος· σὺν γάλακτι δὲ, καὶ ὠταλγίας παύει. ἐμπλαστόν τι φάρμακον σκευάζεται δι' αὐτῆς καὶ κρομμύων, καὶ ῥοῦ τοῦ ἐπὶ τὰ ὄξη, πρὸς τὰ ἐν χαλκῷ κυνορίᾳ ἐν τοῖς ὑπὸ κυνὸς καύμασιν ἡλιαζόντων, ὅτι ἡμέρας μ'. ὑποστρωννυμένη δὲ ἡ πόα, ἑρπετὰ διώκει.

Περὶ Ὀνήτιδος. Κεφ. λγ'.

Ἡ δὲ Ὀνῆτις καλουμένη, λευκοτέρα τοῖς φύλλοις ἐστὶ, καὶ μᾶλλον ἐοικυῖα ὑσσώπῳ, καὶ τὸ σπέρμα ὡς ἂν κορύμβοις συνεχέσι διακειμένοις ἔχει. Δυνάμεως δέ τινος τὰ αὐτὰ τῇ Ηρακλεωτικῇ, οὐχ οὕτω μέντοι δραστικὴ καθέστηκεν.

Περὶ Ἀγλωσεήδους. Κεφ. λδ'.

Ἡ δὲ Ἀγλωσεήδος, ἣν πολλαχοῦ

A *De Stœchade. Cap. XXXI.*

STOECHAS in insulis Galliæ gignitur, quæ è regione Massiliæ sitæ Stœchades appellantur: & ab ijs quoque nomen accepit. Herba est tenuibus sureulis, coma thymi, sed folio longiore, gustu acris, & aliquantum subamara. Decoctum huius, vt & hyssopi, ad pectoris vitia efficax est. Antidotis quoque vtiliter immiscetur.

De Origano. Cap. XXXII.

ORIGANVM Heracleoticum, quod nonnulli cunilam appellant, folium habet hyssopo non dissimile: vmbellam autem non in rotæ speciem orbiculatam, sed veluti diuisam, & semen in summis virgis haudquaquam densum. Vim habet excalfaciendi: ac proinde ipsius decoctum ex vino potui datum, venenatorum morsibus conuenit. Ex passo verò, ijs prodest qui cicutam aut meconium: ex aceto mulso, ijs qui gypsum aut ephemerum hauserunt. Conuulsis autem, ruptis & hydropi medetur, cum fico eíui datum. At aridum, acetabuli mensura cum aqua mulsa epotum, atros humores per aluum extrahit, menses ciet, ac tussi cum melle delinctum medetur. Prurigini autem, psoræ ac morbo regio decoctum ipsius in balneo prodest. Succus virentis, tonsillis, vuulis & aphthis medetur: & in nares ex oleo irino infusus, caput purgat: aurium quoque dolores ex lacte mitigat. Conficitur denique ex eo, cępis, ac rhois frutice quo ad obsonia vtuntur, vomitorium medicamentum, his omnibus in cupreo vase per Caniculæ ardores ad dies quadraginta insolatis. Substrata autem herba serpentes fugat.

De Onitide. Cap. XXXIII.

Quod onitis appellatur, foliis est cádidioribus, hyssopóque similius: ac semen habet, veluti corymbos cohærentes ac sibiinuicem incumbentes. Vis tamen eadem, quæ Heracleotico: at minùs efficax.

De origano syluestri. Cap. XXXIIII.

Syluestre origanũ aliqui panaces

Heraclium vocát, alij cunilam: quo in numero eſt Nicander Colophonius. Folijs eſt origani, virgultis dodrátalibus, tenuibus, in quibus vmbellæ anethi inſunt, flores candidi: radix tenuis ac inutilis. Priuatim venenatorum morſibus folia & flores ex vino in potu auxiliantur.

A Ηρακλιον, οἱ δὲ κονίλην καλοῦσιν, ὧν ἐστι καὶ Νίκανδρος ὁ Κολοφώνιος, ἔχει τὰ μὲν φύλλα ὅμοια ὀρίγανῳ, βλαστὸν δὲ καυλώδη, ἀνθηρὰ, λεπτὰ, ἐφ' ὧν σκιάδια ὅμοια ἀνήθῳ, αὐξη δὲ λευκή. ῥίζα λεπτὴ, ἄχρηστος. ἰδίως δὲ βοηθεῖ θηριοδήκτοις τὰ φύλλα καὶ τὸ αὐξη, σὺν οἴνῳ πινόμενα.

Cæter. ὑποστατῶν

Alii add. ἢ κορακλήκῃ παραπλησίως

B Περὶ Τραγοριγάνου. Κεφ. λέ.

ΤΡΑΓΟΡΙΓΑΝΟΣ θαμνίσκος ἐστὶν, ὀρίγανῳ ἢ ἑρπύλλῳ ἀγρίῳ ὅμοιος τὰ φύλλα καὶ τὰ κλωνία· ἡ μὲν τις βλαστάνει καθ' ὕπνους βλητικὰ, καὶ πλατύφυλλος, κολλώδης ἰκμώδης. ἡ δέ τις λεπτόκαρφος καὶ λεπτόφυλλος, ὧν καὶ προσίενται ἔνιοι καλοῦσι. χρῖσις δὲ ἡ Κιλίκιος, ἣ καὶ ἐν Κῷ, καὶ Χίῳ, καὶ Σμύρνῃ, καὶ Κρήτῃ. θερμαντικαὶ δὲ πᾶσαι· καὶ οὐρητικαὶ καὶ εὐχύλιοι, πινομένου τοῦ ἀφεψήματος. ἁρμόττει γὰρ βεβαίζουσι γὰρ τὰ χολώδη. βύθιοι καὶ σπληνικοῖς πινόμεναι μεθ' ὄξους, καὶ τοῖς ἰξίας πεπωκόσι μετ' οἴνου, καὶ ἔμμηνα δὲ ἄγουσι· βοηθεῖ τι καὶ πνευμονίαις, σὺν μέλιτι τὸ ἐκλεκτὸν διδόμενον. ἔστι γὰρ καὶ τὸ πότημα ὀπτικόν· ὀφθαλμοῖς ἀσαφέσι καὶ κακοπαθέσι καὶ ὀξυρεγμιώσι δίδοται· καὶ ἐφ' ὧν δύσπνοιαι καὶ ναυλία καὶ θέρμη στοματικὸν παραλαμβάνειν. διαφορὰ δὲ καὶ οἰδήμασι καθαπλασθεῖσα μετὰ ἀλφίτων.

V. βοηθεῖ δὲ καὶ

V. cæter. usque ad vocē διδόμενον

Sunt qui addant: πινόμενον δὲ τὸ αὐτὸ ἄνευ καὶ ὀξυγάλου καὶ ῥίζης καὶ ῥίζης πινόμενον ἢ τὸ ἐπὶ τοῖς ἰξίαις πεπωκόσι καὶ βύθιον πινόμενον τοῦτο ἐπὶ χολώδεσι ἐμέσεσι καὶ πρὸς ὀφθαλμοὺς καὶ πρὸς θηριοδήκτους, καὶ πρὸς ἀναπνοὰς καὶ πρὸς βῆχα χρόνιον, καὶ ὑστερικοῖς πάθεσι.

V. cæter.

C Περὶ Πολυγίου. Κεφ. λς'.

ΠΟΛΥΓΙΟΝ πόα γνώριμος, λεπτομερὴς, θερμαντικὴ, πεπτική. ποθεῖσα δὲ ἔμμηνα καὶ δεύτερα καὶ ἔμβρυα ἄγει· ἀναγκάζει δὲ καὶ τὰ ἐκ πνεύμονος μεθ' ἁλὸς καὶ μέλιτος ποθεῖσα, καὶ σωματικοῖς βοηθεῖ· ναυσίας τε καὶ δυσεμοὺς τομάχου μετὰ ὄξους κράτου ποθεῖσα καταμυθεῖται. ἄγει δὲ καὶ καθ' ἰλύν μέλαινα. βοηθεῖ δὲ καὶ θηριοδήκτοις πινομένη μετ' οἴνου. λειποθυμοῦσί τε αἰσχεῖται σὺν ὄξει, πρὸς ῥινὸς προσφερομένη· κρατεῖ δὲ καὶ οὖλα, ξηρὰ λεῖα· κεκαυμένη. ὀφθαλμοὺς καθαπλασθεῖσα ἢ σταφίδι πᾶσαν φλεγμονὴν σὺν ἀλφίτῳ. καθ' ἑαυτὴν δὲ, ποδαγρικοῖς ἁρμόζει, ἄχρι φοινίξεως τῆς ὀφθαλμίας. σὺν κηρωτῇ δὲ, ἰσθμοὺς σβέννυσιν· ὠφε-

Legit Sambucus παπαλοφόρου

D

E

F

G

Περὶ Πουλεγίου. Κεφ. λς'.

ΠΟΥΛΕΓΙΟΝ, βοτάνη κοινὴ τιμῆς. λεπτύνει, θερμαίνει, συνεκκρίνει. ἀφεψήματα πεπτικά. ἔμμηνα καὶ ὕστερα καὶ ἔμβρυα ἄγει. πνεύμονος δὲ πάθη χολώδη μετὰ μέλιτος καὶ ἁλὸς πινόμενον ἐκκαθαίρει. ἐμέσεις δὲ καὶ δυσεντερικοὺς τομάχου μετὰ ὄξους πινόμενον ἰᾶται. ἐπὶ δὲ τῶν ἐκ θαλάσσης ἀνακινήσεως ἀνιέντων καὶ ναυσιώντων καὶ καρδιακῶν καύσων ἐπιτήδειον. ἐπὶ δὲ τῶν ἐκ τοῦ ἁλὸς ἀνιέντων καὶ ναυσιώντων καὶ καρδιακῶν καύσων ἐπιτήδειον. ἐπὶ δὲ τῶν ἐκ τοῦ ἁλὸς ἀνιέντων καὶ ναυσιώντων καὶ καρδιακῶν καύσων ἐπιτήδειον.

De Pulegio. Cap. XXXVI.

PVLEGIVM, herba vulgaris notitiæ. Extenuat, calfacit, concoctiones adiuuat. Bibitum, méſtrua, ſecundas & partus eijcit. Pulmonum verò vitia excreabilia facit, cum ſale & melle potum: ac conuulſis etiam auxiliatur. Nauſeas & ſtomachi roſiones ex poſca bibitum permulcet: atros etiamnũ humores per aluum exigit. Venenatorũ quoque morſibus in vino potum ſuccurrit. Defectos animo recreat, cum aceto naribus admotũ. Gingiuas etiam arefacti cinere corroborat. Illitum verò cum polenta, inflammationem omnem lenit, & podagricis per ſe prodeſt impoſitum dum rubeſcat locus. Cum cerato autem, varos extinguit: ac lie-

λῆ δὲ καὶ καταπλασσομένη μετ' ἄλες καὶ καταπλασσομένη. ὁ δ' ἀφέψημα αὐτῆ χρησμοὶ λυόμενον πιεῖν, καὶ εἰς ἕδρα θερμα, καὶ πρὸς ἐμπνευματώσεις καὶ σκληρίας τοῦ ὑποχονδρίου ὑστέρας ἁρμόζει. καλοῦσι δέ τινες αὐτὴν ἕλκηχρυσα, ἐπειδὴ τὰ γυναικεῖα καὶ τὸ ἄνθος τῶν ποιμένων βλητικῶς ἐκτοπίμπλησι.

Aldi χαραφαλ. V. χροφαλ

Quæ in Cataeuticis capite hoc adducuntur, iuxta Matthiolum extitũ, exegesi sunt nam vtrea sunt eadem. Cat. Dictamni

A nosis etiam confert, cum sale adhibitum. Cæterùm decoctum ipsius prurigines lotione mitigat, & vuluę inflationibus ac duritiei, eiusdémque conuersionibus insessione subuenit. Aliqui porrò blechona vocãt: quoniam, dum floret, à pecoribus gustatum, balatum concitat.

Περὶ Δικτάμνου. Κεφ. λζ'.

De Dictamno. Cap. XXXVII.

B

Δίκταμνος, ἣν καλοῦσί τινες ἕλκηχρυσα ἀγρίαν, πόα ἐστὶ Κρητικὴ, δριμεῖα, λεπτὰ, ὁμοία γλήχωνι· μείζω δὲ καὶ λαφαλεώδη τὰ φύλλα ἔχει, καὶ ἐριώδη ὥσπερ ὑπόκειται. ὅτι μὲν οὖν οὔτε καρπὸν φέρει ποιοῦσι πάντα ὅσα ἐκ τῆς ῥίζης γλήχωνος, ἐπεργέτειρον δὲ πολλῷ· οὐ μόνον γὰρ πρωτοβόλια, ἀλλὰ καὶ προσθηλαζόμενα καὶ ὑποθυμιώμενα, τὰ τεθνηκότα ἔμβρυα ἐκβάλλειν φασὶ δὲ καὶ τὰς αἶγας ὑπὸ Κρητῶν τοξευθείσας καὶ περιθείσας τὴν πόαν, ἐκβάλλειν τὰ τοξεύματα. ἔχει δὲ καὶ καθαρτικὴν δύναμιν ὁ χυλὸς αὐτῆς, καὶ καταχριόμενος ἢ ῥιζόμενος μετ' ὄξους. καὶ καταπλασσομένη δὲ ἡ βοτάνη, ταῖς ὑπὸ τὴν πόδων ἢ τῶν λοιπῶν σώματος ἀραπτόμενα σκόλοπας. ποιεῖ δὲ καὶ πρὸς πόνον σπλῆνος, μιγεῖσα αὐτῷ. καρπίζουσι δὲ αὐτὴν ὑπὸ θέρος καὶ φθινοπώρου. ἡ δὲ ῥίζα αὐτῆς ἑψομένη θερμαίνει. ἔστι δὲ καὶ ὀξυτόκιον βοηθεῖ δὲ καὶ θηριοδήκτοις ὁ χυλὸς αὐτῆς μετ' οἴνου πινόμενος. τοιαύτη δὲ τὴν βοτάνην ἡ δύναμις, ὡς καὶ ὀσφραινομένη διακεῖσθαι, καὶ προσαπτομένη αἱμορῤῥοῦν τὰ ἰοβόλα θηρία. ὃ δὲ αὐτῆς χύλισμα ἐπιχεόμενον πληγῇ σιδήρου ἢ ἰοβόλου δήγματι, ἐκ τοῦ ἐπιχωρῆσαι καὶ λαμβανόμενον ποσὶ, ὠφελίως ὑγιάζει.

C

D

Aldi γαλαφίν

Περὶ Ψευδοδικτάμνου. Κεφ. λη'.

De Pseudodictamno. Cap. XXXVIII.

E

F

Τὸ δὲ ψευδοδίκταμνον καλούμενον, φύεται ἐν πολλοῖς τόποις, ἐμφερὲς μὲν τῷ ἀληθινῷ αὐτῷ, ἔλαττον δὲ δριμύ. ποιεῖ δὲ τὰ αὐτὰ τῷ δικτάμνῳ, οὐχ ὁμοίως ἐνεργοῦν.

Quod pseudodictamnũ vocant, multis in terris nascitur, antedicto simile, at minùs quàm illud acre. Eosdem verò præbet effectus, at inefficaciùs.

Περὶ τοῦ ἑτέρου ἀπὸ Κρήτης Δικτάμνου. Κεφ. λθ'.

De altero Dictamno Cretico. Cap. XXXIX.

V. οἱ δὲ ἀπὸ Κρήτης

Quidam ἐμπίπτουσι Cat.

C

Φέρεται δὲ καὶ ἀπὸ Κρήτης ἕτερον εἶδος δικτάμνου, φύλλοις ἐοικὸς σισυμβρείου, χλωρὸν δὲ μᾶζον· ἀφ' ὧν ἄνθος ὀρεινῷ ἀγρίῳ ἐοικὸς, μέλαν, μαλακὸν.

Defertur & è Creta alterum dictamni genus, folio sisymbrij: at ramis maioribus, in quib' flos emicat syluestris origani, niger ac mollis.

Odor foliorum inter ſiſymbrium & ſaluiam medius, iucundiſſimus. Ad eadem ad quæ & antedictum efficax, ſed minus nares ferit. Miſcetur & emplaſtris ac theriacis compoſitionibus.

De Saluia. Cap. XL.

SALVIA, quam Græci elelisphacon, alij elaphoboſcon, alij denique ſphagnon nominant, frutex eſt oblongus, ramis numeroſis, virgas habens quadrangulas & albicantes: folia mali cotoneæ effigie, ſed longiora, aſperiora craſſioráque, & attritarum veſtium modo, ita parum villoſa, vix vt quiſquam villos animaduertat, ſubalbida, vehemẽter odorata, ſed viroſa: ſemen ſummis in caulibus ſylueſtri hormino ſimile gerit: in aſperis naſcitur. Foliorum ramorúmque decoctũ vim habet epotum vrinas menſéſque ciendi, partus extrahendi, & paſtinacæ marinæ ictibus auxiliandi. Capillos quoque denigrat ſaliua, vulneratiáque eſt, & ſanguinis cohibendi vi prædita: ac denique fera repurgat vlcera. Sed & folia ac ipſi etiam rami, ſi in vino decoquantur, genitalium pruritus fotu ſedant.

De Menta ſatiua. Cap. XLI.

MENTA ab odoris ſuauitate hedyoſmos Græcis dicta, quã alij mintham vocant, cognita herbula eſt. Calfaciendi, aſtringendi atque exiccandi vi prædita: quamobrem ſiſtit ſanguinem ipſius ſuccus ex aceto potus, teretéſque lumbricos enecat, & venerem ſtimulat: ſingultus, vomitiones cholerámque ſedant bini terníve ramuli cum acidi granati ſucco epoti. Diſcutit & abſceſſus, ſi cum polenta adhibeatur, & impoſita fronti dolores capitis leuat: mammas diſtentas & nimio lacte turgentes compeſcit. Cum ſale verò, canum morſibus imponitur. Succus autem aurium doloribus cum aqua mulſa ſubuenit. Porrò mulieribus ante coitum ſubdita, conceptioni reſiſtit, & aſperam linguam affricta læuigat. Coire lac denſarique in caſeum non patitur, ſi illi folia immergantur. In ſumma ſtomacho vtilis eſt, & condimentorum miſturæ familiaris.

Grato mentæ munſæ odore pernarris in ruſticis dapibus. Pl. lib. 19. cap. 8.

Περὶ Ελελισφάκου. Κεφ. μ'.

ΕΛΕΛΙΣΦΑΚΟΝ, οἱ δὲ ἐλαφόβοσκον, οἱ δὲ σφαγνόν, θαμνός ἐστιν ὀπιμώδης, πολύκλωνος, ῥάβδους τετραγώνους καὶ ὑπολεύκους ἔχων. Φύλλα δὲ μηλέᾳ κυδωνίᾳ ἐοικότα, ὀπιμωτέρᾳ μέν τε καὶ τραχύτερα, καὶ παχύτερα, λεπτοτάτοις ὥσπερ τοῖς ἀνατριπτα τῶν ἱματίων δασέα, ὑπόλευκα, σφοδρῶς εὐώδη, βραμώδη· καρπὸν δὲ ἐπ' ἄκρων τῶν καυλῶν ὥσπερ ὁρμίνῳ ἀγρίᾳ ἔχει. Φύεται δὲ ἐν τραχέσι χωρίοις. Δύναμιν δὲ ἔχει τὸ ἀφέψημα τῶν φύλλων καὶ τῶν κλάδων ὕδρᾳ ἀγῇ πινόμενον, ἢ ἔμμηνα, καὶ ἔμβρυα κατασσᾶν, καὶ τοὺς τοκετοὺς πλησιάζειν. μελαίνῃ δὲ καὶ τείχας. καὶ βδελυκτικὴ ἔχει μος, καὶ ἀποκαθαρτικὴ τῶν θηριωδῶν ἐστιν ἑλκῶν. παιᷓ δὲ σὺν οἴνῳ τὸ ἀφέψημα τῶν φύλλων καὶ τῶν κλάδων αὐτῶν προσκλυζόμενον, ἕως ἂν τὰ αἰδοῖα κατασμοί.

Περὶ Ηδυόσμου. Κεφ. μα'.

ΗΔΥΟΣΜΟΣ, οἱ δ', μάσιν, γνώριμον ἁπάντων. Δύναμιν ἔχον θερμαντικὴν, συστατικὴν, ξηραντικὴν· ὅθεν αἷμα ἵστησι πινόμενος ὁ χυλὸς αὐτοῦ μετ' ὄξους· καὶ ἕλμινθας κτείνει προσλυσθείς, ἀφροδισιαστὴν ἐργάζεται, καὶ λυσιμοῦς, καὶ ἐμέτους, καὶ χολέρας παύει δύο ἢ τρία κλωνάρια σὺν ῥοιᾶς ὀξείας χυλῷ πωθέντα. διαφορᾷ δὲ καὶ ἀποστήματα μετὰ σύκου καταπλασθέν. καὶ κεφαλαγίας πᾶσης ὀπτηθὲν ἐπιτιθέμενον μειοῖ πόνους τε κατέπασιν καὶ ἀπαρυσιν φλεγμονῆς· σὺν ἁλσὶ δὲ τοῖς κυνοδήκτοις καταπλασσόμενον ὠταλγίαις ὁ χυλὸς σὺν μελικράτῳ ἀρήγει· γυναιξὶ δὲ πρὸ τῆς πλησιάζειν προστιθέμενον, ἀσυλληψίαν ἐργάζεται· λειοῖ δὲ καὶ τραχύτητα στρατηγούμενον λειαίνει· καὶ γάλα ἀτύρωτον φυλάσσει ἐναποκλυσθέντων αὐτῷ τῶν φύλλων. καὶ καθόλου ὄντων βύσμα χρηστὸν καὶ ἀρτυμάτων ἁρμοστικόν.

Al. θαμνίσκος ἢ ἐν σκιερωτέροις καὶ τραχέσι λασιώδης

V. τῶν ἱματίων ὑπολευκαίνει ἀδόν.

Cæter. ἐμφερὲς τῇ μίνθῃ κτλ.

V. his caret.

V. caret.

Quidam addũt, τάσσει ἢ σπλῆνας.

V. quid addit, χόλῃ

V. τῷ μετώπῳ

V. ὠλγίαι

V. σωφρονεῖν δὲ πῖς

Meth. codex κλυσαγίου.

V. addit, ἔνδον

Hoc caput cōiunctum est cum superiore in V. eod. Goup. V. caret conclusio.

Περὶ Ἡδυόσμου ἀγρίου. Κεφ. μϚ'.

Τὸ δ' ἄγριον Ἡδύοσμον γένος δασύτερον τοῖς φύλλοις, καὶ πάντη μεῖζον ἰσχυρίῳ, εὐῶδες δὲ ὀσμῇ δὲ δριμωδέστερον, καὶ ἧττον εἰς τὴν εὐχρηστίαν χρῆσιν βάλλεται.

Περὶ Καλαμίνθης. Κεφ. μγ'.

V. διαφορίας

ΚΑΛΑΜΙΝΘΗ, ἡ μὲν τις ὀρεινοτέρα ἐστὶν, ἔχει δὲ φύλλα ὅμοια ὠκίμῳ, ὑπόλευκα, κλωνία δὲ καὶ κάρφη γεγανωμένα, ἄνθος πορφυροῦν. Ἡ δέ τις γλήχωνι ἔοικε, μείζων δὲ ὅλην ὠκίμου ἀγρίαν αὐτὴ γλήχωνα ἱκανῶς, διὸ καὶ τὴν ὀσμὴν πρόσοικε. Τὴν τοιαύτην Ῥωμαῖοι νεπέταν καλοῦσιν. Ἡ δὲ τρίτη ἔοικεν ἡδυόσμῳ ἀγρίῳ, ὀπτιμοχαίρα τοῖς φύλλοις, καυλῷ καὶ κλάδῳ μείζων τῇ προφημένῃ, καὶ πίων ὀσμῆς. Πασῶν δὲ τὰ φύλλα χυμοῦται πυρώδη καὶ ἰσχυρὰ καὶ δριμέα, ῥίζα ἄχρηστος. Φύεται δὲ ἐν πεδίοις καὶ ἐν βαχέσι τόποις καὶ κηπάζουσι. πινομένη δὲ καὶ καταπλασσομένη, ἀρμόζει ἐρπετοδήκτοις. ἄγει δὲ καὶ ὕδρας καὶ ἀφεψημα πινόμενον βοηθεῖ δὲ καὶ ῥήγμασι, σπάσμασι, ὀρθοπνοίαις, τρόφοις, χολέρᾳ καὶ ῥίγει· καὶ πρὸς τὰ θανάσιμα προπινομένη πως σὺν οἴνῳ, καὶ ἕκτερον ἀπὸ καθαρᾶς· ἑλμινθάς τε κλυσθεῖσα καὶ ἀσκαρίδας σὺν ἁλὶ καὶ μέλιτι πινομένη, ἐφθή τε καὶ ὠμὴ τριβομένη. ὠφελεῖ καὶ ἐλεφαντιῶντας βρωθεῖσα, ὅταν πινομένῳ ὀρροῦ γάλακτος. φθείρει δὲ ἔμβρυα, καὶ ἔμμηνα ἄγει· τὰ φύλλα λεῖα ἐν προσθέτῳ. θυμιαθέντα δέ, ἑρπετὰ διώκει, καὶ ὑποστρωννύμενα λευκαίνει τε καὶ τοὺς μώλωπας ἅλας ἐφθεῖσα σὺν οἴνῳ καὶ καταπλασθεῖσα, καθαίρει καὶ ὑπώπια. ἰχθυδικοῖς τε ἐπιλείβεται εἰς μελισσόγρισιν, ὀπτικαίουσα τὴν ὀπτασίαν. καὶ σκώληκας ὠσὶ σὺν οἴνῳ κτείνει ὁ χυλὸς σὺν ἁλσὶ ζόμενος.

Περὶ Θύμου. Κεφ. μδ'.

ΘΥΜΟΝ γινώσκει ὑπὸ πάντων, θαμνίσκιον φρυγανοειδὲς, φυλλαρίοις πολλοῖς καὶ τριχοειδέσι περιλαμβανόμενον· ἔχον ἐπ' ἄκρῳ κεφάλια αὐτοῦ πορφυρίζοντα. μάλιστα δὲ φύεται ἐν πετρώδεσι καὶ λεπτογείοις τόποις.

Δύναμιν δὲ ἔχει πινόμενον μετὰ ἁλῶν καὶ ὄξους, ἄγειν φλεγματώδεις καὶ παχεῖς

Doeſt in Paris.

De Mentha ſylueſtri. Cap. XLII.

SYlueſtris Mentha, ſeu mentaſtrum, hirſutioribus eſt foliis, & prorſus maior ſiſymbrio: at odore magis viroſo: quare minùs ad ſanorum vſus idonea eſt.

De Calamintha. Cap. XLIII.

EX Calaminthæ generibus quædam montibus familiaris, folia habet bcimi, incana, ſurculos & caules anguloſos, ac florem purpureum. Altera pulegio ſimilis eſt, ſed maior, quam ſylueſtre pulegium ideò vocarùt, quòd & odore ipſum æmuletur: hanc Latini nepetam vocitant. Tertia menthaſtro cognata eſt, foliis oblongioribus, caule & ramis quàm ſuperiora genera maioribus: ſed viribus inefficacior. Omnium folia guſtu impenſè feruientia & acria: radix ſuperuacua. Naſcitur in campeſtribus locis, aſperis ac præhumidis. Siue pota, ſiue impoſita, demorſis à ſerpente opitulatur. Sed & decoctum potu vrinas pellit: ruptis quoque, conuulſis, orthopnœæ, torminibus, choleræ ac rigori auxiliatur. Præſumpta in vino, venenis reſiſtit, & regium morbum expurgat. Teretes lumbricos & aſcaridas cum ſale & melle pota, enecat: ſeu cocta, ſeu etiam cruda contrita fuerit. Elephanticos etiam eſirata iuuat, ſi ſerum lactis ſuperbiberint. Detrita folia in peſſo ſubdita partus enecant & menſes extrahunt. Eadem accenſa & ſubſtrata, ſerpentes fugant. Porrò cicatricibus nigris etiam candorem reddit in vino cocta & impoſita, ac ſugillata quoque emendat. Iſchiadicis itidem imponitur, vt humores ex alto euocet, ſummam cutem adurés. Succus denique vermes aurium necat inſtillatus.

De Thymo. Cap. XLIIII.

THYMVM ab omnibus cognoſcitur, exiguus frutex, ſurculoſus, exilibus foliis, multis & anguſtis circundatus, habens in cacumine floris capitula purpuraſcentia. Maximè verò petroſo tenuique ſolo naſcitur. Potum cum ſale & aceto, vim habet pituitã per aluum de-

trahendi. At eius decoctum cum melle orthopnoicis & anhelatoribus auxiliatur. Sed & lumbricos, menſes, partus & ſecundas pellit. Vrinas quoque ciet. Cum melle verò in eclegmate ſumptú, excreabilia pectoris vitia facit. Ex aceto autem impoſitum, œdemata recentia diſcutit, ſanguinis grumos diſſoluit, ac thymos penſiléſque verrucas tollit. Quin & iſchiadicis cum vino & poléta impoſitum ſubuenit: hebetiore oculorum acie præditis in cibo confert. Eſt denique pro condimento ad ſanorum vſus perquàm vtile.

De Thymbra. Cap. XLV.

THYMBRA quoque nota eſt: quippe quæ gignitur in tenui ſolo, aſperiſque locis, thymo ſimilis, at minor tamen ac tenetior, ſpicam ferens florum plenam, virentem. Eadem poteſt quæ thymum, ſi modo ſimili aſſumatur, atque itidem ſanorum vſui apta eſt. Eſt & ſatiua quædam ſatureia, ſylueſtri ad omnia inefficacior: quæ tamen propter mitiorem acrimoniam commodiùs in cibos recipitur.

De Serpyllo. Cap. XLVI.

SERPYLLVM eſt quoddá hortenſe, quod quidem odore ſampſuchum imitatur, & in coronas addi ſolet: ita dictum à ſerpendo, quòd radicetur quacunq; ſui parte terrá attingat. Habet autẽ folia & ramulos origani, verùm coloris cándidioris, & è macerijs demiſſum longiùs latiúſque propagatur. Alterum ſylueſtre, quod etiam zygis appellatur, minimè ſerpit: at in altum aſſurgens rámulos edit tenues ac ſurculoſos, folijs rutæ ſimilibus refertos, verùm vtcunque anguſtis, longioribus atque durioribus. Flores guſtanti acres, iucundi odoris: radix nullius vſus. Naſcitur in petris efficacius, magiſque excalfaciens, & ad medendi vſum aptius, quàm ſit hortéſe. Potum ſiquidem méſes trahit, vrinámq; ciet. Torminib⁹, ruptis, cóuulſis & iocineris inflámationibus auxiliatur. Eſt & efficax aduerſus ſerpétes; tum potum, tum & impoſitum. Decoctú in aceto, capitis dolorem adiecto roſaceo lenit, ſi modò in caput irrigetur.

A λίδω. ὃ δὲ ἀφέψημα αὐτῆς μετὰ μέλιτος ὀρθοπνοϊκοῖς καὶ ἀσθμαλικοῖς βοηθεῖ· ἕλμινθάς τε ἐξάγει, καὶ ἔμμηνα, καὶ ἔμβρυα, καὶ δδύτερα· ἔστι δὲ καὶ οὐρητικόν· μιγὲν δὲ μέλιτι καὶ ἐκλειχθὲν, διαφόρησιν τοῦ στήθους ποιεῖ· διαφορεῖ δὲ οἰδήματα πρόσφατα, καὶ παλαιὰ δὲν μεῖον ὄξους· αἵματος θρόμβους ἀγελύει, καὶ θύμους καὶ ἀκροχορδόνας αἴρει· καὶ ἰσχιαδικοῖς μετ' οἴνου καὶ ὀφθαλμῶν ἀμβλυωπίαν ἐσθιόμενον σὺν ὄξει ὠφελεῖ. βύσσινον δὲ καὶ πρὸς τὰ ἐν ὑγιείᾳ χρῆσιν ἁρτύματος.

V. In marg. ἀφελεῖ καὶ πάνυ χρησίμως· λούσαντος μετ' ὀξυμέλιτος, ἢ ὀξυκράτου σὺν ὕσπῳ.

Περὶ Θύμβρας. Κεφ. μέ.

B ΘΥΜΒΡΑ, καὶ αὐτὴ γνώριμος· θυμωδεστέρα δὲ ἐν λεπτογείοις, καὶ τραχέσι τόποις, ὁμοία θύμῳ, ἐλάττων μέν τοι καὶ ἁπαλωτέρα, φέρουσα τάχυ αὐθις μισὸν, ἔλχλωρον. δυνάμει δὲ τὰ αὐτὰ τῷ θύμῳ, ὁμοίως λαμβανομένη. καὶ πρὸς τὰ ἐν ὑγιείᾳ χρῆσιν βέλτιον. γένει δὲ καὶ σατυρεῖ θύμβρα, καὶ πόαι τῆς ἀγελαίας ἐλάττους, εὐχρηστότερα δὲ πρὸς βρῶσιν, διὸ καὶ θρυπτικώτερα τοῦ ἁρμοδίτος.

V. Epi. ex Cratena alicunde πλὴν μή τι τῇ μικρᾷ μὲν χρῷ. φθορικὸν γὰρ ἡ χρεία χρονικωτέρα, ἀλλὰ τῇ ἕξει ἰσχυροτέρου μὴ οὐσῃ, λυσιτελεῖ δὲ πλέον.

Περὶ Ἑρπύλλου. Κεφ. μς'.

E ΕΡΠΥΛΛΟΣ ὁ μέν τις ἐστὶ κηπευτὸς, σαμψυχίζων τῇ ὀσμῇ, καὶ στεφανωματικὸς ὠνόμασται ἀπὸ τοῦ ἕρπειν τε καὶ ὅ, τι ἂν αὐτοῦ μέρος ἅψηται τῆς γῆς ῥιζοβολῶν. ἔχει δὲ φύλλα καὶ κλωνία ὀρειγάνῳ ἐμφερῆ, πλὴν λευκότερα. ἀπὸ δὲ αἱμασιῶν καθιέμενος, εἰς αὐξέστερος γίνεται. Ὁ δέ τις ἐστὶν ἄγελος, ὃς καὶ ζυγὶς καλεῖται, οὐκ ἕρπει, ἀλλ' ὀρθὸς κλωνία αἰεὶς λεπτὰ, φρυγανώδη, φύλλων στενόπλευρα ὁμοίων πηγάνῳ. ὑπόξυνα δέ ἐστι καὶ θριμυκέστερα, καὶ σκληρότερα· αὐξηθὲν γενόμενον δριμὺ, ὀσμὴν ἡδεῖαν ῥίζαν ἄχρηστον. φύεται δὲ πετραῖος εὐεργέστερος καὶ θερμαντικώτερος τοῦ κηπευτοῦ ὑπάρχων, καὶ πρὸς τὴν ἰατρικὴν χρῆσιν θρυπτότερος. ἔμμηνα γὰρ ἄγει, καὶ ὕδρα κινεῖ πυρέμβους· ὠφελεῖ στρόφους, ῥήγματα, σπασμοὺς, ἅπτας φλεγμονὰς· καὶ πρὸς ἕρπητα πυρέμβους τε καὶ καλοπλάσματα· κεφαλῆς τε ὀδύνας παραμυθεῖται ἐμπλαττόμενος, ῥοδίνῳ μυρίνῳ αὐτῷ

V. εἶναι δρεπανοειδῆ ἐμοὶ δοκεῖ.

V. εἶναι στενόπλευρα ἐλλιπῶς cod. στενόπλευρον, ἐμοὶ δοκεῖν. Sunt qui legant παραπλησίως Alcibio.

V. ἢ ἔμμηνα ἄγει ἐπιφέρει.

V. κατὰ.

σὺν ὄξει καὶ καταβραχείς. μάλιστα δὲ ὅτι λιθιάζουσι καὶ φρενίτιδας ἀμαύζει. παύει δὲ καὶ ἔμετον αἵματος ἀπὸ δ'. πλῆθος μέχρι ὀξυβάφου πολλοῖς ὁ χυλὸς ἀποσ.

In vet. cod. teste Goupylo inuenitur hoc loco caput de Lysimachia: ipsa his verba.

Περὶ Σαμψύχου. Κεφ. μζ.

ΣΑΜΨΥΧΟΝ κράτιστον τὸ Κυζικηνὸν καὶ Κύπριον· δευτερεύει δὲ τούτου ὃ Αἰγύπτιον. καλεῖται ὑπὸ Κυζικηνῶν καὶ τῶν ἐν Σικελίᾳ ἀμάρακον. πόα δέ ἐστι πολύκλωνος, ἕρπουσα ἐπὶ τῆς γῆς· φύλλα δασέα καὶ εὐῶδη ἔχουσα, ὅμοια τῆς λεπτοφύλλου καλαμίνθης, σφόδρα εὐώδης, καὶ θερμαντικὴ, πλεκομένη καὶ εἰς στεφάνους. Αρμόζει δὲ τὸ ἀφέψημα αὐτῆς πινόμενον ὅτι ἀρχομένων ὑδρωπικῶν, καὶ δυσουρούντων καὶ τροφομένων ξηρᾷ δὲ τὰ φύλλα ἐπιπλασθέντα μετὰ μέλιτος, αἴρει ὑπώπια· καὶ ἐμμένοντα ἄγει τὸ προσπῖπτον. πρὸς δὲ σκορπίου πληγὴν μετὰ ἁλῶν καὶ ὄξους καταπλάσσει· πρὸς δὲ τρέμματα μέλι καὶ κηρωτῆς αἰγαληφῶς ὅτι πλεῖστα· καὶ πρὸς οἰδήματα ὁμοίως αἰγαληφῶς καὶ κηρωτῆς· καὶ πρὸς ὀφθαλμῶν φλεγμονὰς καὶ καταπλάσεις μετὰ παιπάλης ἀφίστησι. μίσυι δὲ ἀκόπους καὶ μαλάγμασι πρὸς τὸ θερμαίνειν.

Quidam, κεστικὸν

Περὶ Μελιλώτου. Κεφ. μή.

ΜΕΛΙΛΩΤΟΣ, κράτιστος ὁ Αττικὸς καὶ ὁ ἐν Κυζίκῳ, καὶ ὁ ἐν Χαλκηδόνι θερμότερος· προκεῖται καὶ εὐώδης. φύεται δὲ καὶ ἐν Καμπανίᾳ περὶ Νώλαν, μελίζων. ἔστι δὲ τόνος καὶ τῆς εὐωδίας. Δύναμιν δὲ ἔχει συμπλοκὴν, μετὰ λαμπρᾶς πάσης φλεγμονῆς, μάλιστα δὲ τῶν περὶ ὀφθαλμούς καὶ μήτρην, καὶ διαπύλιον, καὶ διόδους, μετὰ γλυκέος ἐψηθεὶς καὶ καταπλασθείς· ἐνίοτε δὲ καὶ ὠὸν λεκίθου ὀπτῆς ἐπιχρίσεις, ἢ τηλίνῳ ἀλεύρῳ, ἢ λιποσπέρμου, ἢ χύρεως ἢ κεδρίων, ἢ σίρεως. θεραπεύει καὶ μηλικηρίδας προσφάτους καθ' ἑαυτὸν ἐν ὕδατι, καὶ ἀχώρας σὺν γῇ Χίᾳ καὶ οἴνῳ ἢ κηκίδι καὶ χαλκανθίνῳ· ἄγημά τε τομάχου μετ' οἴνου ἐφθὸς καὶ ὠμὸς σὺν πηγανίνοις θερμοῖς· καὶ ὠταλγίας παύει σὺν γλυκεῖ ὠμὸς χυλισθεὶς καὶ ὀσφαζόμενος καὶ κεφαλαγίας ἐπιφορήσας μετ' ὄξους καὶ ῥοδίνου.

Vt. margo: ὀμφῇ addit.

maximè verò in lethargo ac phrenitide conuenit. Cæterum cruentam vomitionem sedat succus drachmis quatuor ex aceto potus.

De Sampsucho. Cap. XLVII.

SAMPSVCHVM in Cyzico ac Cypro laudatissimum: secundum ab hoc locum sibi vendicat Ægyptium. Vocatur autem a Cyzicenis & Siculis amaracum. Herba est ramosa, per terram repens, foliis hirsutis ac rotundis, tenuioris folij calaminthæ æmulis, vehementer odorata & excalfaciens: nexilibúsque coronis inseritur. Decoctum ipsius potu incipientibus hydropicis vtile, vt & ijs quos vrinæ difficultas aut tormina excruciát. Illita ex melle arida folia sugillata tollunt: mensésque subdita in pesso trahunt. Contra scorpionis ictum ex aceto & sale illinuntur. Luxatis autem cerato excepta imponuntur, itémque œdematis cerato similiter excepta. Sed & ad oculorum inflammationes cum polline polentæ illinuntur. Cæterum acopis & malagmatis excalfaciendi gratia commiscentur.

De Meliloto, seu sertula Campana. Cap. XLVIII.

SERTVLA Campana laudatissima, quæ in Attica, Cyzico & Chalcedone nascitur: quæ quidem croco similis odoratáque est. Nascitur & in Cápania circa Nolam, in luteum colorem vergens, & odore infirmo. Vim habet astringendi, inflammationémque omnẽ emolliendi, præsertim oculorum, vuluæ sedis ac testium, si ex passo decocta imponatur: addito interdum oui luteo assato, aut fœnigræci farina, lini semine aut tritici polline, aut denique capitulis papaueris, intybóve. Sanat & recentes melicerídas per se cum aqua, & vlcera manantia in capite cũ terra Chia & vino aut galla inuncta. Stomachi dolorem in vino decocta, itémque cruda cum aliquo ex antedictis leuat. Dolores etiam aurium cum passo mitigat succus ex ipsa cruda expressus & instillatus. Denique capitis doloré ex aceto & rosaceo irrigatus lenit.

De Maro.

De Maro. Cap. XLIX.

MARVM seu hysobrium, herba vulgo cognita, surculosa, flore origani, attamen foliis multo candidioribus ac flore odoratiore. Vim habet sisymbrio consimilem: siquidem subastringit & modicè calfacit. Quâ de causa nomas sistit impositum, & in calidas perunctiones additur. Iuxta Magnesiam & Tralleis copiosissimum gignitur.

De Acino. Cap. L.

ACINVS seu aconus, herba est gracili surculo, coronaria, ocimo similis, sed hirsutior atque odorata. Apud nonnullos etiam in hortis seritur. Aluum mensésque pota sistit: ac panos & erysipelata imposita sanat.

De Bacchare. Cap. LI.

BACCHARIS herba est fruticosa, odorata: ex qua itidem coronæ factitantur. Huius folia aspera, magnitudine inter violam & verbascum media: caulis angulosus, cubiti perens altitudinem, aliquantulum asper, nec sine adnatis appendicibus: flores purpurei, subalbicantes & odorati: radices veratro nigro similes, quibus odor est cinnamomo proximus. Solum amat asperum minimèque humidum. Radix in aqua decocta conuulsis, ruptis, euersis seu ex alto præcipitatis, spirandi difficultati, tussi veteri ac vrinæ difficili auxiliatur. Menses quoque pellit, & contra serpentium morsus vtiliter ex vino propinatur. Subdita vnica è tenellis radicibus partus extrahit. Decoctum verò puerperis insidentibus vtile. Vtiliter quoque in diapasmata inseritur, quippe quæ magnam habeat odoris gratiâ. Folia, vtpote quæ astringant, capitis doloribus adhibita prosunt, itémque aurium inflammationi, ægilopis incipientibus, & mammis a partu inflammatis atque etiam erysipelatis. Cæterùm & ipse odor somnum gignit.

De Ruta. Cap. LII.

RVTA montana & syluestris, satiua & hortensi acrior est, & in cibis damnata. Est autem in hortensis genere aptior esui, quæ iuxta ficos prouenit. Vtrunque porrò genus vrendi vim habet, calfacit, exulcerat, vrinam ciet, menses ducit,

A Περὶ Μάρου. Κεφ. μθ'.

MΑΡΟΝ, ἢ ὑσσώπειον, πία γνώριμος, φρυγανώδης, ὁμοία τῷ αὐτῇ ὀσμῇ. τὰ μὲν τὰ φύλλα ζύνου λευκότερα πολλῷ, καὶ δασύτερα. ἔχει δὲ δύναμιν ὁμοίαν σισυμβρίῳ, καὶ τοῦτο φοινικοῦν θερμαῖνον ἡρέμα. ὀθόνας τε ἴσχει καταπλασσόμενον, καὶ εἰς τὰ θερμὰ τῶν συλλογισμάτων μίγνυται. φύεται δὲ καὶ κατὰ Μαγνησίαν καὶ Τραλλεῖς πλεῖστον.

Περὶ Ἀκίνου. Κεφ. ν'.

AΚΙΝΟΣ, ἢ ἄκονος, ἡ πία ἐστὶ λεπτόκαρφος, εὐφανωματική, τῷ σπληνὶ σία ὠφέλιμος, δασυτέρα δὲ καὶ βώδης. πρὸς οἰδήματα δὲ καταπλάσσεται. ἴσχει δὲ κοιλίαν καὶ ἔμμηνα κινοῦσαν φύγεθλά τε καὶ ἐρυσιπέλατα καταπλασσομένη ἰᾶται.

Περὶ Βακχάρεως. Κεφ. να'.

BΑΚΧΑΡΙΣ βοτάνη ἐστὶ θαμνώδης, βώδης δὲ εὐφανωματική. ἧς τὰ φύλλα δασέα, μέλανος ἔχοντα μεταξὺ τὴν φλόμου καυλὸς δὲ γωνιώδης, πήχεως ὃ ὕψος, ὑπόδασυς, ἔχων περιφυάδας. ἄνθη δὲ ἐμπόρφυρα, ὑπάλβυκα, βώδη· ῥίζαι δὲ ὅμοιαι τῆς μέλανος ἑλλεβόρου, ἐοικυῖαι τῇ ὀσμῇ κινναμώμῳ. φιλεῖ δὲ δασέα χωρία καὶ αἰγιαλούς. Ταύτης ἡ ῥίζα ἐψηθεῖσα ὡς ὕδατι, κοιλιακοῖς ἀσθμασι, ῥήγμασι, πάσμασι, δυσπνοίαις, ὀρθοπνοίαις, δυσουρίαις ἄλγεσι τῆς ἐμμήνου καὶ θηλυδρύπτοις χρησίμως συνοίνῳ δίδοται. τρωθεῖσα δὲ μία τῶν ἀπαλαὶ ῥιζῶν, ἕλκει ἔμβρυα· τήν τε λεχὼ εἰς ἑκάθισιν ὃ ἀφέψημα αὐτῆς ἁρμόζει· καὶ εἰς ὄζαι ποτήματα χρησιμεύει, ἀσθμοὺς ἔχουσι τὴν ὀσμήν. τὰ δὲ φύλλα συμπίνεται ὄντα, καταπλασσόμενα ὠφελεῖ κεφαλαγίας, ὀφθαλμῶν φλεγμονήν, καὶ αἰγίλωπα ἀρχόμενον, καὶ μαστοὺς ἐκ πόνων φλεγμαίνοντας, καὶ ἐρυσιπέλατα. ἔστι δὲ καὶ ὑπνοποιὸς ἡ ὀσμή.

Περὶ Πηγάνου. Κεφ. νβ'.

ΠΗΓΑΝΟΝ ὀρεινὸν καὶ ἄγριον, τὸ ἡμέρου καὶ κηπευτὸν δριμύτερον, καὶ ἀθλιώτερον τὸ σπέρμα. ἔστι δὲ κηπευτὸν ἐδώδιμον· ἱερὸν τὸ σπέρμα τῶν συκῶν φυόμενον. Ἀμφότερα δὲ καυστικά, θερμαντικά, ἑλκωτικά, σύρπτικά, ἐμμηνώων ἀγωγά,

In quibusdam codicibus hoc caput desiderantur ac Rei quoque Dioscoridis libro accrescit. Vide Ruellium, & Brasauolum. Matthæum Silu.

V. & vides. Sic Orib.

V. add. Ruellium & Serap.

Deest in vulg. exemp. V. quid. de Cæsalpin. Al. ἐμπίλου.

Matth. suspicatur legendum σκορδωμάδης. Cæs. addit λευκοΐ.

V. quidem addit ἀσπάρ.

V. addit παραλαγίαις

ἐαθιόμθμα τε, καὶ πινόμθμα, χιλίαις ἰ- A
χῶσι. καὶ τὴν φθαρτικὴν φαρμάκων ἔ-
στιν ἀντίδοτος, ὅσοι ὀξυβάφοντες σπέρμα-
τος πολίτου ἐν οἴνῳ. καὶ προβρωθίντα
δὲ τὰ φύλλα καθ' ἑαυτὰ, καὶ μετὰ κα-
ρύων βασιλικῶν καὶ σύκων ξηρῶν, ἄ-
προκτα κενάζησι τὰ θανάσιμα. καὶ
οἷς ἕρπητα ἀρμόζει ὁμοίως λαμβα- B
νόμθμα. χυλὸν τε σβέννυσιν ἐαθιόμθμον, καὶ
πινόμθμον· ἕψηθὲν ἢ σὺν ἀνήθῳ ξηρῷ καὶ
πολίῳ, τροφοὺς παύει. πεπὶ δὲ καὶ πρὸς
πλευρῶν πόνους καὶ θώρακος, δύσπνοιας,
βῆχας, προσπνευμονίας, ἀλγήματα ἰ-
σχίων, ἄρθρων, ῥίγη προσοδικὰ πινόμθμον
ὡς προείρηται. καὶ πρὸς ἐμπνευματώ- C
σεις δὲ κώλου καὶ ὑστέρας καὶ ἀπολυ-
σμένου σὺν ἐλαίῳ ἕψηθὲν καὶ ἐνεθὲν.
πτίσας τε ὑστερικὰς λῦσι μετὰ μέλιτος
κατὰ τῶν αἰδοίου ἄχει δακτυλίου ὑπο-
τεθὲν πράττεται. αἰάζεσθαι δὲ σὺν ἐ-
λαίῳ καὶ πολίῳ, ἕλμινθας ἐκπιάσαι·
καταπλάσσεται δὲ καὶ πρὸς ἄρθρων ἀγ-
γήματα σὺν μέλιτι· σὺν δὲ σύκῳ πρὸς
ὕδρωπας ὑποχρίουσι. καὶ πινόμθμον δὲ
βοηθεῖ τοῖς, καὶ καθεφθὲν ἐν οἴνῳ ἄ-
χρις ἡμίσους· καὶ προσμιχόμθμον. ἔστι δὲ V. cum.
καὶ ὀξυωπὲς ἐαθιόμθμον ὠμὸν καὶ τεθει-
χευτόν· καὶ τὰ ἐν ὀφθαλμοῖς προσιόν-
τα σὺν μέλιτι καταπλασθὲν προσύ-
φει. σὺν ῥοδίνῳ δὲ καὶ ὄξει κεφαλαγίαις
βοηθεῖ, καὶ αἱμορραγίας τὰς ἐκ τῶν μυκτή-
ρων λῦσι τριφθὲν ἴσπι, τὰς δὲ τῶν διδύ-
μων φλεγμονὰς σὺν δάφνης φύλλοις κα-
ταπλασθὲν ὠφελεῖ, καὶ τὰ ὀζαινθήματα
σὺν μυρσίνης κηρωτῇ. σὺν οἴνῳ δὲ καὶ
πανάδι καὶ νίτρῳ προσμιγόμθμον, λθυκὰς
ἀφαιρεῖ ἰάτρα. καὶ καταπλασθὲν δὲ μετὰ
τῶν αὐτῶν, θύμους καὶ μυρμηκίας αἴρει.
ὠφελεῖ καὶ λιχῆνας σὺν μέλιτι καὶ συ-
κῆς ὑπιθέμθμον. ὁ δὲ χυλὸς ποιεῖ πρὸς
ἀλγηδόνας ὦτων σὺν ὄξει θερμαινόμθμος καὶ
ἐγχεόμθμος· καὶ ἀμβλυωπίας βοηθεῖ
μετὰ μαστοῦ θηλυ χυλοῦ καὶ μέλιτος ἐγ-
χεόμθμος· ἐρισιπελατά τε καὶ ἕρπη-
τας καὶ ἀχῶρας σὺν ὄξει καὶ ψιμυ-
θίῳ καὶ ῥοδίνῳ καταχεόμθμος ἰᾶται
τὰς τε ἀπὸ σταφίδων καὶ χρομ-

ac tum cibo tum etiam potu aluum
sistit. Semen acetabuli mensura è
vino bibitum contra lethalia medi-
camenta est pro antidoto. Quin &
folia per se præsumpta aut cum nu-
cibus iuglandibus aridisve ficis, ve-
nena irrita & inefficacia reddunt.
Sed & simili sumpta modo contra
serpentium ictus valent: genitura
seu esitata seu bibita ruta extinguit:
decocta verò cum anetho sicco tor-
mina potu sedat. Facit & ad pecto-
ris laterúmque dolores, spirandi
difficultatem, tusses, pulmonis in-
flammationem, coxendicum ar-
ticulorúmque cruciatus, & rigores
febrium circuitu repetentes, pota
velut antè dictum est. Item ad in-
flationes coli, vuluę, rectique inte-
stini, cum oleo decocta & infu-
sa. Vuluæ etiamnum strangulatui
medetur, si trita cum melle genita-
li sede tenus imponatur. Feruefacta ex oleo & pota lumbri-
cos expellit. Sed & articularijs
doloribus, ex melle: & aquæ sub-
ter cutem fusæ morbo cum ficu-
bus adhibetur. His ijsdem in potu
auxiliatur, itémque decocta in vi-
no ad dimidias partes & affricta.
Cruda quoque conditáque in ci-
bo aciem oculorum excitat: quin
& oculorum dolores, imposita
cum polenta lenit. Caput dolenti-
bus cum rosacco & aceto succurrit, ac profluentem naribus san-
guinem sistit trita & indita. Te-
stium inflammationibus cum lau-
reis folijs imposita, & papularum
eruptionibus cum myrteo cerato
prodest. Cum vino autem pipere ac
nitro affricta, vitiligini albæ mede-
tur, & cum ijsdem illita thymos ac
myrmecias tollit. Contra impetigi-
nes cum melle & alumine vtiliter
imponitur. Succus verò in mali pu-
nici calyce calfactus, aurium dolo-
ribus efficaciter infunditur. Opitulatur & acici oculorum hebetiori, si
additis fœniculi succo ac melle o-
culi ipsi eo inungantur. Erysipelata,
herpetas & vlcera in capite manã-
tia cum aceto cerussa & rosaceo,
inunctione sanat. Ipsa verò ruta
alliorum cęparúmque grauem ha-

Margo add καὶ ἄρθρων καὶ πρὸ γενέσεων φλεγμονὰς καὶ οἰδήματα τὰ ὑπὸ τῶν. Idem tamen postea repetere videtur, vbi cum melle emplastrũ facit.

Hæc vsque ad ἀναζέσθαι in v. cod. desiderantur.

Sic Manh. codex at vulg. exempl. μυρσίνης καὶ κηρωτῇ.

Hæc vsque ad λθυκὰς desiderãtur in v. cod.

Al. ἀπὸ χυλοῦ. V. cum vsque ad ἐγχεόμθμος.

V. cum

litum emendat, si posteà commanducetur. At montana si copiosius estur, interficit. Atque si sub id tempus quo florere incipit, ad muriæ cõdituram colligatur, cutem rubefacit, ac inflat, cum pruritu ac vehemẽti inflammatione. Eá itáque vnctis antea manibus & facie colligere oportet. Tradunt & succum gallinaceis pullis insperſum, feles arcere. Adiiciunt verò, eam quæ iuxta flumen Haliacmonem in Macedonia gignitur, comedẽtes interimere. Montosus autem is locus est ac viperis abundat. At illius semen epotum contra interancorum vitia est efficax: ideóque antidotis vtiliter immiscetur. Contra incontinẽtiam vrinæ, tostum, septenis diebus potui dato, & cessabit. Cæterùm radix huius montanum moly vocitatur. Syluestris itaq; ruta satiuæ quodammodo similis est. Ac pota prodest comitialibus & ischiadicis: mẽstrua quoque mouet, ac partus enecat. Actior verò est quàm satiua & maioris efficaciæ. Attamen syluestrem cibis abdicare oportet, quippe quæ veneni noxiam obtineat.

A μόλυ δριμύτητος, παυὶ ὑπομαινόλη. τὸ δὲ ὄρθιον πολύβροθλον, κτιστή. τοῦτο δὲ τὸ αὔξησιν εἰς τὰς ἁλμυρὰς συλλεγόμενον, Φοινίκαι, καὶ φυσᾷ ⊛ χρῶτα, σὺν κνησμῷ καὶ φλεγμονῇ σφοδρᾷ. διὸ δεῖ προαλειμένους τὸ πρόσωπον καὶ τὰς χεῖρας, οὕτω συλλέγειν. φασὶ

B δὲ ⊛ χυλὸν ὑπερράλητα ὀρνιθίοις, ἀπερύκειν τοὺς ἀλούσεις. τὸ δὲ ἐν Μακεδονίᾳ φυόμενον παρὰ ⊛ Ἁλιάκμονα ποταμὸν ἀναιρεῖ φασὶ βροθλόν. ὀρυκτὸς δὲ τόπος ἐστὶν ἀρχὴ καὶ ἰχθύων πλήρης. τὸ δὲ σπέρμα αὐτοῦ πινόμενον, πρὸς τὰ ἐντὸς ποιεῖ· καὶ αἱ πδότους μίζουσαι χρησί-

C μως· καὶ φθύξας δὲ τὸ σπέρμα αὐτοῦ, δὸς πίνειν ὅτι ἡμέρας ζ. παύσει ταχέως, καὶ παύσεται. ἡ δὲ ῥίζα αὐτοῦ λέγεται μῶλυ ὀρεινόν. τὸ δὲ ὅμοιον πήγανον ὁμοιοῖ παρ' ἡμέρᾳ. πινόμενον δὲ ὠφελεῖ ὅτι λιπιθικοῖς καὶ ἰσχιαδικοῖς· κινεῖ δὲ καὶ καταμήνια, τὰ δὲ ἔμβρυα φθείρει. δριμύτερον δὲ ὄζει

D τοῦ ἡμέρου, καὶ τῇ ἐνεργείᾳ δυνατώτερον. οὗ δεῖ δὲ τοῦ ἡμέρου, καὶ τῇ ἐνεργείᾳ δυνατώτερον. οὗ δεῖ δὲ τοῦ ἡμέρου ἀφεῖναι, ὅτι βαρβάρου ἐστί.

V. caret.

V. hanc periodo caret alius ipse.

V. ἄνομον. Vulg. Ἀνάμωμον.

Orib. ἔχουσι πλείους

V. ait habet vsque ad finem

De Ruta syluestri. Cap. LIII.

Vocant etiamnum syluestrẽ rutá, quod in Cappadocia & Galatia Asiatica moly dicitur. Frutex est ab vna radice complures virgas proferens: folijs multò quàm alterius rutæ longioribus ac tenerioribus, iisque graueolentibus, flore candido, capitulis in cacumine paulò quàm satiuæ rutæ maioribus: quę quidem tribus maximè partibus constant: in quibus triquetrũ semen subdulcẽ gustúque perquàm amarum recluditur, cuius etiam est vsus. Id autumno matureſcit, túmque conuenit ad retusam oculorum aciem, si cum melle, vino, gallinaceo felle, croco ac fœniculi succo teratur. Sunt qui rutam hanc Harmala vocent, Syri Besasa, Cappadoces Moly, quoniam quandam cum Moly seruet similitudinem: siquidem radice nigra est, flore verò candido. In collibus ac læto fœcundóque solo prouenit.

Περὶ Γ ήγανου ἀγρίου. Κεφ. νγ'.

Καλοῦσι δέ τινες Γ ήγανον ἄγριον, καὶ τὸ ἐν τῇ Καππαδοκίᾳ, καὶ τὸ ἐν τῇ κατὰ τὴν Ἀσίαν Γαλατίᾳ λεγόμενον μῶ-

Orib. ἡμέρου

V. σίαν

E λυ. ἔστι δὲ θάμνος ἀπὸ μιᾶς ῥίζης πλείονας ῥάβδους ἀναφέρων ἔχων φύλλα μακρότερα πολλῷ τοῦ ἄλλου πηγάνου καὶ πυκνότερα, βαρύοσμα, ἄνθος λευκόν, ἐπ' ἄκρου τε κεφάλια ὀλίγῳ μείζονα τοῦ ἡμέρου πηγάνου, σκορδιῶν μᾶλλον μεροῦ συγκείμενα· ἐν οἷς σπέρμα τέτρα-

F νον, ὁποκίρρον, πικρὸν μᾶλλον πρὸς τὴν γεῦσιν, οὗ καὶ ἡ χρῆσις. φθινοπώρου δὲ συμπίπτει τὸ σπέρμα ἁρμόζον πρὸς ἀμβλυωπίας, μετὰ μέλιτος λαφανόμενον καὶ οἴνου καὶ χολῆς ἀλεκτορείδων, κρόκου τε ⊛ μαραθρου χυλοῦ. καλοῦσι δέ τινες αὐτὸ Ἅρμαλα, Σύροι Βησασᾶ.

Orib. ἀμφιβλ.

G Καππαδόκαι δὲ Μῶλυ, ἐπὶ καταπασσόμενον σὺν τῷ πρὸς τὸ Μῶλυ ἐμφέρειαν τῇ ῥίζῃ μέλαιναν καὶ τὸ ἄνθος λευκὸν ἐστὶν ἀρ-

χν. φύεται δὲ ἐν χωλόφοις καὶ βύμοις χωρίοις.

Περὶ Μώλεως, Κεφ. νδ'.

De Moly. Cap. LIIII.

V quidam alibi, Βαλανεῖον ἄχριον scribi solere. Nonnulli cod. carent. Al γαλακτόχροα.

Μῶλυ τὰ μὲν φύλλα ἔχει ἀγρώστεα ὅμοια. πλατύτερα δὲ καὶ γλαυκότερα ἐστὶ, λευκοίοις ὅμοια, γαλακτόχροα, μεγέθη δὲ τοῖς τὰ ἴα καυλὸν δὲ λευκὸν, πήχεων τεττάρων· ἐπ' ἄκρου δὲ ἔστιν ὡς σκορδοειδές. ῥίζα δὲ μικρὰ, βολβοειδὴς, αὐτὴ σφόδρα ἀγαθὴ πρὸς ὑστέρας αἰγείους τετριμμένη μετ' ἰρίνου ἀλφίτου καὶ περιτιθεμένη ὠφέλιμος πότῳ.

V. ἀγρώστεα ἀμφότερα. Vulg. exemp. ipsum μόλυνος ἀλφίτου.

Περὶ Παίακος. Κεφ. νε'.

De Panace. Cap. LV.

V. inferiora N.

Πάνακες Ἡρακλέιον, ἐξ οὗ ὀποπάναξ συλλέγεται· πλεῖστον γινόμενον ἐν Βοιωτίᾳ καὶ ἐν Ψωφίδι τῆς Ἀρκαδίας, ὥστε καὶ ὀθνείους κτᾶσθαι ἔξεστιν ἐκ τῆς ὀπὸς προσόδους. φύλλα δὲ ἔχει ταῦτα, χαμαιπετῆ, χλωρὰ σφόδρα πρὸς τὰ τῆς συκῆς, ἐν τῷ περιφερεῖ ἐπιμεμισμένα πενταμερῶς· καυλὸν δὲ ὥσπερ νάρθηκος ὑψηλόπατον, ἔχοντα χροιὰν λευκὴν, καὶ φύλλα περὶ αὐτὸν μικρότερα, σπάδιον δὲ ἐπ' ἄκρῳ ὡς ἄνηθον· μακρὸν αὖθις δὲ μᾶλλον, σπέρμα βοώδες καὶ πυρωδὲς, ῥίζας πλείονας ἐκ μιᾶς ἀρχῆς, λευκὰς, βαρυόσμους, παχὺν ἐχούσας φλοιὸν, ὑποπίπτοι τῇ γλυκύ. φύεται δὲ ἐν Κυρήνῃ τῆς Λιβύης καὶ ἐν Μακεδονίᾳ. ὀπίζεται δὲ ἡ ῥίζα, ὀπτεμηνοπὴν ἀρτιβλάστου θλάσαντα τὴν καυλόν. αἶπος δὲ λευκὸν ὀπὸν, ὃς ξηρανθεὶς καὶ τῷ ὀπτᾶσθαι χροιζεῖ. δίχοι δὲ ὃ ῥέον εἰς φύλλα πρωτοπηγίνες εἰς κεκοιλωμένον ἔδαφος, αἰγανοῦ δὲ ξηρανθέντα. ὀπίζουσι δὲ καὶ τὸν καυλὸν ὀπτεμνοντες εἰς πυρὸν μικτὸν, ὁμοίως δὲ χόρτῳ καὶ ἀποῤῥέον. εἰσὶ δὲ τῶν ῥιζῶν βελτίους αἱ τιτθωταὶ, καὶ λευκαὶ, καὶ ξηραὶ, ἄβρωτοί τε καὶ πυρώδεις ἐν τῇ γλυκύτητι, καὶ ἀρωματίζουσαι. καρπὸς δὲ ὅλητος ὁ ἐκ μίσου τοῦ νάρθηκος. ἐν ᾧ δὲ τῷ δεφρυάδων ἐστὶν ἀξηφάτιος· ὃ δὲ ὀπὸς διαφέρει ὁ πικρότατος τῇ γλυκύτητι, ἔνδοθεν μὲν λευκὸς ἐστὶ κύτταρος, ὁ δὲ ἔξωθεν δὲ χροιζῶν, λιπαρὸς, λιπαρὸς, βύθιος, ὅλητος, ταχέως δὲ διαλυόμενος, βαρύοσμος. ὁ δὲ μέλας φαῦλος καὶ μαλακός. δολοῦται γὰρ ἀμμωνιακῷ, ἢ κηρῷ·

Orib. παράτηγμα. V. delet. V. ἄβλαπτος. V. μαλακός.

Panaces Heracleum, ex quo opopanax colligitur, plurimum in Bœotia & Psophide Arcadiæ nascitur. Sed & quæstus gratia qui quidē ex eo liquore factitatur, in hortis studiosè colitur. Foliis est asperis in terra iacētibus, virētibus, & multū ad ficulnea accedentibus, in ambitu quinq; partitò diuisis: caule verò vti ferulæ altissimo, alba lanugine obducto, foliisque stipato minutioribus, vmbella in cacumine ceu anethi oblonga: flore autem luteo, ac semine odorato, vrendiq; vi prædito: radicibus denique ab vna origine compluribus iisque candidis, graueolentibus, crasso & sabamari gustus cortice præditis. Nascitur in Cyrene Libyæ & Macedonia. Excipitur porro liquor incisa radice, dū cauliculi recens adhuc pullulat, isq; cādidus, qui quidē exiccatus superficie tenus croceum coloré contrahit. Effluentē verò liquoré illū substratis in excauato solo foliis excipiūt, ac vbi exiccatus fuerit eximūt. Simili quoque modo caule messib⁹ incisō profluentē liquorē excipiūt. Meliores è radicibus quæ distentæ sunt ac minimè rugosæ, albæ, aridæ, neutiquā carioſæ, gustu verò feruētes, & aromaticæ. Semen è media ferula idoneū: quod verò ex agnatis coliculis decerpitur minùs succulentum est. Præstat autem in liquoris genere, qui gustu est amarissimus: intus candidus aut subfuluus, foris verò ad croci colorem inclinans, lævis, pinguis, friabilis, quique statim diluitur, estq; graueolens. At niger ac mollis improbatur. ammoniaco enim aut cera adulteratur.

Sed ſincerus ac fraudis expers eo indicio deprehenditur, quod digitis in aqua confricatus reſoluatur atque lacteſcat. Vis ei excalfaciens, emolliens & attenuans: quamobrẽ febrium circuitibus rigoribuſq;, cõuulſis, ruptis, lateris doloribus, tuſſi, torminibus, vrinę ſtillicidio ac veſicæ ſcabiei conuenit, ex aqua mulſa aut vino bibitus. Menſes trahit, fœtus enecat, vuluæ inflationes, duritiáſque ex melle dilutus diſcutit. Iſchiadi quoque illinitur, & cephalicis medicaminibus admiſcetur. Carbunculos etiam circumquaque rumpit: podagricis cum vua paſſa illitus ſubuenit: dolores dentium demulcet ipſorum cauis inditus: & oculorum aciẽ inunctus excitat. Denique ſi pici admiſceatur, emplaſtrum parabitur contra canis rabidi morſus præſtantiſſimum. Radix autem deraſa & vuluæ ſubdita partus extrahit, ad vlcera veruſta efficax eſt, ac etiamnum oſſa nudata carne operit, ſi trita inſpergatur aut cum melle illinatur. Semen verò cũ abſinthio ſumptum menſes ciet. Cum ariſtolochia prodeſt aduerſus beſtias quæ venenum eiaculantur, & contra vuluæ ſtrangulatus in vino bibitum.

A δοκιμάζεται δὲ εἰδαπὶ ἁφῆ τριβόμενος τοῖς δακτύλοις· ὀγδ ἄδηλος αἴεται καὶ γάλακτοῦται. Δύναμις δὲ αὐτῷ ἐστὶ θερμαντικὴ, μαλακτικὴ, λεπτυντικὴ· ὅθεν ἁρμόζει πρὸς ῥιγώδεις καὶ ῥίγη, ἀποσήματα, ῥήγματα, πλευρῆς ἀγήματα, ἕξεις, τρόφους, τραχύτητας, ψώρας

B ἔχει δὲ καὶ κύησι, σὺν μέλιτι πόσιμον ἢ οἴνῳ | πο- V. caret
πιζόμενος· ἔμμηνα ἄγει, καὶ ἔμβρυα φθείρει, καὶ ἐμπνευματώσεις ἔχει δὲ καὶ ὑστέρα, καὶ σπλῆνος διαφοράς, σὺν μέλιτι ἀνιᾶται· ἔστι δὲ καὶ σύνθεσμα ἰσχιάδος· μίγνυται δὲ καὶ ἀκόποις καὶ κεφαλικαῖς δυνάμεσι· πρὸς ἱρπητικὰ δὲ καὶ αἰθραγας,

C ἁρμόζει καὶ ποδαγρικοῖς μετὰ σταφίδος ἡμέρου καταπλασσόμενος. πρὸς τρωτὰ δὲ καὶ τὰ τῶν ὀδόντων ἀγήματα, ἐνιπτόμενος τοῖς βρώμασιν· ὀφθαλμῶν τε ἐστὶ ἐξυδρικὸς· ἔγχεισον. μιγεὶς δὲ πίσῃ ἔμ- V. alg. ex. διχεσον
πλαστρός ἐστι πρὸς τοὺς λυσσοδήκτους ἀρίστη. καὶ ἡ ῥίζα δὲ ξυσθεῖσα καὶ πεσσηθεῖ-

D σα μήτρα, ἄγει ἔμβρυα· πρός τε ἕλκη πυῤῥὰ παλαιὰ, καὶ τὰ ἐψιλωμένα τῶν ἀνέων, σαρκοῖ, λεῖα * καταπλασσομένη καὶ σὺν μέλιτι ἐγχριομένη. ὁ δὲ καρπὸς αὐτοῦ σὺν ἀψινθίῳ ληφθεὶς ἄγει ἔμμηνα· σὺν ἀριστολοχίᾳ δὲ πρὸς τὰ ἰοβόλα ἁρμόζει, καὶ πρὸς τοὺς ὑστερικὰς πίγας,

E σὺν οἴνῳ πεπιζόμενος.

Περὶ Πάνακος Ἀσκληπιοῦ. Κεφ. ις'.

Πάνακες Ἀσκληπιοῦ αἴρουσιν ἀπὸ γῆς καυλὸν λεπτὸν, πηχυαῖον, γόνασι διῃρημένον, ὡς οἱ τὰ φύλλα ὅμοια μαράθῳ, μείζονα δέ, καὶ δασύτερα, βαιόδη. καὶ ἐπ' ἄκρῳ σκιάδιον, ἐφ' οὗ τὸ ἄνθος χρυσοειδὲς, δριμέα, βαιόδη· ῥίζα δὲ μικρά. Δύ- F ναμιν δὲ ἔχει βδέλλειν δι' αἵματος· ἔστι δὲ καρπὸς πρὸς ἕξεις καὶ φύματα, ἐκ φαλαράδας, λεῖος σὺν μέλιτι ἐπιπλασσόμενος· καὶ πρὸς ἕρπητα, πινόμενος σὺν οἴνῳ, ἐκ σπληνοφόρους σὺν ἐλαίῳ. καλοῦσι δέ τινες πάνακας καὶ τὴν ἀγρίαν ὀρίγανον· οἱ δὲ, κονίλιον· ὅθεν τινὲς V. addit οἱ δὲ ὀρίγανον.
εἴρηται ἐν τοῖς περὶ ὀρίγανου.

Περὶ Πάνακος Χειρωνίου. Κεφ. ιζ'.

Πάνακες Χειρώνιον φύεται μάλιστα ἐν τῷ Πηλείῳ ὄρει· φύλλα δὲ ἔχει ἀμαράκῳ ὁμοίῳ· ἄνθη χρυσοειδῆ·

Alt. ἀσκλαπιὸς Orib. ἀσκλαπιὸς ἢ χειρώνιον.

Ald. in notis addit λεπτὰ Matth. vt alibi.

Cæterũ ἀπὸ χειρώνιον. V quidam legunt Theoph. ἐπὶ λοπάδι

De Panace Aſclepio. Cap. LVI.

Panaces Æſculapij caulem à terra emittit tenuem, cubitalem, geniculatum, circa quem folia viſuntur fœniculi, maiora tamẽ hirſutioráq;, odorata. Et in caeumine vmbella, in qua flores emicant aurei, acres, & odorati. Radix eſt parua. Auxiliarem vim habent flores ac ſemina contra vlcera panos & phagedænã, ſi trita cum melle imponantur: aduerſus ſerpentes ex vino bibuntur, & cum oleo illinuntur. Aliqui panaces quoque ſyluestre origanum vocant, alij cunilam: de qua capite de origano dictum eſt.

De Panace Chironio. Cap. LVII.

Panaces Chironium in Pelio mõte maximè prouenit: foliis eſt amaraco ſimilibus, floribus aureis,

ῥίζαν λεπτὴν, καὶ οὐ βαθεῖαν, γλυκυμάχῳ δὲ δριμεῖαν. Δυνάμιν δὲ ἔχει ἡ ῥίζα πρὸς ἕρπητα πινομένη. καὶ ἡ κόμη ἡ θλασθεῖσα πρὸς τὰ αὐτὰ ποιεῖ.

A radice tenui, neque alta, gustu acri. Pota radix serpentium veneno resistit: ac imposita quoque coma cõtra illud ipsum efficax.

Περὶ Λιγυστικοῦ. Κεφ. ιη'.

De Ligustico. Cap. LVIII.

ΛΙΓΥΣΤΙΚΟΝ φύεται μὲν πλεῖστον ἐν Λιγυείᾳ. ὅθεν καὶ τὴν προσωνυμίαν ἔσχηκεν ἀπὸ τοῦ καλουμένου Ἀπεννίνου. ὄρους δέ ἐστιν ὁμορεῖν Ἄλπεσι. Πάναξι δὲ αὐτὸ καλοῦσιν οἱ ἐπιχώριοι οὐκ ἀλόγως· ἐπεὶ ἡ ῥίζα καὶ ὁ καυλὸς ἔοικε τῷ τοῦ Ἡρακλειωτικοῦ πάνακος, καὶ ἡ δύναμις ὁμοία καθέστηκε. φύεται δὲ ἐν τοῖς ὑψηλοτάτοις καὶ τραχυτέροις καὶ συσκίοις ὄρεσι, μάλιστα δὲ περὶ τοῖς διώρυξι. καυλὸν δὲ φέρει λεπτὸν, ὅμοιον μελιλώτῳ, γονάτων πολλῶν, οὗ τὸ φύλλα ἐοικότα τοῖς τοῦ μελιλώτου, πυκνοτέρα δὲ καὶ βαθέα, ἰσχνότερα δὲ τὰ πρὸς ἄκρῳ τοῦ καυλοῦ, καὶ μᾶλλον ἐπεσχισμένα. ἐπ' ἄκρῳ δὲ σκιάδιον, ἐφ' οὗ καὶ τὸ σπέρμα μέλαν, ναστὸν, ὑπέπικρες, πρὸς δὲ τῷ στόματι, γευσαμένῳ δὲ δριμὺ καὶ ἀρωματίζον· ῥίζα λευκὴ, ὁμοία τῇ τοῦ Ἡρακλειωτικοῦ πάνακος, βαθεῖα. Δυνάμεις δὲ τοῦ σπέρματος καὶ τῆς ῥίζης θερμαντικὴ, πεπτικὴ, ἁρμόζουσα πρὸς τὰ αὐτὰς πάθη καὶ πόσεις καὶ οἰδήματα, καὶ ἐμπυηματώδεις, μάλιστα δὲ πρὸς τὰ στόμαχον, καὶ πρὸς φθείσεις πλευρᾶς. ἄγει δὲ καὶ οὖρα καὶ ἔμμηνα πινομένη. ἡ ῥίζα δὲ προσπλασθεῖσα τὸ αὐτὸ ποιεῖ. μίσγουσι δὲ ἡ ῥίζα καὶ τὸ σπέρμα χρησίμως καὶ τοῖς ὀξυπόροις καὶ ταῖς πεπτικαῖς δυνάμεσιν. ἰσχνὸς δὲ βύσμα χόν ἐστιν ὅταν ἡ αὐτὴ πεῖρα αὐτῷ χρῶνται οἱ ἐπιχώριοι, μίσγοντες τοῖς προσφύμασι. δόλοῦται δὲ σπέρματι τινὶ παρομοίῳ, ὃ ὀλιγεινὸς τῇ γλώσσῃ· πικρὸν γάρ ἐστιν. ἔνιοι δὲ καὶ σπέρμα μαράθου ἢ σταφυλίνου συμμίσγοντες, δολοῦσιν αὐτό.

LIGVSTICVM plurimum in Liguria nascitur, vnde & nomen traxit, in mõte scilicet Apẽnino dicto Alpibus contermino. Ipsum incolæ Panaces haud absre appellãt, quoniam & radice & caule Heracleotico panaci simile sit, paribúsq; viribus præditum. Gignitur in altissimis asperísque montibus ac vmbrosis, maximè verò iuxta foueas & scrobes. Cauliculum profert tenuem, ceu anethi, geniculatum: circa quem folia sunt meliloti, at teneriora & odorata, prope verticem graciliora, pluribúsque diuisa incisuris. In cacumine vmbella, è qua semen depẽdet nigrum, solidũ, oblongum, fœniculo proximum, gũstanti acre & aroma redolens. Radix est candida, Heracleotici Panacis similis & odorata. Seminis radicísque vis excalfactoria & concoquens: siquidem prosunt ad interaneorum dolores ac tumores, itémque ad iuuandam concoctionem. Valent & ad inflationes præsertimque ventriculi, necnon & ad venenatarum bestiarũ ictus: vrinas quoque ac menses pota trahunt. Sed & apposita radix idem præstat. Ipsa porrò æquè ac semen vtiliter oxyporis & concoquentibus medicamentis admiscetur. Hoc verò stomacho perquàm vtile est: quare piperis loco id indigenæ obsonijs immiscent. Adulteratur autem semine quodam consimili, quod tamen gustu facilè discernas: amarum enim est. Alij quoque seminibus fœniculi aut seselis simul admixtis fraudem faciunt.

Περὶ Σταφυλίνου. Κεφ. ιθ'.

De Paſtinaca. Cap. LIX.

ΣΤΑΦΥΛΙΝΟΣ ἄγριος φύλλα ἔχει ὁμοια μηλίδι, πλατύτερα δὲ καὶ ὑποπράσου· καυλὸν δὲ ὄρθιον, πραχύν, σκιάδιον ἔχοντα αὐτῷ περιπλήσιον· ἐφ' οὗ αἰθὴ λευκὴ, ἐν μέσῳ δὲ πορφυρίς, πλησίον, καὶ οἱονεὶ κεγχίζον· ῥίζα δὲ,

PASTINACA syluestris folia habet gingidij; at latiora & subamara, caulem rectum, scabrum, vmbellam simile anethi, in qua flores insunt candidi, ac in medio exiguũ quiddam, colore purpureo & ferè ad croceum inclinante. Radix est

digiti craſſitudine, dodrantalis, odorata, & ſi decoquatur, eſculenta. Huius ſemen potum ſubditúmve, menſes ciet. Conuenit & ægrè meientibus, hydropicis, atque pleuriticis, in potione: necnõ & venenatarum beſtiarum mortibus ictibúſque prodeſt. Sed & aiunt qui illud præſumpſerint ab illis minimè lædi. Conceptum quoque adiuuat. Radix autem quæ & ipſa vrinas pellit, venerem prætereà ſtimulat, & partus appoſita eiicit. Folia verò trita & cum melle impoſita phagedænica vlcera repurgant. Hortenſis porrò paſtinaca cibo aptior ad eadem poller, attamen viribus inefficacior.

A δακτύλου τὸ πάχος, ἀσπαμιαῖα, βιώδης, ἐδώδιμη ἐφθή. Τούτου ὁ καρπὸς πολὺς ἢ πεπτικὸς, ἔμμηνα κινῶν ἁρμόζει καὶ νεφρῶσι δυσουρικοῖς καὶ ὑδρωπικοῖς, καὶ πλευριτικοῖς, ἐν πόμασι, καὶ πρὸς θηρίων δὲ δήγματα καὶ πληγὰς λυεῖ. δὲ καὶ παρλαβόντας φασὶ μὴ ἀδικεῖσθαι ὑπὸ θηρίων. σπερματοῖ δὲ καὶ συλλήπτικόν. ἡ δὲ ῥίζα ἐστὶ καὶ αὐτὴ οὐρητικὴ οὖσα, σπερματικά τε παρορμᾷ καὶ ἔμβρυα ἐκβάλλει παρεσπασμένη τε δὲ φύλλα λεῖα μετὰ μέλιτος, ἐπιπλάσματα, τὰ φαγεδαινικὰ ἕλκη ἰᾶται καθαίροντα. ὁ δὲ κυπάρισσος καὶ φυλλίτης ἐδώδιμώτερος ὢν ἁρμόζει πρὸς τὰ αὐτὰ, ἐνδιέτερον ἐνεργῶν.

Vide in Cæter.

Περὶ Σεσίλεως Μασσαλιωτικοῦ.

Κεφ. ξ'.

ΣΕΣΕΛΙ τὸ Μασσαλιωτικὸν, φύλλα ἔχει σκόροδα μακρόφυλλα, παχύτερα δὲ, ἃ καλοῦσι διφυέστερα ἔχει. ἔχει δὲ σκιάδιον αἰνήθῳ ὅμοιον, ἐφ' οὗ ὁ καρπὸς ὀπιμώδης, γογγυλομόρφος, δριμὺς βιβρωσκόμενος· παχεῖα ῥίζα μακρὰ, βιώδης. Δύναμιν δὲ ἔχει ὁ καρπὸς καὶ ἡ ῥίζα θερμαντικήν. πινόμενα δὲ στραγγουρίαι ἰᾶται, καὶ ὀρθοπνοίας· ὠφελεῖ δὲ καὶ ὑστερικὰς πάσας καὶ ἐπιληπτικούς, ἔμμηνά τε ἄγει καὶ ἔμβρυα, καὶ πρὸς τὰ ἔντος πάντα πάσχοντας, καὶ ἕξεις ἰᾶται παλαιάς. πινόμενός τε μετ' οἴνου ὁ καρπὸς, πεπτικός ἐστι, καὶ τρίφων λυτικός· ἁρπάζοις τε χρήσιμος, καὶ πρὸς τοὺς ἐν ὁδοῖς κρυμοὺς σὺν πεπέρει καὶ οἴνῳ πίνεται. δίδοται δὲ καὶ αἰξὶ καὶ τοῖς λοιποῖς κτήνεσι πρὸς βοτοκίαν ποτόν.

Deeſt in Cæter.

V πάσσαλος ἡ ῥίζα

Vel ad extenuanda in iumenta frigora

Marcellus ebulos: legendum ſuſpicamur.

Περὶ Σεσίλεως Αἰθιοπικοῦ. Κεφ. ξα'.

Τὸ δὲ Αἰθιοπικὸν λεγόμενον Σέσιλι, φύλλα μὲν ἔχει ὅμοια κισσῷ, ἡδαίνοα δὲ καὶ ἁπτικὴν πρὸς τὸ θερμαίνειν. θάμνος δέ ἐστι μέγας ὅσον, κλήμασι ὡς διπήχεσιν ἐφ' οὗ κλάδοι διασταμιαῖοι, κεφάλια δὲ ὡς αἴθουσα. σπέρμα δὲ μέλαν, πυκνὸν ὡς πυρὸς, δριμύτερον δὲ καὶ θερμότερον τοῦ Μασσαλιωτικοῦ, ἢ δὺ ἐχυρός. Δύναται δὲ τὰ αὐτά.

Sic v.c. & Cæter. némque Orib. ac vulg. ex μίλακος. V κρυπτὸν Al ἀπὸ θαμνώδους. Sic Orib. V πολὺ Deſunt hæc in vulg. exemplari ſed a Dioſcoride ex cod antiquo Lacunæ temque ex Orib.

Περὶ Σεσέλεως Γηροπονησιακοῦ. Κεφ. ξβ'.

Τὸ δὲ ἐν Γηροπόντῳ γινόμενον, φύλλα

La veteri. hoc caput cum ſuperiore commiſtũ eſt.

ἔχει κισσοῦ τὰ δίπλοα, πλατύτερα δὲ καὶ παχύτερα καὶ μείζονα τοῦ Μα-

Legit Lacunæ ſic v.c. παχύτερα

De Seſeli Maßilienſi. Cap. LX.

SESELI Maſſilienſe folia habet fœniculi, at craſſiora, caulémque vegetiorem: vmbellam anethi, in qua ſemen oblongum, anguloſum, deguſtanti ſtatim acre: radix longa eſt, & iucundi odoris. Semen & radix excalfaciendi vim habent: potu ſtrangurias & orthopnœas medentur: veteri ſuffocationibus, comitialibúſque proſunt, menſes & partus trahũt, ad omnia interna vitia pollent, ac tuſſim denique veterem ſanant. Semen cum vino potum, concoctioni cõfert, torminaque diſcutit: epialis febribus eſt vtile, & ad propulſandam in itinere algoris iniuriam cum pipere ac vino bibitur. Cæterùm ad partum adiuuandum capris cæteriſque pecudibus datur in potu.

De Seſeli AEthiopico. Cap. LXI.

Quod verò Æthiopicum ſiler appellatur, folia habet hederæ, ſed minora & oblonga, ceu periclymeni. Frutex grandis eſt, palmitibus ferè bicubitalibus, ramis dodrãtalibus, & capitulis velut anethi: ſemine nigro ac ceu tritici déſo, verùm acriore & odoratiore, quàm ſit Maſſilienſe, ac valdè ſuaui. Eadem verò præſtat.

De Seſeli Peloponnenſi. Cap. LXII.

Quod autem in Peloponneſo naſcitur, folia habet cicutæ, ſed latiora & craſſiora: caulem ſupra Maſ-

ανάλεπτικόν, καρδιακόν, ἐπ' ἄκρῳ δὲ τούτου σκιάδιον πλατύ. σὺν ᾧ τούτῳ καρπὸς πλατύτερος καὶ ὠιώδης καὶ σφονδυλίτερος. Alt. σφονδυλωτερος

Δύναμιν δὲ τὴν αὐτὴν ἔχει. φύεται ἐν τόποις παχέσι καὶ ἐφύγροις καὶ λιωλόφοις. φύεται δὲ καὶ ἐν Κύπρῳ. V. ἐν Κύπρῳ

Περὶ Τορδυλίου. Κεφ. ξγ'.

ΤΟΡΔΥΛΙΟΝ, ἔνιοι δὲ Σέσελι Κρητικὸν καλοῦσι, φύεται ἐν τοῖς ὄρεσι Κιλικίας Ἀμανῷ. ἔστι δὲ βοτάνιον φρυγανώδες, ἔχον σπέρματα τριφερῆ, διπλοῦν, ὅμοιον ἀσπιδίσκοις, εὐώδη μέν, καὶ θερμαντικόν· πινόμενον πρὸς δυσουρίαν, καὶ ἐμμηνίων ἀγωγόν. ὁ δὲ χυλὸς τῆς κεφαλῆς καὶ τοῦ σπέρματος ἐπιχλωσθέντος, ὅσον τριώβολον πρὸς σὺν γλυκεῖ· ἐν ἡμέραις δέκα, νεφριτικοὺς ὠφελεῖ. ἡ δὲ ῥίζα πρὸς ἀκριτικήν, αἰ ἀλγοῦσι καὶ τὰ ἐκ θώρακος, ἐν λεβηθίῳ μετὰ μέλιτος. Alt. ἐχεῖν, sed perperam. Alii ἐμμηνία καὶ V. Alii ἐμέσει δίκα

Περὶ Σίσωνος. Κεφ. ξδ'.

ΣΙΣΩΝ σπέρμα πόα ἐστὶν ἐν Συρίᾳ γινόμενον, πράσοις σελίνῳ, ὀπίμαχες, μέλαν, πυρωτικόν. πινόμενον πρὸς σπληνῶσι καὶ δυσουρίαις, καὶ ἐμμηνίων ἐπαγωγόν. χρῶνται δὲ αὐτῷ οἱ Ἰνδικοὶ ἀρτύματι μετὰ κολοκύνθης ἐφθῆς σὺν ὄξει λαμβάνοντες. ἔχει δὲ ὡς κοκκία πολλὰ ἐπ' ἄκρων. V. cæteri sequentibus V. οἱ δὲ καὶ σίσυ.

Περὶ Ἀνίσου. Κεφ. ξε'.

ΑΝΙΣΟΝ πλεῖον μὲν καθόλου δύναμιν ἔχει θερμαντικήν, ἑρπυστικήν, εὐπνοον, αἰσώδωδον, διαφορητικόν, οὐρητικόν, διαχυτικόν· ὑδρωπικοῖς ἀδιάφορον πινόμενον. ἁρμόζει δὲ καὶ πρὸς τὰ ἰοβόλα τῶν ζώων, καὶ πρὸς ἐμπνευματώσεις· χολίαν τε ἴσχει καὶ λιθιῶντας, καὶ γάλακτος ἀπόστασιν, καὶ σπονδυλώδη καθάρσεις παύει. καὶ τὰς ῥήξεις τῶν ὤτων, λαβὸν σὺν ῥοδίνῳ ἐντιθέμενον ἰᾶται. ἔστι δὲ αὐτοῦ χρῆσαι τὸ νέον καὶ ἀδρόν, καὶ μὴ πιτυρῶδες, εὔοσμον τῇ ὀσμῇ. σαφητεύει δὲ τὸ Κρητικόν, ἔπειτα δὲ τὸ Αἰγύπτιον. V. omittit V. addit ἀφ' ἡλίου

In antiquo vtroque hæc verba legunturi ἐν τοῖς καταβάδην λεγομένοις; quæ post tempora Dioscoridis huic loco asscripta esse annotat Goup. Nam recentiores κάτω καταβάδην vocare solent.

Περὶ Καρύου. Κεφ. ξς'.

ΚΑΡΟΝ σπέρμα πόας ἐστὶ γονίμου, ῥιζικόν, θερμαντικόν, δύσοσμον χρῶ, εὔοσμον, πεπλικόν, μυγνύμενον τοῖς ἀντιδότοις καὶ ὀξυπόροις χρήσιμον· αἰα-

silienſis magnitudinem, ferulaceũ, & latam in cacumine vmbellam, in qua ſemen latius, odoratum & carnoſius pendet. Iiſdem prædituꝫ eſt viribus. Naſcitur in aſperis, & vliginoſis atque collibus. Gignitur & in Ida.

De Tordylio. Cap. LXIII.

TORDYLIVM, quod aliqui Creticum Seſeli vocant, in Amano Ciliciæ mõte naſcitur. Herbula ſurculacea, exiguo ſemine eóque rotundo, ac duplici, ſcutulorum effigie ſubacri & aroma olente. Bibitur ad contra vrinæ difficultatem, & ad ciendos menſes. Succus caulis ſeminiſq; adhuc virentis ternis obolis ex paſſo diebus decem bibitus, nephriticos perſanat. Efficax quoq; radix eſt: ſiquidem pectoris excreationes purgat, ſi cum melle delingatur.

De Siſone. Cap. LXIIII.

SISON exiguum ſemen eſt, quod in Syria naſcitur, apio ſimile, oblongum, nigrum & feruẽtis guſtus. Bibitur contra lienis vitia & vrinæ difficultatem, itémque ad commorantes menſes euocandos. Eo ipſo indigenæ cum cucurbita in aceto cocta condimẽti vice vtũtur. In cacuminibus autẽ ceu granula multa gerit.

De Aniſo. Cap. LXV.

ANISVM in vniuerſum vim habet excalfaciendi, exiceandi, oris halitum iucundiorem faciendi, dolores leuandi, digerendi, vrinas ciendi, ac denique diſcutiendi diſſipandíque. Potum hydropicis ſitim cohibet: virulentorum animalium venenis aduerſatur, itémque prodeſt ad inflationes: aluũ & alba fœminarũ profluuia ſiſtit, lactis vbertatem præſtat & venerem ſtimulat. Dolorem capitis leuat ſuffitum naribus, & cum roſaceo tritum inſtillatúmque fractis auribus medetur. Efficacius porrò quod recens, plenum, minimè furfuroſum, vehemẽtique eſt odore. Laudatiſſimum eſt Creticum, proximum Ægyptium.

De Caro. Cap. LXVI.

CARVM ſemen eſt exiguum, vulgaris notitiæ. Vrinas ciet, excalfacit, ſtomacho vtile, orique gratũ, cõcoctionẽ adiuuat, ac vtiliter antidotis & oxyporis admiſcetur: denj-

que non parua illi eſt cum aniſo cõuenientia. Eſt & cocta radix edulis æquè ac paſtinacæ.

De Anetho. Cap. LXVII.

ANETHI aridi comæ ſemiuiſque decoctum potu lac euocat, tormina inflationéſque ſedat, aluũ & eorum quæ in ſummo fluitant ventriculo vomitiones cohibet, vrinas ciet ac ſingultus lenit, frequentius potum oculos hebetat & genituræ reſtinguit. Eſt & eius decoctum fœminis hyſtericis ad deſeſſiones vtile. Denique vſtum inſperſúmque ſemen condylomata tollit.

De Cumino ſatiuo. Cap. LXVIII.

CVMINVM ſatiuum ſtomacho eſt vtile: ſed multò magis Æthiopicum, quod Hippocrates regium appellauit. Secũdum locum tenet Ægyptiũ: mox reliqua ſequũtur. Prouenit in Galatia Aſiæ, Cilicia & Tarentina regione, aliiſque locis compluribus. Excalfaciẽdi, aſtringẽdi & exiccandi vi præditum eſt: Ad tormina inflationéſque conuenit, ſeu coctum & cum oleo infuſum, ſeu etiam cum hordeacea farina impoſitũ. Datur & orthopnoïcis, in poſca: demorſis à venenatis beluis, in vino. Teſtiũ inflãmationibus auxiliatur, cũ vua paſſa & fabarũ lomento aut cerato impoſitũ. Cohibet & fluxũ muliebrẽ ſanguiníſq; è naribus profluuia, in aceto contritum & admotũ. Cæterùm cutis colorẽ bibitũ illitúmve mutat in pallorem.

De Cumino ſyluestri. Cap. LXIX.

Syluestre cuminum plurimum efficaciúſque in Lycia & Galatia Aſiæ atque Carthagine Hiſpaniæ gignitur. Eſt verò frutex exiguus, caule, dodrantali ac tenui, in quo quaterna quináve ſunt minuta folia, tenuia veluti ſerrata & gingidij diuiſura. Gerit autem in cacumine quina aut ſena capitula rotunda & mollia, in quib. ſemen aceroſum & guſtu acrius quàm ſatiuum. Naſcitur in collibus. Bibitur ſemen ex aqua aduerſus tormina & inflationes: ſingultus ex aceto ſedat: & cõtra virulẽtas beſtias ac ſtomachi ex nimia humiditate imbecillitatẽ in vino bibitur. Sugillata tollit, ſi commãducatũ cũ mellẽ & vua paſſa imponatur. Quin & teſtiũ inflãmatio-

A λεγομῶ αὐίσῳ. ἡ δὲ ῥίζα ἐφθὴ ἐδώδιμος ὥσπερ καρωτίνος. V. καὶ αὐίῳ ad dunt.

Περὶ Ἀνήθου. Κεφ. ξζ'.

ἌΝΗΘΟΝ ξηρὸν τὰ κόμας καὶ τὸ καρπὸν δὸς ἀφέψημα πινόμενον, γάλα κατασπᾷ, τροφὰς τε καὶ ἐμπνεύματα παύει, κοιλίας τε καὶ τὰς ἐπιπολαίους ἐμέσεις ἵστησι, οὖρά τε κινεῖ, λυγμοὺς πρῆσσον, ἀμβλύνει τε τὰς ὄψεις, καὶ γονὴν σβέννυσι συνεχῶς πινόμενον. χρήσιμον δὲ ἀφέψημα αὐτὸ ἐς γυναῖξὶν ὑστερικὰς εἰς ἐγκάθισμα. τὸ δὲ σπέρμα καὶν καὶ κλασθλασθὲν, κονδυλώματα αἴρει. B V. sic αὐάνου αὐαινομένου. ἡ δὲ ῥίζα ἐφθὴ ἐδώδιμος. ὥσπερ καρωτίνος. αὐάνου & ξηροῦ &c. V. addit καὶ σπέρμα. Sic & Lacuna. V. addit σίνηται, δυσκρασίαν, ἕξιν, πνεύματα μετεώρων & αἱματώδεις ἐμέσεις.

Περὶ Κυμίνου ἡμέρου. Κεφ. ξη'.

ΚΥμινον δὲ ἥμερον, εὔστομον καὶ γλίσχου μᾶλλον τὸ Αἰθιοπικὸν, ὅνπερ Ἱπποκράτης βασιλικὸν ἐκάλεσε. δεύτερον τὸ Αἰγύπτιον εἶτα τὸ λοιπόν. φύεται ἐν Γαλατίᾳ καὶ ἐν Ἀσίᾳ καὶ Κιλικίᾳ καὶ Ταρεντίᾳ, καὶ ἐν ἄλλοις πλείοσι τόποις. Ἐστὶ δὲ θερμαντικὸν, συπτικὸν, ξηραντικὸν, ἁρμόζον πρὸς τροφὰς καὶ ἐμπνευματώσεις. ἐσκυζόμενον ἐφθὸν σὺν ἔλαίῳ καὶ κλασθλασθὲν σὺν ὠμῇ λύσει. δίδοται δὲ ὀρθοπνοϊκοῖς σὺν ὀξυκράτῳ· θηριοδηκτοῦσι δὲ σὺν οἴνῳ. διδύμων τὰ φλεγμονὰς ἀφιᾶσι σὺν σταφίδι καὶ ἐρεσμίῳ ἀλθάρῳ, ἢ κηρωτῇ ἐπιτεθέν. ἐπέχει δὲ καὶ ῥοὰς γυναικείας, καὶ τὰς ἐκ μυελῶν αἱμορραγίας, σὺν ὄξει λαβὸν προστιθέν. τρέπει δὲ καὶ χρῶτα ἐπὶ τὸ ὠχρότερον πινόμενόν τε καὶ συγχριόμενον. C D E Vulg. exemp. φάσσ.

Περὶ Κυμίνου ἀγρίου. Κεφ. ξθ'.

Κύμινον ἄγριον, φύεται μὲν πλεῖστον καὶ ἐπιτερέστερον ἐν Λυκίᾳ καὶ Ἀσίᾳ τῇ Γαλατίας, καὶ ἐν Καρχηδόνι τῇ Ἱσπανίας· ἔστι δὲ θαμνίον ἔχον καυλὸν καθαμμάτιον, λεπτὸν, ἐφ' ᾧ φύλλα ε'. ἢ ϛ'. λεπτὰ, οἱονεὶ πεπερισμένα, τῇ καλάμῃ ὡς γιγλίδιον. κεφάλια δὲ ἔχει ἐπ' ἄκρου ε. ἢ ϛ'. στρογγύλα, μαλακὰ, ἐν οἷς ὁ καρπὸς ἀχυρώδης, βδομήκοντα δριμύτερος τοῦ ἡμέρου. φύεται δὲ ἐν γωλέοις. πίνεται δὲ τὸ σπέρμα πρὸς τροφὰς καὶ ἐμπνευματώσεις σὺν ὕδατι σὺν ὄξει δὲ λυγμοὺς παύει· πρὸς δὲ τὰ ἰσχιάδα καὶ πλάδον στόματος σὺν οἴνῳ. αἴρει δὲ καὶ ὑπόπτωσιν καὶ καταπλασθὲν σὺν μέλιτι καὶ σταφίδι. φλεγμονάς τε διδύμων F G

ἰᾶται, μὴ τὴ αὐτὴν καταπλασσόμενον. Est καὶ ἕτερον ἄγριον κυμίνου ὅμοιον φέρες πᾶν ἀπὸ ἑκάστου σπέρματος ἀφίησι κεφάλια μετέωρα, ἐν οἷς ἐστὶ σπέρμα ὅμοιον μελανθίῳ· τοῦτο πινόμενον, τοῖς ἑρπετοδήκτοις ἄριστον φάρμακον. βοηθεῖ δὲ στραγγουρίαις καὶ λιθιῶσι καὶ αἵματος βρόμβους οὐροῦσιν. ὅταν πίνωσι δὲ στέατι σπέρμα ἀποζεσθέν.

Lacuna, ἢ μέγας Alexan.

Περὶ Ἀμμεως. Κεφ. οʹ.

Ammi, ἔνιοι καὶ τοῦτο Αἰθιοπικὸν, ἢ βασιλικὸν κύμινον καλοῦσιν. ἔνιοι δὲ ἑτέρας φύσεως τὸ Αἰθιοπικὸν κύμινον ἔφασαν εἶναι· καὶ ἑτέρας, τὸ Ἄμμι. γνώριμον δὲ τὸ σπέρμα τοῦτο, μικρότερον πολλῷ τοῦ κυμίνου, καὶ ὀρεγανίζον τῇ γεύσει. ἐκλέγου δὲ καθαρὸν καὶ μὴ πεπυρωδες.

Desunt hæc in Ald. & ad noctu legantur. Alij enim nonnulli codices his carent vsque ad γνώριμον.

Δύναμιν δὲ ἔχει θερμαντικὴν, πυρωτικὴν καὶ ξηραντικήν· ποιοῖ τοὺς τρόφους, δυσουρίας, καὶ θηριοδήκτους, πινόμενον σὺν οἴνῳ ἄκρατον· καὶ ἔμμηνα. μίγνυται καὶ τοῖς ἐκ κηρωταικοῖς ἐκθλιπτοῖς, πρὸς τὰς αἰπαχλύς τε ἐπιγινομένας δυσουρίας. ὑπόπια καταπλασθὲν σὺν μέλιτι αἴρει. πέπει δὲ καὶ χρόας πινόμενον καὶ συγχεόμενον ὅτι τὸ χλωρότερον. καὶ μετὰ σταφίδος ἢ ῥητίνης ὑποζυμώμενον, ὑγιάζει λοπὰ καὶ θαίρει.

Περὶ Κορίου. Κεφ. αʹ.

Korion ἢ Κορίαννον γνώριμον, δύναμιν ἔχον ψυκτικήν. ὅθεν καταπλασσόμενον μετ' ἄρτου ἢ ὀξύκρατον, ἐρυσιπέλατα καὶ ἕρπητας ἰᾶται σὺν μέλιτι δὲ καὶ σταφίδι, ὀφθαλμίδας, καὶ διδύμων φλεγμονὰς καὶ αἰδοίων θλάσεις καταπλασθέν· μετ' ἐρεμμοῦ δὲ χυλοὺς καὶ φύματα διαλύει. τὸ δὲ σπέρμα ὀλίγον μὲν πολὺν μετὰ γλυκέος ἕλμινθας ἐκβάλλει, καὶ σπέρματος ὄξει γυναικεῖα. πλέον δὲ λαφθὲν κινεῖ τὰ ἐμμηνοίας· ὅθεν ἰνδικὸν ὄντα δεῖ φυλάττεσθαι τὰ πλείονα καὶ συνεχῆ χρῆσιν αὐτοῦ. ὁ δὲ χυλὸς σὺν ψιμυθίῳ ἢ λιθαργύρῳ καὶ ὄξει καὶ ῥοδίνῳ καταχριόμενος, ἀφῄρηται καὶ τὰ ὑπὸ φαίδας φλεγμονὰς καὶ πυρώδεις.

Περὶ Ἱεράκιου τοῦ μεγάλου. Κεφ. οϛʹ.

Ieracion τὸ μέγα, καυλὸν αἰτησι παχὺν, ὑπόσπιθρον, ἀκανθώδη,

nibus, adiectis ijsdem impositum medetur. Est & alterum syluestris cumini genus satiuo simile: quod quidé è singulis floribus erecta sursumque spectantia cornicula promit: in quibus semen est melanthio simile: potum id, contra serpentium morsus singulari est præsidio. Quibus subst illum est lotium, calculosis & sanguinis grumos meiétibus auxiliatur: verùm seminis apij decoctum superbibendum est.

De Ammi. Cap. LXX.

Ammi nonnulli Æthiopicum, aliqui regium cuminú appellant. Alij alterius naturę Æthiopicú cuminú: & alterius, Ammi esse prodiderút. Vulgo notum est semen exile, multò minus cumino, & origani sapore. Eligito purum miniméque furfurosum. Vim habet hoc quoque excalfactoriam, vrentem & exiccátem: valet ad tormina, vrinæ difficultatem, ac venenatorum morsus, ex vino potú. Méstrua quoque ciet. Miscetur & cutim erodétibus medicamentis è cátharide paratis, quò resistat vrinæ difficultatibus, quæ alioqui id genus medicamétis superuenire solét. Sugillata cú melle impositú tollit. Sed & potu ac illitu coloré pallidioré efficit. Suffitú aút cú vua passa aut resina, vuluam purgat.

De Coriandro. Cap. LXXI.

Coriandrvm, Græcis Corion seu Coriannú, vulgaris est notitiæ, vim habés refrigeratoriá. Quare cum pane aut polenta impositú, erysipelata & quæ serpút vlcera sanat: cum melle verò & vua passa epinyctidibus, testú inflammationibus carbunculisq; medetur: & cum faba fresa strumas panósque discutit. Semen exigua quantitate cum passo bibitú, lumbricos pellit, & geniturę abúdantiá facit. At si largiùs sumptum fuerit, mentẽ nõ sine periculo è sua sede & statu dimouet. quáobrem ab ipsius copiosiore frequétioreq; vsu cauendú. Succus aút cú cerussa aut lithargyro, necnon & aceto atq; rosaceo púctus, ardétes in súma cute inflámationes emendat.

De Hieracio magno. Cap. LXXII.

Hieracivm magnú, caulem profert asperú, subrubrú, spinosum,

vtcunque cõcauum: folia verò fundit ex interuallis,lacinijs rarioribus diuisa,similia soncho per ambitum: flores luteos in oblongis capitulis. Vim habet refrigeratoriam,modicéque ac leuiter astringentẽ. Quáobrem æstuanti stomacho inflammationibúsque vtiliter imponitur. Succus autem stomachi rosionem sorbitione mitigat.Cæterùm herba cum radice imposita ictis à scorpione auxiliatur.

A ὑπόκεινον φύλλα ἔχει ἐκ διαστημάτων ἐπιμισμένα ἀραιῶς, ὅσον χόν ἐμφερῆ τῷ Marcellus legit πόᾳ.
σευτλίῳ· αἱ δὲ μίσχοι εἰς τὸ κεφάλαιον ὑπομίσχουσι. Δύναμιν ἔχει ψυκτικήν, μετρίως ὑποστύφουσαν. ὅθεν τοῖς ἀρχομένοις καυσουμένῳ ἐπὶ φλεγμονὰς καὶ ἀπλαστώμενον ἁρμόζει. ὁ δὲ χυλὸς καταῤῥοφώ-
B μενος, δηκμὸν παρέχει· τὸ δὲ πόα σὺν τῇ ῥίζῃ καταπλασθεῖσα, σκορπιοπλήκτοις V. addit σὺν χόν. & margo addit, καὶ ἑτέρου λεπτομερεστέρου λόγου πεμ-
ἀρήγει. πτου.

Περὶ Ἱερακίου τοῦ μικροῦ. Κεφ. ογ'.

Ἱεράκιον δὲ μικρόν, φύλλα ἔχει ἐν αὐτὸ ἐκ διαστημάτων ἐπιμισμένα τῷ σεσελεῖ φέρεται· καυλία δὲ αἴσιμα τευφερὰ καὶ
C χλωρά, ἐν οἷς αἱ ἄνθη μίλινα, κύκλον περιγεγράφοντα. Δύναμιν δὲ ἔχει καὶ αὐτὸ τὴν αὐτὴν τῷ ἁρμιθῷ.

Περὶ Σελίνου. Κεφ. οδ'.

ΣΕΛΙΝΟΝ κηπαῖον, ἁρμόζει ὁ πόα] In v. cod. deesse scribus Lacunam
ρος ἀ ἐ δ' κόειον ἐ ῥος ὀφθαλ- Alias, κοχλίων. Vetus quidam addit, ἀκ ἡσίμου.
μῷ φλεγμονὰς μ' ἄρτου ἢ παιπάλης
D ἀφίπου καταπλασσόμενον. καὶ κεῖσον σὺν μάχῃ πρὸς μαστοὺς τὰ χονδριοῦντας αἴσιον κιῆ τε οὖρα ἐφθόν τε ἐ ὠμὸν ἐσθιόμενον. ἐ δ' ἀφέψημα αὐτοῦ τε ἐ τ ῥίζῃ πινόμενα. αἰτιᾶται θανασίμοις φαρμάκοις. ἐμέτους κινοῖ χιλίας τε ἐπέχει. δ' Lacuna in v. c. legit καὶ ἡσίμου πεπ.
ἡ σπέρμα ὄζει οὐρητικώτερον, βοηθοῖ
E δὲ θηριοδήκτοις, καὶ τοῖς λιθάργυρον πεπωκόσι, πνεύματός τε ὄζει διαλυτικήν. μίγνυται δὲ καὶ ἀνωδύνοις καὶ θηριακαῖς καὶ βηχικαῖς χρησίμως.

Περὶ Ἐλεοσελίνου. Κεφ. οε'.

Ἐλεοσέλινον ἡμερώμενον ἐν τοῖς ἐφύ- Ora. addit ὑπὸ
δροις τόποις, μεῖζον τ ἡμέρου σελίνου· πυ
F δὲ ὅσα δὲ κηπευτόν.

Περὶ Ὀρεοσελίνου. Κεφ. ος'. V. ὀρεοσέλινον.

Ὀρεοσέλινον καυλὸς ὄζει σπιθαμιαῖος εἷς ἐκ ῥίζης λεπτῆς· περὶ δὲ αὐτὸν κλωναρεία ἐ κεφάλια κωνεῖῳ πρόσεμφερῆ, λε- Lacuna legit καὶ φύλλα. Ita lectio Theophrasti & Plinij auctoritate comprobatur. V. ὑπομένει.
πτότερα μέν τοι ἰκανῶς· ἐφ' ὧν ὁ καρπὸς
G θρυμμένης, δριμὺς, λεπτὸς, βιώδης, ἐοικὼς κυμίνῳ. φύεται δὲ τόποις πετρώδεσι ἐ ὀρεινοῖς. Δύναμιν δὲ ἔχει ὁ καρπὸς ἐ ῥίζα οὐρητικὴν, πολύτες ἐν οἴνῳ. ἄγει δὲ καὶ ἔμμηνα. μίγνυται δὲ καὶ

Vnde Lacuna in v. c. Ita lectio Theophrasti & Plinij auctoritate comprobatur.

Hieracium paruum,folia quoque habet ex interuallis diuisa per ambitum: cauliculos verò promit tenerosiac virentes, in quibus flores lutei,in orbẽ circinati. Vires porrò & hoc cũ antedicto easdẽ obtinet.

De Apio. Cap. LXXIIII.

APii hortensis herba ad eadẽ ad quæ & coriandrum conuenit: præterea áque ad oculorum inflámationes,cum pane aut polentæ pollíne imposita. Æstuantẽ quoque stomachum demulcet, & mámas grumoso lacte turgentes reprimit: ciet & vrinas, siue cocta siue cruda edatur. Decoctum eius radicúmque, potum, venenorum noxæ resistit, dum vomitiones excitat: aluũ quoque cohibet. At semen potentiùs vrinas pellit,& à venenata bestia demorsis, iisque qui argenti spumam hauserunt,opitulatur,ac deniq; flatus discutit. Sed & vtiliter admiscetur medicamentis quę dolorum leuamenta præstant, itémque theriacis ac tussicularibus.

De Heleoselino,seu apio palustri. Cap. LXXV.

Heleoselinon,quod in aquosis locis nascitur, satiuo apio grãdius est: sed ad eadẽ ad quæ & illud efficax.

De Oreoselino. Cap. LXXVI.

Oreoselinon caule est dodrantẽ alto, qui quidem singularis ex gracili radice assurgit: ambiunt verò ipsum ramuli & capitula cicutæ similia, at multò tamen tenuiora: in quibus semen oblongũ,acre,tenue, odoratum,cumino simile,In petrosis montosisque locis nascitur. Et semen & radix vrinam ciendi vim habent,si in vino bibantur,ac menses etiã trahunt. Antidotis quoq; &

αἱ πιδότοις, καὶ τὰ διυρητικαῖς ἢ θερμαντικαῖς δυνάμεσιν. ἃ δεῖ ὑ πλανᾶσθαι, νομίζοντας ὃ ὀρεοσέλινον εἶναι ἢ ὃ ἐν πέτραις φυόμενον· ἄλλο γάρ ἐστι ὃ πετροσέλινον.

A

Περὶ Πετροσελίνου. Κεφ. οζ'.

Σέλινον τὸ ἢ πετροσέλινον, τὸ φυὲν ὑ ἐν Μακεδονίᾳ, ἐν ἀποκρήμνοις τόποις σπέρμα ἔχον ἐοικὸς ἄμμῳ, ὀδωδὸς ἡδύ· ἢ ῥίζαν δὲ κατ' ὄρεμιν καὶ ἀρωματίζουσαν, οὐρητικὴν, ἐμμηνίων ἀγωγὸν· ἁρμόζει ὑ καὶ πρὸς στομάχου καὶ κάλυκας ἐμπνευματώσεις καὶ φῦσας· πρός τε πλευρᾶς πόνους καὶ νεφρῶν καὶ κύστεως, ἐν ποτῷ λαμβανόμενον. μίγνυται ὑ καὶ τοῖς οὐρητικοῖς ἀντιδότοις.

B

Lacunã legit in v. c. ὀρεμίτην.

Περὶ Ἱπποσελίνου. Κεφ. οη'.

Ἱπποσέλινον, ἃ μὲν, γεῖλον, ἃ δὲ, ἀγριοσέλινον, οἱ ὑ, σμύρνιον καλοῦσι, ἕτερον δὲ κυρίως λεγόμενόν σμυρνίου ὑπάρχοντος, ὡς αὐτίκα ἱστορήσομεν. ἔστι ὑ μεῖζον καὶ λευκότερον τὸ κηπευτὸν σέλινον· καυλὸς κοῖλος, ὑψηλὸς, πυθμενώδης, οἱονεὶ γραμμὰς ἔχων φύλλα πλατύτερα, ἐοικότα φοινικομόμῳ, ἐν οἷς ἐστιν ὡς λιβανωτίδος κόμη, μεσηὶ αὐγοὺς, καὶ κορυμβοὺς ποιοῦσα· ἀνθήσασα συνεχῶς· σπέρμα ὑ μέλαν, ἐπιμηκες, ναστὸν, δριμὺ, ἀρωματίζον· ῥίζα βλαύδης, λευκὴ, εὐστομος, οὐ παχεῖα. φύεται ἐν συσκίοις, καὶ πρὸς ἕλεσι. λαχανεύεται ὑ ὥσπερ τὸ σέλινον. καὶ ἡ ῥίζα ὑ ἑφθὴ καὶ ὠμὴ ἐσθίεται. πάντα φύλλα καὶ ἃ καυλοὶ ἑαυτοῦ ἑφθὰ, καθ' ἑαυτὰ τε καὶ μετ' ἰχθύων σκευάζεται· καὶ ὠμὰ ὑ παρασκευάζεται εἰς ὄψησιν. Δυνάμιν ὑ ἔχει ὁ καρπὸς πινόμενος ἐν οἴνῳ μέλιτι, ἐμμηνίων ἀγωγόν· θερμαίνει τε πεπέρεως δίκην, πινόμενος καὶ συλλειόμενος, στραγγουρίας τε ἴσχεται. ἃ ῥίζα ὑ τὰ αὐτὰ ποιεῖ.

C

V. addit ἢ σμυρνιον. al ἐσμυρνίου

V. non habet

V. ἐπιμαίνεσθαι

V. ναστὸν Cas. ἀγνίσκει. Sic & Lacuna. V. non legit

V. διὰ φθορᾶς

D

E

F

Περὶ Σμυρνίου. Κεφ. οθ'.

Σμύρνιον ὅπερ οἱ Κιλικία πετροσέλινον καλοῦσι, φυόμενον πλεῖστον ἐν τῷ λεγομένῳ Ἀμανῷ ὄρει. ἃ τὸ μὲν καυλὸν ἔχει ὅμοιον σχίνῳ, παραφυάδας ἔχοντα πολλὰς· φύλλα ὑ πλατύτερα πρὸς τὴν γῆν, καὶ ἐοικότα σελίνῳ, ἐστολισμένα, ῥωμαλέα, καὶ βλαύδη ἐν δριμύτητι, φαρμακώδη τε, καὶ

G

vrinam cientibus atque excalfactoris medicamintibus inferũtur. Neque vero nos oportet in eo errore versari, vt id oreoselinon existimemus, quod in saxis prouenit: aliud enim est petroselinum.

De Petroselino. Cap. LXXVII.

Apium, quod petroselinum dicitur, prouenit in Macedonia præruptis in locis, semine ammeos, at odoratiore, acri & aroma olẽte. Vrinas id menstruáque pellit: cõtra stomachi & coli inflationes ac tormina prodest. Succurrit & lateris, renũ ac vesicę doloribus, in potione sumptum. Admiscetur & antidotis vrinas cientibus.

De Hipposelino. Cap. LXXVIII.

Hipposelinon aliqui grielum, alij agrioselinũ: quasi apium syluestre, alij smyrnium appellãt: quanquam aliud est Smyrnium propriè dictũ, de quo mox agemus. Est autem maius cadidiúsque apio hortensi, caule cauo, procero, tenello ac veluti lineis distincto: foliis latioribus, in puniceum vergẽtibus: in quibus est ceu libanotidis coma, florum plena, quæ quidem in corymbos cogitur anteaquá defloreſcat. Semen autẽ est nigrum, oblõgum, soliduin, acre & aromaticum: radix itidem odorata, candida, ori grata, neque adeò crassa. Nascitur in vmbrosis & iuxta paludes. Oleris vero modo editur, veluti apium. Nam & radix cruda coctiue estur, & folia cum ipsis caulibus decocta manduntur, actũ per se tum etiam cum piscibus præparantur. Sed & cruda, muria condiũtur. Semen ex vino mulso potum menses ciendi vim habet, ac rigore prehensos potum illitúmve calefacit, & vrinæ stillicidio auxiliatur. Radix autem eosdem præstat effectus.

Pl. algentes

De Smyrnio. Cap. LXXIX.

Smyrnivm, quod in Cilicia petroselinum vocant, plurimum in Amano monte gignitur. Caulem habet apij, copiosa cinctum agnata sobole: folia verò latiora ad terram, infracta, subpinguia, robusta, odore medicato & cum quadam acrimonia iucundo, colore

colore denique in luteum languescente: habet & vmbellam supra caulem qualis anetho inest: semen rotundum, brassicæ simile, nigrum, acre, myrrhæ sapore, ita vt alterum alterius qualitatē repræsentet: radix verò acris est, odorata, mollis, succosa, faucésque mordens, cortice prædita, foris nigro, intus verò pallido aut subalbido. Nascitur in saxosis, collibus, locis aridis & incultis angulis. Vim habent radix, herba, ac ipsum quoque semen excalfactoriam. Folia quoque muria condita olerum instar in cibos veniunt, aluúmque sistunt: radix verè pota prodest contra serpentium morsus, tusses & orthopnœas mitigat, ac vrinæ difficultatibus medetur: imposita verò recentia œdemata, inflammationes, duritiásque discutit, & vulnera ad cicatricem perducit: feruefacta autem subditáque abortum infert. Semen renum lienis ac vesicæ vitijs succurrit, menses & secūdas pellit: ischiadicis vtiliter in vino propinatur, & inflationes stomachi lenit, sudores item ciet atque ructus. Peculiariter verò potui datur contra hydropem ac febrium circuitus.

A ὑποτομιλίζουσα τῇ χρόᾳ· σπιάδιον δὲ ὅτι πᾶν καυλῷ ἀνηθοφόρις· σπέρμα στρογγύλον, ὅμοιον τῷ τῆς κεφάλης, μέλαν, δριμύ, γλισχρόν, ὡς σμύρνη, ἐν αὑτῷ ἑνὸς ποιοῦν· ἡ δὲ ῥίζα δριμεῖα, εὐώδης, ἁπαλή, πολύχυλος, δάκνουσα περὶ φάρυγγα· φλοιὸν ἔχουσα, ἔξωθεν μὲν μέλαινα, ἔνδοθεν δὲ χλωρὸν ἢ ὑπόλευκον. φύεται δὲ ἐν πετρώδεσι τόποις καὶ γηλόφοις, καὶ ἀνύδροις καὶ γωνίαις χερσευούσαις. Δύναμιν δὲ ἔχει ἡ ῥίζα καὶ ἡ πόα καὶ ὁ καρπὸς θερμαντικὴν. λαχανεύεται δὲ καὶ εἰς τοὺς ἁλμοὺς καὶ φύλλα, χιλίαν τε ἕψουσιν· ἡ δὲ ῥίζα πινομένη ἑρπετοδήκτοις ἁρμόζει, φαίνεται δὲ καὶ ὄφεις καὶ ὀρθοπνοίας, & δυσουρίας ἰᾶται· καταπλασσομένη δὲ τὰ φλεγμονὰς, καὶ σκληρίας διαφορεῖ, τραύματά τε ἄχρις ἐπουλώσεως ἄγει· ζεσθεῖσα δὲ καὶ προσθεῖσα ἐξαμβλώσκει. καὶ τὸ σπέρμα δὲ αὐτῆς, πρὸς πταρμοὺς καὶ σπλῆνα καὶ κύστιν ἁρμόζει· ἄγει δὲ καὶ ἔμμηνα & δεύτερα· πρός τε ἰσχιάδας μετ' οἴνου πινόμενον ἁρμόζει, καὶ τοῖς ὑμπνυμελιώδεσι φαίνεται, ἔστι δὲ καὶ ὑδροποσίαν, ἐρυσιπελικήν. ἰδίως πινόμενον πρὸς ὕδρωπας καὶ τεταρταίους.

V. ἀνίησι

V. addit καὶ σπέρμα πινόν

V. quidem caret.

Περὶ Ἐλαφοβόσκου. Κεφ. π'.

B ΕΛΑΦΟΒΟΣΚΟΝ καυλός ἐστι λιβανωτίδι ἢ μαράθρῳ ὁμοφυὴς, γονικούμενος· φύλλα διδάκτυλα τὸ πλάτος, ἰσχνὰ ὑπομήκη ὡς τερεβίνθου, περικεκλασμένα, πραχία πως. ἔχει δὲ παραφυάδας ἰσχνὰς ὁ καυλός, σκιάδια ἐχούσας ὅμοια ἀνήθῳ, αὐτὴν ὑποτομίλινα, καὶ τὸ σπέρμα ἀνήθῳ ὁμοφερές· ῥίζα ὡς τεσσάκτυλος τὸ μῆκος, παχὺς δακτύλου, λευκὴ, γλυκεῖα, εὐώδιμος. καὶ ὁ καυλὸς δὲ λαχανεύεται ἀρτιφυὴς ὤν. τοῦτον φασὶ πρὸς τοὺς ἁλφοὺς πεπωκόσας, αὐτίχα τοῖς τῶν ἑρπετῶν δήγμασι, ὄφεσι καὶ τὸ σπέρμα δίδοται τοῖς ἑρπετοδήκτοις σὺν οἴνῳ.

V. ὑποτομίλινα

Mss. cod. πλάγιος δὲ ἡ πλάτος

Al. ὑποτομίλινα ἔνιοι.

De Elaphoboſca. Cap. L XXX.

ELAPHOBOSCO caulis est libanotidi aut fœniculo similis, geniculatus: folia duūm digitorum latitudine, prælonga ceu terebinthi, circumfracta, & quodammodo aspera. Habet verò caulis ipse agnatos ramulos multos, qui quidē vmbellas gerunt anethi similes, flores subluteos, & semen itidem anethi: radix ferè ad ternūm digitorū longitudinem, & vnius crassitudinem accedit, candida dulcis & esculenta. Sed & caulis recens adhuc ac tenellus olerum modo in cibos recipitur. Cæterùm huius herbæ pabulo ceruas aiunt serpentium morsibus resistere: atque ideo semen quoque contra serpentium morsus in vino datur.

Περὶ Μαράθρου. Κεφ. πά.

G ΜΑΡΑΘΡΟΝ, αὐτὴ ἁθροιμένη ἡ πόα, δύναται γάλα καθαίρειν, καὶ τὸ σπέρμα δὲ πινόμενον ἢ συνεφθὲν πλησμονὴν. V. vbique pro ἢ legit.

De fœniculo. Cap. L XXXI.

FOENICVLI herba si edatur, mámas lacte replet, idē verò potest semē epotū, aut cū prisana decoctū.

Vulg. exempl. ἐκπτοῖς, πορευτικοῖς πᾶσι

Ὁ δὲ ἀφέψημα τῆς κόμης πολὺν, νεφριτικοῖς καὶ ἕλκεσι τοῖς ἐν τοῖς οὐροποιοῖς χρήσιμον, διουρητικὴν ὑπάρχον· ἀρμόζει δὲ ἐρπετοδήκτοις σὺν οἴνῳ πινόμενον, καὶ καταμηνία ἄγει· ἐν πυρετοῖς τε ναυδίαν καὶ καῦσον σταματᾷ· πρὸς τὰς ἐκ τῶν ἀκρέων ἀναβάσεις ἐπιτήδειον. Ἡ δὲ ῥίζα λεῖα σὺν μέλιτι καταπλασθεῖσα, κυνόδηκτα θεραπεύει. ὁ δὲ χυλὸς ἐκ φλοιβέντων τῶν καυλῶν καὶ τῶν φύλλων ἐν ἡλίῳ ξηραθεὶς, εἰς τὰ ὀφθαλμικὰ ὅσα τοῖς ὀξυδορκίοις, σκυβάζεται χρήσιμος. Χυλίζεται δὲ καὶ τὸ σπέρμα ὡρὸς τὰ αὐτὰ χλωρὸν, ἔτι σὺν τοῖς φύλλοις καὶ τοῖς ἀκρέμοσι· καὶ ἡ ῥίζα κατὰ πρώτην ἐκβλάστησιν. Εἰ δὲ τῇ ὥρᾳ ἐσπάρη Ἰβηρία, καὶ ὁπὸν ἀμίσιον ὅμοιον κόμμει, ἀποθηρίζουσιν ἐν τῇ αἰγὶ μέσον τὸ καυλὸν τὸ ὀπὸν χωρίων, καὶ πυρὶ προσάγοντες, ἵνα ὥσπερ ἀπὸ θερμασίας οἱονεὶ ἀφιδρώσαν ἐκβάλῃ ὁ κόμμι. ἔστι δὲ ἰσχυρότερον τὸ χυλὸ ὡρὸς τὰ ὀφθαλμικὰ τοῦτο.

Vulg. ἰσχυρίζεται

V. χυλίζεται σὺν τοῖς ἀκρέμοσι

Additur in vetusto Lacuna codice ἡ ἀκαλυπτ

V. ἰσχυρότερον

A Comæ autem decoctum bibitum, renũ ac vesicæ vitijs est vtile, quippe quod vrinam excieat. Conuenit & à serpente demorsis, in vino bibitum, ac menses quoque ciet. In febribus nauseam & stomachi ardorem sedat, ex aqua frigida potum. Contritæ verò radices, & cum melle impositæ canũ morsibus medentur. Succus caulibus & folijs expressus, & in sole siccatus, oculorũ medicamentis vtiliter additur, quę ad aciem visus excitandam reficiendámve præparantur. Extrahitur & ad eadem valens è recenti semine succus vna cum folijs atque ramulis. Radicibus præterea prima germinatione succus eodem modo exprimitur. Porro in Iberia quæ ad occidentem spectat, liquorem etiam reddit fœniculum gummi simile. Caulem verò medium dum floret herba demetunt indigenæ, ignique admouent, quo facilius vi caloris velut exudas gummi remittat. Id autem est succo ipso efficacius ad oculorum medicamẽta.

B

C

Περὶ Ἱππομαράθρου. Κεφ. πϛ'.

De Hippomarathro. C. LXXXII.

D

Ἱππομαραθρον, μαράθρου ἐστὶν ἄγριον, μέγα· φέρει δὲ σπέρμα καλάμῃ ὅμοιον. ῥίζα δὲ ὑπέστιν εὐώδης, ἣ τοῖς πινομένη στραγγουρίας ἰᾶται· ἐμμηνά τε ἄγει προσλαμβανόμενον· τὸ δὲ σπέρμα καὶ ἡ ῥίζα χειλίδωσι πινόμενα, σπληνοδήκτοις τι βοηθεῖ, καὶ λίθους θρύπτει καὶ ἴκτερον ἀπὸκαθαίρει. τῶν δὲ φύλλων τὸ ἀφέψημα πινόμενον γάλα ἄγει, καὶ τὰς ἐκ τοκετῶν γυναῖκας ἀποκαθαίρει. καλεῖται καὶ ἕτερον Ἱππομάραθρον, φύλλα ἔχον στενὰ, μικρὰ, σκορπίου· καρπὸν δὲ προσφυᾶ τοῖς τοῦ κοχλίου, δριμὺν, εὐώδη, θερμαντικόν· αἱ ἀλγηδόνες δὲ αὐτῷ ἡ δυσανία τοῦ στόματος, μείους, ἀδυνάτως ἐνεργοῦσα.

Hippomarathrvm, fœniculum est syluestre, procerũ: quod semen profert cachryi simile. Radix autem subest odorata, quę quidẽ bibita stranguriæ medetur, subditáq; menses ciet. Semen porrò & ipsa radix potu ventrẽ sistunt, E contra venenatorum morsus auxiliantur, calculos comminuunt, & regium morbum expurgant. At haustum foliorum decoctum, & lactis abundantiam facit, & fœminas à partu purgat. Traditur & alterum Hippomarathri genus, folijs angustis, exilibus & oblongis, semine rotũdo ceu coriandri, acri, odorato, & F excalfaciendi vi prædito. Viribus id antedicto respondet, nisi quòd agit imbecillius.

Περὶ Δαύκου. Κεφ. πζ'.

De Dauco. Cap. LXXXIII.

Δαυκον, ὃ δὲ, δράκοντα καλοῦσιν· ἔστι μὲν τις ὁ Κρητικὸς, μαράθρῳ ἔχων τὰ φύλλα ὅμοια, μικρότερα δὲ καὶ λεπτότερα· καυλὸν ποδιαμαῖον, σκιάδιον ὅμοιον χαμαίνῃ, αἰῶρα λευκά· ὧν ἡ βοτάνη ὁ καρπὸς δριμεῖς, λευκὸς, δασὺς, ἐν ᾧ δίκαμα μεγάλα· εὐώδης· ῥίζα δακτύλου τὸ πάχος· τὸ δὲ μῆκος ποδιαμαῖος. ἀγινᾶται δὲ ὀπώρᾳ·

Dav cvm aliqui dracũ vocant. Ac Creticũ quidẽ folijs est fœniculi similitudine, at minoribus atque tenuioribus, caule dodrantali, umbella coriãdri, floribus cãdidis: G atq; inter hos semine acri, albo, hirsuto, ac suauis in mandendo odoris. Radix est digitali crassitudine, & dodrantis longitudine. In saxo-

Cat. δρίμεις ὁ καὶ δυσοσμοδης ἡ ζωάτης.

sis apricísque locis prouenit. Alterum verò genus est apio syluestri simile, aroma olens, acre, odoratum feruentísque gustus. Probatius Creticum. Tertium præterea genus est, foliis coriandri, floribus albis, capite & semine anethi: vmbella verò in capite ceu pastinacæ: semine referta oblongo, ceu cumini, acri. Omnium semen excalfaciendi vim habet. Potum, menses, partus & vrinas pellit, torminibus liberat, veteréque tussim mitigat. Subuenit & à phalangio demorsis in vino potum, & impositum œdemata discutit. Seminis duntaxat ex alijs vsus est: at ex Cretico & radicis, quippe quæ maximè contra venenatorum iniuriam in vino bibatur.

Pl. secundas quasi Antipas legerit.

A ἔστι πόαις, καὶ βολίοις. ὅ δὲ τῆς αὐτῆς ἐστὶ στελέχη ἀγρίᾳ σφενδάμνου, ἀρωματώδης, δριμεῖ καὶ εὐώδης γευσάμενος καὶ πυρώδης· διαφέρει δὲ ὁ Κρητικός. τὸ δὲ τρίτον εἶδος καρίῳ φύλλα ἔοικε καὶ τὰ ἄνθη λευκά· καρφὴν δὲ ἔχει καὶ καρπὸν ὅμοια ἀνήθῳ· ἐφ' ᾧ σπερμάδιον ἐμφερὲς σε- Marth. σπέρμα ἢ καρπαλιῶ ὁμοῖα

B φυλίνῳ· σπέρμασι δ' ὀπτιμίκοις πλῆρες, εἰς κυμίνου, δριμέως. τὸ δὲ σπέρμα πάντων δυνάμεων ἔχει θερμαντικὴν παραφθόνου, ἐρεμμίων, ἐλεφρίων, ἢ ὕδρωα ἀγωγὸν, καὶ τρόφων ἀποθεραπευτικὸν, ὄφεσι χρονίοις σφοδρὸν· ἀρίστη δὲ καὶ φαλαγγιοδήκτοις πόνον σὺν οἴνῳ· διαφορᾷ δὲ καὶ οἰδήματα καὶ σπλαδόν· ἡ δὲ ῥίζης τὸ μὲν ἄμισον τοῦ σπέρματος μεῖον· ἔστι δὲ Κρητικοῦ καὶ τὸ ῥίζης, ἢ τῆς μάλιστα πρὸς τὰ θηρία πίνουσιν οἶνον.

C

Περὶ Δελφινίου. Κεφ. πδ'.

ΔΕΛΦΙΝΙΟΝ κλῶνας δύπηχυ διασταμένους ἢ καὶ μείζονας, ἀπὸ μιᾶς ῥίζης πολλοὺς οἷς φύλλα ἐπικαμπῆ λεπτὰ, V. δυσὶ πήχεσι V. κλῶνα

D ὁπτιμίκη, δελφινοειδῆ· ὅθεν καὶ ὄνομασται. ἄνθος ἔχει ὅμοιον λευκίῳ, ἐμπόρφυρον· σπέρμα ἐν λοβοῖς κέγχρῳ ἐμφερές· ὁ δοκεῖ πολὺν ὕπνον οἴνῳ σκορπιοπλήκτοις, ὡς ἄλλο τι ἕτερον. φασὶ δὲ καὶ τοὺς σκορπίους παραπήγνυσι τὰς πέδας παλύειν, ἀποσβέννυσί τε καὶ ναρκώδεις ποιεῖ· ὑφαιρεῖται δὲ ἐν ὀλίγοις τὸ καρηβαρικὸν ποιεῖ. V. caret, licet hæc non nisi ad allia referantur. Dod. sic legit, Δελφίνιον εἶδος ἔχει ὅμοιον λευκίῳ, ἐμπόρφυρον· σπέρμα ἐν λοβοῖς κέγχρῳ ἐμφερές· ὁ δοκεῖ πολὺν ὕπνον οἴνῳ σκορπιοπλήκτοις, ὡς ἄλλο τι ἕτερον. φασὶ δὲ καὶ τοὺς σκορπίους παραπήγνυσι τὰς πέδας παλύειν, ἀποσβέννυσί τε καὶ ναρκώδεις ποιεῖ· ὑφαιρεῖται δὲ ἐν ὀλίγοις τὸ καρηβαρικὸν ποιεῖ, &c. V. ad finem vsque caret.

E

Περὶ Δελφινίου ἑτέρου. Κεφ. πε'.

ΔΕΛΦΙΝΙΟΝ ἕτερον, ὃ καλοῦσιν Ῥωμαῖοι βουκίνιον, καὶ αὐτὸ ἐμφερὲς τῷ ἀνθει, τοῖς δὲ φύλλοις καὶ τοῖς κλωνίοις ἰσχνότερον πολλῷ. δύναμιν ἔχον καὶ αὐτὸ τὴν τοῦ προφρημένου, ἧττον δὲ ἐνεργές.

F

Περὶ Πυρέθρου. Κεφ. πς'.

ΠΥΡΕΘΡΟΝ πόα ἐστὶ καυλὸν αἰσα καὶ φύλλα ὡσανεὶ δαύκου ἄγλεος καὶ μάραθρον σπάδιον· ὡς ἄνηθον· ῥίζα δακτύλου μεγάλου τὸ πάχος μακρὰ, γευσαμένῳ πυρώδικωτάτη. V. si δύο ἢ τρία ἢ τέσσαρα κλωνία V. caret.

G φλέγματος ἐστὶν ὀπτικὴ ἀσκητική. διὸ καὶ τοῖς ὀδοντολγίαις βοηθεῖ μέλι ὄξος ἐψηθὲν καὶ διακλυζόμενον· ἄγει δὲ καὶ φλέγμα διαμασηθεῖσα· συνηθροισμένη δὲ μετ'

Dod. legit αἰσθημένου.

De Delphinio. Cap. LXXXIIII.

DELPHINIVM surculos emittit ab vna radice duûm dodrantũ altitudine, aut etiá maiores: circa quos exiliũt minuta folia, incisuris diuisa, tenuia, & oblonga, quæ delphinorum effigiem repræsentant: vnde & nomen tractũ est. Flos violæ albæ similis, purpureo colore: semen in siliquis milio proximũ, quo nõ aliud vtilius in vino bibi potest à scorpione percussis. Aiunt & admota herba scorpiónes resolui arq; ignauos torpescere: remota verò eadem, sese recolligere. Nascitur in asperis & apricis.

De Delphinio altero. C. LXXXV.

Delphiniũ alterũ, quod alij hyacinthum, Romani bucinum vocãt, superiori quidẽ est simile, at foliis & ramulis longè gracilioribus. Viribus etiamnũ eisdẽ cum antedicto pollet, at non est perinde efficax.

De Pyrethro, seu saluari herba. Cap. LXXXVI.

PYRETHRVM herba est, quæ caulem foliáq; profert, vti daucum syluestre & fœniculũ: vmbellam verò ceu anethi, circinatæ rotunditatis. Radix longa est, pollicari crassitudine, gustúq; feruidissimo. Pituitá elicit: atq; ideò in dentiũ doloribus decocta in aceto collutione auxiliatur. Pituitam etiá eadem cõmanducata extrahit, & ex

ἐλαίου, ἱδρῶτας κινῆ, ποιοῦσα σὺν ἐλαίῳ. χρόνια ῥίγη. ἐ σὺν ὑφυμένα δι' ἣ πεφθημένα μέρη τῶν σώματος, ἄκρως ἁρμόζῃ.

Περὶ Λιβανωτίδος. Κεφ. πζ'.

ΛΙΒΑΝΩΤΙΣ διττή, ἡ μέν τις καρπιμος, ὑπ' ἐνίων δὲ ζέα, ἡ καὶ φάσηλον καλουμένη ὁ καρπὸς καλεῖται· φύλλα δὲ ἔχει μαράθῳ ὅμοια, παχύτερα δὲ καὶ πλατύτερα, ἐχόμενα δῶς ὅπου τῆς γῆς ἑρπόμενα, διώδη· καυλὸν δ' ὅσον πήχεως καὶ μείζονα, μαλάχης ἔχοντα πολλὰς, καὶ ὑπ' ἄκρου σπάδιον· ἐφ' οὗ καρπὸς πολύς, λευκὸς, ἐοικὼς σφονδύλῳ, περιφερὴς, γωνίας ἔχων, δριμὺς, ῥινίζων, ἐν ᾧ δὲ διαμασώμενος θερμαίνων τὴν γλῶσσαν. ῥίζα δὲ λευκὴ, βιμελώδης, ἄζουσα λιβανωτίνου. Ἡ δὲ ἑτέρα κατὰ πάντα ἐοικυῖα τῇ πρὸ αὐτῆς σπέρμα φέρει πλατύ, μέλαν, ὡς σφονδύλιον, διώδης, οὐ πυρώδης, ῥίζαν ἐκ μὲν τῶν ἐκτὸς, μέλαιναν, θλασθεῖσα δὲ λευκήν. Ἡ δὲ λεγομένη ἄκαρπος, κατὰ πάντα ὁμοία οὖσα τῇ προφημέναις, οὔτε καυλὸν φύουσιν, ὅτι αἶγος, οὔτε σπέρμα. φύεται δὲ ἐν πετρώδεσι καὶ τραχυτόποις. πασῶν δὲ κοινὸς ὁ πόα κεκλασμένα λεῖα αἱμορροΐδας σβέννυσι, φλεγμονάς τε ἰᾶται καὶ δυσεντερίαν πρώιμον, καὶ κινδυλώματα καὶ χειράδας, καὶ τὰ δύσπεπτα τῶν ἀποπεμπτῶν συμπίπτει. αἱ δὲ ῥίζαι ξηραὶ σὺν μέλιτι ἕλκη αἴρουσι καθαίρουσι, καὶ τρόφους ἰῶνται καὶ φαγεδαίνας ἁρμόζουσι σὺν οἴνῳ πινόμεναι· ἔμμηνά τε ἄγουσι καὶ ὕδρωπα διαφορεῖ δὲ καὶ οἰδήματα παλαιὰ κεκλασμένα. ὁ δὲ χυλὸς τῆς ῥίζης καὶ τοῦ πόας, ὀξυδερκής, μιγνύμενος μέλιτι καὶ ἐγχριόμενος· ὁ δὲ καρπὸς πινόμενος, τὰ αὐτὰ ποιεῖ. βοηθεῖ καὶ ὑπολιποθυμίαις καὶ παῖς ὁ θάσκαι παλαιαῖς ἀφαιρέσεσιν· ἐκπεμπτικοῖς τε, μετὰ πεπέρεως καὶ οἴνου διδόμενος· ἔστι δὲ καὶ ἱδρωτικὸς, σὺν ἐλαίῳ ἀλιφόμενος· ἁρμόζει καὶ ῥήγμασι, καὶ ἀπόσμασι, ποδάγραις τε, κεκλασμένοις λεῖος σὺν αἰγείνῳ ἀλεύρῳ ἐ ὄξει, ἀλφοῖς τε σμήχει, μιγνύμενος ὄξει δριμυπότῳ. τὴν σπέρμαλι δὲ εἰς τὰ ἀποχήματα χρῆσθαι δεῖ τὸ μὴ τὸ κέγχρου φερούσης λιβανωτίδος. δριμὺ γὰρ ἐστιν καὶ πάχυ πικὺ τῆς ἀρτηρίας.

In quibusdam deest.

In quibusdam non legitur.

Vt libanizontes

In vet. ista ad finem vsque capitis non habentur.

oleo inuncta sudores ciet, contra diuturnos rigores efficax: quin & perfrigeratis resolutisve corporis partibus eximiè conducit.

De Libanotide. C. LXXXVII.

LIBANOTIS duûm est generû: ac vnum quidẽ frugiferum est, à nonnullis zea aut campsanema dictum: cuius semẽ cachryz vocatur: folia fœniculi habet, sed crassiora, latioráque, in rotæ speciem humi strata, odoratáq; caulem cubiti altitudine ac etiamnû maiorẽ, multis concauum alis, ac in cacumine vmbellam, in qua semẽ copiosum, candidum, sphondylio simile, rotundû, angulosum, acre, refinosum, ac in mandendo linguam exurens: radix alba & prægrãdis, thuris odoré habet. Est & genus alterû antedicto omnino consimile, quod semẽ gerit latum, nigrû vti sphondylium, odoratû, minimè feruẽs: ac radice nititur, foris quidẽ nigra, at intus si cõtundatur alba. Quæ verò sterilis libanotis dicitur, penitus antedictarû similitudiné refert, at neq; caulem, neque florem, neq; semen profert: in saxosis autẽ & asperis prouenit. Omnium in genere herba trita & imposita hęmorrhoïdum profluuia sistit, ac sedis inflámationes & condylomata lenit. Concoquit & strumas, atque abscessus qui ad maturationẽ ægrè perducuntur. Siccę verò radices cum melle vlcera repurgãt. Torminibus quoque medentur, ac venenatorû morsibus cõueniunt in vino bibitæ: menses itidé ac vrinas pellũt, & impositæ œdemata vetusta discutiunt. Tam radicis quàm herbæ succus adiecto melle inunctus oculorum aciem exacuit. Potú verò semẽ ad eadẽ pollet. Sed & comitialib⁹ malis, ac veteribus pectoris vitijs auxilio est: itémque regio morbo laborantibus, cum pipere ac vino exhibitũ. Sudores quoq; mouet cum oleo perunctũ. Prodest & ruptis atque conuulsis, itémque podagris, si cum loliacea farina & aceto tritũ illinatur. Vitiligines etiamnum purgat addito aceto quàm acerrimo. Ac semine quidem in potionibus vtendum eius libanotidis quæ cachryn non ferat, quippe illud acre est, & arteriam exasperat.

refinosi odoris

Cæterùm Libanotida tradit Theophraſtus cum erica naſci, foliis lactucæ ſyluestris, amaræ, at candidioribus & aſperioribus: radice verò breui, quæ potu ſupernè infernéque purget.

A Θεόφραστος δὲ ἱστορεῖ μετὰ τῆς ἐρείκης λιβανωτίδα φρίδακι ἀγρίᾳ τῇ πικρᾷ ὁμοια φύλλα ἔχουσαν φύεσθαι, ῥίζαν δὲ βραχεῖαν· καθαίρειν δὲ ἄνω καὶ κάτω ταύτην ποθεῖσαν. λευκότερα μὲν καὶ παχύτερα τὰ φύλλα τῆς φρίδακος.

De Cachry. Cap. LXXXVIII.

Cachry vim habet excalfaciendi & vehementer exiccandi: quare commodè ſmegmatis inſeritur: & contra oculorum fluxiones, capiti inſpergitur, ita vt tertio die tollatur.

B Περὶ Κάγχρυος. Κεφ. πη.

Τὸ μὲν Κάγχρυ δύναμιν ἔχει θερμαντικὴν, ἀναξηραντικὴν σφόδρα· ὅθεν ἁρμόζει σμήγμασι μιγνύμενον. τοῖς ῥεύμασι τῶν ὀφθαλμῶν, ὅτι τῆς κεφαλῆς ἐμπλαττόμενον, καὶ ἐπισπώμενον μετὰ ἡμέρας τρεῖς. Plinius aliter.

De Libanotide coronaria. Cap. LXXXIX.

Libanotis quam Romani roſmarinum vocant, quáque coronarij vtuntur, virgultis eſt tenuibus, circa quæ folia exeũt minuta, déſa, oblõga & gracilia, ſubter incana, ſupernè virentia, graui odore. Vi porrò excalfactoria pollet, regiúmque morbum ſanat, ſi quis ipſam in aqua decoctam ante exercitationes potui dederit, ac deinde laborantem exercitatũ lauet, illique vinum ptopinet. Acopis denique gleucinóque vnguento admiſcetur.

C Περὶ Λιβανωλίδος. Κεφ. πθ.

Λιβανωλὶς ἣν Ρωμαῖοι καλοῦσιν ῥοσμαρῖνον, καὶ ᾧ στεφανοπλόκοι χρῶνται, ῥάβδοι εἰσὶ λεπταί, ἐκ δὲ τῆς ῥίζης φύλλα λεπτά, πικρὰ ἰσθμικὴν καὶ ἰσχνά, ἐνδοθεν λευκά, ἐκ δὲ τῆς ἐκβολῆς χλωρά, βαρύοσμα. Δύναμιν δὲ ἔχει θερμαντικὴν, ἰκτέρῳ ἰατικὴν, καὶ πὶς αὐτὴν ἑψήσας εἰς ὕδατι δῷ πρὸ τῆς γυμνασίων πεῖν, εἶτα γυμνάζων λούῃ καὶ οἴνῳ πατίζῃ. μίσγονται δὲ καὶ ἀκόπῳ καὶ τῷ γλαυκίνῳ χρίσματι. D Orthonon legit.

De Sphondylio. Cap. XC.

SPHONDYLIVM folia quidem habet platano quadantenus ſimilia, ad panacis foliorum figuram accedentia: caules verò cubitali altitudine, aut etiam ampliùs aſſurgentes, fœniculaceos, ſemen in cacumine ſeſeli ſimile, duplex, verùm latius, candidius & magis aceroſum, grauis odoris: flores albos, radicem itidem albam, raphani ſimilitudine. Naſcitur in paluſtribus & aquoſis. Potum ipſius ſemen pituitoſa per aluum excernit, ac medetur etiam hepaticis, ictericis, orthopnoïcis, comitialibus & vuluæ ſtrangulatui. Profundiore verò ſomno captos ſuffitu reuocat. Ex oleo commodè irrigatur in capita phreneticorum, lethargicorum, itémque caput dolentium. Cohibet & herpetas cum ruta adhibitum. Radix autem regio morbo laborantibus & hepaticis exhibetur. Circumraſa eadem & indita

E Σφονδύλιον φύλλα μὲν ἔχει τῇ πόᾳ ἐοικότα· πλατύτερα πρὸς τὰ τῆς πάνακος· καυλὸς δὲ πηχυαῖος ἢ καὶ μείζονας, ἐοικὼς μαράθρῳ· ἄνθημα ὑπ' ἄκρῳ ὅμοιον στεφάνῃ, διπλοῦν, πλατύτερον ἢ καὶ λευκότερον καὶ ἀχρωδέστερον, βαρύοσμον· αἴρει λευκὴ, ῥίζα λευκὴ, ῥαφάνῳ ἐμφερὴς. Φύεται δὲ ἐν ἑλώδεσι καὶ ὑγροῖς χωρίοις. ὁ δὲ καρπὸς αὐτοῦ πολὺς, ἐκκρίνει δὲ χολὴν φλεγματώδη· ἰᾶται δὲ πνιγμὸν ἡπατικοὺς, ἰκτερικοὺς, ὀρθοπνοϊκοὺς, ἐπιληπτικοὺς, καὶ ὑστερικὰ πάσχοντας. καταφυμιῶσι δὲ ἀναπεληφθεὶς καὶ καταφερομένους. σὺν ἐλαίῳ δὲ ἐμβρεχόμενον τῆς κεφαλῆς, ἁρμόζει φρενητικοῖς, ληθαργικοῖς, κεφαλαλγέσι. ἐπέχει δὲ καὶ ἕρπητας σὺν πηγάνῳ καὶ πλατάνου φύλλῳ· ἡ δὲ ῥίζα δίδοται ἰκτερικοῖς καὶ ἡπατικοῖς. ἐξυδατοῦσα δὲ καὶ σὺν ἡδυόσμῳ Goup. Vulgatã ſcripturam verã eſſe ex Plinio facile intelligi poteſt. V. quidam ἐπὶ δὲ ad marginem, ſed perperam. V. καὶ δὲ ὑπὸ πάνακος Al. ὑγροτέροις τοῖς Vaddit ἀπὸ ἴσου χυμοῦ

σβεστικὴ τύλους τοὺς ἐν σύριγξι· τῷ δὲ αὐτῷ χλωρῷ ὁ χυλὸς πρὸς εἰλκωμένα ὦτα καὶ πυορροοῦντα ἁρμόζει. ἀπόλιπε) ἢ ὑλιαζόμενος ὡς τὰ λεπτὰ χυλίσματα.

V. χυλίζωμος

Περὶ Νάρθηκος. Κεφ. ϟά.

ΝΑΡΘΗΚΕΣ, ζύτου χλωροῦ ὄντος ἢ ἐντετριμμένη πινομένη αἱμοπτοϊκοῖς καὶ κοιλιακοῖς ὠφελεῖ, καὶ ἐχεσθίκλοις δίδοται σὺν οἴνῳ, καὶ τοὺς ἐκ ῥινῶν αἱμορραγίας ἐπέχει ἐντιθεῖσα· ὡς ἔλλυχνιον. ὁ δὲ σπέρμα τροφῇ μίνοις πινόμενον ὠφελεῖ, καὶ ἱδρῶτας καὶ ῥιγοῦντας μεῖον ἐλαύνει. ⓘ οἱ δὲ καυλοὶ βρωθέντες, κεφαλαλγεῖς εἰσὶ παρεμπνεύσαντες δὲ καὶ εἰς τοὺς δημεύοντας. ὁ χυμὸς ναρθηκος καυλοῦ ἀναφερόμενος πίπτει μὲν πολλάκις. φύλλα δὲ ἔχει μικρὰ δρῶν ἐμφερῆ, πλατύτερα δὲ πολὺ καὶ μείζονα. ἐξ οὗ καὶ τὸ σαγάπηνον γίνεται, κολαπτομένου πρὸς τῇ ῥίζῃ.

Lacuna legit λύσει ἢ ἐντιθεῖσα ὡς ἐλλύχνιον. Vulg. exempl. carent.

V. ἀναφερόμενος Aliquot exemplaria habent ὑγρὸς χυμὸς ναρθηκος, quod Probus Mesuae citat, ἀμίζει ἀ ἐξαπίνης κορυφὰς ἀναλαμβάνει.

Περὶ Πευκεδάνου. Κεφ. ϟβ.

ΠΕΥΚΕΔΑΝΟΣ καυλὸν ἀμίσπερ λεπτὸν, ἰσχνὸν, μήκει σφόδρα ὅμοιον κώνειον· φύλλα δὲ ἔχει περὶ τὴν ῥίζαν ἴκελα τῷ πικρολιβανῷ· ἄνθος μήλινον· ῥίζαν μέλαιναν, βαρύοσμον, ἀδρὰν, μεγάλην· φύεται ἐν ὄρεσι σκιώδεσι. ὀπίζεται δὲ ἡ ῥίζης ἀπαγῆς ἀποτιμωμένης μαχαίρᾳ, ᾧ τὸ ἀποῤῥέον βύβλοις ἐν σκιᾷ τίθεται· ὑπὸ γὰρ τοῦ ἡλίου εὐθέως ἀφίεται, οὐδὲ ὅλως συλλέγεσθαι κεφαλαλγίαν ποιεῖ καὶ σκοτώματα, ἐὰν μή τις προσιὼν χείσῃ αὐτοῦ τοῖς ῥισὶν ῥοδίνῳ, καὶ τὴν κεφαλὴν προκαταβρέξῃ. ἀχρηστος δὲ γίνεται ὑπιαθεῖσα ἡ ῥίζα. ὀπίζουσι δὲ καὶ οἱ καυλοὶ τὸ χυλίζοντα, καὶ ἡ ῥίζα, ὡς μανδραγόρας. ἥδιον δὲ ἐπέρχει τοῦ ὀπὸς χυλὸς, καὶ τὰ χοϊ ὀκιμῆς. σήπεται δὲ βιαίοτερον ταχέως πιπτόμενος δάκρυσι, ὅμοιον λιβανωτοῦ τοῖς καυλοῖς καὶ ταῖς ῥίζαις προσαπλασσόμενον. τοῦ δὲ ὀποῦ ἄριστος φέρεται ὁ ἐν Σαρδονίᾳ καὶ Σαμοθράκῃ γινόμενος, βαρύοσμος, ξανθὸς, πικρὸς, θερμαίνων τὴν γεῦσιν. ἁρμόζει δὲ σὺν ὄξει καὶ ῥοδίνῳ καταχριόμενος, λήθαργικοῖς, φρενιτικοῖς, σκοτωματικοῖς, ὑπολιπικοῖς, κεφαλαγγικοῖς χρονίοις, παραλυτικοῖς, ἰσχιαδικοῖς, σπωμένοις· καὶ καθόλου τοῖς περὶ νεῦρα παθεσι συλλειόμενος μετ' ἐλαίου

Vulg. exempl. ὁ σαδοῖσα Al. χυλίζουσι ὁ ῥίζα

Vulg. exempl. τῶ χυλὸς ἰσχνὸς

A fistularũ callos exedit. Recentis verò floris succus exulceratis purulẽtísque auribus accommodatur. Cæterùm reliquorũ etiam succorum modo insolatus ad vsum recõditur.

De Ferula. Cap. XCI.

B E viridi ferula medullã epota vtilis est hæmoptoicis atque cœliacis: itémque à vipera morsis in vino datur, erumpentémque naribus sanguinem linamenti instar indita sistit. Semen verò potum torminosis auxiliatur: & perunctum ex oleo, sudores ciet. Caules in cibo sumpti capitis dolores faciunt: ijdem muria quòque cõduntur. Ferula itaque caulem profert ternũm plerunque cubitorum. Folia verò habet fœniculi, at longè crassiora maioráque. (Sagapenum quoque ex ea proximè radicẽ vulnerata manat.)

De Peucedano. Cap. XCII.

D PEVCEDANVM caulem profert tenuem, gracilem, fœniculo similem: comam vero habet circa radicem, copiosam ac densam: florem luteum: radicem nigram, grauiodore, crassam, liquoris plenam. Gignitur in montibus opacis. Excipiendi liquoris ratio hæc est: Tenera radix cultello conciditur, statimque qui profluit è plaga liquor in vmbra reponitur. Sub sole siquidem confestim euanescit. Verum inter colligendum capitis dolorem vertiginémque inducit, nisi quis priùs nares rosaceò perunxerit, eodémque caput irrigauerit. Quæ verò radix liquorem fuderit, deinceps inutilis euadit. Sed & è caulibus vti & è radice & liquor & succus elicitur, haud secus ac è mandragora. At succus liquore inefficacior est, ocyúsque expirat. Interdum etiam priùs concreta reperitur lachryma, thuris similitudine caulibus radicibúsque adhærens. Porro præfertur liquor qui è Sardinia & Samothrace petitur, odore graui, fuluus, feruẽnsque gustu. Ex aceto & rosaceo illitus prodest lethargicis, phreniticis, vertiginosis, comitialibus, diuturno capitis dolore vexatis, paralyticis, ischiadicis & cõuulsis. Ac in vniuersum omnibus neruorum vitijs, ex oleo & aceto con-

uenienter illinitur. Datur & olfactandus in strangulatu vuluæ, paritérque profundiore somno sopitos excitat. Suffitu quoque serpentes fugat. Quin & aurium dolori cum rosaceo vtiliter instillatur, & ad mitigandum dentium dolorem earum cauernis inditur. Sed & contra tussim efficaciter ex ouo assumitur, itémque spirandi difficultatibus, torminibus, inflationibúsque subuenit, ventrem leniter emollit, lienem absumit, ac difficiles partus egregiè adiuuat. Facit & potus ad vesicæ renúmque cruciatus ac distensiones, vuluámque aperit. Radix ad eadem vtilis est, at inefficacior: eius verò decoctum bibitur. Arida quoque trita sordida purgat vlcera, ossium squamas extrahit, veteráque vlcera cicatrice obducit. Incerata denique & malagmata calfacientia additur. Radicem eligito recentem, minimè cariosam, solidam, & odoris plenam. Cæterùm succus ad potiones amaris amygdalis, aut ruta, aut pane calido, aut anetho resoluitur.

A ἔξυς. ἔστι δὲ καὶ ὀσφραντικὸς πηλὸς ὑγιεινὸς, καὶ τῶν κλιθέρομένων ἀναχωτικός· διωκεῖ δὲ θηλεῖα θυμιώμενος· ἁρμόζει δὲ καὶ πρὸς ὠτηλγίαν, σὺν ῥοδίνῳ· ἐπὶ δὲ πρὸς ὀδοντα λύπας, ἐκλυθέντος βρώματος. ποιεῖ δὲ καὶ πρὸς βῆχας μεθ' ὕδατος λαμβανόμενος. δυσεντερίαις τε καὶ στρόφοις καὶ πνευματικαῖς ἀγκύλοσι ἁρμόζει, κοχλίδιον τὸ ἥπιον μαλάσσει, καὶ σπλῆνα τήκει, καὶ δυσοχίαις ἐξόχως ἀρηγεῖ· πρός τε πόνους καὶ ἀλγηδόνας κύστεως καὶ νεφρῶν πιόμενον ποιεῖ· ἀναστομοῖ δὲ καὶ ὑστέρας. χρησίμη δὲ καὶ ἡ ῥίζα πρὸς τὰ αὐτὰ, ἐλαττον ἐνεργοῦσα· πίνεται δὲ αὐτῆς τὸ ἀφέψημα. καθαίρει δὲ καὶ λεία ξηρὰ τὰ ῥυπαρὰ ἕλκη, καὶ λεπίδας ἀποσύεται ἀφίστησι, καὶ ἐπουλοῖ τὰ παλαιὰ μίγνυται δὲ καὶ κηρωτοῖς καὶ μαλάγμασι θερμαντικοῖς. ἐκλέγου δὲ τὴν πρόσφατον, ἀβρωτον, στερεὰν, πλήρη ὀσμῆς. λύεται δὲ ὑπὸ ὄπος εἰς τὰ πεπτικὰ ἀμυγδάλοις πικροῖς, ἢ πηγάνῳ, ἢ ἄρτῳ θερμῷ, ἢ ἀνήθῳ.

B V. μυαγρίας

V. Κνησ

Quidam cæremo

De Gith, seu Melanthio. Cap. XCIII.

Περὶ Μελανθίου. Κεφ. ϛγ'.

MELANTHIVM frutex est exiguus, surculis tenuibus, in binûm dodrantum altitudinem, aut etiam amplius, assurgés, foliis veluti senecionis, at multò tenuioribus, capitulo in cacumine paruo ceu papaueris, oblongo, intrinsecus dissepimentis quibusdam prædito: intra quæ semen latet nigrum, acre & odoratum, quod panibus inspergitur. Caput dolentibus illitum frontí subuenit, itémque incipientibus oculorũ suffusionibus tritum cum irino & infusum naribus. Tollit & lentigines, lepras veteréque tumores ac duritias, ex aceto illitum: circumscarificatos clauos excutit cum vrina vetere impositum. Dentium quoque dolori cum aceto & tæda coctum collutione prodest. Teretes itidem lumbricos expellit illito ex aqua vmbilico. Tritum vero linteolo illigatum & olfactum destillatione laborantes adiuuat. Pluribus autem diebus continuis sumptum menses vrinásque ciet, &

ΜΕΛΑΝΘΙΟΝ θαμνίσκος ἐστὶ λεπτόκαρφος, δίπηχυς, ἢ καὶ μείζων, φύλλα ἔχων ** μικρὰ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἡελιχρύσου, λεπτότερα δὲ πολλῷ, καὶ κεφάλιον ἐπ' ἄκρῳ ἔχων, μικρὸν, ὡς μήκωνος, ὀπτιμήκες, ἔχον κατὰ τὰ σήπια διαφράγματα· ἐν οἷς καὶ τὸ σπέρμα μέλαν, δριμὺ, εὐῶδες, ** καταπλάσσουσιν εἰς ἄρθρα. Ἀρμόζει δὲ καὶ χειμαλγήμασι καταπλασσόμενον τοῦ μετώπου· καὶ τοῖς ἀρχομένοις ὑποχύσεσι, ἐγχεόμενον εἰς τὰς ῥῖνας μετ' ἰρίνου λεῖον· αἴρει δὲ καὶ φακὰς, καὶ λέπρας καὶ οἰδήματα παλαιὰ καὶ σκληρίας, σὺν ὄξει καταπλασθέν· ἐκ πλοκῆς ἀκροχορδόνας ἐκπυάσει, σὺν ** οἴνῳ παλαιῷ ὀπτηθὲν· ὠφελεῖ δὲ καὶ ὀδοντα λίαν μετ' ὄξους καὶ δαδὸς ἐψηθὲν καὶ διακλυζόμενον· ἐκλυάσει δὲ καὶ ἕλμινθας στρογγύλας καταπλασσόμενον τοῦ ὀμφαλοῦ μὲθ' ὕδατος. λεαινόμενον δὲ καὶ ἐποδίσιμον δεθὲν καὶ ὀσφραινόμενον, σὺν καταῤῥοιζοῦσιν ὠφελεῖ· πινόμενον δὲ πλείους ἡμέρας, ἔμμηνα καὶ οὖρα κινεῖ

C

D

Al. ἀνθεμίδι, μικρὸν ἄν

Alter habet λεπτὸν

E

Al. ἐπὶ τοῦ μετώπου, vt & in capite de allio

F

Lacuna legit in v cod. σχεδὸν ἡ λαμπὰς ἀλλ. ἐ παίνη δὲ καὶ διακαυσεως μὲθ' ὕδατος πολύ.

G

λίνῳ γάλα ἄγλι παύῃ καὶ δύσπνοιαν μετ' οἴνου πολλοῦ βοηθεῖ· καὶ φαλαγγιοδήκτοις ὅσον ⊂ ά. μετ' ὄξους πότιμον διδόμενον δὲ καὶ ἑρπετὰ θυμιώμενον. φασὶ δὲ καὶ ὑδαρῆ αὐτὸ πλῆσαι πολλοὺς.

A lac auget. Leuat & spirandi difficultatem addito nitro potum: auxiliatúrque phalangiorum morsibus ex aqua drachmæ pondere bibitum. Incensum quoque serpentes fugat. Sed & ipsum tradunt largiùs epotum enecare.

Περὶ Σιλφίου. Κεφ. ϙδ'.

De Silphio. Cap. XCIIII.

Σιλφιον γίνεται ἐν τοῖς κατὰ Συρίαν καὶ Ἀρμενίαν καὶ Μηδίαν τόποις, καὶ Λιβύῃ. δ' ὁ καυλὸς μάσπιον καλεῖται· ἐμφερὴς ναρθηκι. φύλλα δ' ἔχει σελίνῳ ὅμοια, σπέρμα πλατύ. ῥίζα δ' θερμαντικὴ, δύσπνοος, φυσώδης, κύστεως καὶ κοιλιακὴ· ἅπτεται δὲ χειράδας καὶ φύματα, ἀναληφθεῖσα κηρωτῇ ἢ καὶ ὑπόπτια, σὺν ἐλαίῳ καταπλασθεῖσα· σὺν ἰρίνῃ δὲ κηρωτῇ ἢ κυδωνίῃ ἰχθυδικοῖς ἁρμόζει τοῖς περὶ δακτύλιόν τι ἐξοχὰς αἴρει. σὺν ὄξει ἐνηθὲν καὶ καταπλασθὲν θανασίμων τί ἐστιν αὐτῷ ἁρμακῶν πυομένων· εὔτομός τε ὀφθεὶς μιγνυμένῃ τῇ εἰς ζάμμαλα καὶ ἄλφας συλλείχῃ δὲ ὁ ὀπὸς εἰ χαραχθείη τὸ ῥίζης καὶ καυλοῦ. ἔχει φύσιν δ' αὐτὸς ὁ ὑπέρυθρος καὶ διαυγὴς, σμυρνίζων, καὶ ὃς τῇ ὀσμῇ εὔτονος, μὴ σφοδρὸς, μὴ δ' ἀκοὴν πρὸς τὸν γεῦσιν τῇ γλυκεῖ εὐχερῶς τε διάδηλος ὅτι τὸ λευκὸν χρῶμα. ὁ μὲν τοι Κυρηναϊκὸς καὶ ἐπ' ὀλίγον τις αὐτῷ γεύσῃ, ἐκμαδᾷ καθ' ὅλον τὸ σῶμα τῇ τε ὀσμῇ προσπίπτει· ὥστε γευσαμένῳ τὸ στόμα μὴ δὲ πνεῖν εἰ μὴ ἐπ' ὀλίγον. ὁ δὲ Μηδικὸς καὶ Συριακὸς τῇ δυνάμει εἰσὶν ἀσθενέστεροι, καὶ βρωμῶδες ἔχουσι τὴν ὀσμήν. δοκιμᾶται δὲ πᾶς ὁ ὀπὸς πρὸ τοῦ ξηρανθῆναι, σαγαπηνῷ μιγνυμένου, ἢ ἀλφίτου ἐρεμμένου· ὅταν δὲ χρωὼς τῇ γεύσει καὶ τῇ ὀσμῇ καὶ τῇ ὄψει καὶ τῇ διέσει ἔνιοι δὲ τὸ μὲν καυλὸν σίλφιον ἐκάλεσαν, τὴν δὲ ῥίζαν μαζύδαιον, τὰ δὲ φύλλα μάσπια. πρακτικώτατος δέ ἐστιν ὁ ὀπὸς, εἴτε τὰ φύλλα, εἴτε ὁ καυλὸς. ἔστι δὲ φυσώδης, καὶ δριμὺς, ἀλωπικίας θεραπεύων, σὺν οἴνῳ καὶ πεπέρει, καὶ ὄξει καταχριόμενος· ὀξυδερκίας τε πεπτικὸς, καὶ ἀχλυώδεις τοῦ κύστεως ἀφιστεδαστικὸς σὺν μέλιτι ἐγχριόμενος· τοῖς ὀδοντοπαλγίας τε ἐμβαλλόμενος εἰς τὰ βρώματα, καὶ ἐμπλαττόμενος σὺν λιβανωτῷ· ἐγχριόμενος εἰς ὀφθαλμοὺς, καὶ διακλύζεται σὺν ὀπῷ-

B SILPHIVM seu laserpitium circa Syriam, Armeniam, Mediam & Libyam nascitur. Huius caulis ferulaceus maspetum appellatur: folia sunt apio similia, semen verò latum. Radix excalfacit, ægrè concoquitur, inflationes facit, ac veficæ quoque noxia est. Strumis atque tuberculis cerato excepta, & fugillatis cũ oleo illita medetur. Ischiadicis cum irino aut cyprino cerato conuenit: excrescentia circa sedem tollit, tegmini mali punici incocta cum aceto & imposita: venenis eadem pota resistit: necnon & intinctibus salibúsque admista ori grata est. Colligitur & liquor è radice atque caulibus incisis. Præfertur is modicè ruber atque transluces, myrrhæ æmulus, odoréque valens, minimè porraceus, neque saporis immitis & asperi: qui denique dum liquescit ac diluitur, facilè albescit. At Cyrenaicus etiamsi tantillum quis ipsum degustauerit, madorem toto corpore ciet, éstque odore blandissimo: adeò vt ne os quidem gustanti nisi paululum spiret. Medicus verò & Syriacus viribus minùs valent, & magis virosum reddunt odorem. Porrò liquor omnis anteaquam sicceſcat, addito sagapeno aut fabæ lomento adulteratur: quod maleficium gustu, odore, visu, ac diluendo quoque deprehendes. Sunt verò qui caulem, silphium: radicem, magudarim: & folia, maspeta vocauerint. Efficacissimus est liquor, mox fòlia, postremò caulis. Est autem ille acris, inflationésque facit, alopecias cum vino, pipere & aceto peruncta sanat: cum melle illitus oculorum aciem exacuit, incipientémque suffusionem dissipat. In dentium doloribus cauernis ipsorum inditur, aut cum thure linteolo illigatus circumponitur, aut denique cum hys-

Λίνῳ — Vide addit. ad. Ruellium.
Ὀρίβ. addit φυλλοῦ ὁ καυλὸς μαλακτικὸς βηχικοῖς ὠφέλιμος ὑποτίθεται ἀντὶ τοῦ ὑσσώπου ἐν τοῖς ἀναπνευστικοῖς. — Orib. addit folium caulis emollitorium pectoris affectibus vtilis, quod hyssopi vsum in vulgatis exemplaribus desiderari notat.
V. quidem habet φυσωδέστερος οὗτος. — Vsque ad ἀκοὴν caret.
V. πρὸς τὸν χρωματισμὸν. — In vet. cod. additum legit Lacuna in margine.
V. πνεῦσαι χρωματίσῃ. — V. fabæ farina.

ſopo & ficis in poſca decoctis colluitur. A rabioſo cane demorſis prodeſt vulneribus impoſitus, itidémque valet ad omnium quæ virus eiaculantur animantium, venenatorúmque telorum ictus, ſeu potus, ſeu etiam illitus. Scorpionum plagis oleo dilutus circumlinitur: gangræna obſeſſis partibus prius ſcarificatis infunditur: necnon & carbunculis cum ruta, nitro & melle, aut etiam per ſe: clauos callóſque priùs circumciſos extrahit, ſiquidem cerato ficcorúmve ficuum carne ſubactus antea fuerit. Sanat & lichenas recentes ex aceto: itidémque ſarcomata & polypos, ſi cum atramento ſutorio aut ærugine per dies aliquot illinatur: verùm extuberantia forfice extrahi oportet. Arterijs quoque longo tempore exaſperatis opitulatur: ac vocem quæ derepente irraucuerit aqua dilutus ſorbitione confeſtim expedit. Quin & vuam illitus cum melle reprimit, ac in anginis ex aqua mulſa vtiliter gargarizatur. Veſcentibus lætiorem colorem conciliat, ad tuſſim commodè in ſorbili ouo datur, itémque pleuriticis in ſorbitionibus. Ictericis verò & hydropicis cum aridis ficis vtiliter exhibetur. Rigores etiam cum pipere ac thure in vino potus diſcutit. Tetano opiſthotonóque diſtentis oboli pondere deuorandus datur: hærentes gulæ hirudines gargarizatus cum aceto decutit. Quibus hauſtum lac intus concreuerit, & comitialib', ſumptus ex aceto mulſo ſuccurrit. Potus verò cum pipere & myrrha menſes ciet: cœliacos in acino vuæ ſumptus adiuuat: denique cum lixiuio potui datus repentè conuulſis ruptíſque prodeſt. Ad potiones autem amygdalis amaris, ruta aut pane calido diſſoluitur. Cæterùm foliorum ſuccus eadem præſtat, at liquore multò ineſficaciùs. Eſtur porrò vtiliter cum aceto mulſo ad purgandas fauces, maximè verò cùm ſuppreſſa interceptáve vox eſt: veſcuntur & ipſo cum lactucis, erucæ loco. Sed & altera fertur magudaris in Lybia naſci, radix laſerpitio ſimilis, at

A πυ, καὶ σύκοις ἀφεψημένοις σὺν ὄξυκράτῳ. καὶ ἐπὶ λυσοδήκτων δὲ ὠφελῇ ἐπιτιθέμενος τοῖς τραύμασι, καὶ ὅτι πρὸς ἰοβόλων ζώων πάντων καὶ τὰ φαρμακωδῶς τοξευμένων, ἐγχριόμενος καὶ πινόμενος· ὅτι δὲ σκορπιοπλήκτων ῥαφὰς διεθεῖς καθυγιείφεται, καὶ ὅτι γαγγραινωμένων προκαθαρθέντων ἰνίοις

B πρός τε αἵμαρκας μετὰ πηγάνου καὶ νίτρου καὶ μέλιτος, ἢ καθ' ἑαυτὸν, ἄλσις τε καὶ τύλους αἴρει προπεριχαραχθέντας, ἐπιμαλαχθεὶς κηρωτῇ, ἢ σύκων ξηρῶν τῶν ἐντὸς θεραπεύει καὶ λειχῆνας πρόσφατους σὺν ὄξει. Σαρκώματα δὲ καὶ πολύποδας μετὰ χαλκάνθου ἢ ἰῶδι ἀλεγρεόμενος

C ὅτι ἡμέρας τινὰς ὅπισθεν τῆς ἐξοχῆς σὺν σαρκολαβίδι. ἀρτῆσαι δὲ καὶ βρόγχων χρονίαις παχύτησι· φωνήν τε αἰφνιδίως διαπνιγεῖσαν ὕδατι διεθεὶς καὶ ἐπιῤῥοφηθείς, αὐτίκα ἀποκαθαίρει· κνίδας τε σὺν μέλιτι ἀλεγρεόμενος συναγχικοῖς τε ἀναλαρυγάρισμα μετὰ μυῤῥαίου ὠφέλιμον.

D ὑστέροις ποιεῖ λαμπρὰ ὀμμάτων ἐν διαίτῃ· βηχί τε ἁρμόζει σὺν ὠῷ ῥοφηθὲν δι' ὀδόντος· πλευριτικοῖς τε σὺν ῥοφήματι. ἰκτερικοῖς τε καὶ ὑδρωπικοῖς ὠφελίμως δίδοται μετὰ σύκων ξηρῶν. λύει καὶ ῥίγη σὺν πεπέρει καὶ λιβανωτῷ πολλοῖς, καὶ οἴνῳ τε-

E τραγμένοις τε καὶ ὀπισθοτονικοῖς ὀβολοῦ ὁλκὴν καθεψήσας, δίδου καλαπότῳ. διὰ λαγὼς δὲ τοῖς προσοχλοῦσι τῇ καλῇ πόσει, ἀναγαργαριζόμενος μετ' ὄξους ἀποδήλει· καὶ τοῖς γάλα τι θρομβωμένον ἔνδον πίνουσι καὶ ὅτι λιπιθυμικοῖς μετ' ὀξυμέλιτος λιφθεὶς βοηθεῖ· πολλοῖς δὲ σὺν πεπέρει καὶ σμύρνῃ, καταμήνια ἄγει· καὶ

F λιακοῖς τε ὠῷ ῥαγὶ λαμβανόμενος σαφυλῆς ὠφελεῖ· μετὰ δὲ χυλίας πολλοῖς, ὠφελεῖ τὰ αἰφνίδια ἀποσμήματα, ῥήγματα. ἀμολύνεται δὲ εἰς τὰ ποτήματα ἀμυγδάλοις πικροῖς, ἢ πηγάνῳ, ἢ ἄρτῳ θερμῷ. ὁ δ' ὁπὸς τῶν φύλλων τὰ αὐτὰ μὲν ποιεῖ, πλατανίνου δὲ ἧττον ἐαθίεται δὲ μετ' ὀ-

C ξυμέλιτος ἁρμόζων πρὸς ἀρίπρίδιν, μάλιστα δὲ ἀποκοπίσιν ἤχους· χρῶνται δὲ αὐτῷ καὶ μετ' ἀμυγδάλων ἐαθιόντες αὐτὸ διὰ ζώμου.

Λέγεται δὲ καὶ ἑτέρα μανδραγόρας γυναικεία ἐν Λιβύῃ, ῥίζα παρσνία σιλφίῳ,

Legit in antiquo Lacuna, pro καλαμοῦ αὐλῶνος.

Legit Lac. in v. cod. σὺν πεπέρει καὶ λιβανωτῷ πολλοῖς In vet. cod. poſtremus καὶ olim hoc loco legitur.

Addit Orib. ἢ μέλιτι ἢ ὄξους

Alter πὸν αὐτὸν ὀπὸν

ἧττον ὁ παχεῖα, δριμεῖα καὶ χαύνη, καὶ ὀπὸν μὴ ἔχουσα: ποιεῖ δὲ τὰ αὐτὰ τῷ σιλφίῳ.

Περὶ Σαγαπήνου. Κεφ. ϛέ.

ΣΑΓΑΠΗΝΟΝ ὀπός ἐστι πόας ταρσηκοειδοῦς, γιγνομένης ἐν Μηδείᾳ. διαφέρει δὲ ἡ αὐτῆς τὸ διαυγὲς, ἔξωθεν μὲν ξανθὸν, ἔκτὸς δὲ λευκὸν, ὅλον μεταξὺ ὀποῦ σιλφίου καὶ χαλβάνης, δριμὺ ἐν τῇ γεύσει ποιεῖ δὲ πρὸς ῥῶγμον καὶ πλευρᾶς πόνον, ῥήγμασι, σπάσμασι, βῆχας χρονίους· πάσχοντα τὸ ἐν πνεύμονι αἷμα καθαίρει. διδοται δὲ καὶ ἐπιληπτικοῖς, ὀπισθοτονικοῖς, σπληνικοῖς, παραλυτικοῖς, καὶ τετριμμένοις, καὶ ἐκ ψυχρῶν πυρετοῖς ἐν ποτήμασι, καὶ ἐν συγχρίσμασι δὲ ὠφελίμως προσάγεται· ἄγει καὶ ἔμμηνα, καὶ ἔμβρυα φθείρει πινόμενον μὲθ' ὑδρομέλιτος. ἀρήγει καὶ θηριοδήκτοις μετ' οἴνου λαμβανόμενον· διαχρίει καὶ ὑστερικῶς πνιγομένας μεθ' ἕξεως ὀσφραινόμενον. οὐλάς τε ἀποσμήχει ἐν ὀφθαλμῷ, καὶ ἀμβλυωπίας καὶ τὰ ἐπισχόντα τῆς κόρης καὶ νεφώματα. διαλύεται δὲ ὡς καὶ ὁπός, πηγάνῳ ἢ ὕδατι καὶ πικροῖς ἀμυγδάλοις, ἢ μέλιτι ἢ ἄρτῳ θερμῷ.

minùs crassa, acris verò ac fungosa, nullóque prægnans succo: eiusdem tamen cum laserpitio facultatis.

De Sagapeno. Cap. XCV.

SAGAPENVM ferulaceæ herbę liquor est, quę quidem in Media nascitur. Præfertur id quod transluceat, foris quidem fuluo, intus verò albo colore, medio inter laser & galbanum odore, acrique gustu. Prodest pectoris lateríque dolori, ruptis, conuulsis, tussibus vetustis, humoréque crassos pulmoni molestos expurgat. Datur & comitialibus, opisthotonicis, lienosis, paralyticis, perfrigeratis, & contra febres per circuitum repetentes in potu, & ad vnguenta quoque vtiliter adhibetur. Sed & menses trahit, ac fœtus enecat cum aquæ mulsa potum. Medetur & venenatorum morsibus ex vino sumptum: olfactum etiamnum ex aceto eas quæ ab vtero strangulantur, excitat. Oculorum cicatrices, heberudines offusámque pupillis caliginem, suffusionéque detergit. Cæterùm ceu laser ruta, aqua & amaris amygdalis, aut melle panéve calente resoluitur.

Περὶ ΕΥφορβίου. Κεφ. ϛζ.

ΕΥΦΟΡΒΙΟΝ, δένδρον ὅστε ταρσηκοειδὲς Λιβυκὸν, γιγνώμενον ἐν τῷ κατὰ Μαυρουσίαν Τμώλῳ· ὅπου μετὰ ἀφρομυζάτου· ὃν διοδεύοντες οἱ τῇδε ἄνθρωποι συλλέγουσι διὰ τὸ ὀπτιανόμενον τ πυρώσεως. χιλίαις γοῦν προβατίαις πεπλυμμέναις παρεδηλώσαμεν τὸ δένδρον, μακρόθεν ἀκοντίοις διαφθεῖραι αὐτῆς καὶ καυλόν. βύσσιος δὲ ὡς ἔκ τινος ἀγγείου πολὺς ἀποχεῖται ὁπὸς εἰς ταῖς χιλίας. καὶ ἀπορραίνεται δὲ καὶ εἰς τὴν γῆν ἐξακοντιζόμενος. ἔστι δὲ δύο γήνη τοῦ ὀποῦ· ὃ μὲν διαυγὲς ὡς ζαρκόκολλα, καθὰ μεγέθος ὀφθῆναι· ὃ δέ τι ἐν ταῖς χιλίαις ὑελοειδὲς καὶ στυφτικὸς. δολοῦται δὲ καὶ τῇ σαρκοκόλλῃ καὶ κόλλῃ μιγνυμένοις. ἐκλέγου δὲ τὸ διαυγὲς καὶ δριμύ· δυσδοκίμαστος δὲ ἔστιν ὁ τῇ γλώσσῃ λαμβανόμενος, διὰ ὃ ἅπαξ δηχθέντος τ γλώττης ὑπομένειν τὸ πῶμα ἐφ' ἡμέρας χρόνον,

EVPHORBIVM Libyca arbor est, ferulæ speciem habens: quæ quidē in Atlante Mauritaniæ monte nascitur: acerrimo referta liquore, quem propter eximium feruorem non citra metum incolæ ita colligunt. Quillos ventres lotos arbori circumligant, & è longinquo ipsius caudicem contis hastilibúsve vulnerant, confestimque è plaga ceu ex vase quodam copiosus liquor in subditos ventriculos effluit: pars etiam humi præ eruptionis impetu spargitur. Sunt porro liquoris duo genera: vnum sarcocollæ modo pellucidum, erui magnitudine, alterum in ventriculis quibus excipitur coit, vitri effigie. Adulteratur verò sarcocollæ & glutini mixtione: sed eligendum transluceus & acre. Difficile autem est quod è gustu petitur saporis experimentum: quippe cum leui linguæ contactu os accēsum diu detineat,

Mors. legit κλωσί. Add vet. καὶ τῷ δακτυλῷ

Legit Lacuna in antiquo κ' κ' μικρὸν quam locationem sibi perplacere annotat.

adeò vt quicquid deinde exhibetur, euphorbium esse videatur. Cæterùm id, Iuba in Libya regnante, primò inuentum fuisse in confesso est. Vim porrò habet liquor inunctus suffusiones discutiendi, sed potus die tota exurit: quare melli collyriisque pro acrimoniæ ratione admiscetur. Prodest & coxendicum doloribus, in aromatica potione haustus: ossium verò squamas eadem die remouet. Verùm qui eo vtuntur oportet ossibus circumiacentem carnem inditis linamentis aut ceratis probè communiant. Cæterùm, tradunt nonnulli nihil incommodi sensuros qui à serpente demorsi fuerint, siquidem incisa ossetenus capitis cute intritus liquor infundatur, vulnúsque posteà consuatur.

A ὥστε πρῶτον προσχρήσθαι, εὐφόρβιον δοκεῖν εἶναι. ἡ μέν τις εὕρεσις αὐτοῦ καὶ Ἰόβα τοῦ βασιλέως τῆς Λιβύης ἐπιγνώσθη. Δύναμιν δὲ ἔχει ὁ ὀπὸς διαφορητικὴν ὑπο-
B χυμάτων, ἐγχριόμενος, πυρεῖ μέντοι τινὰ διὰ ὅλης τῆς ἡμέρας· πολλοῖς δὲ καὶ μέλλει μίγνυται, καὶ χλυείοις, καὶ ἀναλογίαν τῆς δριμύτητος. ἁρμοζει καὶ ἰσχιακοῖς ἀλγήμασι, μιγνὺς ἀφρῷ παπύρου καὶ πτισάνῃ· ἀφίστησι δὲ καὶ λεπίδας αὐτημερόν. δεῖ μέντοι τοὺς χρωμένους ἀσφαλίζεσθαι τὰ ἕλκη τοῖς ὀστοῖς ἐρίοις μύττοις ἢ κηρωτοῖς. ἰσχυρῶσι δέ τινες μηδὲν προσχλευδῶν δυσχερὲς τοῖς ἑρπετοδήκτοις, ἐὰν
C ὗς ἐκκόψας ἄχρις ὀστέου τὸ δέρμα τῆς κεφαλῆς, ἔγχέῃ καὶ ὁπὸν λάβῃ, καὶ ῥάψῃ τὸ τραῦμα.

Epit. addit ψυχῶν

De Galbano. Cap. XCVII.

Περὶ Χαλβάνης. Κεφ. ϛζ.

GALBANVM liquor est nascétis in Syria ferulæ: id nonnulli Metopium vocant. Est in hoc genere probatissimum quod thuris (aut hammoniaci) præbet effigiem, grumosum, purum, pingue, minimè lignosum, at nonnihil retinens admixti seminis ac ipsius quoque ferulæ, odore graui, neque valde humidum, neque etiam penitus aridum. Admixtis resina, faba fresa & hammoniaco, adulteratur. Ex-
E calfacit porrò galbanum, vrit, attrahit atque discutit: menses ac partus trahit appositu vel suffitu: lentigines cum aceto & nitro illitum tollit. Deuoratur autem ad tussim veterem, & spirandi difficultatem, suspiria, rupta atque conuulsa. Cum vino quoque & myrrha epotum toxico aduersatur. Sed & simili
F modo sumptum partus mortuos extrahit. Imponitur & lateris dolori atque furunculis. Comitiales, vuluæ strangulatus, & vertiginosos olfactu suscitat. Si vratur, fugat nidore venenatas bestias, ac perunctos itidem ab illarum morsu vindicat: serpentes cum sphondylio & oleo admotum necat. Dentium do-
G lorem oblitum, aut cauernis inditum sedat. Prodesse quoque difficulter mœrentibus existimatur. Sed & ad potiones, amaris amygdalis &

Χαλβάνη ὁποῖός ἐστιν ἁρμόττει ὁ Συρίᾳ γιγνόμενος, ὃν ἔνιοι μετώπιον καλοῦσιν. ἔστι δὲ αὐτοῦ ἀρίστη λιβανωτοειδής, χονδρώδης, καθαρά, λιπαρά, ἄξυλος, ἔχουσα δέ τι τοῦ σπέρματος· καὶ τοῦ νάρθηκος μιγνυμένου, ὀσμὴ βαρεῖα, ὅτ' ἄγαν ὑγρά, ὅτε πάλιν καταξηρος. δολοῦται δὲ αὐτὴ, μιγνύντες ῥητίνῃ, καὶ ἐρεσμὸν καὶ ἀμμωνιακόν. Δυνάμιν δὲ ἔχει θερμαντικὴν, διαφορητικὴν· προσιδιάζει δὲ καὶ ἐπιθυμιωμένη, ἔμμηνα καὶ ἔμβρυα ἄγει· φακοὺς τε αὐρῇ μετ' ὄξους καὶ νίτρου ὑπιπλαθεῖσα καθαιρεῖ· καὶ πρὸς παλαιὰς βῆχα, δύσπνοιαν, ἄσθματα, ῥήγματα, ἀσάσματα. αὐτὸ παχύ δὲ καὶ τοξικῷ σὺν ὄξει καὶ σμύρνῃ πολλοῖς. ἐκλυόμενά τε καὶ τεθνηκότα ἔμβρυα ὁμοίως ληφθεῖσα· ὑπιπτόμενα δὲ πρὸς ὀδύνην πλευρᾶς, καὶ πρὸς διαλιθιάσεις· ὑπιλαπτικούς τε καὶ ὑστερικοὺς πόνους καὶ σπασμωδικοὺς ὀσφραινομένη διεγείρει, πνεῦμα τε ἐμμανῶς διώκει, τούς τε συγχεομένους ἀδικεῖ τρῖψαν σὺν σφονδύλῳ δὲ καὶ ἐλαίῳ πεσσευθεῖσα, ἑρπετὰ κτείνει· ὀδόντος τε πόνον πεσσευθεῖσα ἢ ἐμπλασθεῖσα εἰς τὸ ῥῶγμα, παύει. δοκεῖ δὲ καὶ δυσυγρῶσι ποιεῖν· λύεται δὲ καὶ εἰς μὺ τὰ ποτήματα, πικροῖς ἀμυγδάλοις καὶ

Corn. legit ἐκλυόμενα, aut περιπλαθεῖσα Goup. alter, διαλυόμενα

ὕδατι ἢ πηγάνῳ ἢ μίλτῳ ἢ ἄρτῳ θερμῷ· ἄλλως δὲ μυκτηρίῳ ἢ χαλκῷ κεκαυμένῳ, ἢ χολῇ ὑγρᾷ. καθαίρειν δὲ αὐτὸν βουλόμενος, κάλει εἰς ζεστὸν ὕδωρ· ἔκκειται γὰρ αὐτῆς, ὅταν παλάσῃ ὃ ῥυπαρόν· ὅταν χωρίσῃς οὕτως· εἰς ὀθόνιον καθαρὸν ὀρθαὶ σὺν ὀδίσας ἀποκρέμασον εἰς χαλκοῦν πυξίδα ἢ ὀστράκινον ἀγγεῖον, ὡς μὴ ἅπτεσθαι τοῦ πυθμένος τὸ ἀγγεῖον Ⓦ ἔνδισμον· καὶ πωμάσας, εἰς αἰαβεστὸν ὕδωρ κάθες· οὕτω γὰρ ὃ μὲν τοσοῦτον ἀποζεσθήσεται ὡς δὶ ἡμισυ. τὸ δὲ ξυλῶδες ἐν τῷ ὀθονίῳ μενεῖ.

Lacuna ex vet. codd. sic τὸ ἀχρεῖον ἀποκαθαίρεται· τὸ δὲ &c.

Περὶ Ἀμμωνιακοῦ. Κεφ. ϟη.

ΑΜΜΩΝΙΑΚΟΝ, καὶ τοῦτο ὀπός ἐστι ταρίχους, ἁλισμένου ἐν τῇ κατὰ Κυρηναίου Λιβύῃ· καλεῖται δὲ αὐτὸ ὅλος ὁ θάμνος ζειὰ τῇ ῥίζῃ, Ἀγασυλλίς. ἐγκριτέον δὲ αὐτοῦ τὸ εὔχροον καὶ ἀξυλον καὶ ἀλίθης, ὃ λιθαρώδιζον τοῖς χόνδροις, καθαρὸν καὶ πυκνόν, μηδεμίαν ἔχον ῥυπαρίαν, κατοσίζον τῇ ὀσμῇ, πικρὸν δὲ τῇ γεύσει. καλεῖται δὲ τὸ μὲν τοῦτο, θραῦσμα· τὸ δὲ χεῦδις ἢ λιθῶδες, φύραμα. ἁλᾶται δὲ ἐν Λιβύῃ κατὰ Ἄμμωνα. χυλὸς ὢν δένδρου ναρθηκοειδοῦς. Δύναμιν δὲ ἔχει μαλακτικὴν, διαπαστικὴν, θερμαντικὴν, διαφορητικὴν σκληρωμάτων τε καὶ φυμάτων· κοιλίαν τε ὑποτάττει πολύ· καὶ ἕμπυα καθαίρει. σκληρὰ τήκει μετ' ὄξους ἀ πολύ. καὶ ἄρθρα καὶ ἰσχία ἀλγήματα παραιτεῖται· βοηθεῖ δὲ καὶ ἀσθματικοῖς, ὀρθοπνοϊκοῖς, ὑπολιπποῖς, καὶ τοῖς ὑγρασίαν ἐν θώρακι ἔχουσιν, ἐκλειχόμενον μετὰ μέλιτος, ἢ πτισάνης ῥοφούμενον χυλῷ· ἄγει δὲ καὶ οὖρα αἱματώδη· σμήχει δὲ καὶ τὰ ἐν ὀφθαλμοῖς λευκώματα· καὶ τραχύτητας βλεφάρων τήκει. λειοῖ δὲ σὺν ὄξει καὶ ὑπόστασιν, παύει δὲ καὶ οὐλοῦσα καὶ ἡπατικὰ σκληρίας· λύει δὲ τοὺς κατὰ τὰ ἄρθρα πόρους μετὰ μέλιτος καταπλασσόμενον, ἔτι καὶ πίσσῃ μιχθέν· ποιεῖ καὶ κατὰ κόπους καὶ

Ita legendum ſuſpicatur Marcellus.

V. quidem hic carent ὃ ἀξυλον &c.

V. καὶ τὸ ἰσχὶν ἐξ ἡμισυ σκληρὸν

V. pro his θραῦσμα tantum ἁλατὸν legit.

Lacuna legit ὃ vet. codice ἀκεῖται ὃ ὑπόχ.

In quibuſdam codicibus legi annotat Marcellus κατοδὸν

A aqua, aut ruta mulſáve aut calido pane reſoluitur: aliàs verò meconio, æréve vſto aut felle liquido. Porrò ſi purgare galbanum voles, in feruenté aquam demittito: nam vbi liquatum fuerit, ſordes ex parte fluitabunt, quas ita facilè ſeparabis: dein galbanum ipſum mundo raróque linteo illigatum in æreа
B pyxide aut fictili vaſe ita ſuſpendito, vt ne faſciculus nodulúſve vaſis imum contingat, opertúmque vas in feruidam aquam demittito. Sic enim quod vtile præſtantiúſq; fuerit, vtpote per colum eliqueſcet: lignoſum verò quicquid fuerit intra linteum remanebit.

C *De Hammoniaco. Cap. XCVIII.*

EST & Hammoniacum ferulæ liquor, quæ in ea gignitur Africæ parte quæ eſt iuxta Cyrenen. Totus cum radice frutex Agaſyllis appellatur. Maximè probatur quod bene coloratum eſt, ligni & calculorum expers, thuris glebarum granorúmve ſimilitudine, ſyncerum
D ac denſum, nulla ſorde ſpurcatum, caſtoreum odore imitans & guſtu amarum. Hoc genus thrauſma, quaſi fragmétum ſeu friaturam dicas, appellatur: alterum quod terræ calculorúmve eſt particeps, phyrama, id eſt, mixtura ſeu miſcella. Gignitur verò ſuccus is in Africa iuxta Hammonis templum è ferulacea ſtillans arbore. Vim habet
E molliendi, attrahendi, calfaciendi, atque duritias & panos diſcutiendi. Potum, aluum ſubducit, partúſque extrahit: lienem verò conſumit cum aceto drachmæ pondere hauſtum, & articulorum coxendicúmque doloribus liberat. Auxi-
F lio quoque eſt anhelatoribus, orthopnoïcis & comitialibus: item quibus humor intra pectus hæret, ſi ex melle delingatur, aut cú piſſanæ ſucco ſorbeatur. Cruentas etiam vrinas pellit: necnon & oculorum albugines abſtergit, & genarum ſcabritias abſumit. Tritum autem ex aceto & impoſitum lie-
G nis iocineriſque duritias emollit. Sed & tophos ſeu nodos diſſoluit qui circum articulos occalluerunt, cum melle adhibitú, aut etiam pici admixtú. Facit & ad laſſitudines & iſchia-

iſchiadas, ſi additis aceto, nitro & cyprino oleo, acopi vice, perungantur.

De Sarcocolla. Cap. XCIX.

SARCOCOLLA lachryma eſt arboris in Perſide naſcentis, thuri tenui ſimilis, ſubfulua, guſtu amariuſcula. Vim habet vulnera glutinandi, & oculorum fluxiones inhibendi. Inſeritur & emplaſtris. Cæterùm admixto gummi adulteratur.

De Glaucio. Cap. C.

GLAVCIVM ſuccus eſt herbæ quæ ad Hierapolin Syriæ naſcitur, foliis ferè cornuti papaueris, pinguioribus tamen & in terram ſparſis, graueolentibus & guſtanti amarioribus, quæque ſunt crocei coloris ſucco copioſo prædita. Folia in ollam conjecta, ſemifrigidis clibanis calfaciunt indigenæ, vſquedum flacceſcant: deinde contuſis ſuccum exprimunt. Eſt porrò eius vſus ad oculorum affectus circa principia: quippe cùm refrigerandi vim habeat.

De Glutino. Cap. CI.

GLVTINVM quod xylocollam vel taurocollam vocãt, præſtantiſſimum Rhodiacum, quod è corijs bubulis conficitur. Candidum verò id eſt atque tranſlucens: at nigrum minùs probatur. Reſolutum in aceto, impetigines lepráſq; ſummæ cutis delet. Ex aqua verò calida dilutum & illitum non patitur ambuſta in puſtulas attolli. Vulnerarium quoque eſt, ſi melle & aceto diluatur.

De Ichthyocolla. Cap. CII.

ICHTHYOCOLLA, hoc eſt, piſcium gluten, venter eſt piſcis cetacei. Præſtat natione Pontica, candicans, ſubaſpera, minimè ſcabra, & quæ celerrimè liqueſcit. Vtilis eſt in emplaſtris cephalicis, leprarúmque medicaminibus, & tetanothris quæ faciei cutem erugant & extendunt.

De Viſco. Cap. CIII.

VISCVM optimum quod recens eſt, colore intus porraceo, extra

A ἰχαάδας συγχεόμενον, μηλῷ ὄξει καὶ νίτρῳ καὶ κυπρίνῳ ἐλαίῳ ἀντὶ ἀκόπου.

Περὶ Σαρκοκόλλας. Κεφ. ϛθ.

Η δὲ σαρκοκόλλα ἔστι δάκρυον δένδρου ἡμιωμβίου ἐν Περσίδι, ἐοικὸς λιβανωτῷ λεπτῷ, ὑποπύρρον, ἔμπικρον τῇ γλώσσῃ. Δύναμιν δὲ ἔχει κολλητικὴν τραυμάτων καὶ ἐφεκτικὴν τῶν ἐν ὀφθαλμοῖς ῥευμάτων· μίγνυται δὲ καὶ ἐμπλάστροις. διαλύεται δὲ κόμμεως αὐτῇ μιγνυμένου.

B Veteres quidam non habent καὶ ſq. vſque ad μίγνυται.

Περὶ Γλαυκίου. Κεφ. ρ'.

ΓΛΑΥΚΙΟΝ χυλός ἐστι βοτάνης κατὰ Ἱεράπολιν τῆς Συρίας ἡμιωμβίης. ἔοικε δὲ αὐτῆς τὰ φύλλα τῇ κεραλείτιδος μήκωνος, λιπαρώτερα δὲ καὶ χαμαίζηλα, καὶ βαρύοσμα καὶ πικρότερα ἐν τῇ γλώσσῃ· χυλὸν δὲ ἔχει πολὺν χροιζοντα. Τούτης τὰ φύλλα βάλλοντες ἐν ὀπτῇσιν εἰς χύτρας, θερμήνουσιν ἐν χυλαίοις ἡμιψύκτοις ἄχρι μαλασμοῦ, εἶτα ἐκθλάσαντες ἐκ θλίβουσι χυλόν· ἔστι δὲ ἡ χρῆσις αὐτοῦ πρὸς τὰ ὀφθαλμικὰ ἐν ξηρῇ ψυχρᾷ δίητῃ.

C V. in ſupra addit, ἔξω τ' ὑπόχρως εἶναι

Περὶ Κόλλης. Κεφ. ρά.

ΚΟΛΛΑ ἐν ἔνιοι ξυλοκόλλαν καλοῦσιν ἢ ταυροκόλλαν, καλλίστη δέ ἐστιν ἡ Ῥοδιακή, ἐκ τῶν βοείων βυρσῶν σκευαζομένη· ἔστι δὲ λευκὴ καὶ διαυγὴς ἡ ταύτην ἢ μέλαινα ἧττον. Δύναμιν δὲ ἔχει, λυθεῖσα ὄξει, λειχῆνας καὶ λέπρας τοῦ ὑπαλγοῦς ἀφιστᾶσι· πυκάζουσί τε οὐκ ἐᾶν φλυκταινοῦσθαι μὲν ὕδατος θερμοῦ ἐνεθεῖσα καὶ καταχεομένη. ἔστι δὲ καὶ γαυμαλική, διεθεῖσα μέλιτι καὶ ὄξει.

D V. aliqui nõ habent.

Περὶ Ἰχθυοκόλλης. Κεφ. ρϚ.

Η δὲ ἰχθυοκόλλα λεγομένη κοιλία ἐστὶν ἰχθύος κητώδους. Ἀφ. φέρει δὲ ἡ ἐν Πόντῳ ἡμιωμβίη οὖσα λευκή, ὑποτέφρα χρώς, οὐ ψωρώδης, πάχεα τηκομένη. ὠφελεῖ δὲ εἰς τὰ κεφαλικὰ ἐμπλάστρους καὶ λεπρικὰς δυνάμεις, καὶ εἰς τετανώθρα τῶν προσώπων.

E Marc. legit In antiquo mſſo. Alii, κητώδους. Marc. legit ὑπὸ τὸν χρῶτα.

Περὶ Ἰξοῦ. Κεφ. ργ'.

ΙΞΟΣ καλὸς ἐστὶν ὁ νέος, καὶ προσφυὴς ξύλῳ ᾧ χρώματι καλὰ τὰ ἐντὸς, ἐκτὸς

Marc. legit λέπει

ὁ ὑποξάνθος, μὴ δὶν ἔχων χυμὸν ἢ πιτυ- A
ρώδη. γίνεται δὲ ἐκ τινος καρποῦ φερομένου, ὁμοιουμένου τὸ δρυΐ τῇ ἐχούσῃ τὰ φύλλα ὅμοια πίσῃ· κέπτεται δὲ ὁ καρπὸς, εἶτα τὸ ξύλον), εἶτα τὸ ὕδατι ἕψεται, ἔνιοι δὲ μαστάμενοι αὐτὸν ἐργάζονται. γίνεται δὲ καὶ ἐν μηλέαις καὶ ἀπίοις, καὶ ἄλλοις δένδροις· εὑρίσκεται δὲ καὶ παρὰ ῥίζαις θάμνων τινῶν. Δύναται δὲ ἀφαιρεῖν, μὲν λέπειν, ὀπτᾶσθαι, συμπίπτειν φύματα, περιλίπας, καὶ τοὺς ἀνὰ σάρκας, μυγμὸς ῥιπίζειν καὶ κηρῷ ἴσον· ὀπτυγκλίδας τε ἐν αὐλωνίῳ ἰᾶται· σὺν λιβανωτῷ δὲ ἕλκη παλαιὰ καὶ κακοήθη ἀποσάσης μαλάσσει· καὶ αὐλοῦς πηγνὺς ἀσβέστῳ ἢ χαλάζῃ λίθῳ ἢ ἀσίῳ ἐφεθεὶς καὶ ὀπτηθείς. ἕλκει δὲ ὄνυχας σὺν ἀρσενικῷ ἢ σανδαράχῃ ὀπτηλαθεὶς· μιγεὶς δὲ ἀσβέστῳ καὶ πευκίνῃ τὴν δύναμιν αὐτοῦ.

Περὶ Ἀπαρίνης. Κεφ. ρδ'.

Ἀπαρίνη, ἡ δὲ, ἀμπελόκαρπον, B
ἡ δὲ, ὀμφαλόκαρπον, οἱ δὲ, φιλάνθρωπον καλοῦσιν, οἱ δὲ, ἰξὸν κλῶσιν πολλοὶ, μικροὶ, τετράγωνοι, τραχεῖς· φύλλα δὲ ἐκ βλαστήματος κυκλοτερῆ σχεδὸν ἐρυθροδάνου· ἄνθη λευκὰ· σπέρμα σκληρὸν, λευκὸν, τροχοειδὲς, ὑποκοῖλον ἐκ μέσου ὡς ὀμφαλός· C
προσέρχεται δὲ ἱματίοις ἡ πόα. χρῶνται δὲ αὐτῇ οἱ πολλοὶ αὐτὶ ἥθμοῦ ὀπτῇ τῷ γάλακτι, πρὸς ἕλκωσι τῷ ἐν αὐτῷ τριχῶν. Ταύτης τὸ σπέρμα καὶ οἱ καυλοὶ τὰ φύλλα χυλιόμενα, φάλαγγιοδήκτοις δὲ ἐχιοδήκτοις βοηθεῖ, πινόμενον μετὰ οἴνου· καὶ ὠταλγίας ἴαται ὁ χυλὸς ἐγχυματιζόμενος. ἡ δὲ πόα αἰγιλωφθεῖσα ὀξυγλίῳ λείῳ, ἀφροῖς χοιράδας. D

Περὶ Ἀλύσσου. Κεφ. ρε'.

Ἄλυσσον φρυγανώδές ἐστι, τοῖς ἁπτομένοις, φύλλα ἔχον τροχοειδῆ· πρὸ οἷς ὁ καρπὸς ὡς ἀσπιδίσκια δεδιπλα, ἐν οἷς τὸ σπέρμα ὑποπλατύ. φύεται ἐν ὀρεινοῖς E
καὶ τραχέσι τόποις. Ταύτης τὸ ἀφέψημα πόσιν, λυσμοὺς θηρίων δίχα πυρετῶν λύει· καὶ κρατηθὲν δὲ ἢ ὀσφρανθὲν, ὃ αὐτὸ δρᾷ·

verò subflauo, quódque nil habet asperi aut furfuracei. Confit è fructu quodam rotundo, fruticis in robore nascentis, foliis buxo similibus. Contunditur fructus, deinde lauatur, tandémque in aqua decoquitur. Sunt qui acinos commanducantes ipsum conficiant. Gignitur quoque in malo, pyro & plerisque alijs arboribus: atque etiam apud fruticum quorundam radices inuenitur. Discutit, emollit, attrahit, tubercula, parotidas aliósque abscessus maturat, resinæ, parique ceræ admixtum: epinyctidas quoque in splenio sanat. Vetera autem vlcera, malignósque abscessus cum thure mollit: lienémque absumit cum calce aut gagate Asióve lapide coctum & impositum. Vngues quoque extrahit cum arsenico aut sandaracha illitum. Cæterùm cum calce viníque fæce mistum suam vim intendit.

De Aparine. Cap. CIIII.

APARINE, quam alij ampelocarpum, alij omphalocarpum, alij philanthropum, alij denique ixum quasi visum vocant, ramis multis fruticat, iisque paruis, quadrangulis, asperis: folia ceu & rubiæ ramulos in orbem cingunt per interualla. Flores sunt candidi, semen durum, album, rotundum, in medio quodammodo concauú instar vmbilici: herba ipsa vestibus adhærescit. Ea verò pastores coli vice vtuntur ad eximendos è lacte pilos. Seminis caulium ac foliorú expressus succus è vino potus, contra phalangiorum viperarúmque morsus præbet auxilium. Idem auribus infusus, earú doloribus medetur. Cæterum herba ipsa si axungia trita excipiatur, strumas discutit.

De Alysso. Cap. CV.

ALYSSON suffrutex est exiguus, subasper, foliis rotundis: iuxta quæ fructus est duplicium scutulorum effigie, in quo semen quadantenus latum. Nascitur in montibus asperisque locis. Huius decoctum potum soluit singultus qui sunt citra febrim. Idem præstat si tenoatur vel olfiat:

V. συκάμινος Mat. adei δαφνοειδὴς

V. κηκαλίδες

Mat. legit αὐτοῦ

Al. ἰμφαλόκαρπον

μικροὶ mallet Samb.

V. ὑποκοίλου

Al. προσίσχεται

V. carct.

Ald. in notis addit, μετὰ ἀνεθου, quam vocem interpretatus est Ruellius.

Mat. τὸ σπέρμα αἱρεῖ λαθὸν καὶ πόσει

Ac cum melle tritum, lentigines & maculas à ſolis ardore contractas emendat. Sed & exiſtimatur canis rabidi morſui mederi, contuſum in edulijs & exhibitum. Quin & in domo ſuſpenſum, ſalutare, ac tum hominibus tum alijs animalibus faſcini amuletum eſſe fertur. Panno verò puniceo circumligatum, pecorum morbos abigit.

De Aſclepiade. Cap. CVI.

ASCLEPIAS ramulos emittit longos, in quibus folia lõga, hederacea: radices numeroſas, tenues, odoratas, florem graueolentem, ſemen ceu ſecuridacæ. Naſcitur in mõtibus. Radices in vino potę, torminibus, & contra venenatorum animalium morſus auxiliantur. Folia verò impoſita, mammarũ ac vuluæ malignis vitijs conferunt.

De Atractylide. Cap. CVII.

ATRACTYLIS ſpina eſt cnico ſimilis, ſed quæ in ſummis virgultis folia multò longiora proferat: maior autem pars nuda eſt & aſpera, qua etiam fœminæ pro colu vtuntur. Capitula etiam gerit in cacumine aculeata, florémque pallidum: radix tenuis eſt atque ſupernacua. Huius folia, coma & ſemen, trita potáque cum pipere ac vino, à ſcorpione percuſſis ſuccurrũt. Tradunt & nõnulli, percuſſos, quandiu herbam eam tenuerint, cruciatum non ſentire, ſed illa depoſita, ſtatim dolere.

De Polycnemo. Cap. CVIII.

POLYCNEMON frutex eſt ſurculoſus, folijs origani, caule geniculis multis intercepto, vti pulegij. Neque verò vmbellam habet, ſed paruos in cacumine corymbos cum acri quadam odoris iucũditate. Seu recẽs, ſeu arĩdũ, ex aqua impoſitũ efficaciter vulnera glutinat: ſed quinto die ſolui debet. Ad ſtranguriam itidem & rupta ex vino bibitur.

De Clinopodio. Cap. CIX.

CLINOPODIVM exiguus frutex eſt etiã ſurculoſus, duũm dodrantum altitudine, qui quidem in petroſis naſcitur: folijs ſerpyllo ſimilibus, & floribus (orbiculato ſuo ambitu) lecti pedum ſpeciem præbentibus, ex interuallis marrubij modo diſpoſitis.

A στεω μὴν ὃ λῆον, φασὶ καὶ ἕφηλιν ἀποκαθαίρει. δοκεῖ δὲ καὶ ** λύσσης κυνὸς ἰᾶσθαι, συγκοπὲν ἐδίσματι καὶ δοθέν. καὶ χρεμάμενον δὲ ἐν οἰκίᾳ, ὑγιεινὸν λέγεται εἶναι, καὶ αἰθρώπους καὶ ζῴοις ἀβάσκαντον. περιαφθὲν δὲ φοινικῷ ῥάκει, θρεμμάτων νόσους ἀπελαύνει.

B Περὶ Ἀσκληπιάδος. Κεφ. ρς'.

ΑΣΚΛΗΠΙΑΣ κλωνία ἀφίησι μακρά. ἐφ' ὧν φύλλα μακρὰ χιοσῷ ὅμοια· ῥίζας πολλὰς καὶ λεπτὰς, εὐώδεις· ἄνθος βαρύοσμον· σπέρμα δὲ ὡς πελεκίνου. φύεται ἐν ὄρεσι· βοηθοῦσι δὲ αἱ ῥίζαι ἐν οἴνῳ πινόμεναι τροφοῦσι καὶ θηριοδήκτοις καὶ

C τὰ φύλλα καταπλατόμενα, ἁρμόζει πρὸς τοὺς ἐν μαστοῖς καὶ μήτρας κακοηθείας.

Περὶ Ἀτρακτυλίδος. Κεφ. ρζ'.

ΑΤΡΑΚΤΥΛΙΣ ἄκανθά ἐστιν ἑπτὰ πήχεων, μακρόπρανος· πολλῷ φύλλῳ ἐχυμένη ἐπ' ἄκρου τῆς ῥάβδου. ὃ δὲ πλεῖον μυμοῦ πάχει, ᾧ τὰς γυναῖκες χρῶνται) αὐτὴ

D ἀπὸ ἄκρου. ἔχει δὲ καὶ κεφάλια ἐπ' ἄκρου ἀκανθώδη· ἄνθος ὠχρόν· ῥίζα δὲ λεπτή, ἄχρηστος. ταύτης τὰ φύλλα καὶ ἡ κόμη καὶ ὁ καρπὸς λεῖα πεπέπασιν πιπέρι καὶ οἴνῳ, σκορπιοπλήκτους ὠφελεῖ. ἔνιοι δ' ἐν ῥοῇ, ὅταν πλεκτὰς, ἀγρεύουσι καὶ κρατοῦσι τὸν πόδα, αἰωδυνίους εἶναι) ἀποδημοῦντας,

E ἀλγεῖν.

Περὶ Πολυκνήμου. Κεφ. ρή.

ΠΟΛΥΚΝΗΜΟΝ θάμνος ἐστὶ φρυγανώδης, ἔχων φύλλα ὀριγάνῳ ἐμφερῆ· τὸν δὲ καυλὸν πολυγόνατον ὡς ἂν γλήχωνος. σπέρμα ἔχει μέν τι ὃ σταφίδιον, μικρὰ δ' ἐπ' ἄκρῳ κορύμβια μετ' εὐώδους ὑγροῦ σφριμάδος. ποιεῖ δὲ καταπλασσόμενον χλωρὸν ἢ ξηρὸν μετ' ὕδατος, πρὸς τραύματα, κολλῶσα· δεῖ δὲ πεμπταῖον λύειν. πίνεται καὶ πρὸς στραγγουρίαν καὶ ῥήγματα, σὺν οἴνῳ.

Περὶ Κλινοποδίου. Κεφ. ρθ'.

ΚΛΙΝΟΠΟΔΙΟΝ θαμνίον ἐστὶ τὸ

G φρυγανώδες· δι' ὀλίγων, φυόμενον ἐν πέτραις, ἔχον φύλλα ἑρπύλλου παραπλήσια. τὰ δὲ ἄνθη ὅμοια * ὡς κλίνης ποδὶ, ἀπὸ διαστημάτων ἐμφερῆ περιφερῆ.

Lacuna in vet. legit λυσσοδάκνους: eamque lectionem cenſet probabiliorẽ. V. quidam non habet hanc vocem.

Non legu Oribaſ. al μακρά In antiquiſſimo quodam codice non habetur.

Addit Orib. ἐ μίσου ἄχρου Margo μετέπειτα. Sic & Orib.

Goupylus in vtroque exempl. legit κεμίου. Ald. in no. hist. ἐσπὲρ δὲ τοὺς πορφυρᾶς. quæ verba Marcellus & Ruellius interpretantur. Quibuſdã verò locus purpureũ.

V. διαιρῶν τῷ φρυγανώδες.

Suſpicatur Cornarius legendũ ex Plinio τὸν δὲ καυλὸν πολυγόνατον, καθάπερ δὲ ὄνθου γλήχωνος. Sic enim ille lib. 26. cap. 14. Polycnemon cuniæ bubulæ ſimilis eſt, ſemine pulegij ſurculoſo, multis geniculis corymbo odorato, acri & dulci odore, &c.

V. δηλοῖ τι μετ' εὐώδους πίνεται V. ξυνὸν

Πίνεται δὲ ἡ πόα καὶ ὁ ἀφέψημα αὐτῆς, ἀρὸς θηρίων δήγματα, καὶ σπάσματα, & ῥήγματα καὶ στραγγουείας. ἀγει καὶ ἔμμηνα, καὶ ἔμβρυα, καὶ ἀχροχορδόνας ἀποσ-
Ita suppositicia ceniet Matthiolus. βάλλ, ἐφ' ἡμέρας πεντάδιον. καὶ λίαν τὸ ἴσχιον ὅτι πεῖνον ἐφόρθιον καὶ πυρέσιον ἀπυρέτοις ἐν οἴνῳ πυρέτοισι δὲ, δὶ ὕδατος.

Bibitur herba ipsiúsque decoctum ad venenatorum animalium morsus, conuulsa, ruptáque & stranguriam. Pellit & menses atque partus. Verrucas pensiles, quas acrochordonas vocant, auellit aliquot diebus epotum. Aluum quoque sistit ad tertias decoctum & potum, siquidem febris absit, in vino: sin minùs, ex aqua.

Περὶ Λεοντοπεταλου. Κεφ. ρί.

Λεοντοπεταλον καυλὸν ἀνίησι σπιθαμιαῖον· ἢ καὶ μείζονα, ἔχοντα μεγάλας πλείσας· ἐφ' ὧν ἄκρων λοβοὶ ὅμοιοι ἐρεβίνθοις, ἐν οἷς τοῖς δύο ἢ τρία σπερμάτια· αἰθη φοινικᾶ, ἐοικότα ἀνεμώνῃ· φύλλα ὅμοια χράμβῃ, σὺν ἐλατίνῃ μυθῷ ὡς τὰ τῆς μήκωνος· ῥίζα μέλαινα ὡσαὐτως χοιλύλη, ἐξοχαὶ ἔχουσα καθάπερ κονδύλους τινάς. φύεται δὲ ἐν ἀρούραις & ἐν τοῖς σίτοις. ταύτης ἡ ῥίζα σὺν οἴνῳ πινομένη, βοηθεῖ ἑρπετοδήκτοις, ταχέως ἀπόνους ποιοῦσα. μίσγεται δὲ καὶ εἰς τοὺς ἰσχιαδικοὺς κλυσμούς.

V. Hanc Dematem

Quidem carent his vocibus ἡμῖν.

V. parenthesi includit ἡίζα μὲν αἰθη χοιλύλη.

De Leontopetalo. Cap. CX.

Leontopetalvm caulem profert dodrátalé, aut etiá altiorẽ, plurimis alis concauũ, in quarũ cacuminibus siliquæ sunt cicerum modo, ac in his duo triáve minuta semina, flores punicei, anemonæ similes, folia brassicæ, papaueris, foliorum diuisura: radix nigra, rapo similis, quæ eminentias ceu nodos quosdam habet. Nascitur in aruis, ac inter segetes. Radix ex vino pota commorsis à serpente auxiliatur, dolorem omnem celeriter eximẽs. Miscetur & ischiadicorum clysteribus.

Περὶ Τευκρίου. Κεφ. ριά.

Τευκριον, ὃ δὲ καὶ τοῦτο χαμαιδρυν καλοῦσιν, πόα ῥαβδώδης, ἐοικυῖα χαμαίδρυϊ, λεπτόφυλλος, ἔχουσα ἐρεβίνθῳ πάλαι ὅμοιον φύεται δὲ πλῆθον ὃ Κιλικία τῇ καθ' Γενιάδα & Κισσάδα καλουμένῃ. δύναμιν δὲ ἔχει χλωρὰ μετ' ὄξυκράτου πολεῖσα ἢ ξηρὰ ἀποξεσθεῖσα & πινομένη, σπλῆνα τήκειν ἰχῶρας. καταπλάσσεται δὲ μετὰ σύκων καὶ ὄξους ὅτι σπληνικῶν· ὅτι θηριοδήκτων δὲ, μετ' ὄξους μόνου χωρὶς σύκων.

V. hanc alteram appellationem non habet.

Aldus scribit

De Teucrio. Cap. CXI.

Teucrivm sunt qui etiá chamædryn appellant. Herba est virgæ speciem præ se ferens, trissagini similis, tenui folio ac ciceris figura. In Cilicia iuxta Gentiadem & Cissadem appellatam vbertim prouenit. Recens cum posca, vel etiam aridæ refrictæ ius, potu potenter lienem consumendi vim habet. Sed & lienosis imponitur cum ficis & aceto: venenatorum autem animalium morsibus, ex aceto solo sine ficis.

Περὶ Χαμαίδρυος. Κεφ. ριβ'.

Χαμαιδρυς, ὃ δὲ χαμαίδρυη, ἢ λινόδρις. λέγεται δὲ ὅ τε σύζυγος αὐτῇ ἐμφερὴς τῷ τευκρίῳ, & ταύτην τινὲς τεύκριον ἐκάλεσαν. φύεται & ἐν τραχέσι καὶ πετρώδεσι τόποις· ἔστι δὲ θαμνίσκος σπιθαμιαῖος, φύλλα ἔχων μικρὰ, τῷ σχήματι καὶ τῇ ὀσμῇ δρυΐ ὅμοια, πικρὰ· αὐξὸς ὑποπόρφυρον, μικρόν. συλλέγεται δὲ αὐτοῦ δεῖ ἐγκύμονα τοῦ καρποῦ. δύναμιν δὲ ἔχει χλωρὰ ἀφεψηθεῖσα σὺν ὕδατι καὶ πολιζομένη, βοηθεῖν σπάσμασι, βηχὶ,

Mar. Chamæreps

Orib. ὑποπόρφυρον

Lacuna legit præterea in ver. cod. ἢ μαίρ.

Trissago Græcis chamędrys, quibusdam chamædrops, aliis linodrys dicitur. Sunt & qui eam ipsam Teucrium appellauerint, propterea quod cum teucrio quandam feruet similitudinem. Nascitur in asperis ac petrosis locis. Est verò frutex exiguus, dodrantalis, folia habẽs exigua, effigie & diuisura quercus, amara: florem pene purpureum ac pusillũ. Carpi ipsam semine prægnantem oportet. Recens in aqua decocta, potu, conuulsis, tussi,

lieni indurato, vrinæ difficultate laborantibus ac incipientibus hydropicis auxiliatur. Ciet etiá menses, atque partus extrahit, lienémque ex aceto pota consumit. Est & aduersus venenata animantia, potu ex vino, illitúque efficax. Sed & trita in catapotia redigi potest ad supradicta. Efficax quoque est ad repurgáda vetera vlcera cum melle. Trita verò cum oleo & illita, caligines oculorum discutit. Denique excalfacit perunctione.

A σπλῆνι ἐσκιῤῥωμένῳ, δυσουροῦσιν, ὑδρωπικοῖς ὀρθαῖς· ἄγει καὶ ἔμμηνα καὶ ἔμβρυα, σπλῆνα τήκει, ζωὸν ὄξει πινόμενον· πρὸς δὲ τὰ θηρία, σὺν οἴνῳ πινομένη, & καταπλασσομένη παῤ- λα δὲ δύναται καὶ εἰς καταπότια ἀναπλάσασθαι πρὸς τὰ εἰρημένα, καὶ ἀναγκαίαν ἕλκη παλαιὰ

B σὺν μέλιτι· αἴρει δὲ ἀχλῦς & ὀφθαλμοῖς σὺν ἐλαίῳ λεῖα ἐγχριομένη καὶ ἀλφοὺς ὑπ. ἐστὶ δὲ θερμαντική.

De Leucade. Cap. CXIII.

LEVCAS montana latioribus foliis est quàm satiua, semine verò acriore, amariore atque etiam ori magis ingrato: attamen quam satiua efficacior habetur. Vtraque cum vino & illitu & potu contra virulentorum animalium, maximéque marinorum, venena efficax.

Περὶ Λευκάδος. Κεφ. ριγ'.

C ΛΕΥΚΑΣ ὀρεινή, πλατυφυλλοτέρα τῆς ἡμέρου ἐστί, δριμύτερόν τι καὶ πικρότερον ἔχουσα & καρπὸν καὶ ἀσμένως· δραστικωτέρα μᾶλλον τυγχάνει τῆς ἡμέρου. ὀπτὰ πλασσόμενα δ' ἀμφότερα τὰ πινόμενα, ἁρμόζουσι μετ' οἴνου ὄφεσι πᾶσι ἰοβόλοις, & μάλιστα τοῖς θαλασσίοις.

Huic capiti principium decurtatum esse suspicatur Marcellus.

In vet. legit Lacuna μεφότερα.

De Lychnide coronaria. Cap. CXIIII.

LYCHNIS coronaria flore est D albę violę, sed purpureo: qui quidē in corollas nectitur. Semē in vino potū à scorpione ictis auxiliatur.

Περὶ Λυχνίδος στεφανωματικῆς. Κεφ. ριδ'.

ΛΥΧΝΙΣ στεφανωματική, αἶδος ἐστὶν ὅμοιον λευκοΐῳ, ἐμπορφυροῖ δὲ πλεκόμενον εἰς τὰ στεφάνια. ἧς τὸ σπέρμα βοηθεῖ σὺν οἴνῳ πολὺν σκορπιοπλήκτοις.

De Lychnide syluestri. Cap. CXV.

Lychnis syluestris omni ex parte satiuæ similis. Semē duabus drachmis potum biliosa per aluum detrahit, & ictis à scorpione subuenit. Sed & aiunt scorpiones hac herba admota torpescere, prorsúsque inertes & ad lædendum ineffi- caces reddi.

Περὶ Λυχνίδος ἀγρίας. Κεφ. ριε'.

Λυχνὶς ἀγρία ὁμοία τῇ ἡμέρᾳ κατὰ πάντα. τὸ δὲ σπέρμα αὐτῆς < β'. πλῆθος πολὺ, ἄγει καθ' εἰλίδιον χολώδη, καὶ

E σκορπιοπλήκτοις ἁρμόζει. φασὶ δὲ καὶ τοὺς σκορπίους ναρκᾶσθαι & ἀποπίπτειν γίνεσθαι, ὡς ἀκτιβίστους αὐτοὺς τοῦ πάσχειν.

De Lilio. Cap. CXVI.

LILII regij flos coronarius est: lirium nonnulli vocant: ex eóque paratur vnguentum, quod aliqui lirinum, alij susinum appellant, neruos, priuatimq; vuluæ duritias, emolliens. Herbæ folia imposita, serpentium morsibus opitulantur: feruefacta quoque, adustis proficiunt: aceto verò condita, vulneribus prosunt. Ex eorundem succo in æneo vase decocto, adiectis aceto & melle, liquidum fit medicamentum, veteribus vlceribus recentibúsque vulneribus vtile. Inassata radix & ex ro-

Περὶ Κρίνου. Κεφ. ριϛ'.

F ΚΡΙΝΟΝ βασιλικὸν, τούτου ὁ ἄνθος στεφανωματικόν ἐστι, καλούμενον ὑπ' ἐνίων λείριον. ἀφ' οὗ καὶ ὁ χρίσιμα καταπλάζεται, ὅπερ λείριον, οἱ δὲ σούσινον καλοῦσι, μαλακτικὸν ὂν τῶν νεύρων, καὶ ἰδίως τῶν περὶ μήτραν σκληρῶν. τῆς δὲ ῥίζης τὰ φύλλα καταπλασσόμενα, ἐρπετοδήκτοις βοηθεῖ· καυθὲν δὲ καὶ πρὸς τὰ καύματα, ξηραίνει· ταριχευθὲν δὲ ἐσθίει, πλαυμαλικὰ γίνεται. ὁ δὲ χυλὸς

G αὐτῶν μιγεὶς ὄξει ἢ μέλιτι, ἐνθεὶς τε ὀν χαλκώματι ὑγρὸν γίνεται φάρμακον πρὸς τὰ παλαιὰ ἕλκη, καὶ πρόσφατα τραύματα. ἡ δὲ ῥίζα ὀπτὴ λεῖα σὺν ῥο-

δίνη, πυελικὰ ἰᾶται, καὶ ὑστέρας μα- A
λάσσει, καὶ ἐμμηνα ἄγει, καὶ ἕλκη ἐπου-
λοῖ· σὺν μέλιτι δὲ λεδωτοῦσα, νάρκην δέρ-
ματος καὶ στρέμματα ἰᾶται· ἀλφούς τε ἀ-
ποκαθαίρει καὶ λέπρας, καὶ φύσεις καὶ
ἐλκώσεις σμήχει, τά τε περίσσαρκα καθαίρει
καὶ ἀρρυπίδωτα ποιεῖ. Ζωὸν ὄξει δὲ λεῖα
ἢ σὺν ὀσπυάμου φύλλοις καὶ ἀλθίῳ Quidam ἐλυ-
πυείνῳ, ὄρχεων φλεγμονὰς παραιτεῖται. μώμου
Τὸ δὲ σπέρμα ἑρπετῶν δήγμασιν αἰπο- B
φάρμακον, ποθὲν· ἐρυσιπελάτων δὲ κα-
τάπλασμα, σὺν οἴνῳ λεδωτοῦσα τὴς τε
σπέρμα καὶ τὰ φύλλα. Φασί δέ τινες καὶ
πορφυρᾶ αὐτὰ χρίνα γίνεσθαι. Σπαργά-
νια δὲ ἡμῶνται ἐν τῇ Συρίᾳ καὶ Πισι- C
δίᾳ τῆς Παμφυλίας πρὸς τὰ τῶν χεί-
μασιν καταχυθέντα.

Περὶ Βαλλωτῆς. Κεφ. ριζ.

Ἄλλ. ἐν μέσῃ πράσῳ κεφαλ. ΒΑΛΛΩΤΗ ἢ μήλῳ πράσου, καυλὸς ἔχουσι τετραγώνους, μέλανας, ὑποδασεῖς, ἐκ μιᾶς ῥίζης πλείονας· φύλλα δὲ παρεμφαίῳ ὅμοια, μείζονα δὲ καὶ προμηκέστερα καὶ μέλανα καὶ δασέα, ἐκ διαστημάτων τοῦ καυλοῦ περιπλόκια μελισσοφύλλῳ, δυσώδη ὅλην καὶ τῶν μελισσοφύλλων ἐκάλεσε· καὶ τὰ αὐτὰ δὲ ἅμα τοῖς εἴδεσι λευκοῖς ἔχουσι καυλοῖς ἔγχλοα. Τούτης τὰ φύλλα καὶ πλασσόμενα μετὰ ὠῶν, ποιεῖ πρὸς τὰ κυνόδηκτα· μύρτου ἢ ὀπὸς καὶ E
μυκοδιᾶς, κονδυλώματα φύλλῃ, ῥυπαρά τε ἕλκη σὺν μέλιτι ὀπὸς καθαίρει.

Περὶ Μελισσοφύλλου. Κεφ. ριή.

Ἄλλ. ἐν ποτ. ἀνίησι δὲ ὁ σπόδια &c. ΜΕΛΙΣΣΟΦΥΛΛΟΝ, ὃ ἔνιοι μελίτταινάν καλοῦσι, ἅμα δὲ ἤδεσθαι τῇ πόᾳ ταῖς μελίτταις. ἔοικε δὲ αὐτῆς τὰ φύλλα καὶ τὰ καυλία τῇ προειρημένῃ βαλλωτῇ· μείζονα δὲ ταῦτα καὶ λεπτότερα, οὐχ οὕτω δασέα, ὄζοντα δὲ κιτρομήλου. Ἁρμόζει δὲ τὰ φύλλα ποτίζοντα σὺν οἴνῳ καὶ κατάπλασσόμενα, τοῖς σκορπιοπλήκτοις, καὶ φαλαγγιοδήκτοις, καὶ κυνοδήκτοις. καὶ τὸ ἀφέψημα δὲ αὐτῶν κατεμπλυνόμενον, πρὸς τὰ ὠδὰ ποιεῖται τὰ ἐκκαθάρσια, πρὸς ἐμμηνων ἀγωγὴν βύεται· ὀδοντολγίαις τε ἐγχλυσμα, ἔγκλυσμά τε δυσεντερικοῖς. F

facco trita, igni ambusta sanat, vuluam emollit, menstrua ciet, vlceráque cicatrice obducit. Cum melle autem detrita, præcisis neruis luxatísque medetur: alphósque, lepras & furfures emendat. Quin & vlcera in capite manantia exterget, faciémque purgat simul & erugat. Eadem trita cum aceto aut hyoscyami folijs & farina tritici, testium inflammationes demulcet. Semen verò potum, serpentiũ morsibus aduersatur: erysipelatis autem, semen & folia trita ex vino imponuntur. Tradunt porrò nonnulli, etiam purpureos nasci liliorum flores. Cæterùm in Syria & Pisidia Pamphyliæ lilia vnguẽto conficiendo efficacissima nascuntur.

De Ballote. Cap. CXVII.

BALLOTE seu marrubium nigrum caules edit quadrangulos, nigricantes, subhirsutos, ab vna radice numerosos, folijs marrubij: at maioribus, rotundioribus, nigris & hirsutis, caulem per interualla cingentibus apiastri similitudine, atque etiam graueolentibus. Vnde & hanc aliqui apiastrum vocauere. Sed & flores candidi vnà cum folijs orbiculatim caules ipsos ambiunt. Huius folia ex sale imposita, aduersus canis morsus efficacia sunt. Feruenti verò cinere cocta dũ flaccescant, condylomata reprimunt, sordidáque vlcera cum melle purgant.

De Apiastro. Cap. CXVIII.

APIASTRVM, quod Græci melissophyllõ & alio nomine melittænam, vocant, quoniam apes ea herba delectantur, foliis & cauliculis antè memoratæ ballotæ similis est: attamen maioribus & tenuioribus, neque ita hirsutis, citreum verò malum redolentibus. Folia cum vino pota atque etiam imposita, prosunt contra scorpionum ictus, necnon & phalangiorum canísque rabidi morsus. Eorundem decoctũ fotu ad eadem valet. Conuenit etiamnum fœminarum desessionibus ad ciendos menses. Colluitur & in dentium doloribus, atque etiam dysentericis infunditur.

Folia quoque addito nitro bibita, ijs auxiliantur qui à fungis ſtrangulantur, necnon torminoſis: orthopnoïcis verò, in ecligmate ſumpta. Cæterum impoſita cum ſale, ſtrumas diſcutiũt, itémque vlcera purgant: ſed & articularios dolores illita ſedant.

A βοηθεῖ καὶ τοῖς ὑπὸ μυκήτων πνιγομένοις σὺν νίτρῳ τὰ φύλλα πινόμενα, ⁊ προσφορούμενοι. καὶ ἐκλειπτὸν ὀρθοπνοϊκοῖς. καταπλασόμενα δὲ σὺν ἁλὶ, διαφορᾷ χειρικάδας, καὶ ἕλκη ἀνακαθαίρει. πρὸς τὰ ὑπὸ τῶν ἐχθρικῶν φαρμάκων πεπληγότας, καὶ πεπλασθέντα.

Legit Lacuna in vet. cod. aliquo

De Marrubio. Cap. CXIX.

B Περὶ Πρασίου. Κεφ. ριθ'.

MARRVBIVM frutex eſt ab vna radice ramoſus, ſubhirſutus, candicás, virgis quadrangularibus: folium pollicem æquat, ſubrotundum, villoſum, rugoſum, guſtu amaro. Semen eſt in caulibus ex interuallis: flores verticillato ambitu aſperi. Naſcitur circa domorum areas & rudecta. Huius foliorũ ſiccorum ſimul & ſeminis decoctum ex aqua, aut etiam recentium foliorum ſuccus vna cum melle, tabidis, ſuſpirioſis ac tuſſiẽtibus exhibetur. Craſſam quoque pituitam pectore contentá, ammixta iride ſicca, excreatione purgat. Datur & mulieribus quæ non purgãtur, ad euocanda menſtrua, ſecundáſque pellendas: itémque difficilè parientibus, atque etiam his qui à venenatis beſtijs commorſi ſunt, necnon & ijs qui venena hauſerunt: attamen veſicam ac renes offendit. Folia cum melle illita, ſordida purgant vlcera: pterygia nomáſque ſiſtunt, & laterum dolores mitigant. Sed & ſuccus foliis contuſis expreſſus, & in ſole ſpiſſatus coactúſve, ad eadem pollet. Cum vino quoque ac melle inunctus, oculorum claritatẽ adiuuat: per nares itidẽ regium morbum expurgat. Deniq; aurium doloribus per ſe & cum roſaceo conuenienter inſtillatur.

Πρασιον θάμνος ἐστὶν ἀπὸ μιᾶς ῥίζης πολύκλαδος, ὑποδασυς, λευκὸς, τετράγωνος τοῖς ῥάβδοις· φύλλον δὲ τῷ μεγάλῳ δακτύλῳ ἴσον, ὑποστρόγγυλον, δασύ, * ἔλασσον, πικρὸν τῇ γεύσει· ἐκ διαστημάτων δ' ὅλη τῇ καυλῶν τὸ σπέρμα, καὶ αὐξει ἐπὶ τοῖς οἰκοπέδοις καὶ χαλα. φύεται περὶ τὰ οἰκόπεδα, καὶ * ἐρείπια. Τούτου τὰ φύλλα ξηρὰ σὺν τῷ σπέρματι ἐλφόμενα σὺν ὕδατι, ἢ χυλιζόμενα χλωρὰ, δίδοται μετὰ μέλιτος φθισικοῖς, ἀσθματικοῖς, βηττουσιν. ἀναγκάζει καὶ πάχος ἐκ θώρακος, ἰρίδος ξηρᾶς μιγείσης. δίδοται καὶ ταῖς μὴ καθαιρομέναις γυναιξὶ πρὸς ἀναγκαίων ἐμμήνων καὶ δεύτερον, καὶ δυσοχούσαις, καὶ θηριοδήκτοις, ⁊ τοῖς θανάσιμον πεπωκόσι· κύστει μέν τι καὶ νεφροῖς * ἄδηκτα. τὰ δὲ φύλλα καταπλασόμενα σὺν μέλιτι, ῥυπαρὰ ἕλκη καθαίρει, πτερύγια τέ καὶ νομὰς ἀφίστησι, καὶ ὀδύνας πλευρῶν παύει. ⁊ τὸ ἐξ αὐτῶν δὲ σκληρὰ ζόμενον χύλισμα ἐκθλιβομένων τῶν φύλλων, καὶ συντρεφόμενον ὑπὸ ἡλίου πρὸς τὰ αὐτὰ ποιεῖ. ἔστι δὲ καὶ ὀξυδερκὲς, σὺν οἴνῳ καὶ μέλιτι ἐγχριόμενον. ἀποκαθαίρει δὲ καὶ ἕλκεα ὄζοντα τῶν ῥινῶν ὑπαλγίαις τε ἁρμόζει, ἐγχυματιζόμενον καθ' ἑαυτὸ καὶ μετὰ ῥοδίνου.

Alter, ὑγιὲς, sed perperam.

De Stachy. Cap. CXX.

F Περὶ Στάχυος. Κεφ. ρκ'.

STACHYS frutex eſt marrubio ſimilis, ſed aliquantò longior, & folia proferens numeroſa, rara, ſubhirſuta, dura, odoris iucundi, candida: & complures virgulas ab eadem radice exeuntes, quàm marrubij candidiores. Naſcitur in montoſis & aſperis locis. Vim habet excalfactoriam & acrem: ideóque foliorum decoctum menſtrua fecundáſque potu pellit.

Στάχυς θάμνος ἐμφερὴς πρασίῳ, ὑπομικίστερος δὲ καὶ πλείστα φύλλα ἀραιὰ ἔχων ὑποδασέα, σκληρὰ, εὐώδη, λευκὰ ῥαβδία δὲ πλείονα ἀπὸ τῆς αὐτῆς ῥίζης, λευκότερα ἢ τὸ πρασίου. φύεται δ' ὀρεσιν καὶ παχέσι χωρίοις.

Δύναμιν δ' ἔχει θερμαντικὴν, δριμεῖαν· ὥστε τὸ ἀπόζεμα τῶν φύλλων ἔμμηνα καὶ δεύτερα ἄγει πινόμενον.

V. φυλλάρια in diagnosi tum ὑποπρίνεα. Sed fulpecta eſt ea lectio.

V. ὑπόλευκα, λοιπὰ περὶ τὰ τοῦ πρασίου αὐτοῦ ὑποφέρεται.

Περὶ φυλλίτιδος. Κεφ. ρκά.

ΦΥΛΛΙΤΙΣ φύλλα ἀφίησιν ὅμοια λαπάθῳ, ὀθμικώτερα δὲ καὶ βαθυλείστερα, ς'. ἢ ζ'. ὀρθά, λεῖα· ἐν τῷ ἐμπεσεῖν ἐν τῷ ἔπιθεν δέ, καθάπερ σκώληκας ἔχοντα ἀπερπεμφίους, λεπτούς· φύεται δὲ καταντίους τοῖς καλλιθρίοις, γλυκεμβρύῳ τρυφῇ, οὔτε δὲ καυλὸν, οὔτε καρπὸν, οὔτε ἄνθος φέρει. Ταύτης τὰ φύλλα μετ' οἴνου πινόμενα, τοῖς ἐρπετοδήκτοις πᾶσι· ὅτι τετραπόδων τὰ δήγματα· ἐγχριόμενα βοηθεῖ· πίνεται καὶ πρὸς δυσεντερίαν καὶ διαῤῥοίαν.

Περὶ Φαλαγγίου. Κεφ. ρκβ'.

ΦΑΛΑΓΓΙΟΝ, ὃ δὲ φαλαγγίτιον. οἱ δὲ ἀπὸ τούτου λευκάνθαν καλοῦσιν· ἕλωσιν δύο ἢ τρεῖς ἢ πλείονες, διεστῶτες ἀπ' ἀλλήλων αἰθυλευκοί, καλλιπλόκια χρίνῳ, εὐθυμαὶ πολλαὶ ἔχοντα· σπέρμα δὲ παχὺ, μέλαν, ὡς ἐν φακοῦ ἥμισυ, ἰσχνότερον μέν τι πολλῷ· ῥιζίον μικρὸν, λεπτὸν, χλωρὸν ἅμα τῷ ἕλκεσθαι ἐκ τῆς γῆς. ὕστερον δὲ συνέλκεται· φύεται δὲ ἐν χωλεόφοις. Ταύτης τὰ φύλλα ἐν τῷ σπέρμα, καὶ τὸ ἄνθος πινόμενον μετ' οἴνου, σκορπιοπλήκτοις βοηθεῖ, καὶ φαλαγγιοδήκτοις· λύει δὲ καὶ τροφοὺς.

Περὶ Τριφύλλου. Κεφ. ρκγ'.

ΤΡΙΦΥΛΛΟΝ, ὃ δὲ ὀξύφυλλον, οἱ δὲ μηναν θές, οἱ δὲ ἀσφάλτιον, οἱ δὲ κνίκινον καλοῦσι, θάμνος ὀργυιᾶς μείζων, ῥάβδους ἔχων λεπτὰς, μελαίνας, γόνατας, περὶ οὓς φύλλα ὅμοια λωτῷ τῷ δενδρώδει, τρία καθ' ἑκάστην ἐλάσσονι ἰσομεγέθη αὐτῷ ἄρτι μὲν φυομένῳ, πεπαιοῦ· αὐξηθέντων δὲ, ἀσφάλτου ἄνθος δὲ ἐμπίπτει περφυρεοῦν· σπέρμα δὲ ἐν τοῖς πλατυκάρποις καὶ ἐν τοῖς σάδοις, ἐν τῷ ἑτέρου πέρατος ὥσπερ κεραίαν ἔχον· ῥίζα δὲ λεπτὴ, μακρὰ, ἰσχυρά. Βοηθεῖ δὲ ὁ σπέρμα καὶ τὰ φύλλα, πινόμενα ἐν ὕδατι, πλευριτικοῖς, δυσουρικοῖς, ὑδροπικοῖς, ἐξαμβλώσεις ὑφιεμένοις, ὑστερικαῖς

De Phyllitide. Cap. CXXI.

PHYLLITIS folia promit rumici similia, sed oblongiora & magis virentia, sena septenáve, recta: quæque parte anteriore læuia cernuntur, posteriore verò tenues quasi vermiculos annexos ostendunt. Nascitur in vmbrosis locis ac viridarijs, gustu acerbo. Neque verò caulem, neque semen, neque florem profert. Folia in vino pota serpentiú morsibus aduersantur. Quadrupedibus itidem per os infusa auxilio sunt. Bibuntur & ad dysenteriam & diarrhœam.

De Phalangio. Cap. CXXII.

PHALANGIVM aliqui phalangiten, alij etiam leucacantham appellant. Ramuli ei sunt duo aut tres pluréſve, inter se distantes, flores candidi, liliaceis similes, incisuras multas habentes. Semen verò latum, nigrum, ad dimidiatæ lentis figuram, sed multò gracilius. Radicula parua, tenuis, & dum è terra eruitur, coloris herbacei: posteà verò contrahit sese. Nascitur in collibus. Folia, semen & flos, siquidem ex vino bibantur, contra scorpionum ictus phalangiorúmq; morsus, auxiliantur: tormina quoque discutiunt.

De Trifolio. Cap. CXXIII.

TRIFOLIVM Græci triphyllon, alij oxytriphyllon, alij menyanthes, alij asphaltium, alij denique cnicium vocát. Frutex est supra cubiti altitudinem assurgens, ac virgas habens tenues, nigras, iunceas, non sine ramulorum appendiculis, in quibus folia exeunt loti arboris foliorum similitudine, eáque terna in singulis germinibus. Odor illorum vbi recés nata sunt, rutæ: posteaquam verò adoleuerunt, bitumini proximus. Florem verò edit purpureum, ac semen quadantenus latum & subhirsutum, ab altera extremitate veluti corniculum gerés. Radix autem tenuis, lõga, ac firma validáq; est. Semen & folia in aqua pota, pleuriticis, vrinę difficultate laborátibus, comitialibus, hydropicis incipiétibus, ac fœminis vuluæ strágulationi opportunis auxiliantur:

menſes quoque ciunt. Sed è ſemine, ternæ drachmæ: è foliis verò, quaternæ exhiberi debent. Succurrunt & venenatorum morſibus folia trita ex aceto mulſo pota. Tradunt verò nonnulli, totius fruticis, radicis inquam & foliorum decoctum fotu dolores eorum mitigare quos ſerpentes momorderint. Verùm ſi qua ſanatus quiſpiam fuerit aqua, alius aliquis foueatur qui vlcus habuerit, perinde affici vt qui demorſi fuêre. Quidam terna folia aut totidem ſemina in tertianis cũ vino potui dedere, & in quartanis quaterna, ceu quæ febrium circuitus finiant atque diſcutiant. Cæterùm radix antidotis inſeritur.

A ἄγλ δὲ καὶ καταμιλία· δεῖ δὲ διδόναι τὸν μὲ σπέρμασος < γ. τῶν ἢ φύλλων < δ'. v.l

B ἐρήγλ δὲ καὶ θηριοδήκτοις τὰ φύλλα λαβ σὺν ὀξυμέλιτι πινόμενα· ἱστορῶσι δ' ἔνιοι ὅτι τὸ ἀφέψημα ἕλκη θ' ἁλμυρὰ καὶ τῆς ῥίζης καὶ τῶν φύλλων καταπλασσόμενον ὑπὸ τῶν ἑρπετοδήκτων παραιτεῖται τοὺς πόνους. ὥσθ' αἱ θεραπεύῃ τις ὕδατι, αὐ ἕτερος ἕλκος ἔχων καταντληθῇ, τὰ αὐτὰ πάσχοντος δηλοῦσι. πολίοισι δέ τινες ὑπὸ μὺ βρίζης τὰ φύλλα ἢ τὰ σπέρματα σὺν οἴνῳ· ὑπὸ δὲ τὰ παρωτίδα δ'. ὡς λύονται τὰ τῶν ὀδόντος μίγνυται δ' αὐτῆς καὶ ῥίζα καὶ ὑποδύεις. Veteres addit φύλλα

C

De Polio. Cap. CXXIIII.

Περὶ Πολίου. Κεφ. ρκδ'. Vulg. exempl. addunt ἑρπετῶν.

D POLIVM quoddam mõtanum, cui etiam teuthris nomen eſt, & cuius eſt vſus. Exiguus frutex eſt, tenuis, candidus, dodrantalis, & ſemine refertus: capitulo in cacumine quandam corymbi ſpeciem præ ſe ferente, paruo, cæſariei canæ ſimili, & graueolente cum aliquantula odoris iucunditate. Alterum fruticoſius eſt, non vſqueadeò valens odore, ac viribus inefficacius. Decoctum ipſorum eporum, ſuccurrit venenatorum morſibus, hydropicis & arquatis: ſplenereticis autem ex aceto propinatur. Sed capitis dolorem ciet, ſtomachúmque malè habet. Ducit verò etiá aluum ac menſes. Cæterùm ſubſtratum ſuffitúmve polium venenatas beſtias abigit: impoſitum verò vulnera conglutinat.

ΠΟΛΙΟΝ τὸ μὺ, ἔστιν ὀρφνὸν, ὃ καὶ τευθρίον καλῶσι, οὗ καὶ ἡ χρῆσις· θαμνίον δέ ἐστι λεπτὸν, λευκὸν, ἀσθαμιαῖον, καρποῦ πλῆρες, ἔχον κεφάλιον ἐπ' ἄκρῳ κορυμβοειδὲς μικρὸν ὡς πολιᾶς τρίχα, βαρύοσμον μετὰ ποσῆς εὐωδίας. Τὸ δὲ ἕτερον, θαμνωδέστερον, οὐχ ὕστως εὔτονον τῇ ὀσμῇ, καὶ ἀσθενέστερον κατὰ τὴν δύναμιν. Oribas. ταῦτα λέγει V. margo. οὐκ ἔστιν ὑποκείμενον

Δύναται δὲ αὐτῶν τὸ ἀπόζεμα πινόμενον, θηριοδήκτοις ἐρήγλ, ὑδρωπικοῖς, ἰκτερικοῖς· σπληνικοῖς δὲ σὺν ὄξει· ἔστι δὲ καὶ κεφαλαλγὶς καὶ κακοστόμαχον· ἄγλ δ' καὶ κοιλίαν καὶ ἐμμηνα. ὑποστρωννύμενον δὲ καὶ θυμιώμενον, θηρία διώκει· καταπλασσόμενον δὲ τραύματα κολλᾷ.

E

De Scordio. Cap. CXXV.

Περὶ Σκορδίου. Κεφ. ρκε'.

F SCORDIVM in montanis & paluſtribus locis naſcitur. Folia habet triſſaginis ſimilitudine, at maiora, neque ita per ambitum inciſuris diuiſa, aliquantum verò allium redolentia, aſtringentia & guſtu amara: cauliculos autem quadrangulos, è quibus flos ſubruber emicat.

Vim habet herba excalfactoriã, vrinámque cit. Recens trita, itémque arida, decocta in vino, aduerſus ſerpétium morſus, venenáque propinatur: ad ſtomachi verò roſiones, dyſenteriam, & vrinæ difficultaté, binis drachmis, ex hydromelite:

ΣΚΟΡΔΙΟΝ φύεται· ἐν ὀρειτοῖς τόποις καὶ ἑλώδεσι, φύλλα ἔχον ὁμοίως χαμαίδρυϊ, μείζονα δὲ καὶ οὐχ οὕτως ἐστιτμημένα τὴν περιφέρειαν, ποσῶς δὲ τῇ ὀσμῇ σκορδίζοντα, συμπικνὰ δὲ καὶ ἔμπικρα καὶ τὴν γεῦσιν· καυλία δὲ τετράγωνα· ἀφ' ὧν αὐτὸς ἐξέρυθρος. V. τετράγωνα καὶ μείζονα. Al. μικρὰ δὲ τὰ τῆς ὁμοίως ἔχοντα καὶ οὐχ &c.

G Δύναμιν δὲ ἔχει τὰ θερμαντικὴν, διουρητικὴν, πολυουθῆ χλωρὰ, λεῖα, καὶ ξηρὰ ἀφεψόμενα σὺν οἴνῳ πρὸς ἑρπετῶν δήγματα καὶ θανάσιμα· πρός τε δηγμὸν τομάχου καὶ δυσεντερίαν, καὶ δυσουρίαν < β'. σὺν ὑδρομέλιτι. V. omittit. Legit Lacuna in vet. cod. ἐστὶ τὸ δηγμὸν τομάχου καὶ δυσεντερίαν

καθαίρει καὶ πάσχοντας πυώδεις ἐκ θώρακος. ποιεῖ καὶ τοῖς παλαιοῖς βήχεσι καὶ ῥήγμασι, καὶ ἀποσμάσμασι, σὺν καρδάμῳ καὶ μέλιτι καὶ ῥητίνῃ μιγεῖσα ξηρὰ ἐπὶ ἐκλειχμῷ· καὶ ὑποχόνδριον χρονίως φλεγμῆνον, ἀναληφθεῖσα κηρωτῇ πεπηγυίᾳ· ποιεῖ δὲ καὶ τοῖς ποδάγραις μετ' ὄξους δριμέος τεθερμομένη, ἢ μὲθ' ὕδατος καὶ ἁπλασσομένη. τοὺς σηπεδόνας ἔχοντας ἕλκεα καὶ ῥαγάδας κολλᾷ· ἕλκη παλαιὰ ἀναλαμβάνει καθαίρει, καὶ ἀπυλοῖ σὺν μέλιτι· ξηρὰ δὲ ὑπαφαιρεῖται σάρκας ἐπιπολῆς. πίνεται δὲ καὶ τὸ ἐξ αὐτῆς χύλισμα πρὸς τὰ εἰρημένα πάθη. ἐναρμόζεται δὲ ὄξει τῷ Γορδαίῳ καὶ τῷ Κρητικῷ. A

Περὶ Βηχίου. Κεφ. ρκς'.

BHXION φύλλα ἔχει ὅμοια κισσῷ, μείζονα δὲ καὶ πάχη. ἀπὸ τῆς ῥίζης, ἐκ μὲν τοῦ πρώτου καταλευκα, ἐκ δὲ τοῦ πρώτου καυλοῦ πήχεις πλείους ἔχοντα· καυλὸν ἀσφαλισμαῖον· ἄνθος ὠχρὸν κατὰ θέρος· ὀξεῖαν δὲ ἀποβάλλει τὸ, τε ἄνθος καὶ τὸν καυλόν· ὅθεν τινὲς ὑπέλαβον ἄκαυλον καὶ ἀνάνθη ὑπάρχειν τὴν πόαν. ῥίζα λεπτή, ἀχρηστος· φύεται περὶ λιβάδας καὶ εὐύδρους τόπους. Ταύτης τὰ φύλλα λεῖα σὺν μέλιτι καταπλασσόμενα, ἐρυσιπέλατα καὶ πᾶσαν φλεγμονὴν ἰᾶται· ὑποθυμιώμενα δὲ ξηρὰ εἰς ἀποκαπνισμὸν, σὺν ὑπὸ ξηρᾶς βηχὸς καὶ ὀρθοπνοίας ὀχλουμένοις θεραπεύει, ὅταν χρυόντες, καὶ πόνον τῷ στόματι δίζωνται· καὶ καθαίρει· ῥήσσει δὲ καὶ τὰ ἐν θώρακι ἀποστήματα. Ὁ δ' αὐτὸ ποιεῖ καὶ ἡ ῥίζα ὑποθυμιωμένη. ἔμβρυόν τε τιθηνὸς ἐκβάλλει σὺν ὑδρομέλιτι ἐφθὴ πινομένη. B

Περὶ Ἀρτεμισίας. Κεφ. ρκζ'.

ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ φύεται σὲ παραθαλασσίοις τόποις ὡς τὸ πολύ, πόα θαμνοειδὴς, πρόμικος· ἀψίθιον, μείζω δὲ καὶ λιπαρώτερα τὰ φύλλα ἔχουσα. ἔστι μέν τις ἐξ αὐτῆς βέρνης, πλατύτερα ἔχουσα τὰ φύλλα καὶ ῥαδδώδη· ἡ δὲ, λεπτοτέρα, αὐθημικρὰ, λεπτὰ, λευκὰ, καρύοσμα· φέρως δὲ αὕτη. Ἔνιοι δὲ καὶ μεσογείοις λεπτόκαρφον βοτάνιον ἀπλοῦν τῷ καυλῷ, στρόβρα μικρὸν, αὐθις παρίπλεων· κεφαλὰς C

sed & pus crassius pectore expellit. Facit & arida ad veterē tussim, rupta, conuulsáq;, si cū nasturtio, melle ac resina in eclegmate misceatur: diuturnam quoq; hypochondrij inflammationem cerato excepta lenit: valet itidem ad podagram ex aceto acri oblita aut ex aqua imposita: subdita verò mēses mouet. Quum & vulnera cōglutinat, vetera vlcera repurgat, & cum melle ad cicatricem perducit. Sicca verò carnis excrescentias cohibet. Sed & expressus ex ea succus ad eadem vitia bibitur. Verùm efficacissimum Ponticum, Creticúmque.

De Tussilagine. Cap. CXXVI.

TVSSILAGINI folia sunt hederaceis simulia, sed maiuscula, sena septenáve à radice prodeuntia, infernè subalbida, supernè verò virentia, pluribus angulis prædita: caulis palmi altitudine, flos ex luteo albicans, qui verno tēpore prodit, at quamprimum vnà cum caule amittitur. Ex quo factum vt nonnulli herbam hanc sine caule ac sine flore esse existimauerint. Radix tenuis, nec superuacua. Nascitur circa scaturigines aquarum, & riguis locis. Folia trita, ex melle imposita, erysipelatis omníque inflammationi medentur: suffita verò arida, ita vt ex ijs fumus per infundibulum hianti ore excipiatur, hauriatúrque, eos sanant qui sicca tussi & orthopnœa infestantur: pectoris etiamnum vomicas rumpunt. Eundem effectum præbet suffita radix: sed & decocta in hydromelite, & epota, partus emortuos eijcit.

De Artemisia. Cap. CXXVII.

ARTEMISIA in maritimis plerunque nascitur, herba fruticosa, absinthij similitudine, nisi quòd est maioribus pinguioribúsque folijs: quanquam est quædá lætior habitiórque, folijs virgultisq; latioribus, altera verò tenuioribus. Flores sunt parui, tenues, candidi & graueolentes, æstate autem floret. Sunt qui in Mediterraneis artemisiam monoclonon appellent, herbulam gracili surculo, simplici caule donatam, valde pusillam, attamen floribus refertā tenuibus, & ad fuluum

colorem accedentibus. Hæc quàm præcedens iucundiorem affiat odorem. Vtraque excalfacit & attenuat. Feruefactæ infidentibus fœminis prosunt ad extrahendos menses, partus, secundásque, itémque ad vulvæ præclusionem & inflammationem. Valent etiamnum ad comminuendos calculos remoratámque vrinam eliciendá. Quin etiam herba ipsa copiosior imo ventri imposita menses ciet. Succus ex eadem expressus, cum myrrha subactus vulvæque subditus, eadem quæ & insessus ex vtero trahit. Sed & coma eorundem educendorum gratia ternis drachmis propinatur.

A δὶς τῇ χρωιᾷ, λεπτὸν, καλοῦσιν ἀρτεμισίαν μονόκλωνον· ἔστι δὲ εὐωδεστέρα τῆς πρὸ αὐτῆς. Ἀμφότεραι δὲ θερμαίνουσι καὶ λεπτύνουσιν. ἀποζεννύμεναι δὲ ἀρμόζουσιν εἰς γυναικεῖα ἐγκαθίσματα, πρὸς ἀγωγὴν ἐμμηνίων καὶ δευτέρων καὶ ἐμβρύων, μύσιν τε καὶ φλεγμονὴν τῆς B ὑστέρας καὶ θρύψιν λίθων, καὶ ἐπιχριόμεναι οὖρον. ἡ δὲ πόα κατὰ τοῦ ἤτρου καταπλασθεῖσα τὴν ἐμμηνα κινεῖ· ὁ δὲ ἐξ αὐτῆς χυλὸς λειανθεὶς σμύρνῃ καὶ τοιγαρίοις, ἀγὴ ἀπὸ μήτρας ὅσα καὶ ὁ ἰγκάθισμα. καὶ πολίζεται δὲ ἡ κόμη πρὸς ἀγωγὴν τῶν αὐτῶν, πλῆθος ⊂ γ'.

Al. καὶ ἀφαιρεῖ τὸ ἐμβρυον

V addit, καὶ τὸ ἐμβρυον

De Artemisia tenuifolia. Cap. CXXVIII.

Habetur & artemisia tenuifolia, quæ circa riuulos ac sepes. & in agris frumentarijs nascitur. Huius flores & folia, si contriueris, sampsuchi odorem expirát. Si quis igitur herbam eam tusam, & cum oleo amygdalino bene subactam, more malagmatis, dolenti stomacho imposuérit, sanabitur. Quod si quis etiam neruorum dolore tenteturr, eius contritæ succo expresso & mixto cũ oleo rosaceo, si eum perunxeris, curabitur.

C Περὶ Ἀρτεμισίας λεπτοφύλλου. Κεφ. ρκή.

Ἀρτεμισία λεπτόφυλλος, ἥν τινες θηλυτέραν καλοῦσιν ὀχεῖς τὴν φερομένους καὶ εἰς χώρας εὐοσμους. Ὁ αὐτὸς ὅπερ αὐτῆς καὶ τὰ φύλλα ῥιζώματα, ὁσμὴν ἀποδίδωσι σαμψύχου. εἰ οὖν τις πυρὶ Ⓐ τόμαχον, καὶ τὸν D ἀλγοῦντα τὴν βοτάνην ταύτην μετὰ ἀμυγδαλίνου ἐλαίου καλῶς, καὶ ποιήσῃ ὡς μάλαγμα, καὶ θήσει ὅπου Ⓐ τόμαχον, θεραπεύσει. εἰ δὲ καὶ τὰ νεῦρα πονεῖ τις πυρί, τὸν χυλὸν ταύτης μιγὲν ῥοδίνου ἐλαίου μίξας χρίε, θεραπεύσει.

Hoc caput in aliquibus codicibus deest à Cornario ad notha transfertur.

De Ambrosia. Cap. CXXIX.

AMBROSIA, quam alij botryn, alij botryn artemisiam appellant, exiguus frutex est, trium palmorum altitudine, ramosus: folia circa imum caulem habet exigua, ceu rutæ, cauliculos verò minutis seminibus, quasi racemulis, qui nũquam florent, refertos: est isodore vinoso, ac suauis. Radix tenuis, & duũm palmorum longitudine. Nectitur in coronas apud Cappadoces. Vis eius, reprimere, repellere, & illitu astringere humores qui in aliquam partem incumbunt.

E ΑΜΒΡΟΣΙΑ, Ⓐ δὲ βότρυς, οἱ δὲ βότρυς ἀρτεμισίαν, θαμείσιος ἐστὶ τὴν ποίαν θαμὺς τὸ ὄψος, πολύκλαδος· φύλλα ἔχων περὶ τὴν ἐκβολὴν τοῦ καυλοῦ μικρὰ ὡς πηγάνου· τὰ δὲ καυλία περιπλέα σπερμαλίων, ὁμοίων τοῖς βοτρυδίοις μηδέποτε ἀνθοῦσι, τῇ ὀσμῇ οἰνώδης, ῥίζα λεπτὴ, διπήχης. καταπλέκεται δὲ ἐν Καππαδοκίᾳ τοῖς στεφανοις. Δύναμιν δὲ ἔχει καθαρτικὴν τῶν ὀπτικῶν φερομένων καὶ ἀποπρουστικὴν, καταπλασσομένη σὺν μέλιτι.

V. ἰμάσιον. Al. μασία

V. ἰμάσιον

V. ἐπιπλέκεται

V. ἐπιπλέκουσι

V. ὀπτικοῦ.

De Botry. Cap. CXXX.

BOTRYS herba est lutea tota, fruticosa, latè sparsa, & alis compluribus prædita. Semen circa totos ramulos nascitur: folia cichorio similia, numerosa. Herba verò tota suauiter admodum olet, quamobrem vestibus etiam interponitur.

Περὶ Βότρυος. Κεφ. ρλ'.

G ΒΟΤΡΥΣ πόα ἐστὶν ὅλη μηλίνη, θαμνοειδὴς, ἀφαχειλώδη, πολλὰς ἔχουσα μεγάλας. Ὁ δὲ σπέρμα ὅλοις τοῖς χλωροῖς περιφυκὸς· φύλλα κιχορίῳ ἐμφερῆ πολλὰ καὶ τὸ σύμπαν βίαιος ἰσχυρῶς· διὸ καὶ ἱματίοις συνάπτεται.

Sic V. & Lacuna codex. vulg. exemplatorem.

φύεται δὲ μάλιστα περὶ χαράδρας καὶ χειμάρρους. Δύναμιν δὲ ἔχει σὺν οἴνῳ πνιγμὴν ὀρθοπνοίας πραΰνουσαν. καὶ τοῦτο ἀμβροσίαν Καππαδόκαι καλοῦσι, τινὲς δὲ ἀρτεμισίαν.

A Inuenitur verò potissimùm citra profluentes aquas, & in torrentium ripis. Pota ex vino orthopnœas mulcendi vim habet. Et hanc Cappadoces ambrosiam vocant, alij artemisiam.

Περὶ Γερανίου. Κεφ. ρλά.

De Geranio. Cap. CXXXI.

ΓΕΡΑΝΙΟΝ, ὃ μὲν φύλλον ἔχει ὅμοιον ἀνεμώνῃ, ἐσχισμένον, μακρότερον ῥίζαν ὃ τινὲς τρόχυλον, γλυκεῖαν, εὐθυμορφίλλου, ἣ τὰς πολιώσας ὀνομάζει. πλῆθος, ὑσπάρας ἐμπυημαλεύσεις λύει. καλεῖται ὑπ' ἐνίων καὶ ἕτερον γεράνιον, ἔχον καυλία λεπτὰ, χνοώδη, διασπάσιμα· φύλλα μαλάχης ἐμφερῆ, καὶ ἐπ' ἄκρων τῶν μακρῶν ἐξοχάς τινας αἰανεμώνης, οἷς θῆρες κεφαλὰς σὺν τοῖς ῥάμφεσιν, ἢ κυνῶν ὀδόντας. ῥίζης δὲ αὐτοῦ ἐν ἰατρικῇ οὐδεμία.

B GERANIVM folio est anemones, incisuris diuiso, ac longiore; radice propemodum rotunda, dulci & esui apta. Hæc drachmæ pondere in vino pota, vuluę inflationes discutit. Vocatur & à nonnullis geranium alterũ, quod cauliculos habet tenues, lanuginosos, binûm palmorum altitudine: folia verò ceu malvæ, & in summis alis sursum spectãtes eminentias quasdam, veluti gruum capitula cum suis rostris, aut dentes caninos. Sed nullius est in medicina vsus.

Περὶ Γναφαλίου. Κεφ. ρλβ'.

De Gnaphalio. Cap. CXXXII.

ΓΝΑΦΑΛΙΟΝ, τοῦτο ἔνιοι φύλλοις πίνει αὐτὸ γναφάλου χρῶνται, λευκοῖς οὖσι καὶ μαλακοῖς. πίνεται δὲ σὺν οἴνῳ αὐστηρῷ πολλάκις τὰ φύλλα πρὸς δυσεντερίας.

C GNAPHALII folijs albis, mollibúsque pro tomento vtuntur. Efficaciter autem ad dysenteriam in vino austero propinantur.

Περὶ Τύφης. Κεφ. ρλγ'.

De Typha. Cap. CXXXIII.

ΤΥΦΗ, φύλλον ἔχει ὅμοιον κυπειρίδι ὅμοιον καυλὸν λεῖον, ὁμαλὸν, ἐπ' ἄκρῳ πάχος χειρὸς ἔχοντα αὐθος πυκνὸν καὶ ἐκπαπυρίζον, ὃ καλοῦσιν ἔνιοι ἀμφίλιον. τούτης τὸ αὐθος ἀναληφθὲν φασὶ παλαιῷ ὑείῳ πιπλυσθέν, καθαίρειν ἕλκη θεραπεύειν. φύεται δὲ ἐν ἕλεσι καὶ ὑδροχαρέσι τόποις.

D TYPHA folium profert cyperidi simile, caulem lævem & æquabilem, quem in cacumine flos ambit densus, quíque in pappos soluitur. Eum aliqui paniculam nominant. Huius flos vetere fuillo adipe loto exceptus ambustis medetur. Gignitur autem in paludibus & aquis stagnantibus.

Περὶ Κιρκαίας. Κεφ. ρλδ'.

De Circæa. Cap. CXXXIIII.

ΚΙΡΚΑΙΑ, ἣν δὲ κιρκαίαν καλοῦσι· τὰ μὲν φύλλα ἔχει τρύχνου ὅμοια κηπαίου, πολυφυάδας ἢ πολλὰς· αὐξῆ μέλαινα, μικρὰ, πολλὰ· καρπὸν δὲ κεγχροειδῆ ἔντιον οἱονεὶ καρδαμίνοις· ῥίζας ἀποθαμνιαίας γ' ἢ δ'. λευκὰς, εὐώδεις, θερμαντικάς. μάλιστα δὲ ἐν τοῖς πετρώδεσι φύεται τόποις καὶ ὑπτιοκαίοις εὐηλίοις. τούτης ἡ ῥίζα ὅσον μυᾶς δ'. θλασθεῖσα, καὶ βραχεῖσα ἡμέρας καὶ νύκτα ἐν οἴνου γλυκέως κοτύλαις ς'. καὶ πολιοῦσα ἡμέρας γ'. ὑσπάρας ἀποκαθαίρει. ὁ δὲ καρπὸς γάλα καθαπερεὶ τὸ ῥοφήμασι λαμβανόμενος.

E Inuenitur verò potissimùm citra profluentes aquas, & in torrentium ripis. Pota ex vino orthopnœas mulcendi vim habet. Et hanc Cappadoces ambrosiam vocant, alij artemisiam.

F

G GERANIVM folio est anemones, incisuris diuiso, ac longiore; radice propemodum rotunda, dulci & esui apta. Hæc drachmæ pondere in vino pota, vuluę inflationes discutit. Vocatur & à nonnullis geranium alterũ, quod cauliculos habet tenues, lanuginosos, binûm palmorum altitudine: folia verò ceu malvæ, & in summis alis sursum spectãtes eminentias quasdam, veluti gruum capitula cum suis rostris, aut dentes caninos. Sed nullius est in medicina vsus.

De OEnanthe. Cap. CXXXV.

OENANTHEN alij leucanthon nominát. Folia edit pastinacæ: flores candidos: caulé crassum, palmi altitudinè: semen atriplicis: radicem denique magnam, in multa rotunda capitula extuberantem. Nascitur in petris. Semen, caulis ac folia, ad secundas pellendas cum vino mulso propinantur. Ipsa quoq; radix è vino ad strangurias regiúmque morbum vtilis.

De Conyza. Cap. CXXXVI.

CONYZA quædam parua vocatur, odore præstantior: maior altera, quæ frutice altior est, foliisque latioribus atque graueolens. Vtriusque folia oleæ similia, at hirsuta & pinguia. Et maioris quidem conyzæ caulis in binûm cubitorum altitudinem assurgit, minoris verò, pedem æquat. Flos squalidus est, lutei colotis, & subamarus, ac in pappos abit: radices autè superuacuæ. Frutex cum foliis substratu suffitúque venenatas bestias fugat, culices abigit, ac pulices quoque necat. Folia vtiliter imponúntur serpentiú morsibus, tuberculis atque vulneribus. Flores etiam ac folia ad mẽses partusque pellendos in vino bibuntur; itémque contra strangurias, tormina, morbúmque regium. Eadem ex aceto pota, comitiales adiuuant. Quin & decoctum insessu vuluę vitijs medetur, menséſque purgat. Subditus autem succus abortú infert. Sed & herba ex oleo peruncta, contra rigores est efficax. Tenuior verò, etiam capitis dolores imposita sanat. Est & tertium conyzæ genus, caule crassiore molliore éque, foliis mediæ inter maiorem & minorem amplitudinis. Minimè autem pinguis ea est, at odore longè grauior, atque adeò iniucundior simul & inefficacior. Locis aquosis prouenit.

De Hemerocalle. Cap. CXXXVII.

HEMEROCALLES caulẽ foliáq; habet lilij, sed porri modo virétia. Flores in singulis scapi propaginibus terni quaternive erúpút, lilij diuisura, cùm debiscere cœpe-

Περὶ Οἰναν θης. Κεφ. ρλέ.

Hæc non reperiuntur in Ald. cod. nisi mutila.

Ο Ι ΝΑΝΘΗ, οἱ δὲ λεύκανθον καλοῦσιν· τὰ μὲν φύλλα ἔχει ὅμοια σελίνῳ· ἄνθος δὲ λευκὸν καὶ καλὸν τὸ χρῶ, ἀσφάμινον· καρπὸν δὲ ὡς σφὴν ἀπεφάξιος· ῥίζαν μεγάλην, κεφαλὰς ἔχουσι πολλὰς, στρογγύλας. φυεῖ) ἐν πέτραις. ταύτης ὁ καρπὸς ἡ ὁ καυλὸς καὶ τὰ φύλλα, πολιζό) σφρὸς δυσέρων ἐκβολὴν σὺν οἴνῳ μέλιτι. ἡ ἡ ῥίζα σὺν οἴνῳ σφὸς στραγγουρίας ἁρμόζει, ἔ ἴκτερον. Περὶ Κονύζης. Κεφ ρλς'.

KONYZA, ἡ μὲν τις μικρὰ καλεῖται, εὐωδεστέρα ὅσα· ἡ δὲ μείζων, ὑπερέχουσα ὡς ἁλμυρὰ, καὶ τοῖς φύλλοις πλατύτερα, καὶ βαρύοσμος. ἀμφότεραι δὲ σφοσπεύκασι τοῖς φύλλοις ἐλαίᾳ. ἔστι δὲ δακτύλια ταῦτα καὶ λιπαρά· ὕψος δὲ τῷ καυλῷ ἡ μὲ μείζων, δύο πήχεων ἔχει· ἡ δὲ ἐλάττων, πόδος· ἄνθος φαφαρὸν, μέλινον, ὑπόπικρον, ἐκπαπεύριμον· ῥίζαι δὲ ἄχρηστοι. Δυνάμεις) ἡ ὁ θάμνος ὑποστρογγύλους σὺν τοῖς φύλλοις καὶ θυμώδης, θηρία διώκει, καὶ κώνωπας ἀπελαύνει· κλείει ἡ καὶ φύλλας καὶ ἁπλάσει) δὲ τὰ φύλλα ὠφελίμως ὀπὶ ἐρπετοδήκτοις καὶ θυμῷ καὶ πεπαιμάτων. καὶ πίνεται σὺν οἴνῳ τὸ ἄνθος καὶ τὰ φύλλα· σφὸς καθαρσίους ἀγωγὴν καὶ ἐμεσμούς ἐκβολὴν, καὶ στραγγουρίαν, καὶ στρόφοις καὶ ἴκτερον· μετ' ὄξους δὲ ὀπιλαμπικὰς πυώδεα ὠφελεῖ καὶ τὸ ἀφίψημα ἡ αὐτῶν ἐν καθίσματι, ἐπὶ ὠτίων, στραπεύ) ἔ ἔμμηνα ἀποκαθαίρει ἡ χυλὸς σφοσδήσις ἐκβυσμοὺς ποιεῖ· ποιεῖ ἡ καὶ σφὸς ῥῖγη συλλαμβανόμενον ἡ πόα μεῖ ἐλαίᾳ· ἡ δὲ λεπτὴ καὶ κεφαλαίας καὶ ἁπλασομένη ἀ). Γίνεται ἔ ῥίζαι ὧδε κονύζης. ἔστι ἡ καυλῷ τὰ χείρα καὶ μαλακώτερα, τοῖς ἡ φύλλοις μείζων καὶ λεπτὸς, ἡ ἀσκὸν ἡ καὶ μείζονος, καὶ λιπαρὰ, βαρυοσμότερα ἡ πολλῷ καὶ ἀνδεσίρα καὶ ἀπραιλοτέρα. φυεῖ) ἡ ἐν ὑφύδροις.

Περὶ Ημεροκαλλίδος. Κεφ. ρλζ.

HΜΕΡΟΚΑΛΛΙΣ φύλλα ἔχει καὶ καυλὸν ὅμοια κρίνῳ, χλωρὰ δὲ ὥσσ σφρόσα. ἄνθος δὲ ὡς αὐτῷ κεθ' ἑκάστῳ ὀπώφυσιν γ'. ἡ δὲ πλείω τοῦ κρίνῳ ἐοικότα, ὅταν ἀνοίξῃται χάσκει·

Hæc non reperiuntur in Ald. cod. nisi mutila.

V. inlinens

V. illinens]

Addit Lacuna ex ver. cod & τὸ καθαρσ.

Alter pro Σελίνου habet Νάπυος. Sic V & Lacuna cod. Vulg. exẽpl. carent.

Al. ἔθμους καθαρσ.

V. nonnulli carent sequentibus ad capitis vsque calcem.

Al. χάσκει

τιὼ δὲ χρόαν ἰσχυρὸς ὠχρᾶ. ῥίζαι ὁμοίαι βολβῷ θυμελίῃ· ἣ πῖσα λεῖα ποθεῖσα, καὶ σὺν μέλιτι ἐπὶ ἑρίῳ προσφθεῖσα, πεπαίνει ὄγκους καὶ αἱμαγωγές. τὰ δὲ φύλλα λεῖα καταπλασσόμενα, φλεγμονὰς μαζῶν ταῖς ἐπιπεπτωκυίαις καὶ ὀφθαλμῶν προσφύη. καὶ καταπλάσσεται δὲ ἡ ῥίζα καὶ τὰ φύλλα ὠφελίμως ὅτι πρὸ πυρετοῦ. A rint, saturatiore verò ochrę colore: radix prægrandi bulbo similis est: quæ quidem trita potáque aut cum melle & lana subdita in pessu, aquâ & sanguinem mutilem educit. Folia verò trita illitáque, mammarum à partu inflammationes, necnon & oculorum epiphoras mitigant. Cæterùm & radix & folia igni ambusta vtiliter imponuntur. B

Περὶ Λευκοΐου. Κεφ. ρλή.

ΛΕΥΚΟΙΟΝ γνώριμόν ἐστιν. εἰσὶ δὲ αὐτοῦ διαφοραὶ ἐν τῇ ἀνθῇ. ἢ γὰρ λευκόν ἐστιν, ἢ μήλινον ἢ κυανοῦν ἢ πορφυροῦν εὑρίσκεται. Ἐστι δὲ αὐτῶν δύναμις περὶ τὴν ἰατρικὴν χρῆσιν τὸ μήλινον· οὗ τὰ αὐῆ ξηρὰ ἀποζανθέντα, εἰς ἑδρασμοὺς ποιοῦσι ταῖς ἕδραις ὑστέραν φλεγμονὰς, καὶ ἀναγωγὰς ἐμμηνίων· ἀναλημφθέντα ἢ πρωΐ, ῥαγάδας ταῖς ἐν στόματι θεραπεύει· σὺν δὲ μέλιτι, ἄφθας. ὁ δὲ καρπὸς αὐτοῦ, σὺν οἴνῳ ποθεὶς δραχμῶν δυοῖν πλῆθος, ἢ πεσσοῖς σὺν μέλιτι, ἐμμηνα καὶ δύτηρα καὶ ἔμβρυα ἄγει. αἱ δὲ ῥίζαι καταπλασθεῖσαι σὺν ὄξει, τέλλοισι καλλίωα, καὶ ποδαγρικοὺς ὠφελοῦσι. C D

Addit Cataceni codex: λευκοΐου δυναίνεται, οἱ δὲ ἴον δυναίνεται. ἰοειδεῖς βάπτα κεφαλὰς ἔχει καὶ αὐτὸ τὸ ἄνθος αὐτοῦ τοῦ ὑπὸ ἄνθος λευκοΐου.

Περὶ Κρατιογόνου. Κεφ. ρλθ'.

ΚΡΑΤΑΙΟΓΟΝΟΝ, ὃ ἔνιοι κραταιόγονον, φύλλα ἔχει ὅμοια τοῖς τοῦ μελαμπύρου (πλείους δὲ ἀπὸ μιᾶς ῥίζης φύουσι) βλαστοὶ γονατώδεις) καρπὸν ὅμοιον κέγχρῳ. φύεται ἐν συσκίοις καὶ φρυγμώδεσιν ὡς ἱππομολύ πόποις, ἰσχυρῶς δὲ δριμύ. Ἱστορεῖται δὲ ὑπό τινων ἡ πόσις τοῦ καρποῦ γυναῖκα ἀρρενοτόκον ποιεῖν, ἐάν τις μετὰ τὸν καθαρσιν τῆς καταμηνίων πρὸ τοῦ πλησιάσαι πάνυ νήστις πίνῃ τῆς ἡμέρας ὅλκην πεντώβολον μετ' ὕδατος κυάθων ϛ'. ὅτι ἡμέρας μὲν ὡσαύτως δὲ καὶ ὁ ἀνὴρ πινέτω. ταῦτα ἴσας ἡμέρας, καὶ πλησιαζέτω. E F

Lacuna ex vet. cod. legit φρυγμώδεσιν, id est, aridis.

Περὶ Φύλλου. Κεφ. ρμ'.

ΦΥΛΛΟΝ, ὃ δὲ ἐλαιόφυλλον, οἱ δὲ βρυωνίδα καλοῦσι· φύεται ἐν πέτραις. τὸ μὲν θηλυγόνον λεγόμενον, ὡσανεὶ βρύον ἔχον, χλωρότερον ἐλαίας τὸ φύλλον καυλὸν λεπτὸν, βραχὺ· ῥίζαν λεπτὴν· ἄνθος λευκὸν· καρπὸν μείζονα, ὥσπερ μήκωνος. G

Marc. Apuu

Lacuna ex vet. cod. legitur λευκὸν, μικρὸν.

De Leucoio siue viola alba. Cap. CXXXVIII.

LEVCOION vulgaris est notitiæ: sed est in floribus differẽtia. Nanque aut albi, aut lutei, aut cærulei, aut etiam purpurei reperiuntur. Est porrò leucoium luteum inter cætera præcipui in medicina vsus: quippe cuius aridi flores feruefacti, in desessionibus valent contra vulvæ inflammationes, menstruáque pellunt. Cerato verò excepti, rimas sedis: cum melle autẽ, oris vlcera, quæ aphthæ dicuntur, sanant. At semen duûm drachmarũ pódere ex vino potum, aut cum melle subditum, menses, secundas & partus extrahit. Cęterùm radices ex aceto illitæ lienem reprimunt, & podagricos iuuant.

De Crataeogono. Cap. CXXXIX.

CRATÆOGONON, siue, vt alijs placet, Cratæonon, folia habet melampyri: plures autem ab vna radice emicant culmi geniculati: semen est milio simile. Nascitur vt plurimum locis opacis & frutetosis. Est autem vehementer acre. Traditur à quibusdam, seminis potum efficere vt mulier virilis sexus fœtum pariat, siquidem post menses purgatos, anteaquam cum viro congrediatur, ter die ieiuna semen tribus obolis in aquæ cyathis duobus, bibat, ad dies quadraginta: bibat & ipsum vir modo consimili, ac totidem etiam diebus, deindéq; cum illa coëat.

De Phyllo. Cap. CXL.

PHYLLON, alij elæophyllon, bryoniam alij nominãt: in saxosis nascitur. Ac illud quidem quod thelygonon dicitur, veluti bryon oleæ pallidius gerit: folio verò est magis herbacei coloris: caule tenui, breui: radice gracili: flore albo: semine papaueris, maiusculo.

Arrhenogonon verò cætera antedicto simile: semine tantùm differt: habet enim racemosum, ei quodammodo simile quod, postquam defloruit olea, primulum emergit atque conspicitur. Perhibetur autem, arrhenogoni potu mares generari: thelygoni verò, fœminas. Hæc memoriæ prodidit Crateuas: quanquam talia mihi videtur historiatenus, tanquam fama auditione ve accepta, proponere.

A Τὸ δὲ ἀῤῥενογόνιον, τὰ μὲν ἄλλα ὅμοιον τῷ θηλυγόνῳ· καρπῷ δὲ διαφέρει· ἔχει γὰρ ὅμοιον * αἰγὶ ἐξελιφθείσης ἐλαίας βοτρυώδες. λέγεται δέ, τὸ ἀῤῥενογόνιον, πολὺν, ἀῤῥενοτοκεῖν· τὸ δὲ θηλυγόνιον, θηλυτοκεῖν. Ἱστορεῖ ταῦτα Κρατεύας· ἐμοὶ δὲ δοκεῖ τὰ διαῦτα μέχρι τῆς ἱστορίας εἰς τοσάδε.

B

De Orchi seu testiculo. Cap. CXLI.

Περὶ Ὀρχεως. Κεφ. ρμά.

De testiculo v. cod. quæd præfixa filetæ.

ORCHIS, quę alij cynosorchin, quasi canis testiculum, vocant, foliis est circa caulis imam partem in terra stratis, mollibus, oleæ similibus, at longioribus: caule palmari, in quo flores purpurascentes emicant: radice bulbosa, oblonga, gemina, angusta, oliuarum instar: quarũ vna superior est, altera inferior, & hæc quidem plenior ac mollior: illa durior ac rugosa. Radix cocta vt bulbus estur. Sed & de his radicib' memoriæ proditur, si maiorem edant viri, mares generari: si minorem fœminæ, alterum sexum. Insuper autem proditum est, in Thessalia mulieres teneram è lacte caprino propinare ad excitandam libidinem: aridam verò, ad eandem inhibendam: atque ab vnius potu alterius vires exolui. Nascitur in saxosis & sabuletis.

Vel folio molli similibus: at angustioribus & longioribus.

Ὄρχις, ἡ δὲ κυνὸς ὄρχιν καλοῦσι, φύλλα ἔχει κατὰ γῆς ἐστρωμένα περὶ καυλὸν καὶ τὴν πυθμένα, * ἐλαίᾳ μαλακῇ ὁμοια, στενώτερα δὲ καὶ λεπτότερα· καυλὸν σπιθαμῆς τὸ μῆκος, ἐφ' οὗ ἄνθη πορφυρεσειδῆ· ῥίζαν βολβοειδῆ, ὑπομήκη, διπλοῦν, στρογγύλον, ὡς ἐλαίας, τὸν μὲν ἄνω, τὸν δὲ κατώτερον. καὶ τὸν μὲν, * πλήρη· τὸν δὲ μαλακὸν καὶ ῥυσόν. ἐσθίεται δὲ ἡ ῥίζα ὡς βολβὸς ἑφθεῖσα· ἐπὶ τοῖσδε δὲ ἱστορεῖται, τὴν μὲν μείζονα ῥίζαν ὑπὸ ἀνδρῶν ἐσθιομένην, ἀῤῥενογόνον εἶναι· τὴν δὲ ἐλάττονα ὑπὸ γυναικῶν, θηλυγόνον. προσιστόρηται δὲ καὶ ταῖς ἐν Θετταλίᾳ γυναιξὶ, * μὴ ἀπαλὸν μετὰ αἰγείου γάλακτος πολύειν, ὡς παυστικὸν τὸ ἀφροδίσια· μὴ δὲ ξηρὸν, πρὸς ὄρεξιν καὶ ἔκλυσιν τῶν ἀφροδισίων· ἀναλύεσθαί τε τὴν ἑτέραν ὑπὸ τοῦ ἑτέρου πινόμενον. φύεται δὲ ἐν λιθώδεσι καὶ ἀμμώδεσι τόποις.

De testiculo altero. Cap. CXLII.

Περὶ Ὀρχεως ἑτέρου. Κεφ. ρμβ'.

Testiculus alter, quem alij, velut & Andreas, Serapiada vocant, propter radicis multiplicem vsum, foliis est porri, oblongis, at latioribus & pinguibus, ex alarum sinu inflexis: cauliculis palmaribus, ac floribus penè purpureis: radix autem subiacet testiculis similis. Hæc imposita œdemata dissipat, vlcera repurgat, herpetem sistit: fistulas quoque abolet, & illita partes inflammatas demulcet. Arida eadem insperſa nomas cohibet, sanátque putrescentia & cacoëthe oris vlcera. Aluum denique sistit, è vino pota. Sed & de hac radice eadem, quæ de antè memorata testiculi canini radice, narrantur.

Ὄρχις ἕτερος, ὃν Σεραπιάδα ἕτεροι καλοῦσιν, ὡς καὶ Ἀνδρέας λέγει τὸ πολύχρηστον τῆς ῥίζης· φύλλα ἔχει ὁποῖα πράσου ὑπομήκη, πλατύτερα δὲ καὶ λιπαρά, ἐπικαμπῆ ὁ δὲ μεγάλως· καυλία σπιθαμιαῖα· ἄνθη ὑποπόρφυρα· ῥίζα δὲ ὑπεστὶν ὀρχεσίοις ὁμοία. Ἣ πεῖς δυνάμει ἔχει καταπλατυνομένη οἰδήμασιν σκεδαστικὸν, καὶ ἑλκῶν αἰκισθαρτικὸν, ἡ ἕρπητας ἐφεστικόν. ἰαίνεται δὲ καὶ σύριγγας, καὶ τὰ φλεγμαίνοντα πρηνῶς καταπλασσομένη. ξηρὰ δὲ ὑπὸ πασσομένη, νομὰς ἵστησι· καὶ τὰ ὑπὸ σπιδόνι ἢ τόμῳ κακωθέντα ἰᾶται· ἵστησι δὲ καὶ κοιλίαν σὺν οἴνῳ πινομένη. ἱστορεῖται δὲ καὶ περὶ ταύτης, ὅσα καὶ περὶ τῆς κυνὸς ὄρχεως.

Pena legit πυδόχρων. Ald. ἀπαλήν. Sic Dod. V μαλακὸν & sequentia delet vsque ad ὁμοία

Al. μεγάλως. sed male.

V. circa.

Sic vocat Laconæ codex. at vulg. exempl. carens.

Al. τε

Περὶ Σατυρίου. Κεφ. ρμγ'.

Σατυριον, ⓐ δὲ τετφυλλον καλουσι, ἐπιδιὰ ὡς ὅτι τριῶ χλῶ φύλλα τεῖα φέρῃ κεκλασμένα, λαπάθῳ ἢ κρίνῳ ὅμοια, ἐλάττονα μέντοι καὶ ἐρευθῆ καυλὸν δὲ ψιλὸν, μακρὸν, ὡς πήχεως· ἄνθος κρινοειδὲς, λευκὸν· ῥίζαν βολβοειδῆ, ὅσον μῆλον, πυρρὰν· τὰ δὲ ἐντὸς λευκὴν, ὥσπερ ὠὸν· γευομένῳ γλυκεῖαν καὶ εὔστομον. Ταύτην δεῖ πίνειν ἐν οἴνῳ μέλανι αὐστηρῷ πρὸς ὀπισθότονον. καὶ εἰ βούλει γυναικὶ συνουσιάσαι, ἔχε ταύτην· φασὶ γὰρ αὐτὴν καὶ ἀφροδισιακὴν εἶναι διὰ τοῦτο συνουσίαν.

Περὶ Σατυρίου ἐρυθρονίου. Κεφ. ρμδ'.

Σατύριον δὲ ἐρυθρόνιον, εἴ τις καλέσειεν ἐρυθραϊκὸν, ἔχει σπέρμα λινοσπέρμῳ ἐμφερὲς, μεῖζον δὲ καὶ ῥωμαλέον, καὶ στίλβον, καὶ λεῖον, ὥσπερ ἰσχάδα· καὶ αὐτὸ συνουσίας ἐγείρειν ὥσπερ καὶ ὁ σπίγγος. ἔστι δὲ τῆς ῥίζης αὐτῆς ὁ μὲν φλοιὸς ὑπόχλωρος καὶ πυρρός· τὸ δὲ ἔνδοθεν λευκὸν, γευομένῳ εὔστομον, καὶ γλυκύ. φύεται δὲ εὐηλίοις καὶ ὀρεινοῖς τόποις. ἰσχάδα δὲ ὅτι καὶ εἰς τὸν χεῖμα λαμβάνουσι ῥίζα, ἐρεθίζει πρὸς ἀφροδίσια· σὺν οἴνῳ δὲ πινομένη, μᾶλλον.

Περὶ Ὁρμίνου. Κεφ. ρμε'.

Ὁρμινον ἥμερον, πόα ἐστὶν ἐμφερὴς τερμοίῳ τοῖς φύλλοις. καυλὸς δὲ τετράγωνος ἡμιπηχαῖος· περὶ οὗ ἐξοχαὶ ὅμοιαι λοβοῖς ὡς ὅτι τριῶν ῥίζαν γενικῆν, ἐν αἷς σπέρμα ἔχει φορον· ὅτι μὲν γὰρ ἀγρίου στρογγύλον φαίνεται φαιὸν· ὅτι δὲ τοῦ ἑτέρου, ὀβριμώτερος καὶ μέλαν, οὗ καὶ ἡ χρῆσις. δοκεῖ δὲ καὶ τοῦτο σὺν οἴνῳ πινόμενον, συνουσίαν παρορμᾶν. ἀποκαθαίρει δὲ σὺν μέλιτι λῆγμα, λευκώματα, καὶ ἁπλαδὲν δὲ μὴ ὕδατος καὶ οἰδήματα ἀφορᾷ, καὶ σπλῆνας ὀπισθοτόνους. καὶ ἡ πόα δὲ καταπλασθεῖσα, τὰ αὐτὰ ποιεῖ. τὸ δὲ ἄγριον ἰσχυροτέραν ἔχει τὴν δύναμιν. ὅθεν μίγνυται καὶ συνθείσμασι, μάλιστα δὲ τῷ γλεύκινῳ.

Περὶ Ἡδυσάρου. Κεφ. ρμς'.

Ἡδυσαρον δὲ τὸ τῶν μυρεψῶν καλούμενον πελέκινος, θάμνος ἐστὶ φυλλάεια ἔχων ἐρεβίνθῳ ὅμοια, λοβοὺς

Mutc. ἀε δὲ ἡ τοῦ. Lacuna verò legit in antiquo exemplari ita: Τετράφυλλον τεῖα φέρει κεκλασμένα. Sic & Serapio & Oribas.

Vulg. cod. ex-

Hæc non habet Ald codex, nihil inquit notha.

Mutc. ἐρυθρόνιον

V. addit, εἰ δὲ μέλιτος τι ὁ ὀνομ. quod inter notha legitur.

Orib. mutil

Vulg. exempl. addunt ὁμοίως

A *De Satyrio. Cap. CXLIII.*

Satyrium alij trifolium vocant, quoniam vtplurimum terna folia in terram conuexa proferat, rumici aut lilio similia, attamē minora atq; rubescentia: caulem gerit nudū, cubitalem: florē lilij effigie, candidū: radicem bulbosam, mali magnitudine, rutam, intus verò albam, oui instar, sapore dulcem oríque gratā. Hanc in vino nigro austero bibere oportet, contra opisthotonon. Ipsa quoque vtere, si cum muliere rē habere volueris. Eam enim etiam ad venereos impetus concitatricē vim habere affirmant.

B

De Satyrio erythronio. Cap. CXLIIII.

Satyrium erythronium siue erythraïcum, semen habet lini similitudine, at maius, firmum, splendēs ac læue: quod fertur etiam nō secus atque scincus libidinem excitare. Est verò cortex radicis aliquantum gracilis ac rufus: interna autē pars alba, sapore dulci, oríque grata. In apricis & montosis locis enascitur. Prodit & radix, si modò manu teneatur, veneré stimulare, eóque magis, si bibatur in vino.

C

D

De Hormino. Cap. CXLV.

Hormynum herba est foliis marrubio similis: caule quadrāgulo, semicubitali, circa quem eminentiæ siliquis similes conspiciuntur, quæ quidem radicē versus spectant, & in quibus semen diuersum recluditur. Siquidē in syluestri rotundum fuscúmque reperitur, at in altero oblongum & nigrius, cuius & vsus est. Creditur enim in vino bibitum, etiam venerem stimulare. Purgat verò cum melle oculorū argema & albugines: illitúmque ex aqua, etiā œdemata discutit, & infixos aculeos è corpore extrahit. Sed & imposita herba hæ eadē præstat. Syluestre autē magis viribus pollet: quamobrem etiam vnguentis, præsertímque gleucino immiscetur.

E

F

De Hedysaro. Cap. CXLVI.

Hedysarvm, quod vnguentarij pelecinum, id est, securidacam, vocant, frutex est minutis foliis, ciceri similibus: siliquis verò

G

cornicula referentibus, in quibus semen suluum, quod ancipitem securim æmulatur (vnde & nomen accepit) gustu amarum, stomachóque in potu vtile. Additur & in antidota. Cum melle verò subditum, ante coitum spem partus adimere creditur. Cæterùm inter triticum & hordea nascitur.

A χαρατίοις ἐοικότας ἐν οἷς τὸ σπέρμα πυρρόν, ὅμοιον πελέκει ἀμφισόμῳ, ὅθεν καὶ ὀνόμασται· πικρὸν γλυκαμάρῳ· εὐστόμαχον, πολύμιγνυται δὲ καὶ ἀποβάσεις σὺν μέλιτι δοθὲν πρὸ τῆς μίξεως, ἀπόκιον εἶναι δοκεῖ. φύεται δὲ ἐν κριθαῖς καὶ πυροῖς.

De Onosmate. Cap. CXLVII.

Περὶ Ονόσματος. Κεφ. ρμζ'.

ONOSMA, alij osmadem, alij phlonitum, alij denique ononim vocant: folia habet ad similitudinẽ anchusæ, oblonga, mollia, quatuor digitorum longitudine & vnius latitudine, in terra iacentia, denique anchusæ folijs quàm simillima. Est autem sine caule, sine semine, sine flore. Radicula verò subest longiuscula, infirma, tenuis, ac modicè rubescens. Gignitur in asperis. Folia in vino pota partus extrahunt. Sed & prægnans si herbam eam supergrediatur, abortum facere dicitur.

B ΟΝΟΣΜΑ, ὃ δὲ ὀσμάδαν, οἱ δὲ φλοιτῖτιν, οἱ δὲ ὄνονιν καλοῦσι, τὰ μὲν φύλλα ἔχει ὅμοια τοῖς τῆς ἀγχούσης, προμήκη, μαλακά, ὡς τετραδακτύλου τὸ μῆκος, τὸ δὲ πλάτος δακτύλου, ὑπτίας κατερωμένα, ἐμφερίσταται τοῖς τῆς ἀγχούσης. ἔστι δὲ ἄκαυλος, ἄκαρπος, ἀνθηρός· ῥίζιον δὲ ὑπόκειται κατόμικες, ἀδρυές, λεπτοί, εὐερυθὲς ἠσυχῆ· φύεται δὲ ἐν τραχέσι τόποις. Τοῦτον τὰ φύλλα ἐν οἴνῳ πιθέντα, ἔμβρυα ἄγειν φασὶ καὶ ὅπερ ἂν εἴκοσι ἡμέρας ὑποβρέξῃ τις ὑπὸ πόας, ἐκλιπαίνοντα.

Lacuna legit in vet. cod. ῥίζαν.

De Nymphæa. Cap. CXLVIII.

Περὶ Νυμφαίας. Κεφ. ρμη'.

NYMPHÆA in paludibus stagnantibúsq; aquis nascitur: folia verò habet Ægyptiæ fabæ similia, at minora oblongioráque, plura ab vna eadémque radice prodeuntia: quorum alia super aquam quodammodo extant, alia in ea ipsa demerguntur: florẽ album, lilio similem, in quo medium croceũ est. At cùm defloruerit, cályculus rotundus, figura malo aut papaueris capiti similis, idémq; niger, extuberat: in quo semen nigrum, latum, densum, atque gustanti létum glutinosúmve recluditur. Caulis est læuis, minimè crassus, niger, Ægyptiæ fabæ cauli similis: radix nigra, scabra, clauæ similis, quę autumno secatur. Ea sicca, cum vino pota, cœliacis ac dysentericis auxiliatur, lienémque consumit. Stomachi quoque ac vesicæ doloribus sedandis ipsa radix imponitur, & alphos ex aqua emẽdat: alopecijs etiamnum cum pice imposita medetur. Eadẽ contra veneris insomnia bibitur, siquidẽ illa in totũ adimit: quin & aliquot diebus cõtinẽter epota, genitale ita infirmat, vt arrigi minimè possit. Idẽ porrò seminis quoque poti effectus est. Cæterùm à nymphis nymphææ nomen sibi vendicasse creditur, quoniam loca amet aquosa. Plurima autem

D ΝΥΜΦΑΙΑ φύεται ἐν ἕλεσι καὶ ὕδασι στασίμοις· φύλλα δὲ ἔχει ὅμοια κυαμῶρίῳ, σμικρότερα δὲ καὶ ὀλιγωτέρα, πᾶσιν ὑποφέροντα τὸ ὕδατος. τὰ δὲ καὶ ἐν αὐτῷ τῷ ὕδατι, πλείονα ἐκ τῆς αὐτῆς ῥίζης· ἄνθος δὲ λευκόν, ὅμοιον κρίνῳ, ἔχον κροκώδες τὸ μέσον. ὅταν δὲ ἀποθηρώσῃ, στρογγυλοειδὲς, μήλῳ ἢ παπάβερι πλησιόν τὴν ὄψιν φερόμενον γίνεται, ἧ μήκωνος κεφαλῇ, μέλαν ἐν ᾧ καρπὸς μέλας, πλατύς, πυκνός, γυμνούμενος γλίσχρος· ὁ δὲ καυλὸς λεῖος, εὐπαχὺς, μέλας, ὅμοιος ὡς τὸ κυαμῶρίου· ῥίζα μέλαινα, τραχεῖα, κορυνοειδὴς, ἥτις τέμνεται φθινοπώρου. Ξηρὰ δὲ ἢ σὺν οἴνῳ πιθεῖσα, χιλιακοῖς ὠφελεῖ, δυσεντερικοῖς, καὶ σπλῆνα τήκει. καὶ ἂν πλάσῃ τις ἢ ῥίζα τὸν σπόγγου ἐκ κύστεως ἀγήματα ἡ ῥίζα, καὶ ἀλφοὺς σὺν ὕδατι. ἀλωπεκίας τε σὺν πίσσῃ ὑπιτιθεῖσα ἰᾶται. πίνεται δὲ καὶ ἡ ῥίζα καὶ πρὸς ἀφροδισμούς· πραγτῆται γὰρ θύπις· ἀπονίαν τε ἐργάζεται αἰδοίου πρὸς ὀλίγας ἡμέρας, εἴ τις ἐκδιαιτῷτο πίνων. ὃ αὐτὸ δὲ ποιεῖ καὶ τὸ σπέρμα πιθέν. δοκεῖ δὲ ἀνομάσθαι νυμφαία, ἀφ' ὧ ὕδατος φιλεῖ τόπου. διείρηται δὲ

V. ῥίζαν pro his πλατύς, πυκνός

Orib. πεπῶν

V usque ad ἰᾶται caret.

V. omittit.

V. καὶ πυρὸς

Orib. ut alia

πολλὰ δὲ Ἡλιδὶ ὅτι τῷ Ἀνύγρῳ πο- A
μῷ, καὶ τῆς Βοιωτίας ἐν Ἀλιάρτῳ.

Περὶ Νυμφαίας δευτ. Κεφ. ρμθ'.

V. non habet. Γίνεται καὶ ἄλλη νυμφαία, ἧς δὲ ἄν-
Alafow θος βλέφαρα λέγεται, φύλλα ἔχουσα
ὅμοια τῇ περσεριμωδεῖ· ῥίζαν μέλαν τι λευ-
κὸν καὶ παχεῖαν ἔχει, αὐθος μέλινον,
σίλφιον, ὅμοιον ῥόδῳ. ποιεῖ δὲ ἡ ῥίζα καὶ B
τὸ σπέρμα πρὸς ῥοὰς γυναικείων ἐν οἴνῳ
μέλανι πινόμενον. φύεται ἐν τοῖς περὶ
Addit Lacuna ex antiquo codice παραθαλασσίοις Θεσσαλίαν τόποις κατὰ τὸν Πηνεὸν πο-
ταμόν.

Περὶ Ἀνδροσάκεως. Κεφ. ρν'.

Al. διὰφλοιος ἈΝΔΡΟΣΑΚΕΣ γίνε) μόνη ἐν Συ-
ρίᾳ ἐν παραθαλασσίοις τόποις· πόα C
Al. λίμνιος δέ ἐστι λεπτή, λεπτόκαρφος, πικρά, ἄ-
Al. ἐπὶ τὸ μέσον φυλλος, θυλάκιον ἔχουσα τὸ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς ἔ-
χουσα περιεχόμενον σπέρμασιν. Δυνά-
μεως δὲ ἐχᾷ πολίτου σὺν οἴνῳ ⊀ ϛ'. πλῆ-
θος, οὖρα πολλὰ ὑδρωπικῷ ἄγων.
καὶ ὁ ἀφέψημα δὲ τῆς πόας καὶ ὁ καρ-
Addit Lacuna ex v. sod. καὶ πίσσης μετ' οἴνου πὸς πινόμενος, τὰ αὐτὰ ποιεῖ· κατα- D
πλάσσεται δὲ καὶ ὑπὸ παλαγικῶν ὠφε-
λίμως.

Περὶ Ἀσπληΐου. Κεφ. ρνά.

ΑΣΠΛΗΝΟΝ, ἃ δὲ σκολοπένδριον,
Leg. οἱ μὲν καλοῦσιν. Corn. alii εἰ δὲ, ἀσπλήϊον, οἱ δὲ ἡμίονιον, οἱ δὲ πτέ-
V. delet. ρυξ, φύλλα ἔχᾷ σκολοπένδρᾳ τῷ θηρίῳ
ὅμοια, πλείονα ἀπὸ μιᾶς ῥίζης ἐξερχό- E
μενα. φύεται δὲ τοίχοις καὶ πέτραις τοῖς
ἀπὸ κοχλάκων παλαιοῖς· ἄκαυλος,
V. conclusa delet. μαίδιμος, ἄκαρπα ἐστὶ τὰ μεμφόμενα ὡς τὸ πολυπόδιον, κάτωθεν ὑπόξανθα, ἐπὶ δασέα, αἴωθεν δὲ χλωρά. Δυνάμεως δὲ
ἔχᾷ τὰ φύλλα ἀποζεσθέντα σὺν οἴνῳ καὶ πινόμενα ὅτι ἡμέρας μ' σπλῆνα τήκειν F
δεῖ δὲ κατάπλασιν τὸ σὺν οἴνῳ σπλῆνα τοῖς
φύλλοις λείοις σὺν οἴνῳ. βοηθεῖ δὲ τραχύ-
Add. Lacuna ex vet. cod. καὶ δυσουρίᾳ τητι καὶ λιγμῷ, καὶ ἰκτέρῳ, καὶ λίθοις
ἐν τοῖς κύστεσι θρύπτει. δεῖ δὲ ἀτόκιον εἶ-
ναι καθ' ἑαυτὸ, καὶ μετὰ ἡμέρου σπλῆνος
πρὸς ἀσπληΐου δὲ νύκτωρ φασὶ
δεῖν αὐτὸ ὀρύσσειν εἰς ἀτόκιον. G

Περὶ Ἡμιονίτιδος. Κεφ. ρνϐ.

V. addit, ἐ ἐνίοις αὐξάνει σκολοπένδριον ΗΜΙΟΝΙΤΙΣ, ἃ δὲ σπλήϊον, φύλ-
λον ἔχει ἡμίονου ὅμοιον δρακοντίῳ, μι-

inuenitur in Helide, Anygro amne, & in Bœotiæ Aliarto.

De Nymphæa altera. Cap. CXLIX.

EST & altera Nymphæa, cuius flos blephara dicitur, folijs antedictæ similis, at radice alba simul & aspera, flore luteo, splendente, rosæ simili. Radix & semen ad inhibenda fœminarum profluuia efficaciter ex vino nigro bibuntur. Nascitur autem in Thessalia, iuxta Peneum amnem.

De Androsace. Cap. CL.

ANDROSACES in maritimis Syriæ nascitur, herba verò est alba, tenuibus cirris, amara, sine folijs, folliculum habés in cacumine, quo semen continetur. Ea drachmis duabus in vino pota, copiosam hydropicis vrinam ciet. Quin & herbæ decoctum, seménque largius ex vino potum, eundem præbet effectum. Vtiliter quoque podagricis illinitur.

De Aspleno. Cap. CLI.

ASPLENON aliqui scolopendrium, alij splenium, alij hemionion, alij denique pteryga vocant. Folijs est scolopendræ animali similibus, plurib⁹ ab vna radice sparsis in ambitum. Nascitur in petris parietibúsque confectis è calculis silicibúsve, iísque opacis. Nec verò caulem, nec florem, nec semen habet: folia autem filiculæ modo incisuris diuiduntur, subter flauescentia hirsutáque, supernè verò viridia. Vim hanc habet foliorum in aceto decoctum, vt per dies XL potum lienem absumat. Sed & folijs è vino tritis lienem illini oportet. Stranguriæ quoque, singultui, & regio morbo subuenit, atque calculos vesicæ comminuit. Cæterùm spem partus adimere creditur tum per sese, tum etiam cum muli liene amuleti instar adalligata. Verum in eum vsum tradunt nocte quapiam illuni effodiendam.

De Hemionitide. Cap. CLII.

HEMIONITIN sunt qui splenium vocent. Folium emittit simile dracunculi, curuatæ in cornua

lunæ modo ſinuatum. Radices ſubiacent multæ, exq; tenues: ſed neque caulem, neque ſemen, neque florem profert. In ſaxoſis hæc herba naſcitur, aſtringente ſapore prædita, & ex aceto pota lienem quoq; abſumit.

A ροιδὶς· ῥίζαι δ' ὕπεισι πολλαί, λεπταί· ὅτε δ' οὐ καυλὸν, οὔτε καρπὸν, οὔτε ἄνθος φέρει. φύεται δ' ἐν πετρώδεσι τόποις. γλυκαμάζει δ' ἡ πόα συμπλοκὴ· ἥ τις σὺν ὄξει πεθεῖσα, πίνεται σπληνῶσι.

De Anthyllide. Cap. CLIII.

ANTHYLLIS duûm eſt genus: quædam enim foliis eſt mollibus, alioqui lenticulæ ſimillimis, & ramulis palmi altitudine rectis, radice tenui & parua. Naſcitur in ſabuloſis, apricis, ſubſalſa guſtanti. Altera eſt foliis ramuſculiſque chamæpityi ſimilis, hirſutior tamen, breuior & aſperior, flore purpureo, & odoris admodum grauis: radice cichorij. Hæc drachmis quatuor bibita, vrinæ difficultate laborantibus & nephriticis plurimùm prodeſt. Tritæ verò vteri inflammationes emolliunt, cum roſaceo & lacte ſubditæ, ac vulneribus quoque medentur. Quæ autem chamæpityos ſimilitudinẽ refert, præter alia etiam comitiales ſanat cum aceto mulſo pota.

B ΠΕΡΙ ΑΝΘΥΛΛΙΔΟΣ. ΚΕΦ. ρνγ'.

ΑΝΘΥΛΛΙΣ διτή· ἡ μὲν γὰρ φακῷ παραπλήσια φύλλα ἔχει, καὶ κλωνία σπιθαμῆς ὕψος, ὀρθὰ δὲ, καὶ τὰ φύλλα μαλακά. ῥίζα δὲ λεπτὴ, μικρά. φύεται ἐν ὑφαμμίοις τόποις καὶ θιλίοις, γλυκαμίζῃ ὕφαλμος. ἡ δ' ἑτέρα χαμαιπίτυϊ τὰ φύλλα καὶ τὰ κλωνία ἔοικε, δασυτέρα μέν τι καὶ βραχυτέρα, καὶ πραχυτέρα τὸ δ' ἄνθος πορφυρίζει, βαρύοσμον ἰσχυρῶς· ῥίζα ὥσπερ κιχωρίου. Δύναται δὲ ἰσχυρῶς δυσουροῦσι καὶ νεφριτικοῖς πινομένη βοηθεῖν, πλῆθος < δ'. ἐκμαλάσσουσι δὲ φλεγμονὰς ταῖς ἐπυήτοις λαφαι, σὺν ῥοδίνῳ καὶ χαλαζῇ τροχισθεῖσαι· ἰῶνται δὲ καὶ τραύματα. ἡ δὲ τῇ χαμαιπίτυϊ ὁμοία, μετὰ τῆς ἄλλης καὶ ἐπιληπτικοὺς ἰᾶται σὺν ὀξυμέλιτι πινομένη.

V. ἐμοίωσε δὲ καὶ τὰ ῥίζωμα κοιλ

Sic v. cod. Pliu. Gibaluſis. Vulg. ex vocabulorum ſubtilitate.

V. καὶ habet γαρ. ῥᾳ.

Orib non legit concluſa.

V. addit, ἀκαιτον.

Sic v. cod. Lac. at vulg. exemplo φλέγματα ὡ

De Anthemide. Cap. CLIIII.

ANTHEMIDEM alij leucanthemon, alij eranthemon, quoniam vere floreat, alij chamæmelũ, quoniam odoré mali habeat, nonnulli melanthemon, alij chryſocomen, alij denique calliam vocant. Huius genera tria flore tantùm diſtantia: rami dodrantales, fruticoſi, alis multis concaui: foliola parua, tenuia, numeroſa: rotunda item capitula, intus quidem auri colore fulgentia, foris verò orbiculato ambitu floribus circundata candidis, aut melinis, aut purpureis, magnitudine foliorum tritæ. Naſcitur in aſperis, & iuxta ſemitas. Colligitur vere. Vim habent radices, flores & herba ipſa, excalfaciendi extenuandique: ſeu potu ſeu inſeſſione pellunt menſtrua, partus, calculos & vrinas. Propinantur & aduerſus inflationes & ilei tormenta. Sed & regium morbum expurgant, atque hepaticis medẽtur: decoctum quoque veſicæ fotibus accommodatur. Ex omnibus autem hiſce generibus ad calculos efficaciſſima eſt

ΠΕΡΙ ΑΝΘΕΜΙΔΟΣ. ΚΕΦ. ρνδ'.

ΑΝΘΕΜΙΣ, ἣ δὲ λευκάνθεμον, οἱ δὲ ἠρίνθεμον, ἄλλοι δὲ αἰθυῖαν, ἔνιοι δὲ ἔαρος, οἱ δὲ χαμαίμηλον, ἄλλοι τινὲς ὀσμὴν τὴν μήλου ὁμοιότητα τῇ ὀσμῇ, ἣ δὲ μελάνθεμον, ἣ δὲ χρυσοκόμην, οἱ δὲ καλλίην καλοῦσι· τούτης εἴδη τρία αἰθυῖαι μόνον διαφέροντα· κλῶνες σπιθαμαῖοι, θαμεινοειδεῖς, μακάλας ἔχοντες πολλὰς, πλατυκλωναείας μικρὰς, λεπτὰ, πολλὰ, κεφάλια περιφερῆ· ἔνδοθεν μὲν χρυσίζοντα ἄνθη, ἔξωθεν δὲ ἐπικύπτοντα κυκλοτερῶς λευκὰ, ἢ μήλινα ἢ πορφυρᾶ, τῷ μεγέθει πηλίκα φύλλων· φύεται δὲ ἐν τόποις βαχέσι καὶ παρὰ τὰς ὁδοὺς· συλλέγεται δὲ ἔαρος. Δύναμιν δὲ ἔχουσιν αἱ ῥίζαι καὶ τὰ ἄνθη καὶ ἡ βοτάνη θερμαντικὴν, λεπτυντικήν· πίνονται δὲ καὶ ἐγκαθιζόμεναι, καταμήνια ἄγουσι καὶ ἔμβρυα, καὶ λίθους, καὶ ὕδρα· πολίζεται δὲ καὶ πρὸς ἐμπνευματώσεις καὶ εἰλεούς, καὶ ἴκτερον δὲ ἀποκαθαίρουσι, καὶ ἡπατικοὺς ἰῶνται. καὶ τὸ ἀφέψημα δὲ αὐτῆς εἰς πυρίας λαμβάνεται πρὸς κύστιν. θεραπευτικώτερον δὲ τοῖς λιθιῶσι

V. addit καὶ ὁ χυμὸς ὁ αἰθυίου ἰσχυρ

ὁ πορφυρεμβλὴς, ὅπερ τῆς ὅλης ἐστὶ μεῖζον, ἰδίως ἀνθέμιον καλούμενον. ὁ δὲ λευκάνθεμον καλούμενον, ὑρπικώτερον, καὶ τὸ χρυσάνθεμον. θεραπεύουσι δὲ καὶ αἰγιλώπια καταπλασσόμενα· ἀνθεμασσόμενα δὲ, καὶ ἄφθαν ἰῶνται. χρῶνται δέ τινες καὶ * συγκλύσμασι μετ' ἐλαίου, λεπτελαιοῦντες αὐτὰ πρὸς αἰσχυλὰς τῶν στοιδικῶν πυρετῶν. ἀποπλύνεσθαι δὲ δεῖ τὰ φύλλα καὶ τὰ ἄνθη, ἕκαστον αὐτῶν χωρὶς ἰδίᾳ, καὶ αἰαλαμβάνοντας ἐχίσκους, πλὴν δὲ ῥίζης ξηραίνοντας. χρείας δὲ ὑποτιθέμενος, διδόναι ὅτι μὲν τῆς βοτάνης μέρη β'. ὅτι δὲ τοῦ ἄνθους ἢ τῆς ῥίζης μέρος ἕν. ὅτι δὲ τοὐναντίον, τοῦ ἄνθους μὲν β'. τῆς δὲ βοτάνης ἕν, ἐναλλὰξ διαπλασιάζοντας παρ' ἡμέραν πίνειν δὲ δεῖ σὺν οἰνομέλιτι κεκραμένῳ.

A quæ florem purpureũ habet, quæq; omni ex parte cæteris maior ampliórque est: hanc propriè Eranthemon voeãt. Ea verò cui leucanthemo nomen est, item quæ chrysanthemon dicitur, potentiùs vrinam ciunt: ægilopijs quoque illitæ medentur, & commanducatę vlcerum eruptiones in ore sanant. Nonnulli B ijs in farinam tritis cum oleo vtuntur ad illitiones, idq; ad febres periodicas abigendas. Flores autem ac folia, singula inquam seorsim tusa & in pastillos digesta, recondi oportet: radix verò priùs exiccanda est. Ac vbi vsus exigit, modò herbæ partes duæ dari debent, modò floris aut radicis pars vna: aliàs contrà C floris partes duę & herbæ pars vna, vicissim duplicato pondere alternis diebus. Bibere autem oportet in vino mulso diluto.

Περὶ Παρθενίου. Κεφ. ρνέ.

De Parthenio. Cap. CLV.

ΠΑΡΘΕΝΙΟΝ, ᾧ δὲ ἀμάρακον, οἱ δὲ λευκάνθεμον, φύλλα ἔχει ὅμοια κορίῳ, λεπτά· ἄνθη λευκὰ κύκλῳ, ὁ δὲ μέσον μήλινον, ὀσμὴν ὑποβρωμον, τὴν δὲ γεῦσιν πικρίζον. Δίδοται δὲ ξηρὰ σὺν ὀξυμέλιτι ἢ σὺν ἁλὶ ποθεῖσα, ὡς ὁ ὑπόθυμον, φλέγμα καὶ χολὴν ἄγει κάτω· ἔστι δὲ καὶ σπασμοῖς ὠφελεῖν, καὶ μελαγχολικοῖς. ἡ ῥίζα δὲ χρεία τῷ ἄνθει, ὠφελίμως ὅτι λιθιῶσιν καὶ ἀδμαλικῇ πολιζεται. ὁ δὲ ἀφέψημα αὐτῆς, ἐγκάθισμα ὑστέρας ἐσκληρυμμένης τὴ φλεγμονὴς ὅτι. καταπλάσσεται δὲ καὶ πρὸς ἐρισιπέλατα καὶ φλεγμονὰς σὺν τοῖς ἄνθεσιν.

D PARTHENIVM aliqui amaracum, alij leucanthemon vocant: folijs est coriandri, tenuibus, floribus per ambitum albis, in medio verò melinis, odore subuiroso & sapore subamaro. Siccatum cum aceto mulso aut sale potum, æquè ac epithymũ pituitam & bilem atram detrahit, suspiriosísque ac melancholicis prodest. At herba citra florẽ calculosis & anhelatoribus magna vtilitate propinatur. Ipsius verò decoctum, ad insidendum valet in vuluarum duritijs & inflammationibus. Sed & ipsa cum floribus, erysipelatis & inflãmationibus imponitur.

Περὶ Βουφθάλμου. Κεφ. ρνς'.

De Buphthalmo. Cap. CLVI.

ΒΟΥΦΘΑΛΜΟΝ (ᾧ δὲ καχλὰν καλοῦσι) καυλία ἀφίησι τυφερὰ, κατόλεπτα· φύλλα δὲ μαράθῳ ὁμοιόν· ἄνθη μήλινα, μείζονα τῆς ἀνθεμίδος, ὀφθαλμοειδῆ· ὅθεν καὶ ὠνόμασται· φύεται δὲ ἐν πεδίοις καὶ ταῖς πόλεσι. Ταύτης τὰ ἄνθη λεῖα σὺν κηρωτῇ, οἰδήματα καὶ σκληρίας διαφορεῖ· φασὶ δέ ὅτι ἐν τῷ βαλανείῳ μετὰ ὕδατος θερμοῦ πινόμενον, ὕδρωσιν ποιεῖ πρὸς χρόνον πρὸς τοῖς ἰκτερικοῖς.

E BVPHTHALMVM (quidam cachlan vocant) teneros emittit cauliculos, & quodámodo tenues, folia fœniculi, flores melinos, maiores quàm anthemidis, oculorum similitudine: vnde & herba nomen traxit. In campestribus & circa oppida nascitur. Huius flores triti cũ cerato œdemata duritiásque discutiunt. Aiunt verò, post exitum à balF neo eporam, regio morbo correptus ad tempus aliquod colorem gratiorem facere.

Al. margo, χαμαιμήλῳ

Locus addit. vt videtur ex alio

Ald. καυλὸς ἁλὰς τυφερὸς ὑπόλεπτος

V. addit. σπλῆνας διαχεῖ

V. ἀκτερικοῖς

De Paonia. Cap. CLVII.

Sic Apul. à numero grauium eius fructuum

PÆONIA siue glycyside quibusdam pentorobon dicitur: sunt qui Idæos dactylos radicem pæoniam vocent. Caulis ferè in duorũ dodrantum altitudinem adolescit, adnascente numerosa sobole comitatus: ac mari quidem folia sunt qualia iuglandis, fœminæ verò incisuris Smyrnij modo diuisa. Summo caule fert vtraq; siliquas quasdam, veluti Græcas nuces: quibus dehiscentibus grana multa rubentia, parua, acinis punicorum similia inueniuntur, & inter hæc media quinque aut sex, nigra, purpurea. Radix maris digitali ferè est crassitudine, & palmi longitudine, gustu astringens, candida: fœminæ verò radicibus ceu glandes septem octóve adhærent, quales hastulæ regiæ radicibus adnascuntur. Radix fœminis à partu non purgatis exhibetur: ciet quoque menses nucis Græcæ magnitudine pota: vétris etiam doloribus in vino bibita auxiliatur. Prodest & arquatis, iisq; qui renum aut vesicæ cruciatibus infestantur. Eadem decocta in vino potáque aluum sistit. Seminis autem granula decem duodecimve rubentia in vino nigro & austero pota, sanguinolentum fluorem muliebrem sistũt: stomachicisque, qui erosiones ventriculi sentiunt, comesta opitulantur. Quin & à pueruli pota esitatáve, initia calculi eximunt. Quę verò nigra sunt grana, suppressionibus nocturnis quas ephialtas vocant, vuluæque strágulationibus ac veteri dolorib⁹, numero quindecim, in aqua mulsa aut vino pota, auxiliãtur. Cęterùm nascitur pæonia in altissimis mótibus, eorúmq; verticibus.

Vide ferunt in quorundam codicibus

De Lithospermo. Cap. CLVIII.

LITHOSPERMON, quod nonnulli ęgonychon, alij exonychõ, alij heracleam vocãt, propter seminis duritiam: à qua & lithospermi nomẽ accepit. Folijs est oleæ, longioribus tamen, latioribus atque mollioribus, & ijs quidem quæ in imo à terra exiliunt humi iacentibus: ramulis rectis, tenuibus, acuti iunci crassitudine, firmis, lignosis: in quorum cacumine bifida propago

Περὶ Παιονίας. Κεφ. ρζ.

ΠΑΙΟΝΙΑ, ἡ γλυκυσίδη, ⓐ δὲ πεντόβοραν· ⓑ δὲ Ἰδαίους δακτύλους τινὲς ῥίζαν παιονίαν καλοῦσι. καυλὸς ὡς διασπιθαμιαῖος φύεται, περιφυάδας ἔχων πολλάς· φύλλα δὲ ἡ μὲν ἄρρην βασιλικῇ καρύᾳ ὅμοια· ἡ δὲ θήλεια ἀπίοις τὰ φύλλα ἔοικε σμυρναίοις δὲ τινας ἀμίσχει ἐπ' ἄκρου τοῦ καυλοῦ, ἀμυγδάλοις ὁμοίους· ἐν αὐτοῖς δὲ τοῖς θύσκοις ἔνεισι ῥοιοῦ κόκκοις πολλοί, μικροί, ἐμφερεῖς τοῖς τῆς ῥοιᾶς, ἐν μέσῳ δὲ μέλανες, ἐμπύρφυροι, ἓ ἢ ζ'. ῥίζα δὲ τῆς μὲν ἄρρενος, ἐκ δακτύλου πάχος, μῆκος δὲ σπιθαμῆς, γλυκομόχθῳ γύφουσα, λευκή· ὅτι δὲ τῆς θηλείας, περιφυάδας ὥσπερ βαλάνους ἔχουσα ζ'. ἢ ἡ. ὥσπερ ἀσφόδελος. Δίδοται δὲ γυναιξὶν ἡ ῥίζα πρὸς ἐκ τόκου μὴ καθαιρομέναις· κινεῖ δὲ καὶ τὰ κατάμηνια, ἀμυγδάλου μέγεθος σταφυλῇ πρὸς τὰ καπνώδη ὀδυνώδη βοηθεῖ, πεπτικὸν ὂν ὅπου. ὠφελεῖ δὲ καὶ ἰκτερικούς, καὶ νεφριτικούς, καὶ κύστεως ἀλγοῦντας. ἐνδιδοῦσι δὲ ὅπου· καὶ πνευμονικοῖς βοηθοῦσι. καὶ ὑπὸ τῶν παιδίων πινόμενοι ἢ ἐσθιόμενοι, ἀρχὰς λιθιάσεως παραιροῦνται. εἰ δὲ μέλανες, καὶ πρὸς τοὺς ὑπὸ ἐφιαλτῶν πνιγμούς, καὶ πρὸς τοὺς ὑστερικοὺς πνίγας καὶ ὀδυνώδεις μήτρας, ἐν μελικράτῳ ἢ οἴνῳ, ἕως ιε'. κόκκοι πινόμενοι, πίνουσι.*

Περὶ Λιθοσπέρμου. Κεφ. ρη'.

ΛΙΘΟΣΠΕΡΜΟΝ, ⓐ δὲ ἀιγώνυχον, οἱ δὲ ἐξώνυχον, οἱ δὲ ἡρακλέαν, ἀφ' ὧν τοῦ τὸ σπέρμα ἰσχυρόν· ὅθεν καὶ λιθόσπερμον ἐπώνυμον· φύλλα ἔχει ὅμοια ἐλαίᾳ, μακρότερα δὲ καὶ πλατύτερα, καὶ μαλακώτερα, καὶ τὰ κατὰ ⓑ πυθμένα ὀπτὰ γῆς κείμενα· κλωνία δὲ ὀρθά, λεπτά, πάχος ὀξυχρίνου, στερεά, ξυλώδη· ὅπου δὲ τὰ ἄκρα αὐτῶν.* δίχαλος ἔκφυσις,

Lac. legit in vet. cod. μακρά. Sic & Orib.
V. addit ὑπόλευκον
Sic Orib. & v. codex. Lacuna
V. addit ἢ περὶ διυρητικῶν πινόμ.

καυλοφόδης· ἔχουσα φύλλα μακρά, πρὸ οἷς σπέρμα λιθῶδες, στρογγύλον, λευκόν, ὀρόβῳ μικρῷ ὅμοιον. φύεται ἐν τραχέσι τόποις καὶ ὑψηλοῖς. Δυνάμιν δὲ ἔχει τὸ σπέρμα μετ' οἴνου λευκοῦ πινόμενον, λίθους θρύπτειν, καὶ οὖρα ἄγειν.

A

cauliculorum ſpeciem exhibet; foliis longis: inter quæ ſemen lapidea duritie rotundum, candicans, ervi parui magnitudine. Naſcitur in aſperis & editis locis. Vim habet ſemen, cum vino albo potum, calculos frangendi, vrináſque pellendi.

Περὶ Φαλαρίδος. Κεφ. ριθ'.

V. μετὰ

Φάλαρις, καυλία ἀφίησιν ἐκ ῥιζῶν λεπτῶν καὶ ἀχρήστων πολλά, διὰ πάλαιστα, γονατώδη, καλαμοειδῆ, εὐχύλοις τοῖς τῆς ζέας, ἰσχνότερα δὲ καὶ γλυκέα τῇ γεύσει, ἃ φύλλα ὅμοια τοῖς τῆς ζέας. Σπέρμα ἔπεστι μέγεθος κέγχρου, λευκὸν, ὑπόμηκες. Δυνάμιν ἔχει κοπτομένη ἡ ῥίζα ἢ χυλιζομένη δι' ὕδατος ἢ οἴνου, πρὸς ἕλκη τῆς κύστεως δύσημα ἄγουσα, πινομένη. καὶ τὸ σπέρμα τὸ δὲ * μετὰ κοχλιαρίου ὕδατος πλῆθος πινόμενον πρὸς τὰ αὐτὰ ποιεῖ.

B

Conclusa habentur in vet. cod. itemque apud Oribaſ. at in vulg. exempl. deliderantur.

Περὶ Ἐρυθροδάνου. Κεφ. ρξ'.

V. inſerbit, ſ διὰ ψιλοῦ.

Ἐρυθρόδανον, ἢ ἐρευθόδανον, ἔνιοι δὲ πεύθριον καλοῦσι. ῥίζα δὲ ἔστιν ἐρυθρά, βαφικὴ· ἡ μὲν τις ἀγρία· ἡ δὲ ἀπαρτὴ, ὡς ἐν Θαβαίνῃ τῆς Γαλιλαίας, καὶ Ῥαβαίνῃ τῆς Ἰταλίας· καὶ ἐν Καρίᾳ μεταξὺ τῶν ἐλαιῶν σπειρόμενον, ὥσπερ ἐν ταῖς ἀρούραις. ὠφελίμως δὲ σπείρεται ὅταν τὸ γίνεσθαι ἐκ βύτου πλείστην προσοδον. εἰσὶ δὲ αὐτοῦ οἱ καυλοὶ τετράγωνοι, μακροὶ, τραχεῖς, ὅμοιοι τοῖς τῆς ἀπαρίνης, τὰ πάντα δὲ μείζονες καὶ ῥωμαλεώτεροι ἔχουσιν ἐκ διαστημάτων τὰ φύλλα καθ' ἕκαστον γόνυ, ὥσπερ ἀστέρας εἰς κύκλον τεθειμένα· καρπὸν στρογγύλον, τὰ πρῶτα χλωρὸν, εἶτα ἐρυθρὸν, εἶτα πεπαμένον μέλανα· ῥίζα λεπτὴ, μακρὰ, ἐρυθρὰ, διουρητικὴ· ὅθεν ἰκτερικοῖς μετὰ μελικράτου πινομένη βοηθεῖ, ἰσχιαδικοῖς τε καὶ παραλελυμένοις· ἄγει δὲ οὖρα πολλὰ καὶ παχέα, ἔσθ' ὅτε δὲ καὶ αἷμα. λούεσθαι μέντοι δεῖ καθ' ἡμέραν τοὺς πίνοντας, καὶ ὁρᾶν τὴν κενουμένων τὴν διαφοράν· ῥηγνυμένοις τε βοηθεῖ ὁ καυλὸς μετὰ τῶν φύλλων * πολύς. ὁ δὲ καρπὸς μετ' ὀξυμέλιτος πινόμενος, σπλῆνα τήκει· προσεθεῖσα δὲ ἡ ῥίζα, ἔμβρυα καὶ ἔμμηνα ἄγει καὶ δεύτερα. θεραπεύει δὲ καὶ ἀλφοὺς λευκοὺς, μετ' ὄξους καταπλασσομένη.

C

D

E

F

Alii videtur καὶ λίαν legiſſe.

V. caret.

Addit Lacuna ex v. cod. καὶ κοπτόμ.

Haec non habentur in Aldino codice, niſi inter notha.
V. ἐχιάδικοις Pariſ. χωλ.

V. καὶ πρὸς χειμῶνα

G

De Phalaride. Cap. CLIX.

Phalaris cauliculos emittit à tenuibus ac nullius vſus radicibus numeroſos, bipalmes, geniculatos, culmis zeæ ſimiles, graciliores tamen ac ſapore dulces: folia item eadem zeæ: ſemen verò milij magnitudine, candidum & oblõgum. Herbæ tuſæ ſuccus ex aqua aut vino expreſſus ad veſicæ cruciatus vtiliſſimè bibitur. Semẽ quoque cochlearis mẽſura ex aqua potum, ad eadem eſt efficax.

Περὶ Ῥουβίας. Κεφ. ρξ'.

De Rubia. Cap. CLX.

Rvbia, Græcis Erythrodanum ſeu Ereuthodanum, aliquibus teuthrion vocatur: radix eſt rubra, tingendo idonea. Vna quidem ſylueſtris eſt, ſatiua altera, vt in Thebana Galilææ & Rauennæ in Italia. Sed & in Caria inter oleas ſeritur, velut in aruis. Vtiliter autem colitur, quòd multo polleat quęſtu, ex eáque ampliſſimus reditus percipiatur. Sunt ei caules quadranguli, longi, aſperi, quales aparinæ: ſed omni ex parte maiores atque robuſtiores, folijs in orbem per interualla, nempe circa ſingula genicula, ſtellæ modo decuſſatim radiatis: ſemine rotundo, inter initia viridi, mox rubro, ac poſtremo cùm ematuruit, nigro. Radix eſt tenuis, longa, rubra, ciendæ vrinæ vi prædita: qua de cauſa arquatis auxiliatur, pota cũ aqua mulſa: itémq; iſchiadicis atq; paralyticis. Craſſam porrò copioſámq; vrinam pellit, ac interdum etiam ſanguinem: bibẽtes tamen quotidie lauari oportet, & excrementorum quæ reddũtur differentiam contempłari. Contra ſerpentium morſus caulem cum folijs imponere prodeſt. Semẽ verò ex aceto mulſo potum, lienem abſumit. At ſubdita radix, partus, menſes ſecundáſq; trahit. Albæ quoque vitiligini illita ex aceto medetur.

De Lonchitide. Cap. CLXI.

LONCHITIS folia habet porrò perquam ſimilia, latiora tamẽ & rubentia, plurima, ad radicẽ circũfracta, veluti in terrà procumbẽtia. Habet & circa caulẽ pauca, in quo quidẽ flores ceu pileoli, hiantibus comicis perſonis figura ſimiles, itidẽ nigri, ſed è ridu albam veluti paruã linguam exerentes, quæ ad labrum interius ſpectet: ſemen inuolucris clauſum, triangulum & lanceæ cuſpidi ſimile, vnde etiam planta ipſa ſibi cognomentum arrogauit: radix dauci. Naſcitur in aſperis ac ſitientibus. Radix ex vino pota, vrinam ciet.

De Lonchitide altera. C. CLXII.

Lonchitis altera, quam alij aſperam dicunt, folia profert ſcolopendrij, ſed aſperiora maioráque, ac multò magis diuiſa. Vim porrò habet vulnerariã, inflammationéſque arcet. Lienem quoque pota ex aceto abſumit.

De Althæa. Cap. CLXIII.

ALTHÆA, quam nonnulli Ibiſcum vocant, maluæ ſylueſtris ſpecies eſt, foliis vti cyclamini rotũdis, lanuginoſis: flore roſaceo: caule bicubitali: radice lenta glutinoſáq;, intus alba. Althææ verò nomen inditum illi eſt, à multiplici excellentique quam in medendo præſtat vtilitate. Decocta enim in aqua mulſa aut vino, aut per ſe etiam tuſa, efficaciter imponitur vulneribus, parotidibus, ſtrumis, abſceſſibus, mãmarũ inflammationibus, ſedis doloribus, contuſis, flatuoſis tumoribus ac neruorum diſtentionibus: ſiquidẽ diſcutit & maturat, aut rumpit, & ad cicatricẽ perducit. At cocta, vti dictũ eſt, ſi cum adipe ſuillo aut anſerino, terebinthináve, ſubigatur, facit ad vuluæ inflammationes præcluſionéſq;, ſubdita in peſſo. Sed & ipſius decoctum eundem obtinet effectum, relicta poſt partum in vtero purgamenta præterea extrahens. Succurrit & radicis decoctæ ſuccus ex vino potus vrinæ difficultati, calculoſorũ ſæuis acerbíſque cruciatibus, dyſentericis, iſchiadicis, tremulis atque ruptis.

Περὶ Λογχίτιδος. Κεφ. ρξά.

ΛΟγχῖτις φύλλα ἔχει τετράσιν καρπὰ ὅμοια, πλατύτερα δὲ καὶ ὑπέρυθρα· πλῆθος, τοὺς πρὸς τῇ ῥίζαι κεκλιμένα ὡς ὅπτι πρὸς γῆν. ἔχει δὲ καὶ καυλὸν ὀλίζα, ἐφ' ᾧ αὖθι ὅμοια πιλίσκοις, τῷ τύπῳ δὲ κωμικοῖς προσωπίοις παραπλήσια μέλανα μέν, λευκὸν δέ τι ἀπ' αὐτῶν ἐξέχει ἀπὸ τοῦ χάσματος πρὸς τὸ κάτω χεῖλος, ὥσπερ γλωσσάριον· ὃ σπέρμα δὲ ὅμοιον λύγνῳ, πεπλατυσμένον δὲ πρὸς καρπίοις· ὅθεν καὶ τὴν προσωνυμίαν ἠξιώθη· ῥίζα δὲ ὁμοία δαύκῳ. φύεται δὲ τραχέσι καὶ ἀνύδροις τόποις. ταύτης ἡ ῥίζα διυρητική, πινομένη σὺν οἴνῳ.

V. Matthiolum Marc. aspero planiore. Forte legit Dalech. legit ptarmi

Mar. dauco-similis

Περὶ Ἑτέρας λογχίτιδος. Κεφ. ρξβ.

Λογχῖτις ἑτέρα, οἱ δὲ λογχῖτιν τραχεῖαν, φύλλα ἀνίσοις ὅμοια σκολοπενδρίῳ, τραχύτερα δὲ καὶ μείζονα, καὶ μᾶλλον ἐσχισμένα. Δώσαμεν δὲ ἔχει θαυμαστικὴν, ἀφλέγμαντον· τήκει δὲ καὶ σπλῆνα μετ' ὄξους πινομένη.

Addit Lacuna ex ver. cod. ad fidem

Περὶ Ἀλθαίας. Κεφ. ρξγ.

ΑΛΘΑΙΑ, ἔνιοι δὲ ἰβίσκην καλοῦσι, μαλάχης ἐστὶν ἀγρίας εἶδος· φύλλα τρόπον μὲν ὡς ἂν κυκλάμινος, ἔγχροα· ἔχει δὲ αὖθις ῥοδοειδὲς καυλὸν· ἄνθημον, ῥίζαν δὲ γλίσχρον, λευκὴν ἔνδοθεν. Ὠνόμασται δὲ ἀλθαία, ἀπὸ τοῦ πολυαλθὴς καὶ πολύχρηστον αὐτῆς. ἐφθεῖσα γὰρ ἐν μέλιτι ἑφθῷ ἢ οἴνῳ, καὶ καθ' ἑαυτὴν κοπεῖσα, ποιεῖ πρὸς τραύματα, πτῶσιν, χειράδας, ἀποστήματα, μασῶν φλεγμαίνοντας, δακτυλίων ἀλγήματα, θλάσματα, ἐμφυσήματα, στραγγουρίας, ἕλκη τὰ ἐν στόματι· διαφορεῖ γὰρ καὶ ἐκπέττει, ἢ ῥήγνυσι καὶ ἑπουλοῖ. συμμαλαχθεῖσα δὲ ἐφθὴ, ὡς εἶπον, σταφὶς οὐρίῳ ἢ χύμῳ ἢ τερεβινθίνῃ, πρὸς ὑστέρας φλεγμονὰς καὶ μύσεις ἐν προσθέματι ποιεῖ. καὶ τὸ ἀφέψημα δὲ αὐτῆς τὸ αὐτὸ ποιεῖ. ἄγει δὲ τὰ καλούμενα λόχια. τὸ δὲ τῆς ῥίζης ἀφέψημα σὺν οἴνῳ πινόμενον, ὠφελεῖ δυσουρίας, λιθιώντων ὠμότητας, δυσεντερικοὺς, ἰσχιαδικοὺς, τρομώδεις, ῥηγματίας,

Al. legit. δι' πολλῶν & facilius est lapsus Sic & Serapio. Orib. πάσχων

Vulg. exempl. πάθεσι

Sic. vet. cod. et vulg exempl. carent.

καὶ πόνους ὀδόντων παραύει σὺν ὄξει ἀφεψηθεῖσα καὶ ἀφαιρεῖται τὴν βρωχυζομένην. ὁ δὲ καρπὸς χλωρὸς τε ὢν ξηρός τε λεῖος καταχριόμενος σὺν ὄξει ἐκ μέλιτος, σπιλώδεις ἴσχει τὰς ἀλφούς μετ' ὀξελαίου δὲ συγχριόμενος, παραφυλακτικός ἐστιν ἰοβόλων. ποιεῖ δὲ καὶ πρὸς δυσεντερείας καὶ αἵματος αἰσαγωγὰς καὶ ἀφόρους. Ὁ δὲ ἀφέψημα τοῦ καυλοῦ, πινόμενον καὶ πρὸς μελικράτου καὶ τῶν λεπτῶν θηρίων πληγὰς πομάτων, ἐπιτίθεται ὄξυκράτῳ ἢ οἴνῳ παλαιῷ. καὶ τὰ φύλλα δὲ μετ' ἐλαίου ἐλαίου καταπλάσσεται ὑπὸ τῶν δημάτων καὶ ὑπὸ τῶν πυρικαύστων. πήγνυσι δὲ καὶ ἡ ῥίζα καὶ ὕδωρ μιγεῖσα λεῖα καὶ συνεψηθεῖσα.

Περὶ Ἀλκίας. Κεφ. ρξδ'.

Ἀλκία καὶ αὕτη εἶδός ἐστιν ἀγρίας μαλάχης, ἔχουσα φύλλα ἐπιμήκη πρὸς τὰ τῆς ἱερᾶς βοτάνης· καυλοὺς γ'. ἢ δ'· φλοιῷ ἔχοντας κεκαλυμμένον παρόμοιον ἀίδος μικρᾶς, ἐμφερὲς ῥόδῳ ἰρίζας λευκάς, πλατείας ἑ. ἢ ς'. ὅσον πήχεως· αἵτινες οἴνῳ ἢ ὕδατι πινόμεναι, δυσεντερείας καὶ ῥήγματα ἰῶνται.

Περὶ Κανάβεως ἡμέρας. Κεφ. ρξε'.

Κάνναβις φυτόν ἐστιν εὔχρηστον εἰς τὸν βίον πρὸς τοὺς τῶν βύτινοπλόκων χοινίκων πλοκάς· φύλλα φέρει πλατάνου πλησίον τῇ μελίᾳ, δυσώδη· καυλοὺς μακροὺς, κενοὺς· καρπὸν στρογγύλον· ὃς ἐσθιόμενος πλείων, σβεστικὸς τοῦ γονοῦ χλωρὸς δὲ χυλιόμενος, ἁρμόζει πρὸς τοὺς τῶν ὠτῶν ἀγκυλώδεις σκωληκίζοντας.

Περὶ Κανάβεως ἀγρίας. Κεφ. ρξς'.

Κάνναβις ἀγρία παρόμοια φέρει ὅμοια τοῖς τῆς ἀλθαίας, μελάντερα δὲ καὶ τραχύτερα, καὶ μικρότερα. Ὁ ὕλος πόχεως· τὰ δὲ φύλλα ὅμοια τῇ ἡμέρᾳ, τραχύτερα δὲ καὶ μελάντερα. Ἡ αἴθη ὑπόρυθρα, λυχνίδι ἐμφερῆ· κάρπια δὲ καὶ ῥίζαν ὅμοια τῇ ἀλθαίᾳ. Δύναμιν δὲ ἔχει ἡ ῥίζα ἑφθὴ καταπλασθεῖσα, φλεγμονὰς πραΰνειν, καὶ οἰδήματα διαφορεῖν, καὶ πόρους διαχεῖν. Ὁ δὲ ἀπὸ ταύτης ὁ φλοιὸς, εὔθετος εἰς πλοκὴν χοινίκων.

Lac. in ver. cod. addita referens ad ἰοβόλ.

Videatur hic præterea legisse interpretes καὶ σφακὸν

V. cod Lacuna addit χυμοῖ

In antiquis. codicib', teste Marcello, caput hoc cum superiore coniungitur.

Ver. bis caret. Margo veteris ἢ τρία κεφαλαίπτερα δὲ Quidam mauult πλαχίας

Marcell. τῇ μιᾷ perperam.

Mart. τραχύτερα legit. V. caret.

V. non habet confusa.

V. non legit καὶ πορ. διαχ.

A Eadem dentium mulcet dolorem, cum aceto decocta, colluto inde ore. Semen autē seu viride, seu etiam siccum, vitiligines in sole ex aceto perunctas emendat & exterit. Illud idem ex oxelæo perunctum, venenatorum animalium arcet injurias. Vis quoque illi efficax contra dysenteriā, sanguinis per os relectionem, aluíque profluuium. Quin & bibitur in posca aut vino decoctū, contra apum aliarúmque omnium minutarum bestiolarum aculeatos ictus. Folia verò cum olei momento morsibus ipsis atque etiam igni ambustis imponuntur. Cæterum ipsa radix aquam addensat atque coagulat, siquidē trita illi ammixta, B similúlque sub dio posita fuerit.

De Alcea. Cap. CLXIIII.

ALCEA & ipsa sylvestrium malvarum generi assignatur: folia verò habet diuisa, verbenacæ proxima: caules tres aut quatuor cortice cannabino vestitos: florē paruū, rosæ similem: radices albas, latas, quinque aut sex, ferè cubitales: quæ quidē cum vino aut aqua potæ, dysenteriæ ruptísque medentur. D

De Cannabi satiua. Cap. CLXV.

CANNABIS satiua, plāta ad texendos funes validissimos mortalium generi perutilis, folia gerit E fraxini, sed fœdi odoris, caules proceros, inanes, semen rotundū: quod cibo largiore genituram extinguit. Ex eo recēte expressus succus conuenienter aurium doloribus instillatur.

De Cannabi sylvestri. Cap. CLXVI.

Sylvestris cannabis virgulas profert quales althæa, sed nigriores, asperiores ac minores, cubiti altitudinem æquantes: foliis satiuæ, asperioribus tamen ac nigrioribus: floribus lychnidis, subrubris: semine & radice althææ. Vim habet decocta radix & imposita, inflammationes leniendi, œdemata discutiendi, & tophos articulorum dissipandi. Sed & huius cortex torquēdis funibus est accommodatus. G

De Ana-

De Anagyri. Cap. CLXVII.

Πεϱὶ Ἀναγύϱεως. Κεφ. ρξζ'.

ANAGYRIS siue Anagyros, quem alij acopon vocant, frutex est arboris instar, foliis & virgis vitici assimilis, perquàm grauis odore, flore brassicæ, semine in longis corniculis renibus figura simili, versicolore ac solido, quod vua matureſcente durescit. Huius folia recentia trita & imposita, œdemata reprimunt. Eadem (sicca) drachmæ pondere in passo suspirioſis potui dantur, itémque ad secundas, menses partúsque extrahendos, & contra capitis dolores in vino. Difficulter etiam parientibus amuleti instar adalligantur: sed à partu statim auferri abijcique oportet. Radicis autem succus discutiédis concoquendísque adhibetur. Semen verò comestum vomitiones vehementer concitat.

Flos eius albus, semen brassicæ, cætera appellat.

Ἀνάγυϱις, ⓓ δὲ ἀναγύϱεως, οἱ δὲ ἄκοπον καλοῦσι, θάμνος ὄζοις φύλλοις καὶ ταῖς ῥάβδοις παρεμφερὴς ἄγνῳ, δενδρώδης, βαρύοσμος ἰχῶρας· αἴρεται κεράμβῃ ὁμοίας· καρπὸς ἐν καρποῖς μακροῖς, ὃ χρῆμα κέρως, ποικίλος, στερεός· ἐκληρώσεται δὲ σὺν τῷ τῆς σαφύλης πεπασμῷ. Ταύτης τὰ φύλλα ἁπαλά, λεῖα καὶ πλατύμματα, οἱ δίμαπα γίλλει. σωλίζεται δὲ < πλῆθος ἐν γλυκεῖ πρὸς ἕλμα καὶ ἐκβολὴν χολείου, καὶ ἐμμιλώσεων καὶ ἐμβρύου· πρὸς δὲ κεφαλαλγίαν, σὺν οἴνῳ. ἔστι δὲ σκίαπτον δυσκρύσας δεῖ μήτε μὴν τὸ ἀποτιτεῖν βίᾶιος ἀφελέσθαι ῥίπτει τὸ σκίαμμα. τῆς δὲ ῥίζης χυλὸς διαφορᾷ καὶ σκάπτει. ὁ δὲ καρπὸς ἐθιομβος, ἔμπαν σπλίονος κινῆ.

Acopon, Orib. Lycium

V. πρασίλας. alius, ὃ καὶ ἐπιπρασίλας

Πεϱὶ Κνπαιϱος. Κεφ. ρξη'.

De Cepea. Cap. CLXVIII.

CEPÆA portulacæ similis est, verùm nigriora habet folia, radicémque tenuem. Folia in vino pota, stranguria & vesicæ scabie laborantibus opitulantur. Maximè verò id præstant, si cum asparagi radicum, quem myacanthon vocát, decocto bibantur.

Κνπαιϱα ἐμφεϱὴς ὄζει αἰσθάνεται, μελάντερα δὲ ἔχει τὰ φύλλα, ῥίζαν λεπτήν. βοηθεῖ δὲ τὰ φύλλα πινόμενα σὺν οἴνῳ, στραγγουϱίαις καὶ φλυκτίσι τῆς κύστεως μάλιστα δὲ ποιεῖ, μετὰ ἑψήματος ῥίζης ἀσπαράγου τοῦ μυακάνθου καλουμένου πινόμενα.

De Alismate. Cap. CLXIX.

Πεϱὶ Ἀλίσματος. Κεφ. ρξθ'.

ALISMA aliqui alceam, alij damasonium, alij acyron, alij denique lyron appellát. Folia ei plantaginis, sed angustiora, conuexáque in terram. Caulis tenuis, simplex, cubito altior, thyrsi specie, habens in cacumine capitula. Flores tenues, candidi, pallescentes, radices vt veratri nigri, tenues, odoratæ, acres ac modicè pingues: aquosos amat tractus. Radix drachmæ vnius aut alterius pondere in vino pota his conuenit qui leporem marinum deuorarunt: iisque qui à rana rubeta demorsi sunt, vt & ijs qui opium hauserunt. Valet & contra tormina ac dysenteriam, per se aut cum pari modo seminis dauci potui data. Sed & conuulsis & contra vuluæ vitia prodest. At herba ipsa sistit aluum, ac mẽses ciet, tumoréſque imposita mitigat.

Ἄλισμα, ⓓ δὲ ἄλκεα, οἱ δὲ δαμασώνιον, οἱ δὲ ἄκυρον, οἱ δὲ λύϱον καλοῦσι· φύλλα μὲν ἔχει ἄγνου γλαυκοτέϱοια, στενώτεϱα δὲ καὶ ὀϱθὰ τῷ κλώσματι· καυλὸς δὲ λεπτὸς, ἁπλοῦς ὑπὲϱ πῆχυ ἔχων κεφάλια, θυρσοειδὲς αὖθι λεπτὰ, λευκὰ, ὑπωχϱα· ῥίζαι ὡς μέλανος ἐλλεβόϱου λεπταὶ, διώδυς, δριμεῖαι, ὑποπαϱοι· ὑδϱηλὰ δὲ φιλεῖ χωϱία. Ἁϱμόζει ἡ ῥίζα πινομένη σὺν οἴνῳ, ὅσον < ἀ. ἢ β'. τοῖς λαγωὸν βεβϱωκόσι θαλάσσιον, καὶ τοῖς ὑπὸ φϱυνίου δηχθεῖσι, καὶ τοῖς ὄπιον πεπωκόσι· καὶ τϱόφους καὶ δυσεντεϱίαν καθ' αὑτὸ, καὶ σὺν ἴσῃ δαύκῃ πινομένη. ἁϱμόζει καὶ ἀπόσμασι, καὶ πϱὸς τὰ ὑστεϱικὰ πάθη. ἡ δὲ τϱόφη ἴσχει κοιλίην, καὶ ἐμπλᾶ ἀγλ. καὶ οἰδήματα καὶ πλατυτέϱα πϱοσφύει.

Valet contra

Valet contra

Valet contra

Περὶ Ονοβρυχίδος. Κεφ. ρό'.

Ald. in notis inserit τὰ μὲν

Ald. μικρὰ

V. μικρὸν legit.

ΟΝΟΒΡΥΧΙΣ φύλλα ἔχει ὅμοια φακῷ, μικροῦ μεγαλύτερα· καυλὸν ἀστραγαλιαῖον· αὐτὸς φοινικοῦν, μικρὰν ῥίζαν. φύεται ἐν καθύγροις καὶ ἀγρίοις τόποις.

Δύναμιν δὲ ἔχει ἡ πόα ὅτι πλασθεῖσα λεῖα, σὺν χηρῷ φύματα· μεθ' οἴνου δὲ πινομένη, στραγγουρείαν θεραπεύει· σὺν ἐλαίῳ δὲ B διαφορήσει, ἱδρῶτας κινεῖ.

V codex hæc tota sylvestri adscribit. V. addit ἄγριον.

Περὶ Ὑπερικοῦ. Κεφ. ροά'.

ΥΠΕΡΙΚΟΝ, οἱ δὲ αἱδρόσαιμον, οἱ δὲ χόριον, οἱ δὲ χαμαιπίτυν, διὰ τὸ τὸ σπέρμα ὀσμὴν ἐοικέναι πίτυϊνη ῥητίνῃ· φύλλα ἔχει πηγάνῳ ὅμοια. θάμνος φρυγανώδης, ἀστραγαλιαῖος, ἰξώδυφος· αὐτὸς C ἔχων μήλινον ὀ, ὃ διὰ τελείου ἐν ταῖς δακτύλοις αἱματώδη ἢ χυλὸν ἐκκρίνῃ, ὅθεν καὶ αἱδρόσαιμον ἐκλήθη· κλωναία ὑποδασέα, τρομικὴ ἐν ᾧ φέρεται, μέγεθος, χριᾶς, ἐν ᾧ σπέρμα ὠλίγον ῥητίνης ὄζον. φύεται δὲ ἐν ἐρασίμοις καὶ θαμνώδεσι τόποις.

V. quidam tota hac periodo carent, vt & Orib. vsque ad ἀλυσιτελεῖ. V. ἀλύσεων ὑποδασεῖς. V. ἄμισυ κρόθης

Al. χρείας

Δύναμιν δὲ ἔχει διαρθρωτικὴν, καὶ ἐμμήνων ἀγωγὸν, φροσιθήμονα· τεταρταίους δὲ καὶ τριταίους ἀποφεύγει, μεθ' οἴνου πινόμενον· θεραπεύει δὲ ἰχιάδας ἐπὶ ἡμέρας μ'. τὸ σπέρμα πινόμενον. ἐκ τε φύλλα σὺν ᾧ σπέρματι καὶ καταπλασσόμενα, καὶ ἀχαὶ αἵματα ἰᾶται.

Al. τεταρταίων ἀναλλαπαίων

V. quidam carent. Marco habebat, τὸ σπέρμα ἐπιδιαμένον τῇ αἰθούσῃ καὶ τῷ ἀγγείῳ πηγάνου.

Περὶ Ασκύρου. Κεφ. ροβ'.

Ασκυρον, οἱ δὲ ἀσκυροειδὲς, οἱ δὲ αἱ- E δρόσαιμον, καὶ τοῦτο εἶδός ἐστιν ὑπερικοῦ, μεγάλῃ διαφέρον, κλωσὶ μείζονι, φρυγανωδέστερον δὲ καὶ πεφοινιγμένον ταῖς φύλλοις λεπτοῖς· αὐθη δὲ μήλινα φέρει· καρπὸν δὲ ὅμοιον ὑπερικῷ, ὄζουσα ῥητίνης, ἣν ὅταν πλατυσθῶσιν οἱονεὶ αἱματοῦσθαι δοκοῦσι, ὡς διὰ τοῦτο αἱδρόσαιμον καλεῖσθαι. Γ οἷς δὲ ὁ βότρυς καρπὸς πρὸς ἰχιάδας, πινόμενος ἀπ' ὑδρομέλιτος κύλικι ϛ'. ἄγει γὰρ χολώδη κόπρια πολλά. συνεχῶς δὲ διδόναι χρὴ, ἄχρις ἂν ὑγιασθῶσι. ποιεῖ δὲ πρὸς πυρικαυστα ὅταν πλασθείς.

Ald. codex addit, τὸ σπέρμα

Mare. legit καὶ Suv

V. addit καὶ

Περὶ Ανδροσαίμου. Κεφ. ρογ'.

Ανδρόσαιμον, οἱ δὲ Διονυσιάδα, οἱ δὲ G τοῦτο ἄσκυρον καλοῦσι. διαφέρει δὲ τοῦ ὑπερικοῦ τὸ μὲν ἄσκυρον, θάμνος ὢν λεπτοκαρφὴς, φρυγανώδης, πεφοινιγμένος τοῖς ῥαβδίοις·

De Onobrychide. Cap. CLXX.

ONOBRYCHIS folia habet lentis ferè lõgiora, caulem dodrantalem, florem puniceũ, radicẽ exiguam. Nascitur in humentibus & inultis locis. Herba si trita illinatur, panos discutiendi vim habet. Cum vino autẽ pota, stranguriæ medetur, & inuncta ex oleo sudores mouet.

De Hyperico. Cap. CLXXI.

HYPERICVM alij androsæmũ, alij corion appellant: sunt qui & chamæpityn, quoniam semen odore pineam resinam imitatur. Frutex est surculaceus, dodrantalis, rubescens, foliis rutę: flore verò luteo, violæ albæ simili, qui quidem digitis tritus sanguineũ succum remittit: qua ex causa etiã androsæmon appellatum est: calyculis subhirsutis, in rotũdo oblongis, hordei magnitudine, in quibus semẽ nigrum & resinosi odoris. Gignitur locis cultis & asperis. Vrinam ciet, subditúmque menses trahit: ex vino autem bibitum, tertianis quartanisq; liberat. Medetur & semẽ ischiadicis, quadraginta diebus haustũ. Sed & foliis cum semine impositis ambusta sanantur.

De Ascyro. Cap. CLXXII.

Ascyron siue Ascyroïdes, alijs androsæmon, etiã hyperici genus est, magnitudine distans: siquidem ramos habet maiores, ac fruticosius est: foliis interim tenuibus, puniceo colore rubẽtibus: flores luteos profert, & fructũ hyperico similem ac resinosi odoris: cuius attritu digiti veluti cruentãtur: qua de causa androsæmon (quasi humanũ sanguinem dixeris) vocauere. Est & huius fructus ad ischiadicos efficax potus in hydromelitis heminis duabus. Nã biliosa recremẽta plurima aluo detrahit. Sed dari frequẽtiùs oportet, donec sanitati restituti fuerint. Illinitur & ambustis efficaciter.

Vl. draconis d. subaud.

De Androsæmo. Cap. CLXXIII.

Androsæmõ, quod alij Dionysiada, alij etiã ascyron appellãt, ab hyperico & ascyro differt: frutex verò est ramulis gracilibus, surculosus, virgultis puniceo colore rubẽtibus,

folijs triplo quadruplóve maioribus quàm sint rutæ folia, quæque trita vinoso succo manant. Habet autem alas in cacumine complures, vtrinq; expansas pinnatásque: circa quas flosculi pusilli lutei, & in calyculis semẽ papaueris nigri, veluti punctis notulisve distinctum. Huius coma contrita resinosum odorem reddit. Sed & semen tritum drachmis duabus potum, excrementa bilioſa trahit: prodest verò maximè ischiadicis, verùm à purgatione aquam insuper sorbere oportet. Cæterùm illita herba medetur ambustis, & sanguinem cohibet.

A φύλλα τετπλασίονα ἢ πεντπλασίονα τῶ πηγάνου, ἃ τεφρὰ εἰνάδη χολὴν ἀφίησι· μαχάλας δ' ἔχει πλείους ἐπ' ἄκρῳ τετροπωμένας· πρὸς αἷς αὖ θήλεα μικρὰ, μύλινα· καρπὸς δὲ κάλυκι ὅμοιος ᾧ τῆς μελαίνης μήκωνος, οἱονεὶ κεχαραγμένος· αἱ σπερμάτιαι δὲ ἐν κάψῃ, ὁμοίως πιπάδι ὀσμὴν ἀποδίδωσι. Καὶ πότου δὲ καρπὸς λείος δυοῖν κ' ὀλκαῖ πόσις, ἄγει χολώδη κόπρια· θεραπεύει δὲ μάλιστα ἰσχιάδας· δεῖ δὲ μετὰ πολὺ καθαρσίου ὕδατος ὑπερπίνειν. καὶ πυρίασις δὲ ἡ πόα καταπλασθεῖσα ἰᾶται. καὶ αἷμα ἐπέχει.

Dod. legit ἐμοῦ

Quidam addit ἄμυστι

V. πυρᾶι substituit, ac ita quoque legit Lecyna.

De Coris. Cap. CLXXIIII.

Περὶ Κόριος. Κεφ. ροδ'.

C

KORIS, quod aliqui etiam hypericum appellant, frutex est folio ericæ, sed minore, pinguiore & rubente, dodrantalis, ori gratus, acris & odoratus. Huius semen potum vrinas mensésque ciet. Est & auxilio ex vino potum à phalangio demorsis, ischiadicis & opisthotonicis: itémque rigoribus addito pipere. Sed & eò vtiliter opisthotonici cum oleo perunguntur. [Radix in vino decocta potáque, resolutis egregiè opitulari creditur: sed laborantem inter potandum bene circumquaque operiri decet: siquidem corpore toto sudorem ciet, qua ex re agilitas pristina recuperatur.]

D

KΟΡΙΣ, ᾧ δὲ καὶ τὸν ὑπερικὸν καλοῦσι, φύλλον ἔχει παρπλήσιον τῆς ἐρείκης, μικρότερον δὲ καὶ λιπαρώτερον καὶ ἐρυθρόν. θάμνος δ' ὀργυιαῖος, βύσσιμος, δριμὺς & εὐώδης. Τούτου ὁ καρπὸς πινόμενος, οὖρα καὶ καταμήνια ἄγει. βοηθεῖ καὶ φαλαγγιοδήκτοις, ἰσχιαδικοῖς τε καὶ ὀπισθοτονικοῖς, σὺν εἴδει πινόμενος· πρὸς δὲ ῥίγη σὺν πεπέρει. δεῖ δὲ ὀπισθοτονικῷ καὶ πονηροσαρκίᾳ ἔχοντι σὺν ἐλαίῳ ἀρμόδιον. ἡ δὲ ῥίζα τούτου σὺν οἴνῳ ἑφθεῖσα καὶ πεθεῖσα πρὸς ἕτερα καλῶς βοηθεῖ· περιύεται· δεῖ δὲ ⟨τὸν⟩ πάσχοντα εὖ τὸν πόδα περιεκπεπλῆσθαι καλῶς. ἱδρῶτι γὰρ ὅλον τὸ σῶμα καὶ πρὸς ὑγιασίαν ἐκ τούτου λαμβάνει.

Conclusa habet Aldi. cod. in nonnullis: eadẽ cyprius in vtroq; vetusto codice reperit in capitis calce.

Alibi mutilatum

Aldinus

De Chamapity, seu abiga. Cap. CLXXV.

Περὶ Χαμαιπίτυος. Κεφ. ροε.

E

CHAMÆPITYS, quã qui Pontum incolũt, holocyrton, Athenienses Ioniam, EVboici sideritin vocant, herba est quæ humi serpit, F incuruæ similis, folijs semperuiui minoris, at multò tenuioribus pinguioribúsque & hirsutis, circa ramulos densis, odore pinus: floribus tenuibus, luteis, vel candidis: radice cichorij. Huius folia septem diebus in vino pota regio morbo medentur: & quadraginta diebus ex hydromelite, ischiadẽ sanant. Dantur & hepaticis & vrinæ difficultate laborantibus, ac peculiariter nephriticis: torminosis etiã prosunt. Vtũtur & ea herba Heracleæ Pon-

X

XΑΜΑΙΠΙΤΥΣ, ὣν οἱ μὲν Πόντιοι ὁλόκυρτον καλοῦσι, Ἀθηναῖοι Ἰωνίαν, οἱ δὲ Εὐβοῖαι σιδηρῖτιν, διὰ ἕρπουσα ὀλίγη γῆς, ὑποκύρτῳ· φύλλα δὲ ἔχει ὅμοια ἀφῆς μικρᾶς, λεπτότερα δὲ καὶ λιπαρώτερα καὶ δασέα, πυκνὰ περὶ τὸν κλάδον, ὀσμὴν ἔχοντα πίτυος, ἄνθη λεπτὰ, μύλινα, ἢ λευκὰ· ῥίζαν ὡς κιχωρίου. Ταύτης τὰ φύλλα πινόμενα μ' οἴνου ἐπὶ ἡμέρας ζ'. ἴκτερον θεραπεύει. ἐπὶ δὲ μ'. ἰσχιάδα θεραπεύει μεθ' ὑδρομέλιτος πινόμενα· διδοῦσι δὲ ὑπὲρ πυρετοῦ καὶ δυσουρίας καὶ νεφριτικοῖς ἰδίως, ἀρμόζοντα καὶ τροφαμφίοις. χρῶνται δ' αὐτῇ καὶ οἱ ἐν Ἡρακλείᾳ τῇ Πον-

Aldinus

V. caret. Orib. interpres vertit pauló.

V caret. Expunxit etiam Marcellus.

ζυκῇ, ὡς αἰτιδότῃ, τοῖς ἀκόνιτου πολίζου- A
τις τὴ ἀφέψημα. καὶ ἐπὶ πλάστου δὲ
τοῖς τὰ τοιαυτηρὰ μιγνὺς ἀλφίτων
δεδευμένων τῷ ἀφεψήματι τῆς πόας:
λεαίνει δὲ σὺν σύκοις καὶ αὐτὴ καὶ ἐν
πόλιον δεδευμένη, μαλάσσει χιλίους μι-
γεῖσα μέλιτος δὲ καὶ λεπίδος καὶ ῥητίνης ἀ-
ναλήφεται, καθαίρει· ἄγει δὲ καὶ τὰ ἀπὸ B
ὑστέρας, τοιαυτηρὰ σὺν μέλιτι. Διαφο-
ρεῖ δὲ καὶ σκληρίας μαστῶν, καὶ τραύματα
κολλᾷ. καὶ ἕρπητας ἐπιχριόμενα μετὰ μέλιτος
καταπλάσσει.

Περὶ ἑτέρας χαμαιπίτυος.
Κεφ. ροϛ'.

Ἔστι καὶ ἑτέρα χαμαιπίτυς. κλάδους C
ἔχουσα πηχαίους, ἀγκυροειδεῖς, λεπτο-
χάρφους· κόμιν δὲ ἐοικυῖαν τῇ τοῦ αὐ-
τῆς, καὶ ἄνθος λευκόν· σπέρμα δὲ μέλαν·
ὀσμὴ δὲ καὶ αὐτὴ πίτυος. Καὶ τρίτη
τις ἔστιν ἄῤῥεν καλουμένη. ἔστι δὲ βοτά-
νιον * λεῖον, ἔχον φυλλάρια λεπτὰ, λευ-
κὰ, δασέα· καυλὸν δὲ πηχυαῖον, λευκὸν·
ἀνθήλια μόλινα· σπερμάτιον δὲ πρὸς τοῖς
μασχάλαις. ὄζει δὲ καὶ τοῦτο πίτυος. Δύ-
ναμιν δὲ ἔχουσι καὶ αὐτὰ ὁμοίαν τῇ τοιαυ-
τηρᾷ, οὐ μέντοι οὕτω τοιαυτηράν.

Alter πηχέν, quam lectionem probat Hermolaus. Oribasij interpres hujusmodi verba.

Τέλος τοῦ λόγου τρίτου.

tiæ incolæ, velut antidoto, conti- A
aconitum decoctum ipsius propri-
mantes. Porrò ad antedicta quo-
que vitia cum polenta iure decocta
subacta imponitur. Contrita verò
cum ficubus & pilularum instar ex-
hibita, aluum emollit. At exempta
melle cum æris squama & resina
etiam purgat. Extrahit & quæ in
vtero morantur cum melle subdita B
in pesso. Mammarum quoque du-
ritias discutit, vulneráque glutinat.
Herpetas denique illita cum melle
cohibet.

De altera Chamæpity.
Cap. CLXXVI.

Est & altera Chamæpitys, ramis C
cubitalibus, in anchoræ speciem
incuruatis, gracilibus: coma su-
pradictæ, flore candido, ac se-
mine nigro. Sed & hæc pinum redo-
let. Additur & tertia quæ mascu-
la nominatur. Est autem herbula
læuis, foliolis tenuibus, albis, pi-
losis: caule scabro, candido: pu-
sillis floribus lutèis, ac minuto se- D
mine iuxtà alas. Resipit & hæc pi-
num. Vtraque porrò vim antedi-
ctæ similem obtinet, at non petin-
de efficacem.

Tertij libri finis.

PEDACII DIOSCORIDIS ANAzarbæi De medica materia Liber quartus.

ΠΕΔΑΚΙΟΥ ΔΙΟΣΚΟΡΙΔΟΥ ΑΝΑΖΑΡΒΕΩΣ Περὶ ὕλης ἰατρικῆς βιβλίον τέταρτον.

IANO ANTONIO SARACENO LVGDVNÆO INTERPRETE.

QVONIAM tribus libris prioribus, amantissime Aree, de aromatis, oleis, vnguentis, arboribus, animalibus, cerealibus, oleribus, radicibus, succis, herbis ac seminibus, egimus: in hoc quarto de ijs quæ restant herbis atque radicibus, disseremus.

De Vettonica. Cap. I.

CESTRON, quod psychrotrophon vocitatur, quoniam frigidissimis in locis reperiatur, Romani Vetonicam seu rosmarinum appellant: herba est caulem proferés tenuem, cubiti altitudine, aut etiã maiorem, quadrangulum: folia longa, mollia, quernis similia, in ambitu incisuris diuisa, boni odoris, ac prope radicem maiora: semen in summitate caulium, thymbræ modo spicatum inest. Decerpta huius folia siccari oportet: quippe quorũ sit etiam maior & frequentior vsus. Radices verò subsunt tenues, ceu ellebori: quę quidem ex hydromelite potæ, pituitosam vomitionem cuocant. At folia ad conuulsa, rupta, vuluæq; vitia & strágulationes drachmæ pondere ex aqua mulsa potui dantur: & contra venenatarum bestiarum morsus; drachmis tribus ex vini heminis duabus: sed & herba earundem morsibus vtiliter imponitur: itidémque aduersus venena drachmæ pondere ex vino pota prodest. Quin & ei qui ipsam in potu præsumpserit, haustum deinde lethale medicamentum minimè nocitum est. Vrinas præterea ciet, aluúmque subducit. Medetur & comitialibus atque insanis ex aqua pota: hepaticis verò ac sple-

A ΕΝ τοῖς περὶ τούτου τρισὶ βιβλίοις, φίλτατε Ἄρεϊ, παραδόντες περὶ ἀρωμάτων καὶ ἐλαίων καὶ μύρων καὶ δένδρων καὶ ζώων καὶ σπερμάτων καὶ λαχάνων καὶ ῥιζῶν καὶ χυλισμάτων καὶ βοτάνων καὶ σπερμάτων· ἐν τούτῳ περὶ τῶν λοιπῶν βοτανῶν καὶ ῥιζῶν διαλεξόμεθα.

B

Περὶ Κέστρου. Κεφ. α.

ΚΕΣΤΡΟΝ ὃ καλοῦσιν ψυχότροφον, ἐπειδὴ ἐν τοῖς ψυχροτάτοις τόποις φύεται· Ῥωμαῖοι δὲ στοιχῆνα καλοῦσιν, ἢ ἐσμαρίνην· πόα ἐστὶ καυλὸν ἔχουσα λεπτὸν πήχεως τὸ ὕψος, ἢ, καὶ μείζονα, τετρά-

C γωνον· φύλλα μακρά, μαλακά, ὅμοια δρυΐ, τὰ περὶ τὴν ῥίζαν· ἐπ' ἄκρῳ δὲ τῷ καυλῶν ἔνεστι τὸ σπέρμα ἐσταχυωμένον ὡς τὸ θύμβρας. Τούτης τὰ φύλλα δεῖ συλλέγεσθαι ξηραίνειν· ὧν ἐστι καὶ ἡ πλείων χρῆσις· ῥίζαι δὲ ὕπεισι λεπταὶ ὡς ἡ ἑλλεβόρου,

D αἱ τινες φλεγμαίνουσι προσφερόμεναι ἕμετον, μεθ' ὑδρομέλιτος πινόμεναι. τὰ δὲ φύλλα διδόναι πρὸς τὰ σπάσματα, ῥήγμασι, καὶ πρὸς τὰς ἐν ὑστέρᾳ ἀγρυπνίας, καὶ πίνειν ὑστερικὰς < ἀ. ὁλκὴν μεθ' ὑδρομέλιτος· πινόμεναι. θηριοδήκτοις δὲ ὁλκαὶ γ'. μετ' οἴνου κυάθων β'. καταπλάσσουσι δὲ καὶ πόα, ὠφελεῖ δὲ θηριοδήκτους, καὶ πρὸς τὰ θανάσιμα ὁλκὴ μετ' οἴνου πολιοῦσα αἱμύζει· ἐὰν δέ τις προσπίῃ, οὐδὲν βλαβήσεται λαβὼν φάρμακον θανάσιμον· ἔστι δὲ ὑρητική, χολίας τε ἐκποιητική· ἡρμοσται δὲ καὶ ὀπισθότονοις, καὶ μανικοῖς, μεθ' ὕδατος πινομένη, καὶ ἡπατικοῖς· σπλη-

E

Al. ὠφέλιμα.

V. melius Dioscor. Semb.

V. omittit, non male hamb. V. inuen. Mar. Ἐκκαθαίρει δὲ καὶ ὑδρωπικοὺς Marg. addit ex Steph. καὶ πυρέτους.

Dalech. legit χολὴν ἐκκαθαίρει scil. μανικὰ.

V legit φλεγματώδη χυλοὺς, καὶ ἐκκάθαιρε μεθ' ὑδρομέλιτος.

V. ὁλκὴν καὶ ἡμιδιδ.

V Selec. Al. ἀξίνη τοῦ μέλιτος.

νικοὺς· δι', μετ' ὀξυμέλιτος ὁλκὴ < ά. ὅτι πολῖται· ποιῇ δὲ καὶ πίνεται, ἐαί τις μετὰ τὸ δεῖπνον αὐτὴν κυάμου μέγεθος κατάπιῃ μετὰ μέλιτος ἑφθοῦ. ὁμοίως καὶ ὀξυρεγμιῶσι δίδοται· τοῖς δὲ δυσεντεριῶσι καὶ καταπίνειν ⓦ χύλον, εἶτ' ὑπόρροφον οἶνον κεκραμένον. δίδοται δὲ καὶ αἱμοπτοϊκοῖς ὁλκὴ τριωβόλου μετὰ κεφάλου κυάθου ἑνὸς γαλακτώδους· ἰσχιαδικοῖς τε μεθ' ὕδατος καὶ νεφριτικοῖς καὶ κύστιν ἀλγοῦσιν· ὑδρωπικοῖς δὲ < δ. μεθ' ὑδρομέλιτος, πυρίασιν· ἀπυρέτοις δὲ, σὺν οἰνομέλιτι· ἰσχιαδικοῖς τε καθίστασι, καὶ καταμηνία ἄγει ὁλκὴ < ά. μετ' οἴνου πινομένη· καὶ λίθον δὲ < δ'. πολῖται κεφαλαίωσι μεθ' ὑδρομέλιτος κυάθοις δέκα. ποιῇ καὶ πρὸς φθισικοὺς, ἐμπύικοὺς, μετὰ μέλιτος. ἀποθήκῃ δὲ δεῖ τὰ φύλλα ξηρὰ λαβόντα κεραμίῳ ἀγγείῳ.

V. αἱμοπτυϊκ.

V. curm.

V. ἴρινα

V. δασέα

V. αἰδὼ χυτικὸν δὲ ὁ καυλός.

V. Epit. ἀγχιμάλου.

Περὶ Βρεττανικῆς. Κεφ. β'.

ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ἡ Βεττονικὴ, πόα ἐστὶν ἔχουσα φύλλα ἐμφερῆ λαπάθῳ ἀγρίῳ, μελάντερα δὲ καὶ δασύτερα, γύφουλα τῇ γεύσει· καυλὸν δὲ ἀφιησιν οὐ μέγαν· ῥίζαν λεπτὴν καὶ βραχεῖαν. χυλίζεται δὲ αὐτῆς τὰ φύλλα, καὶ τὸ ἡλίῳ ἢ πυρὶ συγρίφεται. δύναμιν δὲ ἔχει συστελλωτικὴν, ἰδίως ἁρμόζουσαν πρὸς τὰ τοῦ στόματος καὶ παρισθμίους νοσήματα. ποιῇ δὲ καὶ πρὸς τὰ λειχῆνα ὅσα γύψιον χρήζει.

Περὶ Λυσιμαχίου. Κεφ. γ'.

ΛΥΣΙΜΑΧΙΟΝ, ⓐ δὲ λύτρον καλοῦσι, καυλοὺς ἀφιησι πηχυαίους ἢ καὶ μείζονας, λεπτοὺς, θαμινόφυλλους, ὧν πρὸ τῶν γονάτων φύλλων λεπτῶν ἐκφύσεις, περιπλησίως τοῖς τῆς ἰτέας, γυφόεσσαν ἐν τῇ γεύσει· ἄνθος πυῤῥὸν ἢ χρυσοειδές. φύεται δὲ ἐν ἑλώδεσι τόποις, καὶ πρὸ τῶν ὑδάτων. ἁρμόζει δὲ ὁ χυλὸς τῶν φύλλων συστελλικὸς ὤν, πρὸς αἵματος ἀναγωγὰς, καὶ δυσεντερίας, πόμα καὶ ἔγκλυσμα· ῥοιῶντε γυναικεῖον ἴσχνον ἐν προσθέτῳ καὶ πρὸς τοὺς ἐκ μυκτήρων αἱμορραγίας ἐμφερασμένη ἢ πόα ἁρμόζει. ἔστι δὲ καὶ τραυματικὴ καὶ ἱεραιμος· θυμιαθεῖσα δὲ θριμπάλοις ἔχει ⓦ καπνὸν

V. Mare. legit ἔγκλυσμα

V Epit. ἐν ἀγχιμάλῳ.

neticis, drachmæ pondere in aceto mulso. Concoctionem quoque facit, si quis ipsam à cœna, fabæ magnitudine cum melle cocto deuorarit. Simili modo & acidum eructantibus exhibetur. Stomachicis autem eam manducare, succúmque deuorare, deindéq; vinum dilutũ insuper sorbere proderit. Datur & sanguinem excreantibus, obolis tribus in vini diluti egelidi cyatho vno: itémque ischiadicis, nephriticis, & à vesica dolentibus, ex aqua: hydropicis autem binis drachmis, ex aqua mulsa, si quidem febricitent: sin aliter, ex mulso. Regio quoque morbo laborantes recreat, ac mẽses pellit, drachmę pondere in vino pota: drachmis verò quatuor bibita in aquæ mulsæ cyathis decem, aluum purgat. Est & phthisicis ac empyicis auxilio cum melle. Cæterùm folia arefacta tritáque in fictili vase recõdi oportet.

De Britannica. Cap. II.

BRITANNICA seu Vettonica, herba est folijs syluestris lapathi, at nigrioribus ac pilosioribus, gustu adstringentibus: caulẽ verò promit non ita magnum: radice autem tenui breuíque nititur. Folijs exprimitur succus, qui sole aut igni cogitur & inspissatur. Vim porrò habet astrictoriã, priuatim oris ac tonsillarum depascẽtibus vlceribus accommodatam. Valet etiam ad reliqua, quibus adstrictione opus est.

De Lysimachia. Cap. III.

LYSIMACHIA, quã aliqui lytron appellant, caules emittit cubitales aut etiam altiores, tenues, fruticosos, à quorum geniculis folia prodeunt salignis similia, gustu astringentia: flos est fuluus aureúsve. Nascitur in palustribus & secus aquas. Foliorum succus, qua pollet astringendi vi, sanguinis reiectiones supprimit: valet etiam ad dysenteriam, seu potui datus, seu etiam clystere infusus: fluorem quoque muliebrem sistit, subditus in pessũ. Sed & herba sanguinis è naribus profluuio subuenit, ijsdem indita. Est & vulneraria, sanguinémq; supprimit. Acerrimũ verò nidorẽ suffita red-

dit, adeò vt & serpentes abigat, & muscas enecet.

De Polygono mare. Cap. IIII.

POLYGONON mas, Latinis sanguinaria seu sanguinalis, herba est quæ ramos habet exiles, teneros, numerosos, geniculis interseptos, qui graminis instar humi serpunt, neque à terra attolluntur: folia rutæ, sed longiora mollioráque, semine sub singulis folijs turgescẽte, vnde & marem appellari volũt: flos ei candidus aut puniceus. Vis epoti succi, astringere & refrigerare: prodest cruẽtis excreationibus, alui fluxionibus, cholera & stranguria laborantibus: nam euidenter vrinas ciet. Cum vino potus venenatorum morsibus auxiliatur, ac febriũ circuitus finit, si hora vna antè accessionẽ assumatur. Sistit & subditus fluorem muliebrẽ, ac auribus dolentibus purulentísve vtiliter instillatur. Cum vino autem decoctus adiecto melle, facit eximiè ad genitalium vlcera. Folia verò stomachi feruori, sanguinis reiectioni, herpetibus, erysipelatis, inflammationibus, œdematis & recentibus vulneribus imponuntur.

De Polygono fœmina. Cap. V.

Polygonon fœmina frutex est exiguus, vno caule præditus, tener & harundini similis, geniculis densus: quorum alia alijs tubarũ modo inseruntur infarciuntúrve. Ipsos verò geniculorũ articulos cingunt in orbem apices, foliolis pini similes: radix superuacua. Nascitur in aquosis. Huic vis astringens ac refrigerans, ad eadem valens, ad quę antedicta: sed inefficacior.

De Polygonato. Cap. VI.

POLYGONATVM in montibus nascitur, frutex cubito altior, folijs lauri, at latioribus, & læuioribus, sapore quodammodo malum cotoneum aut punicum redolentibus, siquidem gustanti astrictum saporem resipiunt: flores autẽ per singulos foliorum exortus promit candidos, folijs ipsis numerosiores, incœpta à radice supputatione: radicem verò habet albam, mollem, longam, crebris nodis ceu geniculis cinctam, den-

A ὡς τε καὶ ἑρπετὰ διώκειν, καὶ μύας ἀποκτείνειν. Περὶ Πολυγόνου ἄῤῥενος. Κεφ. δ'.

ΠΟΛΥΓΟΝΟΝ ἄῤῥεν πόα ὀρθὴ κλῶνας ἔχουσα λεπτοὺς, τυφεσιοὺς, πολλοὺς, γόνασι διειλημμένους, ἕρπουσα ὅλη τὴν ἴσην ἄνωσιν· φύλλα δὲ πηγάνου ὅμοια, ὀλιγοστίχια δὲ μᾶλλον καὶ πυκνὰ· ἔχει δὲ καρπὸν πρὸ ἑκάστου φύλλου· ὁ δὲ ἄῤῥεν καλεῖται· αὐθος δὲ λευκὸν ἢ φοινικοῦν. Δύναμιν δὲ ἔχει συμπτικὴν, ψυκτικὴν· ὁ χυλὸς πινόμενος· ἀρμόζει δὲ αἱμοπτοϊκοῖς, καὶ τοῖς καλῶς χειλίαις ῥεύμασι, χολερικοῖς τε καὶ στραγγουριῶσι· ἄλλῃ δὲ οὐδὲν ἰσχυρός. Βοηθεῖ καὶ φθειροδήκτοις μετ' οἴνου πινόμενος, καὶ πρὸς περιόδους, ἐπὶ μιᾶς ὥρας τῆς ἐπισυμβαινούσης λαμβανόμενος. ἴσχει δὲ καὶ ῥοῦν γυναικεῖον πεσσευθεὶς, καὶ πρὸς ὠταλγίας καὶ πυορροίας ἐνιστάζόμενος ἁρμόζει. συνεψηθεὶς δὲ οἴνῳ καὶ μέλι πεσσοποιεῖν, ἄκρως ποιεῖ πρὸς τὰ ἐν αἰδοίοις ἕλκη καλῶς πλάσσεται δὲ τὰ φύλλα πρὸς στομάχου ἔγκαυσιν, καὶ αἵματος ἀναγωγὰς καὶ ἕρπητας, ἐρυσιπέλατά τε καὶ φλεγμονὰς, καὶ οἰδήματα, καὶ τραύματα πρόσφατα.

Περὶ Πολυγόνου θήλεως. Κεφ. ε'.

Πολύγονον θῆλυ θαμνίον ὀρθὸν μονόκλωνον, τυφεσιὸν, καλαμώδες, γόνασι συνεχῆ ἔχον ἐγκείμενα ἀλλήλοις· ὡς ἐφ' σάλπιγξος· καὶ περὶ τοῖς γόνασιν ἐν κύκλῳ ἕξοχαὶ πίτυος, φυλλαρίοις ἐοικυῖαι. ῥίζα ἄχρηστος· φύεται δὲ καὶ τοῖς ὑδατώδεσι.

Δύναμιν δὲ ἔχει συμπτικὴν, ψυκτικὴν, παραπλησίαν τὰ αὐτὰ τῷ πρὸ αὐτοῦ, ὅτι μὴ ἀσθενέστερον.

Περὶ Πολυγονάτου. Κεφ. ς'.

ΠΟΛΥΓΟΝΑΤΟΝ φύεται μὲν ὄρεσι, θάμνος μείζων πήχεως· φύλλα ἔχων ὅμοια δάφνῃ, πλατύτερα δὲ καὶ λιπότερα, γευομένῳ ὅμοιόν τι μήλῳ κυδωνίᾳ ἢ ῥοιᾷ. μετὰ σύφους δὲ προσβήξ. κεῖται ἐκφυσιν τῶν φύλλων αἰχμὴ λευκὴ, τῷ πλήθει τὸ σὸν ἔχουσα τῶν φύλλων τῷ ἀριθμῷ ἀπὸ τῆς ῥίζης γινομένου· ῥίζα δὲ λευκὴ, μακρὰ, πολυγόνατος, δεσ-

Vide carm.

Sic alius codex & Orib. at vulg. exempl. βότανα τετράγωνα.

V. caret his verbis. φύλλα.

V. non aquosis.

Al ὁ δὲ χυλὸς πινόμενος· ἄλλῃ δὲ οὐδὲν ἰσχυρός πεπόμφασι δὲ.

Videtur Oribasius interpres legisse, Θαμνίον ὀρθὸν μονόκλωνον οὗ ὁ κυλὸς ζυγοῖς χρωμένοις

Al κολλασθαι

στῖδι, βαρύοσμοι, πάχος ἔχουσι δακτύλου, ποιοῦσαι ῥοὰς τραύματα, καταπλασσόμενον αἵματος ἴσχουσι καὶ οὐλοῦσι ἐν προσώπῳ.

Περὶ Κληματίδος. Κεφ. ζ.

ΚΛΗΜΑΤΙΣ, ἣν δὲ δαφνοειδῆ, οἱ δὲ μυρσινοειδῆ, οἱ δὲ πολυγονοειδῆ καλοῦσι φύεται ἐν *εὐχείοις. κλήματα δὲ ἔχει μικρὰ ὅσον ἀρίνου τὸ πάχος, πήχεσι δὲ μικροῖς, δάφνῃ ἐμφερὲς τῷ τε φύλλῳ καὶ τῇ χρόᾳ, μικρότερον δὲ πολλῷ. Ταύτης τὰ φύλλα καὶ οἱ κλῶνες σὺν οἴνῳ πινόμενα, δυσεντερίας καὶ δυσουρίας παύει· μετὰ γάλακτος δὲ καὶ ῥοδίνου, ἢ κυπαρίττου ἐν ποτῷ τοῖς σκιδήμασι, ὑστέρας πόνους θεραπεύει. παύει δὲ καὶ ὀδόντων πόνους ἀφαμαξωμένη. βοηθεῖ καὶ θηριοδήκτοις ἐπιληφθέντα. ἱστορεῖται δὲ καὶ ἀσπιδοδήκτοις μετ' ὄξους πινομένη, βοηθεῖν. φύεται δὲ ἐν χέρσοις.

Περὶ Πολεμωνίας. Κεφ. η.

ΠΟΛΕΜΩΝΙΟΝ, οἱ δὲ φιλεταίειον, Καππάδοκες μὲν χιλιοδύναμιν καλοῦσι, χλωρία ἔχει λεπτὰ τετορωμένα· φύλλα ὀλίγῳ μείζονα πηγάνου, ὀπιμηκέστερα δὲ πρὸς τὰ τῆς πολυγόνου ἢ τῆς καλαμίνθης. ἐπ' ἄκρου ὀμματίων ὡσεὶ κόρυμβοι, ἐν οἷς σπέρμα μέλαν· ῥίζα πηχυαία, ὑπόλευκος, ἐμφερὴς τρυφῇ· φύεται ἐν ὀρεινοῖς καὶ βραχέσι τόποις. Ταύτης ἡ ῥίζα πινομένη ἐν οἴνῳ πρὸς θηρία καὶ δυσεντερίαν, δυσουρίαν τε καὶ ἰσχιάδα, μεθ' ὕδατος. καλλικοὺς δὲ, μέχρι ὄξους ὄσον < ἀ. ὀλκήν. ἐπιλάπτεται ἡ τούτου ῥίζα πρὸς σκορπίου πληγήν. φασὶ δὲ μὴ τυπτεσθαι ὑπ' αὐτῶν ἔχοντας αὐτὴν, ἢ κἂν πληγῶσι, μηδὲν πάσχειν. παύει δὲ καὶ ὀδοντάλγιας ἀφαμαξωμένη.

Περὶ Συμφύτου πετραίου. Κεφ. θ'.

ΣΥΜΦΥΤΟΝ πετραῖον φύεται ἐν πέτραις· χλωρία δὲ ἔχει ὅμοια ὀριγάνῳ, λεπτὰ φύλλα, κεφάλια δὲ ὡς θύμου· ὅλον δὲ ἐστὶ ξυλῶδες ἐπὶ βώδεσι, γλυκύ τε πρὸς τὴν γεῦσιν, καὶ πνεύσεως πρόκλησιν· ῥίζαν δὲ ἔχει μακράν, ἐπιπόρφυρον, ὅσον δακτύλου πάχος. Τοῦτο ἑψηθὲν σὺν μελικράτῳ καὶ πόσει, ἀνακαθαίρει τὰ ἐν πνεύ-

Sic Cal. & V. cod.

Catar. ὑπερχυσιν

Lacuna legit in vet. cod. διαμαξωμένη καὶ οὐταλγήσω.

Ald χιλιοδύναμιν. Marc. χιλιόδυνον

Hæc ascititia suspicatur Dodonæus, quoniam neque in Cretæ fragmentis habentur.

V. ad eram. ταχεῖα. Sic quoque in vet. legit Lacuna.

Rectius πλήσιον.

Al. τῶν χιῶνα.

sam, graueolentem, ac digitali crassitudine, quæ vulneribus efficaciter imponitur, ac maculas etiam in facie delet.

De Clematide. Cap. VII.

CLEMATIS, quam aliqui daphnoides, alij myrsinoides, alij polygonoides vocant, gignitur in Ægypto. Sarmentosas autem spargit quasi viticulas; eásq; longas, iunci crassitudine, folio paruo, laurini figura & colore, at multò minore. Caules foliáque in vino pota, alui profluuia & dysenterias sedant. Cũ lacte verò & rosaceo, aut cyprino subdita in pesso, cruciatibus vulvæ medentur. Dolores dentium commanducata finit: impositа quoque venenatorum morsibus, iuuamentum præstat. Fertur & ex aceto pota, cõtra aspidum morsus auxiliari. Nascitur in incultis.

De Polemonia. Cap. VIII.

POLEMONIAM, alij philetæriam, Cappadoces chiliodynamon appellãt: ramulis est exilibus, vtrinq; pinnatis, foliis paulò quàm rutæ maioribus, at longioribus, ad polygoni aut calaminthæ similitudinem: quibus in summis veluti corymbi dependent, nigro intus semine: radice cubitali, albicãte, struthio seu radiculæ simili. Nascitur in montosis & asperis. Radix ex vino bibitur contra venenatas bestias ac dysenteriam: & ex aqua, aduersus vrinæ difficultatem & ischiadem. Datur autẽ ex aceto drachmæ pondere lienosis. Eadem contra scorpionis ictum amuleti instar adalligatur. Tradunt porrò, qui radicem eam gestauerint à scorpionibus minimè feriri, aut si ab ijs icti fuerint, nihil mali passuros. Dentium quoque dolores commanducata mitigat.

De Symphyto petræo. Cap. IX.

SYMPHYTVM petræum in petris nascitur: ramulis origano similibus, foliis tenuibus, & capitulis thymi. Totum verò lignosum, odoratum & gustu dulce est, saluámq; ciet: radice nititur longa, subfulua, digitali ferè crassitudine. Decoctũ in aqua mulsa & potum, quæ pul-

moni hærent excremẽta repurgat: sanguinem reijciẽtibus ac nephriticis cum aqua exhibetur. Bibitur & ad dysenteriam rubẽtémq; fluorem muliebrem in viño decoctum, vti ad conuulsa ruptáque cum aceto mulso. Quin & commanducatú sitim sedat: faucibus asperis subuenit: illitum recentia vulnera glutinat, & enterocelas cohibet. Quin & carnes dum coquuntur conglutinat additum.

Α μους· ἕ πὸς αἷμα ἀναῤῥοσι, ἡ πεφριτικοῖς σὺν ὕδατι δίδο· σὺν οἴνῳ ἡ ἑλκῶν, πίνε· πρὸς δυσεντερίας, καὶ ῥῆξι γυναικῶν ἐρυθρόν· σὺν ὀξυμέλιτι ἡ, πρὸς ἀποσματα καὶ ῥήγματα. καὶ ἀδινον δι' ὅστ ἀμμαστόμενον· ἁρμόζει καὶ πὸς βεβῆκου πραχύτητι κολλᾷ ἡ ποπτωσα, ἕ ἐντεροκήλας ἀποκρατεῖ καὶ ἁπλᾶ καὶ ἁπλοῦν. καὶ τὰ κρέα δι' Β συμπίπτει ἐφόλκια σὺν αὐτοῖς.

V. ἀμμᾶται καὶ ἐμμᾶται
V. ἀπλοῦν

De Symphyto altero. Cap. X.

Περὶ Συμφύτου ἄλλου. Κεφ. ι.

Symphytum alterum, quod aliqui pecton vocant, caulem emittit bicubitalem aut etiam altiorem, leuem, crassum, angulosum, & ceu sonchi inanem: circa quem ex interuallis, haud ita magnis folia exeunt hirsutá, angusta, longiuscula, ad buglossi foliorum similitudinẽ: habet verò caulis eminentias quasdam secundum angulos porrectas, adiacentibus ac velut annexis foliis tenuibus, quæ è singulis prodeunt alarũ sinibus. Sunt insuper flores lutei, ac semen circa caulẽ ceu verbasci. Totus autẽ caulis ac folia quoq; ipsa subaspera lanugine horrent, attactúque pruritum excitant. Radices demittuntur foris nigræ, intus candidæ, glutinosæ: quarum etiam est vsus. Tritæ & potæ sanguinem excreantibus ruptisque proficiunt, & recentia vulnera impositæ glutinant: carnium quoque frusta quibuscum coquuntur cogunt ita vt coalescant. Cæterùm inflammationibus, præsertímque sedis, cum senecionis foliis vtiliter illinuntur.

Σύμφυτον ἄλλο, οἱ δὲ πηκτὸν καλοῦσιν· ἀμίσχαιον ἢ καὶ μείζονα, κοῖλον, πεπλωμένον, γωνιοειδῆ, κενὸν· ἀσπερεὶ σόγχου, ἐκφέρει ὃν οὐκ ἐκ μεγάλων διαστημάτων φύλλα δασέα, ἁπλᾶ, στενά, ἐπιμήκη, πρὸς τὰ τῆς βουγλώσσου ἐξοχὰς δὲ ἔχοντα· ὁ καυλὸς ἐκ δὲ τῶν γωνίας πτερυγώδεις, φύλλων λεπτῶν παρεκφύσεις, ἀφ' ἑκάστης μεγάλης τινὰ αὐτῇ ἕπεται μίλινα, καὶ καρπὸς περὶ αὐτὸν καυλοῦ ὡς φλόμου. ὅλος ἡ ὁ καυλὸς καὶ τὰ φύλλα ἔχει χνοῦν ὑπόπεζον, καθ' ὃν πολὺ παρέσται φλοιὸν κρημνὸν ἐμποιοῦντα· ῥίζαν δὲ ὑπόφαιν τὴν μὲν ὀπτοφαίαν μέλαιναν, ἔνδοθεν δὲ λευκὴν καὶ γλίσχραν· ὧν καὶ ἡ χρῆσις. Ποιεῖ ἡ λᾶσαι πτόμεναι αἱμοπτοϊκοῖς καὶ ῥηγμασίαις, καὶ τὰ ποπτωσα κολλῶσι καθαπλασθέντα καὶ τὰ κρέα δὲ συναρθόμενα συναγόμενοι· καθαπλασθέντα δὲ πρὸς φλεγμονὰς, μάλιστα δὲ ἐν δακτυλίῳ ὠφελίμως μετὰ φύλλων πεπηγότος.

V. legit ἀσπερ, ἀσπιχον
V. caret & Oxf.
V. caret
V. ἐκφύσεις καὶ ἐκφύσεων
Al. ἐκφερόμενα ἀπὸ τῶν γωνιῶν ἐκφύσεις μεγάλας.
Ald. φύλλα λεπτὰ
Ald addit in nothis, ἐκφερόμενα ἀπὸ τῶν γωνιῶν
V. κρημνὸν
V. addit, μέλαιναν καὶ
V. ἐκφυμένη, nullo discrimine

Apud aliquos secundæ generis.

De Holostio. Cap. XI.

Περὶ Ὁλεστίου. Κεφ. ια.

HOLOSTIVM herba est pusilla, tribus ferè quatuórve digitis sese supra terram attollens, foliis viticulísque coronopodi aut gramini proximis, gustu astringẽtibus, radice prætenui vsque in capillamenti speciem, alba, fibrosa, longitudine quatuor digitorũ. Nascitur in collibus terrenis. Carnes & hæc herba cogit atque conglutinat, dum coquuntur addita, & ad rupta in vino propinatur.

ΟΛΕΣΤΙΟΝ πόα ὀλίγη μικρά, ἐκφυῆς, ὡς πεῖσαι δακτύλων ἢ τεσσάρων, φύλλα δὲ ἔχει καὶ κλήματα κορωνόποδι πλησίαζοντα, ἢ ἀγρώστῃ, συμπεπλεγμένα· ῥίζαν δὲ σφόδρα λεπτὴν ὡς τρίχα, λευκὴν· ὧν εἶδος, μῆκος δακτύλων τεσσάρων· φύεται ἐν γηλόφοις. Δυνάται δὲ καὶ αὐτὴ κρέα συνάγειν στενοχωρίᾳ, καὶ πρὸς ῥήγματα σὺν οἴνῳ πολίζειν.

V. quidam ad oram γραείῳ.

Marc. suspicatur addendum καὶ σπόρμα τὸ Ἀλεξανδρικὸν

De Stœbe. Cap. XII.

Περὶ Στοιβῆς. Κεφ. ιβ'.

STOEBE vulgaris est notitiæ. Semen & folia astringũt: quapropter eorũ decoctũ dysentericis infunditur:

ΣΤΟΙΒΗ γνώριμος· ἧς ὁ καρπὸς ἕ τὰ φύλλα στύφει· ὅθεν ἡ δυσεντερικοῖς τὸ ἀφέψημα αὐτῶν ἐπιβάλλεται ἡ καὶ εἰς

Sic Ald in nothis. At Par. caret.

ὦτα πυρῤῥοούντων· καταπλασθέντα δὲ τὰ φύλλα ὠφελεῖ σύγχυσιν ὀφθαλμῶν τῶν ἐκ πληγῆς, καὶ αἱμορῤαγίαν ἴσχει.

A auribus quoque purulentis inſtillatur. Folia verò impoſita oculis ictu cruentatis proſunt, & erumpentis ſanguinis impetus cohibent.

Περὶ Κλυμένου. Κεφ. ιγ'.

De Clymeno. Cap. XIII.

ΚΛΥΜΕΝΟΝ καυλὸν ἀνίησι τετράγωνον, ὅμοιον τοῦ τῦ κυάμου· φύλλα δὲ παρὸμοια τὰ τοῦ ἀρνογλώσσου. θυλάκια δὲ ἔχει ὅπου τὸν καυλὸν εἰς ἄλληλα νεύοντα, ἐοικότα ἴριδι καὶ πολύποδος πλεκτοῖς. ἄριστον δὲ τὸ ὀρεινόν. Χυλίζεται δὲ ὅλον σὺν τῇ ῥίζῃ. πίνεται δὲ ὁ χυλὸς πρὸς αἵματος ἀναγωγὴν κυάθους κὴ χειλιακοὺς, καὶ ῥοῦν ἐρυθρὸν, σύφωνα καὶ ψύχων. ἐπέχει δὲ καὶ τὰς ἐκ μυκτήρων αἱμορῤαγίας. τὰ δὲ φύλλα λεῖα, ἢ τὰ θυλάκια τῆς ποτῶτιδος ἐπιπλήσματα, μίσγει τοῖς ἐπουλωτικοῖς ἐργεῖ.

B habet ſupra caulem ita diſpoſitos, vt alter in alterum propédeat, velut in iride ac polyporum cirris. Probatiſſimum eſt montanum. E fruticetoto cum radice ſuccus exprimitur, qui ad ſanguinis reiectionem in potu efficax eſt, itémque ad cœliacorũ profluuia, rubẽtémq; fluorem muliebrem: quippe qui aſtringat ſimul atque refrigeret. Sanguinem quoque naribus erumpentem ſupprimit. Folia trita aut folliculi, ſi vulneribus recentibus imponantur, ea ita efficaciter ſanãt, vt etiam ad cicatricem perducant.

C

Περὶ Περικλυμένου. Κεφ. ιδ'.

De Periclymeno. Cap. XIIII.

ΠΕΡΙΚΛΥΜΕΝΟΝ θαμνίσκος ἐστὶν ἁπλοῦς, ἔχων ἐκ διαστημάτων φυλλάρια τετράφυλλα αὐτὸν, ὑποπόλιον, χλοερὸν, καὶ περὶ τὰ φύλλα ἐκβλαστήσεις· ἐφ' ὧν ὁ καρπὸς χλοερῷ περιπλήσιος· αὐτὸς λευκὸν, κυάμῳ ἐμφερές, ὑποστρογγύλον, οἱονεὶ ὀπτημένον τοῦ φύλλου· καρπὸν σκληρὸν καὶ δυσπέπαστον· ῥίζαν παχεῖαν, στρογγύλην. φύεται ἐν δρυμοῖς καὶ φραγμοῖς. περιελίσσεται δὲ τοῖς πλησιάζουσι θάμνοις. τούτου ὁ καρπὸς πεπανθεὶς συλλεχεὶς καὶ ξηρανθεὶς ἐν σκιᾷ, πίνεται μεθ' οἴνου ⊀ ά. ὀλκὴν ὅτι ἡμέρας μ'. καὶ σπληνῶν τήκει, καὶ κόπον λύει, καὶ ὀρθόπνοιαν ὠφελεῖ καὶ λυγμόν· οὖρα δὲ ἄγει ἀπὸ τῆς ἕκτης ἡμέρας αἱματώδη. ἔστι δὲ καὶ ἀκυτόκιον. τὸν αὐτὸν δὲ καὶ τὰ φύλλα δυνάμιν ἔχει ἡμέρας λζ'. πολύποτα, καὶ ἀγόνους ἰσορρέπει ποιεῖ· ἀλειφόμενα δὲ μετ' ἐλαίου ὅτι τῆς τεσσαρακοντάδος, τὰ φρικώδη παραιτεῖται.

D PERICLYMENON frutex eſt exiguus ac ſimplex, habens ex interuallis foliola caulem amplectentia, ſubcandida, hederacea, ac inter ea naſcentia germina, in quibus ſemen hederæ: florem candidum ceu fabæ, aliquantum rotundum & quaſi in folium procumbentem: ſemen durum & quod difficilè euellatur: radicem craſſam ac rotundam. Naſcitur in aruis ac ſepibus: conuoluit verò ſe propinquis fruticibus. Semen poſtquam ematuruit collectum & in vmbra ſiccatum, ſi drachmæ põdere ex vino bibatur quadragenis diebus, lienem abſumit, laſſitudinem diſcutit, & orthopnœæ atque ſingultui prodeſt: ſed vrinas ciet ſtatim à ſexto die cruentas. Idem partum quoque accelerat. Sed & folia iiſdem ſunt prædita viribus, ac tricenis ſeptenis diebus epota ſterilitatem in viris facere produntur. Eadem ſi ex oleo perungantur, febrium circuitibus redeuntium horrores abigunt.

E

F

Περὶ Τριβόλου. Κεφ. ιε.

De Tribulo. Cap. XV.

ΤΡΙΒΟΛΟΣ ὁ μὲν χερσαῖος αἱθράχνῃ τὰ φύλλα ἔοικε, λεπτότερα δὲ, καὶ τὰ κλήματα μακρὰ, κατὰ γῆς ἐρπόμενα. ὁ

TRIBVLVS terreſtris foliis eſt portulacæ, at tenuioribus: viticulis verò longis in terra ſtratis, &

ſpinis ſecundũ ipſas acerbis ac præduris: iuxta amnes & domorum areas naſcitur. Eſt & alter aquaticus, in fluminibus naſcens, qui quidem comam ſupra aquas attollit, aculeos verò condit & ipſis aquis occulit: foliis latis è pediculo longo dependentibus: caule parte ſumma quàm ima craſſiore: adſunt & ei adnata quędam capillamenta ſpicacea: fructus verò durus eſt, vti & alterius antè memorati. Ambo aſtringentis refrigerantiſque ſunt naturæ: ideò contra inflammationes omnes cataplaſmate vtiles. Oris autem vlcuſcula, tonſillas, itémque putredines in ore ac gingiuarũ vitia ſanant. Ex ijs etiam ſuccus ad oculorũ medicinas exprimitur. Semen vtriuſq; dum recens bibitur, calculoſis adiumentum affert: ſed priuatim quod è tribulo terreſtri eruitur, drachmæ põdere potum impoſitúmve, commorſos à vipera priſtinæ ſanitati reſtituit, & contra venena etiamnum vtiliter ex vino bibitur. Sed & eius decoctum ſparſum pulices necat. Cæterùm Thraces qui ad Strymona amnem habitant, virenti herba equos ſaginant, nucleum verò dulcem & alendo idoneum ad panificia accommodant, eóque vice panis vtuntur.

A τοὺς αὐλοὺς ἄχρηστα τρυφταί, σκληραί. φύεται δὲ τοῖς ἐ τοταμοῖς καὶ οἰκοπέδοις. Ἔστι δέ τις καὶ ἔνυδρος, πρὸς τοῖς ποταμοῖς φυόμενος, ὑπερέχων τὴν κόμην, πλὴν ὑπ' ἄκανθαν κρύπτων· φύλλα πλατέα, μίσχον ἔχοντα μακρόν. καυλὸς δὲ ἐξ ἄκρου παχύς, μᾶλλον τῆς ῥιζοτάτης. ῥιζοῦται δὲ V addit εἰς τοπὸ

B ἡ τριχώδη πρὸς ἀποπτυόμενα χυοειδῆ· καρπὸς σκληρὸς ὡς καὶ ὁ πατήρου. Ἀμφότεροι δὲ τρυφοῦσι, ψύχουσιν· εἰσί τε πάσης φλεγμονῆς καταπλάσματα. σὺν μέλιτι δὲ ἄφθας καὶ παιδοδομία, καὶ [τὰ V. carn. ὀ τόματι ἀσπεδόνας, καὶ οὖλα θεραπεύουσι· χυλίζον] δὲ καὶ εἰς τὰ ὀφθαλ-

C μικά. ὁ δὲ καρπὸς αὐτῶν, χλωρὸς λιθιῶντας πινόμενος ὠφελεῖ. τῶν δὲ χερσαίου ὅσον < ά. πινομένη καὶ καταπλασσομένη, τοὺς ἐχιοδήκτους ἀποκαθίστησιν· ἁρμόζει καὶ θανασίμοις μετ' οἴνου πινόμενος. κτείνει δὲ καὶ φύλλας τὸ ἀπόζεμα αὐτῶν ῥαιθῆν. ⓓ δὲ τρεῖς † Σρυμόνα ποταμὸν Θρᾷκες,

D πλὴν μόνοι πάντες χλωροὶ ἱππόβοσκοι εἰσι. ⓦ δὲ καρπὸν γλυκὺν ὄντα καὶ εὐφιμον σιτοποιοῦνται, χρώμενοι αὐτῷ ἀντὶ ἄρτου.

De Limonio ſeu beta ſylueſtri. Cap. XVI.

LIMONIVM, alijs neuroïdes dictum, folia habet betæ, verum tenuiora & minora, decem aut plura: caulem tenuem, rectum, liliaceo æqualem, rubro ſemine refertum, quod guſtu aſtringit. Semé tritum, & ex vino acetabuli menſura potũ, dyſentericis cœliaciſque prodeſt, ac rubentem fœminarum fluorem cohibet. Naſcitur in pratis & paluſtribus locis.

Περὶ Λιμωνίδος. Κεφ. ις'.

ΛΕΙΜΩΝΙΟΝ, ⓓ δέ, νευρεωδές. V. πετροῦς ἀπόκλινον τὰ μὲν φύλλα ἔχει ὅμοια σεύτλῳ,

E λεπτότερα δὲ καὶ μικρότερα, δίκην ἢ πλείω· καυλὸν λεπτὸν, ὄρθιον, ἴσον ὡς ἀφ' κρίνου, γέμοντα καρποῦ ἐρυθροῦ, σύφοντος πλὴν γλύκους. Δύναται δὲ ὁ καρπὸς λεῖος, σὺν οἴνῳ πότοις ἐξυβάφου πλήθος, δυσεντερικοῖς καὶ κοιλιακοῖς ὠφελεῖν· ῥοῦν τε γυναικεῖον ἐρυθρὸν ἐ-

F φιστάνει. φύεται δὲ ἐν λειμῶσι καὶ ἑλώδεσι τόποις.

De Lagopode. Cap. XVII.

LAGOPVS herba ſiſtit aluum è vino pota, aut in febri, ex aqua. Eadem ad inguinum inflammationem adalligatur. Naſcitur autem in ſegetum areis.

Περὶ Λαγώποδος. Κεφ. ιζ'.

ΛΑΓΩΠΟΥΣ δύναμιν ἔχει σταλτικὴν κοιλίας, πινόμενος μετ' οἴνου· ἐπὶ δὲ τὴν πυρετοῦντων, μὴ ὕδατος ποτεόντων· δὲ καὶ πρὸς φλεγμονὴν ἐκκοπτόντων·

G φύεται δὲ ἐν θερμοῖς. V. εἰ δὲ καὶ πρὸς αἵματος, γυναικείου Ed.

De Medio, Cap. XVIII.

MEDIVM in opacis & petroſis locis naſcitur: folia habet ſeri-

Περὶ Μηδίου. Κεφ. ιη'.

ΜΗΔΙΟΝ φύεται ἐν παλιοκίοις τόποις καὶ πλησίον ἔχει φύλλα ὅμοια σιερι- Vulg. exempl. δεῖ

Quid in marg. ἡ πρωτὴ

δὲ καυλὸς δίπηχυς, αὐθη πορφυροειδῆ, μεγάλα τε καὶ στρογγύλα καρπὸν μικρὸν, ὁμοιοῦν κνίδῃ· ῥίζα σπαθαμιαία, βακτηρίας ἔχουσα πάχος, στρυφνὴ γευσάμενον. Ἡ πιεσθεῖσα λεῖα ἐκλειχομένη σὺν μέλιτι ἐφ' ἡμέρας πρωΐ τὴν ἔμμηνον ἔκκριση. Ὁ δὲ σπέρμα σὺν οἴνῳ πότιμον, ἄγει ἔμμηνα.

Περὶ Ἐπιμηδίου. Κεφ. ιθ'.

ΕΠΙΜΗΔΙΟΝ καυλός ἐστιν ὑπόμεγας, κισσῷ πλατυφύλλοις φύλλα ἔχων ὅσον ἐπὶ ιβ'· οὔτε δὲ καρπὸν οὔτε ἄνθη φέρει· ῥίζαι δὲ λεπταί, μέλαιναι, βαρύοσμοι, γλυκάζουσαι μόραι· φύεται ἐν τόποις ὑδρηλοῖς. Ταύτης τὰ φύλλα λεῖα μετ' ἐλαίου, καταπλασθέντα μαστοῖς εἰς ὃ μὴ αὔξειν. ἀποκόπτει τε τὴν ῥίζαν, καὶ τὰ φύλλα λεῖα πινόμενα ἐν οἴνῳ μετὰ τὴν καθαρσιν < ε'. πλῆθος ὀβολοῦ ἡμέρας ε'. ἀσυλλήπτους τηρεῖ.

V. mutgo. μιλάδι παραπλήσιον φύλλα ἔχον ὡσεὶ ι̅β̅.

Περὶ Ξιφίου. Κεφ. κ'.

ΞΙΦΙΟΝ, ὃ δέ, φάσγανον, οἱ δέ, μαχαιρώνιον καλοῦσι, ἀπὸ τοῦ φύλλου σχῆμα· ἔοικε γὰρ ἴριδι, ἔλαττον μέντοι καὶ στενώτερον, καὶ ἄκρως ὡς μαχαίριον, ἰνώδες. καυλὸν δὲ ἀνίησι πηχυαῖον, ἐφ' οὗ ἄνθη πορφυρᾶ στιχηδὸν ἀπ' ἀλλήλων διεστῶτα· καρπὸν δὲ στρογγύλον· ῥίζας β'. τὴν μὲν μίαν ὑπὸ τῆς ἑτέρας καθημένην, ὡς ἐπὶ βολβίᾳ μικρᾷ· ζύπτων ἡ μὲν κάτω, ἰσχνὴ ὄζει, ἡ δὲ ἄνωθεν, ἀδροτέρα. φύεται δὲ μάλιστα ἐν ἀρούραις. Δώσεται δὲ ἡ ἄνωθεν ῥίζα καταπλασσομένη μετ' οἴνου καὶ λιβανωτοῦ, ἀχίδας καὶ σκόλοπας ὑπεκπαθεῖν· σὺν ἀλεύρῳ δὲ ἀείνῳ καὶ ὑδρομέλιτι, διαφορᾷ φύγιλλα· ὄζει ταῖς τοιαύταις ἐμπλάστροις μίγνυται. ἀγεῖ δὲ καταμήνια πεσσηθεῖσα. φασὶ δὲ καὶ ἀφροδίσια παρορμᾶν πινομένην ἀνωτέρω ῥίζαν σὺν οἴνῳ πολιτικῷ· πινομένη δὲ κατωτέρω, ἀγόνους ποιεῖ. ὀντερικλικοῖς τε παιδίοις ὠφελίμως δίδοται πινομένη ῥίζα ἐν πόμῳ σὺν ὕδατι.

Ἐπιμηδίου Ἀλ. ἐπιμήδιον

Ξιφίου Ἀλ. ξιφίον.

Ὀνθαλλὶς ἐνίοτε μυρσίνη

Lectio legit in v. cod. μικρᾷ καὶ ἰσχνῇ

Vulg. διαπλάσσει Al. σπᾶν

Mirantur docti legendum suspicatur.

Περὶ Σπαργανίου. Κεφ. κα'.

ΣΠΑΡΓΑΝΙΟΝ φύλλα ἔχει ὁμοιότατα ξιφιδίῳ, στενώτερα δὲ καὶ ὀρθοκλινέστερα· ἐπ' ἄκρου δὲ τοῦ καυλοῦ ὥσπερ σφαγεῖα, ἐν οἷς ὁ καρπός· δίδοται δὲ

dis; caulem tricubitalem, flores purpureos, grandes ac rotundos, semẽ minutum, cnico simile: radicem dodrantalem, baculi crassitudine, gustu acerbo. Hæc arida trita decoctáque cum melle per aliquot dies in eclegmate sumpta, rubentẽ fluorem sistit. Semen verò in vino potũ menstrua pellit.

De Epimedio. Cap. XIX.

EPIMEDIVM caulis est nõ magnus, hederæ foliis denis aut duodenis, neque semen, neque flores proferens: radicibus tenuibus, nigris, graui odore, gustu fatuo seu insipido. Nascitur in aquosis. Folia ex oleo trita & mammis adhibita, eas ita cohibent vt ne augescant. Radix spem partus adimit. Folia quoq; trita & post menstruam purgationem quinis drachmis in vino pota quinque diebus, præstant mulieribus ne concipiant.

De Xiphio. Cap. XX.

XIPHION alij phasganon, alij machæronion à folij figura vocant. Est enim iridi simile, at minus & angustius, & gladioli modo mucronatum, neruosum. Caulem verò promit cubitalem, in quo purpurei flores certis æqualibúsque spatijs inter se distantes: semen rotundum, radices geminas, quarum vna alteri insidet, pusillorum bulborum figura. Ex his inferior gracilis est, superna pleniot & vberiot. In aruis potissimùm nascitur. Superior radix cum vino & thure impositi spicula & aculeos è corpore extrahit: cum farina autem loliacea & aqua mulsa, panos discutit: quamobrem eiuscemodi vi præditis emplastris inseri solet. Ciet & menses subdita in pesso. Aiunt & superiorem radicem potui datam in vino veneris appetentiam facere, inferiorem verò, sterilitatem inducere: superiorem itidem radicem infantibus enterocelicis vtiliter ex aqua propinari.

De Sparganio. Cap. XXI.

SPARGANIVM folia habet gladioli, sed arctiora & inclinatiora: ac in summo caule veluti pilulas, in quibus semen. Aduersus venenata-

rum

rum beſtiarum morſus & radix & ſemen ex vino potui dantur.

A ῥίζα καὶ ὁ καρπὸς σὺν οἴνῳ θηριοδήκτοις.

De Xyride. Cap. XXII.

Περὶ Ξυρίδος. Κεφ. κβ'.

XYRIS folia habet iridis, at latiora, & in cacumine acuminata: quorum è medio caulis erumpit cubitalis, ſatis craſſus, in quo ſiliquæ ſunt triangulares, & ſuper ipſis flos purpureus, medio puniceo: ſemen in folliculis ſimile fabis, rotundum, rubens & acre: radix crebris cincta geniculis, longa ac rufa. Ea contra capitis vulnera fractáq; efficax eſt: aculeos & teli genus omne citra moleſtiam extrahit, adiecta floris æris tertia parte, itémque radicis centaurij parte quinta, & melle ſufficienti. Impoſita quoque ex aceto, œdemata inflammationéſque ſanat. Bibitur & ex paſſo radix contuſa, ad conuulſa, rupta, iſchiadas, ſtranguriam & alui profluuia. Semen verò tribus obolis in vino potum, potentiſſimè vrinam ciet, & cum aceto, lienem abſumit.

Ξυρὶς, τὰ μὲν φύλλα ἔχει ἴριδι ὅμοια, πλατύτερα δὲ καὶ ἐξ ἄκρου ὀξέα· καυλὸν δὲ ἐκ μέσου τοῦ φύλλου πυχαῖον, ἡμιπῆχυ, ἐφ' οὗ λοβοὶ τέλγονοι· καὶ ἐπ' αὐτῶν ἄνθος πορφυροῦν· ὁ δὲ ἐν μέσῳ φοινικοῦν· καρπὸς δὲ ἐν θυλακίοις κυάμοις ὁμοίοις, στρογγύλος, ἐρυθρὸς, δριμὺς· ῥίζα δὲ πολυγόνατος, μακρὰ, πυρρὰ, πεπυῦσα πρὸς τὰ ἐν κεφαλῇ τραύματα ἐκ καλάμης πᾶν ἀγαγεῖν δύναται· στόλοπας, καὶ πᾶν βέλος ἀπτεται ἄπονως, μιᾶς ὀπτίας, μίγματος αὐτῇ χαλκοῦ ἄνθους μέρος τρίτον, καὶ κεντρωνίτου ῥίζης μέρος ε'. ἐκ μέλιτος δὲ αὐτάρκως. θεραπεύει δὲ καὶ οἰδήματα καὶ φλέγμονας καταπλασσομένη μετ' ὄξους· πίνεται δὲ καὶ πρὸς ἀποστήματα, ῥῆγματα, ἰσχιάδας τε ἐκ στραγγουρίας, καὶ διαῤῥοίας· ἡ ῥίζα μετὰ γλυκέος πιθανωμένη· ὁ δὲ καρπὸς ἁρπικώτατος ὅσον τεσσάρων πρὸς ἓξ ἐν οἴνῳ πινόμενος.

A Xyris folia habet iridis, at latiora, & in cacumine acuminata: quorum è medio caulis erumpit cubitalis, ſatis craſſus, in quo ſiliquæ ſunt triangulares, & ſuper ipſis flos purpureus, medio puniceo: ſemen B in follicuſis ſimile fabis, rotundum, rubens & acre: radix crebris cincta geniculis, longa ac rufa. Ea contra capitis vulnera fractáq; efficax eſt: aculeos & teli genus omne citra moleſtiam extrahit, adiecta floris æris tertia parte, itémque radicis centaurij parte quinta, & melle ſufficienti. Impoſita quoque ex aceto, C œdemata inflammationéſque ſanat. Bibitur & ex paſſo radix contuſa, ad conuulſa, rupta, iſchiadas, ſtranguriam & alui profluuia. Semen verò tribus obolis in vino potum, potentiſſimè vrinam ciet, & cum aceto, lienem abſumit.

Orbiculatus

Orbiculatæ Petra mixtæ legendum ſuſpicatur.

Addidimus ex Lac. τὸ αὐτάρκως, quod in vulg. exempl. deſiderabatur.

De Anchuſa. Cap. XXIII.

Περὶ Ἀγχούσης. Κεφ. κγ'.

ANCHVSA, quam nonnulli calycem, alij onocleam appellant, folia habet lactucæ quæ folio viſitur acuto proxima, hirſuta, aſpera, nigra, numeroſa, vndecunque ab radice terræ velut affixa, ſpinoſa. Radix illi eſt digitali craſſitudine, colore quodammodo ſanguineo: quæ æſtate vel eo agnoſcitur, quòd manus inficiat: læto ſolo prouenit. Radici vis aſtrictoria, ad ambuſta veteráque vlcera efficax, ſi in oleo addita cera decoquatur. Eryſipelatis cum polenta impoſita medetur: itémque vitiligini & lepris, ex aceto illita. Vuluæ quoque ſubdita, partus extrahit. Datur & eius decoctum bile ſuffuſis, nephriticis ac ſplenicis, ſi febris ſit, ex aqua mulſa. Folia verò ſiſtunt aluum in vino pota. Vtuntur & vnguentarij radice ad vnguentorum ſpiſſamenta.

Ἀγχοῦσα, ὧν ἔνιοι κέλυκα, οἱ δὲ ὀνοκλείαν καλοῦσι· τὰ μὲν φύλλα ἔχει θριδακὶ τῇ ὀξυφύλλῳ παραπλήσια, δασέα, τραχέα, μέλανα, πολλὰ, πάντοθεν τῶν ῥίζης πρὸς πεπλασμένα τῇ γῇ, ἀκανθώδη· ἡ δὲ ῥίζα δακτύλου τὸ πάχος, τὴν χρόαν αἱματώδης, ὑφ' ἧς καὶ μαίνεται· δυνατὴ δὲ καὶ βάπτουσα τὰς χεῖρας. φύεται δὲ τοῖς ἀγκίστροις πόποις. Ἔστι δὲ ἡ ῥίζα συμπλοκὴν ποιοῦσα πρὸς καταπλάσματα ἐκ παλαιᾶς ἕλκη, ἐναφεψομένη κηρῷ καὶ ἐλαίῳ· ἐρυσιπέλατα δὲ σὺν ἀλφίτῳ καταπλασθεῖσα θεραπεύει· καὶ φύσας ἐκ λέπρας σὺν ὄξει καταπλασσομένη. προσπεμμένη δὲ ἔμβρυα καταιτᾷ. τὸ δὲ ἀφέψημα αὐτῆς δίδοται ἐκ ἰκτερικοῖς, νεφριτικοῖς, σπληνικοῖς, πυρίασιν, μετὰ μελικράτου· τὰ δὲ φύλλα κοιλίαν ἵστησι μᾶλλον οἶνος πινόμενα. χρῶνται δὲ καὶ οἱ μυρεψοὶ τῇ ῥίζῃ πρὸς τὰς σύψεις τῶν μύρων.

ANCHVSA, quam nonnulli calycem, alij onocleam appellant, folia habet lactucæ quæ folio viſitur acuto proxima, hirſuta, aſpera, nigra, numeroſa, vndecunque ab radice terræ velut affixa, ſpinoſa. Radix illi eſt digitali craſſitudine, colore quodammodo ſanguineo: quæ æſtate vel eo agnoſcitur, quòd manus inficiat: læto ſolo prouenit. Radici vis aſtrictoria, ad ambuſta veteráque vlcera efficax, ſi in oleo addita cera decoquatur. Eryſipelatis cum polenta impoſita medetur: itémque vitiligini & lepris, ex aceto illita. Vuluæ quoque ſubdita, partus extrahit. Datur & eius decoctum bile ſuffuſis, nephriticis ac ſplenicis, ſi febris ſit, ex aqua mulſa. Folia verò ſiſtunt aluum in vino pota. Vtuntur & vnguentarij radice ad vnguentorum ſpiſſamenta.

V. mango φύλλα καὶ ἔχουσι ἴριδι τὰ μὲν φύλλα ὁμοίως· τὰ δὲ ἄνθη ὑπόλευκα· ἡ ῥίζα ὑπόξανθος.

V. μαίνεται

V addit, αὐτὸν δὲ πυρετοί.

De Anchuſa altera. Cap. XXIIII.

Περὶ Ἀγχούσης ἑτέρας. Κεφ. κδ'.

Anchuſa altera, quam aliqui alcibiadion ſeu onochiles vocauere, à priore diſtat, quòd minora habeat

Ἀγχοῦσα ἑτέρα, ὧν ἔνιοι ἀλκιβιάδιον, ἢ ὀνοχειλὲς καλέουσι, αὕτη διαφέρει τῆς πρώτης, τῷ μικρότερα ἔχειν τὰ

φύλλα, πραχία δὲ ὁμοίως· καὶ τὰ κλαδία λεπτά, ἐφ' ὧν αὐξος πορφυρίζοντος· ῥίζας δὲ ἐρυθράς, βραχείας, ὡδὶ ⊛ πυρρομιτὴν ἐχούσας· ὃ αἱματώδης· φύεται δὲ ἐν ἀμμώδεσι τόποις. Δυνάμεις δὲ αὐτῆς καὶ τῶν φύλλων, θηριοδηκτοις βοηθεῖ, μάλιστα δὲ ἐχιοδήκτοις, ἐαθιόμβια, καὶ πινόμβια, καὶ περιαπόμβια· κἂν μαινοσάμβους τις εἰς τὸ σῶμα τοῦ θηρίου ἀποπτύσῃ, ἀποκτενῇ αὐτό.

Orib. ἐρυσιπέλατα

V. ἀγρία ἀγριωτέρα

A folia, quanquam ſimili modo aſpera, & ramulos tenues, in quibus flos purpureus in puniceum vergens: radices autem rubras, prælongas, quæ meſſibus ſanguineo ſucco turgent. In ſabuloſis naſcitur. Tum ipſa radix, tum & folia contra venenatarum beſtiarum, maximéque viperarum, morſus efficaciter auxiliantur, ſiue cibo, ſiue potu, ſiue etiam amuleto. Quin & ſi quis ijs commanducatis in venenatæ beſtiæ os expuerit, eam enecabit.

Περὶ Ετέρας Ἀγχούσης. Κεφ. κέ.

Ἔστι δὲ καὶ ἄλλη ἐμφερὴς ταύτῃ, ἐλάττω δὲ καρπὸν ἔχουσα φοινικοῦν. οὗ ἐάν τις μαινοσάμβους ἀποπτύσῃ εἰς τὸ σῶμα τῆς ἐρπετοῦ, ἀποκτενεῖ. ἡ δὲ ῥίζα μετ' ὑσσώπου καὶ καρδάμου πολεῖσα ὀξυβάφου σκῦφος, πλατείαν ἕλμινθα ἐκβιάσεται.

B

C

Περὶ Λυκόψεως. Κεφ. κϛ'.

Λύκοψις, ἣν δὲ, καὶ ταύτην ἄγχουσάν τινες καλέουσιν, τὰ μὲν φύλλα ἔχει ὁμοια θριδακι, μακρότερα δὲ καὶ παχύτερα, καὶ πραχία καὶ πλατύτερα, πεπλωκότα περὶ τὴν τοῦ ῥίζης κεφαλήν· καυλὸν ἀφιησι μακρὸν, ὀρθὸν, πραχύν, τραχυφύλλους ἔχοντα πολλὰς, πτυχαίας, πραχείας· καὶ ἐπ' αὐταῖς αὖθι μικρὰ, πορφυρίζοντα· ῥίζα δὲ ἐρυθρὰ, σπιλικὴ· φύεται ἐν πεδίοις. καταπλασθεῖσα δὲ μετ' ἐλαίου ἡ ῥίζα, τραύματα ἰᾶται· μετὰ ὑλφίτου δὲ, ἐρυσιπέλατα· λεῖα δὲ σὺν ἀλφομίτῳ μετ' ἐλαίου, ἱδρῶτας κινεῖ.

Vulg. exempl. πραχύτερα καὶ πραχία

V. πραχύ

D

E

Περὶ Ἐχίου. Κεφ. κζ'.

Ἔχιον, ἣν δὲ, Σκύθαι, οἱ δὲ, *ἀλκιβιάδιον, τὰ μὲν φύλλα ἔχει πορφυρίζοντα, πραχία, ὑπολεπτα, πρὸς τὰ τῆς ἀγχούσης, ἤπλοια δὲ ἐν λιπαρᾷ, ἀχαῦλα λεπτὰ ὑπερείσματα, καὶ ἃ καὶ δασυνεῖ τὰ φύλλα· καυλία λεπτὰ, πολλὰ· ἔκφυσιν δὲ φυλλάρια λεπτὰ παρούμενα, μίλανα, ἐλαφρότατα ἐπὶ πρὸς λεῖον τὸ ἐπ' ἄκρῳ τοῦ καυλοῦ. τὰ δὲ αὖθι πρὸ τῶν φύλλων πορφυροειδῆ, ἐν οἷς ἐστι καὶ ὁ καρπὸς κεφαλὴν ἔχος ὄμμος· ῥίζα ἐν λεπτοτέρᾳ δακτύλου, ὑπομέλαινα. ἡ δὲ μίσυ τινὲς δηλοῦσιν ὑπὸ

Sunt qui addunt hoc loco, ἰσάριθμα. V. delet vſque ad καυλία

V. addit, ἀνάπλεκτα, ἀνάπλεκτα τοῖς φύλλοις

V. ἄκρα τῶν καυλῶν μίλανα

F

G

folia, quanquam ſimili modo aſpera, & ramulos tenues, in quibus flos purpureus in puniceum vergens: radices autem rubras, prælongas, quæ meſſibus ſanguineo ſucco turgent. In ſabuloſis naſcitur. Tum ipſa radix, tum & folia contra venenatarum beſtiarum, maximéque viperarum, morſus efficaciter auxiliantur, ſiue cibo, ſiue potu, ſiue etiam amuleto. Quin & ſi quis ijs commanducatis in venenatæ beſtiæ os expuerit, eam enecabit.

De Anchuſa tertia. Cap. XXV.

Eſt & alia huic ſimilis, at minore ſemine, eóque puniceo, quo commanducato ſi in ſerpentis os inſpuatur, ea morietur. Radix autem acetabuli menſura cum hyſſopo & naſturtio pota, latas ventris tineas pellit.

De Lycopſi. Cap. XXVI.

Lycopsis, quæ & anchuſa à nonnullis vocata eſt, folijs eſt latucæ, at longioribus, craſſioribus, latioribúſque, aſperis & circa radicis caput ad terram deciduis: caule longo, recto, ſcabro, adnatis multis cubitalibus & aſperis, in quibus flores parui, purpuraſcentes: radix rubra eſt & aſtringens. Naſcitur in campeſtribus. Radix cum oleo impoſita, vulneribus medetur, & cum polenta, eryſipelatis illinitur. Trita verò ſi ex oleo perungatur, ſudores mouet.

De Echio. Cap. XXVII.

Echion aliqui dorida, alij alcibiadion appellant: folia habet oblonga, aſpera, aliquantum tenuia, anchuſæ proxima, at minora & pinguia, tenui ſpinoſa lanugine veſtita: cauliculos graciles, numeroſos, vtrinque verò minuta foliola expaſa pinnatáq;, nigra, ac minora quidē proportione quò ſummo cauli propiora ſunt: flores autē ſecundum folia purpureos, in quibus & ſemē viperæ capitulo ſimile. Radix eſt digito tenuior & ſubnigra: quę quidē nō modò demorſis à

serpẽtibus in vino pota auxiliatur, sed & eos à quibus præbibita fuerit à serpentibus feriri minimè patitur. Folia & semen idem ipsum præstant. Sed & radix lumborum dolorem sedat, lactísq; vbertatem facit, in vino aut sorbitione sumpta.

De Ocimoide, siue Ocimastro.

Cap. XXVIII.

OCIMOIDES, seu, vt alij, philetærium, folia fert ocimi, & ramos dodrantales, hirsutos, siliquas hyoscyamo similes, semine nigro, ceu melanthij, prægnantes. Vim hanc habet semen in vino potum, vt viperarum cæterarúmq; serpentium morsibus medeatur. Datur & ischiadicis cum myrrha & pipere. Cæterùm radice nititur tenui & superuacua.

De Erino. Cap. XXIX.

ERINVS apud flumina fonteésq; nascitur, foliis ocimi, sed minoribus & parte superna diuisis, surculis quinis seníve dodrãtalibus, floribus candidis, semine nigro, paruo & acerbo: folia & caulis liquore multo manant. Semen drachmis duabus mistũ cum mellis drachmis quatuor, oculorum fluxiones illitu cohibet. At succus aurium dolorem sedat, cum sulphure igné haud experto ac nitro instillatus.

De Gramine. Cap. XXX.

GRÀMEN viticulas habet geniculatas per terram repentes, quę à suis articulis radices spargũt dulces, internodijs distinctas: folia acuminata, dura, lata, ceu arũdinis paruæ, quibus boues & iumẽta pascuntur. Huius trita radix & imposita, vulnera glutinat. Ipsius autẽ decoctũ epotũ, efficax est aduersus tormina, vrinę difficultatem ac vesicę vlcera, & calculos frangit.

al. & vesicæ calculosa vtrumuis cum minuit.

De Gramine arundinaceo.

Cap. XXXI.

Arundinaceũ gramẽ priore maius est omni ex parte. Iumenta porrò in pabulo sumptum necat, maximéque quod in Babylonis regione secus vias nascitur.

De Parnassio gramine.

Cap. XXXII.

Quod verò in Parnasso mõte gignitur gramẽ, densius fruticat, foliis

A ἑρπετῶν βοηθεῖ πολεῖσα μετ' οἴνου, ἀγαθὸν δὲ καὶ τοῖς ἀπὸ τῶν ἑρπετῶν δηχθεῖσι ποιεῖ. ὁμοίως δὲ καὶ τὰ φύλλα καὶ ὁ καρπός. παυεῖ δὲ καὶ ὀσφύος ἄλγημα, καὶ γάλα κατασκᾷ μετ' οἴνου ἢ ῥοφήματος ληφθέντα.

Περὶ Ὠκιμοειδοῦς. Κεφ. κη'.

ΩΚΙΜΟΕΙΔΕΣ, ὃ δή, φιλεταῖριον, B φύλλα μὲν ἔχει ὠκίμῳ ὅμοια, κλῶνας δὲ ἀπαλαιοὺς, δασεῖς· λοβοὺς δὲ τοῖς ὑοσκυάμοις ὁμοίους, πλήρεις σπέρματος μέλανος, ἐοικότας μελανθίῳ.

Δύναμιν δὲ ἔχει τὸ σπέρμα πινόμενον ἐν οἴνῳ, ἐχιοδήκτοις καὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς ἑρπετῶν δήγμασι θεραπεύειν. δίδοται δὲ καὶ ἰσχιαδικοῖς μετὰ σμύρνης καὶ πεπέρεως· ῥίζα C δὲ ὑπεστὶ λεπτὴ καὶ ἄχρηστος.

V. caret. Ald. in morbis alijs addit. V. Mauri

Περὶ Ἐρίνου. Κεφ. κθ'.

ΕΡΙΝΟΣ φύεται περὶ ποταμοὺς καὶ χειμάρρους, φύλλα ἔχει ὠκίμοις ὅμοια, μικρότερα δὲ καὶ ἐπεσταλμένα ὡς τὴν ἄνωθεν μορφὴν, χλωρία ὑπ. ἢ ς' ἀσθμαίνοντα, D αὐχμηρά· καρπὸν δ' μέλανα, μικρὸν, τρυφερὸν ὅπερ δὲ μεσοῦ ἐστιν ὁ καυλὸς καὶ τὰ πέταλα. Τούτων ὁ καρπὸς < ϛ'. πλῆθος μιγνὺς πρὸς μέλιτος ϛ' τέσσαρας, ῥύμας ὀφθαλμῶν ἐγχεόμενος ἴσχει. ὁ δὲ χυλὸς ὅταν πίνοι παυεῖ μ' ὑπὸ ἀπύρου καὶ νίτρου ὀσφὺν ζώμενος.

Tragus suspicatur legendũ μεμέλανται. Forte μέλαινα Paris. euidens mendum.

Περὶ Ἀγρώστεως. Κεφ. λ'.

E ΑΓΡΩΣΤΙΣ κλημάτια ἔχει γονατώδη ἕρπειν ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ἀπὸ τῶν κλάδων προϊέμενα ῥίζας γλυκείας, γονατώδεις· φύλλα ὀξέα, σπληνὶ, πλατέα, ὡς καλάμου μικροῦ, πέφυκε βόας καὶ κτήνη. Ταύτης ἡ ῥίζα καὶ λαπαροῖς μέλι, F θαύματα καλά. Ὃ δ' ἀφέψημα αὐτῆς πινόμενον, πρὸς τροφοὺς ποιεῖ ϵ̓ δυσουρεῖν· ἢ δὲ ἐκεῖ τὴν κόπην ἕλκη, ἢ λίθους θρύπτει.

Laetum v. cod addit, καὶ δυσεντερικοῖς.

Περὶ Καλαμαγρώστεως. Κεφ. λα'.

Καλαμάγρωστις μείζων ὄφεσι μὲν πόα τῆς ἀγρώστεως. ἔστι δὲ κλῶνας αἱμορροϊκὴ ῥωθεῖσα, ϵ̓ μάλιστα ἡ ἐν Βαβυλῶνι G τοῖς ὁδοῖς φυομένη.

Περὶ τοῦ ἐν Παρνασσῷ ἀγρώστεως. Κεφ. λϛ'.

Ἡ δὲ ἐν τῷ Παρνασσῷ γινομένη ἄγρωστις, πολυκλαδεστέρα ἐστὶ· φύλλα

δι' χιαυτῶ ὅμοια φέρῃ· αὐθος λᾶυκὸν, ὃ βῶδες· καρπὸν μικρὸν, ὃν ἄχρηστον· ῥίζας ἑ. ἢ ς'. δακτύλου πάχος, λᾶυκὰς, μαλακὰς, γλυκείας, ἰσχυρὰς. ὧν ὁ χυλὸς ἑφθεὶς σὺν οἴνῳ καὶ μέλιτι συμμέτρῳ, καὶ σμύρνης ἡμίσους μέρει, πεπέρει τε καὶ λιβανωτῷ ἀνὰ μέρος τρίτον, φάρμακόν ἐστιν ἄριστον πρὸς ὀφθαλμοὺς· ἀποτίθεται δ' ἐν χαλκῇ πυξίδι. τὸ δὲ ἀφέψημα τῶν ῥιζῶν, ποιεῖ πρὸς ἃ καὶ αὐτή. Ὃ δὲ αὐτὸ ῥόφημα ζωτικὸς ἰσχυρῶς διουρητικόν, καὶ ἐμέτων καὶ κοιλίας ῥεύσεως παλλικόν. Ἡ δὲ ἐν Κιλικίᾳ γινομένη, ὃν οἱ ἐπιχώριοι Κίνδυ καλοῦσιν, ὑγρὰ βοσκηθέντα πολλάκις, πίμπρησι τοὺς βόας.

Quidam v. cod. cestit Lacuna habet. γίνεται δὲ ἐν Κιλικίᾳ πεδίοις τισὶ, ὃν Κίνδυ καλοῦσιν ἐπιχώριοι, ὑγρὰ βοσκηθέντα πολλάκις πίμπρησι τοὺς βόας. Sic & Hermolaus legisse videtur.

V χωρὶς
Cistus hederifolia hemimorus
Hanc solam describit Byzantinus codex.
V delet.
V ἐλαιοσφάκῳ πρὸς τὸ ῥόδῳ.
V. πεπέρει
V. ἰσχύει.

Περὶ Σιδηρίτιδος. Κεφ. λγ'.

Σιδηρῖτις, ἣν ἔνιοι Ἡρακλέαν, πόα ἧς τὰ φύλλα ἔχουσα ὅμοια τραγίῳ, ἑτερομήκεστερα δὲ πρὸς τὰ τοῦ ἐλελισφάκου ἢ δρυός, μικρότερα μέν τι καὶ πραχέα· καυλοὺς δὲ ἀνίησι τετραγώνους, ἀπαλαμαίους ἢ καὶ μείζονας, οὐκ ἀηδεῖς τὴν γλῶσσαν, καὶ πως ἰσχναγωγοὺς· ἐν οἷς ἐκ ἀφεσημάτων ἀοίδυλοι περιφερεῖς ὥσπερ τραγίου, ἐν οἷς αὐτοῖς σπέρμα μέλαν· φύεται δὲ ἐν ὑποπέτροις χωρίοις.

Δύναμιν ἔχει τὰ φύλλα κολλητικὴν τραυμάτων καὶ ἀναφλεγμάνων.

V add. διὰ τὸ φύειν.

Περὶ Ἑτέρας Σιδηρίτιδος. Κεφ. λδ'.

Ἄλλη σιδηρῖτις χλωρὰς ἔχει διπήχεις, λεπτοὺς· φύλλα δὲ ὑπὸ μόχθων, μακρῶν, ὅμοια τοῖς τῆς πτερίδος, ἀκροχόδην πολλαὶ ἐκπεφύκασιν, ἐκ δὲ τῶν αἰωρουμένων μακαλλῶν, ἀποφύσεις μακρὰς, λεπτὰς, ἐπ' ἄκρου σφαιροειδεῖς, καθάπερ ἐχούσας πραχεῖαν, ἐν οἷς σπέρμα ὅμοιον σεύτλῳ, στρογγυλώτερον ἢ ἐν σκληρότερον. Δύναμις ἔστι καὶ ταύτης ἡ τῶν φύλλων βαμματική.

Περὶ Ἑτέρας Σιδηρίτιδος. Κεφ. λέ.

Ἔτι καὶ ἑτέρα ἡ λεγομένη Σιδηρῖτις, ἣν καὶ αὐτὴν Κρατεύας Ἡράκλεαν καλεῖ, φυομένην ἐν τοίχοις καὶ ἀμπελῶσι, ἔχουσα φύλλα πολλὰ ἀπὸ μιᾶς ῥίζης ὅμοια κριθαίῳ περὶ καυλίοις ἀπαλαμαίοις, λείοις, πυθμενώδεσι, πραέσι λᾶυκοῖς, εὐερεύθοντι· αἴθει δὲ φοινικῇ, μικρᾷ, γλωμώδει

Lacuna legit in v cod φύλλα μακρὰ, πολλὰ ἀπὸ μιᾶς ῥίζης ὅμοια κριθαίῳ περὶ καυλίοις add Orib.
Al γλωμώδει

A hederaceis, flore candido & odorato, semine paruo, non inutili: radicibus quinis seniue, digitali crassitudine, cádidis, mollibus, dulcibus ac robustis. Quarũ succus si in vino cũ pari melle ac myrrhæ dimidio pipe risque ac thuris tertijs portionibus decoquatur, præstantissimum fiet ad oculos medicamentum. Id verò B in ærea pyxide reconditur. Radicũ autem decoctum eadem quæ herba ipsa præstat. At semẽ vehementiùs vrinam impellit, vomitionẽ́sq; & alui profluuia sistit. Natum porrò in Cilicia gramen, quod indigenæ Cinnam appellant, boues inflammat, si eo virenti sæpe pascantur. al. fæcinat.

C *De Sideritide. Cap. XXXIII.*

SIDERITIS, quam aliqui Heracleam vocãt, herba est foliis marrubij, sed oblongioribus, ad saluiæ aut quercus foliorum similitudinẽ, minoribus tamen & asperis. Caules verò edit quadrangulos, dodrantales, aut etiam maiores, non iniucundi gustus, & quodammodo leuiter D astringentes, in quibus ex interuallis orbiculata verticilla spectantur, ceu marrubij, & in ijs semẽ nigrum. In locis sub quibus petræ latent nascitur. Vim porrò habent impositæ folia, vulnera glutinandi, & ab inflammatione vindicandi.

De Sideritide altera. Cap. XXXIIII.

E Sideritis altera ramos habet binũm cubitorum, exiles: folia longis hærentia pediculis, ceu filicis, in extrema sui parte incisuris diuisa, vtrinq; numerosa: è superioribus autem alarum cauis nouos erumpentes surculos, longos, tenues, capitulis in cacumine globosis & asperis, F in quibus semen cõtinetur, ceu betæ, verùm aliquantò rotundius atque durius. Huius etiam foliorum vis vulneribus vtilis est.

De Sideritide tertia. Cap. XXXV.

Traditur & tertia Sideritis, quam etiam Crateuas Heracleam vocat. G In macerijs vinetisque nascitur, foliis ab vna radice multis, coriandro similibus, circa cauliculos dodrantales, læues, teneros, cũ rubore candicantes: floribus puniceis, paruis,

gustu amaris & lentis. Huius etiam impositæ ea vis est, vt cruenta recentiáque vulnera glutinet.

A πικρά, γλίχρα. καὶ τούτης ἡ δύναμις ὁπὸ πλημμήνης, κολλητικὴ σὺν αἱμῶν καὶ νεοτρώτων.

De Achillea. Cap. XXXVI.

ACHILLEAM sunt qui etiam Sideritin vocent. Gerit autem scapos dodrantales, aut etiam maiores, fusorum effigie, foliis circundatos minutulis, ex obliquo crebras habentibus incisuras, coriandro proximis, subfuluis, lentis, odore multo, nō insuaui, sed medicato: vmbellam vero in cacumine rotundam, floribus candidis, & aurum æmulantibus. Læto solo prouenit. Huius etiam coma trita, vulnera cruenta glutinat & ab inflammationis periculo tuetur, nec non ab ijs erumpentem sanguinē inhibet: vti etiam ab vtero, subdita in pesso. Sed & ipsius decocto vtiliter insident fœminæ vteri fluore laborantes. Denique & ad dysenteriam illa bibitur.

Περὶ Ἀχιλλείου. Κεφ. λ'ς.

ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ, καλοῦσι τινὲς καὶ τινὲς ἀχίλλιον σιδηρῖτιν· φέρει δὲ ῥάβδια ἀσταμιαῖα ἢ καὶ μείζω, ἀτρακτοειδῆ, καὶ B πρὸς αὐτὰ φυλλάρια λεπτά, ἐκ πλαγίων σχιζομαῖς ἔχοντα πυκνάς, παρεμφερῆ κορίῳ, ὑποπύρρα, γλίχρα, πολύσωμα, σκληρά, φαρμακώδη δὲ τὴν ὀσμήν· σκιάδιον ἐπ' ἄκρου πρόσφορες, αὐθη λευκὰ καὶ χρυσίζοντα· φύεται ἐν ὑγροῖς τόποις. Καὶ τούτου ἡ κόμη λεῖα, σὺν C αἵματι ἑστὶ κολλητικὴ, καὶ ἀφλέγμαντος, αἱμορραγίας τε ἐφεκτικὴ, καὶ τῆς ἐκ μήτρας σὺν πεσσοῖτο. καὶ τὸ ἀφέψημα δὲ αὐτῆς ὅστε ἐγκάθισμα ῥοικαῖς. πίνεται δὲ καὶ πρὸς δυσεντερίαν.

V. cum. V. addit ἡ τραχεῖα. V. quidem cod. ad finem addit, ἔνια κεντέονα μετ' ἀξυλίου σκολοπίζει ἔνιοι δὲ λυσσπόλεμον δηρατικόν. ἔχει δὲ κεντέονα ἡ μελίτη μεγίστου ὄζει ἀσκορδηματικά.

Περὶ Βάτου. Κεφ. λζ.

ΒΑΤΟΣ, λιθοκονούσης, σῦφε καὶ ξηραίνει πέσσας βάπτει. Ὁ δὲ ἀφέψημα τῆς ἀκρεμόνων αὐτῆς, κυλίκας ἴσης πυθμένι, καὶ ῥοῦν ἐπίσχει γυναικεῖον ἢ τραγῆρος δύσμασι βύθιστι. κρατύνει δὲ καὶ ὕλας καὶ ἄφθας ὑγιάζει. Ἁφήματα τὰ φύλλα. καὶ ἕρπητας ἐπέχει, καὶ ἀχῶρας τοὺς ἐν κεφαλῇ θεραπεύει, καὶ ὀφθαλμῶν D προπτώσεις, καὶ κονδυλώματα, καὶ αἱμορροΐδας καταπλασσόμενα τὰ φύλλα. καὶ ὅτι σπλαγχνῶν δὲ καὶ καρδιακῶν λῦσι ὀπτηθέντα ἀρμόζει. ὁ δὲ χυλὸς αὐτῆς ἐνθλιβόμενος τῶν κοιλιῶν καὶ τῶν φύλλων συτραφεὶς ἐν ἡλίῳ, βέλτιον ποιεῖ εἰς πτύσια τὰ ἱερμένα. τὸ δὲ καρπόν ἐστιν ὁ χυλὸς πεπέρου ὄντος πλείους, εἰς τὰ στομαχικὰ ἁρμόζει. ἴσχει δὲ καὶ κυλίκας ἓξ ὑδρομέλιτος ἑνὸς ἡσυχίους πέπερος, καὶ τὸ αἶδος δὲ αὐτῆς πολὺν σὺν οἴνῳ κυλίκας ἴσχει.

V. καὶ φύσει.

Vel prunatorum, hoc est, quadam materia id genus significat, teste Valla lib. 4. elegantiarum.

De Rubo Idæo. Cap. XXXVIII.

Idæus rubus appellatus est, quoniā copiosus in Ida nascatur. Est autē lōgè tenerior priore, exiguis spinis præditus, [quanquā & sine spinis inueniatur:] eadē verò præstat quæ supradictus. At ex abundanti flos

Περὶ Βάτου Ἰδαίας. Κεφ. λη.

Βάτος Ἰδαία σκληρὰ λεπτή, ἀφ' ὃ πολλοὶ σὺν τῇ Ἴδῃ γινώσθαι. ἔστι δὲ ἀG παλαιτέρα πολλῷ τῆς πρὸ αὐτῆς, ἀκανθας μικρὰς ἔχουσα. [βλαστάνει δὲ καὶ χωρὶς ἀκανθῶν.] δύναται δὲ τὰ αὐτὰ τῇ πρὸ αὐτῆς. σὺν πλείονος δὲ ὁ αὐτῆς αἶδος

Hanc periodum quamuis non habebant in vulg. exemplaribus ex cod. Ald. nothis adnexuimus.

σὺν μέλλι λεανθέν, ὀφθαλμικαῖς φλεγμοναῖς καταχριόμενον βοηθεῖ, καὶ ἐρυσιπέλατα σβέννυσι· στομαχικοῖς τε μεθ' ὕδατος ἐκ ποτοῦ δίδοται.

A ipsius ex melle subactus oculorum inflammationibus commodè illinitur, & erysipelata restinguit. Stomachicis quoque ex aqua bibendus datur.

Περὶ Ἑλξίνης. Κεφ. λθ'.

Cat Ἑλξίνη.

Ἑλξίνη ἔχει φύλλα ὅμοια κισσῷ, ἐλάττονα δέ, καὶ κλωνία μακρά, περιπλεκόμενα ὅπου αὐ τύχοι. Φύεται δὲ ἐν φραγμοῖς καὶ ἀμπελῶσι καὶ σίτῳ.

V. addit καὶ λεπτά. Sic Lac ex vet. cod. legit. Sic etiam habet Cat. ac at vulg. exempl. μακρά

Δύναμιν δὲ ἔχει τὸν φύλλων ὁ χυλὸς πυόρμους λυλικὴν κοιλίας.

Περὶ Ἐλατίνης. Κεφ. μά.

Epit. addit καὶ σκίρρους μελαναλγεῖς.

Ἐλατίνη τὰ μὲν φύλλα ἔχει ὅμοια τῇ ἑλξίνῃ, μικρότερα δὲ καὶ στρογγυλώτερα, δασέα, χλωρὰς λεπτοὺς, ἀπὸ γαμαιοῦς ἑνὸς ἢ τριῶν. Ἀπὸ τῆς ῥίζης, φύλλων πλήρεις τρυφερῶν ἐν τῇ γλοιᾷ. Φύεται ἐν σίτοις καὶ πόαις ἐργασίμοις. Δύναμιν δὲ ἔχει τὰ φύλλα καταπλασσόμενα σὺν ἀλφίτοις, φλεγμαίνουσι καὶ ῥευματιζομένοις ἀφίλεως ὀφθαλμοὺς ἐψηθέντα δὲ καὶ ῥοφούμενα, δυσεντερίαν ἴσχει.

V. al. Πτερωτὰ λεπτὰ, Orib. μεμψίμοιρα

V. add. ἐχόμενα αὐτοῦ. V. ἀπὸ τῆς γῆς ἢ τῆς ῥίζης.

B ramulis verò longis, quibus circumplectitur quodcunque contigerit adminiculum. Nascitur in sepibus, vinetis ac segetibus. Potus foliorũ succus aluum soluendi vim habet.

De Elatine. Cap. XL.

C ELATINE folia habet helxinæ, at minora rotundioráque, pilosa: ramos tenues, dodrantales, quinos senósve, à radice statim foliis refertos gustu acerbis. Nascitur in segetibus & cultis. Folia cum polenta imposita, inflammatis fluxionéque infestatis oculis auxiliantur. Cocta verò herba sorbitionis vsu dysenteriam sistit.

Περὶ Εὐπατωρείου. Κεφ. μά.

V. μυαλοειδέστατα ἄκρα παραδίδοντες. Lacuna add. reperta in v. cod. ἢ πλατύτατα διάδοντες. V. delet.

Εὐπατώριον πόα ὀξεῖ φρυγανώδης, ῥάβδον ἀναφέρουσα μίαν, λεπτήν, ξυλώδη, ὀρθήν, μέλαιναν, ἔνδασυν, πτυχὰς ἢ καὶ μείζονα· φύλλα δὲ ἐκ διαστημάτων, ἐχόμενα μαλιστά πως εἰς ἓ μοίρας ἢ καὶ πλείους, ὁμοίως τῆς πετασφύλλου ἢ κανάβεως μᾶλλον ἐοικότα, καὶ αὐτὰ δὲ ὑπομέλανα τριποδώδη δὲ ἄκρων ἐστὶ πτερυμενα· σπέρμα δὲ ἀφεστηκὸς ἀπὸ μίσου τοῦ καυλοῦ, ὑπόδασυ, κάτω νευρικὸς, ὡς ἂν τις ἰμαλοιὸς σύριγγας ξηραλόη. Ταύτης τὰ φύλλα μετὰ σταφίδος χειρὸς παλαιᾶς λεῖα ὀλιτριβέντα, τὰ δυσεντερικὰ τῆς ἕλκεσι ἰᾶται. Τὸ δὲ σπέρμα ἔνιοι πόας μείζονος πυόρμους, δυσεντερικοὺς καὶ ἑρπητοδήκτους ὠφελεῖ. Ἔνιοι τοῦτον ἀργεμιώνας ἐκάλεσαν πλανηθέντες· ἑτέρα γάρ ἐστιν ὡς ὑποδείξομεν.

V. μέσου. V. delet. οἷς. Addunt alii καὶ ἑρπητικοῖς

D

De Eupatorio. Cap. XLI.

E EVPATORIVM herba est è cremiorum genere, vnicum proferens thyrsum, eúmque tenuem, lignosum, rectum, nigrum, hirsutum, cubitalem aut etiam altiorẽ, foliis per interualla quinquepartitò vt plurimùm aut etiam ampliùs diuisis, quinquefolij aut cannabis potiùs similibus, nigricantibus & ipsis ac per ambitum serrę modo incisis. Semen à medio statim caule adnascitur subhirsutum, ac ita deorsum inclinatum, vt etiam siccatum vestibus inhæresçat. Trita huius folia & cum veteri suillo adipe imposita, cicatricem ægrè trahentibus vlceribus medentur. Tum semen tum & herba potu ex vino dysentericis, hepaticis, & à serpentibus demorsis auxiliantur. Cæterùm hanc nonnulli errore ducti argemonem appellarunt, cùm tamen longè alia sit, vti demonstrauimus.

Περὶ Πενταφύλλου. Κεφ. μβ'.

V. πόαι

V. add. ὁ

Πενταφύλλον χλωρὰς φέρει καρφοειδεῖς, λεπτοὺς, ἀπὸ γαμαιοῦς, ἐφ' ὧν ὁ καρπὸς· φύλλα δ' ἔχει ἑπτὰ ἢ ὀγδοήκοντα,

De Quinquefolio. Cap. XLII.

G QVINQVEFOLIVM ramulos fert festucarũ similitudine, tenues, dodrantales, in quibus semẽ: folia mentæ, quina singulis pedicu-

lis pediculis, rarò plura, in ambitu ferrata: florem ex candido pallescentem, auri æmulum. Nascitur in aquosis locis & iuxta riuos. Subrubram verò habet radicem, oblongam, veratro nigro crassiorem, cuius est multiplex vsus. Ius radicis ad tertias decoctæ si ore detineatur, dolores dentium sedat, putrida oris vlcera collutione sistit, arteriæ scabritias gargarizatu emendat, contra alui profluuiũ & dysenteriá auxiliatur, itémque arthriticis & ischiadicis potum. Trita eadem in acero cocta & imposita, herpetas cohibet. Strumas, duritias, œdemata, aneurysmata & abscessus discutit. Erysipelatis, digitorum pterygijs, condylomatis psorisque medetur. At tenere radicis succus contra iecinoris pulmonisq; vitia prodest; itémque aduersum venena. Folia autem cum hydromelite aut vino diluto & piperis exiguo bibuntur contra febrium circuitus: in quartana quidem, quaternûm ramulorum folia: in tertiana verò, ternûm: in quotidiana, vnius. Eadem comitialibus tricenis diebus pota succurrunt. Celeriter quoque regio morbo medetur foliorum succus, tribus cyathis aliquot diebus epotus. Illa eadem cum sale aut melle imposita, tam vulneribus quàm fistulis remedio sunt. Opitulatur & quinquefolium enterocelicis, ac erumpentem sanguinem sistit tum potu, tum etiam illitu. Inciditur & ad expiationes lustrationésque, atque hæmorrhagias.

De Phœnice. Cap. XLIII.

PHOENICEA herba, quam aliqui rhun, alij anchinopa vocant, folia quidem habet hordei, at breuiora & angustiora: spicam verò lolio similem, & ramos circa radicem senûm digitorum, ac septenas octonásve spicas. In aruis, rectisque recens illitis nascitur. Vim hác habet in austero vino pota, vt alui profluuium, erumpentémque ab vtero sanguinem, vrinarúmque largiorem fluxum sistat. Tradunt & nonnulli in puniceo vellere amuleti instar adalligatam, sanguinẽ supprimere.

πίνετε καθ' ἕκαστον μέρος, ἀσαφέως δέ που πλείονα, κύκλῳ ἐχόμενα ὁμοιοειδῶς. ἄνθος ὑ᾽ ὠχρόλευκον, χρυσοειδές. φύε ὑ᾽ ἐν ἐφύδροις τόποις & πρὸ ὥρας τῆς. ῥίζαν ὑ᾽ ἔχει ὑπόξυθρον, ὀστιμώδη, παχυτέραν ἢ ἑλένιον μῆκος. ἔστι ὑ᾽ πολύχρηστος. Δύναται ὑ᾽ τὸ τῆς ῥίζης ἀφέψημα ἄχρι τρίτου καταβιβαζόμενον ἐν τῇ ἑψήσει, ὀδονταλγίας παύειν, στόματα ἑλκώδη ἐν ᾧ τόματι & ὑπερδύνας ἐν ᾧ τόματι ἀφανιζόμενον ἵστησι τὴν ταχύτητας ἀρτηρίας αἱμορραγιζόμενον πρὸς ἄρτι τὴν χυλία τὸ ῥεῦσον καὶ δυσεντερία ζοντι· ἀρθριτικοῖς τε καὶ ἰσχιαδικοῖς πινόμενον ἐφθὴ ὑ᾽ ἐν ὄξει λεῖα καταπλασσόμενα, ἕρπητας ἐπέχει· διαφορεῖ χοιράδας, σκληρίας, οἰδήματα, αἰγυρίσματα, ἀποστήματα, ἐρυσιπέλατα, πέρυσι τὰ ἐν δακτύλῳ, καὶ κονδυλώματα· καὶ ψώρας ἰᾶται. ὁ ὑ᾽ χυλὸς τῆς ῥίζης ἀπαλῆς, ποθὲν πρὸς τὸ ὑπνωτικὸν καὶ πνεύμονι πάθη & τὰ θανάσιμα. τὰ δὲ φύλλα πίνεται καὶ μὲθ' ὑδρομέλιτος ἢ οἴνου κεκραμένου καὶ πεπέρεως ὀλίγου πρὸς πυρετοὺς· ὅτι μὲν τεταρταίου, τεσσάρων χλωαρίων φύλλα, ἐπὶ δὲ τριταίου τριῶν, ὅτι δ᾽ ἐφημερεύοντος ἑνός. ἀρκεῖ δὲ καὶ ὑπὸ λιπυρίας πινόμενα. ἐφ' ἡμέρας λ'. ὑγιάζει δὲ καὶ ἕλκεσιν παχέως ὁ χυλὸς τῶν φύλλων πολλὰς ὅτι τινας ἡμέρας τριῶν κυάθων πλῆθος. βοηθεῖ δὲ καὶ σύριγξι μὲθ' ἁλῶν καὶ μέλιτος καὶ ἀπλῶς πάσῃ ἰᾶται· βοηθεῖ ὑ᾽ καὶ ἐντεροκηλικοῖς, & αἱμορραγίαις ἵστησι πινόμενον καὶ καταπλασσόμενον· τέμνεται δὲ καὶ πρὸς καθαρμοὺς καὶ αἱμορραγίας καὶ αἰγυπιάς.

Περὶ Φοίνικος. Κεφ. μγ'.

ΦΟΙΝΙΞ, οἱ δὲ ῥῦν, οἱ δὲ ἀγχίνοπα, τὰ μὲ φύλλα ἔχει ὅμοια κριθῇ, σπαχύτερα δὲ καὶ στενώτερα, στάχυν ὑ᾽ ἐμφερῆ τῇ αἴρᾳ· κλῶνας δὲ ἑξαδακτύλους κύκλῳ τῆς ῥίζης. καὶ στάχυς ζ'. ἢ η'. φύεται δὲ ἐν ἀρούραις, καὶ ὅτι πρὸ τῶν τριῶν τῶν πεπαιτέρων. δύναμιν δὲ ἔχει πινόμενον ὁ οἶνος αὐστηρῷ, διαῤῥοίαν καὶ αἱμορραγίαν τοῦ ἐκ μήτρας, καὶ οὖρον πλείονα φορεῖν ἰσᾶν. ἰσχυροῦσι δέ τινες καὶ ἔχειν

ἀυτὸν εἶναι ἐνδεδεμένον φοινικῷ ἐρίῳ καὶ περικεκλωσμένῳ.

A V. πίνε καθ' ἕκαστον μέρος, ἀσαφέως δὲ πλείονα, κύκλῳ ἐχόμενα ὁμοιοειδῶς.

B V. ἀχρόλ.

V. ὑπόξυθρον

V. ἐστὶ

V. ἐπὶ τοῦ τόματος

C V. πίσσης ἀποστήματα

Caus. Κονδύλωμα καὶ τὰ τοιαῦτα τὰ ἐν δακτύλοις.

In vet. Lacuna colmadd ἢ ἀχλύες

D

E

Al. ἐν ἡμέραις λ'. V. πινόμενα οὖλα ἐν ἡμέραις τριάκοντα. ἐν ἡμέραις τριάκοντα.

V. add. ἰσχυροὺς καὶ τὰ τοιαῦτα καὶ σύρ.

V. quidã vsque ad finem caret.

V τὰ καταμήνια καὶ πρὸς καθαρμοὺς καὶ ἀποδίας

F

Suspicatur Matthæus eam vocẽ hinc accersitam, quam etiam præterm. sit R. Ellius.

G

Περὶ Ἰδαίας ῥίζης. Κεφ. μδ'.

ΙΔΑΙΑ ῥίζα, ὀξυμυρσίνῃ τὰ φύλλα ἔοικε· πρὸ αὐτὰ δὲ ὡς ἕλικες μικραὶ πεφύκασιν, ἐξ ὧν καὶ ὁ ἄνθος. Ταύτης ἡ ῥίζα στυπτικὴ σφόδρα, ἁρμόζουσα ἐφ' ὧν σύψεως ἐστὶ χρεία. πίνεται δὲ καὶ πρὸς χολίας ῥεύματα καὶ ῥοῦν γυναικεῖον αἱμορραγίαι τε πᾶσαι ἴσχνει.

Περὶ Ῥοδίας ῥίζης. Κεφ. με'.

ΡΟΔΙΑ ῥίζα γίνεται ἐν Μακεδονίᾳ, ἐοικυῖα κόστῳ, λευφοτέρα δὲ καὶ ἀνώμαλος, ῥόδου ὀσμὴν τῇ ἁφῇ ἀποφορὰν ποιοῦσα ὁμοίαν· χρησιμεύει δὲ ὅτι τοῖς καφαλγικοῦσιν, σὺν ῥοδίνῳ ὀλίγῳ λεπτὴ ἐπιπλασσομένη καὶ ἐμβρεχομένη μετὰ πηγανίνου καὶ προσώποις.

Περὶ Ἱππουρίδος. Κεφ. μς'.

ΙΠΠΟΥΡΙΣ φύεται ἐν τόποις ἐφύδροις καὶ πάφεσιν· καυλία ἔχει κενά, ὑπέρυθρα, κατάφαλα, στρεπτά, γόνασι διῃρημένα· ἐμπεφυκότα εἰς ἄλληλα· περὶ δὲ αὐτὰ χοινώδη φύλλα πυκνά, λεπτά. αὔξεται δὲ εἰς ὕψος ἀναβαίνουσα ὅτι τὰ παραχείμενα φλέγει, καὶ καλαχρημνᾶται πρὸς καυχμὸν κόμης πολλαῖς μελαίναις, καθάπερ ἵππου οὐρά· ῥίζα ξυλώδης, σκληρά. Στυπτικὴ δὲ ἡ πᾶσα· ὅθεν ὁ χυλὸς αὐτῆς αἱμορραγίας ἵστησι τὰς ἐκ μυκτήρων καὶ δυσεντερίας ὠφελεῖ, πινόμενος μετ' οἴνου καὶ οὖρα. τὰ δὲ φύλλα ἕλκεσι πάσμασι καὶ ἀλφοῖς ἐπιπασσόμενα. ἡ δὲ ῥίζα καὶ ἡ πᾶσα βήσεσί τε καὶ ὀρθοπνοϊκοῖς καὶ ῥηγματίαις ἁρμόζει. ἐπορέγεται δὲ καὶ ἐντέρου διαῤῥήξεως καὶ κύστεως ἀγκυλῆς, καὶ ἐντεροκήλῃ συναγόμενα τὰ φύλλα πινόμενα ἐν ὕδατι.

Περὶ Ἑτέρας Ἱππουρίδος. Κεφ. μζ'.

Ἱππουρὶς ἑτέρα. καυλός ἐστιν ὀρθός, ἴσος, μείζων ὁ πήχεως, ὑπόκενος. κόμας ἐκδέχεται ἔχουσα βραχυτέρας καὶ λευκοτέρας καὶ μαλακωτέρας. ἥτις καὶ αὐτὴ λεανθεῖσα σὺν ὄξει πρόσματτα ἰᾶται, πλὴν αὐτὴν ἔχουσα δυνάμιν.

Περὶ Κόκκου βαφικῆς. Κεφ. μη'.

ΚΟΚΚΟΣ βαφικὴ, θάμνος ἐστὶ μικρὸς, φρυγανώδης, ᾧ ἀκάνθιναι

Qeldam v. hoc caput nō habet.

Al. add. τὸ παρεκκλίνον ὕδωρ

Marc. legit καρδίᾳ V. caret.

Margini additur, Corbeil. ἢ ἐκ τῶν καὶ γυναικείων ῥοῦν.

V. add καὶ πρὸς κοιλιακοὺς ἐντερικούς

V. caret hisce μεταξὺ ἄλλ.

V. add. ἢ καταπλασσόμενα

Cōclusa à Ruellio expressa ex codicis Ald. notis adiecimus.

De Idaea radice. Cap. XLIIII.

IDÆÆ radicis folia *oxymyrsinen referunt: iuxta ipsa verò exigui sunt veluti pampini seu capreoli, ex quibus etiam flos erumpit. Radix præclarè astringit, ijs iccirco cōueniēs, quibus astrictione opus est. Bibitur & aduersus alui profluuia fluorémque muliebrē, & omnem sanguinis eruptionem sistit.

De Rhodia radice. Cap. XLV.

RHODIA radix in Macedonia gignitur, costo similis, at leuior & inæqualis, quæ dum conteritur, rosarum odorem spirat. Caput dolentibus vtilis est, si cum pauco rosaceo trita capiti imponatur, aut madefacta frōti ac temporibus adhibeatur.

De Equiseto. Cap. XLVI.

EQVISETVM in riguis & scrobibus nascitur. Cauliculos edit inanes, rubescentes, subasperos, solidos, geniculis in sese farctis interseptos: ac circum ipsos folia iuncea, crebra tenuiáque. In sublime autē attollitur, vicinos scandens arborum caudices, ex iisque dependet circūfusum comis multis, nigris, vt est equi cauda: radix lignosa est ac dura. Est verò herbæ vis adstrictoria: quamobrē ipsius succus fluentem è naribus sanguinem sistit, prodéstque dysenterijs in vino potus, & vrinam ciet. Folijs autem tritis & insperſis vulnera cruenta glutinantur. Radix verò, itémque herba ipsa, tussientibus, orthopnoicis ruptísque succurrunt. Narrantur & folia in aqua bibita diuisum intestinum, dissectámque vesicam & enterocelen cogere & agglutinare.

De Equiseto altero. Cap. XLVII.

Equisetum alterum caule est recto, æquali, cubito maiore, quodammodo inani, comis per interualla breuioribus, candidioribúsque & mollioribus. Id cum aceto subactū vulneribus etiam remedio est, eadémque qua prius illud facultate pollet.

De Cocco tinctili. Cap. XLVIII.

COCCVM tinctile frutex est paruus è cremiorum genere, cui

grana ceu lentes adhærét, quæ quidē exempta decerptáve reponuntur. Optimum gignitur in Galatia & Armenia, deinde in Asia & Cilicia: locum postremú obtinet quod in Hispania prouenit. Vis huic astringere: cuius ratione vulneribus neruisque fauciatis tritum ex aceto conuenienter imponitur. Nascitur porrò Cilicium in quercubus, exilis cochleę similitudine, quod illius regionis mulieres ore legunt & coccum vocitant.

A κόκκοι ὡς φασὶ, οἵ τινες ἐκλεγόμενοι σκωλήκιτας. ἀρίστη δέ ἐστιν ἡ Γαλατικὴ καὶ ἡ Ἀρμενιακὴ· ἔπειτα ἡ ἐν Ἀσίᾳ καὶ ἡ Κιλίκιος· ἐσχάτη δὲ πασῶν ἡ ἐν Ἰβηρίᾳ. Δύναμιν δ' ἔχει στυπτικὴν, ἁρμόζουσαν τραύμασι καὶ νεύροις πρώτοις, λεῖα μετ' ὄξους καταπλασσομένη. γίνεται δὲ ἡ ἐν Κιλικίᾳ ἐν ταῖς δρυσὶν ὁμοίως κοχλίᾳ μικρῷ, ὧν αἱ τῇδε γυναῖκες τῷ στόματι αἰδοίζουσαι κόκκον καλοῦσιν.

B

V. non habet.

V. ὁ σημαίνει μύ. Sed Scholion est. al. σχῖνος.

De Tragio. Cap. XLIX.

TRAGIVM in Creta tātùm nascitur, lentisco simile, foliis femine ac ramis, singulis tamen minoribus. Liquorem verò profert gummi similem. Folia, semen & lacryma impositione ex vino spicula omniáque corpori impacta euocant. Pota eadem drachmæ vnius pondere stranguriæ medentur, calculos vesicæ comminuunt, & menses trahunt. Aiunt & syluestres capras sagittis ictas huius herbæ pabulo spicula excutere.

Περὶ Τραγίου. Κεφ. μθ'.

ΤΡΑΓΙΟΝ φύεται μόνῃ τῇ Κρήτῃ μόνη, ἔχει δὲ τὰ φύλλα σχῖνῳ ὅμοια, καὶ τοὺς ῥάβδους καὶ τὸν καρπὸν, μικρότερα δὲ πολύ. φέρει δὲ ὀπὸν κόμμι παραπλήσιον. Τούτου τὰ φύλλα καὶ ὁ καρπὸς καὶ ὁ δάκρυον καταπλασσόμενα σὺν οἴνῳ, ὀϊστοὺς σκόλοπας καὶ πᾶσαν τὴν ἐμπεπηγυῖαν. πίνεται δὲ, στραγγουείαις ἰᾶται, καὶ λίθους τοὺς ἐν κύστει θρύπτει, καὶ καταμηνία ἄγει. λαμβάνεται δὲ ὀλκὴν δ. φασὶ δὲ καὶ τὰς ἀγρίας αἶγας τοξευθείσας καὶ νεμηθείσας τοῦ τόου, ἐκβαλεῖν τοὺς ὀϊστούς.

C

D

De Tragio altero. Cap. L.

Tragium alterū folia scolopendrij habet, & radicem tenuem, candidam, syluestris raphani similem. Hæc seu cruda seu cocta comedatur, dysentericis est auxilio. Cæterùm folia per autumnum hircini virus odorem emittunt: vnde & herba tragij nomen obtinuit. Prouenit in montibus & præcipitijs.

Περὶ ἄλλου Τραγίου. Κεφ. ν'.

Τραγίου ἄλλο τι μόνῃ φύλλα ἔχει ὅμοια σκολοπενδρίῳ, ῥίζαν ὑπόλευκον, λευκὴν, παρεμπλησίαν ῥαφανίδι ἀγρίᾳ· ἣν τις βούληται δυσεντερικὸς ὢν ἢ ἕψων ἐσθίειν. προσβάλλει δὲ κατὰ τὸ φθινόπωρον τὰ φύλλα τράγου ὀσμὴν· ὅθεν καὶ ὠνόμασται τράγιον. Φύεται δὲ ἐν ὀρεινοῖς καὶ κρημνώδεσι τόποις.

E

F

Hæc ex Aldi codicis nostri hæc transferre visum est.

De Trago. Cap. LI.

TRAGVS, quam aliqui Scorpiō, alij Traganon vocāt, frutex est pusillus in maritimis maximè nascens, & per terram sparsus, oblongus, at non ita magnus, palmi altitudine, aut paulò amplior: & is quidē sine folijs est: circa ramos autē hærētes habet velut acinos pusillos, rufos, triticei grani magnitudine, summa parte acuminatos, numerosos, gustuq; admodū astringētes. Racemorū acini decē ex vino poti, cœliacis, fœminisque fluore laborantibus auxiliantur. Sunt & qui tusos digerunt in pastillos, quò fœliciùs asseruentur, iisque ita vtuntur.

quasi alnius diceas

Περὶ Τράγου. Κεφ. να'.

ΤΡΑΓΟΣ, ὁ δὲ, σκορπίος, οἱ δὲ, τράγανος· φύεται παρὰ θαλάττην μάλιστα, θαμνίσκος βραχύς, βραχυκλαδής, ὑ μέγας, ὅσον ἀσπάλαθος ἢ μείζων, φύλλα οὐκ ἔχει· βλαστοὺς δὲ περὶ κλάδους περίκειται οἷονεὶ ῥᾶγας μικρὰς, πυρρὰς, κατὰ μέγεθος πυρῶν, ὀξεῖαι ἐπ' ἄκρου, πολλαὶ, λίαν γλυκάζουσαι στυπτικαί. τούτου ὁ καρπὸς ὡς ῥᾶγες δέκα σὺν οἴνῳ πολίταις, χιλιακοῖς καὶ ῥοϊκοῖς γυναιξὶ συμφέρουσιν. εἰσὶ δὲ οἱ τὸν χυλὸν αὐτοῦ, αἰγιαλάθου ἐχίνου εἰς ἀπόθεσιν, καὶ οὕτω χρῶνται.

G

V. ad fi. aliam scripsit Catac. θαμνίσκος κλαδώδης &c. V conclusis caret.

Περὶ Σχοίνου. Κεφ. νϛ'.

Ald. cod χοῖνος λευκὸ τὸ μὲν τὸ αὐτὸ καὶ ὀξὺ χοῖνος λεῖα δὲ forte ἐλεῖα. Sic enim AEgin. quē sic eius est Hermol. Quidam ex Gal. sic emendāt Σχοῖνος λεῖα ἀπόξυς ἐπ' ἄκρου· τούτου διαὶ μὲν τὸ μὴ δὶς ἐξόχους δὲ λαχανοῦσι· τὸν δὲ ὀξόχοιν δύο εἶναι αὐτὸ· ὁ μὲν γὰρ ἄκαρπος &c. hoc est: Iuncus lēuis in summum fastigium duo sunt genera: vnū oxyschenos, alterū holoschœnos. rursus oxyschœni duo assignātur genera, vnum sterile &c.

V. add. ἐλεύθερα

V. λεῖα

Σχοῖνος, ζύπου διαὸν εἶδος. ὃ μὲν τοῦ αὐτοῦ καλεῖται ὀξοῖνος λεῖα, τὸ δὲ, ὀξύχοινος ἄποξυς ἐπ' ἄκρου· διαὸν δὲ καὶ τούτου εἶδος· ἡ μὲν γὰρ ἄκαρπος, ἡ δὲ, καρπὸν μέλανα ἔχει, σκληρόφυλλον. καὶ χύτροις δὲ τούτοις οἱ κάλαμοι, καὶ σαρκωδέστεροι. Ἔστι δὲ καὶ τρίτη πολλῷ σαρκωδεστέρα καὶ παχυτέρα τῶν δυοῖν, ὁλόχοινος λεγομένη. ἔχει δὲ καὶ αὐτὴ καρπὸν ἐπ' ἄκρου ὅμοιον τοῖς περὶ αὐτῆς. Ἀμφοτέρων δὲ ὁ καρπὸς φρυγεὶς καὶ πινόμενος μετὰ κεφαλῆς, κοιλίαν καὶ ῥοῦν ἐρυθρὸν ἴσχει, καὶ οὖρα κινεῖ· ἔστι δὲ καὶ κεφαλαλγής. τὰ δὲ πρὸς τὴν ῥίζαν ἁπαλὰ φύλλα καταπλασσόμενα, φαλαγγιοδήκτοις ἐπιμάζει. Ἡ δὲ Αἰθιοπικὴ ὀξοῖνος ὑπνωτικὸν ἔχει καρπόν· φυλάττεσθαι δὲ δεῖ αὐτὴν ἐν ταῖς πόσεσι τὸ πλῆθος· καιρεῖ γὰρ λίαν.

Περὶ Λειχῆνος. Κεφ. ργ'.

Λειχὴν ὁ ἐπὶ τῶν πετρῶν, οἷς, βρύον καλοῦσι, βρύον ὄντι προσεχόμενον ταῖς ἐνύδροις πέτραις. τοῦτο καταπλασθὲν αἱμορραγίας ἴσχει, καὶ φλεγμονὰς παραιτεῖται, καὶ λαγόνας θεραπεύει· ὠφελεῖ δὲ καὶ ἰκτερικοὺς μετὰ μέλιτος ἀλειφόμενον· στόματος δὲ καὶ τῆς γλώττης ῥευματισμοὺς παραιτεῖται.

Περὶ Παρωνυχίας. Κεφ. ργ'.

Παρωνυχία φυὴ) ἐν πέτραις, θαμνίσκιον ὅμοιον πευκάνῳ, τῷ δὲ μήκει ἔλαττον, τοῖς δὲ φύλλοις μεῖζον. ὅλη καταπλασθὲν λύει ὅλον παρωνυχίας καὶ κηρία θεραπεύει.

Al. πευκάνῃ

Περὶ Χρυσοκόμης. Κεφ. νϛ.

Χρυσοκόμη θαμνίον ἐστὶ πολυθαμνιῶδες· ἔχον κόμην κορυμβοειδῆ, ὁμοίαν ὑοσκύαμῳ· ῥίζαν δασεῖαν, λεπτὴν, ὡς ἐλλεβόρου· μέλανος, γευσαμένῳ σὺν ἀστυφῇ, κυπείρῳ ἴσην ὀσμὴν, ἐν δὲ γλυκεῖ ὑπαυστηρόν· φύεται ἐν παλιοκίοις καὶ πετρώδεσι.

V. εἰ δὲ φαντασίαμεν κορυφοῦν. Vulg. exempl. ἐκδίδον Dal. κορυμβοειδὴ corymbis ornata.

Auth. adstrict. μελαίνας.

V. συκαμίνου Auth. adstrictoriam

V. πυρεί.

V caret.

Δύναμιν δὲ ἔχει θερμαντικὴν καὶ στυπτικὴν· ἡ ῥίζα· ἰπατικοῖς ἢ πλευριτικοῖς ἁρμόζουσιν. λαμβάνεται δὲ ἐν ὑδρομέλιτι ἕφθη πρὸς καθαρσιν ὑστέρας.

De Iunco. Cap. LII.

IVNCI duo sunt genera: vnum lęuis nominati, alterū oxyschœni dicti, qui quidem in mucronem fastigiatur. Huius rursum duo assignantur genera: vnum quidem sterile: alterum semē profert nigrum, rotundum, culmis crassioribus carnosioribúsque. Est & tertius iuncus, qui vocatur Holoschœnos, prioribus illis multò carnosior atq; crassior: is & semen in cacumine gerit, antedicto simile. Porrò semen vtriusque tostum & ex vino diluto potum, sistit aluum rubentémque fluorem muliebrem: vrinas quoque cit: at capitis dolores facit. Folia autē tenera quæ radici proxima sunt, phalangiorū morsibus conuenienter imponuntur. Cæterùm Æthiopicus iuncus semen habet alliciendi somni vi præditum: at vitanda in potionibus maior ipsius copia, quoniam altum grauémque nimiùm soporem inuehit.

Vl. sanguinem mouet

De Licbene. Cap. LIII.

LICHEN qui petris innascitur, & aliquibus bryon appellatur, ceu muscus est roscidis petris inhęrens. Is impositus sanguinis eruptiones sistit, inflammationes lenit, ac impetigini medetur. Iuuat & arquatos cum melle illitus: cæterùm defluxionibus oris ac linguæ succurrit.

De Paronychia. Cap. LIIII.

PARONYCHIA frutex est pusillus in saxosis nascens, peplo similis, at breuior: foliis tamen maioribus. Ea tota contrita paronychijs atque fauis remedio est.

De Chrysocome. Cap. LV.

CHRYSOCOME frutex est exiguus, palmi altitudine, coma specie corymborum, hyssopo simili, radice densa & ceu veratri nigri tenui, cyperum æquante, gustu minimè aspero, sed ex dulci subaustero. In opacis petrosisque nascitur. Radix calfactoriam adstrictoriámque vim habet, hepaticis & peripneumonicis accommodatam. Sed & eadem decocta in aqua mulsa ad purgandam vuluam assumitur.

De Chrysogono. Cap. LVI.

CHRYSOGONON denſè fruticat, folijs quernis, flore verbaſci coronarij, radice rapi, intus quidem ruberrima, foris verò nigra. Hæc cum aceto ſubacta & impoſita, contra muris aranei morſus auxiliatur.

De Helichryſo. Cap. LVII.

HELICHRYSVM quidã chryſanthemon, alij etiam amarantum vocant, quo Deorum ſimulachra coronant: ramulum habet ex candido virẽtem, rectum, ſolidum: folia ex interuallis anguſta, abrotono ſimilia: comam in orbem circumactam, aureæ lucis fulgore: vmbellam rotundam, veluti corymbis aridis dependentibus: radicem gracilem. Naſcitur in aſperis & ſalebroſis. Coma ex vino pota, contra vrinę difficultatem, ſerpentiũ morſus, iſchiada ruptáque opitulatur, menſéſque ciet. Sanguinem concretum ventris aut veſicæ abſumit, cum mulſo pota. Siſtit & deſtillationes, trium obolorum põdere ieiunis potui data in vino albo diluto. Veſtibus quoque interponitur, vt eas à teredinum iniurijs tueatur.

De Chryſanthemo. Cap. LVIII.

CHRYSANTHEMON ſeu chalcas, alijs buphthalmũ, herba quidem eſt tenera, at fruticoſa, læues proferens caules, foliáque multifida: flores autem luteos eximio ſplendore micantes, & oculi orbem imitãtes, vnde & buphthalmi nomen obtinuit: propter oppida naſcitur: ipſius verò caules olerum inſtar eſitantur. At flores cum cerato triti, ſteatomata diſcutere produntur: regio autẽ morbo correptis breui colorem reddunt meliorem, ſi è balneo poſt longiorem in eo moram egreſſis propinentur.

De Agerato. Cap. LIX.

AGERATVM frutex eſt è cremiorum genere, duorum palmorũ altitudine, humilis, ſimplex, origano maximè ſimilis, vmbellam gerens, in qua flos aureis quaſi bullis emicat, helichryſo minor. Age-

A Περὶ Χρυσογόνου. Κεφ. νϛ'.

ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΝ φύλλα ἔχει ὅμοια δρυΐ ὁ δὲ θάμνος ἐστὶ πυκνός. ἄνθος δὲ παραπλήσιον τῷ στεφανωτικῷ φλόμῳ. ῥίζαν ὁμοίαν χλόῃ, ἔνδοθεν ἐρυθράν, ἔξωθεν δὲ μέλαιναν. ἣν τὶς σὺν ὄξει λειανθεῖσαν καὶ ὑποτεθεῖσαν μυ-

B γαλῆς δήγμασιν.

Περὶ Ελιχρύσου. Κεφ. νζ'.

ΕΛΙΧΡΥΣΟΝ, ᾧ δὲ, χρυσάνθεμον, οἱ δὲ, καὶ τοῦτο ἀμάραντον καλοῦσιν, ᾧ καὶ τὰ εἴδωλα στεφανοῦσι· ῥαβδίον λευκὸν, χλωρὸν, ὀρθὸν, στρεπτόν· φύλλα σπάνια ἔχει ἀφεστηκότα τοῦ ἔχοντος πρὸς τὸ ἄνθος τὸ

C κύκλον· κόμην κυκλοτερῆ, χρυσοφαῆ, σπαδίοις παραφερῆ, ὥσπερ κορύμβους ξηροὺς, ῥίζαν λεπτὴν. φύεται δὲ ἐν τραχέσι καὶ χαραδρώδεσι τόποις. Βοηθεῖ δὲ ἡ κόμη σὺν οἴνῳ πόσει, δυσουρίαις καὶ ἑρπετῶν δήγμασι, καὶ ἰσχιάσι καὶ ῥήγμασι καὶ ἐμπύοις ἄγει. καὶ θρόμβους αἵματος

D ἐν οὐρήσει ἢ κοιλίᾳ τηκεῖ, ζωὸν οἰνομέλιτι πινομένη· ἔχει δὲ καὶ καταπότιον ὅσον περιβολὴν νήστει δοθεῖσα ἐν κεφαλῇ οἴνου λευκοῦ· συμβάλλεται δὲ καὶ μετὰ ἱματίων, ἄβρωτα τηροῦσα αὐτά.

Περὶ Χρυσαθέμου. Κεφ. νη'.

E ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΟΝ, ἢ χαλκάς, ᾧ δὲ, βούφθαλμον· πυφιερά τις πόα, θαμνοειδὴς δὲ, λείους ἀναφέρουσα καυλοὺς καὶ φύλλα πολυχιδῆ· αἱ δὲ μάλιστα, ἰχμαῖς ἐλαίου ζέουσα, καὶ ὀφθαλμὸν κυκλοτερῆ, διὸ καὶ οὕτως ὠνόμασται· φύεται πανταχοῦ πόλεως. ᾧ καυλοὶ δὲ αὐτοῦ λα-

F χανεύονται. Τὰ δὲ ἄνθη λεῖα μετὰ κηρωτῆς, στεατώματα λύοντα διαφορῆσι· λιπαιτικοῖς δὲ φοινικαίροις βήσσῃσι πιεῖν, πεθεῖσα μὲν πλεῖ σὺν τοῖς λουτροῖς ἀπὸ τῆς μακρᾶς διατριβῆς ἔξοδον.

Περὶ Αγηράτου. Κεφ. νθ'.

ΑΓΗΡΑΤΟΝ θάμνος ἐστὶ φρυγανώδης, πανθαμώδης, ἁπτινώδης, ἁπλοῦς,

G ἐμφερὴς μάλιστα ὀριγάνῳ· στεφάνους ἔχων, ἐφ' οὗ ἄνθος πομφολυγώδες, χρυσοειδὲς, ἔλαττον ἐλιχρύσου. ὀνόμασται δὲ ἀγή-

V. ubi ſit ſtrobilus & χρυσόκομος, & picturam oſtendit alicam ſimilem, vt ait Samb.

Al. πρὸς Sudæ V. hic caret ver. xx.

Pond. χρυσοφεῆ

V. caret. Locuna in vet. cod. legit, σὺν οἴνῳ ἰσομέλιτι

V. Διοσκόρ. V. πλείστ

V. κοσμεῖ

Al. κεχραί. vt lib. 3 cap. 157.

V. caret his ſyllabis.

Marg: δυνάμεως δὲ διαφερτικῆς, καὶ ἀτρίμματος ἀξιολογωτέρου. V. ἰσχνὰ non habet.

ρατον, ἀφ' οὗ ὅπι πολὺ τὸ ἄνθος ὁμοιοδὲς φυλάττεσθαι. Δύναμιν δὲ ἔχει ὅ ἀφέψημα αὐτοῦ * πυρωλικὸν· καὶ αὐτὴ ἡ πόα ἐσθιομιωμένη οὖρα ἄγει, & τὰ τῶν ὑστέρων μαλάττει.

A rati nomen illi inditum est, quoniam flos diutissimè in sua coloris specie conseruatur. Vis decocti fotibus apta. Herbæ quoque ipsius vstæ nidor vrinas ciet, yuluæq; duritias emollit.

Περὶ Περιστερεῶνος. Κεφ. ξ'.

De Peristereone, seu Verbenaca recta. Cap. LX.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΕΩΝ φύεται ἐν ὑγροῖς τόποις. δοκεῖ δὲ ὠνομάσθαι ἀπὸ τοῦ τοῖς περιστεροῖς ἡδέως ἐφαπτέσθαι ἐν αὐτῇ. πόα δέ ἐστι σπιθαμιαία ἔχουσα ὅ ὕψος, ἢ καὶ μεῖζον, πίτυλα ἐντετμημένα, ἐσθόλυκα, ἀπὸ φυκότα ἀπὸ τοῦ καυλοῦ· * μονόκλωνος ὡς τὸ πολὺ καὶ μονόῤῥιζος ὑπάρχει. Δοκεῖ τε τὰ φύλλα σὺν ῥοδίνῳ ἢ σταφυλῆρι ἢ ναρδῷ τοῖς ὠδήμασι, αἰρωδιοῖδυνίαν ὑστέρας ποιεῖν. σέλλει δὲ καὶ ἐρυσιπέλατα σὺν ὄξει καταπλασθεῖσα, καὶ σπιδόνιας ἐπέχει. & φαύμαλα κολλᾷ, & ἀπυλοῖ τὰ παλαιὰ σὺν μέλιτι.

B VERBENACA in aquosis nascitur: nomen autem Græcum ex eo duxisse videtur, quòd libéter circa eam columbæ commorentur. Herba est palmi altitudine, aut etiá maior, foliis incisis, subalbidis, è caule prodeuntibus: singulari plerunque ramo & radice vnica réperitur. Folia tum rosaceo aut adipe C suillo recenti subdita, vuluæ dolorem adimere creduntur. Ipsa quoque herba impositа cum aceto, erysipelata reprimit, putridáque vlcera cohibet: vulnera etiamnũ glutinat, veteráque cum melle ad cicatricem perducit.

V. ἐπιπασθεῖσα αὐτῇ. V. μονόκλωνος. Salmb. μονόκλαδος. V. σπλαν

Περὶ Ἱερᾶς Βοτάνης. Κεφ. ξά.

De Hierabotane, seu Verbenaca supina. Cap. LXI.

G. Vterq; codex hunc titulũ ἀπὸ ἀφεστικότος ὑπῆλιο habet. Ant quus codex manuscriptus habet ὕπτιον.

Ἱερὰ Βοτάνη, ἣν δέ, περιστερεῶνα· ἐκ D καλεσθη, ῥάβδους ἀνίσους πηχυαίους ἢ & μείζονας, γωνιοειδεῖς, περὶ ἃς τὰ φύλλα ἐκ ἀφασμάτων ἐοικότα δρυΐ, πλὴν στενώτερα· καὶ ἥπλονα, ἐντετμημένα δὲ τὰς κύκλῳ, ἐσθόλυκα· ῥίζαι δὲ ὑπομήκη, λεπτὴν· αὐθη πορφυρᾶ, λεπτά. Τούτης τὰ φύλλα καὶ ἡ ῥίζα πολυζήμονα E μεθ' οἴνου ἢ καθαπλασσόμενα, ποιεῖ ταχὺ ἕρπητα· ταχὺ δὲ ἴκτερον τὰ φύλλα ὅσον < ὀλκὴν μετὰ λιβανωτοῦ περιωβόλου, σὺν οἴνου * παλαιοῦ κυάθῳ μιᾷ νήστει ἐφ' ἡμέρας μ'. πινόμενα· οἱ δήματά τε χρόνια & φλεγμονὰς καθαπλασθέντα ταραύνει· καὶ ῥυπαρὰ ἕλκη καθαίρει. ἐψηθεῖσα δ' ὅλη F σὺν οἴνῳ, ἐφαίρας τοὺς ἐν παιδομίοις περιῤῥήγνυσι, & νομὰς τοὺς ἐν στόματι αἰθαγαργαλιζομένη ἐφίστησι. ῥαδιόμενόν τε ἐν συμποσίοις ὃ ἀπόβρεγμα, εὐδιαγωγοτέρους ἱστορεῖται ποιεῖν· δίδοται δ' ἐν τεταρταίοις πρὸ τοῦ πρίσαι χόνδρου ἀπὸ τῆς γῆς σὺν τοῖς περικειμένοις φύλλοις· τεταρταίοις δὲ G τέταρτον. καλοῦσι δ' αὐτὴν ἱερὰν βοτάνην, ὅτι τὸ εὔχρηστον ἐν τοῖς καθαρμοῖς εἶναι εἰς τελετάς.

Lacuna legit in antiquo exemplari, quod ipsemet habeo

V. addit, καὶ φύλλα ἐπιπασθέντα

V. cæter. sequentibus.

HERBA sacra, quam etiá nonnulli peristereona vocarunt, ramulos emittit cubitales, aut etiam maiores & angulosos, circa quos folia sunt ex interuallis, quernis similia, sed angustiora minoráque, diuisuris incisa per ambitum, & colore aliquatenus glauco: radicem lõgiusculam & gracilem, flores purpureos ac renues. Huius folia cum radice ex vino pota illitáve, aduersus serpentes pollent: eadem illa contra morbum regiú drachmæ vnius pondere ex vini veteris & calidi hemina vna quaternis diebus ieiuno ventriculo bibuntur. Sed & œdemata diuturna inflammationésq; imposita mitigant, sordidáq; vlcera purgant. Tota verò herba in vino decocta, tonsillarú crustas abrumpit, & oris nomas gargarizatu cohibet. Aiunt, si aqua spargatur triclinũ quâ maduerit, lætiores hilariorésve conuiuas fieri. Datur & potandum tertiana laborantibus tertium à terra geniculum vnà cum foliis circundantibus, vti & quartanâ, quartum. Cæterùm sacram herbam ideò vocant, quòd in expiationibus sit ad amuleta perutilis.

De Astra-

De Astragalo. Cap. LXII.

ASTRAGALVS paruus est à terra frutex, foliis & ramulis ciceri similis: floribus purpureis, paruis: radice rotunda, raphani modo prægrandi: quæ adnatas habet appendices, eásque solidas, nigras, præduras, ceu cornua inter se implicatas, gustúque astringentes. Nascitur in ventosis, opacis atque niualibus: magna verò copia in Pheneo Arcadiæ. Radix fluentem aluum in vino pota sistit, vrináque mouet: veteribus quoque vlceribus sicca efficaciter inspergitur, sanguinémq; supprimit: verùm difficilè solliditatis suæ ratione tunditur.

De Hyacintho. Cap. LXIII.

HYACINTHVS folia habet bulbi, caulem dodrantalem, læuem, minimo digito graciliorẽ, & herbacei coloris, cui coma incumbit incurua, florũ purpurascentium plena: radicem quoq; bulbaceam. Hæc, vt creditur, pueris è vino albo illita, pubertatem coërcet, & nó patitur erumpere. Sistit & aluum, vrinámque impellit pota, phalangiorúmq; morsibus resistit. At semen astringentius est, atque adeò cœliacis auxiliatur, theriacísq; ipsum expetitur, ac regium quoque morbũ emendat cum vino potum.

De Papauere erratico. Cap. LXIIII.

PAPAVER erraticũ, quod à flore protinus deciduo rhœadis nomen a Græcis accepit, in aruis vere nascitur, quo quidẽ tempore etiam colligitur. Folia origano aut erucæ aut cichorio aut thymo similia spectantur, eáque diuisa, sed longiora & scabra. Caulis ei lanuginosus, rectus, asper, & ferè cubitali altitudine. Flos puniceus, interdum & candidus, syluestris anemones similitudine: caput oblongum, sed quàm anemones minus: semen rufum: radix oblonga, subalbida, parui digiti crassitudine & amara. Huius capitula quinque aut sex in vini cyathis tribus decocta dum ad duos redeant, ijs potui dabis, quibus somnum inducere volueris. At semen acetabuli mensura ex aqua mul sapotũ, aluum leniter emollit:

A Περὶ Ἀστραγάλου. Κεφ. ξβ'.

ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΣ θαμνίσκος ἐστὶ μικρὸς ἀπὸ γῆς, φύλλοις καὶ κλωσίοις ὅμοιος ἐρεβίνθῳ· αἴθει πορφυρέῳ, μικρά· ῥίζα δὲ ὕπεστι στρογγύλη ὡς τὸ ῥάφανος ὁ μεγάλης, πτερυγώδας ἔχουσα τριγωνίας, μελαίνας, σκληροτέρας, ὡς κέρατα αἰτιμοπλεγμένας ἀλλήλαις, γένεσιν μέλιτι συπλικάς. φύεται δὲ ἐν θυσιάμοις καὶ αὐχμίοις καὶ χειμαζομένοις τόποις. παλαιὰ δὲ ἐν Μεσσηνίδι τῆς Ἀρκαδίας, ἰσχνὰ δὲ χειλίδι ῥωμαπζομένῳ ἐν εἴνῳ πολίτῃ ἡ ῥίζα· κινεῖ τε καὶ οὖρα· πυῷ καὶ τοὺς παλαιὰ ἕλκη ξηρεῖ· ὅτι πασσομένη καὶ αἷμα ἴσχει· κόπτεται δὲ δυσχερῶς διὰ τὸ τριγῶδες αὐτῆς.

Περὶ Ὑακίνθου. Κεφ. ξγ'.

ΥΑΚΙΝΘΟΣ φύλλα ἔχει ὅμοια βολβῷ· καυλὸν ἀσθμαίαν, ὑψηλόν, λεπτότερον τοῦ μικροῦ δακτύλου, χλωρόν· κόμην ὀπισθίαν κορτὸν, αἴθοντα πολλὰ πορφυρωδῆ· ῥίζαν καὶ αὐτὸν ἀμυῶδη φερῶν βολβῷ. Ἣν σὺν οἴνῳ λευκῷ ὀπὸ παίδων ἀνύβαντες τρισὶν πυάθοις· ἴσχει δὲ καὶ χειλίας, καὶ ὕπνα ἄγει πολύσπα, ἐς φαλαγγιοδηκτίας σὺν φελλῷ· καρπὸς δὲ σπληνικώτερος ὢν καὶ αὐτὸς, θηριακοῖς ἁρμόζει· ἔστι δὲ καὶ αὐτὸν καθαίρει σὺν οἴνῳ πυόμβρους.

Περὶ Μήκωνος ῥοιᾶς. Κεφ. ξδ'.

ΜΗΚΩΝ ῥοιὰς, ὠνόμασται δὲ ἀφ' ἁβροῦ παχίος τὸ αὖθις ἀποβάλλει, φύεται ἐν ἀρούραις ἔαρος, ὅ τι ἐς συλλήψεως δὲ τὰ φύλλα ὁμοιάζει, ἢ βύζημα ἢ κιχωρίῳ ἢ θύμῳ, ἐπιμήκεα, μακρότερα δὲ καὶ παχέα· καυλὸν δὲ ὄρθιον, παχύν, ὡς πήχεως· αὖθος φοινικοῦν· ἐσθίεται δὲ καὶ λευκὸν, ὅμοιον τοῖς τῆς ἀγρίας ἀνεμώνης κεφαλὴ δὲ περιμήκης, ἥπερ καὶ τοῦ τῆς ἀνεμώνης καρπὸς πυρρός· ῥίζα ὀθνείης, ὑποπόλιον, δακτύλου ἔχουσα μικροῦ πάχος, πικρά. Ταύτης τὰ κεφάλια πέντε ἢ ἑξ μετ' οἴνου κυάθων τριῶν ἐφέσιος ὡς εἰς ἑξ ἀγωγῆς, πότιζε οἷς ἂν βούλῃ ὑπνῶσαι. τῶν δὲ σπέρματος πόλιν ὅσον ὀξυβάφου σὺν μελικράτῳ, χειλίαν ὑπνον μαλάσσει.

V. σκίμους

V. φυλλάρια.

Dalech. βάλανος legendum suspicatur.

Al. πεπλεγμένας

V. non habet.

V. διαλύει καὶ χειμαζομένους

V. σαρκία. Orib. φασιν

V. non habet.

Al. ἔθι γὰρ ἀναφλύει

Al. γονοῖσιν

V. caret.

Lacuna legit in antiquo, ἀλ' ὅτε παρακαθέ ἑφελῆ.

V. inserit, ἡμιοδακτίης.

Al. ὡς πρέπει.

Quidam ἢ ἀζέμῳ non legunt.

Tragus. ἀγνοεῖται

Cornarius restituit ex Plinio legendum suspicatur.

μίζουσιν δὲ καὶ μελιτθοῦσι καὶ ἐπιδείοις πρὸς ὃ αὐτό. Τὰ δὲ φύλλα σὺν ταῖς κεφαλαίοις ἑψήσαντα πλατύσματα, φλεγμοναῖς ἁρμόζει. καὶ τὸ ἀφέψημα δὲ αὐτῶν αὐτὰ πινόμενον, ὑπνοποιόν ἐστι.

V. nõ habet quæ conclusa sunt.

Sic Lac. ex ver. cod. at vulg. ex. αὐτὰ πιν.

A ad idem præstandum mellitis placentulis & dulciarijs libis admiscetur. Cæterùm folia cum calycibus imposita, inflammationibus medentur: ac eorundem quoque decoctum fotu seu perfusione somniferum est.

Περὶ Μήκωνος ἡμέρου καὶ ἀγρίας.

Κεφ. ξέ.

De Papauere satiuo & syluestri. Cap. LXV.

Μήκων ἡ μέν τις ἐστὶν ἥμερος, καρπωτή, ἧς τὸ σπέρμα ἀρτοπιέσται εἰς τροφὴν ἐν ὑγιείᾳ χρῶσιν· καὶ σὺν μέλιτι δὲ αὐτὴ σπόρμης αὐτῇ χρῶνται. καλεῖται δὲ θυλακῖτις. θύμβρας ἔχουσα τὸ κεφάλιον, καὶ τὸ σπέρμα λευκόν. Ἡ δὲ τις ἀγρία εἴληται μένην ἔχουσα τὴν κεφάλιον, μέλαν σπέρμα. ὃ καὶ πίτυς ὀνομάζεται· ὑπ' ἐνίων δὲ ῥοιὰς καὶ αὐτὴ, ἀφ' οὗ τὸ ῥεῖν ἐξ αὐτῆς τὸ ὀπόν. Τρίτη δὲ ἀγριωτέρα καὶ φαρμακωδεστέρα καὶ μακροτέρα τύπον, ἔχουσα τὸν κεφάλιον θύμβρᾳ. Κοινὴ δὲ αὐτῶν δύναμις ψυκτικὴ ὅλη· τὰ φύλλα καὶ αἱ κεφάλαι καταπλασσόμενα ὑπνοποιοῦσι. πίνεται δὲ πρὸς ἀχρυπνίαν τὸ ἀφέψημα. καὶ εἰς τὰ καλούμενα πλάσματα δὲ λεῖαι αἱ κεφάλαι μετὰ ἀλφίτων μιγνύμεναι, πρὸς φλεγμονὰς καὶ ἐρυσιπέλατα ἁρμόζουσι. δεῖ δὲ κόπτοντας αὐτὰς χλωρὰς αἰωρεῖσθαι εἰς ἐγχύσεις, καὶ ξηραίνοντας ἀποτίθεσθαι, ἡνίκα χρῆσθαι· καθ' ἑαυτὰς δὲ ἑψεῖσαι αἱ κεφάλαι τὸ ὕδατι μέχρις ἡμίσεως, εἶτα σὺν μέλιτι πάλιν ἑψεῖσαι, ἄχρις οὗ συναφῇ τὸ ὑγρόν, ποιοῦσι φάρμακον ἐκλεκτὸν, ἀνώδυνον πρὸς βῆχας καὶ ῥευματισμοὺς ἀρτηριακοὺς καὶ χιλιακὰς διαθέσεις. ἐνεργέστερον δὲ γίνεται, μιγνύντων αὐτῷ ἰσοχιλάδες χυλοῦ καὶ ἀκακίας. τὸ δὲ σπέρμα τῆς μελαίνης μήκωνος λεῖον σὺν οἴνῳ πολίζεται πρὸς ῥεῦμα χιλίας καὶ γυναικεῖον ῥοῦν. καταπλάσσεται δὲ ὅλη τὴν ἀχρυπνοῦσαν μὲν ὕδατος, κατὰ τὸ μετώπου καὶ τὴν χροιάν. ὁ δὲ ὑπὸς καὶ αὐτὸς ψύχων ὅλη πλέον καὶ παχυνῶν καὶ ξηραίνων· ληθαργικοὺς βραχὺς ὢν ὄγκος, ἀνώδυνός ἐστι καὶ ὑπνοποιὸς ἐν ποτοῖς· βοηθᾷ δὲ καὶ χιλιακαῖς διαθέσεσι πλείστον δὲ ποθεῖς, βλάπτει νευρῶν ληθαργικὰς, καὶ αἰσθητικάς. ποιεῖ δὲ καὶ κεφαλαλ-

Papaueris genus quoddam est satiuum & hortense, cuius semen in sanorum vsum ad panes adhibetur: eo etiam ex melle pro sesama vtuntur: thylacitin, quasi folliculosum, vocant. Capitulum id habet oblongum, & semen candidum. Alterum est syluestre papaueris genus, sessili calyculo & semine nigro. Nõnullis & ipsum rhœas ex eo dicitur, quòd ab eo liquor emanet. Quod pithithitis, quasi doliare nominatur. Est & tertium agrestius, ac medicatius, hisque longius, oblongo capitulo. Omnibus in commune vis est refrigerandi: proinde si folia cum capitibus ipsis in aqua decocta fuerint, somnum fotu conciliant: bibitur & decoctum contra vigilias. Calyces verò triti & cum polenta cataplasmatis admisti, inflãmationibus ac erysipelatis prosunt. Verùm ex ipsis dum adhuc virent tusis fingi trochiscos oportet, eósque siccatos ad vsum recondere. Ex ijsdem quoque calycibus per se in aqua decoctis ad dimidias, iterúmque deinde cum melle ad iustam spissitudinem percoctis eclegma conficitur, quod in tussi, arteriæ fluxionibus, cœliacísque affectibus doloris leuamentum præstat. Efficacius tamen redditur, additis hypocisthidis succo & acacia. Papaueris autem nigri semen tritum cum vino, potui datur contra fluxionem alui fluorémque muliebrem. At in peruigilijs fronti temporibúsque ex aqua imponitur. Ipse verò liquor refrigerat magis, incrassat, exiccatq; Sũptus crui magnitudine, dolores sedat, somnum conciliat, & concoctionẽ adiuuat: tussi, cœliacorumq; affectibus auxiliatur. Verùm si copiosior hauriatur, accersito lethargo etiã mortifer est. Est & ad capi-

V. legit, καταπλάσσονται δὲ καὶ τὸ μετώπου καὶ τὴν χροιάν, ὅπου χρὴ ὑποδύειν.

Al. Brodæi

tis dolores efficax, ſi cũ roſaceo irrigetur: vti & ad aurium dolores, ſi cũ amygdalino, myrrha & croco inſtilletur. Oculorũ inflámationibus cum oui luteo toſto & croco proficit: eryſipelatis ac vulneribus, cum aceto: podagris, cum lacte muliebri & croco: denique ſedi pro balano ſubditus ſomnum facit. In eo liquoris genere præſtantiſſimus cenſetur qui denſus & grauis eſt, odoratu ſoporifer, guſtu amarus, quíque facilè aqua diluitur, læuis, candidus, neq; aſper neque grumoſus, quíq; inter colandum non vti cera coit denſatúrve, ſed Soli expoſitus diffunditur, & ad lucernam accẽſus, minimè atra obſcuráve lucet flãma: qui denique poſtquá extinctus fuerit, ſuá odoris vim etiamnum conſeruat. Ipſum porrò admixto glaucio, aut gummi, aut ſyluestris lactucæ ſucco adulterant. Veruntamẽ qui glaucio fucatus eſt, dũ diluitur coloré croci reddit: qui verò agreſtis lactucę ſucco, exili & euanido eſt odore, aſperiórq; ſpectatur: qui deniq; gummi vitiatus eſt, inualidus eſt, inodorus atq; pellucidus. Nec deſunt qui eò demẽtiæ deuenerint, vt & adipem illi admiſcerẽt. Porrò ad oculorum medicamenta fictili nouo torretur, dum mollior fuluiórq; appareat. At Eraſiſtratus, Diagorá teſtatur illius vſum damnaſſe in auriũ doloribus & oculorum lippitudinibus, quoniá & viſus aciem hebetaret & ſoporifer eſſet. Addidit Andreas protinus excæcatum iri qui eo illinerẽtur, niſi adulteraretur. Mneſidemus prętereà vſum duntaxat olfactandi probauit ad conciliandũ ſomnum: alioqui ceu noxium damnat. Quæ quidẽ omnia cõmentitia eſſe experimento deprehenditur, ſiquidẽ effectus virium huiuſce medicaméti fidem facit. Quare nõ abs re fuerit liquoris illius excipiendi rationem ſubtexere. Nonnulli capita foliáque ipſa tundũt & prælo exprimũt, mox terentes in mortario, paſtillos effingunt: id meconium vocatur, multum opio ignauius. At opij faciendi ratio hæc eſt: Cum ros exaruerit, ſtellulam (quæ in ſummo papaueris capite viſitur) cultello ita ſcarificare oportet, vt ne penitus intrò adigatur, & à capitis late-

A χρῆσθαι σὺν ῥοδίνῳ ἐμβρεχόμενος ὀπαλγῆσαι
ᾖ, σὺν ἀμυγδαλίνῳ δὲ καὶ σμύρνῃ καὶ κρόκῳ
ἐγχεόμενος. ὅτι δὲ φλεγμονὰς ὀφθαλ-
μοῦ, σὺν λευκῷ ὠῷ καὶ κρόκῳ δὲ ἀρί- Al. ἀνὰ
στοις ἑρυσιπέλατα δὲ καὶ τραύματα, σὺν ὄξει
τοῖς δὲ ποδάγραις, σὺν γάλακτι γυναι-
κείῳ καὶ κρόκῳ· τοῖς τε ἕδραις δὲ ἐκπυ- Al. ἐκπυεῖν
B λῳ αὐτὴ βαλάνου, ὕπνον ποιεῖ. κρίσεις δὲ
ἔστιν ἐπὶ ὀπτικοῖς καὶ βαρεῖ, ὃν δὲ τῇ Lacuna legit ex vet. cod. ὁ πυκνότατος καὶ λιπαρώτατος
ὀσμῇ καρηβαρὴς, πικρὸς δὲ τῇ γλώσσῃ, βύχε-
ρος διμιθὴς ὕδατι, λιπὴς, λευκὸς, οὐ τα-
χὺς, οὔτε θρομβοειδὴς, οὔτε συγκρεφόμε-
νος ὑπὸ διηθήσεως ὡς κηρὸς, ἐν τε τῷ ἡλίῳ
τηκὶς, ἀφαχιμιθὴς, ἢ παρὸς λίχνον ἐξα-
C πόλιθος οὐ ζοφώδη φλογί· φυλάσσειν
τε μέλι ὃ σκευαθῆναι τοιοῦτον τῇ ὀσμῇ
δυνάμενον. δολοῦσι δὲ αὐτὸν γλαύκιον μι-
γνύοντες ἢ κόμμι, ἢ χυλὸν ἀγρίας θρί-
δακος· ἔστι δὲ ὁ μὲν σὺν τῷ γλαυκίου, κρο-
κίζων τὸ τῇ ὀμίχλῃ· ὁ δὲ σὺν τῆς θρίδα-
κος, ἐξίτηλος τὴν ὀσμὴν ἢ παχύτερος· ὁ δὲ
D σὺν τῷ κόμμεως, ἄπους ἢ διαυγής. ἔνιοι δὲ Addit Lacuna ex vet. cod. καὶ ἄσπονον Al. ἀγνίαν
εἰς τοσοῦτον αἰσίας προήκασιν, ὡς καὶ σίαρ
παραμιγνύναι αὐτῷ. φύγνυται δὲ εἰς τὰ
ὀφθαλμικὰ ἐπ' ὀστράκου καινοῦ, ἕως ἂν
μαλακώτερος ᾖ κιρρότερος φανῇ. Ἐρα-
σίστρατος μὲν τοι Διαγόραν φησὶν ἀποδοκι-
μάζειν αὐτῷ τινὰ χρῆσιν ὅτι τῷ ὠπαλγι-
E κῷ καὶ ὀφθαλμιώντων, ἀμβλυω-
πὸς εἶναι ἢ καρηβαρῆ. Ἀνδρέας δέ φησιν, ὅ-
τι οἱ μὴ ἐδόλουτο, ἐτυφλοῦντο ἂν οἱ εἰς χρεί-
αν ἰόντες αὐτῷ. Μνησίδημος δέ φησι V. ordine his carent.
μόνον αὐτῷ χρῆσιν εἶναι τινὰ κατ' ὄσφρη-
σιν, εἰς ὕπνον ἁρμόζουσ· ἄλλως δ' ὀπιόλαι-
ον τυγχάνει· ἅτε ὂν ἧττον, τοῦ τῆς
F πύρας ἐλεγχόμενα. Δεῖ δ' ὀπιῶντυφᾶ-
σθαι ταῖς ἄρχαις τ' εἰσάγειν τὸ φαρμά-
κου. ὅκ ἄπιον δ' ἐστὶ χρῆσθαι τὸ τ' ἔξ-
πιον φ' συλλέγουσι τὸν ὀπόν. ἔνιοι μὲν γὰρ
καθάπερ μὴ τ' φύλλων κάπτοντες ἐκρίζουσι
διὰ πυξῖδος, ἔπειτα ῥίζοντες ἐν θυίᾳ, αἷμα πλάτ-
τουσι ἐχίσκοις· καλέσαι δ' τὸ πυῶδες μα-
G κρὸν, ἀδρανέστερον τῷ ὀπῷ. ὀπίζουσι δὲ
δεῖ, μετὰ δὲ τὰς δρόσους αἴρεσθαι, καθάπερ μαχαιρίῳ ᾧ ἀστείσκῳ, ὡς
μὴ εἰς τὸ ὀστοῦν ἀφικνεῖσθαι, καὶ ὅτι πλα-

γίων δὲ τῆς κοιλίας ἐπ' ὀλίγας ἐκτίμῳ ἐξεπιπολῆς, καὶ ἀποψᾶν τὸ δάκρυον ἐμβεβλημένον δακτύλῳ εἰς μύκητα· εἶτα πάλιν ἐπιπορεύεσθαι μέν ἐστι πολύ· βέλτιστον γὰρ ἐπισυνεχῶς, εἶτα τῇ ὑστεραίᾳ δὲ ὅπως ἐπιτηδεύεται. δεῖ δὲ καὶ ὑγιᾶ τρίβειν καὶ ἀποθλᾶν αἰσθανόμενον. ἐν μὲν τοῖς τήμερον ὀπίσω ἀναχωρεῖν δεῖ, πρὸς τὸ μὴ ἀποψᾶσθαι τῷ ἱματίῳ ὃ ὀπόν.

Vtcrq; Goupyl. codex ὦ Sylburgij.

Περὶ Μήκωνος κεραλιτίδος. Κεφ. ξς'.

Μήκων κεραΐτις, οἱ δέ, πολύφυλλον, οἱ δέ, ἀγρίαν μήκωνα, οἱ δέ, θαλάσσιον φύλλα ἔχει λευκά, δασέα, ὅμοια φλόμῳ, περιτρεμένα τῷ ἀνθεμίδι, ὡς καὶ τὰ τῆς ἀγρίας μήκωνος, καὶ τὸν καυλὸν ὅμοιον, αἶγος ὠτός. καρπὸν δὲ μικρόν, καμπύλον ὥσπερ κέρας, ὅμοιον τῷ τῆλεως ὀνομαζομένῳ, σπέρμα δὲ μικρόν, μέλαν, ὅμοιον τοῖς τῆς μήκωνος, ῥίζαν ἐξεπιπολῆς φυομένην, μέλαιναν, παχεῖαν. φύεται δὲ παραθαλασσίοις τόποις καὶ θαλασσίοις.

Vetus ξαχέα addit, & prudenter Sambu.

Ald. τηλεως

Δύναμιν δὲ ἔχει ἡ μὲν ῥίζα ἐφθεῖσα ἀγρίοις ἡμίσεσι ἐν ὕδατι καὶ πεθεῖσα, ἰχθάδας καὶ ἀπαπυκνὰς λεπίδας θεραπεύει· καὶ τὸν πάχεα ἢ ἀραχνώδη ὑρῶν ὠφελεῖ. Τὸ δὲ σπέρμα πλῆθος ὀξυβάφου πεθὲν σὺν μελικράτῳ, κοιλίαν ὑπερφυῶς καθαίρει· τὰ δὲ φύλλα καὶ τὸν αὐτὸν ἐκμάραντα καὶ θλάσαντα σὺν ἐλαίῳ ἐγχριόμενα δὲ, τὰ ὑπὸ κτενῶν ἄγρια καὶ νεφέλια ἀποκαθαίρει. ἔνιοι δὲ ἐπλανήθησαν, νομίσαντες ἐκ τούτης τὸ γλαύκιον γίνεσθαι διὰ τὴν τῶν φύλλων ἐμφέρειαν.

Περὶ Μήκωνος ἀφρώδους. Κεφ. ξζ'.

Μήκων ἀφρώδης, ὑπό δέ τινων Ἡρακλέα καλουμένη, καυλὸν ἔχει σπιθαμιαῖον, καὶ τὰ φύλλα στρόβα μικρά, τρυφερὰ ἐοικότα, καὶ καρπὸν περὶ αὐτοῖς λευκόν. ὅλον δὲ βοτάνιον λευκόν ἐστι καὶ ἀφρῶδες· ῥίζαν δὲ λεπτὴν * ὅτι πλέον. Ταύτης ὁ καρπὸς συλλέγεται ὅταν πλείους ἀδρυνθῶσι θῆκες, καὶ ξηρανθεὶς ἀποπίσσει· καθαίρει δὲ διὰ ἐμέτων, ὀξυβάφου πλῆθος σὺν μελικράτῳ λαμβανόμενος· ἰδίως δὲ ἡ τοιαύτη καθάρσις ὑπολιπικοῖς ἀρμόζει.

V. inseris μικὸς.

V. non legit conclusa.

Mathiol. & Oribas. cod. ἀποπίσσει.

ribus per directum ſummam cutem incidere, & erumpentem lacrymam digito in conchulam abſtergere, ac non ita multo poſt eò redire: tũ enim rurſum & alia denſata reperitur, atque etiam poſtero die. Tandem in pila teri & in paſtillos coacta reponi debet. Verumtamen interea dum inciditur, retrocedendum eſt, vt ne liquor veſtium affrictu deradatur.

De Cornuto papauere.
Cap. LXVI.

Corniculatum papauer alij paralium, ſeu thalaſſion, quaſi in maritimis naſcens, alij agreſte vocãt: folia habet candida, hirta, verbaſco ſimilia, ſerrata in ambitu ſylueſtris papaueris modo, & caule non diſſimili, flore ex luteo palleſcente, ſiliqua longa, in corniculi modũ inflexa ceu fœnigræci, vnde & nomen accepit: ſemine exili nigróque ceu papaueris: radice per ſumma ceſpitum naſcente, nigra, craſſa. Gignitur in maritimis & aſperis. Radici ea vis meſt, vt decoctà in aqua ad dimidias coxendicũ & iecinoris vitia potu ſanet; iiſque proſit qui craſſa & araneoſa quædam cum lotio reddunt. Semen acetabuli menſura ex aqua mulſa potũ, leniter aluũ purgat. Illita ex oleo folia floréſque, cruſtas emarginãt: argemas & nubeculas iumentorum inunctione depurgant. Cęterũm non deſunt qui ex hoc papaueris genere factitari glaucium falsò exiſtimarint; decepti quadam foliorum ſimilitudine.

De Papauere ſpumeo.
Cap. LXVII.

Papauer ſpumeum, ab aliquibus Heraclij vocatũ, caule eſt dodrantali, foliis admodum paruis, radiculæ ſimilibus, ſemine inter ea candido. Sed & herbula tota candida eſt atque ſpumea, radice alba, in ſumma terra naſcente. Legitur æſtate ſemen, cum integrè adoleuerit, aridúmque decíderit. Acetabuli autẽ menſura ſumptum in aqua mulſa, vomitione purgat, priuatimque huiuſmodi purgatio comitialibus prodeſt.

vl. in ſumma terra cute.

De Hypecoo. Cap. LXVIII.

HYPECOON aliqui hypopheō vocant. Naſcitur in triticeis ſegetibus aruíſque, folio ceu rutæ, ramulis exilibus. Natura ei eadē, quæ papaueris ſucco.

De Apollinari, ſiue Hyoſcyamo. Cap. LXIX.

HYOSCYAMVS frutex eſt caules emittēs craſſos, folia lata, oblōga, diuiſa, nigra, hirſuta: ſecūdùm verò caulē continua quaſi ſerie flores prodeunt, tanquā puncorū cytini, ſcutulis ſepti ſeminum plenis, ceu papaueris. Tria porrò ſunt eius genera. Vnū ſiquidē flores profert penè purpureos, folia ſmilaci proxima, ſemen nigrum, ac cytinos præduros & ſpinoſos: alterū flores habet luteos, folia & ſiliquas molliores teneriorēſve, & ſemē ſubflauū, urionis ſemini ſimile. Ambo inſaniā gignūt & ſoporem, ideóque vix in communē vſum recipiūtur. Tertiū genus quod mitiſſimum eſt, adeóq; ad medicinam vtile, pingue, molle, lanuginoſum, candidis floribus ac ſemine. In maritimis ruderibúſque naſcitur. Albo itaq; vtendū eſt: idq; ſi deſit, flauō vſurpari oportet. Nigrum enim ceu deterrimū improbatur. Recenti ſemine, folijs caulibúſque tuſis ſuccus exprimitur, qui ad ſolem exiccatur. Vſus autem eius ad annum dūtaxat protogatur, quia facilè corruptionē ſentit. Elicitur & ſeparatim ſuccus ex ſemine, cùm inaruit affuſa aqua calida tuſo & expreſſo. Eſt autem expreſſus eiuſmodi ſuccus liquore ſeu lacteo eiuſdem ſucco præſtātior, leniendíſque doloribus accōmodatior. Ipſa verò herba virens contuſa, farina è tritico trimeſtri addita, in paſtillos redigitur atque reconditur. Porrò prius ſucci genus, & quod è ſicco ſemine exprimitur, collyrijs ſenſum doloris auferentibus vtiliter inſeruntur: proſunt & contra acres calidáſq; fluxiones, aurium dolores ac vuluæ mala. Cum farina autem polentáve, contra oculorum, pedum cæterarúmque partium inflammationes. Semen eadem præſtat, præterēáque ad tuſſim, deſtillationem, oculorum fluxiones dolo-

Περὶ Ὑπηκόου. Κεφ. ξή.

A Ὑπηκοον, ὃ δὲ ὑποφοινικαλῖδα φύεται δὲ ἐν τοῖς σίτοις καὶ ταῖς ἀρούραις· φύλλον δὲ ἔχει πηγάνῳ ὅμοιον, κλωνας μικρούς. Δύναμιν δ' ἔχει ἀναλγησίαν ὁμοίαν τοῖς μήκωνος ὀπῷ.

Περὶ Ὑοσκυάμου. Κεφ. ξθ'.

B Ὑοσκυαμος, θάμνος ὅστις καυλοὺς αἰεὶς παχεῖς, φύλλα πλατέα, ὀδμὴν, ἐχομένα, μέλανα, δασέα. πρᾶσις δὲ καυλοὶ ἐφεξῆς πεφύκασιν αἴγηι ὡς τοῖς ῥοιᾶς κύπιροι, πεφραγμένοι ἀσπιδίσκοις σπέρματος μεστοῖς, ὥσπερ μήκωνος. ἔστι δὲ αὐτοῦ διαφορὰ τριττή. ὁ μὲν γὰρ, αἴγηι Ante addit. ταλαὶ

C ὑποπορφύρα φέρει, φύλλα σιλφίοις ὅμοια, σπέρμα μέλαν, ᾧ διὰ χιλίους σκληρὰς καὶ ἀκανθώδεις. ὁ δὲ πρὸς, αἴγηι μαλακὰς, φύλλα καὶ λοβοὺς ἁπαλώτερα, σπέρμα ὑποξάνθιζον ὡς τοῦ ἐρύσιμον· ἀμφότεροι δὲ οὗτοι μανιώδεις ὑπάρχουσι καὶ καρωτικοί, δύσπνοοι. Εὔπνοος δὲ ὁ πρὸς ἀπὸ τοῦ πόντου ὢν ὁ τρίτος λιπαρὸς καὶ ἁπαλὸς καὶ

D χροώδης, αἴγηι λευκὰ ἔχων, καὶ τὸ σπέρμα λευκὸν φύεται πρὰ θαλάττης καὶ ἐρήμιος. χρήσιμον οὖν ἐστὶ τὸ λευκόν. εἰ δὲ μὴ παρείη τοῦτο, χρηστέον δεῖ τῷ ξανθῷ, τὸ δὲ μέλαν ἀποδεκιμάζειν ὡς χεῖριστον. Χυλίζεται δὲ ὁ καρπὸς ἁπαλὸς καὶ τὰ φύλλα καὶ

E οἱ καυλοὶ κοπτόμενοι καὶ ἐκθλιβόμενοι, ἐν ἡλίῳ ξηραινόμενα τῇ ὑγρᾷ χρῆσις δὲ αὐτοῦ κατὰ ἑαυτὸν, διὰ τὸ εὔσπαστον. χυλίζεται δὲ καὶ τὸ σπέρμα αὐτοῦ καὶ ἰδίαν κοπτόμενον χρηστὸν, ὑφ' ὕδατος θερμοῦ τριβόμενον καὶ ἐκθλιβόμενον· ἔστι δὲ βέλτιον τοῦ πυρῶ τὸ χύλισμα, καὶ ἀνωδυνώτερον. ἡ δὲ

F χλωρὰ κοπεῖσα καὶ μιγεῖσα σταφὶς ἀλλήρῳ, αἱ ἁπλάδες εἰς ἀρθρίσκους, καὶ ἀποτίθεται. ἁρμόζει δὲ τὸ πρῶτον χύλισμα καὶ τὸ ἀπὸ ξηροῦ τοῦ σπέρματος εἰς κοιλίας ἀνώδυνα, καὶ πρὸς ῥεύματα δριμέα καὶ θερμά· ὀπαλγίαν τε καὶ τὰ πρὸς οὖς ἕλκεα. σὺν ἀλεύρῳ δὲ ἢ ἀλφίτοις, πρός

G τε ὀφθαλμῶν φλεγμονὰς καὶ ποδῶν καὶ τῶν ἄλλων. ὃ δὲ σπέρμα τὰ αὐτὰ παρέχει, πιοῦσα καὶ πρὸς βῆχας καὶ καταῤῥοίας, καὶ ῥεύματα ὀφθαλμῶν καὶ πρὸς

Ista addūt Crib. & v. codex Lacunæ.

V Lac cod. add. τῶν κενεῶν.

Mar. legit χλόη. Lacuna legit in antiquo cod. ex ἀπὸ τοῦ ἀνθρίσκου ἕως τοῦ ἀνθρίσκου. Alia omnia ἀνώδυνα καὶ

δωνίας, πρὸς τὴ ῥοῦν γυναικεῖον καὶ τὰς ἄλλας αἱμορραγίας, ὄσον ὀβολὸς σὺν μήκωνος σπέρματι καὶ μελικράτῳ σοβεῖν. ἁρμόζει καὶ πρὸς ποδάγρας, ὄρχεις πεφυσωμένοις, μαστοὺς ἐν τοκετῷ ἐπαγομένοις, λῶτον μετ' οἴνου καταπλασσόμενον, καὶ εἰς τὰ ἄλλα ἀνώδυνα καταπλάσματα μίγνυται ὠφελίμως. καὶ τὰ αἱ ἀποπλασμένα φύλλα, εἰς πόματα τὰ ἀνώδυνα εὔχρηστα, μιγνύμενα ἀλφίτοις καὶ καθ' ἑαυτὰ καταπλασσόμενα. τὰ δὲ περίφαλα φύλλα καταπλαστέα, ἀνωδυνώτατα πρὸς πόματα πόνον. πεῖα δὲ ἡ τέτταρα πινόμενα σὺν οἴνῳ, ἡπιάλοις πυρετοὺς διαπαύει· ἐφεψόμενα δὲ ὡς λάχανα καὶ βρωθέντα πυελίου πλῆθος, μετρίαν παρέχοντα ἐργάζεται. φασὶ δὲ ὅτι ἐάν τις ἕλκος ἔχοντα τὸ κεφάλαιον ἐγκλύσῃ, τὸ αὐτὸ ἀπεργάζεται. ἡ δὲ ῥίζα μετ' ὄξους ἐφεψηθεῖσα, ὀδοντάλγιας ὄντως ἀφέλκυσμα.

A rétque efficax, itémque contra fluorem muliebrem, aliáſque ſanguinis eruptiones, ſi oboli pondere cum papaueris ſemine ex aqua mulſa bibatur. Subuenit & podagris, teſtibus inflatis, mammíſque à partu tumentibus, ſi tritum ex vino imponatur. Denique & alijs cataplaſmatis quæ doloris leuamentum præ- B ſtant vtiliter admiſcetur. Quin & in paſtillos digeſta folia medicamentis omnibus dolores ſedátibus tum per ſe, tum etiam ex polenta vtiliter imponuntur. At recentia folia illita, ad mitigandos omne genus dolores apprimè ſunt idonea. Eadẽ terna quaternáve cum vino pota, febres epialas depellunt. Cocta verò olerum inſtar, & tryblij menſura eſitata, mediocrem mentis alienationem faciũt. Aiunt & idem C efficere, ſi cui in colo vlcus ſentienti infundantur. Cæterùm radice in aceto decocta dentes vtiliter in dolore colluuntur.

V. caret vſque ad ἡ καθ' ἑαυτὰ

Additur in vet. cod Lac. ſine. Legitur in antiquo excẽpl Lac. post δι' ὑγιάσεως

V. caret hac periodo.

V. de μίλιφ

V. quidam add. σὺν γλανεῖ, vt annotes Lacuna.

Περὶ Ψυλλίου. Κεφ. ό.

De Pſyllio. Cap. LXX.

D PSYLLIVM folio eſt coronopodis, hirſuto, at longiore, ramulis dodrantalibus, toráque herbula fœni modo tenuis ac minutula. Coma verò ipſius à medio caule ducit initiũ, capitulis duobus tribúſve conglobatis: in quibus ſemen pulicibus ſimile, nigrum atque durum. Naſcitur in aruis & incultis. Vis ei refrigerans: articulorum morbis, parotidibus, tuberculis, œdematis luxatíſque & capitis dolori cum roſaceo aut aceto aquáve impoſitũ auxiliatur. Infantium quoque enterocelis ac eminenti vmbilico illitum ex aceto medetur. Acetabuli verò menſuram tritam in duabus aquæ E heminis macerari oportet, ac vbi ſeſe aqua denſauerit, lentorémve contraxerit, illini. Siquidem vehementer refrigerat: ſed & in feruentem aquam immiſſa calorem reprimit: denique & contra eryſipelata eſt efficax. Fama eſt, ſi virens herba domum importetur, pulices arceri. Tuſa porrò cum adipe, ſordida malignáq; vlcera repurgat. Succus fluxione infeſtatis ac vermiculoſis auribus ex melle prodeſt. F G

Addendum hoc annotarunt Gouplylus ex vtroq; antiquo, quod in vulg. excẽpl. deſiderabatur.

V. addit ἢ πλείονα

V. caret.

Alii codices legunt, μελαπάτιον. Sed vulgata ſcriptura potior Add. Lac. ἐνεῖναι. Al. ἀπέρματα

V. ad finẽ vſque horum nihil legit.

Ψύλλιον φύλλον ἔχει κορωνόποδι ὅμοιον, δασὺ καὶ μακρότερον ἰκλῶνας δὲ ἀπὸ βαθμιαίους, καὶ τὸ ὅλον βοτάνιον χορτῶδες· ἄρχεται δ' αὐτοῦ ἡ κόμη ἀπὸ μέσου τοῦ καυλοῦ, κεφάλια δὲ δύο ἢ τρία ἐπ' ἄκρου στεφανηδόν· ἐν οἷς σπέρμα ψύλλοις ὅμοιον, μέλαν, σκληρόν· φύεται ἐν ἀρούραις καὶ χέρσοις. δύναμιν δὲ ἔχει ψυκτικὴν. ὠφελεῖ δὲ καταπλασσόμενον ἐρυσίπελας, πρωΐδας, φύματα, οἰδήματα, τρέμματα, κεφαλαλγίαν, μετὰ ῥοδίνου ἢ ὄξους ἢ ὕδατος· ἐντεροκήλας τε τοῖς ἐκτὸς παιδῶν καὶ ἐξομφάλους ὠμὰ ζῇ καταπλασσόμενον σὺν ὄξει. δεῖ δὲ ὀξυβάφου πλῆθος λαμβάνοντας βρέχειν ἐν δυσὶν ὕδασι ξηκύθοις, καὶ ὅταν παχὺ τὸ ὕδωρ, ὅτι πλατὴν ψυχὴν ἰκανῶς, καὶ εἰς ὕδωρ δὲ ζέον ὅταν πεφθῇ καταπλάσσειν πρὸ θέρμου. παύει δὲ καὶ πρὸς ἐρεσιπέλατα. φασὶ δὲ ὅτι κομισθεῖσα ἐν οἴκῳ χλωρὰ, οὐκ ἐᾷ φύλλας φυέσθαι. κοπεῖσα δὲ μετὰ στέατος, τὰ ῥυπαρὰ καὶ καχεκτοῦντα τῶν ἑλκῶν ἀνακαθαίρει. ὁ δὲ χυλὸς μετὰ μέλιτος πρὸς ὦτα ῥυματιζόμενα πονεῖ καὶ σκώληκας ἔχοντα.

De Solano hortensi. Cap. LXXI.

SOLANVM hortense frutex est esculentus, haud ita magnus, alarũ cauis multis, foliis nigris & quàm ocymi maioribus ac latioribus, fructu rotundo, ac primùm quidem viridi, mox vbi maturitatem assecutus est, nigro aut fuluo: est verò herba innocentis gustus. Vis ei refrigerandi: quare folia erysipelatis & herpetibus cum polline polentæ conuenienter imponuntur. Trita autem & per se imposita, ægilopa capitisque dolorem sanant, & stomacho æstuanti auxiliantur: parotidas cum sale detrita illitu discutiunt. Sed & ipsius succus valet aduersus erysipelata & herpetas cum cerussa, rosaceo & argenti spuma: ægilopas verò, cum pane. Infantibus quoque inflammatione laborantibus quam Syriasin vocant cum rosaceo infusus proficit. Inseritur & aquę vel oui vice collyrijs, quę contra fluxiones acres illinuntur: quin & aurium dolori instillatus prodest: fluorem etiamnũ muliebrem sistit in vellere subditus. Denique succus fuluo gallinarum cortalium fimo subactus & linteo appositus, ægilopijs præsentaneo est remedio.

De Solano Halicacabo. Cap. LXXII.

Est & alterum Solanum, quod peculiari nomine halicacabum vocant, alij physalida, id est, vesicariã, foliis antedicto similibus, verùm latioribus: huius caules posteaquam adoleuerũt, proni terram spectant: est autẽ fructus intra folliculos orbiculatos vesicis similes fuluus, rotundus ac lævis ceu vuæ acinus: quo etiam coronarij vruntur, corollis intorquentes. Vim vsúmque obtinet hortensis solani, nisi quòd in cibos minimè recipitur. Valet autẽ fructus epotus ad expurgandũ morbum regium, qua præditus est vrinæ ciendæ facultate. Cæterùm ex vtriusque solani herba succus elicitur, qui siccatus in vmbra reconditur, & ad eadem illa pollet.

De Solano somnifico. C. LXXIII.

Solanum somnificum aliqui etiam halicacabum vocant: frutex est

A Περὶ Σπρύχνου. Κεφ. οβ'.

Σπρυχνος κηπαῖος ἐδώδιμος ἐστὶ θαμνίσκος, ὑ μέγας, μακάλας ἔχων πολλὰς· φύλλα μέλανα, ὠκίμου μείζονα ἢ πλατύτερα· καρπὸν ἀξιφερῆ, χλωρόν. μέλας ὁ ἢ κιρρὸς γίνεται μετὰ ὃ πεπανθῆναι· ἀλλαβὴς ὁ ἡ βοτάνη τροφὸς χεῦσαι.

B Δύναμιν ὁ ἔχει ψυχρὰν· ὅθεν τὰ φύλλα καταπλασσόμενα, ἁρμόζει πρὸς ἐρυσιπέλατα καὶ ἕρπητας μετὰ παπάλης ἀλφίτου· καθ' ἑαυτὰ δὲ ὑποπλάσματα, αἰγίλωπα θεραπεύει καὶ κεφαλαλγίαν· καὶ τοῖς καυσυμβύοις βοηθεῖ παρειδίδας δὲ διαφορεῖ σὺν ἀλεύρῳ καταπλασσόμενα. καὶ ὁ χυλὸς δὲ αὐτοῦ ποιεῖ

C πρὸς ἐρυσιπέλατα & ἕρπητας, σὺν ψιμυθίῳ καὶ ῥοδίνῳ καὶ λιθαργύρῳ· πρὸς αἰγίλωπα δὲ, σὺν ἄρτῳ. ἁρμόζει καὶ σιριῶσι παιδίοις, σὺν ῥοδίνῳ ἐμβρεχόμενος μίγνυται δὲ καὶ κολλυρίοις αὐτὴ ὕδατος ἢ ὠοῦ ὄγις πρὸς ῥύσεις δριμείας τοῦ ἐγκεφάλου·

D ὠφελεῖ καὶ ὠταλγίαν ὀσταγείς. ἔχει δὲ καὶ ῥοῦν γυναικεῖον, ἐν ἐρίῳ τεθὲν ὑγρόν. ὁ δὲ χυλὸς ἀναγκαῖος ἐστὶ πρὸς αἰγίλωπας, συμμαλασσόμενος ἀφόδῳ πυρᾶ ὀρνίθων καὶ περιστερίων, καὶ ῥάκει ὑποπλάσμενος.

Περὶ Σπρύχνου Ἀλικακάβου. Κεφ. οβ'.

E Ἔστι καὶ ἕτερον σπρύχνον, ὃ ἰδίως Ἀλικάκαβον καλοῦσιν, ᾧ ὄμοιον τῷ προειρημένῳ, πλατύτερος μέντοι καὶ λεῖος δὲ αὐτοῦ μετὰ ὃ αὐξηθῆναι χαμαικλινὴς γίνεται· καρπὸν δὲ ἔχει ὑαλοειδεῖς ἀξιφέρεσιν ὁμοίους φυσαῖς, πυρρόν, ἀξιφερῆ, λεῖον, ὡς ῥᾶγα σταφυλῆς, ᾧ καὶ οἱ στεφανοπλόκοι χρῶνται καταπλέκοντες τοὺς στεφάνους. Δύναμιν δὲ ἔχει καὶ χεῖρον τοῦ αὐτοῦ τοῦ κηπαίου σπρύχνου· χρεὼν δὲ βιβρώσκεσθαι. Δύναται ὁ καρπὸς αὐτοῦ πινόμενος ἕκτριτον ἀποκαθαίρειν, ὑρητικὸς ὤν. χυλίζεται δὲ ἀμφοτέρων ἡ πόα, ᾗ ξηραίνεται ἐν σκιᾷ πρὸς

G ἀπόθεσιν· παῖς δὲ πρὸς τὰ αὐτά.

Περὶ Σπρύχνου ὑπνωτικοῦ. Κεφ. ογ'.

Σπρύχνον ὑπνωτικὸν, οἱ δὲ, ἀλικάκαβον, θάμνος ἐστὶ κλάδους ἔχων στολ-

λοιὶ, πυκνοὶ, σελιχώδεις, δυσθραύστους, φύλλων πλήρεις λιπαρῶν, ἐμφερῶν μήλῃ κυδωνίῃ· ἄνθος ἐρυθρὸν, μέγα· καρπὸν ἐν λοβοῖς κροκίζοντα· ῥίζαν φλοιὸν ἔχουσαν ὑπέρυθρον, εὐμεγέθη· φύεται ἐν πετρώδεσι τόποις, οὐ πόρρω θαλάσσης. Ταύτης ὁ φλοιὸς τῆς ῥίζης ἐν οἴνῳ ποθεὶς < ὀλκὴ, ὑπνωτικὸν ἔχει δύναμιν τῷ ὀπῷ τῆς μήκωνος ὑπεικτέραν. ὁ δὲ καρπὸς οὐρητικός ἐστιν ἄγαν· δίδονται δὲ ὑδρωπικοῖς κέρυμβοι ὡς ιβ'. πλείονες δὲ ποθέντες, ἔκστασιν ἐργάζονται. βοηθοῦνται δὲ μελικράτῳ πολλῷ πινομένῳ. μίγνυται καὶ αἰωδύνοις ὀδόντων χυλὸς αὐτῆς, καὶ ἔγχύσεις· ἐναφεψηθεὶς δ' οἴνῳ καὶ διακατούμενος, ὀδοντολγίας ἀφαιρεῖ. ὁ δὲ χυλὸς τῆς ῥίζης ἀμβλυωπίας μετὰ μέλιτος ἐγχριόμενος πραΰνει.

V. caret.

V. ὑπωχλοῦσι μικρὸν Margo addit. ὑπόφαιον ὑπόλευκον, σπέρμα τριγωνοειδὲς ὅμοιον ὀρόβου ὡς ἐπὶ τὸ πολύ.

Al. ὡς πίττα. V. caret.

Al. ὑποχλοῦσι

Al. εἰωδοῦσιν ἔγχύσεις ὁ χυλὸς αὐτῆς καὶ ὁ φλοιὸς αὐτοῦ. V. quidā ἐλαίῳ atque ita legit Lacuna.

Al. διακατούμενον ἐν τῷ στόματι ὀδοντολγίας παύει

A numerosis præditus ramis, denſis, caudicoſis, fructu contumacibus, pinguium foliorum cotoneęq; mali ſimilium plenis: flore rubro, prægrandi: fructu in folliculis croci colorem æmulante: radice denique grandi, cortice ſubrubro veſtita. Naſcitur in petroſis locis, non procul à mari. Radicis cortex drachmæ B pondere in vino potus, ſomniferam vim habet, quàm opium mitiorem: fructus autem potenter vrinam cit: atque adeò corymbi duodecim hydropicis exhibentur: quòd ſi plures numero propinentur, mentem è ſua ſede & ſtatu dimouent. Sed remedio eſt aqua mulſa copioſa potui data. Paſtillis etiam ac doloris leuamentum præbentibus medicamentis ſuccus eius admiſcetur. Idē decoctus in vino ſi ore contineatur, doloribus dentium ſuccurrit. Cæterùm radicis ſuccus cum melle inunctus, oculorū hebetudines tollit.

Περὶ Στρύχνου μανικοῦ. Κεφ. οδ'.

De Solano manico ſeu furiali. *Cap. LXXIIII.*

Στρύχνον μανικὸν, ὃ ἔνιοι * πέρσιον, ⓓ δὲ, Θρύον καλέσαν. Τούτου τὸ μὲν φύλλον πλατύτερον ἐστὶν ὑοσκυάμου, μεῖζον δὲ πρὸς τὰ τῆς ἀκάνθης, ἣν τινες καὶ παίδηρως καλεῖσιν· καυλοὶ δὲ ἀπὸ τῆς ῥίζης ὑποφυεῖς δίχα ἢ ιβ'. ὀργυιὰς ἔχοντες ὕψος· τὸ κεφαλαῖον ὀπωρικὸν ὁμοίως ἀχράδι, μέλανα, ῥαγάδας ἢ ιβ'. ὁμοίας κισσοῦ κορύμβοις, μελανὰς ὥσπερ σταφυλή. ῥίζα δὲ ὑπέστι λευκὴ, παχεῖα, κοίλη ὡς πηχίου· φύεται ἐν ὀρεινοῖς χερσαίοις καὶ προσωλυμίοις καὶ πλατάμωσι. Δύναμιν δὲ ἔχει ἡ ῥίζα πινομένη μετ' οἴνου < ὁ σπλῆνος, φαντασίας ἀποτελεῖν οὐκ ἀηδεῖς· δύο δὲ < ποθεῖσα, ἐξισάνουσιν ἄχρι τεσσάρων ἡμερῶν· δ'. δὲ ποθεῖσα, καὶ αἰσθήσεως. ἀντιφάρμακον δέ ἐστιν αὐτοῦ μελίκρατον, πολὺ πινόμενον καὶ ἐξεμοῦμενον.

Theoph. θρύον, pro quo reponit Scaliger θρύον ἡλιακόν.

Vtrtque ῥίζαν, quæ ex lenticula Goupyli, vera eſt huius loci ſcriptura. Sic & ὁμοίους, μελανὰς.

V. πηχυῖα

D Solanum manicum ſeu furiale nonnulli periſſon, alij thryon appellauere. Huic folium erucæ proximum, at maius, ad acanthi quem pęderota vocant, folio accedens. Caules verò à radice proceros emittit decem aut duodecim, vlnæ altitudine adoleſcentes: caput in cacumine oliuæ figura, at platani pilularum inſtar hirſutius, maius tamen illa atque craſſius: florem nigrum, cui ſuccedit fructus racemoſus, rotundus, niger, denis aut duodenis conſtans acinis, corymbis hederæ ſimilibus & ceu vuæ mollibus. Radix ſubiacet candida, craſſa, concaua & E ferè cubitalis. Naſcitur in montoſis locis vento perflatis, atque littoralibus petris. Vis ea radici, vt drachmæ vnius pondere pota ex vino, varias ſpecies & imagines haud iniucundas menti repræſentet: duplicatus autem hic modus ad triduum vſque inſaniam, ſeu mentis alienationem faciat, & quadruplicatus, mortem etiam repræſentet. F Remedio eſt aqua mulſa largiùs epota, móxque identidem vomitione reddita.

De Doryenio. Cap. LXXV.

DORYCNION (Crateuas halicacabũ aut caleam vocat) frutex oleæ nuper prodeunti similis: nascitur in petris nõ procul a mari, ramis cubito breuioribus, foliis oleæ similibus colore, at minoribus firmioribúsque ac vehementer asperis, flore candido, folliculis in cacumine densis, ceu ciceris: in quibus quina senáve minuta semina, rotúda, exigui erui magnitudine, læuia, firma & verticolora: radix ad digiti crassitudinem & cubiti longitudinem adolescit. Et hoc quoque somnifera esse creditur: copiosius verò haustum, enecare. Nec desunt qui dicãt eius semen in amatoria experti.

De Mandragora. Cap. LXXVI.

MANDRAGORAM nonnulli antimalum, aliqui dirceam, alij etiam circæam itcirco vocant, quòd credatur radix in amatorijs efficax esse. Duo eius genera: niger, qui fœmina existimatur, thridacias appellatus, foliis est quam lactucæ angustioribus & longioribus, virosis ac graueolẽtibus, in terra sparsis: atque inter ipsa, mala gerit sorbis similia, ex luteo pallida, odorata, & in his semen ceu pyrorũ. Radicibus autẽ inhæret bene mágnis, binis terniſve inuicem implicitis, nigris foris, intus albis, crasso cortice vestitis: caule verò viduus est. Alterius candidi, qui & mas dicitur, & nonnullis morion vocatus est, folia sunt magna, alba, lata, læuia ceu betæ: poma quàm prioris duplo maiora, colore in crocum inclinante, iucundè cũ grauitate quadam olentia: quæ si mandantur à pastoribus, ij quodammodo sopoporantur: radix antedictæ similis, at maior atque candidior: orbata & hæc caule. E radicis recenti cortice tuso ac prælis subiecto succus exprimitur, quem in sole versatum, vbi densatus fuerit, fictili vase recondi oportet. Succus fit & è malis simili planè modo, sed aliquantò ignauior. Quin & detractus radici cortex filóque traiectus ad vsum suspenditur. Aliqui radices in vino ad tertias decoquunt, excolatúmque ius asseruant, ciúsque cya-

A Περὶ Δορυκνίου. Κεφ. οε'.

ΔΟΡΥΚΝΙΟΝ, Κρατεύας ἁλικάκαβον ἢ καλέουσι καλάν, θάμνος ὅμοιος ἐλαίᾳ ἀγρίᾳ· κλωνας ἔχων ἑλαστινας πήχεως· φύεται ἐν πέτραις, ἀπὸ πόρρω θαλάσσης, φύλλα ἔχων ὡς χαμαιπέλαια πλατέα, μικρότερα ἢ κατὰ γερόντερα, καὶ βραχέα ἰσχυρὰ· αὐτὸς λευκὸν, ἐπ' ἄκρου ἔχων πυκνὰ θυλάκια ὥσπερ ἐρεβίνθου. ἐν οἷς σπερμάτια στρογγύλα ε ἢ ς'. ὅσοι ὄροβοι μικροὶ, λαῦα, ἰσχυρὰ καὶ ποικίλα· ῥίζαν πάχος δακτύλου, μῆκος δὲ πήχεως· δοκεῖ δὲ καὶ τοῦτο ὑπνωτικὸν εἶναι· πλεονασθὲν δὲ, ἀναιρεῖ· φασὶ δέ τινες καὶ τὸ σπέρμα αὐτοῦ εἰς τὰ φίλτρα παραλαμβάνεσθαι.

Περὶ Μανδραγόρου. Κεφ. οϛ'.

ΜΑΝΔΡΑΓΟΡΑΣ, οἱ μὲν αὐτίμηλον, οἱ δὲ δίρκαιαν, οἱ δὲ κιρκαίαν καλοῦσιν, ἐπειδὴ δοκεῖ ἡ ῥίζα φίλτρων εἶναι ποιητική. ἔστι δὲ αὐτοῦ ὁ μὲν θῆλυς, ὁ μέλας, ὀνομαζόμενος θριδακίας καλούμενος· φύλλα ἔχων στενότερα καὶ μακρότερα θριδάκων, βραχέα καὶ βαρέα καὶ τὸ ὀσμῆ, κεχυμένα δὲ ὑπὸ γῆν. καὶ περὶ αὐτὰ μῆλα οἷοις ἐμφερῆ, ὠχρά, ὠδώδη, ἐν οἷς ἡ καρπὸς ὥσπερ ἀπίου· ῥίζαν μεγάλης δύο ἢ τρεῖς, αἰτιμπεπλεγμένας ἀλλήλαις, μιγαίαν· καὶ τὸ ὑπόφαιον, ἔνδοθεν λευκὸν καὶ παχύφλοιον· καυλὸν δὲ οὐ φέρει. Τοῦ δὲ ἄρρενος καὶ λευκοῦ, ὃν ἔνιοι κώριον ἐκάλεσαν, φύλλα ἐστὶ μεγάλα, λευκὰ, πλατέα, λαῦα καθάπερ τεύτλου· τὰ δὲ μῆλα δίπλασια, χροιὰν ζόλα τῇ χροιᾷ, ὠδώδη μὲν καίρως πως· ἃ καὶ ἐσθίουσιν οἱ ποιμένες πρὸς ὑπνοφορίαν· ῥίζα δὲ ὁμοία τῇ τοῦ αὐτῆς, μείζων δὲ καὶ λευκοτέρα· ἄκαυλος δὲ καὶ αὐτή. Χυλίζεται δὲ ὁ φλοιὸς τῆς ῥίζης χλωρὸς κοπτὸς καὶ ὑποτεθεὶς πιέζει. δεῖσαι δὲ λεανθείσας μὴ δεῖ συσφαῖραι ἀσφάλειαν ἐν ὀστρακίνῳ ἀγγείῳ. χυλίζεται δὲ καὶ τὰ μῆλα ὁμοίως, ἀνηλιωθέντα γίνεται τὸ ἐξ αὐτῶν χύλισμα. καὶ ὁ φλοιὸς δὲ τῆς ῥίζης ἀφελόμενος καὶ ὀξυβαφηθεὶς καὶ ὀξυβληθεὶς λίνῳ, χρεμάται εἰς ἀπόθεσιν. ἔνιοι δὲ καὶ ἑψοῦσιν οἴνῳ τὰς ῥίζας ἄχρι τρίτου, καὶ διυλίσαντες ἀποθέμενοι ἐν

V. Epit. ἐσθίουσι δὲ μῆλα ὁ ποιμήν.

Quidam inserunt ἐν τῷ ὕδατι Ald. in nouellis, λευκὰ καὶ τὸ &c. Quidam, στυπίῳ δὲ καὶ μηκωνίτῃ. Lac. legit in vet. cod. μηκώνιον δὲ καὶ σπέρμα.

V. quidã addit ἀνὰ τὴν ῥίζαν. V. ἢ ἐκ περὶ ὠκεανὸν quidam ex Ionia. V. ἐμφερῆ.

V. διαφόρως ἀπὸ ψευδῆ

V. μέλανα &c. nec male, inquit Dios. tibi contrarius esse videt. Samb. V. addit, καθάπερ τὰ ἐξῆς

Al. φασιανίδια

V. πέριον V. φλόμι

Al. πεπλάσια

Lac. legit in vet. cod. ἢ, καὶ ἐπὶ πλ.

V. subdit καὶ τὸ σπέρμα ὁμοίως ἀναιρεῖ δὲ καὶ πλεονασθὲν

πὶ τῶν ἀχρύπνων ἢ τοῖς ὑποδυομένοις κυάθῳ ἑνὶ, καὶ ἐφ' οἷς βούλονται αἰσθησόμενον τὸν ὑπνον ἢ τοῖς ἀλγοῦσι πίνουσι. ὁ δὲ ὀπὸς ὀβολοῖς δυσὶν πλῆθος ὑδρίας, σὺν μέλικρατι, ἄγει αἷμα φλέγμα καὶ μέλαν καὶ χολὴν καὶ ἐκβάλλει τοὺς ζῶντας μίγνυται καὶ εἰς τοὺς ὀφθαλμικοὺς καὶ αἰωδοῦσι δυνάμεις, καὶ παισὶν μαλακτικοῖς. καθ' ἑαυτὸν δὲ ὅσον ἡμιώβολον τοῖς ἕδραις, ἔμμηνα καὶ ἔμβρυα ἄγει, δακτυλίῳ τὸ αὐτὸ βαλάνου ὑπτιάζει, ὕπνον ποιεῖ. μαλάσσει δὲ καὶ ἐλίφαιρα λέγεται ἡ ῥίζα σὺν ἀλφίτοις ἀνὰ ὀβολοὺς ς'. καὶ εὐπλάστους· αὐτὸν εἰς ὃ αὖ τις βούληθῃ σχῆμα τοῦτο ποιεῖν. τὰ δὲ φύλλα τροφαῖς ἁρμόζει πρός τε ὀφθαλμῶν φλεγμονὰς, καὶ τοῖς ὑπὸ τῶν ἑλκῶν μετὰ ἀλφίτου καταπλασσόμενα. διαφορεῖ δὲ καὶ πᾶσιν σκληρίαις καὶ ἀποστήμασι, χοιράδας, φύματα· τοῦτο πεδηκόμενά τισι χρῶ ὑπὲρ ἡμέρας ἑπτὰ ς'. στίγματα αὖθις τῶν ἑλκῶν ἀφανίζει. πεμφυλύζει δὲ τὰ φύλλα, ἀποπλύνει πρὸς τοὺς αὐτοὺς χρόνους. ἡ δὲ ῥίζα σὺν ὄξει λείᾳ, ἰριοπλάστοις ἰᾶται· πρὸς δὲ ἑρπητῶν πληγὰς, σὺν μέλιτι ἢ ἐλαίῳ· σὺν ὕδατι δὲ, χοιράδας καὶ φύματα διαχεῖ· καὶ ἀγρίαις πόνους παύει μετὰ ἀλφίτων. σκυβάλοις δὲ καὶ δίχα ἐμέσεως οἷος ἐκ τοῦ φλοιοῦ τῆς ῥίζης. δεῖ δὲ ἐμβάλλειν μυᾶς γ'. εἰς μετρητὴν οἴνου γλυκέος, διδόναι τὸ ἐξ αὐτοῦ κυάθους γ'. πρὸς μέλλοντι τίμνεσθαι ἢ καίεσθαι, ὡς προείρηται· οὐ γὰρ αἰσθήσονται τοῦ ἁλγήματος, διὰ τὸ καταφέρεσθαι. τὰ δὲ μᾶλλον ὀσφραντὰ νόσημα καὶ ἰαθήσεται, καρωτικὰ· καὶ ὁ ἐξ αὐτῶν χυλὸς πλοιοτάτιλα ἦ, καὶ ἀφώνους ποιεῖ. ὃ δ' αὐτὸ μᾶλλον πολὺν, ὑστέρας καθαίρει προεκτὸς δὲ μετ' ἀπύρου δίδοται, ῥοῦν ἴσχειν ἐρυθρὸν· ὀπίζει δὲ τοὺς ἐχαπτομένους τῆς ῥίζης πολυειδῶς, καὶ τὸ συῤῥέοντος εἰς τὴν κοιλότητα συλλεγόμενον. ἔστι δὲ εὐεργέστερος ὁ ὀπὸς τοῦ χυλοῦ· καὶ ὁ μὲν χυλὸς δὲ τόπῳ φέρεται ὅπου αἱ ῥίζαι· ὁ δὲ ὀπὸς διαίνει δὲ ὃ πιοῦσι ἢ πίεσι.

V. carte.
V. quidā carnem.
V. addit, vbi ad formandum ex ea quod libuerit.
Epit. addit, Ad menstrua & partus. Sed pulsat ex Symb.
V. Symeonis & Mesue. Salomonis.

thum vnum propinant in peruigilijs grauioribúsque partium quarúmuis doloribus, itémque ante sectiones vstionésve, vt ne sentiátur. Ipse verò liquor binis obolis ex aqua mulsa potus, veratri instar supernè pituitam bilémq; atram extrahit: at potu largiore, vitam adimit. Miscetur & oculorum medicamentis, iisque quibus dolores leniuntur, ac pessis quoque emollientibus. Per se autem semioboli pondere appositus, menses ciet atque partus: sedi quoque pro balano inditus, somnum conciliat. Porrò & radix ebur emollire fertur, quæ senis horis cũ eo decocta fuerit: præterea áque ita tractabile ipsum efficere, vt quam quisque voluerit formam facilè suscipiat. Folia verò recẽtia oculorum inflammationibus, iisque quæ vlceribus superueniunt, cum polenta conuenienter imponuntur. Sed & duritias omnes, apostemata, strumas & tubercula discutiunt. Eadem si quinis seníve diebus leniter affricentur, stigmata citra exulcerationem delẽt. Illa quoque ad eosdẽ vsus in muria seruantur. Radix autem ex aceto trita, erysipelatis medetur: serpentium autẽ ictibus, cum melle aut oleo. At ex aqua, strumas atque tubercula dissipat, & articulorum cruciatus cum polenta sedat. Paratur & citra coctúram vinú è cortice radicis, dum ternæ minæ in vini dulcis cadum conijciuntur: atque dantur ex eo terni cyathi ijs qui secari vríve debent, vti antè dictum est: neque enim altiore somno sopiti dolorem percipiunt. Poma verò & olfactu & cibo sunt soporifera, itémque expressus ex ijs succus. At illa seu nimio odore, seu etiam largiore cibo, vocis vsum præcludunt. Semen autem ipsorum epotum, vuluam purgat, subditúmque cum sulphure ignem minimè experto, rubrum sistit fluorem muliebrem. Cæterùm circunscarificata punctisque multifariam aperta radice liquor seu lacryma erumpit, quæ quidem in cauitatem recepta colligitur. At succus hac lacryma efficacior est. Neque verò, quod experiẽtia testatur, vbique lacrymam radices fundunt.

Porrò & alium tradút esse mandragoram, qui morion etiam nominetur. Nascitur is in opacis & iuxta specus, folijs albi mandragoræ, at minoribus, penè dodrantalibus, candidis, radicem ambienti bus: quæ quidem tenera est candidáq;, paulo maior palmo, pollicémque crassitudine æquat. Hanc narrant eporam drachmę pondere, aut cum polenta in placenta obsoniove deuoratam, infatuare, vsúmque rationis intercipere. Obdormiscit enim homo eadé qua illam comederit figura, sensus impos ternis quaternisve ex quo data est horis. Sed & illa Medici vtuntur, cùm secandi vrendive necessitas adest. Aiunt insuper pro antidoto esse radicem, si cum solano manico bibatur.

De Aconito. Cap. LXXVII.

ACONITVM aliqui pardalianches, alij cammarum, alij thelyphonon, alij myoctonon, alij denique theriophonon appellauere. Folia habet terna quaternáve, ceu cyclamini aut cucumeris, minora tamen ac leniter aspera, caulem dodrantalem: radix scorpij caudam æmulatur, & alabastri modo splendet. Huius, vt aiunt, radice admota scorpius quasi resolutus torpescit, rursúmque apposito helleboro excitatur. Miscetur & oculorum medicamentis doloris leuandi vi prædítis. Enecat verò pantheras, sues, lupos ac ferarum genus omne, carnium frustulis inditum & appositum.

De Aconito altero. C. LXXVIII.

Aconitum alterum, quod nonnulli cynoctonon, alij lycoctonon vocant, plurimum in Italia nascitur Vestinis mótibus, à priore distans. Siquidem folia gerit similia platani, sed altioribus diuisa incisuris, minoráque multò & nigriora, caulem pediculi filicis instar nudum, cubitali altitudine aut etiam maiore, & semen in siliquis aliquatenus oblongis: radices verò in modum squillæ marinæ cirrorú nigras, quibus ad venationem luporum vtuntur. Insertæ siquidem crudis carnibus & à lupis deuoratæ, eos enecát.

A Ἰστεροῦσι δέ καὶ ἕτερον μύωπι λεγόμενον, φυομένῳ ἐν παλιστίοις καὶ τοῖς αὐτοῖς, ἰφύλλα ἔχουσαν ὅμοια τῇ λευκῇ μανδραγόρᾳ. μικρότερα δὲ ἀσπαραμιᾶ, λευκὰ, κύκλῳ περὶ τὴν ῥίζαν, οὐσαν ἀπαλὴν καὶ λιπαρὰν, μικρῷ μείζονα ἀσπαράγου, πάχος δακτύλου μεγάλου. ὧν φασὶ πυρῶν κόκκου ἕως B δ'. ἢ μετὰ ἀλφίτων ἑψηθὲν ὄψῳ ἢ πόματι, ἀπανωσιᾶν. καὶ τινὰ δή φασιν ὁ ἄνθρωπος ἐν ᾧ ἂν φάγοι χρόνῳ, ἀσθανέσθαι οὐδένος ὅτι ὥρας γ'. ἢ δ'. ἀφ' ἧς ἂν ἀφῇ ἀπογεύσηται. χρῶνται δὲ τούτῳ οἱ ἰατροὶ, ὅταν τιμωρῆ ἢ καίειν μέλλωσι. φασὶ C δὲ καὶ αἰτιῶδες εἶναι τῇ ῥίζαν, πυρῶν μέλανος χρίχνυσθαι τὸ λευκὸν μασσόν.

Περὶ Ἀκονίτου. Κεφ.

ΑΚΟΝΙΤΟΝ, οἱ δὲ, πάρδαλιαγχὲς, οἱ δὲ, κάμμαρον, οἱ δὲ, θηλυφόνον, οἱ δὲ, μυοκτόνον εἴδη, θηριοφόνον. φύλλα ἔχει τέλα ἢ τέτρα, ὅμοια κυκλάμινῳ D ἢ σικύᾳ, μικρότερα δὲ καὶ τραχέα· καυλὸς δὲ ἀσπαραμιᾶν· ῥίζα ὁμοία σκορπίου οὐρᾷ, σίλλουσα ἀλαβαστροειδῶς. Τούτου τῆς ῥίζαν φασὶ προσαχθέντος σκορπίον, παραλύεσθαι αὐτὸν διαμείνασθαί τε παλιν, ἐλλεβόρου προσπεσόντος. μίγνυται δὲ καὶ ὀφθαλμικαῖς ἀλγηδονίοις δυνάμεσι κλείE ται δὲ καὶ πανθήρας καὶ σῦς καὶ λύκους καὶ πᾶν θηρίον, κρεάσιοις ἐνιθέμενον καὶ προβαλλόμενον.

Περὶ ἑτέρου Ἀκονίτου. Κεφ. οα.

Ἀκονιτον ἕτερον, ὃ ἔνιοι κυνοκτόνον, ⟨α⟩. δὲ λυκοκτόνον καλοῦσι. φυόμενον μάλιστα ἐν Ἰταλίᾳ, ἐν τοῖς καλουμένοις F Οὐεστίνοις ὄρεσι, διαφέρον τοῦ πρὸς αὐτῷ φύλλα δὲ ἔχει ὅμοια τοῖς τῆς πλατάνου, μᾶλλον δὲ ἐπιχισμένα καὶ μικρότερα πολλῷ καὶ μελάντερα· καυλὸν δὲ καθάπερ πτέριδος μίζονα ψιλὸν, ὕψος πήχεως, ἢ καὶ μείζονα· καρπὸν δὲ ἐν λοβοῖς ὀλιγοστοῖσι παχέας ῥίζας ὥσπερ πλεG κτάνας κεκλῶσθαι μελαίνας· αἷς χρῶνται πρὸς τοὺς τῶν λύκων θῆρας· ὀλιγίστης γὰρ ἐκπεσούσης τοῦ λύκου, ἀναιροῦσιν αὐτούς.

V. multi carent.

Lac. legit in vet. cod. ἐν ἰώδεσι

Has voces ἀ ἢ interserit Georgius ex vulgatis excepi. desiderabantur. Quidã aliter scripserunt, ἢ ἀκόνιτα Orib. ἀδοκί, ἢ ἀκόνιτα

V. addit οὐχὶ δὲ καλῶς, quod nõ esse negligendũ monet Lamb. Dodonæus legendum cẽset, ὁμοία σικύᾳ

V. addit τόπον χίον ἐν τῇ Ἰωνίᾳ καὶ ἐν Συρίᾳ χόπτουσι τὸν λύτραιον ἐκβάλ τόπον τὸ λεγόμενον Πεντανεῖ· οἱ πάντων γλυκὺ ὄντα τὸν μέν· ὃ δὲ καὶ ἐπιθάμενοι· χρῶνται τοῖς δὲ ἄνθρ. ἐν τῇ ὑγρᾷ, ἐὰν τὸ πρῶτον λαμβάνωσι ποτήριον, id est, bunni grana tria, vnũ quo venatores vtuntur, duo quibus medici ex his tertium est quod Pontium dicitur.

Vulg. exempl. ἰαχίνοις

V μικρότερα ἐκφαρμάκια ἐχόντα ἐν τῷ οἱ παρθένοι, ἀναιροῦσι.

Περὶ Κωνείου. Κεφ. οθ'.

ΚΩΝΕΙΟΝ καυλὸν ἀνίσου γονατώδη ὡς μάραθρον, μέλαν, φύλλα ὑπὸ νάρθηκι ἐμφερῆ, στενότερα δὲ καὶ ὀσμώδη. ἐπ' ἄκρων δὲ καὶ ἀποφύσεις καὶ σκιάδια· αἱ δὲ ὑπόλευκον σπέρμα ἐμφερὲς ἀνίσῳ, λευκότερον· ῥίζα κοίλη καὶ ἀβαθής. Ἔστι δὲ αὐτὸ καὶ φθαρτικὸν, καὶ ψύξει ἀναιρῶν. βοηθεῖται δὲ ἀκράτῳ. χυλίζουσι δὲ τὰ ἄκρα πρὸ τοῦ ξηραθῆναι τὸ σπέρμα, καὶ κόμην, καὶ συμβλύσεται καὶ πλείω, καὶ συντρέφεται εἰς ὑγίειαν· ἔστι δὲ καὶ πολύχρηστον εἰς τὴν ὑγιεινὴν χρῆσιν ξηραινόμενον· μιγνύμενοι γὰρ ἐπιπλάσμασι τοῖς ἀνωδύνοις καὶ λευκοῖς τὸ χύλισμα· ἕρπητάς τε καὶ ἐρυσιπέλατα καὶ ἀπλᾶ οἰδήματα σβέννυσιν. ἡ δὲ πόα καὶ ἡ κόμη λεία καταπλασσομένη τοῖς διδύμοις, ὀνειρώττουσι βοηθεῖ. παρίησι δὲ καὶ αἰδοῖα καταπλασθέντα. καὶ γάλα σβέννυσι, μαστούς τε ἐν παρθενίᾳ κωλύει αὔξεσθαι, καὶ διδύμους ἀτρόφους παρὰ τὴν παιδίων. συνεργάζεται δὲ ὅστι τὸ Κρητικὸν καὶ Μεγαρικὸν, καὶ τὸ Ἀττικὸν, καὶ τὸ ἐν τῇ Χίῳ καὶ Κιλικίᾳ φυόμενον.

Περὶ Σμίλακος. Κεφ. π'.

ΣΜΙΛΑΞ, οἱ δὲ, θύμαλον, Ῥωμαῖοι δὲ Ταξον καλοῦσι, δένδρον ἐστὶ πρὸς πλάτος ἐλάτῃ τοῖς φύλλοις καὶ μεγέθει, ἐν Ἰταλίᾳ καὶ ἐν Ναρβωνίᾳ τῇ κατ' Ἰσπανίαν φυόμενον. τοῦτο ἐν Ἰταλίᾳ φυόμενον καρπὸν ὀρνίθια ἐσθίουσι, μελαίνεται· οἱ δὲ ἐροσινεῖς καλοῦσι, ὑγροῖς παθήμασι περιπίπτουσι. τὸ δὲ ἐν τῇ Ναρβωνίᾳ, τοσαύτης δυνάμεως μετέχει, ὡς καὶ ἐκ τῆς σκιᾶς τοὺς ὑποκαθεσθέντας ἢ κοιμηθέντας βλάπτεσθαι, πολλάκις δὲ καὶ θνήσκειν. ἱστορεῖται δὲ περὶ αὐτῆς χάριν τοῦ προφυλάττεσθαι.

Περὶ Ἀποκύνου. Κεφ. πά.

ΑΠΟΚΥΝΟΝ, οἱ μὲν, κύναχον, οἱ δὲ, πάρδαλιαγχές, οἱ δὲ κυνόμορον, οἱ δὲ, κυνοκράμβην καλοῦσι, θάμνος ἐστὶ ῥάδδους ἔχων μακράς, λυγώδεις δυσθραύστους, φύλλα χαμαιπίτυος ὅμοια, μελανώτερα δὲ καὶ ὀξύτερα κατ' ἄκρον, βαρύοσμα, ἐκπολυχρόα, ὁπῶδες μετὰ μιλίνου. καρπὸς δὲ ὁμοίως

Al. μίλαξ
V. δαμνομένου
V. τὰ σκιάδια δὲ ἄμφω ὑπόλευκα
Al. ἡ ῥίζα ἐν Ἰταλίᾳ κοίλη
V. χυλίζουσι δὲ ἄκρα πρὸ
V. add. καὶ οἶνῳ
V. interpon. ἢ
V. pro his habet, ἢ τὸ ἐν τῇ Ἀσίᾳ γινόμενον
Mss. Καρδονίᾳ
Al. πυκνόμορον
Ignoret vulg. exempl. Sunt qui μαραθρίδα legerint. Al. λινόδεσι addunt

A

De Cicuta. Cap. LXXIX.

CICVTA caulem edit geniculatum vti & fœniculũ; grandem: folia ferulæ, sed angustiora & graui odoratu: in cacuminibus autem ramorũ propagines & vmbellas, florem quoque albicantem & semen ceu anisi, at candidius: radicem denique tõtauam minimeq; profundam. Est & cicuta in lethaliũ venenorũ genere, quippe quæ vi sua refrigeratoria enecet: merũ verò remedio est. Porrò contusis cacuminibus seu coma ipsa, priùs quàm semina siccescant, succus exprimitur, qui deinde Sole dẽlatur atq; cogitur. Huius autẽ arefacti multiplex est in medicina vsus. Siquidem collyrijs doloris sedandi vi prędictis cõmodè miscetur, & herpetas ac erysipelata illitu restinguit. Herba verò cum coma trita testibúsque circumlita, libidinis in somno imaginationi simul & seminis profusioni obnoxijs opitulatur. Sed & genitalia illitu effœta languidioráq; reddit. Lac itidem extinguit, & virginum mammas crescere nõ patitur: ac puerorum quoque testes nutrimento defectos ita reddit, vt intabescant. Maxima efficacissimáque vis Creticæ, Megaricæ, Atticæ, & in Chio ac Cilicia nascenti.

B

C

D

De Taxo. Cap. LXXX.

SMILAX à quibusdá thymalus, à Latinis Taxus appellatur, arbor abietis magnitudine & foliorum eiusdẽ figura, in Italia & Narbonensi Gallia Hispaniæ contermina nascẽs. Sed nigrescũt pulli gallinacei, qui Italicę taxi fructu vescũtur: & q; eũdẽ ederint homines, alui profluuijs corripiũtur. Narbonẽsis verò tá præsentis est veneni, vt qui sub eius vmbra sederint obdormierintve, lædátur, & sæpenumerò etiá moriãtur. Cæterùm hæc de taxo tradũtur eo consilio, vt ab ea quisque caueat.

E

F

De Apocyno. Cap. LXXXI.

APOCYNON aliqui cynáchon, nonnulli pardalianches, alij cynomoron, alij deniq; cynocrambẽ, h. e. brassicá caninã, appellãt. Est verò frutex lõgis cõstans virgultis, vitiliũ modo obsequiosis, fractúq; ferè inuictis: foliis hederę, attamẽ mollioribus & per extremũ acutioribꝰ, graníque odore, quadantenus viscosis, & luteo succo turgentibus. Fructus ceu fabarum

G

fabarum siliqua digiti longitudine protenditur, folliculari specie, minutis intus seminibus duris, paruis atque nigris. Huius folia cum subacta farina in panes coacta & in cibo data, canes, lupos, vulpes & pantheras necant, ac protinus earum quadrupedum coxendices resoluunt.

A λοβὸς κυάμων τὸ μῆκος δακτύλου τὸ μέγας, ξυλοκόνης ἐφ' ὧν σπερμάτια, πλατέα, σμικρά, μέλανα. Χρῶνται δὲ φύλλα σὺν ταῖς ἀρτοπανίσκοις καὶ τοῖς βλαπτύσι, κύνας, λύκους, ἀλώπεκας, πρόβατα τοῖς βλαπτικὰ ὄντα τὰ ἕρπα. V. ἀπὸ τοῦ ἕρπα. Pro μέλανα Rivilli codex ἀδρὰ legit.

De Nerio. Cap. LXXXII.

Περὶ Νηρίου. Κεφ. πβ'.

NERION quibusdam rhododaphne, alijs rhododendron vocatum, frutex est vulgaris notitiæ, longioribus crassioribúsque folijs quàm sint amygdalina: flore ad rosæ similitudinem conformato, & siliqua fructui amygdalino proximæ: quæ quidem dehiscens lanosa quadam natura acanthij pappos repræsentante plena reperitur: radice acuminata & longa, lignosa atque gustanti salsa. Nascitur in viridariis, maritimisque locis, & secus ammes. Flores ac folia canibus, asinis, mulis & pleriſque quadrupedibus venena sunt: hominibus verò contra venenatarum bestiarum morsus præsidia, si è vino bibantur, eóque magis ruta addita. Imbecilliores autẽ animantes, vti capræ ac pecudes, si aquam biberint in qua illa maduerint, moriuntur.

B ΝΗΡΙΟΝ, ἢ ῥοδοδάφνη, ἢ ῥοδόδενδρον, θάμνος γνώριμος, ἀμυγδαλῆς μακρότερα καὶ παχύτερα ἔχων φύλλα. Τὸ δ' αὐτὸ ῥοδοδάφνης καρπὸν δὲ ἐμφερῆ ἀμυγδάλῳ, ὡς κέρατι, αἰσαγμένον πλήρη ἐριώδους φύσεως, ὅμοιον τοῖς ἀκανθίνοις πάπποις ῥίζα ὀξεῖα καὶ μακρά, ξυλώδης, γλυκαμάρῳ ὁμοιοῦται. Φύεται δὲ ἐν θαλασσίοις καὶ θαλασσίοις τόποις, καὶ παρὰ ποταμοῖς. Δύναμιν δ' ἔχει τὸ αὐτὸς καὶ τὰ φύλλα, ἀκωλυτικὴν καὶ ἔμετον καὶ ἀμύσεως, καὶ τὰ πλείστων τετραπόδων δὲ ζώων φθαρτικά· ἀνθρώποις δὲ συντετὸν, σὺν οἴνῳ πινόμενα πρὸς δηγματα θηρίων· ἢ μᾶλλον εἰ πιόντα παραμίξας τις ἀδηνίστρα τοῖς ζώοις, ὡς αἶγες ἢ πρόβατα, ἐπὶ τὸ ἀπόρρυσμα αὐτῶν πίῃ, ἀποθνήσκει. Gemb. κατὰ τὸ ἀκωλυτικὸν. V. ἀδηνίστρα. V. ἀκωλυτικὸν.

Περὶ Μυκήτων. Κεφ. πγ'.

De Fungis. Cap. LXXXIII.

FVNGORVM differentia duplex. Aut enim edules sunt, aut exitiosi & perniciales. Ac tales quidẽ multis de causis euadũt: nẽpe quia iuxta clauos rubiginosos, aut putridos pannos, aut serpentum latibula gignantur: aut etiam arboribus quæ priuatim noxios pariunt fructus adnascantur. Habent porrò & qui tales sunt concretum quendam strigmẽtique modo viscosum intra se lentorem, ac etiamnum posteaquá terra sunt eruti si reponantur, celeriter corrumpuntur & computrescunt. At innocentiores, quique veneno imbuti non sunt, gratiam iuribus conciliant, iucundique sunt saporis. Veruntamen & hi ipsi largiùs sumpti nocent: quippe qui ægrè cõcocti strangulant, aut cholera morbum accersunt. Remedio est nitri & olei, aut lixiuij cum acida muria potus, hausúmve thymbræ decoctæ origanive iusculum. Est & remedio fimum gallinaceum ex aceto potũ, aut ex copioso melle delinctum. Cæterùm alibiles illi sunt ægréque dissoluuntur: quin & integri vt plurimùm vnà cum recrementis alui reiiciuntur.

ΜΥΚΗΤΩΝ δὲ φορὰ διττή· ἢ γὰρ ἐδώδιμοί εἰσιν, ἢ φθαρτικοί. Τὰ δὲ πολλαῖς δὲ αἰτίαις γίνοιτ' ἂν τοιοῦτος ἢ δι' ὧν λοις καὶ ἰωμένοις, ἢ ῥάκεσι σεσηπόσι, ἢ ἑρπετῶν φωλεοῖς τὰ φύοντα, ἢ δένδρεσιν ἰδίως βλαπτικοῖς φέρουσι τὸν καρπόν· ἔχουσι δὲ καὶ οἱ τοιοῦτοι ὀπὸν γονοκαταίθυιον ἢ μᾶλλον τὸ ἀφαιρεθὲν, ταχέως διαφθείρεσθαι σπεύδοντα. οἱ δὲ μὴ τοιοῦτοι, ζωμοποιοί, ἁδεῖς· πλεονασθέντες μέντοι καὶ ὕπνον, βλαπτικοὶ δυσαπεπτοῦντες, πνίγοντες ἢ χολέρας ἐπάγοντες. Βοηθοῦσι δὲ πηγνῖται ποτιζόμενοι νίτρῳ καὶ ἁλὶ, ἢ κονία, μᾶλλον ἐξαίμους, ἢ θύμβρας ἀποζέματα, ἢ δεῖγανον, ἢ ὀριγάνου κόπρος μετ' ὄξους πινόμενοι, ἢ μᾶλλον ἐναλλόμενοι πολλῷ γόφιμοι δὲ εἰσὶ καὶ δυσδιάλυτοι· ὁ λεπτὸς δὲ ὡς ὀπτὸς μόλυς σὺν τοῖς ἀπεπτήμασιν ἀποδίδονται. V. ἕρπετα. Ald. ἐπὶ τὸ ἀφαιρεθὲν. Gemb. κατὰ τὸ ἀκωλυτικὸν. Orib. Simplicior. Gemb. γονοκαταίθυιον. Orib. ἀδιάφθορον ἔχει. In v. lg. ex. deest ἢ ὑπὸ τοῦ ἕρπετος. Lacuna videtur esse. Orib. adhuc.

Περὶ Κολχικοῦ. Κεφ. πδ'.

A

Κολχικον, ⓐ οἱ, ἐφήμερον, ⓐ οἱ, κολχὸν ἄγριον, λήγοντες τοῦ φθινοπώρου αἴτησιν αὐτὸς ἀπὸ λευκὸν, ὅμοιον κρόκου αὐτῷ· ὕστερον δὲ τὰ φύλλα φέρει κολχῷ παραπλήσια, λιπαρώτερα· καὶ αὐλὸν ἀσπαραγιαῖον, καρπὸν ἔχοντα πυρρόν· ῥίζαν φλοιοὺς ἔχουσαν ἐξυρρὸν ὑπὸ τῷ μέσῳ, ἣ τις λεπτὴ ὁμοίη λευκὴ καὶ ἁπαλὴ καὶ ὑπὸ μέσην διείρηται, καὶ γλυκεῖα· ἔχει δὲ ὁ κολχὸς ἀφίσιον μέσον, καθ' ὃν τὸ αἶδος ἀφίησιν· θηρᾶται δὲ πλῆσον ὑπὸ τὴν Μεσσηνίαν καὶ Κόλχους. Φαγοῦσα δὲ κτείνει καθάπερ καὶ μύκητα ὁμοίως μύκησον. Ἀνεξέταμον δὲ αὐτὸν, ἵνα μὴ λάθῃ βρωθεῖσα αὐτὶ κολχικοῦ παραδόξως γάρ ἐστιν ἐπακτικὴ ἀφ' ἑαυτοῦ ὑδατώδη τοῖς ἀπείροις. βοηθεῖ δὲ τοῖς φαγοῦσιν ὅσα καὶ τοῖς μύκησι φάσκοντες ὑγρὰ πολλὰ πίνεσθαι. ὥστε ὅταν παρῇ τοῦτο, μηδενὸς ἄλλου δεῖσθαι δοκιμάζομεν.

Al. καὶ πυῤῥὸν. V. ὁμοίως πυῤῥὸν

Al. Μεσσηνίαν.

V μέσῳ

V. addit καὶ

V. διάχυσιν.

V. addit δὲ

De Colchico. Cap. LXXXIIII.

COLCHICVM, quod aliqui ephemerum, alij agreſtem bulbũ vocant, ſub finem autumni florem edit croci candicanté: deinceps verò folia bulbi, ſed pinguiora: caulẽ dodrantalem cum ruſo ſemine: radicem cortice prediţá è nigro fulueſcente: quæ quidem delibrata cándida, tenera, ſucci plena atque etiá guſtanti dulcis reperitur. Habet verò bulbus eius mediam rimam fiſſurámve, è qua flos erumpit. Plurimum in Meſſenia & apud Colchos enaſcitur. Comeſa radix fungorum more ſtrangulando enecat. Hanc autẽ ideò ſtudioſiùs deſcripſimus, vt ne fortè per imprudentiam pro eſculẽto bulbo in cibos recipiatur: mirum enim quantũ ſaporis iucunditate imperitos alliciat. Opem ferunt eadem quę fungis deuoratis, inſuperq; lac bubulum epotum ita auxiliatur; vt ſi affuerit, aliud nullum deſideretur auxilium.

Περὶ Ἐφημέρου. Κεφ. πε'.

Ἐφημερον, οἱ δὲ, ἴριν ἀγρίαν, φύλλα δὲ καὶ αὐλὸν ὅμοια ἔχει κρίνῳ, λεπτότερα δὲ· ἄνθη λευκὰ, πικρά· καρπὸν δὲ μαλακὸν· ῥίζα δὲ ὑπὸ σκληρὸν πάχος μία, μακρὰ, συμπλοκὴ, εὐώδης. φύεται δὲ δρυμοῖς καὶ παλιούροις. Τούτου ἡ μὲν ῥίζα ὀδοντολγίας δοκεῖ φάρμακον, ἀφεψηθεῖσα· τὰ δὲ φύλλα δὲ οἴνῳ ἑψηθέντα καὶ καταπλασθέντα, οἰδήματα ⓒ φύματα ἀφ' ἑαυτῶν φορᾷ, μάτην ὑγρὸν ἔχοντα.

Al. κρίνῳ

V. addit δὲ

Lacuna cod. addit ἔχειν γὰρ πλείω ὀδυνῶν.

Fuchsius nihil legendum cenſet ex Galeno. V. ἐπιφλοίσβῳ

De Ephemero. Cap. LXXXV.

ĒPHEMERVM, quod alij agreſtem irin appellant, caulem foliáque habet lilij, ſed hæc tenuiora: flores candidos, amaros: ſemen molle: radicem vnam digitali craſſitudine, longam, aſtringentem, odoratá. Naſcitur in ſyluis & opacis. Huius radix dentium doloribus præcipua, ſi decocto ij colluantur. Folia verò in vino cocta illitáq;, œdemata tuberculáque diſcutiunt, quæ quidem humidi nihildum contraxêre.

Περὶ Ἑλξίνης. Κεφ. πς'.

Ἑλξινη, ⓐ δὲ, παρθένιον, οἱ δὲ, σιδηρῖτιν, οἱ δὲ, περίκλαστον, οἱ δὲ, ἀσυσίαν, οἱ δὲ, νιτρώδη ἀγρίαν, οἱ δὲ, κλαδάδιον, οἱ δὲ, πολυώνυμον καλοῦσι· φύεται δὲ τοῖχοις καὶ τοίχοις καυλία δὲ ἔχει λεπτὰ, ὑπόῤῥυθρα· φύλλα ὅμοια λινοζώστῃ, δασέα· ἐπὶ δὲ τοῦ καυλοῦ οἱονεὶ σπερμάτια ῥαχέα, αἱ πλαμβανόμενα τῶν ἱματίων.

Δύναμιν δὲ ἔχει τὰ φύλλα ψυκτικὴν, συμπλοκὴν· ὅθεν καταπλασσόμενα ἰᾶται ἐρυσιπέλατα, κονδυλώματα, καλοηθῆ οἰδήματα, φύγεθλα, ἀρχόμενα, καὶ πᾶσαν φλεγμονὴν καὶ οἰδήματα· ὁ δὲ χυλὸς αὐτῆς μετὰ ψιμυθίου, ἐρυσιπέλατα ⓒ ἕρπητας

Ὀνίδ. αἰγὶ λεύκῃσι

Fortè αλυβάσιν, vt apud Nic.

Quidam codices carent. In nonnullis verò legitur, οἱονεὶ ἀφορμὴ ἡ πίσσης καὶ ἀμπέλου ἐστὶ. καὶ τὰ δὲ ἐξῆς ὑφῆνται &c. Ald καὶ. V. καὶ ἀπὸ δυσεργίας V. διαπύλους V. carer

Dynamin verò habent folia refrigeratoriam & aſtringentem: qua ex cauſa ſanant illitu eryſipelata, condylomata, aduſta, incipientes panos, omnéque inflámationis genus & œdemata. Succus eius cũ ceruſſa eryſipelatis & herpetib⁹

Plerique aliam dictionem deſiderant

vtiliter illinitur : vti & podagris, si cerato cyprino aut hircino seuo exceptus fuerit. Veterem quoque tussim emendat succus, instar cyathi hausti: Quin & tonsillis inflammationem sentientibus vtiliter & gargarizatur & oblinitur, necnon & aurium dolorem cum rosaceo instillatus leuat.

De Alsine. Cap. LXXXVII.

ALSINEN alij myosota vocant, quoniam folijs musculorum auriculas imitetur. Alsine verò dicta est, quòd opacis nemorosisque locis gaudeat. Herba est helxinę similis, at humilior, longioribúsque folijs, ac minimè hirsuta: & cùm teritur, odorem cucumeris reddit. Vim porrò refrigerandi astringendíque obtinet: quamobrem oculorum inflammationibus cómodè cum polenta illinitur, auriúmque dolori succus infunditur: denique ad eadē omnia quæ helxine valet.

De Lenticula palustri.

Cap. LXXXVIII.

LENS palustris in aquis pigris stagnantibúsque reperitur, muscus scilicet lenticulæ similis, refrigeratoriæ naturæ: propter quod omnibus inflammationibus, erysipelatis, podagrisque & per se & cum poléta conuenienter imponitur: insupéq; puerorum enterocelas agglutinat.

De Sēpernino magno. C.LXXXIX.

SEMPERVIVVM magnum Semperuiui nomen sibi vendicat, quoniam folia semper vireant. Caules edit cubitales, aut etiam altitudinem eam excedētes, crassitudine pollicari, pingues, egregiè virentes, Characiæ tithymalli modo incisuris distinctos: folia pinguia, pollicari magnitudine, & extremo cacumine linguæ similia, & infima quidem in terram conuexa: quę verò sunt in capite, ita cōferta adductaq; inuicem, vt orbiculato ambitu effigiē imitentur oculi. Nascitur in locis mōtosis & argillosis. Sunt & qui ipsum supra domicilia serant. Vis ei perfrigerare & astringere. Quamobrem folia tum per se tum etiam cum polenta imposita, valent ad erysipelata, herpetas, nomas, oculorum inflammationes, ambusta & podagras.

A ὠφελεῖ καταχριόμενος, καὶ ποδάγρας σὺν χαρωτῷ κυπαρίσσῳ αἰδηφθεὶς ἢ παγλίφ σταφ. ὠφελεῖ δὲ ἐπιτιθέμενος χρονίους ὁ χυλὸς καταῤῥοφούμενος ὅσον κύαθος· ἐκ παρειληθίοις φλεγμαίνουσιν ἀναγαργάρισμα ἐκ ἀλοίσιμα ὠφέλιμόν ἐστι· καὶ ὠτηγλύσι ξὺν ῥοδίνῳ ἐγχεόμενον ὠφελεῖ.

B Περὶ Ἀλσίνης. Κεφ. πζ.

ΑΛΣΙΝΗ, ἣν ἔνιοι μυὸς ὦτα, ἀπὸ τῶν ἐχόντων φύλλα ὅμοια μυὸς ὠτὸς ἀφομοιοῦσιν, ἀπὸ τοῦ σκιερὰ καὶ ὑγρὰ φιλεῖν τόπους. πόα ἐστὶν ὁμοία ἕλξίνῃ, ταπεινοτέρα δὲ καὶ μακροφυλλοτέρα, καὶ οὐ δασεῖα· ἀλαπιφθεῖσα πεπόσιον ὀζεῖ. Δύναται μὲν ἔχειν ψυκτικὴν, συστατικὴν· ἁρμόζει οὖν πρὸς φλεγμονὰς ὀφθαλμῶν μετ' ὑγρῶν καταπλασσομένη, καὶ πρὸς ὠτῶν πόνον ὁ χυλὸς αὐτῆς ἐνσταζόμενος, καὶ καθόλου δύναται τὰ αὐτὰ τῇ ἕλξίνῃ.

Περὶ Φακοῦ τῆς ἐπὶ τῶν ἑλμάτων. Κεφ. πθ.

ΦΑΚΟΣ ὁ ἐπὶ τῶν ἑλμάτων, ὃν εἰσιτᾶν ἐπὶ τῶν ἁσίμων ὑδάτων, ψυχρόν ἐστιν ὅμοιον φακῷ, ψύχων τῇ δυνάμει. πάσας φλεγμονὰς καὶ ἐρυσιπέλατα ὑγρὰ ποδάγρας ἁρμόζει καταπλασσόμενος, καὶ ἑαυτὸν πεῖν σὺν ἀφίτῳ πολυχύλῳ ὄντα καὶ ἐπιστομίλλας ἐπὶ παίδων.

B Περὶ Ἀφζοΐδος τοῦ μεγάλου. Κεφ. πθ.

ΑΕΙΖΟΟΝ τὸ μέγα καὶ μακρὸν ἀφ' ἑνὸς ἀθρόου φύλλου. καυλοὺς δ' ἐκπέμπει πηχαίους, ἐνίοτε καὶ μείζονας, πάχος δακτύλου μεγάλου, λιπαροὺς, ὑθρούς, ὁμοίους ἔχοντας ὥσπερ τὸ χαρακίου πολυμαλλου· φύλλα δὲ, μέγεθος δακτύλου μεγάλου, γλωσσοειδῆ τὸ ἄκρον, καὶ τὰ μὲν κατωτέρω τῶν φύλλων ὑπτιώμενα, τὰ δὲ κατὰ τὸν κεφαλὴν ἐπεστραμμένα ἐπ' ἄλληλα, κύκλον ὀφθαλμοειδῆ ἐπιδεικνύοντα· φύεται δὲ ἐν τόποις ὀρεινοῖς καὶ ὀστρακώδεσι. ἔνιοι δὲ φυτεύουσιν αὐτὸ ἐπὶ τῶν οἰκημάτων. Δύναμιν δὲ ἔχει ψυχικὴν, σύφοιν, ποιεῖ δὲ πρὸς ἐρυσιπέλατα, ἕρπητας, νομὰς, ὀφθαλμῶν φλεγμονὰς, πυρίκαυστα, ποδάγρας, καταπλασσόμενα τὰ φύλλα καθ' ἑαυτὰ καὶ μετὰ ἀφίτου

Lacuna ex v.c. inter ὀξύκρατ. καὶ ἐλαιον καὶ

ὁ δ' χυλὸς ποὸς κεφαλαγίας μετ' ἀλφίτ' ἀ
ζυ καὶ ῥοδίνῳ ἐμβρέχεται· καὶ φαλαγγίου
δήκτοις ὸ ποτὸς δίδοται, καὶ ἀλφοῖοι ζῶ
μόροις, καὶ δυσεντερικοῖς· τροχίσκας τε
ῥίμματας ἐκπιάσαι ζιὼ οἴνῳ πότοις ἴσοις
καὶ ῥοιῶ γυναικείου ὸ ποτὸς δίδοται. ὑγ
ρίζεται δ' ὁ χυλὸς καὶ ὑπὸ τῶ ὀφθαλμιώ
των ὠφελίμως ἀπὸ αἵματος. B

Cat. ἰφθαλμῶν ὠφέλιμον.

Περὶ Ἀλίζωου τῦ μικροῦ. Κεφ. ρ'.

Ἀείζωον δ' μικρὸν φύεται ὸ τείχεσι
ἢ πέτραις, ἢ θρυγλοῖς ἢ τάφροις ἀποσκί
οις. καυλία ἀπὸ μιᾶς ῥίζης πολλά,
λεπτὰ, πλείονα· φύλλα εἴλικι φε
ρῆ, λιπαρῆ, μικρὰ, ὀξέως ἐπ' ἄκρ' ἀ
είνοι δ' καὶ καυλὸν ὸ μέσῳ πολὺ ἀπο C
στατικὸν τὸ μέγεθος, ἔχοντα σκιάδιον ἢ αὖ
τὸ λευκὰ ὸ χλωρά. πόπτει τὰ φύλλα
δυνάμιν ἔχοντα τὴν αὐτὴν ὃ τῶ σεμπερβίβου.

Cat. τείχεσι

Vide magis ex Galeno

Cat. μικρόν

Cat. πέτραις

Cat. ἀείζωον

Cat. ἀποσκίοις

Cat. καυλία

Cat. φύλλα

Cat. σκιάδιον

Cat. λευκά

Cat. πόπτει

Cat. δύναμιν

Cat. αὐτὴν

Cat. σεμπερβίβου

Περὶ Ἀλίζωου ἑτέρου. Κεφ. ρα'.

Δοκεῖ δ' εἶναι ἢ τέταρτον εἶδος ἀείζωον, ὃ
ἔνιοι ἀνδράχλην ἄγριαν ἢ τηλεφίου ὀνομά
ζουσιν, Ῥωμαῖοι δ' ἰλλέκτρουμ· ἔχει δ' αὐτὴ D
πτόρεα τὰ φύλλα ποὸς τὰς
ἀνδράχνης καὶ δασέα. φύεται ὸ πέτραις.
Δύναμιν δ' ἔχει θερμαντικὴν, ἀριστικὴν,
ἑλκωτικὴν, χειρῶσιν ἀφροφορητικὴν,
ζιὼ ὀξυγλίσι καταπλασθέν.

Lacuna legit in v.c. Matthiolo

Περὶ Κοτυληδόνος. Κεφ. ρβ'.

ΚΟΤΥΛΗΔΩΝ, ἣν δ', σκυτάλιον, οἱ E
δ', κυμβάλιον, φύλλον ἔχει ὅμοιον ὀξύ
βαφον, κοίλον, λιχηνώδη καὶ λεῖον καυ-
λίον δ' ὸ μέσου βραχύ, ὸ ᾧ τὸ σπέρμα·
ῥίζαν ὡς ἐλαίας τροχίσκου. Ταύτης δὲ τῆ
φύλλων ὁ χυλὸς μεθυσθεὶς ὄνον σκληρύνει, F
ἢ ὑγκλυζόμενος, φίμωσιν δὲ ὸ αἰδοίοις
χόνδρους φλεγμονάς τε ἢ ἐρυσιπέλατα καὶ
χοιράδας καταπλασθεὶς καὶ
μετὰ ὠφελεῖ, καὶ στόμαχον καυστούμενον.
ἐσθιόμενα δ' τὰ φύλλα σὺν τῆ ῥίζη, λί
θους θρύπτει, καὶ ὕδρωπικοῖς
δὲ ὑδρωπικοῖς σὺν οἴνομέλιτι δίδοται. χρῶνται δ' αὐτῆ ἢ
εἰς τὰ φίλτρα.

Lacuna legit in v.c. Matthiolo

Cat. κοτυληδόνος

Cat. φύλλον

Cat. καυλίον

Cat. ῥίζαν

Cat. φύλλων

Cat. ὄνον

Cat. φίμωσιν

Cat. χόνδρους

Cat. φλεγμονάς

Cat. στόμαχον

Cat. ἐσθιόμενα

Cat. λίθους

Cat. ὕδρωπικοῖς

Cat. χρῶνται

Cat. φίλτρα

Περὶ Ἑτέρας κοτυληδόνος. Κεφ. ργ'.

Ἔστι δ' καὶ ἑτέρου εἶδος κοτυληδόνος, G
πλατύτερα ἔχον καὶ λιπαρὰ φύλλα
ὡς γλωσσάρια, πυκνὰ περὶ τινὰ ῥίζαν,

v. ἀνακλίνοντα

v. κανούρια

Succus autem ad capitis dolores cum polenta & rosaceo instillatur: morsis à phalangio potui datur, itémque profluuio alui laborantibus atque dysentericis. Sed & teretes lumbricos pellit ex vino potus, & fluorem muliebrem sistit in vellere subditus: denique oculorum lippitudinibus à sanguine obortis vtiliter inungitur.

De Semperuiuo paruo. Cap. XC.

Semperuiuum minusculum in parietinis, petris & macerijs, nec nō & scrobibus opacis nascitur: cauliculis ab vna radice multis, tenuibus: qui quidem crebris cincti sunt pusillis folijs, iisque rotūdis, pinguibus, exilibus, mucronatis. Promit & à medio caulem palmum ferè altū, vmbella floribúsque tenuibus & ex luteo pallidis præditum. Folia eisdem cum priore viribus pollent.

Vide magis ex Galeno

De Semperuiuo tertio. Cap. XCI.

Videtur & tertium esse semperuiui genus, quod aliqui portulacam agrestem aut telephiū vocauerunt, Romani Illecebram, pusillis foliis crassiusculis ad portulacæ similitudinem ac densis. Nascitur in petris. Vis ei excalfactoria, acris & exulcerans: impositúmque cum axungia strumas discutit.

De Vmbilico Veneris. Cap. XCII.

COTYLEDON alijs scytalium, seu cymbalium, folio est acetabuli instar orbiculato atque concauo, ita tamen vt cauum id aciem propè fugiat: breui in medio cauliculo, in quo semen ineſt: radice oliuæ modo rotunda. Radicis foliorúmque succus cum vino circumlitus aut infusus, astricta pudenda laxat: herba verò inflammationibus, erysipelatis, perniunculis ac strumis, itémque stomacho æstuanti vtiliter imponitur. At folia cum radice comesa, calculos comminuunt, vrinásque cient, & hydropicis ex mulso dantur. Est & ipsius herbæ vsus ad amatoria.

De Vmbilico veneris altero. Cap. XCIII.

EST porrò & alterum Cotyledonis genus, latioribus folijs, iisque pinguibus, ac ceu lingulas referentibus, dēsis confertisq; circa radicē;

& velut oculum in medio constituentibus,(quemadmodum de maiore semperuiuo dictum est) astringentis gustus:cauliculo tenui,in cuius summo flores sunt & semina hyperici:radice maiuscula. Vsus eius ad eadem,quæ semperuiui.

De Vrtica. Cap. XCIIII.

VRTICÆ, quæ Græcorum plerisque Acalyphe, alijs Cnide dicitur,duo genera:vna siquidem agrestior est,asperioribus, latioribus nigrioribúsq; folijs,semine lini,at minore:altera non æquè aspera,minuto semine. Vtriusque folia illita sale addito, canis morsibus medentur: itémque in gangrænam vergentia, maligna, carcinode sordidáque vlcera, luxata, tubercula, parotidas, panos & abscessus sanant. Lienosis eadem cum cerato imponúntur. Faciunt & ad sanguinis è naribus profluuia folia ipsa cum succo trita & naribus indita:menses quoque ciúr eadem detrita cum myrrha & apposita: sed & procidétes vuluas admota recentia folia restituunt. Semen autem ex passo potum venerẽ stimulat,vuluámque aperit. Idem cum melle delinctum,orthopnœx, lateris & pulmonum inflammationibus prodest:thoracem purgat, ac septicis etiamnum medicamentis admiscetur. Porrò cum conchylijs cocta folia, difficilem ventrem emolliunt, inflationes discutiunt, vrináſque cient. At cum ptissana decocta, vitia pectoris excreabilia faciunt. Mulierum denique menses euocat foliorum decoctum,cũ myrrhæ modico potum. Inflammatam verò vuam gargarizatus succus reprimit.

Vt tollo vsi lineo cogant

De Galiopsi. Cap. XCV.

GALEOBDOLON quidam apud Dioscoridem Galeobdolon vocant

GALIOPSIS,quam alij Galeobdolon vocant,toto frutice cum caule & foliis vrticam refert. At lęuiora sunt folia, & valdè grauem odorem trita reddunt:flores verò tenues sunt ac purpurascentes.Nascitur circa sepes, semitas ędificiorúmque areas vbique. Folia,succus, caulis ac semen duritias, carcinomata, strumas, parotidas & panos discutiendi vim habent.

A οἱονεὶ ὀφθαλμὸν ἕνα μέσον περιεχόμενα, ὥσπερ τὸ μεῖζον ἀείζωον, τῇ γλυκύτητι σύμφορα. καυλίον λεπτὸν, καὶ ἐπ' αὐτῷ αὐτὰ καὶ τὰ σπέρματα ὅμοια. ἐστὶ δὲ καὶ ῥίζα οὐ μείζων. πᾶν δὲ τὸ φυὲν ὅμοιον καὶ τὸ ἀείζωον.

V. σπερμάτια

Περὶ Ἀκαλύφης. Κεφ. ϛδ'.

ΑΚΑΛΥΦΗ, ἡ δὲ, καὶ δικῶς εἶδος ἐστὶν αὐτῆς. ἡ μὲν γάρ ἐστιν ἀγριωτέρα, πραχυτέρα καὶ πλατυτέρα καὶ μελαντέρα τοῖς φύλλοις· καρπὸν δὲ ὅμοιον λινοσπέρμῳ ἔχει, πλείω δὲ ἄνθη. ἡ δὲ ἑτέρα λεπτόσπερμός τε καὶ οὐχ ὁμοίως βραχεῖα. ἀμφοτέρων δὲ τὰ φύλλα κατὰ πλάσμα μετ' ὠμοῦ, κυνόδηκτα ἰᾶται καὶ σαπρώματα, καὶ τὰ κακοήθη καὶ καρκινώδη, καὶ τὰ ῥυπαρὰ τῶν ἑλκῶν, καὶ τρέμματα, φύματα, παρωτίδας, φίγεθλα, ἀποστήματα· ἀσηλωτικοῖς δὲ μετὰ κηρωτῆς ἐπιτίθενται. πᾶν δὲ καὶ τρόχος ἐκ μυκτήρων αἱμορραγίας τὰ φύλλα σὺν τῷ χυλῷ λαβὼν ἐπιτίθεσθαι κυνόδηκτα καὶ ἐμμένοντα, λαβὼν μετ' ὄμφακος ἐπιτίθεσθαι μα, καὶ ὑστέρας προπτώσεις ἀποκαθίστησι παραλαβὼν τὰ φύλλα τρῖψαι πρόσθεμα. τὸ δὲ σπέρμα ἐπὶ σπυρώσεσι παρρεῖ μετ' οἴνου πινόμενον μετ' ὠμοῦ· καὶ ὑστέρῳ αἱματωμοῖ σὺν μέλιτι δὲ ἐκλείχμενον, ὀρθοπνοίας ὠφελεῖ καὶ πλευρίτιδας καὶ πνευμονίας. αἴρει δὲ καὶ τὰ ἐκ θώρακος μίγνυ δὲ σπλάγχνοις. σὺν ψήθῳ δὲ τὰ φύλλα κλύσμασι, καὶ χειλίας μαλάσσει· λύει ἐμπνευματώσεις, ὄρεξιν κινεῖ. σὺν πλακοῦντι δὲ ἐσθιόμενα, τὰ ἐκ θώρακος αἴρει. τὸ δὲ ἀφέψημα τῶν φύλλων σὺν ὀλίγῃ σμύρνῃ πολὺν, κινεῖ καταμηνία. ὁ δὲ χυλὸς αἱματόρροιζόμφους, γάλα κινεῖ δὲ φλεγμαίνουσαν.

V. κυνόδηκτα σὺν τῷ δάκνοντα legit significanter.

Lacuna est v. addit qui vertit. nus

Al. ἀσηλία

V. alia ἰᾶται πρὸς φυσᾷ.

V. caret conclusio.

Περὶ Γαλιόψεως. Κεφ. ϛι'.

ΓΑΛΙΟΨΙΣ, ἡ δὲ, γαλεόβδολον· ὅλον τὸ θαμνίον σὺν τῷ καυλῷ καὶ τοῖς φύλλοις ἐμφερές ἐστι κνίδῃ, λεπτότερα δὲ τὰ φύλλα· καὶ ἰσχνὰς· δυσώδη δὲ τῶν ἀγαπεῖ· αἱ δὲ λεπταὶ πορφυρίζουσαι φύονται ἐν φραγμοῖς, καὶ παρὰ τὰς ὁδούς καὶ οἰκήσεις πάντας. δύναμιν δὲ ἔχει τὰ φύλλα καὶ ὁ χυλὸς καὶ ὁ καυλὸς καὶ ὁ καρπὸς, ἰσχυρίσιν συμπεφωτισμένων καὶ καρκινωμάτων, χειράδων, παρωτίδων, φυσίθλων.

δεῖ δὲ μετ' ὄξους δὶς τῆς ἡμέρας κα- A
ταπλάσσειν, χλιαρὸν ποιοῦντας τὸ κα-
τάπλασμα. καὶ τὸ ἀφέψημα δ' αὐτῆς
καταπλάσσειν ὠφελίμως. ποιεῖ καὶ πρὸς
νομὰς, χαλαζώσεις & σηπεδόνας, μεθ' ὑδα-
κατάπλασμα.

Περὶ Γαλίου. Κεφ. ϟϛ'.

ΓΑΛΛΙΟΝ, οἱ δὲ, γαλλέριον, οἱ δὲ, γα-
λάπιον ὀνόμασαν δ' ἀπὸ τοῦ γάλα πη- B
γνύειν· αὐτὸ πιπάσας ἑαυτό· ὃ δὲ χλωρὸν καὶ
τὸ φύλλον ἔχει ἐμφερέστατον ἀπαρείνῃ, καὶ
ὀρθὸν δὲ, καὶ ἐπ' ἄκρου αὐγὸς μέλινον, λε-
πτὸν, πυκνὸν, πολὺ, εὔοσμον· οὗ τὸ αὐγος
πρὸς τὰ πυρίκαυτα καταπλάσσεται,
καὶ αἱμορραγίας ἴσχει· μίγνυται δὲ καὶ κη- C
ρωτῇ ῥοδίνῃ, ἁλιφόμενον ἄγρας αὐ λευκὸν
χρίεται· καὶ ἔστι τὸ πιοῦσιν ἄκοπον. ἡ δὲ ῥί-
ζα πρὸς συνουσίαν παρορμᾷ. φύεται δὲ
ἐν ἑλώδεσι τόποις.

Περὶ Ἠριγέροντος. Κεφ. ϟζ'.

ΗΡΙΓΕΡΩΝ καυλίσκους ἔχει πηχυαίους,
ὑφωμένους, στενοὺς ἔχοντας φυλλά- D
δια, ἀκροχλιδὸν ὥσπερ βύζωμον, πολλὰ
πολὺ ἐλάττονα· ἄνθη μηλίζοντα, παχέως
ἐξόμενα καὶ ἐξανθοῦντα εἰς τοὺς λεγο-
μένους πάππους. ὅθεν καὶ ἠριγέρων ὠνόμα-
σθη, ἔχει τὸ ἔαρος τὰ αὐτὰ τριχηδῶς πα-
λιοῦσθαι. ῥίζα ἄχρηστος. φύεται μάλιστα
ὅπου θρυπτοῖς καὶ σπέρεται πόλεως. Δύνα- E
μιν δ' ἔχει ψυκτικὴν τὰ φύλλα σὺν τοῖς
ἄνθεσιν· ὅθεν καταπλασσόμενα τὰ φύλλα
σὺν ὀλίγῳ οἴνῳ, ἢ καὶ καθ' ἑαυτὰ, φλεγμο-
νὰς ὄρχεων καὶ δακτυλίους θεραπεύει· σὺν
δὲ μέλιτι, πάσας ἄλλας πρόσπασσα καὶ τὰ ἐν
θυρεοῖς ἕλκη· καὶ οἱ πάπποι δὲ, καθ' ἑαυ-
τοὺς καταπλασθέντες ἐν ὄξει, τὸ αὐτὸ
δρῶσι· πολέντες μέλιτι πρὸς ἐπιμόνους ἐ- F
πιφέρουσιν. ὅλος δὲ ὁ καυλὸς σὺν ὕδατι
ἑφθεὶς, καὶ σὺν γλυκεῖ πιόμενος, κο-
μάχου πόνους τοὺς ἀπὸ χολῆς θεραπεύει.

Περὶ Θαλικτροῦ. Κεφ. ϟη'.

ΘΑΛΙΚΤΡΟΝ φύλλα μὲν πλησία
χεῖρι ἔχει, λιπαρώτερα δὲ, καὶ καυ-
λίσκοι πολλοὶ ἀπὸ ῥίζης, ἐφ' οἷς τὰ φύλλα· ἄνθη
καταπλασθέντα λεπτὰ, τὰ χρόνια τῶν ἕλκων
ἐπουλοῖ. φύεται δὲ μάλιστα ἐν πεδίοις.

Sed eiusmodi cataplasma addito a-
cero tepidum bis die impon oportet. Ex vsu est & herbæ decocto lo-
uere. Cæterum & ad nomas, gan-
græna & putrescentia vlcera, cum
sale folia efficaciter imponuntur.

De Gallio. Cap. XCVI.

GALLIVM, alijs galerium siue ga-
latium, nomẽ ex eo traxit, quod
coaguli vice lac cogat & coagulet.
Ramulũ foliúmq; habet aparinæ si-
millimũ, rectum: florem in cacumi-
ne luteum, tenuem, densum, copio-
sum, odoratum. Flos igni ambustis
illinitur, sanguinisque profluuia si-
stit. Admixtus & oleo rosaceo, inso-
latúsque vsque dum albescat, medi-
camentum fit acopon, seu leuandis
lassitudinibus aptum. Radix vene-
rem concitat. Cæterùm nascitur in
palustribus.

De Senecione. Cap. XCVII.

SENECIO cauliculo est cubi-
tali, subrubicundo, foliolis cre-
bris & erucæ modo per extre-
mitates diuisis, sed minoribus mul-
tò: floribus in luteum vergentibus,
qui quidem citò dehiscunt ac de-
florescentes in pappos abeunt. At-
que inde etiam Erigerontis no-
men Senecio apud Græcos inue-
nit, quòd verè flores capillorum ri-
tu canescant. Radix est superuacua.
Nascitur porrò maximè in mace-
riis & circum oppida. Folia cũ flo-
ribus refrigerãdi vim habẽt: proin-
déque illita cum vini modico aut
etiam per sese folia, testium & sedis
inflammationes sanant: quin & ex
manna thuris cùm reliquis meden-
tur vulneribus, tum iis quæ neruis
inflicta sunt. Illiti quoque pappi per
se cum acero, idem præstant: verùm
recentes epoti strangulant. Totus
autem caulis si ex aqua coctus cum
musto potui detur, stomachi dolores à bile contractos persanat.

De Thalictro. Cap. XCVIII.

THALICTRVM folia coriã-
dri habet, at pinguiora: caulí-
culum rutæ crassitudine, in quo fo-
lia: quæ quidem trita illitu diuturna
vlcera ad cicatricem perducunt.
Nascitur præcipuè in campestribus.

Ita Ald. cod. at Paris. caret.

V. Inscribit, alij γαλίου

V. caret.

V. caret

Al. ἀπὸ χῆ

Cat. ἀπὸ τριχῶν.

V. hæc postrema periodo caret.

Annotat Goupylus in veteribus hoc loco caput esse alterius.

V. quidam, ἰσχυροτέρα

De marino Musco. Cap. XCIX.

MVSCVS marinus in saxis testisque ad mare nascitur, capillaceus, gracilis, sine caule, valdè astringentis gustus: ad inflammationes & podagras, quas refrigerare opus est, efficax.

De marino Fuco, seu alga. Cap. C.

EFuci marini generibus, quoddã latum, alterum oblongũ & quadantenus puniceum, tertium candidum, quod in Creta nascitur iuxta terram, pulchre floridum neque corruptioni obnoxium. Omnia genera vim habent refrigeratoriam, in cataplasmatis, ad podagras & inflammationes efficaciter vtilé: verùm ijs adhuc humentibus vti conuenit, priusquàm exarefiant. Nicãder puniceum asserit aduersus serpentes valere: idipsúmque est quo existimauêre nonnulli cõlorẽ suum mentiri mulieres; cùm tamen radicula sit eiusdem nominis, qua sese fucant.

De Potamogetone. Cap. CI.

POTAMOGETON folio est betæ simili, denso & paululum supereminente extra aquam. Porrò refrigerat & astringit, proindéque conuenit prurigimibus, ac depascẽtibus vetustísque vlceribus. Nomẽ autem ex eo inditum est, quòd in paludibus & aquosis locis nascatur.

De Stratiote. Cap. CII.

STRATIOTES in aquis nascens, quem alij stratiotẽ fluuiatilem appellant, ex eo cognomẽtum traxit, quòd aquis supernatat, & sine radice viuit. Folium habet aizoo simile, at maius, idémque refrigerandi vi præditum. Sanguinem qui defluit à renibus potum sistit. Ex aceto autem illitum, vulnera & erysipelata, necnon & œdemata ab inflammatione vindicat.

De Stratiote millefolio. Cap. CIII.

STRATIOTES, millefolius, pusillus est frutex palmi altitudine aut etiam ampliùs assurgens, foliis pulli pennas imitantibus: sunt autem foliorum exortus breues admodum & incisuris diuisi. Folia maximè cuminum agreste, tum breuitate tum etiam scabritia, simulant: sed sunt etiamnum breuiora paulò, densio-

Περὶ Βρύου θαλασσίου. Κεφ. ϛ'.

ΒΡΥΟΝ θαλάσσιον φύεται λίθων καὶ ὀστράκων πρὸς θαλάσσῃ, τεῖχος δες, ἰσχνόν, ἄκαυλον, ἰσθμοῖς συμπλεκόμενον, ποιοῦν πρὸς φλεγμονὰς καὶ ποδάγρας, ταῖς ἐπύφλοις διαφοράς.

Περὶ Φύκους θαλασσίου. Κεφ. ρ'.

ΦΥΚΟΣ θαλάσσιον, γίνεται δὲ μὲν τὸ αὐτὸ πλατύ, τὸ δὲ κατάμικες δὲ φοινίκεον, ὃ δὲ, λευκὸν, φύεσθαι δὲ ἐν Κρήτῃ πρὸς τῇ γῇ, βίσσῳ ἄγαν καὶ ἄσηπτον. ψυκτικὴν δὲ ἔχει πᾶσι τὴν δύναμιν, ποιοῦσι δὲ καὶ τὰ καταπλάσματα, ποδαγρικοῖς καὶ ταῖς φλεγμοναῖς· δεῖ δὲ αὐτοῖς χρῆσθαι εὐκάρποις πρὸ τοῦ ξηρανθῆναι. Νίκανδρος δὲ φησὶ δὲ ἰδιάζειν τὸ φοινικοῦν· ὅπερ ἔοικεν ἐνίοις εἶναι, ἃ καὶ γυναῖκες χρῶνται, ὅτιπερ ἐκείνου ῥίζῃ· ὁμωνύμως δὲ καλεῖσθαι φύκους.

Περὶ Ποταμογείτονος. Κεφ. ρα'.

ΠΟΤΑΜΟΓΕΙΤΩΝ φύλλον ἔχει ὅμοιον σεύτλῳ, δασύ, καὶ ἐλάττων ὑπερκύπτον τὸ ὕδατος. ψύχει δὲ καὶ σφίγγει, ἁρμόζον κατάρροις, καὶ νεμυθώδεσι δὲ παλαιοῖς ἕλκεσιν. ὠφελεῖ δὲ πρὸς τὸ ἐν τίλμασι καὶ σύνδρομα τόποις. φύεσθαι.

Περὶ Στρατιώτου. Κεφ. ρβ'.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ, ὁ ἔστι τῶν ὑδάτων φύλλος, οἱ δὲ, ποτάμιον στρατιώτην καλοῦσιν· ὠνόμασται δὲ ἀπὸ τοῦ ἐστηκέναι τοῖς ὕδασι καὶ χωρὶς ῥίζης ζῆν. φύλλον δὲ ἔχει ἀίζῳ ὅμοιον, μᾶλλον μέντοι, καὶ ψυκτικὸν ἔχον δύναμιν. ἐφίσταται δὲ ἐκ νεφρῶν αἱμορραγίας, πτύελόν τε αἵματός τι ἀφλέγματα τηρῇ, καὶ ἐρυσιπέλατα καὶ οἰδήματα, ζωὸν ἔξωθεν καταπλασθέν.

Περὶ Χιλιοφύλλου στρατιώτου. Κεφ. ργ'.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ὁ χιλιόφυλλος ἔστι θαμνίσκος μικρὸς, πανθαμαῖος καὶ μείζων· ἔχων τὰ φύλλα ὅμοια νεοττοῦ πτερῷ· εἰσὶ δὲ αἱ ἐκφύσεις τῶν φύλλων στρόβοι βραχίαι, ἑξαδύλιαι. ἔοικε δὲ μάλιστα τὰ φύλλα τῇ βραχύτητι καὶ τῇ πυχνότητι τῷ κυμίνῳ ἀγρίῳ· καὶ ἐπὶ βραχέα· καὶ τὸ σπέρμα δὲ πυκνότερον

V. inscriptio, τοῦ δὲ βρύου διαφορὰ ἐν τῇ βίβλῳ τρίτῃ.

Locum in v.e. legit, γυναῖκα· quæ quidem lectio potest illi videtur. Ita quoque legit Orib.

V. negatio, quæ deest in ceteris.

V. ἐοικὼς legit

V. βραχύτητι V. bis caret.

πούτου καὶ ἀδρότερον. ἔχει δὲ ἐπ' ἄκρου A
χαρφία μικρά, ἐφ' ὧν τὰ σκιάδια ὄζει
V. quidam legit τεῖνε Lac. καὶ ἀ- ἀνήθου τρόπον αὔξη μικρά, λευκά. φύεται
χέ. πλησίον τῆς. ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἐν ἀγροῖς ὑποτραχέσι καὶ παρὰ τὰς
Lac. in v. cod. ὁδοὺς μάλιστα. ἔστι δὲ αὕτη ἡ βοτάνη σφόδρα ἀγαθὴ πρὸς αἱμορραγίας καὶ ἕλκη
V. πρὸς παλαιὰ καὶ πρὸς σφακελισμούς.

Περὶ φλόμου. Κεφ. ρλ'.

V. fortasse pro- Φλόμος τῶν μὲν αἰσθήσει διαφορὰν ἔχει διττὴν· ἡ μὲν γάρ ἐστιν αὐ-
prium duarum species dicit esse. τῆς λευκή, ἡ δὲ, μέλαινα· καὶ τῆς λευκῆς ἡ
μὲν, θῆλυς, ἡ δὲ, ἄρρην. τῆς μὲν οὖν θηλείας τὰ φύλλα πρασοειδέστερα ἐστὶ καὶ μᾶλ-
βη, δασύτερα δὲ πολλῷ καὶ πλατύτερα C
Orib. λευκότερος καὶ λευκὰ καυλὸς πηχυαῖος καὶ μείζων,
Orib. ἰσχνότερος λευκός, ὑποδασὺς· αὕτη λευκὰ ἔνια ὑπόχρα· σπέρμα μέλαν· ῥίζα δὲ μακρά, στρυ-
φνή, πάχος ἔχουσα δακτύλου φύεται δὲ ἐν πεδίοις. Ἡ δὲ ἄρρην καὶ λευκὴ καὶ μέλαινα,
V. non habet λευκόφυλλος, ὑποτραχεῖα δὲ καὶ σπιδνοτέρα
Alii μείζω τοῖς φύλλοις, καὶ ὡς καυλῷ δὲ λεπτοτέρα. D
Ἡ δὲ μέλαινα ὁμοία τῇ λευκῇ κατὰ πάντα, πλατυφυλλοτέρα μόνον καὶ μελανοτέρα
τοῖς φύλλοις ὑποτραχεῖα ἀρχή. Γίνεται καὶ ἡ λεγομένη ἀγρία, ῥάβδους ὑψηλὰς φέρουσα
Μεγιστόλοβος καὶ δενδρώδεις, φύλλα χελισφάκῳ ὁμοία·
V. deest ἔχει δὲ καὶ κλῶνας περὶ τὰς ῥάβδους ὥσπερ
V. quidam inpri- πρασόσπορον, αὐθις μέλινον, χρυσοειδές. εἰσὶ B
V. χρυσομέλινον mum δὲ καὶ φλομίδες διπλαῖ, δασεῖαι, πρὸς
V. περιφυὲς τῇ γῇ, στρογγύλα ἔχουσαι τὰ φύλλα.
Καὶ πέπτι φλομὶς ἡ καλουμένη λυχνῖτις,
V. numero caret ὑποδὲ τινων θρυαλλὶς, φύλλα γ' ἢ δ' ἢ
καὶ πλείονα ἔχουσα παχέα, λιπαρά, δασέα. εἰς ὑγιείαν χρησιμεύει. τῆς μὲν οὖν πρώ-
της δύο ῥίζαι συμπικνοῦνται· ὅθεν ὀλιγαρκοῦσι ζωμοῖς F
ὅσον ἀστράγαλος σὺν οἴνῳ ὠφελίμως
εἰς τὸ πότῳ δίδοται. Τὸ δὲ ἀφέψημα αὐτῆς
ῥήγμασι καὶ ἀπάσμασι καὶ θλάσμασι καὶ
βηξὶ παλαιαῖς ὑδρωπικοῖς· ὀδοντολγίαις τε
Lacuna legit in προσαυτὸ ὀξυκλυζόμενον. Ἡ δὲ χρυσοειδὴς
v.c. τῶν δὲ χρυσο- τὰ αὐτὰ, πείρας βάπτει, ἐν ὅπου αὐτὴν
ειδῶν μνησθείς θέλῃς σὺν ἁλφίτοις σὺν ἀγρίῳ. τὰ δὲ φύλλα ἐφθὰ ἐπὶ G
ὕδατι, πρὸς οἰδήματα ἐν ὀφθαλμοῖς φλεγμονὰς καταπλάσαντα, πρὸς σφακελίζοντα ἕλκη σὺν μέλιτι ἢ οἴνῳ· σὺν ὄξει δὲ, βαύματα θηριπλήκτων, ἐν σκορπιοπλήκτοις

sfiore plenioréque vmbella. Surculos in cacumine gerit exiguos, in quibus vmbellæ in modum anethi, flores parui candidique. Nascitur in agris subasperis, præcipuéque secus vias. Herba eximij vsus ad profluẽtem sanguinẽ, vlceráque tum veterata tum recentia, atque etiã fistulas.

De Verbasco. Cap. CIIII.

VERBASCVM genera habet summa duo: siquidem hoc albũ est, illud nigrum: rursúmque in albi genere alterum mas est, alterum fœmina. Ac fœminæ quidẽ folia sunt brassicæ, at pilosiora multò latioráque, & candida: caulis cubitalis aut amplior, albus, subhirsutus: flores candidi aut quadantenus ex luteo pallescentes: semen nigrum: radix longa, gustu acerba, crassitudine digiti. Nascitur in campestribus. Qui verò mas appellatur, albis est, oblongis, angustioribúsque foliis, ac tenuiori quoque caule. Nigrum autem albo prorsus esset simile, nisi latioribus nigrioribúsque folijs constaret. Est & Verbascũ syluestre, virgas gerens altas & arboris specie lignosas, folia saluiæ: habet autem vti marrubium verticillato circa virgas ambitu florem luteum, auro similem. Sunt porrò & Phlomides duæ, hirsutæ, humiles, rotundisque prædítæ folijs. Tertia præter has est quæ lychnitis vocatur, ab aliis thryallis, foliis ternis quaternísve aut etiã pluribus, crassis, pinguibus & hirsutis: ea ad lucernarum ellychnia apta est. Porrò duũm generum primo loco recensitorũ radix astringit: proindéq; alui profluuio laborãtibus ludicri tali magnitudine vtiliter ex vino propinatur. Decoctum ruptis, conuulsis, contusis & antiquæ tussi auxiliatur: ac dentiũ quoque dolores collutione mitigat. Verbascũ autẽ cui flos aureus, capillos tingit, & quocunq; loco reponatur, blattas in se contrahit. Cocta in aqua folia, œdematis & oculorum inflammationibus imponuntur, itémque syderatis vlceribus, ex melle aut vino. Cum aceto quoque vulneribus medentur, & à scorpione ictis opitulan-

tur. At verò syluestris folia ignì ambustis illinuntur. Fœminæ verò folia ferunt caricis interposita, eas incorruptas & à putredine immunes tueri.

De AEthiopide. Cap. CV.

AETHIOPIS folia etiam habet verbasco similia, perquàm hirsuta densáque, & circa imam radicem orbem conficientia: caulem quadrangulum, crassum & scabrú, similem apiastro aut arctio, multis concauum alis: semina erui magnitudine bina in singulis conceptaculis: radices ab eodem cespite numerosas, longas, crassas & gustu glutinosas: quæ siccæ nigrescunt, durántúrque vt cornua videri possint. Plurima in Messenia & Ida nascitur. Huius radix decocta potáque, ischiadi, pleuritidi, sanguinis expuitioni & arteriæ scabritijs auxiliatur: cum melle autem eclegmatis vice assumitur.

De Arctio. Cap. CVI.

ARCTION aliqui arcturum vocát, folia itidem habet verbasco similia, nisi quòd hirsutiora rotundioráque sunt: radicem tenerá, dulcem & albam: caulem mollem, longum: semen cumino paruo simile. Radix cum semine in vino decocta, dentium dolores mulcet, siquidem ore decoctum contineatur. Ambusta pernionésque eodem fouentur. Bibitur & propter ischiada vrinæque difficultatem è vino.

De Arcio, siue Personata. Cap. CVII.

ARCION, quod alij prosopida aut prosopion quasi personatam vocant, folia habet cucurbitæ, maiora tamen, duriora nigrioráque & hirsuta: caulem albicátem, quanquam & interdum herba hæc vidua caule reperiatur: radix grandis est, & intus quidem alba, foris verò nigra. Hæc drachmæ vnius pondere pota cum pineis nucleis, cruenta expuéntibus, purulentáque excreantibus auxiliatur. Trita quoque articulorum dolores ex contorsionibus contractos illitu sedat. Folia denique antiquis vlceribus vtiliter imponuntur.

A βοηθεῖ. τὰ δὲ τῆς ἀγρίας φύλλα ᾽ πυκνὰ ὄντα καὶ παχέα. τὰ δὲ τῆς ἡμέρου φύλλα φασὶ μὲν σύκων ξηρῶν σκωληκόβρωτα, ἄσηπτα αὐτὰ διαφυλάττειν. Totus hic locus inquit Goup desideratur in veteri: sed hæc omnia agnoscuntur ab interpretibus

Περὶ Αἰθιοπίδος. Κεφ. ρε'.

ΑΙΘΙΟΠΙΣ, καὶ αὐτὴ πολυφύλλου φλόμου ἔχει τὰ φύλλα, δασέα καὶ λίαν B καὶ πυκνά, κύκλῳ πως ἐπὶ πυθμένα τῆς ῥίζης καυλὸν τετράγωνον, παχύν, καὶ ξανθόν, ἐοικότα μυρσίνῃ ἢ ἀρκτίῳ, μεγάλας αἰθέρια πολλάς. καρπὸν δὲ ἔχει μέγαθος ὀσβέου σὺν δύο εἰς ἓν ἀγγεῖον· ῥίζας δὲ πολὺ τοῦ αὐτοῦ πυθμένος πολλάς, μακράς, παχείας, γλυκυρριζώδεις κολλώδεις· γίνεται δὲ ξηραινόμεναι μέλαιναι καὶ σκληραί, κέρασιν ἐοικυῖαι πλείστῃ δὲ ἁμαὶ καὶ περὶ Μεσσηνίαν καὶ περὶ Ἴδην. Ταύτης ἡ ῥίζα ἐψηθεῖσα καὶ πινομένη βοηθεῖ ἰσχιάδι, πλευρίτιδι, αἵματος πόσει, καὶ ἀρτηρίας τραχύτητι· λαμβάνεται δὲ μετὰ μέλιτος αἱρὶ ἐκλείχειν. Aethiopis.

Περὶ Ἀρκτίου. Κεφ. ρϛ'.

ΑΡΚΤΙΟΝ, οἱ μὲν ἀρκτοῦρον, φύλλα ἔχει ὅμοια καὶ αὐτὸ ἔχει οἷα καὶ τὰ φύλλα, δασύτερα δὲ καὶ τραχυλώτερα· ῥίζαν ἁπαλήν, γλυκεῖαν, λευκήν· καυλὸν δὲ μαλακόν, μαχρὸν καρπὸν δὲ κυμίνου μικροῦ ὅμοιον. Arctium, Matthiolo. καυλὸν δὲ μαλακὸν μακρὸν καρπὸν δὲ κυμίνου μικροῦ ὅμοιον.

Ταύτης ἡ ῥίζα δεινὰ μὲν ὀδόντων ἀφεψηθεῖσα ἐν οἴνῳ, ὀδύνας ἰσχιάδος διαχεῖ· πίνεται δὲ ἡμιόλιον κοτύλης ἑκάστης ἡμέρας ἐν ἡμέραις ἑπτὰ καθ' ἑκάστην κίνησιν δὲ καὶ πρὸς ἰσχιάδας καὶ δυσουρίας ἐν οἴνῳ.

Περὶ Ἀρκείου. Κεφ. ρζ'.

ΑΡΚΕΙΟΝ, οἱ δὲ, προσωπίδα, οἱ δὲ, προσώπιον καλοῦσι, φύλλα ἔχει ὅμοια τοῖς τοῦ κολοκύνθης, μείζονα μέντοι καὶ σκληρότερα καὶ μελαντέρα καὶ δασέα· καυλὸν ἐνίοτε δὲ καὶ ἄκαυλος εὑρίσκεται· ῥίζα μεγάλη καὶ λευκὴ ἔνδοθεν, ἔξωθεν δὲ μέλαινα. Πίνεται πρὸς βοηθεῖ πόσεως ἑκάστης ἡμ. ὀλίγος μὲν προβίλων, αἱμοπτοϊκοῖς, ἐμπυϊκοῖς. παιόμενα δὲ καὶ ἐκ τῶν λυσιμελῶν φέρεται ἄρθρα ὀδυνήματα, κατάπλασσόμενα λεία. καὶ τὰ φύλλα δὲ ὠφελίμως ἐπιτίθεται παλαιοῖς ἕλκεσι καθαπλάσματα. Ipsum dicunt quasi arctium alterum à Gal. vocatum. Ista non habet, nisi inter nostra, Ald. codex, vt neque vetus manuscriptus & Oribas.

Περὶ Πεταςίτου. Κεφ. ρη'.

Lac. legit in v.c. Sumitur

ΠΕΤΑΣΙΤΗΣ μέχρις ὅσου μείζων πήχεως, δακτύλου μεγάλου παχος, ἐφ' ᾧ φύλλον πετασώδες μέγα, τῷ σχεδίῳ ὅμοιον ὥσπερ μύκης, ποιοῦν τοῖς τὰ καρκίνια καὶ φαγεδαινικὰ ἕλκη, λῆρον καταπλασσόμενον.

V addit. καὶ ὑδρωπας & carbunculos.

Περὶ Ἐπιπακτίδος. Κεφ. ρθ'.

V. quid. an. μία μικρα Al. φύλλα.

ΕΠΙΠΑΚΤΙΣ, οἱ δὲ ἐλλεβορίνη, θαμνίσκος μικρὸς, ἐλάχιστα φύλλα ἔχων. πρὸς τὰ θανάσιμα ὑπὸ πίνεται, καὶ πρὸς τὰ ὑπὸ ἄπατι παθη.

V. addit. οἷον προυχοντα.

Περὶ Καπνοῦ. Κεφ. ρι'.

Al Coma in marg. alias συκωνίδες Lac. addit ex v. c. ὅθεν καὶ περὶ ταύτου ὀνόματος.

ΚΑΠΝΟΣ βοτάνιόν ἐστι θαμνοειδὲς, κοριάνδρου ὅμοιος, τὴν ὄψιν πάνυ· τὰ δὲ φύλλα λευκότερα καὶ τρυφερώδη, πολλὰ πάνυ τὰ χύδην· ἄνθος πορφυροῦν. τούτου ὁ χυλὸς δριμὺς, ὀξυδερκὴς, δακρύων ἀγαθὸς· ὅθεν καὶ τοὔνομα εἴληχεν. Δύναται δὲ καὶ τὰς ἐπὶ τῶν βλεφάρων διπλᾶς θρίχας σὺν κόμμι καταχριόμενος μὴ ἐᾷν φύεσθαι. Θρωθεῖσα δὲ ἡ πόα, οὖσα ἀγχόλωδη. Περὶ Λωτοῦ ἡμέρου. Κεφ. ρια'.

Lac. legit. πλείονα χρόνον δὲ οὐσαν ἀγχ. Al μικρὰ σχιδακίδια, καὶ περὶ ἑκάστην, ἃ πολλὰ ὄντα λέγεται.

ΛΩΤΟΣ ἥμερος, ἣν δέ, τρίφυλλον· φύεται δὲ παραδείσοις. ὃς χυλισθεὶς καὶ μιγεὶς μέλιτι, ἄργεμα καὶ νεφέλια καὶ λευκώματα καὶ τὰ ὑπόσκοτα τῶν κόρης ἀποκαθαίρει.

Περὶ Λωτοῦ ἀγρίου. Κεφ. ριβ'.

V. Romæis vel Papilion

ΛΩΤΟΣ ἄγριος, ἣν δέ, Λίβυον καλοῦσι, φύεται μὲν πλῆθος ἐν Λιβύῃ, καυλὸν φέρων δίπηχυν ἢ καὶ μείζονα, μασχάλας ἔχοντα πολλάς· φύλλα ὅμοια λωτῷ τριφύλλῳ, ᾧ ἐν χορτοκοπείοις χρώμεθα· ἄνθος ἐοικὸς τήλει, μικρότερον δὲ πολλῷ, Φαρμακῶδες τῇ γεύσει. Δύναται δὲ ἕλκη θερμαντικὴν, ὑπόπυον ποιεῖν, ἀποκαθαρτικὴν ἀπὸ λίθων τῶν ἐν τῷ σώματι καὶ ἐφηλίδων, σὺν μέλιτι καταχριόμενος. πίνεται δὲ καθ' ἑαυτὸν λῆρος, ἢ ἐν μετὰ μεγάλης ἄνθος σὺν οἴνῳ ἢ γλυκεῖ, ἰοῖς τε ῥὶς κύστις ἀγήμασι βοηθεῖ. Περὶ Κυτίσου. Κεφ. ριγ'.

V. μικρὸν πανὶ

ΚΥΤΙΣΣΟΣ θάμνος ἐστὶ λευκὸς ἄλλος ὡς ῥάμνος, κλάδους ἀϊσσεις πηχαίους ἢ μείζονας, τοῖς ἐν τοῖς φύλλα ὅμοια τήλι-

De Petasite. Cap. CVIII.

PETASITES pediculo est cubitali maiore, & crassitudine pollicis, cui folium pregrande petasi modo amplum ceu fungus incumbit. Tritum id contra maligna & phagedænica vlcera efficaciter illinitur.

De Epipactide. Cap. CIX.

EPIPACTIS ab aliis Elleborine vocata, frutex est pusillus, perquàm exiguis constans foliolis. Contra venena & iocineris vitia pota prodest.

De Capno seu fumaria. Cap. CX.

FVMARIA fruticosa est herbula, coriandri similitudine, prætenera, foliis candidioribus & cineracei coloris, vndique numerosis: flore purpureo. Huius succus acris est, claritatémq; facit oculis & delacrymationé, ceu fumus: vnde & herba nomen traxit. Illitus cum gũmi, duplicatos palpebrarum pilos euulsos renasci prohibet. Cæterùm herba in cibo sumpta, copiosam bilem per vrinas trahit.

De Loto satiua. Cap. CXI.

LOTVS satiua quam aliqui Trifolium vocant, nascitur in hortis. Expressus ea succus addito melle, argema, nubeculas, albugines exteráque vitia caliginem oculis offundentia discutit.

De Loto sylvestri. Cap. CXII.

Sylvestris lotus, quam alij Libyon appellant, pluuima in Libya gignitur, caule bicubitali aut etiam maiore, alis multis: foliis loti trifoliæ pratensis: semine fœnigræci, at minore multò, gustu medicato. Vim calfaciendi & leniter astringendi obtinet. Tollit è facie nævos, itémque maculas à Solis ardore contractas, si cum melle perungatur. At trita per sese aut cum maluæ semine, & ex vino aut passo bibita, doloribus vesicæ succurrit.

De Cytiso. Cap. CXIII.

CYTISVS frutex est albus in totum, vti rhamnus, ramos spargens cubitales ac etiamnum maiores, in quibus folia fœnigræci,

ramos effundit Pl.

aut lori trifoliæ, niſi quòd minora ſunt, dorſóque medio prominétiore. Ea digitis trita erucam olent, guſtaráque cicer viride ſápiunt. Folia vim habent refrigeratoriam: œdemata intet initia diſcutiunt, ſi cum pane trita illinantur. Eorum quoq; decoctum vrinam potu ciet. Cæterùm nonnulli, quòd apes alliciat, eam propter aluearia ſerunt.

De Loto AEgyptia. Cap. CXIIII.

LOTVS quæ in Ægypti cápis flumine inundatis prouenit, caule eſt (Ægyptiæ) fabæ ſimili: flore paruo, candido, liliaceo ſimili, qué tradunt ad ortum Solis aperiri & expandi, eodem occidente comprimi occludíque: hócque ampliùs, caput ipſum veſpera mergi aquíſque condi, rurſúmque ad exortum Solis emergere extra aquam. Refert verò caput calycem papaueris maximum. In eo grana ſunt ceu milij, quæ Ægyptij ſiccant & in panes cogũt. Radicem Lotus hęc habet mali cotonei ſimilitudine, quæ & ipſa cruda coctáque manditur: cocta ſanè qualitate vitello oui reſpondet.

De Myriophyllo, ſeu millefolio. Cap. CXV.

MYRIOPHYLLON cauliculo eſt ſingulari, tenero, vnicáque nixo radice: foliis circa caulem lęuibus, fœniculi ſimilibus, iiſque plurimis, vnde & nomen accepit. Eſt verò caulis quadantenus cauus, coloribus varijs diſtinctus, & quaſi ſtudio atque artificio limatus & expolitus. Naſcitur in paluſtribus. Vulnera recentia ab inflammatione vindicat, ſeu viride ſeu etiam ſiccũ ex aceto oblinatur: præcipitatis quoq; ex alto cũ aqua & ſale potui datur.

De Myrrhide. Cap. CXVI.

MYRRHIS, quam alij myrrhá nominant, ſimilis eſt cicutæ caule foliiſq; radicẽ verò habet oblongá, tenerá, rotúdá, odoratá, cibo nõ inſuauẽ. Hęc pota in vino, phalangiorum morſibus auxiliatur. Ciet verò mẽſtrua, & fœminarũ purgationes à puerperio trahit. Eadẽ decocta & in ſorbitione data, phthiſicis ſubuenit. Tradunt & nonnulli eandẽ bis die térve potam ex vino in peſtilenti conſtitutione ita ſalutarem eſſe, vt arceat morbi contagia.

A δι, ἢ λωτὸς φύλλῳ μικρότερα· ἢ ὑράχιν ἔχουσα μείζονα· ἐπὶ δὲ ἀγκρίζονται τοῖς δακτύλοις ὄζοντα· βύζωμον· ἐν ἢ τῇ γλώσσῃ ὅμοια ἐρεθίζοντος χλωροῖς. Διώλαμεν ἢ ἐκ τὰ φύλλα ψυκτικὰ· διαφορητικὰ τῶν ἐν ἀρχῇ οἰδημάτων, σὺν ἄλφιτα καταπλασθέντα. καὶ ἢ κεφαλὴ τὸ ἀφέψημα αὐτῶν πινόμενον. ἔνιοι ἢ φυτύουσιν αὐτὸ περὶ τοῖς σμήνεσιν, ὡς ἑπακτικὸν τῶν ἀνθέων.

Lacuna legit in V. e. marg.

V. ἢ χλωρόν. Lacuna legit cum ἐπὶ τὸ ψυκτικὸν

Γπερὶ Λωτοῦ Αἰγυπτίου. Κεφ. ριδ'.

B ΛΩΤΟΣ ὁ ἐν Αἰγύπτῳ ποταμίου ἐν ἢ ὕδατι τὸ ἐπικλυσθέντι πεδίῳ, καυλὸς ἐστὶ ἢ κυάμου ἐμφερὴς· ἔχων ἄνθος μικρὸν, λευκὸν, ἐοικὸς κρίνῳ, ὃ φασὶ τῇ ἡλίου ἀνατολῇ ἀνοίγεσθαι καὶ ἀναπετάννυσθαι, δύνοντος ἢ μίκρ' ἔλαττον τὸ κωδίου κρύπτεσθαι ἐν ἢ ὕδατι, πάλιν τὸ πρὸς τὴν ἀνατολὴν τὸ ἡλίου ἀναφαίνεσθαι. ἔοικε ἢ ἡ κωδία μήκωνι μεγίστῃ· ἐν ἢ καρπὸς ὡς κέγχρος, ὃν ξηράναντες οἱ ἐν Αἰγύπτῳ, καὶ μίσγοντες εἰς ἄρτοποιΐαν. ῥίζαν ἢ ἔχει ὁμοίαν μήλῳ κυδωνίῳ, ἣ τις ἐν αὐτῇ ἐσθίεται ὠμὴ τε ἐφθή. αἰσθάνομαι δὲ ἐψηθεῖσα τῇ ποιότητι λευκῇ ᾠοῦ. Περὶ Μυελοφύλλου. Κεφ. ριε'.

C ΜΥΡΙΟΦΥΛΛΟΝ καυλίσκος ἐστὶ μονοφυὴς, ξυφοειδὴς, μονόῤῥιζος· περὶ ἢ φύλλα πολλὰ, λεπτὰ, ἅμα ἐσθῆτα ὁμοίας ἔθνει καὶ ὀνόματι. ὁ ἢ καυλὸς ἐστὶ κοῖλος, ἀλλὰ ποικίλος, ὡς ἐκτὸς δοκεῖν διεῤῥιμμένος φυῇ· ὃ χρῶνται πρὸς τοῦτο τῇ ἀφελεῖν μάλα τὰ νεόπτωτα τῇ ἕλκεσιν, σὺν ὄξει χλωρόν τε ξηρὸν καταπλασσόμενον· ποτίζει ἢ καὶ τοὺς πλεύμονας σὺν ὕδατι καὶ ὀξυκράτῳ.

D Al. ἀνθεμίδι ἐστὶ λεπτ. V. caret

V. caret

Al. ἀνθεμίδι ἐστὶ λεπτὰ ἅμα ἐσθῆτα ὁμοίας ἔθνει καὶ ὀνόματι· ὁ ἢ καυλὸς ἐστὶ κοῖλος, ἀλλὰ ποικίλος, ὡς ἐκτὸς δοκεῖν διεῤῥιμμένος φυῇ· ὃ χρῶνται πρὸς τοῦτο τῇ ἀφελεῖν μάλα τὰ νεόπτωτα τῇ ἕλκεσιν, σὺν ὄξει χλωρόν τε ξηρὸν καταπλασσόμενον· ποτίζει ἢ καὶ τοὺς πλεύμονας σὺν ὕδατι καὶ ὀξυκράτῳ.

Cellorium Vulg. ex Dioſcor.

V. κοιλοκαλλίδ- πτωτα

Sic Goop. alter codex Vulg. ex. διεῤῥιμμένος μάλιστα

πλάσσειν legendum ſatis ſuipſe patet Marcellus.

Γπερὶ Μυῤῥίδος. Κεφ. ριϛ'.

E ΜΥΡΡΙΣ, ἣν δὲ μύῤῥαν καλοῦσι, ὡς καυλῷ μὲν τοῖς φύλλοις ἔοικε κωνείῳ· ῥίζαν ἢ ἔχει θρυμματικὴν, ἀπαλὴν, εὐφερῆ, βώδη, ἡδεῖαν ὀσφρήσασθαι. Ἣ πίνεται πρὸ μάλα σὺν οἴνῳ, φυγαδιοδήκτοις βοηθεῖ· καθαίρει ἢ ἐμμελῶς, καὶ λόχια· καθίστησι δὲ ὀλίγα τὰ ῥοφήσασιν, ὠφελίμως φθισικοῖς δίδοται· ἰσχυρότερον δὲ ἔνιοι, πτισάνῃ τὴν αὐτὴν δίς ἢ τρὶς τῆς ἡμέρας σὺν οἴνῳ τὸ λοιμικῆς καταστάσεως, βοηθεῖ πρὸς τὰ αἴτια σχεδιάζοντα.

V. κοιλοκαλλίδ- πτωτα

Sic Goop. alter codex Vulg. ex. διεῤῥιμμένος μάλιστα

πλάσσειν legendum ſatis ſuipſe patet Marcellus.

Περὶ Μυάγρου. Κεφ. μζ'. A

ΜΥΑΓΡΟΣ, ὃν δι. μυγάμπυρον, πόα φρυγανώδης, ὄπποχυς, φύλλα ἔχουσα ἐμφερῆ τοῖς τῦ ἐρυθροδάνου, ὡχρὰ σπέρμα μελαχίῳ ὁμοιον, λιπαρόν. ᾧ χρῶνται κόπλοντες αὐτὸ πρὸς ῥόθια, καὶ σφακελίζοντες ῥάδιος, καὶ αὐτὴ λύχνου χρώμενοι. δοκεῖ δὲ τὸ ἐξ αὐτῦ λίπος ὀμαλίζειν B καὶ λειαίνειν τὰς τῦ σώματος τραχύτητας.

Περὶ Οἰνάγρας. Κεφ. μη'.

ΟΙΝΑΓΡΑ, ἣν δέ, ὀνοθήρειον, οἱ δέ, ὄνηρον, θάμνος ἐστὶ δενδροειδὴς, ὑπομέγεθης, φύλλα ἔχων ἀμυγδαλῇ παραπλήσια, πλατύτερα δὲ καὶ ἐμφερῆ τοῖς τοῦ κρίνου· αὐτὴ ῥοδόχρους, μεγάλας· ῥίζαν δὲ λευκὴν, μακρὰν, ἣν τις ξηράνας θύσας, οἴνῳ ὑσμὴν ἀποδίδωσι. φύεται δὲ ὀρεινοῖς τόποις. Δύναμιν δὲ ἔχει τὸ ἀποβρεγμα τῆς ῥίζης ὑπὸ τῶν ἀγρίων ζώων πινόμενον, ἡμερωθῆναι αὐτὰ καὶ παραθῦσαι δι, τροφὴν τὰ θηριώδη ἕλκη. C

Περὶ Κιρσίου. Κεφ. μθ'. D

ΚΙΡΣΙΟΝ καυλός ἐστιν ἁπαλὸς, ὡς ὄπποχυς, βίγονος, τὰ κάτωθεν φυλλώδεια ῥοδόχρων, ἔχοντα τὰ γονία ἀκανθώδεις ἐξοχὰς μικρὰς. τὰ δὲ φύλλα ὑπογλαυκα ἐμφερῆ, δασέα μετρίως ἔχοντα· τὰ δὲ ἄκρα, ὑπόλευκα, ἀκανθώδη τοῖς πέρασι. τὸ δὲ ἀνώτατον τῦ καυλῦ πεφορημένον, δασύ, ἔχον ἐπ' αὐτῷ κεφάλια ἀκανθόπορφυρα, ὡς τὰ πασσάλια. Τούτῃ τὴ ῥίζῃ Ἀνδρέας ἀναδεσάμενος ὠφελεῖσθαι λέγει πρὸς τόπους ἀναδυομένους, παυόμενα χειρῶν πόνους. E

Περὶ Ἀστέρος Ἀττικοῦ. Κεφ. ν'.

ΑΣΤΗΡ Ἀττικὸς, ῥαδίου ξυλώδης, ἐπ' ἄκρου ἔχων αὖθις πορφυροῦν, ἢ μίλτινον, ὥσπερ ἀνθεμίδος κεφάλιον πεφορημένος· ἧλιξ δὲ φυλλάρια ἀσφοδέλου ὅμοια. τὰ δὲ περὶ τὸν καυλὸν φύλλα ὑπομήκη καὶ δασέα. Ὠφελεῖ δὲ τὰ μάλιστα ἐκπυρώμενον, καὶ παραπλασσόμενον, καὶ ὀφθαλμῶν φλεγμονὰς καὶ βυβῶνας, καὶ τοῖς τροπικοῖς ἕλκεσι. φασὶ δὲ καὶ τὸ πορφυρίζον τῶν ἀνθέων, μὲν ὑδαρὲς πεθὲν, συναγωγοῖς χρῆσθαι, καὶ ἐπιληψίας παίδων. ἁρμόζει δὲ καὶ παραπλασσόμενον ὑπὸ τροφὸς ἐκθλίψεσι φλεγμο- F G

Vulg. ex. γλυκυμύρρας. sed vtrique Goop. codex vetustior esse conextum scripturam testatur.

Vulg. ex. μυρρίνου.

Ald. αμωλου & sic deinceps

V. ἐπὶ

V. μακρόστερα

V. ἀκανθώδη τοῖς πέρασι. Ald. χρῶς περ γεται

Orib. κ' ξυλώδεις

V. ῥαδίου ξυλώδη

V. πολυγόνις. Quidam ubi γόνιμα φυλλάρια vertunt.

V. aliqui vsq; ad ὑγιάζει.

De Myagro. Cap. CXVII.

MYAGROS, quam aliqui melampyron vocant, herba est è cremiorum genere, bicubitalis, folijs rubię similibus, pallidis: semen verò gerit fœnogræco simile, pingue: quo quidem torrefacto & tuso virgas oblinunt, iisque lucernarum vice vtuntur. Cæterũ hoc pingui corporis scabritias expoliri læuigarique constat. Nisi fortasse

De OEnagra. Cap. CXVIII.

OENAGRA siue œnothera aut œnuris, frutex est arboris specie, prægrandis, folio amygdalaceo, sed latiore, liliaceo nõ dissimili: floribus roseis, magnis: radice candida, longa: cùm siccata est, vinũ olente. Nascitur in montanis. Radicis dilutum feris animantibus in potu datũ, vim hanc habet, vt eas ex feritate ad mansuetudinem traducat. Quin & illitu eadem radix efferantia sese vlcera mitigat.

De Cirsio. Cap. CXIX.

CIRSIVM caule est tenero, duũm fermè cubitorum, triangulari, ab imo foliis roseę pusillis circundato, quæ quidem angulos habent ex interuallis spinosos, sed molles: folijs bugloſſo similibus, modicè hirsutis, longioribus, subcandidis & per extremitates aculeatis. Est autem pars summa caulis rotunda & hirsuta, illiq; insidẽt capitula in summo purpurea, quę in pappos seu lanugines soluuntur. Huius radicem memorię prodidit Andreas laboranti loco adalligatam, dolores varicũ sedare.

De Astere Attico. Cap. CXX.

ASTER Atticus, (qui ab aliquibus Bubonium appellatur) virgultũ est lignosum, florem habens in cacumine purpureum aut luteum, per ambitum anthemidis capituli modo diuisum, foliolis stellę modo radiatis. Quæ verò caulem circundãt folia, oblonga sunt ac hirsuta. Exæstuanti stomacho, oculorum & inguinum inflammationibus, sedíque prociduæ illitu auxiliatur. Aiunt & id quod in flore purpurascit ex aqua potũ, angina laborantibus puerisq; comitialibus opitulari. Prodest verò flos recens ac etiamdũ humidus, inguinum inflámationi adhibitus. Si

tus. Si verò aridus siniſtra laborantis manu decerpatur, & inguini adalligetur, dolore liberat.

De Isopyro. Cap. CXXI.

ISOPYRON vocant aliqui Phaſiolum, quoniam ad phaſioli ſimilitudinem in ſummo folio pampinum ſeu clauiculam gerat. Capitula ſunt in ſummo caule tenuia, minutorũ ſeminum plena, melanthij ſaporem imitantium. At folium eſt aniſo ſimile. Semen contra tuſſim eęteráque pectoris vitia cum aqua mulſa bibitur. Sanguinẽ quoque excreantibus & hepaticis vtile.

De Viola nigra ſeu purpurea. Cap. CXXII.

VIOLA folium habet hederaceo minus, tenuius atque nigrius: alioqui haud ita diſſimile. Cauliculus à radice medius prodit, in quo floſculus per quàm ſuauiter olens, purpureus. Locis naſcitur opacis & aſperis. Refrigerandi naturam habet: proindéque folia per ſe & cum polenta impoſita, ſtomacho ardenti, oculorũ inflammationibus, procidentíque ſedi auxiliantur. Aiunt & id quod in flore purpureum eſt in aqua potum, angina laborantibus, puerísque comitialibus opitulari.

De Cacalia. Cap CXXIII.

CACALIA ſiue Leontice, folia profert candida, prægrãdiáque: è quorum medio caulis emicat rectus, albus, florem ferens bryoniæ ſimilem. Naſcitur in mõtibus. Huius radix in vino macerata ceu tragacantha, & delincta commanducatáve per ſe, tuſſi & arteriæ ſcabritiei medetur. Grana verò quæ poſt excuſſum florem ſubnaſcuntur, trita & cerato excepta illitáque, extendunt cutem in facie, eámque à rugis vindicant.

De Bunio. Cap. CXXIIII.

BVNIVM caulem edit quadrangulum, procerũ, digiti craſſitudine: folia verò apio ſimilia, verùm tenuiora multò, & coriãdrinis proxima: florẽ anethi: ſemẽ odoratum, hyoſcyami ſemine minus. Ciet id vrinas, excalfacit & ſecũdas euocat:

Πεεὶ Ισοπύεου. Κεφ. ρκά.

ΙΣΟΠΥΡΟΝ, ⓓ δὶ, φασίολον καλῶσιν, ἀπὸ τῆ ὁμοιότητος φασόλῳ, τῷ κατ' ἄκρου δ' πόα ἔλικα φέρει· ἔπειτα δὶ καφαλαὶ ἐπ' ἄκρου τῦ καυλῦ λεπταὶ, σπερμάτων πλήρεις, τὸ μέγεθος μελανθίῳ τῷ γλῦκει· τὸ δὶ φύλλον ὁμοίως. Τούτου τὸ σπέρμα πινόμενον σὺν μέλικράτῳ, ἕλκει τὰς ἐν θώρακι πόνους & ἕξεις ὠφελεῖ· αἱμοπτοϊκοῖς τε & ἡπατικοῖς ἁρμόζει.

Πεεὶ Ιου. Κεφ. ρκβ'.

ΙΟΝ φύλλον ἔχει μικρότερον κισσοῦ καὶ λεπτότερον, μελαίτερον δὶ καὶ οὐκ ἀτόμιον. Ἡ καυλίον μέσον ἀπὸ τ ῥίζης, ἐφ' ᾧ αὐθήλιον σφόδρα βώδες, πορφυρεῶν. φύεται δὲ παλιστίοις καὶ πετρώδεσι τόποις.

Δυνάμει δὶ ἔχει ψυκτικὴν· οὗ τε φύλλα καταπλασσόμενα καθ' ἑαυτὰ καὶ μετὰ ἀφέψου, βοηθεῖ στομάχῳ καυσουμένῳ, καὶ ὀφθαλμῶν φλεγμοναῖς, καὶ παῖς τῆς ἕδρας προλιπώσαις. Φασὶ δὲ & πορφυρίζον τοῦ ἄνθους μετ' ὕδατος πῶσιν, στομαγχικοῖς βοηθεῖν & ὑπαληψίαις παῖς ὑπὸ παιδων.

Πεεὶ Καταλίας· Κεφ. ρκγ'.

ΚΑΚΑΛΙΑ, οἱ δὶ, λεοντικὴ, φύλλα φέρει λευκὰ, βύμεγέθη· καυλὸς ὑ ἐξ αὐτῶν μέσος ὀρθὸς, λευκὸς, ἄνθος ἔχων ἑοικὸς βρυωνίᾳ· ἐν ὄρεσι δὶ φύεται. Ταύτης ἡ ῥίζα ἐν οἴνῳ βρεχομένη ὡς τραγάκανθα & ἐπιλιχμωμένη, ἢ ἁφὴ μαλάσσει καθ' ἑαυτὴν, ὄγχας & δασύτητας τῆς ἀρτηρίας ἰᾶται. ⓓ δὶ μετὰ τ ἐξανθησιν ὅτι φυόμενοι κάκκοι, λῷοι αἱ ἁλιφθέντες χνρωτῇ καὶ ὅτι χειμάζοντες, τιτθοὺς & ἀῤῥυλίδωτον τηροῦσι τὸ πρόσωπον.

Πεεὶ Βουνίου. Κεφ. ρκδ'.

ΒΟΥΝΙΟΝ καυλὸν ἰσχνὸν τετράγωνον, βύμετρον, πάχος δακτυλιαῖον. Φύλλα δὶ ὅμοια σελίνῳ, λεπτότερα δὶ πολλῷ πρὸς τὰ τοῦ κορίου· ἄνθος ἀνηθου· σπέρμα βώδες, ὑοσκυάμου μικρότερον. Ἐστὶ δ' οὐρητικὸν, θερμαντικὸν, & διὰ πέρων ἀγωγὸν

A ναί. ξηρὸν δὶ αἱρεθὲν τῇ ἀριστερᾷ χειρὶ τῦ ἀγρυπνῶντος, καὶ προσαφθὲν τῷ βουβῶνι, ἀπαλλάσσει τῆς ὀδυνης.

B

C

D

E

F

G

V. mandit, μασήσας καὶ

V. cum inclusa.

V. cauliculus

Al. βρυώνιον sed minus recte.

Lac. legitur alterum, ἄνθος ἔχων βρυωνίας Vulg. exempl. ἄνθει ἔλικας

Ald. in marg. addit, καὶ ἐν ἄλλοις ἀντίγραφοις οὐκ ἔστιν ἰδεῖν τοῦτο, τὸ μέλας ἀκατανόητον. εἰ δὲ ἐν ἄλλοις εὑρίσκεται ἀντίγραφοις, τάδε φύλλα δὲ ἐστὶν ἐν ἴδιον σκίλλης

Sic & Orib. al. βολβὸν. Lac. aut legit in cod. veteri πρὸς τὰ τῦ κορίου. αὐτὸς ἀνήθου. πάχος. Dodon. legendũ putat πρὸς τὰ ἄκρα. Al. ἀδῦτα

σπλῆνί τε καὶ νεφροῖς καὶ κύσει ὀπτισθέν. χρῶνται δὲ αὐτῆ ὑγρῷ τε καὶ ξηρᾷ, καὶ χυλισθέντες σὺν τοῖς ῥίζαις καὶ τοῖς καυλοῖς καὶ καὶ τοῖς φύλλοις, μετὰ μέλιτος πότου.

Περὶ Ψευδοβουνίου. Κεφ. ρκέ.

Ψευδοβούνιον δαμνίον ὅσον σπιθαμιαῖον ἐν Κρήτῃ, ἔχον φύλλα βουνίου ὅμοια, ὀρμίαι. δίδοται δὲ καὶ τὰ ἐξ αὐτοῦ πινόμενα χλαῖα ὅσον δ'. σὺν ὕδατι, τρόφοις καὶ στραγγουρίας, καὶ πλευρᾶς πόνοι θεραπεύει. Διαφορεῖ δὲ καὶ χοιράδας, μετὰ ἁλῶν καὶ οἴνου κεχαπλασμένα χλιαρά.

Περὶ Χαμαιτίσσου. Κεφ. ρκς'.

ΧΑΜΑΙΤΙΣΣΟΣ φύλλα ἔχει ὅμοια κισσοῖς, μακρότερα δὲ καὶ λεπτότερα, πολλά· χλαῖα σπιθαμιαῖα, εὐθέτλεα φύλλων ἀπὸ τῆς γῆς ἐπὶ ς', αὐθη λευκοῖοις ὅμοια, μικρότερα, καὶ πικρὰ πρὸς τὴν γεῦσιν ἰσχυρῶς· ῥίζα λεπτὴ, λευκὴ, ἄχρηστος φύει ἐν ἐργασίμοις χωρίοις. Ἁρμόζει δὲ τὰ φύλλα ἰσχιαδικοῖς, ὅσον τριώβολος ἐν ὕδατι κυάθοις τρισὶ πινόμενα ἐπὶ ἡμέρας μὲ ἢ ι'. καὶ ἕκτεσι δὲ ἀποκαθαίρει, ὁμοίως πινόμενα ἐπὶς ς' ἢ ζ'. ἡμέρας.

Περὶ Χαμαιλεύκης. Κεφ. ρκζ'.

ΧΑΜΑΙΛΕΥΚΗ πίπτει πρὸς ἰσχύος ἀλγήματα, ἐν ὕδατι λεία πινομένη. [ἔστι δὲ ἡ βοτάνη ὁλίχλωρος, ἔχουσα φυλλάρια ὀπισθαμπῆ, καὶ τὰ κλάδια ἐπικαμπῆ. καὶ αὐθη ὡς ῥόδα.]

Περὶ Βουγλώσσου. Κεφ. ρκή.

ΒΟΥΓΛΩΣΣΟΝ ἔοικε φλόμῳ φύλλοις δὲ ἔχει χαμαιπετῆ, τραχύτερα καὶ μελανίτερα, ὅμοιον βοὸς γλώσσῃ. ὃν καταμίξαντες εἰς οἶνον, εὐφροσύνους δοκεῖ εἶναι.

Περὶ Κυνογλώσσου. Κεφ. ρκθ'.

ΚΥΝΟΓΛΩΣΣΟΝ φύλλα ἔχει ἀγριογλώσσῳ ὁμοίως πλατυφύλλῳ ἐμφερῆ, γενύτερα ἢ ἐλάττονα καὶ μικρότερα, χνοώδη. ἄκαυλον, ἐπὶ γῆς ἑρπούσης φύει· ἐν ἀμμώδεσι τόποις. Δύναται δὲ ἔχει τὰ φύλλα λεανθέντα σὺν σταφίδι παλαιῷ ὑείῳ, κυνοδήκτοις καὶ ἀλωπεκιζομένοις ἐπιτιθέμενα. ἀφαιρεῖ δὲ καὶ τὰς ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν ὑπογραφὰς, καὶ τὰς ἐκ τῶν ἀνθρακώσεις ἐπιτιθέμενα. ἐπουλοῖ δὲ καὶ τὰ ἕλκη τὰ ἐν τοῖς στόμασι καὶ τοῖς αἰδοίοις καὶ τοῖς ἕδραις, καὶ τὰ ἐν τοῖς ἀναλήμμασι καὶ τοῖς ἀπορρωγάσι καὶ τοῖς ἐπιτιθέμενα. ἐπουλοῖ δὲ καὶ τὰ ἕλκη τὰ ἐν τοῖς στόμασι καὶ τοῖς αἰδοίοις καὶ τοῖς ἕδραις, καὶ τὰ ἐν τοῖς ἀναλήμμασι καὶ τοῖς ἀπορρωγάσι καὶ τοῖς ἐπιτιθέμενα.

Goup. annotat addēdum ex veteribus. καὶ πλευρίτιδι. al. καὶ πλευρίτιδι. V. caret.

V. caret.

Ald. in nothis addit καυλότερα ἢ λεπτότερα. V. μικρά

Illa quæ sequuntur ad finē vsq; ex Ald. codicis nothis adiecimus.

Cætet. τραχύτερα, καὶ μελανίτερα. V. addit καὶ μικρότερα. ita & Otho.

Cod. v. Δύναται δὲ καὶ ἐπιμηνίδι, ἐφεστὸς τῇ μήτρᾳ· φύσει ἐφυσίας ποιεῖ.

lieni, renibus ac veficæ vtile. Cæterùm feminis tam humidi quàm ficci, itémque fucci ab eo vna cùm radicibus caulibus ac folijs expreſſi vſus eſt ex aqua mulſa.

De Pſeudobunio. Cap. CXXV.

Pſeudobunium palmi altitudine fruticat in Creta, folia ramulóſque bunij ferens, acri guſtu. Quaterni eius ramuli ex aqua bibiti, tormina, ſtranguriam, lateríſque dolores ſanant: diſcutiunt & ſtrumas, ſi cum ſale & vino repétes imponantur.

De Chamaciſſo, ſeu hedera humi repente. Cap. CXXVI.

CHAMÆCISSOS folijs eſt hederæ, at longioribus tenuioribúſque, numeroſis: ramulis ab radice quinis ſeníſve, dodrantalibus, folioſis: floribus leucoij ſeu violæ albæ, minoribus tamen, & guſtu admodum amaris: radice tenui, candida, inutili: naſcitur in cultis. Folia vtiliter bibunt iſchiadici tribus obolis in aquæ cyathis tribus, quadragenis quinquageníſve diebus. Eodem pota modo ſenis aut ſeptenis diebus, regium morbum emendat & expurgant.

De Chamapence. Cap. CXXVII.

CHAMÆPEVCE lumborũ doloribus propitia eſt, ſi trita ex aqua bibatur. Eſt autem herba tota viridis herbaceíve coloris, foliolis ramuliſque incuruis, floribus roſaceis.

De Bugloſſo. Cap. CXXVIII.

BVGLOSSVM verbaſco ſimile eſt, folio in terra ſparſo, verùm aſpero, nigriore minoréque, bubulę linguæ ſimili: quod vino inditum animi voluptates augere, hilaritatémque afferre creditur.

De Cynogloſſo. Cap. CXXIX.

CYNOGLOSSON folia latifoliæ plantaginis habet, at anguſtiora & minora, lanuginoſa. Caule vacat, humiq; ſternitur. Prouenit in fabuletis. Folia cum ſuillo adipe veteri trita, canum morſibus, alope-

cijs ambustísque medentur. Ipsius verò herbæ decoctum ex vino potum, aluum emollit.

De Phyteumate. Cap. CXXX.

PHYTEVMA folia habet radiculæ, sed minora: semen copiosum, perforatum: radicem paruam, tenuem, per summa terræ nitétem: quam ad amatoria conuenire nonnulli prodiderunt.

De Leontopodio. Cap. CXXXI.

LEONTOPODION duorũ digitorum herbula est, foliola habens arcta, robusta, quaternûm ferè aut etiam ternûm digitorum longitudine, hirsuta, quæq; radici proxima sunt lanatiora & subalbida: capitula in summis caulib⁹ quasi perforata, in quibus flores nigri. Semé verò vsqueadeò spissa lanugine obuolutũ est, vt ægrè deprehendi possit. Radix subiacet parua: quá etiam tradunt amuleti ratione alligatam ad amatoria prodesse, tuberculaq; discutere.

De Hippoglosso. Cap. CXXXII.

HIPPOGLOSSON pusillus est frutex; folia habens tenuis syluestris myrti figura, comámque spinosam, & in summo ceu ligulas secundũ folia exeuntes. Coma caput dolentibus amuletum vtile creditur. Malagmatis radix expressúsque succus admiscetur.

De Antirrhino. Cap. CXXXIII.

ANTIRRHINON siue anarrhinon, aliqui etiá lychnida syluestrẽ vocauerunt. Herba est caule foliísq; anagallidi similis: florib⁹ leucoij, minoribus tamen, purpureis: ideò etiá syluestris lychnis nominata est. Fructú verò gerit vituli nariú simílẽ, aspectu russeũ. Traditur hæc amuleti instar adalligata, malis medicamẽtis veneficiisque aduersari, iísq; gratiá cóciliare, qui ea cũ oleo liliaceo cyprinóve perũcti fuerint.

De Catanance. Cap. CXXXIIII.

EX Catanances generibus vna folia habet lõga ceu coronopi, radicem iunci modo ptætenuem: capitula sena septenáve, in quibus semen eruo simile. Arescens in terram euruatur, & se cõtrahit ad speciem vnguium milui exanimati.

Περὶ Φυτεύματος. Κεφ. ρλ'.

ΦΥΤΕΥΜΑ φύλλα ἔχει ὅμοια σφονδύλῳ, μικρότερα δὲ· καρπὸν πολύν, πτερυγίνου· ῥίζαν μικράν, λεπτήν, ὀσμὴν λαμπρὸν αἰσχροῖς ἔρωσι βίαιον πρὸς φίλτρα.

Περὶ Λεοντοποδίου. Κεφ. ρλά.

ΛΕΟΝΤΟΠΟΔΙΟΝ διδάκτυλιόν ἐστι βοτάνιον, ἔχον φύλλα στενά, λιχνοειδῆ, ὡς ταπείρινον δακτύλου ἢ καὶ μείζω τὸ μῆκος, δασέα, ἐριώδη περὶ τὰ κατὰ τὴν ῥίζαν καὶ ὑπόλευκα· ἐπ' ἄκρων δὲ τῶν καυλῶν κεφάλια ὥσπερ πτερυλλία, ἐν οἷς αὐθις μέλανα· ὁ δὲ καρπὸς αὐτοῦ δυσθεώρητος διὰ τὸν περὶ αὐτὸν χνοῦν ἐριῶδες· ἔστι χρεὼν ῥίζα δ' ὑπῆν μικρά. Φασὶ δὲ καὶ ταύτην βιαζομένην εἰς φίλτρα περιαπτομένην, καὶ φύματα διαφορῆσαι.

Περὶ Ἱππογλώσσου. Κεφ. ρλβ'.

ΙΠΠΟΓΛΩΣΣΟΝ θαμνίσκος ἐστὶ μυρσίνῃ ἀγρίᾳ καὶ λεπτῇ τὰ φύλλα ὅμοιος. κόμην δ' ἀκανθώδη ἔχει, καὶ ἐπ' ἄκρῳ ὥσπερ γλωσσίδα πρὸ τῶν φύλλων. Δοκεῖ δὲ ἡ κόμη περίαμμα εἶναι χρήσιμον κεφαλαλγοῦσι· μίγνυται δ' καὶ εἰς μαλάγματα ἥτις ῥίζα, καὶ τὸ χύλισμα.

Περὶ Ἀντιρρίνου. Κεφ. ρλγ'.

ΑΝΤΙΡΡΙΝΟΝ, οἱ δὲ, ἀναρρῖνες, ἔνιοι δὲ καὶ ταύτην λυχνίδα ἀγρίαν ἐκάλεσαν, ἥτις ἐστὶν ἐμφερὴς ἀναγαλλίδος φύλλοις καὶ καυλῷ· τὸ δ' ἄνθος πορφυρᾶ, ὅμοια λευκοΐῳ μικρότερα δέ. διὸ καὶ ἀγρία λύχνις ἐκλήθη· καρπὸν δ' φέρει μόσχου ῥινὶ ὅμοιον, ῥύσιον ἰδεῖν. Ἱστορεῖται δὲ τὸν αἰτοῦντα εἰς φαρμακίας, περιαπτόμενον ἐπίχριόν τι ποιεῖν ἀλειφόμενον σὺν ἐλαίῳ κρινίνῳ, ἢ κυπρίνῳ.

Περὶ Κατανάγκης. Κεφ. ρλδ'.

ΚΑΤΑΝΑΓΚΗ, ἧς μὲν τὰς αὐτὰς ἔχει φύλλα μακρὰ ὡς κορωνόποδος, ῥίζαν λεπτὴν, σχοινώδη· κεφαλὰς δὲ ς', ἢ ζ'. τὸ δὲ σπέρμα ὅμοιος ὀρόβῳ· κάμπτεται δὲ

A πτισίας, καὶ κηλὰς αἵματος ἰᾶται ἐμπλαττόμενα δὲ ἢ πόα καὶ πινομένη σὺν οἴνῳ, κοιλίας ἐστὶ μαλακτική.

Al. πτισμάδος V. κηφῶ. Ἀπολλ. Marcellus quem κηφῶ legit.

B

C

D

E

F

G

V. sine legit.

Ald. ἀνίστησι Ald. τὴν ῥίζαν

V. κατὰ τὸν

V. πτισμάδος ἰᾶται Mar. V. μίσγεται, ἐν οἷς αἱ κρῖναι δέκατοι δύο.

Hæc quæ exprimi ferunt interpretes ex cod. Aldi nactus adiecimus. V. τοιαύτη οἱονεὶ πλάνη φύεται διαφορήσαι τὴν ὕλην ἀπόπλασμα ἰᾶται Dalech. Adiap Dalechamp legendum putat ἀναπλάσσει ἔχει δ' ἄνθος, ὡς αὐτὸς γνωρίζει παρὰ τοῖς φυτικοῖς. Lacuna in v. cod. legit, καὶ αὖ ἄνθος ἀπὸ πλαγκτίδος παραπλήσιος μικρὸς ὡς τὸν φύλλον. Quidam al. γλωσσίδα ἐκφύει· μικρὸν V. addit μικρὸν V. ἢ δεῖ πινομένη φαλίου.

Ἀπὸ ξηραινόμενος ὅτι τὸν χλῶ, καὶ ἐκλύειν ὄνυξιν ὁμοιοῦται νεκροῦ. Τὸ δὲ ἕτερον μέ-

λου μέγεθος ἔχει μικρῷ ῥίζαν δὲ μικραὶ ὅσον ἐλαία. τὰ δὲ φύλλα σχήματι καὶ χροιᾷ ὁμοιότατα ἐλαίᾳ, μαλακὰ, ὀλίγης ἐρωμένα καὶ ἐπεσχισμένα· καρπὸν ὑπέρυθρον μικροὶ, τετρημένον καὶ πολλαχοῦ μέρη, ὡς ἐρέβινθον, φοινικοῦν· ἀμφοτέρας δὲ ἱστοροῦσι τινὲς εἰς φίλτρα ἁρμόζειν. χρῶνται δὲ λέγουσιν αὐτοῖς αἱ Θεσσαλὶς γυναῖκες.

A Altera mali paruę magnitudinẽ explet, radice interim exiguæ oliuæ magnitudine, foliis quoque oleæ figura & colore, mollibus, diuisis ac per terrã stratis: semine in virgulis minuto, multis foraminibus pertuso, ciceris figura, puniceo. Vtranque narrant nonnulli in amatoria expeti, Thessalisque mulieribus esse in vsu. B

V. ἐστὶ. V. παραπλήσια

Περὶ Τριπολίου. Κεφ. ρλέ.

De Tripolio. Cap. CXXXV.

Τριπόλιον φύεται ἐν παραθαλασσίοις τόποις, ὅς ἐπικλύζει ἡ θάλασσα καὶ ὑποχωρεῖ, ὅτι ὁ μὲν ξηρὸς, οὔτε ἐν θαλάσσῃ φύλλα δὲ ἔχει ἰσάτιδι παραπλήσια, παχύτερα μέντοι καὶ ἀσθαμαίνοντα, αἴωλον ἐπεσχισμένον. χρῶνται ἰσορρόπῳ τῇ τὸ αὐτὸς βίος τῆς ἡμέρας μεταβάλλει· ὃ μὲν χρῶμα, πρωὶ μὲν λευκὸν, καὶ δι' ἡμέρας μεσημβρίαν πορφυρίζον, ὀψὲ δὲ φοινικοῦν· ῥίζα λευκὴ, ὀδώδης, θερμαντικὴ γευομένῳ. ἣν τις πινομένην ἐν οἴνῳ κυάθοις δυσὶ πλῆθος, καὶ κοιλίας ὕδωρ ἄγει καὶ οὖρα. τίθενται δὲ καὶ εἰς ἀλεξιφάρμακα. C D

Lac. legit in vet. cod. πάχος ἀσ. Sic etiam Plin.

Fortè ἰσάτιδι

Lac. legit in vet. καὶ φύλλα τοῖς

Lac. legit καθὼ Pl. crassa. Delet Angulla.

Περὶ Ἀδιάντου. Κεφ. ρλς'.

De Adianto. Cap. CXXXVI.

Ἄδιαντον, οἱ δὲ, πολύτριχον, φυλλάρια ἔχει χοιριάδρᾳ ὅμοια, ἐπεσχισμένα ἐπ' ἄκρου· τὰ δὲ καυλία ἐφ' ὧν ἐκπίπτουσι, μέλανα, ἰσχυρὰ λεπτὰ, ἀσθαμαίνοντα, στιλβοντα· φύλλα ὅμοια πλείστῃ, μικρὰ λίαν ὅτι μὲν καυλὸν, ὅτι αὖλος, ὅτι καρπὸν φέρει. ῥίζα ἄχρηστος. Δυνάμεις δὲ τοῦ ἀφέψημα τῆς πόας πινόμενον, βοηθεῖ ἀσθματικοῖς, δυσπνοϊκοῖς, ἰκτερικοῖς, σπληνικοῖς, δυσουρικοῖς. θρύπτει δὲ καὶ λίθους, καὶ κιλλίασι ἴσχει, καὶ θηριοδήκτοις βοηθεῖ· καὶ γομάχου ῥεύματι, σὺν οἴνῳ πινόμενον· ἄγει δὲ καὶ ἔμμηνα καὶ λόχια· ἴσχει δὲ καὶ αἷματος αἰσαγωγίαν. κεφαλαπλάθηται δὲ καὶ πρὸς θηριόδηκτα ὠμὰ, καὶ ἀλωπεκίας διαστύει, χοιράδας σκορπίζει· ἀποσμᾷ πίτυρα καὶ ἀχῶρας σὺν κονίᾳ· σὺν λαδάνῳ δὲ καὶ μυρσινίνῳ, καὶ σευσίνῳ, ἢ καὶ οἰσύπῳ καὶ οἴνῳ τείχας ῥεούσας παραπαῖ. καὶ ὃ ἀφέψημα δὲ αὐτοῦ, σὺν κονίᾳ καὶ οἴνῳ σμηχόμενον, πολὺ καὶ τοὺς ἀλεκτρυόνας καὶ τοὺς ὄρτυγας μαχιμωτέρους, μιγνύμενον τῇ ἐφῇ·

Ἄδιαντον, alijs polytrichon, pusilla gerit folia, coriádri similia, in extremo incisuris diuisa: virgulas verò è quibus ea prodeũt nigro colore nitẽtes, prætenues & palmũ altas: at neq; thyrsum, neq; florẽ, neq; semen profert: radix est superuacua. Herbæ decoctũ epotum, suspirijosis & alioqui ægrè spiritum ducẽtibus, felle suffusis, splenèticis & vrinę difficultate laborãtibus auxiliatur. Calculos quoq; frangit, aluum sistit, & venenatorũ morsibus resistit: cõtra stomachi fluxiones in vino bibitur: menstrua ciet, & quę à puerperio purgamẽta relinquũtur: sed & sanguinis reiectionẽ inhibet. Cõtra venenatorum morsus herba cruda illinitur: alopecias eadẽ densat, strumásque dissipat. Ex lixiuio, furfures & manantia capitis vlcera detergendo exterit. Cum ladano autem ac myrtino & sulino, aut etiam œsypo ac vino, defluẽtes capillos cohibet atque confirmat: sed & affrictum eius decoctum cum lixiuio & vino, idem præstat. Facit & gallinaceos & conturnices pugnaciores, in cibum eorũ additum:

V. add. μικρότερα

V. τὰ δὲ καυλία ἐφ' ὧν ἐκπίπτουσι, μέλανα, στιλβοντα

Matth. ἰσχνὰ.

V. non legit.

V. ἐστὶ.

V. ἐστὶ.

V. καὶ σπληνικοῖς

Al. μικρὸν V. add καπὸ σκορπίζει καὶ ἀλωπεκίας διαστύει χοιράδας σκορπίζει ἀποσμᾷ πίτυρα καὶ ἀχῶρας σὺν κονίᾳ

Sic Lac. legit in v. cod. at v. lg. exempl. ἰσοπέπτου

V. add ποιεῖ καὶ ἀποπίπτειν πίνεται καὶ δεῖ τὸ σῶμα ἡμερωτέρους

circa ouilia quoque pecorum vtilitatis gratia plantatur. Cęterùm vmbrosis & paluſtribus locis & in parietibus aſpergine humentibus, circáque fontes prouenit.

De Trichomane. Cap. CXXXVII.

TRICHOMANES, quod & nõnulli adiantum appellant, locis ijſdem naſcitur, filici ſimile, at longè exilius: folijs tenuibus, ordine vtrinque diſpoſitis, lenticulæ ſimilibus, aduerſis inter ſe, in virgulis itidem tenuibus, ſplendentibus, nigricantibus, iiſque acerbis. Eadem quæ & modò dictum adiantũ præſtare poſſe creditur.

De Xanthio. Cap. CXXXVIII.

XANTHIVM, alij phaſganon, alij antitheſion, alij chaſcanon, alij chœradolechron, quaſi ſtrumarum perniciem, aliqui & aparinen vocant. Naſcitur læto & pingui ſolo, itémque in paludibus exiccatis, caule cubitali, pingui, anguloſo, & prodeuntibus ex eo alis compluribus: folia verò habet atriplicis, inciſuras habentia, naſturtium odore imitantia: fructum teretem, grandis oliuæ inſtar, & platani pilularũ modo ſpinoſum, qui quidem contactu veſtibus adhæreſcit. Is antè collectus quàm perfectè ſiccefcat, deinde tuſus & fictili vaſe reconditus, flauos facit capillos: ſiquidem, cùm vſus exigit, eius ſextarij ſemiſſem aqua tepida diluas, móxque eo caput nitro antè perfrictum illinas. Sunt & qui in vino tundant, itáque aſſeruent. Cæterùm fructus commodè quoque œdematis imponitur.

De AEgilope ſiue feſtuca. Cap. CXXXIX.

AEGILOPS herbula eſt folia tritici habens, ſed molliora, & in ſummo capite ſemina ſuis incluſa folliculis bina ternáve rubra, è quibus ariſtæ veluti capillaceæ exeunt. Herba cum farina impoſita ſanat ægilopas, duritiáſque diſcutit. Ad eadem ſuccus cum farina permixtus ſiccatúſque recondítur.

A Φυτεύεται δὲ ἐπ' ὠφελείᾳ τοῦ βάτου ἐν τοῖς μάνδραις· φύεται δὲ ἐν παλιοκίοις καὶ ἐλώδεσι τόποις καὶ τοίχοις, εὐύγροις καὶ ἐγγὺς τῶν ῥευμάτων. V. quidem hanc periodum aut legit. Al. ἐν τοῖς ἕλεσι

Περὶ Τειχομανοῦς. Κεφ. ρλζ.

TRICHOMANES, ἡ δὲ, καὶ πολύτριχον καλοῦσι, φύεται κατὰ τοὺς αὐτοὺς τόπους, ὅμοιον πτέριδι, μικρὸν λίαν· τοιχῶδες ἐξ ἑκατέρου μέρους τὰ φύλλα ἔχον λεπτά, φακοειδῆ, εὐανθῆ ἀλλήλοις, ὅτι ῥαβδίων λεπτῶν καὶ σιλπνῶν καὶ τρυφερῶν, εὐσταλέων. δοκεῖ δέ τι καὶ διυλισθὲν τῆς σπληνιάδος. Ortãs. μικρὸν λίαν.

Περὶ Ξανθίου. Κεφ. ρλη.

XANTHION, ἡ δὲ, φάσγανον, ἡ δὲ ἀντιθήσιον, οἱ δὲ χάσκανον. ἡ δὲ, χοιραδόλεθρον, οἱ δὲ, καὶ ταύτην ἀπαρίνην καλοῦσι. φύεται ἐν εὐγείοις τόποις καὶ λίμναις· αὐξηθὲν πῆχυν ἢ καὶ πλέον, λεπτὸν, γαστρῶδες, καὶ ἐπ' αὐτοῦ μακάλας πλείονας. ἁπτομένου δὲ τὰ φύλλα ἐμφερῆ ἔχει, ὀδμὴν ἔχοντα· καρδάμῳ δὲ πλησίον ὅμοιον τὸ σπέρμα· καρπὸν δὲ στρογγύλον ὡς ἐλάτης μεγάλην, ἀκανθώδη ὡς πλατάνου σφαῖραν, ἀπτόμενον ἁπαλὸν ἱματίων μετὰ πολὺ φαῦσιν. Δύναται δὲ ὁ καρπὸς περὶ τελείως ξηρανθὲν συλλεγεὶς καὶ κοπεὶς καὶ ἀποτεθεὶς εἰς κεραμεοῦν ἀγγεῖον, ξανθὰς τρίχας ποιεῖν. ἐάν τις ὅτι τῆς χρησίμου λαβὼν πυρίνου πλῆθος ἐξ αὐτοῦ, δύο τι ὕδατι χλιαρῷ, καὶ προεκπιέσας τὸν κεφαλὸν καταπλάσῃ. ἰοῦς δὲ καὶ μετ' οἴνου κόπτουσιν αὐτὸν, ἀποδίδονται· καταπλάττουσι δὲ καὶ τοὺς οἰδήματα ὁ καρπὸς ἀποτίνδιος. B C D E F Ortãs. μικρὸν λίαν. V. ἀσπλ. Al. γαστρὸς ἐγγυσσῆ Al. ἀπὸ τοῦ Al. ἀποδίδοται

Περὶ Αἰγίλωπος. Κεφ. ρλθ.

AIGILOPS βοτάνιόν ἐστι φύλλα πυρῷ ἔχον ὅμοια, μαλακώτερα δὲ, ἐπ' ἄκρας δὲ τοὺς κεφαλοὺς καρπὸν ἔχον ξ'. ἓν ἢ γ'. ἐρυθρούς, ἐφ' ὧν ἀθῆρες οἱονεὶ τρίχες ἐκπεφύκασι. θερισθὲν δὲ ἅμα πόᾳ μετὰ ἀλθύρου καταπλασθεῖσα αἰγιλώπια, καὶ σκληρίας διαφορὰς ἀποδίδοται δὲ ὁ χυλὸς πρὸς τὰ αὐτὰ μιγεὶς ἀλθύρῳ καὶ ξηραθείς. V. ἓν ἢ γ'. ἐρυθρούς, ἐφ' ὧν ἀθῆρες οἱονεὶ τρίχες ἐκπεφύκασι. V. edit. διαφορὰς ἔχει διὰ τῶν χειρόνων ἀμμωνιακὸν χάλβ. V. ἀσπλ.

Περὶ Βρώμου. Κεφ. ρμ'.

ΒΡΩΜΟΣ πόα ἐστὶν Αἰγίλωπι ἐμφερὴς, δυνάμιν ἔχουσα ὅτι ξηραντικήν. ἀφεψηθεῖσαν δὲ σὺν τῇ ῥίζαις μὲθ' ὕδατος, ἕως ἂν πεπτωθῇ τὸ ἀπόζεμα, διυλίζων αὐτὸ ὑπίμισγε μέλι τοσοῦτον, καὶ ἕψε μέχρις οὗ γένηται πάχος ὑγροῦ μέλιτος. καὶ ποιεῖ ἐπὶ τῶν ὀζαινόδων, εἰ βρέχων οἰόπιον παρεσίθης τῷ μυκτῆρι, καὶ καθ' ἑαυτὸ μόνη τι ποιεῖ οὖτος· ἔνιοι δὲ ἀλόην λειώσαντες προσμίσγουσι, καὶ ὕπτια χρῶνται. ποιεῖ δὲ καὶ μετ' ῥόδων ξηρῶν ἀφεψηθεὶς σὺν οἴνῳ πρὸς τὰ τῶν στόματος δυσωδίας.

De Bromo. Cap. CXL.

BROMVS herba est Ægilopi similis, exiccatoriam vim habens. Quamobrem si cum radicibus in aqua decoquatur ad tertias, iusque colato par modus mellis admisceatur, rursúmq; discoquatur dũ mellis crassitudo fiat, medicamentum parabitur: quo quidẽ imbutum linteum & naribus etiam per se inditũ ad graueolentia narium vlcera erit efficax. Sunt qui tritam aloen addant, eodémque modo vtantur. Cæterùm cum rosis siccis in vino decocta, graué oris halitũ emẽdat.

Περὶ Γλαυκός. Κεφ. ρμά.

ΓΛΑΥΞ *κυπείρῳ ἢ φακῷ τὰ φύλλα ἔοικεν, ὠχριὰ κάτωθεν λευκότερα, αἰώρην ἢ χλωρὰ· χλωνία ἢ ἀπὸ γῆς δύο πήχεις ἢ τρία λεπτά, ἀσθμαίνοντα ἀπὸ τῆς ῥίζης· αὕτη λευκοῖς ὁμοία, μικρότερα δέ, πορφυρᾶ φύεται παρὰ θαλάσσης. αὕτη ἑψομένη μετὰ ἀλφίτου κριθίνου καὶ ἁλὸς καὶ ἐλαίου, καὶ ῥοφηθεῖσα, γάλα σβεννύμενον ἀναλήψεται.

De Glauce. Cap. CXLI.

GLAVX folijs cytiso aut lẽticulæ similis est, quæ quidem supernè virent, auersãque candidiora spectantur: ramulos vero spargit à terra quinos senósve, tenues, a radice dodrantales: flores autem violæ albæ, purpurei exeunt, attamen minores. Nascitur iuxta mare. Ipsa decocta cum hordeacea farina sale & oleo, in sorbitione lactis vbertatẽ intermissam restituit.

Περὶ Πολυγάλης. Κεφ. ρμβ'.

ΠΟΛΥΓΑΛΟΝ θαμνίον ὀλίγον ἀσθμαῖον, ἔχον φύλλα φακοειδῆ, γλύσιν ὑποστρυφνον· πολὺν δὲ καὶ τῦτο, γάλα δοκεῖ πολὺν ποιεῖν.

De Polygala. Cap. CXLII.

POLYGALA frutex breuis est, palmi altitudinem petens, folijs lenticulæ, gustu subacerbo. Potus is lactis itidem abundantiam facere creditur.

Περὶ Ὀσύριδος Κεφ. ρμγ'.

ΟΣΥΡΙΣ φρυγάνιον μέλαν, λεπτόραδον, διυδρωτον, καὶ περὶ αὐτὸ φυλλάρια γ'. ἔστι δὲ καὶ δ'. ἢ έ. ἢ ς'. αὐτῆς ὡσεὶ λίνου, μέλανα καὶ ἀρχαί μελανθεῖσαι ὑπόφυσα γίνονται. Ταύτης τὸ ἀφέψημα πινόμενον, ἰκτέρῳ βοηθεῖ.

De Osyride. Cap. CXLIII.

OSYRIS, herba est furculacea, colore nigro, tenuib⁹ virgis, fractúque contumacibus: in quibus foliola terna, interdum & quaterna, quina, senáve, ceu lini, nigra initio, deinde colore mutato rubescentia. Decoctũ eius potũ iuuat arquatos.

Περὶ Σμίλακος τραχείας. Κεφ. ρμδ'.

ΣΜΙΛΑΞ τραχεῖα, τὰ μὲν φύλλα ἔχει παρεκλυμένῳ ὁμοια, κλήματα πολλὰ, λεπτὰ, ἀκανθώδη ὡς παλίουρος ἢ βάτος· ἐλίσσεται δέ τι περὶ τὰ δένδρα ὡς αἶγος ἕκαστον περιφέρη. καρπὸν δὲ φέρει βοτρυώδη· ὡς ὅτι φυλλίδα, ἐστὶν ὠθούμενα ὀλίγα ἐρυθρὰ, ὑποδάκνουσα ἠρέμα σὺν τῇ γλυκύ· ῥίζαν σκληράν, τραχεῖαν. φύεται ἐν τόποις ἑλώδεσι καὶ βραχέσι. Ταύτης τὰ φύλλα καὶ ὁ καρπὸς θανασίμων ἐστὶν ἀντίδοτος, φερόπε-

De Smilace aspera. C. CXLIIII.

SMILAX aspera folia habet periclymeni, sarmẽta multa, tenuia, palluri aut rubi modo spinosa: & sese arboribus circũuoluit, per eas sursum deorsúmque repens. Fructum verò profert racematum, ceu exilem labruscæ racemulum, qui quidem vbi maturuit, colore est rubro, gustumq; leniter quodámodo mordet: radice deniq; est dura crassaq;. Nascitur locis palustrib⁹ & asperis. Folia fructusque cõtra venena efficacis antidoti vim habẽt, siue antè,

Sic v.c. itémque Ruellius at vulg. exempl. αὐτῷ

Mare Rui. pro lege legendum censet.

Vulnerum

Addit Lacuna ex vet. cod. omissa δι' ὧν γάλα ἐξ αὐτῆς.

Desunt hæc in cod. Aid. in contextu, & ad notatha transferuntur.

siue posteà bibátur. Quin & memoriæ proditú est, siquid ex his infanti recés nato tritum propinetur, nulla ei posteà venena nocitura. Inciditur & ad alexipharmaca, id est, ad ea medicaméta quib⁹ venena arcétur.

De Smilace læui. Cap. CXLV.

Smilax lęuis folia habet hederacea, sed molliora, læuiora tenuioráque, itemq; flagella æquè ac prior, at nullis spinis horrida: quibus tamé haud secus ac illa arbores scádit, iis sese circumuolués: semé verò gerit ceu lupini, nigrum, exiguum, supra quod flores perpetuò visũtur cádidi, vndique numerosi & orbiculati. Ex hac porro smilace per æstaté topiarij operis vmbracula factitátur: at folia per autumnú amittit. Cæterùm semé cum dorycnio potú ternis singulorú obolis, vt somnia tum varia, tum etiá tumultuosa videantur, efficere perhibetur.

De Ruſco, ſeu Myrto ſylueſtri. Cap. CXLVI.

MYRTVS sylvestris seu oxymyrsine, foliú fert myrti, sed latius, ad formam lanceæ mucronatú: fructum rotundum, medio folio inhærentem, qui per maturitatem rubet, nucleumq; ossis instar durum complectitur. Ramuli ab vna eadémque radice numerosi exeút, vitiliú modo lenti, fructu contumaces, cubitales, folioſi: radix graminis similis, gustáti acerba & subamara. In asperis & præruptis locis enascitur. Folia & baccæ in vino potæ vrinas cient, menses pellunt, & calculos vesicæ frangunt. Morbo quoque regio, vrinæ stillicidio & capitis dolori medentur. Sed & radicis decoctum in vino potum, cosdé illos præbet effectus. Porrò & cauliculi pullulare incipientes asparagorum vice ac olerum modo in cibo sumuntur: sunt autem amari, vrinásque cient.

De Lauro Alexandrina. Cap. CXLVII.

LAVRVS Alexándrina, quã aliqui Idæam, aliqui danaën, alij hypoglottion, alij zalæam, alij denique stephanen vocát, folijs est myrti sylvestris, maioribus tamé, mollioribⁿ & candidioribus: fructu in medijs folijs rubro, ciceris magnitudine. Ramos verò per terram spargit do-

A νόμενα, καὶ ὅτι πινόμενα. τῷ δὲ δίδοται ὅτι ἐάν τις ἀρτιγέννητον παιδίον τείνας τὴ τούτων δῷ πιεῖν, οὐδὲν δηλητήριον φαρμάκου βλαβήσεται. τίμεται δὲ καὶ εἰς ἀλεξιφάρμακα. V. caret. Al. αἰσθηθῆ

Περὶ Σμίλακος λείας. Κεφ. μέ.

Σμίλαξ λεία, ὁμοία κισσῷ τὰ φύλλα

B ἔχει, μαλακώτερα δὲ καὶ λιπότερα καὶ λεπότερα· τὰ δὲ κλήματα ὥσαυτως καὶ περὶ αὐτῆς, ἀκάνθας οὐκ ἔχοντα· ἐλίσσεται δὲ περὶ τὰ δένδρα, ὡς ἡ τραχεῖα· καρπὸν δὲ ἔχει ὥσαυτως θέρμου μέλανα, μικρὸν ἀεὶ δὲ ἐπάνω ἔχοντα αὐθη λευκὴ, πολλὰ κατὰ πᾶσαν τὴν σμίλακα, καὶ ἀδιφερῆ. καὶ V. λεπότερα. V. inter. Auth. aduersẽ ego. Quidam legendum coniicit, καρπὸν δὲ ἔχει ὥσαυτως μέλανα, μικρὸν ἀεὶ &c.

C σκιπὴ δ' αὐτῆς γίνεται τῷ θέρει· φυλλορροῖ δὲ τὸ φθινοπώρῳ. Τοῦτου ὁ καρπὸς μετὰ δορυκνίου πινόμενος, τενεσμόν λυει ἐκπίεσιν, οὐρητια πολλὰ καὶ περιχόλη ὀφελεῖ ἰσχιάδα. Matth. σκιπὴ λαν Ἀθηναῖοι ἐκ τοῦτο

Περὶ Μυρσίνης ἀγρίας. Κεφ. μς.

D ΜΥΡΣΙΝΗ ἀγρία, ὃ μὲν φύλλον μυρσίνῃ ἔχει ὅμοιον, πλατύτερον δὲ, λογχοειδὲς, ὀξὺ ἐπ' ἄκρου· ⊛ δὲ καρπὸν στρογγύλον, ἐν μέσῳ ᾧ ὃ πεπάλῳ ἀδιφερῆν, ἐρυθρὸν ἐν ᾧ πεπάνεσθαι, ἔχοντα δ' ἐντὸς ὀστᾶδες· χλωνία λυγοειδῆ, πολλὰ ἐκ ῥίζης αὐτῆς, δύσθραυστα, ὅσον πήχεως, φύλλων μεσά· ῥίζαι πλατάπλησιαι ἀγρώ- V. add. καρπὸς ἐπιτείνει τὸ ἀμίδα καὶ ἀφροδισιάζειν. V. ἐρυθρὸν, ἀδιφερῆν

E σται, γινομένῳ· στρυφνὸν, ἐπὶ τὸ πικρὸν φύει) εἰς τραχέα τόπους καὶ κρημνώδεσι. Δύναμιν δὲ ἔχει τὰ φύλλα καὶ ὁ καρπὸς ὡς οἴνου πινόμενα, οὖρα κινῆν, καταμηνία ἄγειν, καὶ λίθους εἰς τὸ κύστει θρύπτειν. θεραπεύει δὲ καὶ ἴκτερον καὶ στραγγουρίαν, καὶ κεφαλαλγίαν· καὶ ὁ ἀφέψημα δὲ τῆς V. addit, καὶ ἐλάμμει

F ῥίζης σὺν οἴνῳ πολλὴν, τὰ αὐτὰ ποιεῖ. καὶ αὐλὸς ἀσπαράγου ἢ οἱ καυλοὶ τοῦ θαλλοῦ λαχανευόμενοι ἐσθίονται. εἰσὶ δὲ ἔμπικροι καὶ διουρητικοί. Quidam, ἐσθιόμενοι. καὶ

Περὶ Δάφνης Ἀλεξανδρείας. Κεφ. μζ.

ΔΑΦΝΗ Ἀλεξανδρία, οἱ μὲν Ἰδαία, οἱ δὲ δημάνη, οἱ δὲ ὑπογλωττον, ἣν δὲ ζά-

G λαι, οἱ δὲ στεφάνη καλοῦσι· φύλλα ὀξυμυρσίνῃ ὅμοια ἔχει, μείζονα δὲ καὶ μαλακώτερα, καὶ λευκότερα· καρπὸν δὲ ἐν μέσοις ἐρυθρὸν, ἐρεβίνθου τὸ μέγεθος· κλῶνας ἐπὶ γῆς κατήρε- Marc. perperam μείονα legisse videtur.

μιαίους ἢ ἐς μείζονας· ῥίζαν πλ̃ ἓν πλησίον τῆ ὀξυμυρσίνη, μείζονα ἢ ἐς ὠὼδη καὶ μαλακωτέραν. φύεται ἐν τόποις ὀρεινοῖς.

In vet. margine: ὁ ἀριθμὸς τοῦτο τὸ λειπόμενον μετ' ἄλλου ἀριθμοῦ ἀναγνωστέον ἐν τῷ ἀκολούθῳ λόγῳ, ὅπου δὲ καὶ φύεται λ'.

Δυώδεκα ἢ ἔχει ῥίζα πινομένη ς'. πλῆξις μεθ' οἴνου γλυκέος, βοηθεῖ τ̃ δυστοκούσαις ὑπὸ τραχηλιασμοῦ. ἄγει ἢ καὶ αἷμα.

A drantales, interdum etiam maiores: radice myrti syluestris simili, at maiore, odorata, molliorēque. Nascitur in montosis. Radix drachmarum sex pondere in vino dulci pota, difficulter parientibus, vrinæq; stillicidio laborantibus auxiliatur. Sed & sanguinem etiam extrahit.

Περὶ Δαφνοΐδους. Κεφ. ρμή.

Δ Αφνοειδες, οἱ δὲ, δυπέταλον, ἢ δὲ, χαμαιδαφνίδιον, οἱ δὲ, πέπλιον καλοῦσι. θαμνίσκος ἐστὶ πηχυαῖος, κλάδους πολλοὺς ἔχων ἰμαντώδεις ἀπὸ τοῦ αὐθους ἥμισυ φυλλοφόρους· φλοιὸς δὲ περὶ τοὺς ῥάβδους γλίσχρος ἰχῶρος· φύλλα δάφνῃ ἐοικότα, μαλακώτερα δὲ καὶ ἰχνοτέρα ἢ ὄντα εὔκλαστα, δάκνοντα καὶ πυροῦντα ὅ στόμα καὶ φάρυγα· ἄνθη λευκὰ· καρπὸν ἢ μέλανα, ὅταν πεπανθῇ· ῥίζα ἄχρηστος. φύεται ἐν ὀρεινοῖς τόποις· ἄγει ἢ ἐς ὃ φύλλον αὐτῆς ξηρὸν ἢ νεαρὸν πολὺν μὲν χολίδη φλεγματώδη· κινεῖ καὶ ἐμέτους καὶ ἔμμηνα· καὶ ἀφεδρωπὸν ἀποφλεγματίζει ἔστι δὲ καὶ παρμικόν. καθαίρει ἢ καὶ ὁ καρπὸς αὐτῆς ὅσον κόκκοι ιε πινόμενοι.

A Al πήχεις τὸ ἴδιον, al. πηχυαῖος κλάδους

B V. ἰχνοῦς

C V. ἰκμάς

D

De Daphnoide. Cap. CXLVIII.

D Aphnoides aliqui cupetalon, alij chamædaphnen, alij peplion vocant: exiguus frutex est, cubitalis, ramis multis a medio sursum versus lori modo flexilibus & obsequiosis, isque foliosis. Ramulos vestiēs cortex supramodum viscosus est: at folia sunt lauri, verùm molliora, validiora, fractúque contumacia, quorum gustatu os faucésque mordentur & accéduntur: flores cádidi: fructus, cùm ematuruit, niger: radix superuacua. Nascitur in montosis. Folium seu aridum, seu etiam recens, potu pituitosa per aluum deijcit: vomitus quoque ac menses ciet: quin & commanducatũ pituitam à capite extrahit: sternutamenta etiamnum mouet. Cæterùm & quindenæ ipsius baccæ potæ purgant.

Περὶ Χαμαιδάφνης. Κεφ. ρμθ'.

Χ Αμαιδαφνη, οἱ δὲ καὶ ταύτην Ἀλεξανδρίδα ἐκάλεσε, ῥάβδους ἀφίησι μονοκλώνους, πηχυαίους, ὀρθὰς, λεπτὰς καὶ λείας· ἐς ταύτης ἢ τὰ φύλλα ὅμοια δάφνῃ, λεπτότερα ἢ πολλῷ καὶ λεπιότερα· ἐς χλωρότερα· καρπὸν δὲ φέρει, ἐρυθρὸν, περὶ τοῖς φύλλοις βότρυος φύοντα. Ταύτης τὰ φύλλα λεῖα καὶ πλατέα, κεφαλαλγίας καὶ στομάχου ἐξαύστους ἀρήγει· πολύωλα ἢ μεθ' οἴνου, στρόφοις παύει· ὁ ἢ χυλὸς σὺν οἴνῳ πολυζόμους, καὶ ταμνία καὶ οὖρα ἄγει· καὶ ὑπὸ πόδα προτιθεὶς, τὸ αὐτὸ ποιεῖ.

Decrse in vulg. exempl. Sed addidimus ex vet. cod.

Adiecit Lac. ex v. cod.

E Chamædaphne, quam & Alexandrinam aliqui vocauerunt, virgas promit singulari ramulo constantes, cubitales, rectas, tenues ac lævues. Sed & huic folia sunt lauri similitudine, at lævuiora multò, tenuioráque ac viridiora: fructus rotundus, rubens, foliis annexus. Huius folia trita illitáq; capitis doloribus inflationibusque stomachi succurrunt: eadem bibita cum vino tormina sedát. At succus cum vino propinatus, mẽses vrinásq; ciet: idé quoque subditus in pessō præstat.

Περὶ Ἐλλεβόρου λευκοῦ. Κεφ. ρι'.

Ε Λλεβορος λευκὸς φύλλα ἔχει ὅμοια τοῖς τῦ ἀρνογλώσσου, ἢ στεμφύλλῳ ἀγρίᾳ, ἐλάσσονα δὲ καὶ μελάντερα, ἐς ἐρυθρὰ πρὸς χρόαν· καυλὸν ἢ παλαιστιαῖον, ἰσχνὸν, περιφλοιζόμενον· ὅταν ἄρξηται ξηραίνεσθαι· ῥίζαι δὲ ὑπόφυσι πολλαὶ, λεπταὶ, ἀπὸ κεφαλίου μικροῦ καὶ ὀβολιαίου, ὡσπερεὶ κρομμύου, συμπεφυκυῖαι.

V. caret.

V. add. ἐν τῇ μέσῃ ὑποβολῇ V. hic caret. V. hinc abest

V. caret.

De Helleboro seu veratro albo. Cap. CL.

V Eratrvm album folia fert plantaginis aut betæ sylvestris similia, sed breuiora, nigriora & dorso rubescentia: caulem palmi altitudine, concauum: qui quidem tunicas quibus cõuoluitur abdicat, cùm arescere incipit. Radices subiacent numerosæ, tenues ac fibratæ, ab exiguo & oblongo capitulo ceu cæpa exeuntes, eidémque annexæ.

Naſcitur in montoſis & aſperis. Radices meſſibus colligendę. Optimũ autẽ habetur veratrũ, quod modicè extentum eſt, candidum, fragile, carnoſum, minimè exacutum aut iuncum referẽs, aut dum frangitur, puluerem emittẽs: ſed tenuem habens medullam, guſtúq; non admodum feruens, neq; ſaliuam ſubinde ciens: huiuſcemodi ſiquidẽ ſtrágulat. Primatum tenet Anticyrenum. At Galaticum æquè atque Cappadocicum, cãdidius eſt, iuncо ſimile, maioremq; ſtrágulandi vim habet. Porrò vomitionibus varij coloris humores extrahit: collyrijs admiſcetur, quæ caliginẽ oculorũ diſcutiendi vim habẽt: mẽſes pellit, partúſque necat, appoſitum: ſternutamenta mouet, ac mures interficit cum melle & polenta ſubactũ: quin & carnes colliquat & abſumit, ſi coquatur vnà. Datur & ieiunis per ſe, itémque cum ſeſamo & ptiſſanæ aut alicæ cremore, aut cũ aqua mulſa, aut pulte, aut lente aliáve ſorbitione. Sed & cogitur cum pane, atq; ita inaſſatur. Apparatus vero inſupérq; victus ratio vtẽtibus accommodata diligenter ab ijs tradita eſt, qui ex profeſſo de ipſius doſi ſcriptitarunt. Sed maximè Philonidæ Siculo Ennæo aſſentimur. Longum enim foret in hac quam præcipuè inſtituimus materiæ Medicæ tractatione, victus rationẽ ad medendũ neceſſariam ſimul & ſemel exponere. Sunt tamen nonnulli qui dent ipſum cũ larga ſorbitione, aut copioſo cremore: vel etiam exhibito parciore cibo poſt illico veratrũ offerant: ac ijs præſertim quibus ſtrãgulationis ſuſpicio imminet, aut corporis imbecillitas adeſt. Illo enim modo ſumẽtibus purgatio periculo vacat, quòd nõ intempeſtiuè iuſtóve citiùs medicamentum corporibus accedat. Cæterùm & ſedi ſubditę ex eo balani cum aceto votiones concitant.

A Φύεται ἐν ὀρεινοῖς τόποις ἐ βαχέσι. Συλλέγειν δ' αὐτῆς τὰς ῥίζας ἀρξαμένου τοῦ πυραμιτοῦ. ἄριστος δέ ἐστιν ἀυτῆς, ὁ μετρίως τεταμένος καὶ λευκὸς, καὶ εὔθραυστος ἐ σφογγώδης, ὑκ ἄπυρος δὲ καὶ σφογγώδης, ἢ χρωμᾶ ἀφιεὶς ὁ τοῦ θραύεσθαι, ἔχων δ' καὶ τ' ἐντερώδη λεπτὴν, ἐκπυρῶν τ' χυῶν τ' λίαν, οὐδὲ ἀθρόως σίτλον ὀπτασώμενος πτιγώδης γὰ ὁ ἰσχυρὸς. πρωτεύει δὲ ὁ Κυρηναϊκὸς ὁ δ' Γαλατικὸς καὶ Καππαδοκικὸς, λευκότερος καὶ χροώδης καὶ πτιγωδέστερος. καθαίρει δὲ δι' ἐμέτων, ἀγων ποικίλα· μίγνυται δὲ καὶ κολλυρίοις τοῖς δυναμένοις τὰ ὑπόσχυτα τῶν ὀμμάτων ταῖς χερσὶν ἀποκαθαίρειν. καὶ ἔμμηνα ἄγει, καὶ ἔμβρυα κτείνει, πρισθέντος. πλαρμοῖς τε ὑπερθέτοις, καὶ μῦς κτείνει σὺν μέλιτι καὶ ἀλφίτῳ φυραθεὶς. συγκαθεψόμενός τε χρέασι, σωτηρίαν αὐτά. δίδοται δὲ πίνουσι καθ' ἑαυτὸν, καὶ μετὰ σησάμου καὶ πτισάνης χυλοῦ, ἢ ἅλυκος, ἢ μελικράτου, ἢ πόλτου, ἢ φακοῦ ἢ ὄμφακος ὑποπλασμάτος. συνεπιποιεῖται δὲ καὶ ἄρτῳ, καὶ ὀπτᾶται· ἢ δὲ παρασκευὴ καὶ ὀπτὴ διαίτησις ἐξειργασται πᾶσα τοῖς παρηγορικῶς περὶ τῆς δόσεως αὐτῆς γράψασι μάλιστα δ' συγκατεθέμεθα Φιλωνίδῃ τῷ Σικελῷ τῷ ἀπὸ Ἐννης, μακρῷ γάρ ἐστιν ἐν ὕλης παραδόσει προηγουμένως θεραπευτικὴν ἐπιθεωρῆσαι ἀγωγήν. διδόασι δ' ἔνιοι σὺν πολλῷ ῥοφήματι ἢ χυλοῦ πλείστῳ, ἢ ἐ βαθεῖ ὀλίγῳ παραδιδόντες, ὑπολύδασι δὲ ἐλλέβορον θᾶσσον, ἐφ' ᾧ μάλιστα πτυσμὸς ἐπιπίπτει ἢ ἀδηφαγία σώματος ἐπέχεται· ἀκίνδυνος γὰ ὅτι τῶν οὕτω λαμβανόντων ἡ καθαρσις· διχᾶ τὸ μὴ ἀκαίρως ἐ φαρμάκου παραπίπτειν τοῖς σώμασι· καὶ βάλανοι δὲ ἐξ αὐτοῦ προσλεῖουσι τῇ ὕδρᾳ μετ' ὄξους, ἐμέτους κινοῦσαι.

B

C

D

E

F

G

De Helleboro ſeu veratro nigro. Cap. CLI.

Helleborum ſeu veratrũ nigrum aliqui Melampodiũ, alij ectomon, alij polyrrhizon vocant. Melampodion verò appellatur, quoniã caprarum paſtor nomine Melampus furẽtes Prœti filias eo primus purgaſſe & ſa-

Περὶ Ἐλλεβόρου μέλανος. Κεφ. ρνά.

Ἐλλέβορος μέλας, οἱ δ', Μελαμπόδιον, οἱ δ', ἔκτομον, οἱ δ' πολύρριζον. Μελαμπόδιον δὲ λέγεται, ὅτι δοκεῖ Μελάμπους τὰς ἀπὸ τοῦ Προίτου θυγατέρας μανείσας ἐν αὐτῷ καθᾶραι πρῶτος ἐ θερα-

Vide quidem veratrum.
Alter, ἀγριόμορον, ſed perperam.
V. πτισάνης
Alter, ἀγριόμορον ὅπερ ὁ Γαλατικός. Loc. add. ex ver. cod. ἢ ὄμφακος.
Alter, χροώδης, quam ſcripturã Serapio ſecutus eſt. Quidã v. γεώδης καὶ καππαδοκικός.
V. quidam caret.
Goupylus ex veteribus libris & interpretibus legendum cenſet, σὺν πολλῷ ῥοφήματι.
V. χόνδρου V. caret.
V. παρασπάσθαι
Quidam non habent.

πόδας. ἔχει δὲ τὰ φύλλα χλωρὰ, πλατάνῳ παρεμφερῆ, ἐλάττονα δὲ, παρὸς τὰ τοῦ κοτυληδόνος, καὶ πολυσχιδέστερα καὶ μελάντερα, καὶ ὑποτραχύτερα καὶ λεπτότερα. ἡ ῥίζα δὲ λευκὴ, ἐμπόρφυρος, τῷ δὲ χρώματι βοτρυώδης· καὶ ὁ αὐτῷ καρπὸς κύκλῳ ὅμοιος, ὃν καὶ αὐτὸν καλοῦσιν ⓖ οἱ Ἀνλαύρᾳ σπασμῳδοῦντες χρώμενοι πρὸς τοὺς καθάρσεις αὐτῷ· ῥίζαι δὲ ὕπτιοι λεπταὶ, μέλαιναι, οἱονεὶ ἀπό τινος κεφαλίου κρεμαννύμεναι ἀρτημέναι, ὧν καὶ ἡ χρῆσις· φύεται δὲ τραχέσι καὶ χαλεποῖς καὶ καταξήροις τόποις. Καὶ ἄριστος ὁ ἐν τῇ Ἑλικῶνι λαμβανόμενος χωρίων. οἷός ἐστιν ὁ ἐξ Ἀνλαύρας. καὶ γὰρ ὁ μέλας καὶ κάλλιστος ἐν αὐτῇ γινόμενος. συλλέγου δὲ ⓗ εὔσαρκον καὶ βαρύφορον, λεπτὸν ἔχοντα τὸν ὀπισθώνιον, δριμὺν ἐν τῇ γεύσει καὶ πορώδη. ἑλλέβορος δέ ἐστιν ὁ ἐν τοῦ Ἑλικῶνι καὶ Παρνασσῷ καὶ Αἰτωλίᾳ φυόμενος· διαφέρει μέν τι ὁ Ἑλικώνιος. καθαίρει δὲ τὴν μὲν ἀπὸ χυλίδων, ἄνευ φλέγματος καὶ χολῆς, καθ' ἑαυτὸν ἢ μετὰ σκαμμωνίας διδόμενος καὶ ἁλῶν, < ὁ. ἢ περιβόλου ἁλυκῆς· σκωλήκια δὲ καὶ φακῆ, ἐξ ζωμοῦ λαμβανόμενος. ὠφελεῖ δὲ ἐπιληπτικούς, μελαγχολικοὺς, μαινομένους, ἀρθριτικούς, παραλελυμένους. προσιεῖς δὲ, ἔμμηνα ἄγει ἐμβρυα κλύσμασι· σύριγξαί τε καθαίρει κατατιθεὶς ἐς μυξῶδες ἐξαιρετικῶς. ὁμοίως δὲ ὅτι δυσπνοούντων καὶ εἰς τὸ ὦς, ἰώμενος ἐπὶ ϛ'. ἢ ζ'. ἡμέρας. θεραπεύει δὲ ἐν ὥραις, μετὰ λιβανωτοῦ ἢ κηροῦ καὶ πίσσης καὶ κεδρίνου ἐλαίου καταχριόμενος· μετ' ὄξους δὲ καθ' ἑαυτὸν καταπλασσόμενος, ἀλφοὺς καὶ λειχῆνας καὶ λέπρας θεραπεύει· ἐφεδρεῖς δὲ σὺν ὄξει, ὀδοντάλγίας παύει ἀφαλυζόμενος· σπιλάδι τι μίγνυται· μετὰ δὲ χριθῆς ἀλθίσας καὶ οἴνου, καταπλασμά ἐστιν ὑδρωπικοῖς ὠφέλιμον· συμφυτευθεὶς δὲ ἀμπέλοις πρὸς τῇ ῥίζῃ, ⓗ ἐξ αὐτῶν οἶνον καθαρτικὸν ἐργάζεται. παιδοῤῥαίστους δὲ καὶ οἰκίας αὐτὸν, καθαρτικὸν εἶναι νομίζοντες· ὅθεν καὶ ὁρύττοντες ἴσασι προσευχόμενοι Ἀπόλλωνι καὶ Ἀσκληπιῷ, φυλαττόμενοι ἀετόν. ἐφίπτασθαι γὰρ φασὶ τὸν

naſſe creditur. Folia ei viridia, platani ſimilia, ſed minora, foliis ſpondylij proxima, pluribus diuiſuris ſciſſa, nigriora & ſubaſpera: caulis breuis: flores candidi, purpuraſcentes, figura racemoſi: ſemen intus cnici, quod & Anticyraei ſeſamoides vocant, & in purgationes adhibent. Radices ſubſunt tenues, nigræ, velut è capitulo quodam cæpæ ſimili dependentes, quarum etiam vſus eſt. In aſperis, editioribus ſitientibúſque locis enaſcitur. Optimum quod ex locis eiuſmodi petitur, quale quod ex Anticyra: nigrum enim inibi probatiſſimum gignitur. Eligi debet carnoſum, plenum, cui tenuis medulla ſit, acre denique guſtu, feruénſque. Huiuſmodi eſt quod in Helicone, Parnaſſo & Ætolia naſcitur: attamen Heliconium præcellit. Veratrum nigrum purgat per inferna, trahítque pituitam & bilem, datum per ſe, aut cum ſcammonia & ſale, drachma vna ſeu obolis tribus. Decoquitur & cum lente ac iuſculis quæ purgationis cauſa ſumptitantur. Prodeſt verò in comitialibus articulariiſque morbis, itémq; melancholicis, inſanientibus & paralyticis. Subditum mẽſes trahit & partus necat: fiſtulas inditum ac tertia die exemptum purgat. Similiter in auditu difficili immittitur in aurem, ibique ad biduum triduúmve ſinitur. Scabiem quoque ſanat, cum thure aut cera & pice ac cedrino oleo perunctum. Vitiligini verò, impetigini ac lepris ex aceto impoſitú per ſe medetur. Dentium dolorem coctum cum aceto collutione mitigat. Septicis etiamnum medicamentis admiſcetur. Quin & hydropicorum ventri cum farina hordeacea & vino vtiliter imponitur. Porrò autem conſitum proximè vitium radices, vino inde expreſſo vim purgandi conciliat. Sed & eo domos aſpergunt, purgandi expiandiq; vim illi tribuẽtes. Quamobrem & qui ipſum effodiunt, ſtantes Apollinem & Æſculapium precantur, obſeruántque aquilæ volatus: eam enim alitem tradunt non

V. αὐτὸ.
Leg. βοτρυώδει cũ Serap.
V. εἰσὶ nõ legit. Quidã ἰσάσιν. Docti nonnulli βοτρυοείδη. hoc eſt, cincinnorum in modum.
V. λαυλὼ
V. οἶκον
V. πολιωτικοὺς
V. ἐπὶ
V. ἔστι.

citra periculum aduolare, atque etiam ei mortem inferre, quem veratrum effodientem conſpexerit. Celeriter quoque effodiatur oportet, quoniam halitu auráve ſua caput aggrauat: quapropter ad id præcauendum, effoſſuri allia præſumunt, vinúmque ſubinde ſorbent: ita ſiquidé ab affiatu ſecuriores, noxæq; minùs opportuni redduntur. Cæterùm veratrum hoc candidi modo etiam emedullatur.

A ἀκαδώνιος· δίδωσι γὰρ ῥᾷστα ὁ ὄρνις, ἐὰν πρὸ ἥλιου ἀνατολῶν ἐρυγὼν τὸν ἐλλέβορον. σεισθέντος δὲ δεῖ ὀρύττειν, ἀφ' ὃ καρηβαρεῖται ἐν τῇ ἀποφορᾷ γίνεσθαι· ὅθεν εἰς ἀσφάλειαν, ⟨καὶ⟩ ὀρύττοντες ἐσθίουσι σκόροδα, καὶ οἶνον πίνουσιν ἀλλ' ἧττον γὰρ οὕτω βλάπτονται. ἐξαιρεῖται δὲ, ὡσαύτως

B καὶ ὁ λευκὸς ἐλλέβορος.

Περὶ Σησαμοειδοῦς τοῦ μεγάλου. V. Dioscor.

Κεφ. ριϛ'.

De Seſamoide magno. Cap. CLII.

V carent

SESAMOIDES magnũ in Anticyra elleborum vocãt, quoniam in purgationibus candido veratro miſceatur. Similis eſt herba ſenecioni aut rutæ: folijs lõgis, flore candido, radice gracili, inefficaci: ſemine ſeſamæ, guſtu amaro. Granum id per ſuperna pituitam ac bilem purgat, ſi trirum quantum tribus digitis capitur, cũ albi veratri ſeſquiobolo ex aqua mulſa detur.

ΣΗΣΑΜΟΕΙΔΕΣ ὁ μείζων, ὃν ἐν Ἀντικύρᾳ ἑλλέβορον καλοῦσι, διὰ τὸ μίγνυσθαι ἐν ταῖς καθάρσεσι τῷ λευκῷ ἑλλεβόρῳ. ἔοικεν ἡ πόα ἡρακλείῳ ἢ πηγάνῳ·

V ἡρακλείῳ ἢ μείζονι aliud cod. habet tantùm Ἡρακλείῳ ἢ πηγάνῳ. Ald. & Ven.

C φύλλα μακρὰ, αἰγὸς λευκοῦ· ῥίζα ἰσχνὴ, ἄωρακτος· σπέρμα ὅμοιον σησάμῳ, πικρὸν ἐν τῇ γεύσει. ὃ καθαίρει αἷμα φλέγμα τε καὶ χολὴν, ὅσον τοῖς τρισὶ δακτύλοις λῆψαν μεθ' ἑλλεβόρου λευκοῦ τριῶν ὑμιωβόλιον σὺν μελικράτῳ.

Al. λευκοῦ καθαίρει

Περὶ Σησαμοειδοῦς τοῦ μικροῦ. V. quidã aliter

Κεφ. ρνγ'.

De Seſamoide paruo. Cap. CLIII.

D

Seſamoidi paruo cauliculi ſunt dodrantales: folia coronopi, at hirſutiora minoráque: in ſummis cauliculis capitula floſculorum penè purpureorum, quorum medium albicat: ſemen in illis ſeſamæ, amarum, fuluum: radix tenuis. Semen potum dimidio acetabulo in aqua mulſa, bilem ac pituitam per inferna purgat. Ex aqua verò impoſitũ, tubercula & œdemata diſcutit. Naſcitur in aſperis.

Σησαμοειδὲς τὸ μικρόν. καυλία ὀκτωδακτυλιαῖα· ἔχοντα φύλλα κορωνοπόδιον ὅμοια, δασύτερα καὶ τὰ καὶ μικρότερα· ἐπ' ἄκρου δὲ τῶν καυλίων κεφάλια αἰθόμενα ὑποπορφύρων, ὧν τὸ μέσον, λευκόν· ἐν οἷς σπέρμα σησάμῳ ἐοικὸς, πικρὸν, κιρρόν· ῥίζα λεπτή. Καθαίρει δὲ χολὴν καὶ φλέγμα κάτω πολὺ τὸ σπέρμα, ὀξυβάφου ὅμοιον σὺν μελικράτῳ· καταπλασθὲν δὲ μὲν ὕδατος, φύματα καὶ οἰδήματα ἀφίστησι. φύεται ἐν τραχέσι χωρίοις.

V. σησαμοειδὲς

Authores aduerſã legendum ſuſpicantur μαραίνεται.

V αἰθόμενα πρὸς τὸ φλέγει μέσον

Περὶ Σίκυος ἀγρίου. Κεφ. ρνδ'.

De Cucumere ſylueſtri. Cap. CLIIII.

CVCVMIS agreſtis à ſatiuo fructu ſolo diſtat, quem longè minorem parit, oblongis glandibus ſimilem: folia ſarmentáque ſatiui refert: radix eſt candida, magna. Naſcitur in ruderibus & ſabuletis, frutice in totum amaro. Inſtillatus foliorum ſuccus, aurium doloribus confert. Radix autem illita cum polenta, vetus quoduis œdema diſcutit: impoſita cum reſina terebinthina, tubercula rumpit: cocta ex aceto

ΣΙΚΥΣ ἄγριος τοῦ καρπῷ μὲν διαφέρει τοῦ ἡμέρου σίκυος, ἐλάσσονα παλλῷ ἔχων, βαλανείοις ὀπτημένοις ἐοικότα· τὰ φύλλα καὶ τὰ κλήματα ἡμέρῳ ὅμοια· ῥίζαι δὲ λευκὴν καὶ μεγάλην φύει· ἐν οἰκοπέδοις καὶ ἀμμώδεσι τόποις· ὅλος δὲ ὁ θάμνος πικρός. Ἁρμόζει δὲ ὁ τῶν φύλλων χυλὸς ἐσχαζόμενος ὠσὶ λήμας. ἡ δὲ ῥίζα καταπλασθεῖσα μετὰ ἀλφίτου, παντὸς οἰδήματος παλαιοῦ διαφορᾷ· μετὰ δὲ ὄξους δὲ ἐφθεῖσα

Potiũ βαλάνῳ.

τὰ ῥήγνυσι δὲ τερεβινθίνης ὀπτηθεῖσα,

V. ἐπιπλάσσει ἐσχάραι ποδαγρικαῖς.

καὶ κεφαλαλγεῖσα, ποδάγρας δὲ φορᾶς καὶ ἰσχιάδος δὲ ὄντι ἔγκλυσμα, καὶ ὀδονταλγίας ἀφέλκυσμα, ὃ ἀφέψημα. ξηρὰ δὲ λεία, ἀλφοὺς, λέπρας καὶ λιχῆνας σμήχει· οὐλάς τε μελαίνας καὶ στίγμας τοὺς ἐν προσώπῳ ἀπομαραίνει. καὶ ὁ χυλὸς δὲ τῆς ῥίζης, πλῆθος τεσσάρων ἡμιωβολίων ὃ ἐλάχιστον, καὶ ὁ φλοιὸς δὲ ὅσον πίναρον ὀξυβάφου, καθαίρει φλέγμα ἐκ χολῆς, καὶ μάλιστα ὅταν ὑδρωπικῶν. δίχα δὲ τοῦ σώματος ἀδικεῖν, πίνεται τοῦ καθαρσίου. δεῖ δὲ τῆς ῥίζης λαβόντα ἡμίλιτρον, μεῖξαι δυοῖν ξεστῶν οἴνου, μάλιστα Λιβυκοῦ, λεαίνειν, καὶ διδόναι ἐκ τούτου κυάθους γ'. ἕως ἂν ὁ ὄγκος ἰκμῶς συσταλῇ.

V. διγυφεῖ. Lac. v. quæ Algentis genuino

A

B

C

Περὶ Ἐλατηρίου. Κεφ. ριέ.

Τὸ δὲ λεγόμενον Ἐλατήριον, ἐκ τοῦ καρποῦ τῶν σικύων σκευάζεται. ἔστιν τοῦτον. τοὺς ἅμα τῷ ἄλφαϊ σικύους ἀποτυδῶντας ἐκλέγου, ἀποπλυνε, ἐῶν νύκτα· τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ὅπως κεφαλῆς κόσκινον μὴ πυκνὸν ὀπίζης, καὶ μαχαίριον ὑπλιον ἁρμόσας τοῦ ἄκρου ἔχου αὐτοῦ, λαμβάνων ἀμφοτέραις ταῖς χερσὶ καθ' ἓν τῶν σικυῶν, διαίρει καὶ ἐκθλίβε εἰς τὸν ὑποκείμενον κρατῆρα· προσεκθλίβων δὲ τὸ ἐν αὐλοῖς σφακῶδες, ὃ δὴ προσαπτῆλ τῷ κοσκίνῳ· ἵνα δὲ αὐτὸ διεκπίπτῃ· ἢ εἰς λεκάνην πλατυκείλιον τὰ ἐκθλιβόμενα· εἶτα λε. σωρεύσας τὰ πιτυμάτια ὅπως τῷ κοσκίνῳ, ὕδατι γλυκεῖ σφιγχίας ἢ ἀποπιέσας, ταῦτα μὴ ῥίπτε. παρεξας δὲ ὃ ἐν τῇ λεκάνῃ ὑγρὸν, ἢ σπεπάσας ὀθόνῃ, πίθῳ ἐν ἡλίῳ· ἢ ὅτε ἔῃ, πάλιν τὸ ὀπτηχύμενον ὕδωρ μετὰ τοῦ ὀπτάχου ἀποχύ· καὶ τοῦτο ποίει πολλάκις, ἄχρις οὗ καθαρὸν ᾖ τὸ ἐφιστάμενον ὕδωρ. ὁ οὖν ἐκτραγγίσας ὀπτιμελῶς, τῷ ἀποσάθμῃ βαλὼν εἰς ψυχρὸν, λέαινε, καὶ ἀναπλάττε ἐχίσκους. ἔνιοι δὲ πρὸς τὸ παχέως αἰπιμασθῆναι τὸ ὑγρὸν, πίφεσιν σεσηπυίῃ ὀπτῇ γῆς καταχρώσαντες, καὶ κοιλάναντες τὸ μέσον, ὀθόνιον τετριπλοῦν ὀπιτείναντες, ἐν τούτου τὸ ἐλατήριον σὺν τῇ ἰκμάδι ὀπτχέουσιν, ἵνα ξηρανθῇ, τὸ δὲ ψυχρὸν λεαίνουσιν εἰς προείρηται. ἔνιοι δὲ καὶ τῷ ὕδατος ψιλεπίαν τοῦ ἀλεπτοῦ

V. κεφαλῆς

V. κεν.

Quidam add. καὶ ὅταν ὅλον ἐκθλιβῇς, ἕκαστον αὐτὸ κατατρίσας. Sic Aldus non hus. V. add. ἢ σπ. πίον.

Al πρατῆρα

V. add. καὶ ὑλας ἐδωρίφ

V. ἐκπιεσ γίνας. Lac. ἀποχίασας.

D

E

F

G

illitáque podagras discutit: sed & eius decoctũ ischiadicis infunditur, & in dẽtium dolore colluitur. Eadẽ arida tritáq; vitiligines, lepras & impetigines absterget: cicatrices nigras emendat, & maculas faciei repurgat. Quin & radicis succus sesquioboli pondere cùm minimùm, itémq; cortex acetabuli quarta parte, bilẽ ac pituitá purgãt, maximéq; in hydropicis, idq; citra vllam stomachi iniuriã. Radicis selibra in vini præsertim Libyci sextarijs duobus conteritur: dantúrq; ex eo ieiunis terni cyathi tertio quoque die, dum tumor plurimùm subsederit.

De Elaterio. C. CLV.

E fructu cucumerũ (agrestiũ) medicamentũ fit, quod Elaterium vocatur, ad hunc modum. Cucumeres eligito, qui simulatq; tangũtur quasi retiliendo succum intra se cõtentũ eiaculentur, eósq; decerptos nocte vna seruato. Postero die impositio supra craterem rariore cribro, insupérq; resupinato ita cultello vt aciem sursum versus habeat, prehẽsos vtraq; manu cucumeres singulatim diuidito, humoremq; in vas subiectum per cribrũ exprimito: simúlq; carnosam cucumerum partẽ quæ cribro hæsit, quò & ipsa transmittatur, elidito*. Expressum succũ in vicinam peluim transfundito. Aceruata autẽ super cribro seminũ frustula vbi aqua dulci perfuderis, itidemq; expresseris, tandẽ abijcito. Exceptũ verò pelui succum agitato ac permiscето: moxq; opertum linteo, Soli exponito. Ac vbi coierit, supernatantẽ aquam omnẽ, cum eo quod in summo ceu spuma concretũ est, effundito: illúdq; identidẽ facito, dum aqua superstabit. Hanc (si qua reliqua fuerit) posteaquam guttatim diligentérque excluseris, sedimentũ ipsum mortario inditum conterito, & in pastillos cogito. Sũt qui ad coercendam hauriendamq; protinus humoris abundantiã, cribratos cineres humi sternunt, ac in eorum medio excauata foueola triplicatũ linteolũ obtẽdũt, cui elateriũ cũ humiditate sua infũdũt, illáq; (hoc artificio) exhausta, tandẽ resiccatũ ipsũ in pila, vti dictũ est, conterũt. Alij p dulci aqua marinã affundentes,

* Al. addunt: vbi quid ibi expressum, subsederit fuit.

quod subsederit.

dentes ita eluunt. Alij in postrema lotura multam affundũt. Elaterium porrò optimũ creditur, quod cũ cãdore modicè humectũ est, minimè ponderosum, læue, gustu amarissimum, quódq; lucernæ admotũ facilè accẽditur. At quod porraceum est, scabrum & ad aspectũ turbidum ac erui cineríſq; plenũ, graue & vitiosum est. Nec desunt qui cucumeris succo amylũ immiscẽãt, vt candorem & leuitatẽ ementiantur. A bimatu ad decenniũ purgationibus accõmodatũ est. Integra dosis eius est, obolus: minima, semiobol°: pueris, æreola duo: nam copiosius haustum, periculum adfert. Bilem ac pituitam per inferna pariter & superna trahit. Atque qui ægrè spirant, eo medicamenti genere fœliciter vtiteríq; purgantur. Quòd si in animo est per aluum purgare, adiecto salis duplo & sinapis tantillo, quantum scilicet ad colorandum satis sit, ex aqua catapotia erui magnitudine formato: quę posteaquam exhibueris, aquæ tepidę cyathum vnũ exorbendum dato. Sin vomitum concitare volueris, elaterium aqua diluito, intinctaq; pẽna subiectas linguæ partes quàm penitissimè oblinito. At si æger ad vomitũ difficilis fuerit, vel oleo, vel irino vnguento diluito: somnũ interim inhibeto. Porrò his qui effusè ac præter modum purgantur, vinum oleo mistum frequenter propinari oportet. Etenim superuenientibus vomitionibus restituuntur. Quibus verò crebriores vomitus sisti par est, aqua frigida, polenta, posca, poma & quæcunq; stomachum densando roborant, offerẽda sunt. Menses quoque ciet, partusq; necat elateriũ in pesso subditũ. Cũ lacte verò narib° infusum, & regiũ morbũ depellit, & diuturnos capitis dolores sũmouet. In anginis autẽ efficaciter illinitur ex oleo vetere, melle, aut felle taurino. [Satiui cucumeris radix cõtrita & drachmæ pondere in hydromelite pota, vomitus mouet. Quòd si cui à cœna placidè ac citra molestiam vomere libuerit, oboli duo satis fuerint.]

De Staphide agria, siue herba pediculari.° Cap. CLVI.

STAPHIS agria folia quidem habet labruscæ modo diuisa, &

A χίοντες, πλυνόμενον. Ⓐ δὲ, τῇ πλυντικῇ πλύσει μιλίκρητον τῷ ὄξει χέουσι. δοκεῖ δὲ ἐλατήριον κάλλιστον εἶναι, ὃ μετὰ τὸ λευκὸν ἀφρῷ ἔχον ἔπικμον, κοῦφον, λεῖον, πυρόπολον τῇ χλόῃ, καὶ προσομιχθὲν λύχνῳ ἄφλεκτον. τὸ μὲν πρασίζον καὶ παχὺ καὶ βολοειδὲς τῇ ὄψει, χίμαιρ ὀφθίου καὶ τέφρας, βαρὺ τε ὂν καὶ φαῦλον. ἔνιοι δὲ καὶ ἄπυρ χυλῷ τοῦ σικύου μιγνύουσιν ἄμυλον, πρὸς τὸ μιμήσασθαι αὐτὸ λευκὸν καὶ κοῦφον. εἰς ὑδρόπικρα καθαρικὰ ὁ δραστικὸς ἁρμόζει ἄχρι δυοβολοῦ· ἡ δὲ πλείων δόσις, ὀβολός· ἡ δὲ ἐλαχίστη, ἡμιωβόλιον παιδίοις δέ, διχάλκου· πλέον γὰρ πολὺ κίνδυνον ὑποφέρει. χυεῖ δὲ τὴν κάτω καὶ τὴν ἄνω καθαρόν, ἄγει φλέγμα καὶ χολήν. ἀείπνοα δὲ τοῖς δυσπνοοῦσιν ἡ δι' αὐτοῦ καθαρσις. εἰ μὲν οὖν ἥλεις κατὰ κοιλίαν καθαίρειν, διπλάσιον ἄλατος μίξας καὶ κύμινος ὅσον χρῶσιν δι' ὕδατος ὀρεβινθίνα καταπότια δίδου, ὑπορρόφειτον ἐπὶ χλιαροῦ ὕδατος κύαθον ἕνα· εἰς δὲ ἔμετον, ὕδατι λιπαρῷ διαλυτὸν γλώσσαν ἀλαίνει τόπους ὡς ὅτι ἐσχάτους· εἰ δὲ δυσμενὴς εἴη, ἢ ἐλαίῳ ἢ ἰσχνῷ μύρῳ δεῖς, κάλυπτε δὲ κοιμᾶσθαι. τοῖς δὲ ὑπερκαθαιρομένοις συνεχῶς προσφέρειν δεῖ οἰνόλαιον· ἐμοιοῦντες γὰρ ἀποκαθίστανται. μὴ παυομένων δὲ τῶν ἐμέτων, ὕδωρ ψυχρὸν καὶ ἄλφιτον καὶ ὀξύκρατον καὶ ὀπώρας, καὶ ὅσα διϋδατοῦται Ⓦ στόμαχον πυκνώσαντα προσεισέχτεον. κινεῖ δὲ τὸ ἐλατήριον καὶ ἔμμηνα, καὶ ἔμβρυα κτείνει· ὃ προσδέτῳ· ἐγχυθὲν τε μετὰ γάλακτος εἰς τοὺς ῥώθωνας, ἥπερ ἀποκαθαίρει, καὶ κεφαλαλγίας τὰς χρονίους ἀπαλλάττει· συναλοιῖς τε ἀφέψημα προσλυθὲν μετ' ἐλαίου παλαιοῦ ἢ μέλιτος ἢ χολῆς ταυρείας. [τῆς δὲ ἡμέρου σικύου ἡ ῥίζα λεία πλυθεῖσα σὺν ὑδρομέλιτι < ἀ. ἑλκεῖ, ἐμέτους κινεῖ. εἰ δέ τις μετὰ τὸ δεῖπνον προσφάγοι ἐλθὼν, ἀχοδοῦν ὀ-

B

C

D

E

F

G Colοὶ β'.]

Περὶ Σταφίδος ἀγρίας. Κεφ. ρνς'.

ΣΤΑΦΙΣ ἀγρία φύλλα μὲν ἔχει ὥσπερ ἀμπέλου ἀγρίας ἐπικεκομένα·

V. caret. καυλία ὀρθά, μαλακά, μίσγια· ὃ δὲ αὐ- A
γος φέρει ἑστῶτι ὅμοιον· τὸ δὲ καρπὸν ἐν θυ-
V. conclusis caret. λακίοις ἐχλωροῖς ὡς περ ἐρεβίνθου, τρίγω-
νον, ἡδαχύν, ὑπόκιρρον ἐν τῷ μίσγειν, τὰ δὲ
V. caret. ἔνδον λευκὸν, γλυκαμύρῳ ὁριμῷ. Τὸν πυ-
κνοὺς ἡμέ. ἐὰν τις λεαίνας ἐν μελικράτῳ
V. caret. δῷ καθαίρει δι' ἐμέτων πάχη. Περιπατεῖ-
τωσαν δὲ οἱ πεπωκότες. Διδόασι μέν τινι περσί- B
χην συνεπῶς μίσγοντες διδόντες, μᾶλλον δὲ
ὅτι φέρει τοὺς κατὰ στόμαχον κινδύνους, καὶ
καίει τὰ φάρυγγα. ἁρμόζει δὲ ῥιφθεῖσα ἐν
V. add. καὶ αἰ- ἐλαίῳ συνεχριόμενα πρὸς φθειριάσεις καὶ
θέσθαι κνησμούς. Ἐν ὥραις. Σχεμαασκηθεῖσα δὲ,
φλέγμα ἀγαθὸν πλῆθον. Ἐν ὀδοντάλγίαις ὠ-
φελεῖ σὺν ὄξει ἐμπλυθεῖσα τὰ σχαλυζόμενα C
οὖλά τι ῥευματίζόμενα σίλφι· καὶ ἄφθας
θεῖ ἐν στόματι θεραπεύει μετὰ μέλιτος. μίσ-
γνυται καὶ τοῖς πυρωτικοῖς μαλάγμασιν.

Περὶ Θαψίας. Κεφ. ρνζ'.

ΘΑΨΙΑ ὠνόμασται μὲν ἀπὸ τῆς νήσου εὑρεθεῖσα ἐν Θάψῳ τῇ νήσῳ τῇ D
ὁμωνύμῳ. τῇ δὲ ὅλῃ φύσει ἔοικε νάρθηκι,
Valg. exempl. ἰσχνότερος δ' αὐτῆς μᾶλλον ὁ καυλὸς, καὶ
φύλλα μαράθρῳ ἐμφερῆ· ἐπ' ἄκρου δὲ
σκιάδια καθ' ἑκάστην ἀπόφυσιν, ἀνήθῳ ὅ-
μοια· ἐφ' ὧν σπέρμα ὑπόπλατυ, ὡς τὸ νάρθηκος ἐμφερές, ἔλαττον
V. Ῥιζὰ, ἔνδοθεν μὲν ἀστὸ λευκὸν ἔξωθεν δὲ τοῦ θαψίου, μεγάλου, μελαίνης. μέν τοι ῥίζα ἔνδοθεν λευκὴ, μεγάλη, μέ- E
λαινα δὲ ἔξωθεν, παχύφλοιος, ὁριμῆσα. Ἡ
πὶς ὀπίζεται περιορυχθεῖσα καὶ ἐγκοπτομέ-
νη τὸ φλοιὸν, ἣν κοιλανθεῖσα αὐτὴ ὑπ' ἑαυτῇ
ὁλοσχερῶς ἡ ῥίζα, καὶ πυκαζομένη πρὸς τὸ
καθαρὸν μένειν τὸ ὀπὸν· τῇ δ' ὑστεραίᾳ δεῖ ἐ-
V. caret. πιούσας αἱρεῖν. Ἐπισυλλεγόμενα ὀ-
πὸν. Ἐκθλίβεται δὲ κοπεῖσα ἡ ῥίζα καὶ σχί-
ζουσα καὶ ὀργάνῳ ἐκθλιβεῖσα, καὶ ξηρανθεῖ- F
σα ἐν ἡλίῳ δι' ὀστράκου παχέος ἀγείρει. ἔ-
νιοι δὲ καὶ τὰ φύλλα συναποθλίβουσιν. ἀσθε-
νὴς δὲ ὁ χυμός. σχηματίζεται δὲ ὡς βρέ-
V. ὑγρότερον μα τῶν δίκην ἕνεκεν ἀπὸ τῆς ῥίζης. καὶ
μένειν ἔτι μὲν· ξηραίνεσθαι δὲ ἀπὸ
τῶν φύλλων, καὶ τερηδονίζεσθαι. ὀπίζου-
σα δὲ δεῖ μὴ κατ' ἀνέμους ἵστασθαι. μᾶλλον
δὲ νηνεμίας οὔσης· ἐποιδεῖ γὰρ ἰσχυ- G

caulículos rectos, molles, nigrosq;: flore verò fert glasti, semen in folliculis viridib⁹ ceu ciceris triangulũ, scabrum, ex nigro subfuluescẽs, intus album, gustu acre. Huius grana decẽ aut quindecim si trita in aqua mulsa detur, crassos humores vomitu purgabunt: sed qui hauserint, deambulare debent. Videndũ nihilominus vt ijs frequenter aqua mulsa potui detur: alioqui in strangulationis periculũ deducuntur, faucésque aduruntur. Herba autẽ ipsa trita per se, vel admista sandaracha ex oleo illita, phthiriasi prodest: itémq; pruritui & psoris: plurimã pituitam cõmanducata trahit, & in aceto decocta détiũ doloribus ore colluto subuenit, gingiuarumq; fluxiones, quas Græci rheumatismos vocant, reprimit, & feruida oris vlcuscula cum melle sanat. Deniq; malagmatis etiam vrendi vi prædictis immiscetur.

De Thapsia. Cap. CLVII.

THAPSIA ex eo nomẽ accepit, quòd in Thapso eiusdẽ nominis insula primùm inuenta fuerit. Tota verò natura ferulæ similis est, attamen graciliore caule, & folijs fœniculo proximis, vmbellis in singulorum surculorum cacumine anethi similibus: flore in ijs luteo: semine quadantenus lato, quale ferulæ, sed aliquantò minore: radice intus candida, foris nigra, magna, crasso vestita cortice, eadémq; acri, cuius liquor excipitur in hunc modũ. Effossa in ambitu scrobe inciditur radicis cortex: aut incauatur ipsa radix, ita tamẽ vt excauatio sensim à latiore orbe in acutũ desinat: mox cooperitur, quò purior liquor confluat: postero autem die congestum eũ tolli par est. Eliciendi quoq; succi ratio hæc est: Radix contunditur, ac succus per quallum instrumento ad id cõparato exprimitur, qui quidẽ fictili crasso inditus in sole cogitur siccaturq;. Sũt & qui folijs simul cũ radice tusis succũ exprimãt, sed inualidior is est. Hoc verò indicio discernitur q è sola radice manauit, q viroso magis est odore, humidúsq; permanet: ac è folijs extractus, exiccatur ac teredinũ iniuriam sentit. Porrò qui liquorẽ colligit, minimè obuersum vento stare oportet: ac potiùs tẽpestatẽ deligere à ventis silentẽ, quáve nulla aspiret aura. Alioqui propter

halitus acrimoniâ vehemẽter intumescit facies, nudaſq; corporis partes puſtulæ inuadunt. Iccirco etiam non, niſi cerato quopiam aſtringẽte liquido priùs inunctis nudis partibus, eò accedendũ. Purgandi vim habent cortex radicis & ſuccus, itemq; liquor, ſi in aqua mulſa bibatur: ſupernè enim æquè ac infernè bilẽ extrahũt. Radicis modus, quaterni oboli cum ternis ſeminis anethi drachmis: expreſſi verò ſucci, terni oboli: at liquoris, obolus vnus: copioſior doſis ſalutem in diſcrimẽ adducit. Conuenit autem huiuſcemodi purgatio ſuſpirioſis, & in diuturnis laterum doloribus, atque difficilibus excreationibus: ijs verò qui ægrè vomunt in cibarijs opſoniiſve datur. Tã radix quàm liquor omniũ maximè quæ pares cum eis vires ſortita ſunt, metaſyncritica vi pollẽt, ſiue quid ex alto euocare, ſiue ſummæ cutis meatus relaxando corporis habitũ mutari expedit. Quamobrẽ ſuccus perunctione, aut radix recens affricta, alopecias explet. Radix ſuccúſve cum æquis thuris ac ceræ portionibus ſugillata liuentiáque emẽdat: ſed non plus binis horis dimittatur, ac locus deinde aqua maris calida foueatur. Tollit & maculas à ſolis ardore contractas illitus ex melle ſuccus, ac lepras remouet: ſed & tubercula rumpit, cum ſulphure perunctus. In diuturnis quoque lateris, pulmonis, pedũ, articulorúmque vitijs vtiliter illinitur. Cæterùm valet & ad integendam colis glandem, ſi modò alia ex cauſa quàm circunciſione nudata fuerit. Tumorem enim excitat, qui & foribus & pinguibus adhibitis emollitus præputij iacturã reſarcit.

De Spartio. Cap. CLVIII.

SPARTIVM frutex eſt longas proferens virgas, ſine folijs, firmas, fractu contumaces, quæ in alligádis vitibus vinculi vſum præſtát: ſiliquas ceu phaſeli, in quibus exilia ſemina, lenticulæ ſimilia: florẽ leucoij, luteum. Huius ſemina & flores purgát per ſuperna vehemẽter, helebori modo & citra periculũ, ſi quinis obolis ex aqua mulſa bibantur.

τὴν ὀλκὴν ὀβολοὺς ε', καθαίρει αἶμα μετ'

ῥιζὸς δὲ χρόσπαν, καὶ φλυκταινοῦται τὰ γυμνὰ μέρη ἅμα πᾶσι θριμύτητα τῆς ἀποφορᾶς· δεῖ οὖν κηροταῖς συφούσαις ὑγραῖς προχρίειν τὰ γυμνὰ τῶν μερῶν, καὶ οὕτω προσέρχεσθαι. Δύναμιν δ' ἔχει καθαρτικὴν ὅ, τε φλοιὸς τῆς ῥίζης καὶ ὁ χυλὸς, καὶ ὁ ὀπὸς, σὺν μελικράτῳ πινόμενος· αἴρει γὰρ καὶ κάτω χολὴν καθαίρεσιν. δίδοται δὲ τῆς μὲν ῥίζης τετρώβολον [μετὰ ἀνήθου σπέρματος <γ.] τῆς δὲ χυλίσματος, τεσσάρων· τοῦ δὲ ὀποῦ, ὀβολὸς· πλεῖον γὰρ δοθὲν, κινδυνώδες. ἁρμόζει δὲ καὶ αὐτὸ καθαίρειν πάθη ἀδηματικὰ, πλευρῶν ἀλγήματα χρονίους, καὶ αἰγαγρίας· πίνεται δὲ δυσεμίου ἐν ἀλίοις ἢ ἐφήμασι δίδοται. κίνεται δὲ καὶ μετὰ σταφυλῆς χυλὸς δυσὶν ὀβολοῖς, τὸ ὀπὸς καὶ ἡ ῥίζα πάντων μᾶλλον τὴν ἰσοδυναμοῦσαν, ὅπου δεῖ ἐκβάλλειν ἰλυώδη, ἢ μελαγχολικὰ ἐκκρίνουσα. ὄφεσι ἀλωπεκίας καταχρίοντος ὁ χυλὸς, ἢ ἡ ῥίζα χλωρὰ τετριμμένη, δασύνει. ὑποπά τε αὖρει καὶ πτερώματα λεία ἡ ῥίζα ἢ ὁ χυλὸς σὺν λιβανωτῷ καὶ κηρῷ ἴσοις· δεῖ δὲ μὴ πλέον δυοῖν ὡρῶν ἐᾶν· μετὰ δὲ ταῦτα πυελῶν θερμῷ θαλάσσῃ· αἴρει δὲ καὶ ἔφηλα σὺν μέλιτι καταχριόμενος, καὶ λέπρας ἀφίστησι φύμασί τι ῥηγνὺς μετὰ ἁλὸς καταχριόμενος ὁ χυλός· χρησίμως δὲ καταχρίεται καὶ ἐπὶ τῶν χρονίως ἐχόντων ἀφέδρους εἰς πλευρὸν ἢ πνεύμονα, ἢ πόδας ἢ ἄρθρα· χρησιμεύει δὲ καὶ πρὸς ἐπιγόνια ὀπὶ τῶν μὴ ἐκ φύσεως λειποδρίων, οἴδημα ἐγείρων, ὅταν καταμυλεύμενον καὶ τοῖς λιπαίνουσι μαλαττόμενον, ὁ ἐλλέβορος τῆς πώδης ἀναπλήσῃ.

Περὶ Σπαρτίου. Κεφ. ριή.

ΣΠΑΡΤΙΟΝ θάμνος ὀζὴ φέρων ῥάβδους μακράς, [ἀφύλλους, τριχὰς,] δυσθραύστους, αἷς τοὺς ἀμπέλους δεσμεύουσι· φέρει δὲ λοβοὺς ὡς φακὸς, φασήλοις ὁμοίους σπέρματα φακοειδῆ· εἶδος μέλαν, ὥσπερ λευκίου. Τοῦτου ὁ καρπὸς καὶ τὰ αὐτὰ πάθη ἅπερ καὶ μελιτόεις ὡσαύτως ὡς ὁ ἐλλέβορος ἀποδιδώσιν·

Hunc locum sic legit in altero Goupylus, φλυκταινοῦται τὰ γυμνὰ μέρη τῶν γυμνῶν σώματος, quo modo Hermol. legisse videtur.

V. carn.

V. καὶ.

A. αἴρει δὲ καὶ δασύνει.

V. λεῖα ἡ χυλὸς

Mscr. legit μεγάλοι V. non habet.

V. addit ὁ φασήλος

ὁ δὲ καρπὸς κνῆ πλὴν κάτω καθαρσιν· καὶ αὐτῶν δὲ τῶν ῥάβδων τὸ ὕδατι βραχέων, εἶτα κατεψυγμένων καὶ χολικοῖς, ἰσχιαδικοῖς καὶ σπασμῶν ἐστὶ βοήθημα, ὅσον κύαθος τῶν πινόμενος νήστεων. ἔνιοι δὲ καὶ τοὺς ῥίζους ἀμμὴ ἢ θαλάττῃ, ἐκλύζουσι τοὺς ἰσχιαδικοὺς ἄλλοι δὲ αἱματώδεις καὶ ξυσματώδεις.

V. aut. ἐκλύζουσι

A Semen verò deiectione quoq; mouet. Quin & ramuli in aqua macerati, mox tusi succum dant ischiadicis & angina laborantibus vtilem, si cyathi vnius modũ ieiuni biberint. Quidam eosdem illos ramulos muria aut aqua marina macerare malunt, extractúmque succum clystere infundunt ischiadicis. Extrahit verò cruenta, quæque ramenta strigmentáve repræsentant.

Περὶ Σιλύβου. Κεφ. ριθ'.

B

ΣΙΛΥΒΟΝ ἄκανθα ἐστὶ πλατεῖα, φύλλα ἔχουσα χαμαιλέοντι ὁμοια τῷ λευκῷ. ἡ πίς δὲ ῥιζωφυὴς ἑαθεῖσα ἐφθὴ σὺν ἐλαίῳ καὶ ἁλῒ. τῆς δὲ ῥίζης ὁ ὀπὸς ὅσον ὁλκὴ πόσις σὺν μελικράτῳ, ἐμέτους κινεῖ.

De Silybo. Cap. CLIX.

SILYBVM spina est lata, foliis, chamæleonti albo similis: quæ adhuc nouella, cum oleo & sale cocta, estur. Stillans è radice liquor drachmæ pondere potus ex aqua mulsa, vomitiones ciet.

Περὶ Βαλάνου μυρεψικῆς. Κεφ. ρξ'.

C

ΒΑΛΑΝΟΣ μυρεψικὴ καρπός ἐστι δένδρου μυείκῃ ἐοικώς, ὅμοιος δὲ λεμβώδει Ποντικῇ καρύᾳ, οὗ δὲ ἔνδοθεν θλιβόμενοι, ὥσπερ τὰ πικρὰ ἀμύγδαλα, ἐξίησιν ὑγρὸν, εἰς τὰ πολυτελῆ μύρα αὐτὸ ἐλαίῳ χρῶνται· φύεται δὲ ἐν Αἰθιοπίᾳ καὶ Αἰγύπτῳ καὶ Ἀραβίᾳ, καὶ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ Πέτρᾳ διαφέρει δὲ αὐτῶν ἡ νέα καὶ πλήρης, λευκή τε καὶ βελτίστη. Ἡ πὶς μὲν ὀξυκράτου πολλῆς σὺν ἁλῒ, σκληρὰ τὴν ἕλκη. καὶ καθαπλασθεῖσα ἢ ἐπ' αὐτῶν μετ' ἀσείτου ἀλθύρου, καὶ μετὰ μελικράτου καὶ ὀπὸς ποδαγρικῶν σὺν ὄξει ἢ ἐφθεῖσα, ἀποσμήχει ψώρας, λέπρας· σὺν νίτρῳ δὲ, ἀλφούς, οὐλὰς μελαίνας· σὺν ὕδρῳ δὲ, αἴρει φακοὺς, ἰούλους, ἐφήλεις, ἐξανθήματα τοῦ προσώπου· ἐμέτους δὲ κινεῖ καὶ χολίδι λυεῖ μετὰ ὑδρομέλιτος· κακοστόμαχος δέ ἐστιν ἰσχυρῶς. καὶ τὸ ἐξ αὐτῆς ἔλαιον πολὺν, πίνειν χολίδι· ἐπάγει. συστελλόντων δὲ ἐστὶν ὁ φλοιὸς αὐτῆς· τὸ δὲ ἔκπωμα καὶ ἐκπλύσεις καὶ ἐκπάσματα, μίσυος σμάγμασι βοὸς τραχύτητας καὶ κνησμοὺς βέλτιστον.

Post ἐπάγει

D

E

F

De Glande vnguentaria. C.CLX.

GLANS vnguentaria fructus est arboris myricæ similis, magnitudine auellanæ nucis: cuius nucleus amygdalarũ amararum more tusus pressúsq; liquorẽ reddit, quo in pretiosa vnguẽta pro oleo vtuntur. Nascitur in Æthiopia, Ægypto, Arabia & Petra oppido secus Iudæam. Præfertur recens, plena, candida, quæq; facilè cortice spoliatur. Ea trita & ex posca drachmæ pondere pota, lienem absumit. Quin & eidẽ visceri cum lolij farina, itemq; podagricis cum aqua mulsa imponitur. Cum aceto cocta, psoram & leprã exterit: cum nitro, vitiligines & cicatrices nigras emendat: & cum lotio lentigines & varos, maculas à Solis ardore contractas & papulas in facie tollit. Vomitiones autẽ mouet aluumq; soluit cum hydromelite: sed valdè stomacho aduersatur. Oleum quod ea exprimitur, aluũ potu subducit: at cortex eius magis astringit. Cæterũ quod ex ea tusa expressáq; reliquũ est quasi retrimentũ seu magma, smegmatis immiscetur, quę ad scabritias & prurigines accommodátur.

Περὶ Νάρκισσου. Κεφ. ρξα'.

NΑΡΚΙΣΣΟΣ, ἔνιοι καὶ τοῦτο ὥσπερ ὃ κρίνον λείριον ἐκάλεσε, τὰ μὲν φύλλα πράσῳ ἔοικε, λεπτὰ δὲ καὶ μικρότερα καὶ πολὺ, καὶ τενώτερα· καὶ ὁλόκληρα κενὸν, ἄφυλλον, μεῖζω ἀσφοδέλου· ἐφ' ὧν ἄνθος λευκὸν· ἔσωθεν δὲ κροκῶδες, ἐπ' ἐνίων δὲ πορφυροειδὲς· ῥίζα δὲ λευκὴ ἔνδοθεν, στρογγύλη, βολ-

De Narcisso. Cap. CLXI.

NARCISSVM sunt qui, haud secus ac liliũ, liriũ appellarint. Folijs quidem porrum refert, at tenuia ea sunt, minoráq; multò & angustiora: caulis inanis ac sine folijs supra dodrantem attollitur: flos in ipsius cacumine albus, intus croceus, & in quibusdam purpureus: radix intus candida, rotunda, bul-

V. ἔστιν δὲ μείζω καὶ πλατύτερα

V. λευκὸν· ὁ μέσος δὲ κύτινος ἔχει πορφυροῦν.

bosa: semen velut in membrana seu pellicula, nigrum & oblongum. Probatissimus nascitur in montosis, odore suaui: reliqui porrum imitantur, & herbaceum quendam odorem resipiunt. Radix cocta seu edatur, seu etiam bibatur, vomitoria est: ambustis igni prodest cum melle trita: præcisos neruos imposita glutinat: luxatis malleolis diuturnisque articulorũ doloribus trita ex melle illitáque subuenit. Vitia cutis à sole contracta, itémque vitiliginem cum vrticæ semine & aceto emaculat: cum eruo autem ac melle, vlcerum sordes expurgat, & abscessus rũpit ęgrè matureſcentes: deniq; infixa corpori extrahit, imposita cum lolij farina & melle.

A Ἐσθλὸς καρπὸς ὡς ἐν ὑμῷ, μέλας, τρομέχης φύλλῳ ὁ κάλλιστος ἐν ὀρεινοῖς τόποις, βώδης· ὁ δὲ λοιπὸς παραπλήσιός ἐστι, καὶ βοτανώδη τινὰ διαφορὰν ἔχει. Τούτου ἡ ῥίζα βρωθεῖσα ἐφθὴ καὶ πολεῖσα, ἐμέτους κινεῖ· ἁρμόζει δὲ καὶ πυελικαῖς στρόφοις μέλλι λείᾳ· καὶ ἕλκεσι νέοις ἀφεψηθεὶς B τραχήλοις καὶ ἀπλανοῦσι τρέμματά τι σκυρωδῆ καὶ τὰ τοιαῦτα ἄρθρα χρόνια ἀλγήματα λείᾳ σὺν μέλιτι καταπλασθεῖσα ὑπαιθριᾷ καθαίρει καὶ ἕφηλιν καὶ ἀλφοὺς σὺν κηδίνῳ σπέρματι καὶ ὄξει· σὺν ὀξυμέλιτι δὲ καὶ μέλιτι, ἕλκεσι ἀνθηρολοιᾷ τῇ ἐλαχίστῃ ἀποκαθαίρει· καὶ τὰ δύσπεπτα τῆς C ἀποπεμάτων ῥήσεως ἄγει καὶ σπλῆνας· σὺν αἰγείῳ ἀλθίρῳ καὶ μέλιτι καταπλασσόμενον.

V. caret.

V. addunt Oribasius, & melius qui immediate

V. καὶ αἰσθῶ σκόλοπας

Add. Lacunã ex vet. cod. ἐμβεβυσμένα

De Hippophaë. Cap. CLXII.

HIPPOPHAES, quo vestes à fullonibus interpolatur, in maritimis sabulosisque nascitur. Est autem frutex è cremiorum genere, densus & surculos suos quoquouersus expandens, foliáque habens longa, oleaginis proxima: sed angustiora molliora que, inter quæ candicantes spinæ emicant, siccæ, anguloſæ, distantes inter se: flores hederę corymbis similes, ac veluti racematim sibi inuicem cohærentes, minores tamen ac molles, candidos simul & ex parte puniceo colore rubentes: radicem crassam, E mollem, lactei succi plenam, gustu amaram. Ex hac perinde ac è thapsia liquor excipitur, qui & per se, & cum erui farina subactus siccatur, & ad vsum reconditur. Sincerus is bilioſa, aquoſa pituitoſáque detrahit, oboli pondere: at erui farina exceptus, quaternis obolis ex aqua mulsa. Sed & frutex cum radicibus siccatus tunditur, & cum aquæ mulsæ dimidia hemina tritus exhibetur. Cæterùm è radicibus ac simul etiam herba ipsa succus itidem haud secus ac è thapsia exprimitur, cuius in purgationibus modus est, drachma vna.

Περὶ Ἱπποφαοῦς. Κεφ. ρξβ'.

ἹΠΠΟΦΑΕΣ, ᾧ γναφεῖσι τὰ ἱμάτια, φύεται μὲν ἐν θαλασσίοις καὶ ἀμμώδεσι τόποις. θάμνος δέ ἐστι φρυγανώδης, D πυκνός, ἀμφιλαφής, φύλλα ἔχων μακρὰ ὡρὸς τὰ τῆς ἐλαίας, στενώτερα δὲ καὶ μαλακώτερα καὶ μαλαξὺ ἀκανθώδεις ξηρὰς, ὑπολεύκους, σωληνοειδεῖς, ἀπ' ἀλλήλων διεστώσας· ἄνθη κορύμβοις ἐοικότα κισσοῦ, ὡς βοτρύδια προσκείμενα ἀλλήλοις, πλὴν μικρότερα καὶ μαλακώτερα, καὶ μετὰ τοῦ λευκοῦ φοινίσσοντα ἐν μέρεσι· ῥίζα παχεῖα καὶ μαλακὴ, ὀπτῷ μὲν ἡδεῖα, γλυκαλόβῳ πικρά, ὀπίζομεν ὡς ἀφ' θαψίας. Ἀποπλύνουσι δὲ καθ' ἑαυτὸν ὁ ὀπὸς, καὶ σὺν ὀροβίνῳ ἀλθίρῳ αἰσαλαμβανόμενος καὶ ξηραινόμενος· καθαίρει δὲ χολώδεις, ὑδατώδεις καὶ φλεγματώδεις κάτω, ὅσον ὀβολὸς ἀκίρατος. τοῦ δὲ μὲν πρὸ ὀροβίνου, πτισσόλου σὺν μελικράτῳ. καὶ ὁ θάμνος δὲ σὺν ταῖς ῥίζαις ξηραινόμενος κόπτεται, καὶ δίδοται λεῖος μετὰ μελικράτου κοτύλης μιᾶς ἡμισείας· γίνεται δὲ καὶ χύλισμα τῆς ῥίζης καὶ τῆς πόας, ὡς περ ὅτι τῆς θαψίας δίδοται ὁ τρόπος· καὶ αἱ εἰς ταῦτα καθάρσεις.

Lacuna ex vet. cod. interserit, μικρὸν

Sic legit Lacuna ex vet. cod. At vulg. exemplaria τόπος

De Hippophæsto. Cap. CLXIII.

HIPPOPHÆSTON, quod aliqui etiá hippophaes appellãt, nascitur ijsdẽ locis, quib' & hippophaës:

Περὶ Ἱπποφαίστου. Κεφ. ρξγ'.

ἹΠΠΟΦΑΙΣΤΟΝ, οἱ δέ, καὶ τὸν ἱπποφαὲς καλέουσι, φύεται ἐν τοῖς αὐτοῖς τόποις, ἐν οἷς καὶ ὁ ἱπποφαὲς,

καὶ αὐτὸ γναφικῆς ἀκάνθης εἶδός ὑπάρχον. ἔστι δὲ χαμηπετὴς, ἔχον μόνον φυλλάρια μικρὰ, ἀκανθώδη, καὶ κεφάλια χαῦνα· ὅτι δὲ καυλὸν, οὔτε ἄνθος φέρει· ῥίζαν δὲ παχεῖαν καὶ μαλακήν. Ταύτης τὰ φύλλα καὶ τὴν ῥίζαν καὶ τὰ κεφάλια χυλίσας, ξύραις, καὶ δίδου ἑλκῶν ῥιωδόλου μετὰ μελικράτου ᾧ βούλει· τὸ γὰρ δλον τοῦτο καθαρσις ὕδωρ καὶ φλέγμα ἄγει· ἰδίως δὲ ὀρθοπνοίαις ἀρμόζει καὶ ὀπιλημψίαις καὶ τοῖς ἐξ ὑπνου πάθεσιν ἡ δλη τούτου κάθαρσις.

Lacuna additi ex vet. cod. ὅτι καυλὸν

A

B

Περὶ Κίκεως. Κεφ. ρξδ'.

Κίκι ἢ κρότων, οἱ δὲ, σήσαμον ἄγριον, οἱ δὲ, σίσελι Κύπριον, οἱ δὲ, κρότωνα. ὠνόμασται κρότων, δλη τε πρὸς τὸ ζῶον ἐμφέρεια τὸ σπέρματος· δένδρον δέ ἐστι συκῆς μικρᾶς μέγεθος ἔχον φύλλα ὅμοια πλατάνου, μείζονα δὲ καὶ λιπότερα καὶ μυγαίτερα. τὸ δὲ τελεχῶδες τῆς κράδας καὶ λεῖα καὶ λάμον ἔχον ἔλκη κερπὸν δὲ ἐν βότρυσι βαχίοις, λεπιδώλια ὅμοιον κρότωνι ᾧ ζώῳ. ἐξ οὗ καὶ ἀποθλίβεται τὸ λεχθὲν κίκινον ἔλαιον· ἄκρατον μὲν, ὅπως δὲ χρήσιμον εἰς λύχνους καὶ ἐμπλάστρους· καθαρτικὸς δὲ ὅσον λ' κίκεως καὶ τὰ ἀριθμὸν, καὶ πεπόντες λεῖοι, ἄγαν καὶ χιλίδι φλέγμα καὶ χολὴν καὶ ὕδωρ· κινοῖ δὲ καὶ ἔμετον. ἔστι δὲ λίαν ἀνδρὸς καὶ ἐργάδος καὶ τοιαύτη κάθαρσις, ἀναῤῥήγνυσι τόμαχον ἰσχυρῶς· *κοπεῖσα δὲ καὶ ἁπλασθεῖσα, ἰοῦσι δὲ ἐφήλεις καθαίρει. τὰ δὲ φύλλα βρεχέντα μετὰ παπάλης δήφιτου, ὀφθαλμῶν οἰδήματα καὶ φλεγμονὰς παύει· ἐπαρτᾶται μασοῖς, ἀριστοπλασία τι σβέννυσι, καθ' ἑαυτὰ καὶ μετ' ὄξους καταπλασσόμενα.

C

D

E

V. καὶ τοὺς κλάδους τοῦ.

Al. ἐξυφάτου

Περὶ Τιθυμάλων. Κεφ. ρξέ.

Τιθυμάλων εἴδη ζ'. ὧν ὁ μὲν ἄρρην χαρακίας καλεῖται, ὑπό δέ τινων κομάντης, ἢ ἀμυγδαλοειδὴς ἢ κωβιὰς ὀνομάζεται· ὁ δέ τις θῆλυς ἢ μυρσίτης, ὃν δὲ καρύτην ἢ μυρσινίτην καλοῦσι. ὁ δὲ παράλιος, ὃν ἔνιοι τιθυμαλίδα ἐκάλεσαν· ὁ δέ τις ἡλιοσκόπιος. ὁ δὲ κυπαρισσίας· ὁ δὲ δενδροειδὴς· ὁ δὲ πλατύφυλλος. Τοῦ δὲ χαρακίου καλουμένου, καυλὸς μέν ἐστι πῆχυν, ὑπερβαίνων πάχει, ὑπερυθρὸς, ὀπτὸν ἁπτομένοις καὶ λευκὸν

F

G

éstque spinæ fulloniæ genus. Humi vero sternitur, sine caule ac flore: minutis tantũ foliolis, iisq; spinosis, & capitulis inanib⁹: radice crassa & molli. Succ⁹ foliis, radice & capitulo exprimitur: q̃ quidẽ exiccatur, atq; datus cui volueris obolis tribus in aqua mulsa, aquam pituitámq; detrahit: priuatim verò orthopnœæ, comitialibus, neruorúmque vitijs, conuenit huiscemodi purgatio.

De Ricino. Cap. CLXIIII.

Crotona, hoc est, ricinũ seu cici, aliqui sesamum syluestre, alij seseli Cyprium appellant. Ricini verò nomen accepit à similitudine, quę est illius semini cum ricino animali. Arbuscula est paruæ ficus altitudine, foliis platani, at maioribus, læuiorib⁹ ac nigrioribus: ramis caudicibúsque cauis in harũdinis modũ, semine in vuis asperis, quod decorticatum ricinum animal repræsentat. Ex eo oleum nomine cicinum exprimitur, cibis quidem ineptum ac fœdum: sed aliàs lucernis & emplastris vtile. Grana numero triginta purgata tritáque, potu pituitam bilem aquásque per aluum extrahút, ac vomitiones etiá cient. Veruntamen admodum ingrata laborioságque est eiusmodi purgatio: siquidem valenter stomachum subuertit. Tusa verò & imposita eadẽ varos & vitia cutis à sole contracta depurgant. At folia cum polentæ polline trita, oculorũ œdemata inflammationésque leniunt. Eadem seu per se, seu etiam ex aceto illita, lactis vbertate turgentes mammas cohibent, & erysipelata restinguũt.

De Tithymalis, seu lactarijs herbis. Cap. CLXV.

Tithymalorvm genera septem: quorum masculus characias, quasi vallaris, ab aliquibus comatus, amygdaloides aut gobius appellatur: alter, qui fœmina existimatur, myrtites, quem & caryitem aut myrsinitem vocant: tertius paralius, quem nonnulli tithymalidem appellarunt: quartus heliosçopius: quintus cyparissias: sextus dendroides, quasi arboreścens: septimus denique platyphyllos, quasi latifolius dicitur. Porro Characiæ caules supra cubiti altitudinem attolluntur, rubri, acri lacteóque

succo referti: folia sunt circa ramulos oleaginis similia, sed longiora & angustiora: radix crassa lignosáque: in cauliú cacuminibus coma iunci similium virgultorum, sub quibus caua quædã peluibus aut alueolis similia, ac in ijs semen. Nascitur in asperis & mõtosis. Succus lacteus per aluum pituitam bilémq; trahit, obolis binis in posca sumptis: at cú aqua mulsa, vomitiones etiam mouet. Circa vindemiá succus is congestis ramulis, mox dissectis, & in vas inclinatis, excipitur. Aliqui adiecta erui farina pastillos ex eo fingunt, qui erui magnitudinem impleant. Alij in ficos quę exiccantur, ternas quaternásve guttas instillãt, vt cum ijs inarescant, eiusmodique ficos ad vsum recondũt. Sed & per se tritus in pila cogitur in pastillos, atque reponitur. Porrò qui succum colligit, minimè obuersum vento stare, aut oculis manus admouere oportet: quinimò antequam operi sese accingat, corpus, præsertimque faciem, collum scrotúmq; adipe aut oleo cum vino perungere. Quoniá verò fauces idem exasperat, catapotia quę ex eo concinnantur, cera aut decocto melle oblini, atque ita dari par est. Caricas verò binas ternásve soluẽdæ alui gratia sumpsisse satis est. Recẽs idem succus ex oleo illitos in sole capillos detrahit, renascẽtésque flauos & exiles efficit, tandémque omnes abolet. Dẽtium cauis inditus, eorum dolores leuat: sed cera dentes oblinendi, ne fortè præterlapsus is, fauces linguámve malè afficiat. Tollit & illitu myrmecias, pensiles verrucas & quæ thymi florem repræsentant, itémque lichenas. Valet idem aduersus pterygia, carbunculos, phagedænas, gangrænas atque fistulas. Legitur semẽ autumno, & siccatum sole leuiter tunditur, tandémque ab aceribus repurgatum loco mundo reponitur. Similiter & folia siccata reponuntur: quæ haud secus ac semen lactei succi effectum præbẽt, dimidio acetabulo pota. Sunt qui ipsa inueterant, admisto etiam cũ laxopíς τι κύφως καὶ ἀποδεραθεὶς, καθαρὸς ἀπόλλυται. καὶ τὰ φύλλα ὁμοίως ξηρά. ποιεῖ δὲ καὶ ὁ καρπὸς καὶ τὰ φύλλα τὰ αὐτὰ τῷ ὀπῷ, πλῆθος ἡμίστεως ὀξυβάφου πολιζόμενα. ἔνιοι δὲ καὶ παιχνίοισιν αὐτὰ, μιγνύντες τῷ ἀλφίτου χάρ-

A μεσεῖ· φύλλα δὲ ἔχει ῥάβδοις ὁμοια ἐλαίᾳ, μακρότερα δὲ καὶ στενώτερα· ῥίζα αὐτῇ καὶ ξυλώδης· ἐπ' ἄκρων δὲ τῶν καυλῶν κόμην ἐοικυῖαν ῥαβδίων, καὶ ὑπ' αὐτῶν ὑποκύστεις ὅμοια πυέλοισιν, ἐν οἷς ὁ καρπός· φύεται δὲ παχέσι καὶ ὀρεινοῖς τόποις. Δύναμιν δὲ ἔχει ὁ

B ὁπὸς καθαρτικὴν τῆς κάτω χολῆς· ἄγει φλέγμα καὶ χολὴν ὀβολῶν β' πλῆθος λαμβανόμενος μετ' ὄξυκράτου σὺν μελικράτῳ δέ, καὶ ἔμετον κινεῖ. ὀπίζεται δὲ ὧδε· τὸν πυγμαῖον, σὺν ἀζύμοις τῷ ῥάβδῳ καὶ ἀποτμήμασιν ἐγκεκλεῖσθαι δὲ αὐτὰς δεῖ εἰς ἀγγεῖον. ἔνιοι

C δὲ ὀρύσσουσιν ἄλυσιν μιγνύντες, σὺν ἀναπλάσσουσιν ὀροβιαῖα μεγέθη. ὑιὰς δὲ εἰς τὰ ξηραινόμενα σῦκα ἀποτάζουσι σταλαγμοὺς γ' ἢ δ'. καὶ ξηράναντες ἀποτίθενται. χρῶ δ' ἑαυτὸν δὲ τελούμενος ὁ ὑιὸς ἀναπλάσσεται καὶ ἀποτίθεται. ὁ δὲ τῷ ὀπίζειν οὐ δεῖ κατὰ αἷμον ἴσα-

D σθαι, οὐδὲ ὅταν χεῖρες ἅψῃ τοῖς ὀφθαλμοῖς· ἀλλὰ καὶ περὶ τὸ ὀπίζειν, ὃ σῶμα δεῖ χρίειν σίαπι ἢ ἐλαίῳ μετ' οἴνου, καὶ μάλιστα περὶ στόμα καὶ πάχνας καὶ ὄγχους. πάχνῃσι δὲ καὶ τοῖς φάρυγξι· ὅταν δὲ δεῖ καταπότια ἐκπλάττειν χηρῷ ἢ μέλιτι ἑφθῷ, καὶ οὕτως διδόναι· ἰσάδιν

E μὲν τοῖς δύο ἢ τρεῖς λαμβανόμενα, αὐτάρκεις εἰσὶ πρὸς κάθαρσιν. φιλεῖ δὲ καὶ πείρας ὑπὸ περὶ στόμα ὄντας ὑπιχριόμενος μετ' ἐλαίου τὸ ἁλίφ· καὶ τοὺς ὑπογινομένας δὲ ξανθὰς καὶ λεπίδας ποιεῖ· καὶ τύλους ἐκφθείρει πάσας. ὀδόντας δὲ καὶ τοῖς βρώμασι τῷ ὀδόντων, κονφίζων τὰ

F ἀλγήματα· χηρῷ δὲ δεῖ τὸν ὀδόντας ἐκπλάττειν, ἵνα μὴ παρρεῖς κακώσῃ τὸν φάρυγξα ἢ τὴν γλῶτταν. αἴρει δὲ καὶ μυρμηκίας καὶ ἀκροχορδόνας ἐν ὑμοῖς ὑπιχριόμενος. ἁρμόζει ὑπὸ ῥοὸς πτερύγια ὑπ' αἴθραχας, φαγεδαίνας, γαγγραίνας, σύριγγας. ὑπὸ ὁ καρπὸς ὁ φθι-

G νοπώρῳ συλλεγείς, ὑπὸ ξηρανθεὶς ἐν ἁλίφ,

Add. Lacuna ex v. cod. οἷσιν δ' τίνεται ὁ πόνος

λαχὸς λεπιδίῳ, καὶ τυρῷ κοπέντι. καὶ ἡ ῥίζα δὲ ὀβολιαία σὺν ὑδρομέλιτι καὶ πινομένη, ἄγει καθαρτικὴν χολὴν· ἐφθεῖσα δὲ σὺν ὄξει καὶ ἀφαλυζομένη, ὀδονταλγίας βοηθεῖ. A

Add. Lacuna ex v. cod. ἀφαλαγίας π.

Περὶ τῆς Θήλεως.

Ὁ δὲ θῆλυς, ὃν ἔνιοι μυρσινίτιδα ἢ καρυΐτιδα ἐκάλεσαν, παρεμφερὴς τὴν δαφνοειδῆ τὴν φύσιν· καὶ τὰ φύλλα ὅμοια ἔχει μυρσίνῃ, μείζονα δὲ καὶ τραχέα, ἐπ' ἄκρου ὀξέα καὶ ἀκανθώδη· κλήματα δὲ ἀπὸ τῆς ῥίζης ἀποβλαστάνει ἀφθονα· καρπὸν δὲ φέρει πρὸ ὡραίου τοῦ, καρύῳ ὅμοιον, ἡσυχῇ δάκνοντα τὴν γλῶτταν· ἐν τραχέσι δὲ χωρίοις καὶ ὄρεσι φύεται. Δύναμιν δὲ ἔχει ὁ ὀπὸς καὶ ἡ ῥίζα καὶ ὁ καρπὸς καὶ τὰ φύλλα ὁμοίαν τοῖς περὶ αὐτά· ἐμετικώτερος μέντοι ἐκείνου τούτου ἐστί. B

Μαν. legit, τὴν δαφνοειδῆ τὴν φύσιν καὶ τὰ φύλλα ὅμοια.

Lac. legit in ver. cod. καρύῳ ὅμοιον καὶ ἡσυχῇ δάκνοντα τὴν γλῶτταν. C

Add. Lacuna ex v. cod. καὶ δύναμιν ἔχει ὁμοίαν τοῖς περὶ αὐτά. Sic & Orib.

Orib. ἐμετικώτερος μέντοι.

Περὶ τοῦ παραλίου.

Ὁ δὲ παράλιος λεγόμενος τιθύμαλος, ὃν ἔνιοι τιθυμαλίδα ἢ μήκωνα ἐκάλεσε· φύεται ἐν πλαταγιασμοῖς τόποις. χλωρὰς δὲ ἔχει σχιζὰς, ὀρθίους, ὑποπύρρους, ἑπτὰ ἢ ὀκτώ· ἀπὸ τῆς ῥίζης, περὶ οὓς τὰ φύλλα τοιχηδὸν μικρὰ, ὑπ' ὀλίγα, περιμήκη, ἐοικότα λίνῳ· κεφαλὴν δὲ ἐπ' ἄκρου περιφερῆ, ἐν ᾗ ὁ καρπὸς ὡς ὄρεβος, ποικίλος, αὐθη λευκά. ὅλος δὲ ὁ θάμνος καὶ ἡ ῥίζα, ὅπου λευκοῦ μετὰ. καὶ τούτου χρῆσις καὶ ἀπόθεσις, ὁμοία ἐστὶ τοῖς περιφρηθεῖσιν. D

Sic v. c. Lacuna etiã legit ὀρθούς. Ita & Serapio, nímque Apul.

Vlcus. μετὰ.

Vox addit. Sic etiã legit Lacuna & Orib.

Orib. addit. καὶ

Περὶ τοῦ ἡλιοσκοπίου.

Ὁ δὲ ἡλιοσκόπιος λεγόμενος, αἰθράχνῃ ὅμοια φύλλα ἔχει, λεπτότερα δὲ καὶ περιφερέστερα· χλωρὰς δὲ ἀφίησιν ἀπὸ τῆς ῥίζης δ' ἢ ε'. ἀποβλαστάνει, λεπτοὺς καὶ ἐρυθρούς, ὀποῦ λευκοῦ μεστούς· πολλοῦ κεφαλὴ δὲ αἰσθητῆς· καὶ ὁ καρπὸς δὲ ὥσπερ ἐν κεφαλίοις συμπεφύρηται δὲ τούτου ἡ κόμη τῇ τοῦ ἡλίου κλισῇ. ὅθεν καὶ ὠνόμασται ἡλιοσκόπιος. ἐν ἐρημίοις δὲ μάλιστα καὶ περὶ τὰς πόλεις φύεται. συλλέγεται δὲ ὁ ὀπὸς καὶ ὁ καρπὸς, ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἄλλων. δύναμιν ἔχουσι τὴν αὐτὴν τοῖς πρότερον, ἀλλ' οὐχ οὕτως ἰσχυρῶς. E F G

V. αἰθρ. ιαν.

Mart. Lacuna ex v. cod. ἀφαλαγιάσεις π.

Of Lacma.

Of Tithymalo fœmina.

Fœmina, quam myrſiniten aut caryiten vocarunt, ſimilis ſuapte natura daphnoidi: folijs myrti, ſed maioribus ac firmis, in ſummitate acutis, atque etiam aculeatis. Sarmenta mittit ab radice dodrantalia, fructúmque profert alternis annis nuci ſimilem, qui quidem leniter linguam mordet. Naſcitur & hic in aſperis. Succus lacteus, radix, ſemen & folia conſimilem antedicto ſortiuntur facultatem. Sed ille ad citandas vomitiones hoc ipſo efficacior.

Of Paralio.

Tertij generis tithymalus Paralios vocatur, quem aliqui tithymalida aut mecona appellauere. Naſcitur in maritimis, ramis palmum altis, erectis, ſubrubentibus, quinis ſeniſve à radice exeuntibus: circa quos folia ſerie quadam digeſta, eáque parua, quadantenus anguſta, oblonga, & lini folijs ſimilia: capite in cacumine orbiculato, in quo ſemen erui ſimile, varium, flores albi. Frutex totus cum radice lacteo ſucco turget. Idem huius qui antedictorum vſus, ſimilitérque reponitur.

Of Helioſcopio.

Qui Helioſcopius dicitur, folijs eſt portulacæ, attamen tenuioribus rotundioribúſque, ramulis ab radice quaternis aut quinis, dodrantali altitudine, tenuibus ac rubentibus, lactei ſucci copioſi plenis, capite anethi: ſemine velut inter folia locato. Comam cum ſole circumagit, ideóque Helioſcopij nomen accepit. Cæterùm in ruderibus potiſſimùm & circa oppida naſcitur. Colligitur ſemen ſuccúſque, vt & aliorum: nam & eædem quæ ſuperioribus vires, non tamen vſque adeo validæ.

De Cyparissa.

Cyparissias caulem profert dodrantalem, aut etiam altiorem, subrubrum: ex quo folia pini similitudine pullulant, molliora tamen tenuioraq; atque in totum nuper nascentem pinum æmulatur, vnde & cognomen traxit. Candido & hic succo refertus est, eique vis eadem, quæ superioribus.

De nascente in petris tithymalo, Dendroide nominato.

Qui verò in petris nascitur, Dendroides, quasi arboreſcens, cognominatus, foliosus est in cacumine, densámq; spargit comam, succo lacteo prægnans, subrubétibus ramis, folijs circum ipsa myrti tenuioris, semine characiæ. Eiusdem est effectus, cuius & antedicti, similiq; modo recondítur.

De Platyphyllo, seu latifolio.

Platyphyllos verbasco similis est. Radix succus & folia aquas per inferna trahunt. Pisces necat tusus aquaq; dilutus: id quod & antè memorata tithymalorum genera præstant.

De Pityusa. Cap. CLXVI.

PITYVSA, quam alij clema, alij crambion, alij paralion, alij denique canopicon vocant, à cyparissia tithymalo specie differre existimatur, ideoq; etiam in tithymali genere connumeratur. Caulem profert cubito altiorẽ, crebris geniculis interseptũ, foliolis acutis ac tenuibus circúndatum, pini folia imitátibus: flores exiguos penè purpureos: semen latum instar léticulæ: radicem candidam, crassam, lacteo succo refertam: quibusdá in locis frutex hic prægrádis inuenitur. Purgat per inferna radix, drachmis duabus data in aqua mulsa: semẽ verò, drachma vna: At succi farina excepti cochlearium in catapotio datur: foliorum denique modus, drachmæ tres.

De Lathyride. Cap. CLXVII.

LATHYRIS, quam & aliqui tithymalon appellant, eámque tithymalorum numero ascribút, caulẽ emittit cubiti altitudine & digiti crassitudine, inanem. Sunt porrò in ipsius cacumine alæ, & folia quidem in caule oblóga, amygdalinis

Περὶ Κυπαρίσσου.

Ο δὲ Κυπαρίσσιας, καυλὸν μὲν ἀπίνει ὑπερυθραμμαίσον, ὕψος δὲ μείζονα, ἐπάρυθρον ἔχ. οὗ βεβλάστηκε τὰ φύλλα τοῖς τῆς πίτυος ὅμοια, πυφερώτερα μέν πως καὶ λεπτότερα· καὶ καθόλου ἔοικε πίτυϊ ἀρτιφυεῖ· ὅθεν καὶ ὠνόμασται. πεπλήρωται δὲ καὶ οὗτος ὀποῦ λευκοῦ. Δυώαμιν δὲ ἔχει ὁμοίαν τοῖς πρὸ αὐτοῦ.

Περὶ τοῦ ἐν ταῖς πέτραις φυομένου.

Ο δὲ ἐν ταῖς πέτραις φυόμενος, δενδροειδὴς ἢ καλούμενος, ἀμφιλαφὴς αὔωθεν καὶ πολύκομος, ὀποῦ μεστός, ἐπάρυθρος τοῖς κλάδοις περὶ οὗ τὰ φύλλα μυρσίνῃ λεπτῇ παραπλήσια καρπὸς δὲ ὅμοιος τοῦ τῆς χαρακίου σπέρματος ἢ ἐστὶ δὲ καὶ ἀποπλητικὸς, καὶ ἐνεργὴς ὁμοίως τοῖς προφημένοις.

Περὶ Πλατυφύλλου.

Ο δὲ πλατύφυλλος φλόμῳ ἔοικε. καὶ αὐτοῦ δὲ ἡ ῥίζα καὶ ὁ ὀπὸς καὶ τὰ φύλλα, ἀγλυδατώδη καὶ χιλίαρ ἀποτείνει δὲ καὶ τοὺς ἰχθύας, κτείνει καὶ διεθεῖς τοῦ ὕδατος· καὶ ⓐ προγεγραμμένοι δὲ τὸ αὐτὸ δρῶσι.

Περὶ Πιτυούσης. Κεφ. ρξς'.

ΠΙΤΥΟΥΣΑ, οἱ δὲ, κλῆμα, οἱ δὲ, κραμβίον, οἱ δὲ, παράλιον, οἱ δὲ, κωνοπικὸν καλοῦσιν εἶδος δοκεῖ διαφέρειν τῆς εὐπαρσαπὸς πθυμάλου ὅτι καὶ εἴδεσι ἐν αὐλοῖς καταριθμεῖται· ἀνίσοι δὲ καυλοὶ πήχεως μείζονα, πολυγόνατοι, φυλλαρίοις ὀξέσι λεπτοῖς καὶ ἐλαιώδεσιν, ἐμφερέσι τοῖς τῆς πίτυος· ἄνθη μικρὰ, ὡσεὶ πορφυρᾶ καρπὸν ἔχ στρογγύλον, ὡς φακὸν ῥίζαν λευκὴν, παχεῖαν, ὀποῦ μεστὴν θυρίσκε) δὲ καὶ τύπους σφοδρὰ βυμελθὴς ὁ θάμνος. Καθαίρει δὲ κάτω ἡ μὲν ῥίζα, < > ὁλκὴ δραχμὴ σὺν μελικρήτῳ· τῆς δὲ καρποῦ ἀλεύρου δὲ ὀποῦ ὅσον κοχλιάριον, ἐν κύλικι πόσει ἀκράτῳ· τῶν δὲ φύλλων, ὁλκαὶ γ'.

Περὶ Λαθυρίδος. Κεφ. ρξζ'.

ΛΑΘΥΡΙΣ, οἱ δὲ, [καὶ τοῦτον] πθύμαλον καλοῦσι καὶ καταριθμοῦσι τοῖς καὶ τοῦτον ἐν τοῖς πθυμάλοις, καυλὸν ἀνίσοι πήχεως ὕψος, κενὸν, πάχος δακτύλου ἐπ' ἄκρου ἢ αὐτὸν, μεγάλαις φύλλαις δὲ τὰ μὲν ὑπὸ τῆς καυλῆς, ὑπερμήκεσιν ὁμοίαις

A
B
C
D
E
F
G

V. add. κατὰ μέσον. V. non habet. V. λιβάνου. Al. ἐμφερὲς. Al. ὁμοίως. Al. ἀποτίνει. Lacuna legit in vtroq; adde μετὰ τοῦ ὕδατος ἐκπίνομενον ἐξ ἡμέρας ἕξ. V. cum. V. cum.

τῆς τῆς ἀμυγδαλῆς, πλατύτερα δὲ καὶ λειότερα· τὰ δὲ ἐπ' ἄκρων τῶν κλαδίων, μικρότερα, ὡσαὐτως ἀειπλοχίας ἢ κισσοῦ τὰ ὀθνήκεια. καρπὸν δὲ ἔχει ἐπ' ἄκρων τῶν κλάδων τρίχωρον, σκεφερῆ ὡσαὐτως κάππαριν, ἐν ᾧ τρία σπερμάτια διηρημένα ἑλύτροις ἀπ' ἀλλήλων, σκεφερῆ, μείζονα ὀφθέντα· λεπιδότητα δὲ, λευκὰ καὶ γλυκέα ἐν τῷ γλίσχρῳ. ῥίζα λεπτὴ καὶ λευκὴ ἄχρηστος. ἕλκος δὲ ὁ θάμνος ὁποῦ μισὸς ὡσαὐτως τιθύμαλος. Δύναμιν δὲ ἔχει καθαρτικὴν κοιλίας τὰ σπέρματα, ὅσον ζ ἢ η. ἀριθμὸν λαμβανόμενα ἐν καταπλάσματι, ἢ ἐλαιώδημα καὶ καταπινόμενα μετὰ ἰσχάδων ἢ φοινίκων, ὑδατος ψυχροῦ ὀπτηρὸν ποιοῦντα. ἄγει δὲ φλέγμα καὶ χολὴν ἐν ὕδατι. ἡ δὲ ὁπὸς αἱ ἀλληφθεῖσα ὡσαὐτως ὁ τοῦ τιθυμάλου, ὃ αὐτὸ ποιεῖ. συνέφιται δὲ καὶ ὄφεσι ἢ λαχάνοις τὰ φύλλα σὺν τῷ αὐτῷ ἐνέργειᾳ.

V. carn. Add Lac. ex v. cod. ἡ ἀειπλοχίας Ald. ἀειπλόκης. sequ. in ita Mart. & Corn.

V. quadam καὶ χλωρὸν

V. ἰσχάδ

Sic Lacuna vet. cod.

V. carn.

Περὶ Πέπλεως. Κεφ. ρξή.

ΠΕΠΛΟΣ, ἡ δὲ, συκῆ, οἱ δὲ, μήκωνα ἀφρώδη καλοῦσι, θαμνίσκος ἐστὶν ὁπτοῦ λευκοῦ μισὸς, ἔχων φύλλα μικρὰ, ὅμοια πηγάνῳ, πλατύτερα δὲ ἢ δὶ σύμπαντα κόμη ὡς ἀσφαμῆς, σκεφερῆς, ἐκ χυμῶδη ὑπὸ τῆς γῆς. ἡ δὲ ἀπὸ τῶν φύλλων καρπὸς μικρὸς, στρογγύλος, ἥπιον τῶν λευκῶν μήκωνος· πολύχρηστος δὲ ἡ πόα, ῥίζαν ἔχουσα μίαν ἄχρηστον, ἀφ' ἧς ὅλος ὁ θάμνος πέφυκε· γίνεται δὲ ἐν κήποις καὶ ἀμπελῶσι. Σωάγεται ἐν πυραμητῷ ξηραινομένη ἐν σκιᾷ, καὶ συνεχῶς στρεφομένη. ἀπόλλυται δὲ ὁ καρπὸς κηπεύσεως καὶ ἀποκαθάρσεως. ἄγει δὲ φλέγμα καὶ χολὴν ὑγρὰν ξυλάφου πλῆθος, μετὰ ὑδρομέλιτος κοτύλης πυέλμου· καὶ ἐν ὀξυσφήματι δὲ μιγνύμενος, παράγει τὴν κοιλίαν. Θεραπεύεται δὲ εἰς ἀλμύρας.

Lac. legit in ver. cod. Τῆς τῶν φύλλων.

Hæc omnia ver. cod. peplidi tribuit.

V. αὐτὸ

Vulg. exempl. mendo.

V. κόπτω

Περὶ Πεπλίδος. Κεφ. ρξθ.

ΠΕΠΛΙΣ, ἡ δὲ, αἰδράχνῃ ἀγρία, ἱπποκρήτης δὲ πέπλιν καλεῖ· φύεται μάλιστα ἐν ἀλμυραῖς τόποις, θάμνος ἀμφιλαφής, ἐποῦ μισὸς λευκοῦ· φύλλα ἔχων ὅμοια τῇ κηπαίᾳ αἰδράχνῃ, σκεφερῆ δὲ καὶ ἐν τῷ κάτω ἔχοντα

A proxima, sed latiora & læuiora: quæ verò in summis exeunt ramulis, minora conspiciũtur, aristolochiæ aut hederæ oblongæ figura. In summis autem surculis fructum gerit triplici loculamento distinctum, rotundum ceu capparim: in quo tria sunt minuta semina incursantibus tunicũlis inter se discreta, eruis maiora, quæque decorticata candida sunt, & gustu dulcia. Radix tenuis & candida, nullius vsus: totus verò frutex lacteo succo turget, vti tithymalus. Aluum purgant grana septẽ octóue in catapotio sumpta, vel esitata, & cum caricis palmulísue deuorata: sed aqua frigida posteà sorbeatur. Trahũt autem pituitam, B bilem & aquas. Succus tithymalini modo exceptus, eundem effectum præbet. Cum gallinaceo etiam aut oleribus folia decoquuntur in eosdem vsus.

De Peplo. Cap. CLXVIII.

PEPLON, alij sycen, alij papauer spumeum appellãt: exiguus frutex est, lactei succi plenus, folio paruo ceu rutæ, at latiore: vniuersa coma ferè dodrantali, rotunda, humi sparsa: semine sub folijs paruo, rotundo, minore quàm candidi papaueris. Herba multiplicis est vsus, at radicem habet vnicam, eámque superuacuam, è qua totus frutex erumpit. Nascitur in hortis ac inter vites. Colligitur messibus, ac siccatur in vmbra, crebróque versatur. Semen verò tusum repurgatúmque reconditur. Bilis ac pituita detrahitur, acetabulo eius in hydromelitis hemina poto: obsonijs admistum, conturbat aluum. Muria quoque conditur, itáque asseruatur.

De Peplide. Cap. CLXIX.

PEPLIS, quam vocant aliqui syluestrem portulacam, Hippocrates peplion, in maritimis maximè nascitur. Frutex verò est ramulos quoquouersum expandens, & G candidi succi plenus, folijs hortensis portulacæ, rotundis, & infernè

vel in Lacuna diuersa fefe diffundens

rubentibus: semine sub folijs rotundo, ceu pepli, feruente gustu: radice tenui, singulari ac superuacua. Colligi, reponi, darique vti peplus, itidémque condiri solet: ac eadem quoque vires habet.

De Chamæsyce. Cap. CLXX.

CHAMÆSYCE, quá aliqui Sycen nominant, ramos emittit quaternûm digitorum, per terram stratos, teretes, lactei succi plenos: folia lętis figura, peplo similia, parua, tenuia ac terrę inhærentia: semé sub folijs rotundum, ceu pepli: radicem tenué ac superuacuam: sed neque florem, neque caulem promit. Rami ex vino triti & in pesso apposiți, vuluę dolores sedant: œdemata verò, pęsiles verrucas & myrmecias illiti tollunt. Elixi autem si comedantur, aluum soluũt. Sed & eorundem succus simili effectu prodest: prætereaq; illitus, aduersus scorpionis ictum auxiliatur. Valet & cõtra oculorum hebetem aciem, itemq; caliginé, incipientes suffusiones, cicatrices ac nubeculas, cũ melle inunctus. Cæterùm in petrosis aridisque nascitur.

De Scammonia. Cap. CLXXI.

SCAMMONIA ramos ab vna radice multos profert, ternûm cubitorum, pingues & quadantenus hirsutos: folijs itidé hirsutis, helxinę (cissampeli) aut hederæ similib⁹, sed mollioribus ac triangulis: floribus albis, rotundis, in modum calathorum concauis & graueolẽtibus: radice prælonga, crassitudine brachiali, candida & grauis odoris, lacteiq; succi plena, qui quidé legitur hunc in modũ: capite exempto radix ita cultro incauatur, vt excauatio sensim à latiore orbe in acutum desinat, proindéq; in id cauũ confluit succus, qui conchis demum excipitur. Alij postquam scrobes in terra concamerato sinu effoderunt, iuglandum folia insternunt, in quæ radicis incisæ succus diffundatur, eúmq; inibi siccatũ tandé auferunt. Bonitate præstat qui pellucidus est ac leuis, rarus & colore glutini taurino similis, rimulis fistulisve tenuibus, atque fungosus, qualis scilicet ex Mysia regione Asiæ

A σεσηθὲς· καὶ ὁ καρπὸς δὲ στρογγύλος ὑποκάτω τῶν φύλλων, ὡς καὶ τὸ πέπλου, πυρωδης τῇ γεύσει. ῥίζα λεπτὴ, μία, ἄχρηστος. συλλέγεται δὲ καὶ ἀποξήραται, καὶ δίδοται ὡς καὶ ὁ πέπλος, καὶ παραχέεται. Δυναμιν δὲ ἔχει τὴν αὐτήν.

Quidam manuscriptus addit, πλὴν ἀμυτικὴν.

Περὶ Χαμαισύκης. Κεφ. ρό.

B ΧΑΜΑΙΣΥΚΗΝ, οἱ δὲ, συκὴν καλοῦσι, κλάδους ἀμίσχοντα τετραδακτύλους, ἐπὶ γῆς ἐρριμμένους, παχυφεῖς, ὑπὸ μεσοῦ φύλλα φακοειδῆ, τῷ πέπλῳ ὅμοια, μικρὰ, λεπτὰ, πρὸς τῇ γῇ καρπὸς δὲ ὑπὸ τοῖς φύλλοις στρογγύλος, ὡς πέπλου· ὕπτι δὲ ἄνθος, οὔτε καυλὸν ἔχει· ῥίζαν λεπτὴν καὶ

C ἄχρηστον. Δυναμιν δὲ ἔχουσιν αἱ κλῶνες λειανθέντες σὺν οἴνῳ, τοῖς τε μήτρης ὀδυνῶσι παιόν, ἁλὶ πεσσοῦ τε προσφυόντες· καταπλασσόμενοι δὲ, αἰδήματα καὶ ἀκροχορδόνας καὶ μυρμηκίας αἴρουσιν· ἑφθοὶ δὲ ἐσθιόμενοι, χειλίασιν ἐκλύουσι. καὶ ὁ ἐξ αὐτῶν δὲ ὀπὸς τὰ αὐτὰ δρᾷ. καὶ καταχριόμενος, σκορπίου πληγῇ βοηθεῖ· ἀρμόζει καὶ πρὸς ἀμβλυωπίας καὶ ἀχλυὰ, καὶ

D ἀρχομένας ὑποχύσεις, οὐλὰς, νεφέλια, σὺν μέλιτι ἐγχριόμενος. φύεται δὲ πετρώδεσι καὶ αὐχμηροῖς τόποις.

Περὶ Σκαμμωνίας. Κεφ. ρόά.

ΣΚΑΜΜΩΝΙΑ κλῶνας ἀμίσχοντα πολ- Orib. κλῶνας ἐκ τοῦ ἀμίσχ.

E λοὺς, ἀπὸ μιᾶς ῥίζης τετραπήχεις, λιπτοὺς, ἐμφαίνοντάς τι δασύτητος· καὶ τὰ φύλλα δὲ δασέα, ὅμοια ἑλίκῃ ἢ κισσῷ, μαλακώτερα μέν τι καὶ τετανοφυῆ δὲ αἴθῃ λευκὴ, παχυφεῖ, χεῖλος ὡς Ⓓ κάλαζοι, καρύοσμα· ῥίζα δὲ θύμβρης, παχεῖα ὅσον βραχίων, λευκὴ, καρύοσμος, ὑπὸ μέσῃ. Συλλέγεται δὲ ὁ ὀπὸς, τῆς κεφαλῆς ἀπὸ τῆς ῥίζης ἀφαιρουμένης, καὶ ὁλοφδῶς

F τιτανοειδῶς εἰς κοιλότητα. συῤῥεῖ γὰρ εἰς αὐτὴν ὁ ὀπὸς, καὶ οὕτως αὐαλαμβάνεται εἰς μύαχας. ἔστι δὲ τὴν ὀρύζαντες ὁλοφδῶς, καρύας φύλλα ὑποθέντες, καταχέασι τὸν ὀπὸν, καὶ οὕτω ξηραθέντα αὐαιροῦνται. ἔστι δὲ καλὸς ὁ διαυγὴς καὶ κοῦφος, ἀραιὸς, ταυροκολλώδης τὴν χρόαν, σπαργανας ἔχων λεπτὰς, σφογγώδης. τοιοῦτος δέ

G ἐστιν ὁ ἐκ Μυσίας τῆς κατὰ τὴν Ἀσίαν

V. add. ἐ περιπήχ. sic & Orib.

V. quidã καλαμίνθη. Orib. Καμμίνθη

V. ἀπὸ τῆς

Add. Lacunæ ex v. codd. ἐν τὴν ῥίζαν ἀπέντες ὁλοφδῶς Orib. Sunt codd. l. mutatis instar.

V. ῥοιά.

V. ἔχουσι ἴσον καπάδνι.

Forte σπογγώδης

κνημζόμδμος. μὴ ποιοῦσι δὲ μόνον τῷ λθυκαίνεσθαι αὐτὸν κὶ τῷ τῆς γλώττης θίξει, (τοῦτο γὰρ γίνεται καὶ τοῦ θυμάλου μιγθέντος αὐτῷ ὀποῦ θυμάλου.) μᾶλλον δὲ τῶν προφημθέντων. καὶ ἐὰν μὴ λίαν σφοδρῶς τῷ γλώσσῃ, ὅπερ γίνεται τῷ θυμάλου μιγθέντος. ὁ δὲ Συρίαξ καὶ ὁ ἐκ Ιουδαίας θρυπτόμδμος, χλιδῶσι, βαρεῖς, πυκνοὶ, δολούμδμοι τῷ θυμάλῳ καὶ ὀρόβίνῳ ἀλεύρῳ. Δοῦναι δὲ ἔχει ὁ ὀπὸς λαφθεὶς σὺν μελικράτῳ ἢ ὕδατι πλῆθος < ἢ τετραδράχμου, καθαίρει κάτω χολὴν ἐ φλέγμα· εἰς δὲ τὸ λύσαι τῷ κοιλίᾳ, ὀροβόσοισιν ὀβολοὶ β'. μετὰ σησάμου ἢ λίνου ἄλλου σπέρματος λαμβανόμδμοι. δίδοται καὶ ποὸς ἐπεργεσίαν καθάρσεως τῶν μδν ὀποῦ τριώβολον, ἑλλεβόρου δὲ μέλανος ὀβολοὶ β'. καὶ ἀλόης < ά. σκυβάζονται δὲ ἐν ἄλες καθαρικοὶ, ποὸς κυάθους ς'. τῶν ἁλῶν, ὀλκῶν κ'. τῆς σκαμμωνίας τῆς ὀποῦ μιγνυμδίου. λαμβάνεται δὲ ποὸς δύναμιν ὃ μδν τέλειον, τρία κοχλιάρια· μέσον δὲ, β'· ὃ δὲ ἐλάχιστον, ά. καθαίρει δὲ καὶ τῆς ῥίζης < ά. ἢ β'. σὺν οἷς εἴρηται. ἔνιοι δὲ ἀφέψοντες αὐτὸν, πίνουσι. σὺν ψηλωθεῖσα δὲ ὄξει καὶ λεανθεῖσα μετὰ ἀλεύρου κριθίνου, ἰχαδικῶν ἕξι καταπλασμα. ὁ δὲ ὀπὸς προσιθέμδμος εἰς ἐλαίῳ τῇ μήτρᾳ, ἔμβρυα φθείρει· διαφορεῖ δὲ καὶ φύματα, σὺν μέλιτι ἢ ἐλαίῳ καταχριόμενος· ἐφθεὶς δὲ εἰς ὄξει καὶ καταχρισθεὶς, λέπρας ἐξαίρει· κεφαλαλγίας τε χρονίας ἐστὶν ἀπόβρεγμα σὺν ὄξει καὶ ῥοδίνῳ.

Lac. legit in vet. cod. χαίδω

Lac. legit ex v. cod μ' σησάμου, i. μίαν aut τετραδράχμου λαμβανόμδμοι.

Goup. in altero cod. ἁλὸς, sed vulgatam lectionem melioremdenſet.

Περὶ Χαμελαίας. Κεφ. ροβ'.

ΧΑΜΕΛΑΙΑ, ἣν δὲ, πυρὸς ἄχνη ἢ ἄκανθος, οἱ δὲ, κόκκος Κνίδιος· κλῶνας μὲν ἔχει παθαμιαίους· ὁ δὲ γάμμος φρυγανώδης· φύλλα ἔχει ἐλαίας παραπλήσια, λεπτότερα δὲ καὶ πυκνὰ, καὶ τραχέα, δάκνοντα τὴν γεῦσιν, καὶ χαράττοντα τὴν ἀρτηρίαν. Τούτου τὰ φύλλα κάτω καθαίρει φλέγμα ἐ χολὴν, μάλιστα ἐν κεφαλαλγίᾳ λαμβανόμδμα· μιγνυμένου δὲ πλησίον ἀψινθίου ἐπὶ μέρους τὸ χαμελαίας. εἶτα λαμβανέσθω ἢ ὕδατι ἢ μέλιτι εἰς κυάθους

deportatur. Neq; verò in probatione animaduertere ſolum par eſt, vtrũ linguæ tactu albeſcat: (hoc enim euenit etiam admiſto tithymali ſucco) ſed longè magis anteà commemoratis attendendum eſt: itemq; ſi non vehementer linguam excalfaciat exurátve: id quod & miſti tithymali argumentum eſt. Natione autẽ Syriacus & Iudaicus deterrimi habẽtur, graues, denſi, erui farina & tithymalo adulterati. Succus drachmæ vnius aut quaternũm obolorũ pondere hauſtus ex aqua pura aut mulſa, per inferna bilem pituitámque extrahit. Soluendæ alui gratia, binos obolos cum ſeſama alióve ſemine ſumpſiſſe ſat eſt. Efficacioris etiam purgationis cauſa dantur ſucci tres oboli, cum veratri nigri duobus, & aloës drachma vna. Fiunt & purgatorij ſales, drachmis viginti ſucci ſcammoniæ in ſenos ſalis cyathos adiectis. Horum modus proportione virium: integer quidẽ, cochlearia tria: medius, duo: minimus, vnum. Purgat & radicis drachma vna aut altera cum iis quę retulimus. Ipſius quoque decoctum nonnulli ebibunt. Ex cadẽ decocta in aceto cõtritáque cũ hordeacea farina, cataplaſma fit iſchiadicis vtile. Succus autẽ vuluę appoſitus in lana, partus enecat: tubercula quoq; diſcutit, cũ melle oleóve perũctus. Eodẽ decocto in aceto illitę leprę auferuntur. Sed & eodem caput contra diuturnum dolorem ex aceto & roſaceo irrigatur.

Pl. vegetur

De Chamelæa. Cap. CLXXII.

CHAMELÆA, quã alij pyros achnen ſeu acneſton, alij coccon Cnidion appellant, frutex eſt è cremiorum genere, ramis dodrantalibus, foliis oleæ ſimilitudinem habentibus, at tenuioribus, denſis & amaris, quæ guſtata linguam mordent & arteriam abradunt. Huius folia per inferna pituitam bilémque detrahunt, maximéque ſi in catapotio aſſumantur. Vni ſiquidem chamelææ parti duplum abſinthij aduciturr, ex hiſque aqua aut melle exceptis catapotia fingũtur:

Al. διαφορεῖται

& ea

& ea quidem in ventre non liquescunt conficiuntúrve: sed prout deuorata fuerint, ità per aluum egeruntur. Cæterùm folijs tritis melléque exceptis vlcera sordida crustosaque purgantur.

De Thymelæa. Cap. CLXXIII.

ETHYMELÆA, quam aliqui chamelæá, alij pyrosachnen seu cneôron aut cneoron vocant, granum Gnidium, quod ipsius semẽ est, colligitur. Hoc EVboenses Ætolium, Syri Apolinum, alij Linum vocant, quoniam frutex suapte natura sartiui lini similitudinem referat. Virgas edit speciosas, numerosas, tenues, ac fermè binûm cubitorum altitudine: folijs chamelææ, sed angustioribus & pinguioribus, quæ inter mandendum quadantenus viscosa & glutinosa percipiuntur: floribus candidis, ac inter ipsos fructu ceu myrti paruo, rotundo, inter initia quidem viridi, tandem verò rubente: cuius inuolucrum durum ac nigrum est, medulla autem alba. Per inferna bilem, pituitam aquasque detrahit viginti granorum pars hæc interna bibita, verùm fauces adurit: atque ideò cum farina polentáve, aut in vuæ acino dari debet, aut cocto melle obducta deuorari. Quibus autem ægrè sudores eliciuntur, eadem trita cum nitro & aceto inungitur. At folia, quæ peculiariter Cneoron appellantur, per messes colligi debent, & siccata in vmbra recondi. Sed si cui exhibere placet, prius ea tundere, ac ipsorum quoque fibras eximere conuenit. Vino diluto insperſa, acetabuli modò aquosa detrahunt: sed moderatiùs purgant, admista lenti cocta & contritis oleribus. Eadem trita vuæ acerbæ succo excipiuntur, & in pastillos coacta reponuntur. Herba stomacho infesta: partus subdita necat. Nascitur in montosis & asperis. Hallucinantur porrò qui granum Gnidium Chamelææ fructum esse existimant, decepti quadam foliorum similitudine.

De Sambuco. Cap. CLXXIIII.

SAMBVCI duo genera: ac vnum quidẽ in arboré assurgit, surculos spargés arũdinaceos, teretes, quadá tenus cauos, cádicátes, prælõgos: folia terna quaternáve ex interuallis

A ἔστι δ' αὐτῆς τὰ ὀξέα διαχωρητικὰ δὲ ὅσα λαμβάνεται. αἱ δὲ λαμβανόμεναι λεῖα τὰ φύλλα μὴ μέλιτος, αἱ δὲ καθαρὰ τὰ ῥυπτικὰ ἕλκη καὶ ἐκφορικώτατα. Aldus & Basileenses. V. διαχωρητικὰ δὲ λαμβ.

Περὶ Θυμελαίας. Κεφ. ροη'.

B ΘΥΜΕΛΑΙΑ, οἱ δὲ, χαμέλαια, οἱ δὲ, πυρὸς ἄχνη, ἢ κνέωρον ἢ κνέωρα καλοῦσιν. ἐκ ταύτης ὁ Κνίδιος κόκκος καρπὸς ὢν συλλέγεται. ἔν τε Ἕλλεσι μὲν Αἰτώλιον· Σύροι δὲ Ἀπόλινον καλοῦσιν, οἱ δὲ, Λῖνον, ἀφ' ὃ τὸ εἶναι τῷ σπάρτῳ λίνῳ ὁμοίαν τῇ φύσει παρέχεται. ῥάβδους δὲ ἀνίησι καλὰς καὶ πολλὰς, λεπτὰς, ὅσον δὲ πήχεως· τὰ δὲ φύλλα χαμελαίᾳ ὅμοια, πλὴν ἐλάττονα C καὶ λιπαρώτερα, ὑπογλίσχρα διὰ τὸ δάκνεσθαι, ἢ χολώδη· αἷθη λευκὰ καὶ μυξώδη· ἀπὸ δὲ καρπὸς, ὡς μύρτου μικροῦ, στρογγύλος, ἐν ἀρχῇ μὲν χλωρὸς, αὖθις δὲ ἐρυθρὸς· τὸ δὲ ἐκφέρεται καλεῖται μέλαν, τὸ δ' ἔνδον, λευκόν. ὅσαν καθαίρει κάτω χολὴν καὶ D φλέγμα καὶ ὕδωρ, ὅσον κ'. κόκκων τὸ ἔνδον τοῦ ἐκτὸς πολύ· καὶ διὰ τοῦτο φάρυγγα. διὸ μὴ ἀλεύρου ἢ ἀλφίτου δοτέον, ἢ ἐν ῥαγὶ σταφυλῆς, ἢ μέλιτι ἐφθῷ ἐκκλυσμένον καὶ πεπανθέν. συλλέγειν δὲ καὶ ταῦτα δυσίδρως, λεῖον μὴ πίνων καὶ ὄξος. τὰ δὲ φύλλα, ἂν ἰδίως καλῶσι τινὲς, συλλέγειν δεῖ ἐν τῷ πυρομανεῖν, καὶ ἀποβάλλεσθαι ξηραίνεται ἐν σκιᾷ. διδόασι δὲ δραχμὴν, καὶ ἀφαιροῦσι τὸ αὐτῶν ἕλκος. καθαίρει δὲ βάτραχον πλατύτερον ὅσον ὀξυβάφου πλῆθος μετ' ἀλφίτων, ἄγαν ὑδατώδης· μετριωτέραν δὲ πιεῖν τὸν καθαρὸν μυελὸν, ἐφθὸν φακῇ καὶ λαχάνοις τεθειμένοις. ἀποπνίγει δὲ λεῖα αἰελυφίζοντα ὄμφακος χυλῷ εἰς ἔρπησις. ἔστι δὲ κακοσύμφορος ἢ βοτάνη· φορὸς τιθῆσα δὲ, ἔμβρυα κτείνει. φύεται δὲ ὀρεινοῖς καὶ τραχέσι τόποις. Πλανῶνται δὲ νομίζοντες τὸν Κνίδιον κόκκον τὴν χαμελαίας εἶναι καρπὸν, ἀπατώμενοι διὰ τὸ τὰ φύλλα ὁμοιοῦσθαι. Περὶ Ἀκτῆς. Κεφ. ροθ'.

ΑΚΤΗ διαφέρει μὲν γάρ τις ἐστὶ δενδρώδης, κλάδους καλαμοειδεῖς ἔχουσα, στρογγύλους, ὑποκοίλους, ὑπολεύκους, βύμικας δὲ τὰ φύλλα· ἢ δ'. ἐκ διαστημάτων

Aldus & Basileenses. Hic historia vacat.

Hanc vocem addit v. cod.

Sunt qui legant Βλητωνόμενοι. Plerique πλανώμενοι videntur legisse.

V. Iouemalore Alcuma d'ἐκ ibi

περὶ τὴν ῥάδδον, καρυᾷ βασιλικῇ ὅμοια, βαρύοσμά τε καὶ τερπνότερα· ἐπ' ἄκρων δὲ τῶν κλάδων ἢ τῶν καυλῶν, σκιάδας περιφερῆ, ἔχοντα αἰθρηλευκὰ καρπὸν δὲ ἐοικότα τερμίνθῳ, ὑπὸ μὲν πρῶτον ὑποπόρφυρον, βοτρυώδη, πολύχυλον, οἰνώδη.

Lac. ex v. c. Βαρύοσμα δὲ καὶ τερπνότερα. Cat. τερπνότερα. Oc. μακρότερα.

Al. τερμίνθῳ & v. καρύοις. V. βοτρυοειδῆ. V. addit καὶ ὅλως αἰθριλευκὸν καὶ ραμνοειδῆ.

A circa virgas singulas exeunt, nucis iuglandis foliorũ similitudine, grauolentia, magisque incisa: in summis autem surculis cauliculisve umbellæ sunt circinatæ rotunditatis, in quibus flores candidi, tandémque fructus terebinthino similis, ex nigro purpurascens, racemosus, succosus, vinosúsque.

Περὶ Χαμαιάκτης. Κεφ. ροέ.

Τὸ δὲ ἕτερον αὐτῆς, χαμαιάκτη καλοῦσιν· αὕτη χαμαιπετὴς ὅλη, ἐλάσσων ἐστὶ καὶ βοτρυωδεστέρα, καυλὸν ἔχουσα τετράγωνον καὶ πολυγόνατον· τὰ δὲ φύλλα ὅμοια δρακοντίων, ἕκαστον γόνυ τετραφύλλα, ὅμοια ἀμυγδαλῇ, κεχαραγμένα περὶ κύκλῳ τὰ μακρότερα, βαρύοσμα· σκιάδιον ἐπ' ἄκρῳ ὅμοιον τῇ περὶ αὐτῆς ἔχουσα, καὶ αὖθις καὶ καρπόν· ῥίζα δ' ὑπέστι μακρά, δακτύλου πάχος. Δύναμις δ' ἡ αὐτὴ ἀμφοτέρως καὶ ζέουσα, ξηραντική, ὑδραγωγός, καχεκτικὴ μάλιστα· ἐφέλκεται δὲ καὶ τὰ φύλλα ὡς λάχανα, καθαίρει φλέγμα καὶ χολήν. καὶ ⓐ καυλοὶ δ' ἁπαλοὶ σὺν λοπάδι ἑφθέντες, τὰ αὐτὰ ποιοῦσιν. ἡ ῥίζα δ' αὐτῆς ἀφεψηθεῖσα σὺν οἴνῳ καὶ διδομένη πρὸς τὴν διαιτὴν, ὑδρωπικοὺς ὠφελεῖ· βοηθεῖ δὲ καὶ ὄφεσι δηχθεῖσι ὁμοίως πινομένη· ἀφεψηθεῖσα δὲ μετ' ὕδατος εἰς ἐγκάθισμα, μαλάσσει ὑστέραν καὶ αἰδοῖα, καὶ διορθοῦται πρὸς αὐτὴν διαχεόμενος· ὁ δὲ καρπὸς δ' σὺν οἴνῳ πινόμενος, τὰ αὐτὰ ποιεῖ· μαγεῖρα δ' καὶ πέτρας ἐγχριόμενος· τὰ δὲ φύλλα πεφθέντα καὶ ἁπαλά, φλεγμονὰς πεφυκυίας μετ' ἀλφίτων καταπλασσόμενα· ἕλκεσι δὲ καὶ ἀπορρυσιν ἀρμόζει καὶ κυνοδήκτοις, καταπλασσόμενα. καλλᾶ δ' ὑποφορὰς, καὶ ποδαγρικοῖς βοηθεῖ, μετὰ τέλους ταυρείου ἢ τραγείου καταπλασσόμενα.

Addit. alias, ὧν πρώτη,

Lacuna add. ex v. cod. καὶ ἐκθύμασι.

Ald. λοπάδι ὀπτὰς

V. ἀφίας

B *De Chamæacte, seu humili sambuco. Cap. CLXXV.*

Alterum genus Ebulus, Græcis Chamæacte vocatur, idque humile ac longè breuius, & ad genus herbaceũ propiùs accedens, caule quadrangulo, crebris distincto geniculis: foliis per interualla circa singula genicula vtrinque expansis, iisque amygdalinis, at in ambitu serratis, longioribúsque & graui odore: in cacumine verò vmbella, flore ac fructu sambuci: radice nititur lõga, crassitudine digitali. Eadem vtrique vis & vsus, exiccans nimirum & aquas aluo detrahens: at stomachum offendunt. Folia olerum more cocta, C pituitam bilémque purgant. Sed & caules teneri in patinis cocti, eadẽ præstant. Radix in vino decocta & in cibis data, hydropicos adiuuat. Prodest & contra viperarum morsus, eodem pota modo. Decocta verò ex aqua ad insessum, vuluam emollit, eiúsque spiracula patefacit, ac ipsius denique vitia emendat. Acini in vino poti, eundem præbent D effectum: denigrant & capillos inuncti. At folia recentia molliáque illita ex polenta, inflámationes mitigant: ambustis & canum morsibus illitu prosunt. Vlcera verò sinuosa glutinant, & iis qui podagra tentantur cum seuo taurino aut hircino illita prosunt.

Περὶ Πυκνοκόμου. Κεφ. ροϛ'.

Πυκνοκομον φύλλα ἔχει ὅμοια βήσσῃ, τραχέα δὲ καὶ παχέα καὶ δριμύτερα· καυλὸν τετράγωνον αἶγος ἢ τῶν ὠκίμου ἐμφερῆ· καρπὸν ἢ, ὡς ὥρα σίν· ῥίζαν μέλαιναν, στρογγύλην, ὠχρᾶν, ὡς μικρὸν μῆλον, γλώσσῃ ὄζουσαν· φύεται δὲ πετρώδεσι τόποις. Δύναμιν δ' ἔχει ὁ καρπὸς πολεῖς ὅσον ⊂ ἀπλοῦς, τραχηλώδη δ' διὰ σύστασιν ποιεῖ διαφορᾶς τε καὶ οἰδήματα ὅτι πλατόμους σὺν ὀξυκράτῳ, καὶ ἀκίδας

Lac. ex v. c. ἀφέψου. Sic etiam Oribas. Al. μαγεῖρα,

V. πυκνὰ

F *De Pycnocomo. Cap. CLXXVI.*

Pycnocomon folia habet erucæ, sed aspera, crassa, acrioráque: caulẽ quadrangulũ, florẽ ocimi: semẽ marrubij: radicẽ nigrã, rotundã (intus) pallidam, exigui mali figura, terrã olentẽ. Nascitur in saxosis locis. Semen tumultuosa grauiaq; somnia facit, vna drachma potũ. Discutit & œdemata, impositũ cum polenta: necnon & spicula & adactos

Lac. ex v. c. ἀπλοῦς

corpori aculeos extrahit. Impoſita quoque folia, tubercula furunculóſque diſcutiunt. Cæterùm radix eius in aqua mulſa drachmarum duarũ pondere, aluum ſoluit & bilem exinanit.

De Apio. Cap. CLXXVII.

APIOS, aliis iſchas, aliis chamæbalanos, aliis montanus aut ſylueſtris raphanus, aliis denique linozoſtis, ramulos duos ſiue tres in terra ſpargit, iunceos, tenues, rubentes & paululum à terra ſeſe attollentes, foliis rutæ, oblongioribus tamen & anguſtioribus, herbaceis: ſemine paruo: radice haſtulæ regiæ & ad pyri formam accedente, rotundiore tamen, lacteíque ſucci plena, cortice extra quidem nigro, intus verò candido. Superior pars eius aſſumpta, vomitione bilem pituitámque extrahit, inferior, per aluum. Tota verò ſumpta, vtraque parte purgat. Liquorem ſi libet excipere, radices tundito, & crateri aquæ inditas agitato, ac liquorem qui ſupernatat penna collectum exiccato. Huius ſeſquiobolus potus, per ſuperna infernáque purgat.

De Colocynthide. Cap. CLXXVIII.

COLOCYNTHIS, aliis cucurbita ſylueſtris, aliis amara cucurbitula, aliis cucurbita Alexandrina, ſarmenta foliáque emittit per terram ſtrata, ſatiui cucumeris ſimilia, inciſuris diuiſa: fructum verò rotundum, mediocris pilæ ſimilitudine, vehementer amarum: quem legere oportet, cùm cœperit ad pallidiorem colorem vergere. Fructus medulla purgandi vim habet, ſi eius quatuor oboli ex aqua mulſa ſumantur: vel additis nitro & myrrha melle decocto excipiantur & in pilulas cogantur. Ipſæ verò pilæ arefactæ teruntur, & vtiliter infunduntur clyſteribus ad coxendicum dolorem, paralyſin & coli vitia: vt quæ pituitam, bilem, ſtrigmentáque, interdum etiam cruéta eliciant. Subditæ eædem, fœtus enecant. Quòd ſi quis vná exépta medulla obducat luto,

Περὶ Ἀπίου. Κεφ. ροζ'.

ΑΠΙΟΣ, οἱ δὲ, *ἰσχάδα. οἱ δ', *χαμαιβάλανος, ὀρεινὴ ἢ ἀγρία, ἡ δὲ, λινοζωστις, κλωνία δύο ἢ τρία ἀπὸ γῆς ἀίσσει, σχοινώδη, λεπτὰ, *ἐρυθρὰ, μικρὸν ὑπὲρ τῆς γῆς αἴροντα· φύλλα πηγάνῳ *ἐοικότα, ὀλιγοστίχοις μᾶλλον καὶ στενώτερα, *χλωρὰ· καρπὸς μικρός. ῥίζα *ἀσφοδίλῳ παραπλησία, καὶ τοσὸς τὸ τῆς ἀπίου χρῶμα, χροιᾷ λευκοτέρα δ', μᾶλλον ὀπώδης, *φλοιὸν ἔχουσα ἔξωθεν μέλαινα, ἔνδοθεν δὲ, λευκόν. Ταύτης τὸ μὲν *ἔνδοθεν μέρος τῆς ῥίζης ληφθὲν, δι' ἐμέτων ἄγει χολὴν καὶ φλέγμα· ὃ δὲ τοσὸς τῇ ῥίζῃ, κάτω καθαίρει· ὅλη δὲ ληφθεῖσα, ἀμφοτέρως ἄγει καθαρούς κινεῖ. ὀπίσας δὲ βυληθεὶς, κόπτεις τὰς ῥίζας, καὶ βαλὼν εἰς κρατῆρα ὕδατος, σεισάτω, καὶ ἐφισάμενον ὀπὸν τοῦ ἱερᾶ ἁλὸς λέγων, *ξήραινε. τούτου τρία ἡμιωβόλια πινόμενα, ἄγει καὶ κάτω καθαίρει.

Περὶ Κολοκυνθίδος. Κεφ. ροη'.

ΚΟΛΟΚΥΝΘΙΣ, ἡ δὲ, κολόκυνθα ἀγρὶς, ἡ δὲ, σικύα πικρὰ, ἡ δὲ, κολόκυνθα Ἀλεξανδρίνη, κλήματα καὶ φύλλα ἐρπύοντα ὑπὸ τῆς γῆς ἀίσσοντα, ὅμοια τοῖς τοῦ ἡμέρου σικύου, ἐπεσχισμένα· καρπὸν δὲ φέρει, ὅμοιον σφαίρᾳ μέσῃ, πικρὸν ἰσχυρῶς· οὗ δεῖ σπεύδειν, ἀρχόμενον μεταβάλλειν ὑπὸ τὸ ὠχρότερον. Δύναμιν δ' ἔχει ἡ μὲν σαρκὸς τοῦ καρποῦ καθαρτικὴν, *τριῶβόλου πλῆθος μετ' ὑδρομέλιτος λαμβανομένη· σὺν νίτρῳ καὶ σμύρνῃ καὶ μέλιτι ἐφθῷ εἰς καθαπόσιον. αὐτὰ δ' αἱ σφαῖραι ξηραθεῖσαι, ἀφελίμως μίγνυνται κλύσμασι ὑπὸ ἰσχιαδικοῦ, καὶ *πλευριτικοῦ, καὶ κωλικοῦ, ἄγουσαι φλέγμα καὶ χολὴν καὶ ξύσματα, ἐφ' ὅτῳ δ' ὑπὸ αἱμορροΐδες· ἔμβρυά τε φθείρουσι σφο-

σι. ῥίμμα· ὀδόντα λιχὰς τὸ ἀφεψημένον, ἐάν τις ἐκκαθάρας αὐτὴν ἐνθεὶς πλάσας πηλῷ,

A καὶ σκόλοπας ἐξάγει. καὶ τὰ φύλλα δὲ καταπλασθέντα, φύματα καὶ ὀδηλιῶσας διαφορεῖ. ἡ δὲ ῥίζα αὐτῆς, λυπρὰ καὶ χολίας ἐκ τριβικὴ χολῆς, δίδοται < β'. σὺν μελικράτῳ.

Forte. οἱ δὲ καὶ φασι εἶναι

Al ἰρδὸ

Cæt. addit ἀχλὺν

V. carere Al σπυρίδιλῳ seu σπυρίλλιφ.

V φλοιὸν ἔχουσαν ἔξωθεν μέλαιναν

Al. αὐτὴν

Byz. ξηλ. al ξῆνον

Corn. ἀχρίον γεγεσθαι imperatur.

V. σωὶ ὑγρῷ

Al πεπλασμένα

V. τριτῶν καὶ σὺν τοῖς ἄλλοις ἀγ.

V. caret. σταπτίζεσας τὶ * ὸ ὄξει ἓ νίτρῳ, οὗ ἕψε- A
κλύζεαθαι· εἰ δέ τις σταφεψήσας μελί-
κρατι ἢ καὶ γλυκεῖ, καὶ ἄξαι θριάσας δῶ
πιεῖν, καθαίρει πάχος καὶ ἰούσμα· ἔστι δὲ κακο-
στόμαχος λίαν· πορεύεται δὲ ἓ βάλανος
ἐξ αὐτῆς, πρὸς κοιλίαν τὴν πρόπωμά-
των. καὶ χλωρᾶς δὲ αὐτῆς ὁ χυλὸς, ὅτι
ἰσχαδικῶν αἱ ατελεύθμους ἁρμόζει. B

Περὶ Ἐπιθύμου. Κεφ. ροθ'.

V. αἶδος θύμου σκληροῦ καὶ ΕΠΙΘΥΜΟΝ θύμου ἐστὶν αἶδος τῦ σκληροτέρου καὶ θυμβρᾳ ἐοικότος. ἔχει
V. caret. δὲ κεφάλια λεπτὰ, κῦφα, * ὑπέρχρυσ· ἔχον-
τα ὡς τρίχας. Πινόμενον δὲ σὺν μέλιτι,
κάτω καθαίρει φλέγμα καὶ χολὴν μέ-
λαιναν. ἰδίως ἁρμόζει ὅτι μελαγχολι- C
κοῖς ἐμπνευματουμένοις, ὀξυβάφου πλῆ
θος πρὸς ὁλκὴν < δ'. σὺν μέλιτι καὶ ἅλατι,
καὶ ὀλίγῳ ὄξει. γίνεται δὲ πλεῖστον ἐν Κα
ππαδοκίᾳ καὶ Παμφυλίᾳ.

Περὶ Ἀλύπου. Κεφ. ρπ'.

Ald. σταφυλοκαρ- φος. ΑΛΥΠΟΝ φρυγανώδες ἐστὶ πόα, ὑπόρ- D
ρυθρος, λεπτόκαρφος, λεπτόφυλλος,
αὐθοις μαλακοῦ καὶ κούφου μεσῆ ὡς * ῥί-
ζα τεύτλου λεπτὴ, μεσὴ ὁποῦ δριμέος·
σπέρμα ὡς ὑπερθύμου γίνεται δὲ ἐν τόπ-
ποις ἀθαλασσίοις, μάλιστα δὲ ἐν τῆς
Λιβύης τόποις πλεῖστον, καὶ ὄρεσι δὲ χωρίοις
πλείστη. Καθαίρει δὲ τὸ σπέρμα μέλαιναν
Orib. πλείστη. recte. χολὴν κάτω, λαμβανόμενον * τὸ ἴσον πλῆ B
θος μετ' ἄλλων τῶν ὑπερθύμων καὶ ὄξει· τὰ δὲ
ἔντερα ἐλαφρῶς ἕλκοι.

Περὶ Ἐμπέτρου. Κεφ. ρπά.

Empetri caput in quibusdam deest exemplaribus. ΕΜΠΕΤΡΟΝ, οἱ δέ, φακοειδὲς, ἐν παρα-
λίοις καὶ ὀρεινοῖς φύεται, ἁλυκὸν τῇ
γεύσει· ὃ δὲ πρόσγειότερον, πικρότερον.
διδόμενον δὲ ἐν ζωμῷ ἢ ὑδρομέλιτι, κα- F
θαίρει φλέγμα καὶ χολὴν καὶ ὑδατώδη.

Περὶ Κληματίτιδος. Κεφ. ρπβ'.

ΚΛΗΜΑΤΙΤΙΣ κλῆμα αἱμάτινον ὑ-
πέρυθρον, λυγῶδες, φύλλον δριμὺ
λίαν γλυκεῖαν καὶ ἑλκωτικὸν πρόσλιπ-
τεται δὲ τοῖς δένδροις ὡς σμίλαξ. Ταύτης
ὁ καρπὸς λεῖος μὲν ὕδατος ἢ ὑδρομέλιτος G
πολὺς, ἄγει κάτω φλέγμα καὶ χολήν. τὰ
δὲ φύλλα καταπλασθέντα, λέπρας ἀ-
φίστησι. (ἀειχνεῖ) δὲ μετὰ τοῦ λεπιδίου εἰς
βρῶσιν.

in eáque acetum ac nitrum feruefaciat, decocti ius illud dentium doloribus collutione proderit. Sin mulsa aut passum in eadem decoquatur & sub diuo refrigefcat, potu crassum humorem strigmentaque alui detrahet: stomacho tamen supra modum aduersatur. Sed & subdita ex ea balano alui excrementa euocantur. Virentis denique succus prodest coxendicum dolori, si infricetur.

De Epithymo. Cap. CLXXIX.

EPITHYMVM flos est thymi durioris & satureiæ similis: capitula autem habet tenuia ac leuia, caudas spargentia quasi capillaceas. Potum id cum melle, detrahit pituitam bilémque atram per inferna, priuatim vtile melancholicis & inflatis acetabuli mensura ad quatuor drachmas, cũ melle, sale & aceti exiguo. Plurimùm in Cappadocia & Pamphylia gignitur.

De Alypo. Cap. CLXXX.

ALYPVM herba est è cremiorum genere, subrubra, gracilibus surculis, ac tenuibus foliis, flore molli ac leui plena: radice ceu betæ, tenui, acri, lacteo succo referta: semine ceu epithymi. Gignitur in maritimis, maximéque Libyæ, vberrima, quanquam & aliis quoque locis plurimis prouenit. Semen atram bilem per inferna purgat, si pondere epithymo pari, additis aceto & sale, sumatur: verùm interanea leuiter exulcerat.

De Empetro. Cap. CLXXXI.

EMPETRON aliqui phacoides vocant. Nascitur in maritimis & montanis, salso gustu: quod verò propius terræ fuerit, amarius sentitur. Trahit pituitam, bilem & aquam, datum in iure aliquo, aut in hydromelite.

De Clematitide. Cap. CLXXXII.

CLEMATITIS sarmentum emittit subrubrum, & vitilium modo lentum: folium gustatu admodum acre & exulcerãs. Arboribus autem smilacis in modum sese circumuoluit. Semen tritum pituitam bilémq; detrahit, in aqua aut hydromelite potum. At imposita folia, lepras remouent. Cæterum cum lepidio conditur ad cibos.

De Vite Syluestri. Cap. CLXXXIII.

VITIS ſyluestris ſarmenta vitis modo longa emittit, cáque lignoſa, aſpera & rimoſo cortice: folia vero ſolani hortenſis ſimilia, at latiora longioráque: florem capillaceum, muſcoſum: fructum exiguis vuis ſimilem, ac vbi maturitatem aſſecutus eſt, rubentem: rotunda autem eſt acinorum figura. Radix decocta in aqua, potáque in vino aqua marina diluti cyathis duobus, aquoſa ciet: atque ideò hydropicis datur. Vuæ eius tum maculas à ſole contractas, tum & alias omnes expurgant. Cibi verò gratia nouelli ſurculi condiuntur.

De Vite alba. Cap. CLXXXIIII.

VITEM albam aliqui bryoniam, alij ophioſtaphylon, alij chelidonion, alij melothron, ſeu pſilothron, alij archezoſtin, agroſtin aut cedroſtin vocant. Sarmentis, foliis & torrilibus pampinis ſatiuam vitem imitatur: ſed hirſutiora ſunt omnia. Vicinis vero fruticibus implicat ſeſe, illos ſuis clauiculis amplectens: fructum autem gerit racemoſum, ſuluum, quo quidem coria depilantur. Ex ea aſparagi qui prima germinatione exeunt decocti in cibo, aluum & vrinam cient. Folia, fructus & radix vim acrem ſortiuntur: proindéq; Chironiis, gangræna comitatis, phagedænicis, ac denique tibiarum putridis vlceribus efficaciter cum ſale illinuntur. Radix corporis cutem abſtergit & erugat: maculas itidem à ſole contractas, varos, lentigines ac cicatrices nigras emédat cum eruo, terra Chia & fœnogræco. Eodem effectu prodeſt decocta in oleo, dum liqueſcat atq; diſſoluatur. Tollit & ſugillata, & digitorum pterygia coërcet: illita ex vino inflámationes diſcutit, & abſceſſus rumpit: trita quoque & impoſita, infracta oſſa extrahit: ſepticis denique medicamentis apte immiſcetur. Bibitur eadem ad morbum comitialé drachmæ pondere quotidie, anno toto. Prodeſt etiamnum arthritis & vertiginoſis, ſimiliter aſſumpta. Drachmis vero duabus pota, contra viperarum morſus auxiliatur & partus enecat: mentem verò interdum turbat aliquan-

A Περὶ Ἀμπέλου ἀγρίας. Κεφ. ρπγ'.

ΑΜΠΕΛΟΣ ἀγρία κλήματα μέτρια μακρὰ, ὡς ἀμπέλου, ξυλώδη, τραχέα, φλοιορραγοῦντα, φύλλα δ' ὅμοια σρύχνῳ κηπαίῳ, πλατύτερα δὲ καὶ μακρότερα· αὐξάνεται ὡς τείχας βρυωδῆς· καρπὸν δὲ βοτρυώδεις μικροῖς ἔμπαν, ἐρυθρόν· B κόκκοι δ' ἐν αὐτῷ εἰσὶ τρεῖς ἢ τέσσαρες. Ταύτης ἡ ῥίζα ἑψηθεῖσα ἐν οἴνῳ, ἢ μὴ ὕδατος πινομένη τὴν θαλασσαμιθρίων κυάθων β'. ὑδατώδεις καθαίρει δύο· καὶ ὑδρωπικοῖς, οἱ δὲ βότρυες ἐφίλλεις ἀπὸ καθαίρουσι καὶ πρὸς τὰ αὐλοὺς. Ἐπιχρίεται δὲ καὶ οἱ ταύτης C ἀκρέμονες ἐπὶ φυσὶς εἰς βρῶσιν.

Περὶ Ἀμπέλου λευκῆς. Κεφ. ρπδ'.

ΑΜΠΕΛΟΣ λευκὴ, οἱ δὲ, βρυωνίαν, οἱ δὲ, ὀφιοσάφυλον, οἱ δὲ, χελιδόνιον, ἢ μήλωθρον, ἢ ψίλωθρον, ἢ ἀρχέζωστιν, ἢ * ἄγρωστιν, ἢ κέδρωστιν καλοῦσι. Ταύτης τὰ κλήματα καὶ τὰ φύλλα, καὶ οἱ ἔλικες, Forte οἷ D ὅμοια τῇ ἡμέρῳ ἀμπέλῳ, δασύτερα δὲ πόλυ. καὶ ἐμπλέκεται τοῖς παρακειμένοις θάμνοις, ἕλκαμβανομένη τοῖς ἕλιξι· καρπὸν δ' ἔχει βοτρυώδη, πυῤῥόν, ᾧ χλιδῶσι τὰ δέρματα. Ταύτης αἱ ἀπαλαὶ βλάσται ἐν ὕδατι ἑφθαὶ ἐκβλήσουσιν ἔφοδοι ἑαυτοῦ, ὕρησιν καὶ κοιλίας κινοῦσιν τῆς. Δύ- Dragon. addit. ὁ ῥίζα ὁ ἐν ναμα ἐν τοῦ κεφ. E ναται δ' ἔχειν τὰ φύλλα κατὰ κορυφὴν καὶ ἡ ῥίζα ἀφιμᾶσαι. ὀδὰξ δὲ τὴν χρωτίαν, καὶ μαλαγματικὴν ἐν φαγεδαινικὴν ἐν σαπρὰ κτήματα ἕλκεσιν, λεῖα δὲ καὶ καθαρὰ ἀπεργάζεται μῶμα ποιεῖ. ἡ δὲ ῥίζα χρῶνται ῥινᾶσι ἐν τετα- ροῖς ἔφηλις ἀπὸ καθαίρει, ἰούλους, φακοὺς, ὕλας μέλαινας, σὺν ὄξει δὲ ἐπὶ λέπρα ἐν τὰ F λεῖ. καθαιρεθῆσαι δὲ μᾶλλον ἐλαίῳ μίσγεται ῥαθῇ, τοῖς δὲ αὐτὰ ἁρμόζει ἀφὶ δὲ καὶ ὑπώπια, καὶ περύγια τὰ ἐπὶ δακτύλοις συντίλλει. σὺν δὲ οἴνῳ καὶ πεπλασμένη, σχίζας φλεγμονὰς καὶ ἀποστήματα ῥήγνυσιν ἐν ὀδᾷ, λεῖα καὶ πεπλασμένη. ὀπτᾶται τὸ μίγμα δὲ ὀστᾶ δύσπνοια πίνεται δὲ καὶ G τοῖς ὀπτικοῖς ἕλκη ἀ. καθ' ἡμέραν, πρὸς σπασμόν. ὠφελεῖ δὲ καὶ πλήκτους ἐν στομαχικοὺς, ὁμοίως λαμβανομένη. δυσὶν δὲ < ἑλκὴ παθόσα, ἐχεδήκτοις βοηθεῖ, καὶ ἔμβρυα φθείρει· ὑποζεσθὲν δὲ ἐπὶ σ' ἐνίοτε

Add. Ald. hic loco, δι' αὐτῆς

Deeſt in Ald.

Lacuna legi in v cod. aperte

V. addit. φυτὸν δὲ ἔχει ὅμοιον μὲν τῷ κισσῷ τὸν καυκαλὶν τοιοῦτον.

Al. χαίρουσι.

V. αστερ.

V. ειστ.

V. επιπ.

Ald. addit ὧν V. βάτραχον. Theocrit. Schol. Διόσκωρ appellat.

V. add. λίτους

ἀφόνους· * ἡ καὶ ὕδερα κιττὸς πτερώδης, καὶ A
σπερμαῖνα ὑγιφα, ἕμβρυα καὶ δάκτυλα
ὀνομάζεται. καὶ * ἐκλέγεται δὲ μὴ μέλι-
τος δὶ' αὐτῆς, τοῖς πνιγμώδεσι δ' δυσπνοῦ-
σι, καὶ βήσσαις, πλευρίτι ὀδύναις, καὶ
ῥήγμασι καὶ ἀποσπάσμασι δίδοται. καὶ σπλῆ-
να τήκει, τελεοῖλον ἑλκὴ πεθῆται σὺν
ὄξει ἡμέρας λ'. καὶ καταπλάσσεται B
δὲ μὴ σύκου σπεῖς τὰ αὐτὰ χρήσιμος.
ἀφίστησι δὲ καὶ τὰς ἐξανθήσεις, καθαρ-
τικὴν ὑγίειαν ἔχει τὴν ἐκκόλιον. χυλίζε)
δὲ ἡ ῥίζα αὐτῆς ἕλαιος· πίνεται δ' σὺν μι-
λικρίτῳ ὁ χυλὸς σπεῖς τὰ αὐτὰ, ἄγει
φλέγμα. ὁ δὲ καρπὸς πιεὶς σπεῖς ψύξεις
καὶ λύσεις, συλλειόμβους καὶ καταπλασ- C
σόμβους. καταπασθὲν δὲ γάλακτος ὁ καρπὸς
αὐτῆς χυλιωθεὶς, καὶ μὴ πυρῶν ἐψηθέντων
* ῥοφηθείς.

Περὶ Ἀμπέλου μελαίνης. Κεφ. ρπέ.

Ἄμπελος μέλαινα, ⟨Ⓡ⟩ ἧ βρυωνία μέ-
λαινα, οἱ δ' χλωρώνιον ἄμπελον, φύλλα ἔχει
κισσοῦ ὅμοια, μᾶλλον δὲ σπεῖς τὰς σφέ- D
νδαμνους, καὶ οἱ κλῶνες, ⟨μείζονα δ'⟩ τῶν
ἑλλαμβάνει) δὲ ἐν αὐτῇ τὸ δένδρον τῇ
ἕλικι. καρπὸς βοτρυώδης, χλωρὸς κατ'
ὀπώραν, πυρρίζων δὲ μέλας γίνε) ῥίζα
μέλαινα ἔξωθεν, ἔνδοθεν δὲ, πυξοειδής. Καὶ
ταύτης οἱ κλῶνες τῇ πρώτῃ φορᾷ ἐκ-
βλαστάνουσι λαχανώδεις) εἰσὶ δὲ καὶ ὑρητικοὶ E
καὶ καταμήνιοι ἀγωγοὶ, καὶ τὰς ἐπιπό-
νους. ὑπολιποθυμίας, καὶ σκοτωματικὰς, καὶ
τοὺς ἀλυπικοὺς ἀρμόζουσιν. ἔχει δὲ ἡ ῥίζα
δύναμιν ὁμοίαν τῇ λευκῇ, σπεῖς τὰ αὐτὰ
ἁρμόζουσαν, ἧττον μέντοι * ἐνεργεῖ. ποιεῖ
δὲ σπεῖς τοὺς ἀποζυγίους λύσεις, ἐπι-
σθιόντων ἑλκωθῆναι, τὰ φύλλα σὺν οἴνῳ καὶ F
καταπλασσόμενα· καὶ σπεῖς στόματα ὁ-
μοίως ἐπιτίθεται.

Περὶ Πτερίδος. Κεφ. ρπϛ'.

ΠΤΕΡΙΣ, οἱ δὲ, * βλῆχον, οἱ δὲ, πο-
λύῤῥιζον καλοῦσι, φύλλα ἔχει ἄκαν-
θῳ, καὶ αἰσθῇ, ἧ ἄκαρπα ἐξ ἑνὸς μίσχου,
σχεδὸν πῆχυν τὸ μέγεθος, ἐσχισμένα καὶ G
κατακεκομμένα ὡς πτέρυξ, ὑποδυσώδη·
ῥίζαν δὲ ἔχει ἐπὶ πολλοῦ, * μέλαιναν, ὑ-
περμήκη, ἐπιφύσεις ἔχουσαν πολλὰς, ὑποσυφούσας τῇ γλώσσῃ· φύεται δὲ ὀρεινοῖς

tulum. Cit & vrinam epota. Subdita autem vuluæ, partus ſecundáſque morantes trahit. Sed & eclegma ex ea fit cum melle ſtrangulatu oppreſſis, ægrè ſpirantibus atque tuſſientibus, lateruum doloribus, ruptis atque vulſis. Quinetiam ſplenem ternis obolis pota ex aceto tricenis diebus conſumit: necnon & ad eadem cum fico vtiliter illinitur. Ad muliebres inſeſſus decoquitur, qui quidem vuluam purgandi & fœtus enectos eiiciendi vim habent. Succus è radice vere exprimitur, qui ex aqua mulſa potus tum cætera antedicta præſtat, tum & pituitam trahit. Ad pſoras & lepras fructus efficaciter inungitur atque imponitur. Sed & eius ſuccus lactis abundantiam facit, ſi cum tritico cocto ſorbeatur.

De Vite nigra. Cap. CLXXXV.

Nigra vitis, quam aliqui bryoniam nigram, alij Chironiam vitem nominant, folia fert hederæ, ad ſimilacis folia propiùs accedentia, ſed maiora, caules etiam huic ſimiles: ac ipſa quoque vicinas arbores capreolis ſuis amplectitur: fructus racematim cohæret, qui inter principia viret, at poſt maturitatem nigricat: radix foris nigra, intus buxeo colore. Huius etiam cauliculi qui primo germinum parti erumpunt, olerum modo in cibos recipiuntur. Vrinas porrò cient, menſes pellunt, ac lienem minuunt, nec non & comitialibus, vertiginoſis ac neruorum reſolutione tentatis proſunt. Radix iiſdem quibus albæ viribus pollet, eadémque præſtat, ſed inefficaciùs. Folia verò cum vino exulceratis iumentorum ceruicibus efficaciter illinuntur: ac luxatis etiam ſimiliter imponuntur.

De Filice. Cap. CLXXXVI.

FILICI, quam aliqui blechnon, alij polyrrhizon vocant, folia ſine caule, ſine flore, ſine ſemine, eáque ex vno pediculo cubitali fermè longitudine exeunt, inciſa & pinnarum modo vtrinque expaſſa, ſubgraui odore: radicem verò habet per ſumma cæſpitum nigram, quadantenus longam, multas fundentẽ propagines, quæ ſunt ſubadſtringente guſtu. Naſcitur in montanis

saxosisque locis. Huius radix latum lumbricum, quam tæniam vocant, excutit, sumpta drachmis quatuor ex aqua mulsa: melius, si cum scammonij aut ellebori nigri totidem obolis detur: verùm eos qui sumunt alia priùs edisse oportet. Eadem laborantes ex liene efficaciter restituit. Quinetiam cum axungia contrita & imposita, ictis ab arundine efficaciter auxiliatur: cuius rei probatio talis fertur. Perimetur filix quam per ambitum sata copiosior arundo cinxerit, & contrà, extinguetur & euanescet arundo, quam multa filix circundederit.

A καὶ πεφώδεσι τόποις. Ταύτης ἡ ῥίζα ἑλμινθα πλατέας ἐκβαλλόσαι < σὺ ὁλκὴ μὲ μελικράτου λαμβανομένη· βέλτιον ἢ, εἰ μὲ σταμμωνίας ἢ ἑλλεβόρου μέλανος ὀβολῶν τεττάρων δοθείη. δεῖ ἢ προσκορδοφαγῶν τοὺς λαμβάνοντας· ποιεῖ δὲ καὶ πρὸς ἀπεπτασίαν σφυκτῶν. καὶ B μὲ ἀξουγγίου δὲ ἡ ῥίζα τεθεῖσα καὶ καταπλασθεῖσα, ποιεῖ πρὸς τοὺς ἐκτὸς καλάμου πληγὰς· ἡ δὲ δοκιμασία τοιαύτη. ἔνθα τέτταλοι κάλαμοι καὶ πολὺ βλάχοι, σφαίωσιν. ἀφανίζει ἡ βλάχος.

De Thelypteri, seu filice fœmina. Cap. CLXXXVII.

Thelypteris seu filix fœmina, quã aliqui nymphæam pterin nominãt, solius est filicis, quę tamẽ nõ singulari, vt illa, pediculo hærent, sed è numerosis altioribúsq; propaginibus exeunt. Radices subiacent longæ in obliquum, numerosæ, ex nigro flauescentes: aliquæ etiamnum rubræ inueniuntur. Et hæ quoque radices cum melle in eclegmate sumptę, lata interaneorum animalia pellunt: potę verò ex vino drachmis tribus, teretes lumbricos eiiciunt. Datæ fœminis, conceptum impediunt: quòd si à grauida sumantur, abortum illa faciet. Earundem farina præhumidis & ægrè sanescentibus vlceribus inspergitur, ac iumentorum quoque ceruicibus medetur. Cæterùm elixa folia quæ recèns eruperint, olerum vice manduntur, vt aluum emolliant.

Περὶ Θηλυπτεῖδος. Κεφ. ρπζ.

Θηλυπτεῖς, εἰ ἢ, νυμφαίας πλέον ἢ C νομάζουσι, ἃ μὲ φύλλα τοῖς ἀρσεσι ὅμοια, εὐμεγέθεσι ἢ, ὡς τὰ ἐκείνης, ἀλλὰ πολλοὺς ἔχοντα λοπφοὺς καὶ ὑπολεπτοτέρας ῥίζας δὲ ὕστερον μακρὰς, πλαγίας, πλόκους, ὑποξάνθους· ἐν τῇ μέλαιναι τινὲς δὲ ἐρυθραί. Καὶ αὗται δὲ σὺν μέλιτι ἐν κλύστρῳ λαμβανόμεναι, πλατέας ἕλμινθας ἐκβάλλουσι· σὺν οἴνῳ δὲ πινόμεναι < γ' πλατυστροφύλλιον ἐκβαλοῦσαι D ἕλμινθας· γυναιξὶ δὲ δοθεῖσαι, ἀσυλλήπτους ποιοῦσι· καὶ * ἕλκεσι δὲ ὑγιεῖ, ἐκλειτικόν. ξηραὶ δὲ ὄντες τὸν δυσπλοῦν καὶ καθύγρων ἐλκῶν * ὄντι πλεῖστον τὸ ὑποζύγιον ἰῶνται· τὰ δὲ φύλλα αὐτῆς ἀρτιόλασα λαχανεύεται ἑφθὰ βιβρωσκόμενα, καὶ κοιλίαν μαλάττουσι.

Περὶ Πολυποδίου. Κεφ. ρπη.

ΠΟΛΥΠΟΔΙΟΝ φύεται ἐν πέτραις βρύα ἐχούσαις, καὶ ἐν τοῖς * ἀγρίοις τρέμουσι τοῖς ὄντι τὴν δρυῶν, σπιθαμιαῖς ἔχουσα τὰ ὕψεα, ὅμοιον τῇ πτέρει, πεπταλωμένοις, πτιμηλόφυλλον, ὡμιλῶ οὕτω λεπτοφυλλίδας· ῥίζα δὲ ὑπέστι δασεῖα, πλεκτὰς ὠσπερεὶ πολύποδος ἔχουσα, πάχος μικροῦ δακτύλου. ξυανθεῖσα δὲ, ἐνδόθεν χλωρὰ, τρυφερὴ, τῇ χρόᾳ ὑποξάνθη, δυνάμιν ἔχουσα καθαρτικὴν. δίδοται δὲ συλλαβοῦσι ὄρνιθι, ἢ ἰχθύσι, ἢ σὺν βύτλῳ, ἢ μαλάχῃ πρὸς καθαρσιν. ξηρὰ δ' ὄντα πασσάλῳ τὸ μελικράτῳ, ἀγρὶ φλέγματα καὶ χολάς. ποιεῖ καὶ πρὸς τρώματα ἢ

E

F

G

De Polypodio, seu filicula. Cap. CLXXXVIII.

POLYPODION nascitur in muscosis petris & vetustis quercuum caudicibus, palmi altitudine, filici simile, subhirsutum & incisum, at non perinde tenui diuisura. Radix subiacet pilosa, cirros habens ceu polyporum, crassitudine minimi digiti: hæc si derasa fuerit, coloris intus herbacei comperietur: acerba verò est atque gustu subdulcis, purgãdi vi prædita. Datur porrò ad aluum soluendã cocta cũ gallina, aut piscibus, aut beta, aut malua. Aridæ farina aquę mulsę inspersa, detrahit pituitã ac bilem. Trita cadẽ luxatis

ῥίζα λεία κεπαπλασσόμενα, καὶ τοὺς ἀ-
Mss. ὁ δυσπλάσιος legendum ἰσχνασμούς. ῥαγάδας ταῖς· ὁ μεσοδακτύλιος.

Περὶ Δρυοπτέριδος. Κεφ. ρπθ'.

Orib. Cornutus. ΔΡΥΟΠΤΕΡΙΣ φύεται καὶ παὶ βρυώδη μέρη τῶν παλαιῶν δρυῶν, ὁμοία πλείστῃ, ἐλάττων ἢ πολλῷ τῇ χλοῇ· ῥίζας ἔχει κατ' ὀπτιλακίων δασείας, τροφιὰς καὶ πιοηλύους; ὁ τοῦ γλίνης ῥίπτουσι. Αὕτη ὀπτιλασθεῖσα λεία σὺν ταῖς ῥίζαις, πίσσας φιλεῖ· δεῖ ἢ ἀποψᾶν πρότερον μὴ τὸ ἐκμάσσον τὸν χρῶτα, καὶ τότε ἐπιπλάσσειν.

Quidam add. τὸ ἀφέστηκε καὶ ἐρεσχηλεῖ. V. caret.

Περὶ Κνίκου. Κεφ. ρξ'.

Matth. σπερμάτια. V caret. V. ὑπερχόμενοι ἀκανθώδεις. Sic & Lacuna v.c. Al. μεγάλια. Marc. subjicitur legendum magis aut evigna. V. delet. V. καὶ ἐν Ald. ἀνὰ

ΚΝΙΚΟΣ φύλλα ἔχει ὀπτιμάκη, εὐτέλμηθμα, τραχέα, ἀκανθώδη κυλοῦ δὲ πτχυαίους, ἐφ' ὧν κεφαλίῳ μέγεθος ἁλλίας αὐθις κρόκῳ ὅμοιον· σπέρμα λιθοειδὲς καὶ πυρρόν, ὀπτιμάκης, γονιωμένον. Τούτου ἡ αὐθη χρῶνται εἰς τὰ προσωφέλιματα. Τὸ σπέρμα κατέχει· καὶ χυλιζόμενον σὺν ὑδρομέλιτι ἢ ζωμῷ ὄρνιθος, κοιλίαν καθαίρει, κακοσμαχον δέ ἐστι. γίνεται δὲ καὶ κοπάδεια κοιλίας μαλακτικά, τὸ ὁπὸ αὐτοῦ μιγνύντες ἀμυγδάλῳ καὶ νίτρῳ, καὶ ἀνίσῳ, καὶ μέλιτι ἑφθῷ. δίδοται δὲ πρὸ δείπνου λαμβάνειν εἰς δ'. διελόντα, ὡς βασιλικοῦ κεγχρίου μέγεθος β'. ἢ γ'. ἐκβάλλει δὲ τὸν ἔμπυον τοῦτον δι' κνίκης λιπαρᾶς ξέσιν α'. Θασίου πεφωλιμένου καὶ λελεπυσμένου καθάρας πρῶς, ἀνίσου ξέσιν ἕνα, ἀφρονίτρου < ἀμίγδαλα τῆς ὡρικῆς ἀριθμῷ λ'. πίνονται δὲ καὶ γάλακτος χυλὸς τοῦ σπέρματος, καὶ λυτικώτερον πολύ.

Vrat. δ'.

Περὶ Λινοζώστεως. Κεφ. ρξα'.

ΛΙΝΟΣΤΡΟΤΙΣ, οἱ δὲ παρθένιον, οἱ δὲ Ἑρμοῦ βοτάνιον καλοῦσι. ἔχει τὰ φύλλα ὅμοια ἀνήμῳ, πρὸς τὴν ἕλξινα, ἐλάττονα δὲ· κλωνία λεπτὰ, μακάλας πολλὰς, πικρὰς ἔχοντα τὸν δὲ καρπὸν, τὸ μὲν θῆλυ βοτρυοειδῆ καὶ πολύν· ὁ δὲ ἄρρην, πρὸς ταῖς πετάλοις μικρὸς, στρογγύλος, ὥσπερ ὀρχίδια καὶ δύο παρεστηκότα· ἔλαιον δὲ ὁ θαμνίσκος ἀσθματικοῖς, ἢ καὶ μείζων. Κινοῦσι δὲ καὶ ἀμφότερα κιλλίαν λεχουσῶν καὶ ἐαθιόμενα· καθαίρουσι δὲ

Ald. διαγίνεται

efficaciter imponitur, & aduersus rimas quæ inter digitos fiunt.

De Dryopteri. Cap. CLXXXIX.

DRYOPTERIS in veterum robo-rum muscosis partibus enascitur, filici similis, at multò tenuiore foliorum incisura: radicibus inter se implicitis, hirsutis, gustu astringentibus, & ad dulcedinem vergentibus. Ea si trita cum radicibus illinatur, pilos abolet. Primùm autem cutem posteaquam exudauerit abstergere oportet, ac deinde recentem ipsam imponere.

De Cnico. Cap. CXC.

CNICVS foliis constat oblongis, per ambitum diuisis, asperis, aculeatis: caulibus cubitalibus, & in eorum cacumine capitulis oliuæ magnitudine: flore croci: semine candido aut fuluo, oblongo, anguloso: illo flore in obsonis vtuntur. Seminis verò cõtusi & expressi succus ex aqua mulsa aut gallinacei iusculo aluum purgat, sed stomacho aduersatur. Fiunt & ex eo placentulæ aluum emollientes, adiectis succo amygdalis, nitro, aniso & melle cocto. Hæ in frusta quatuor diuiduntur, quæ nucis iuglandis magnitudinem impleant: è quibus ante cœnam duo triáve sumi oportet. Ratio temperandi ea est, vt accipiátur, cnici candidi sextarius vnus, nucum Thasiarum seu amygdalarum tostarum & decorticatarum cyathi tres, anisi sextarius vnus, aphronitri drachma vna, cum carne caricarum numero triginta. Cæterùm seminis succus lac etiam coagular, ipsúmque ad soluendá aluum efficacius reddit.

De Linozostide, seu Mercuriali. Cap. CXCI.

LINOZOSTIN aliqui parthenum, alij Mercurij herbulam appellant. Folia habet ocimi, helxinæ cognata, sed minora: ramulos duplici geniculorum nodo cinctos, & alarum cauis multis iisque dentis præditos: semen, fœminæ quidem, racemosum atque copiosum: mari verò, iuxta folia paruum ac rotúdum, ceu binos testiculos vna cohærentes. Totus autem frutex dodrátalis est, aut etiam maior. Vtraque aluum ciet, si olerum vice mádatur. Cocta

ἢ sine folioru dependentes

verò in aqua, epoto iure, bilem aquoſáque detrahit. Creduntur autem folia trita ſi bibantur, atque etiam à purgatione menſtrua verendis admoueantur, vt fœminæ concipiantur facere: maris verò folia ſimiliter vſurpata, vt maſculi gignantur efficere.

A ἐν ὕδατι, καὶ πινόμενον τὸ ὕδωρ, ἄγριον χολὴν καὶ ὑδατώδη. δοκεῖ δὲ καὶ μὴν τῆς θηλείας φύλλα, λάπαθα πινόμενα καὶ προσιζήματα μὴν τοῦ καθαρσίου ποιεῖσθαι, καὶ σὺν ἡλεῖφ θηλέως ποιεῖσθαι, καὶ δὲ τὸ ἄρρενος ὁμοίως ὀπτισθὲν θήσει, ἀφροδισιάζεσθαι.

De Cynocrambe. Cap. CXCII.

B Περὶ Κυνοκράμβης. Κεφ. ρϟβ'.

Censet Marcellus hoc caput adulterinum maximè cum in veteribus codicibus minimè reperiatur.

CYNIA ſeu cynocrambe, aliis mercurialis ſylueſtris mas, cauliculum emittit binûm palmorum altitudine, mollem ac ſubalbidum: folia mercuriali aut hederæ ſimilia, certis interſtitiis candicantia: ſemen foliis adiacet paruum ac rotundum. Folia cum caulibus olerum inſtar pota, vim aluiciendæ habent. C lus verò decocti, bilem aquoſáque detrahit.

ΚΥΝΙΑ ἡ κυνοκράμβη, οἱ δὲ λινόζωστρα ἀγρία ἄρρεν, καυλίον ἀνίησι δισπιθαμιαῖον, ῥυφεινόν, ὑπολάβανον φύλλα ἐμφερῆ λαπαθίῳ ἢ κισσῷ, ὑπολάβανα ὀπὸ διαστημάτων ὅτι δὲ καρπὸν πρὸς τοῖς πετάλοις περιτείνουσι, μικρὸν, στρογγύλον. Δυνάμιν δὲ ἔχει ὅ, τι καυλὸς καὶ τὰ φύλλα πινόμενα, χολίας καθαρτικὸν, λαγαρωτικόν. καθηψημένου δὲ τὸ ὕδωρ, ἄγει χολὴν καὶ ὑδατώδη.

De Heliotropio magno, ſeu Solari herba maiore. Cap. CXCIII.

D Περὶ Ἡλιοτροπίου τοῦ μεγάλου. Κεφ. ρϟγ'.

HELIOTROPIVM magnũ aliqui à floris figura Scorpiuron appellauêre: cæteri heliotropium, quoniam folia ſua cum inclinante ſole circumagat. Folia ocimi habet, hirſutiora tamen, nigriora maioráque: ramulos ab ima radice ternos, quaternos, quinóſve, compluribus alis concauos: florem in ipſorum cacuminibus candidum, purpuraſcentem, qui ad ſimilitudinem caudæ ſcorpionis incuruatur. Radix gracilis eſt atque ſuperuacua. Naſcitur in aſperis. Huius manualis faſciculus ex aqua decoctus & potus, pituitam bilémque per aluum extrahit. Prodeſt & contra ſcorpionum ictus ex vino bibitum, atque etiam illitum: ad arcendos verò conceptus, amuleti inſtar adalligatur. Aiunt porrò ſeminis grana quatuor hora vna ante acceſſionem cum vino pota, quartanas finire, triaverò, tertianas. Illitum autem ſemen, myrmecias, penſiles verrucas, thymos & epinyctidas exiccat. At folia podagris luxatíſque, & infantium aduſtioni, quam ſiriaſin vocant, vtiliter illinitur. Méſes eadẽ cient: atque etiam partus trita & impoſita pellunt.

ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟΝ ὁ μέγα, ὃ ἔνιοι ἐκάλεσάν σκορπίουρον ἀπὸ τοῦ εἶδος ὅμοιος, ἡλιοτρόπιον ἢ ἀπὸ τοῦ συμπεριπολεῖσθαι τὰ φύλλα τῇ τοῦ ἡλίου κλίσει. ἔχει δὲ τὰ φύλλα ὠκίμῳ παραπλήσια, διασυτερα δὲ καὶ μελάντερα, Add. quidam καὶ γεῦμα.

E μείζονα· κλωνία ἀπὸ τῆς ῥίζης ὅσον γ'. ἄνθος δὲ καὶ ἐν τούτοις μικρὰς τελείας· ἐπ' ἄκρου δὲ αὐτοῦ λευκὸν, ὑποπορφυροῦν, ὀπτικαμπὲς, καθάπερ σκορπίου οὐρά· ῥίζα δὲ λεπτὴ, καὶ ἄχρηστος· φύεται δὲ τραχέσι τόποις. Τοῦτου ὅσον δίσμιλ ἀφεψηθὲν μεθ' ὕδατος καὶ πεθὲν, ἀγει φλέγμα καὶ χολὴν διὰ κοιλίας· ἁρμόζει δὲ καὶ σκορπιοπλήκτοις, μετ' οἴνου πινόμενον καὶ καταπλασσόμενον· πρὸς ἀπόστασιν δὲ διαπλέπει. Φασὶ δὲ πρὸ μιᾶς ὥρας τῆς ὀπτισμασίας, τὸ καρπὸν ἑπτὰ κόκκους μετ' οἴνου πιόντας, τεταρταίους καταπαύειν· τεσσαρακοντάρους δὲ, τριταίους. καταπλασσόμενος δὲ ὁ καρπὸς, μυρμηκίας δὲ ἀκροχορδόνας καὶ θύμους καὶ ὀπτυκτίδας ξηραίνει. τὰ δὲ φύλλα ποδάγραις καὶ στρέμμασι, καὶ σκιρώσει παιδίων ὀπτὸν λαμβανόμενα ὠφελίμως. κινεῖ δὲ καὶ ἔμμηνα, καὶ ἔμβρυα ἄγει λαμβανόμενα πόσει.

Vulg. ex ἰσμήνῃ. Forte σκίμμος, & ita deinceps.

Ad. ἀπόστασιν

Περὶ Ἡλιοτρόπιου τοῦ μικροῦ. Κεφ. ρϟδ'.

V. add. εἰ δὲ καὶ σκορπίου ἰαῦται. ἴσον δὲ σκορπίῳ:

Ἡλιοτρόπιον τὸ μικρὸν φύεται ἐν τελματώδεσι τόποις καὶ παρὰ λίμναις, ἔχον φύλλα παρεμπλήσια τῷ σεσελεώδει, στρογγυλώτερα δὲ καρπὸν στρογγυλον ἀπερεμάδιον ὡς ἀκροχορδόνας. Δίδωται δὲ ἡ πόα μετὰ τοῦ καρποῦ πινομένη σὺν νίτρῳ καὶ ὑσσώπῳ καὶ καρδάμῳ καὶ ὕδατι, ἕλμινθα πλατεῖαν καὶ στρογγύλων ἐκλυτικώτατον· αἴρει δὲ καὶ ἀκροχορδόνας σὺν ἁλὶ καταπλασσομένη.

Περὶ Σκορπιοειδοῦς. Κεφ. ρϟε'.

Σκορπιοειδὲς, βοτάνιον φύλλα ἔχον ὀλίγα, καὶ σπέρματα οὐραῖς σκορπίου ἐμφερῆ. βοηθεῖ δὲ καταπλασσόμενα σκορπιοπλήκτοις ἄκρως.

Τέλος τοῦ τετάρτου βιβλίου.

De Heliotropio paruo. Cap. CXCIIII.

HELIOTROPION paruum, (quod & alio nomine Scorpiuros vocatur,) nascitur in palustribus, & iuxta lacus, foliis antedicto proximis, at rotundioribus: semine rotundo, pensilium verrucarum modo depédente. Herba cum semine pota, additis nitro, hyssopo, cardamomo & aqua, valet ad latos teretésque lumbricos excutiédos: quin & pensiles verrucas cum sale illita tollit.

De Scorpioide. Cap. CXCV.

SCORPIOIDES herbula est, foliis paucis, & semine caudæ scorpionis effigie. Hęc illita, contra scorpionū ictus præsentaneo sunt auxilio.

Quarti libri finis.

ΠΕΔΑΚΙΟΥ ΔΙΟΣΚΟΡΙΔΟΥ ΑΝΑΖΑΡΒΕΩΣ, Περὶ ὕλης ἰατρικῆς βιβλίον πέμπτον.

PEDACII DIOSCORIDIS ANAZARBÆI, De medica materia Liber quintus.

IANO ANTONIO SARACENO LVGDVNÆO INTERPRETE.

ΑΠοδόντες ὁ τῆς εὐσεβεστάτης τέτταρσι βιβλίοις, φίλτατε Ἄρχε, τὰ περὶ ἀρωμάτων καὶ ἐλαίων καὶ μύρων καὶ δένδρων, καὶ τῶν ἐξ αὐτῶν καρπῶν τε καὶ δακρύων ἔτι τὰ ζώων καὶ μέλιτος καὶ γάλακτος καὶ τυρῶν, καὶ τῶν καλουμένων σπερμῶν καὶ λαχάνων. καὶ τὰ σύμπαντα τοῖς ῥίζῶν καὶ βοτάνων καὶ χυλισμάτων καὶ σπερμάτων λόγοις. ὁ τούτῳ, τελευταίῳ ἐπάρχοντι τῆς ὅλης πραγματείας, ἀφαιρεῖσθαι τοῖς οἷόν ἐστι τῶν καλουμένων μεταλλικῶν, ἀρξάμενοι ἀπὸ τῆς τοῖς ἀμπέλου πραγματείας.

QVONIAM superioribus quatuor libris, amicissime Arce, de aromatibus, oleis, vnguentis, arboribus & earundem fructibus atque lacrymis, itémque de animalibus, melle, lacte, adipe, cerealibus & oleribus egimus: necnon & vniuersam de radicibus, herbis, succis, seminibúsque tractationem absoluimus: in hoc totius operis vltimo, de vinis & iis quæ metallica dicuntur differemus, à vitis tractatione ducto exordio.

De Vite vinifera. Cap. I.

VITIS viniferæ folia cum clauiculis trita & impoſita, capitis dolores mitigant, itémq; ſtomachi inflammationem & ardorem cum polētā. Idipſum etiam folia per ſe impoſita præſtant: quippe quæ refrigerandi aſtringendiq; vim habeant. Potus eorundem ſuccus iuuat dyſentericos, ſanguinem excreantes, ſtomachicos, ac mulieres malacia laborantes. Eadem efficiunt macerati in aqua capreoli & poti. Lacryma vitium, quæ veluti gummi eſt, quæque circa illarum caudices concreſcit, ex vino pota, calculos pellit: inuncta lichenas, pſoras, lepráſque nitro affricto præparatas ſanat. Eadem cum oleo ſæpius pilis illitis pſilothri effectum habet, maximéque liquor quem accenſa ſarmenta vitium viridia exudarunt, quo & perunctæ myrmeciæ tolluntur. Cinis autem ſarmentorum & vinaceorum, detractis circa ſedem condylomatis & thymiis illitus ex aceto medetur. Prodeſt & luxatis ac viperarum morſibus: quin & contra lienis inflammationes proficit, cũ roſaceo, ruta & aceto impoſitus.

De Labruſca ſeu vite ſylueſtri. Cap. II.

vel, minime vtilis.

LABRVSCA duũm eſt generum: Altera enim vuam ad incipientem maturitatem minimè perducit, ſed flore tenus œnanthen nominatam profert. Altera ad frugem peruenit, paruis acinis, nigris & adſtringentibus. Folia, caules & clauiculæ quibus repunt, vim habent ſatiuæ viti ſimilem.

De Vua. Cap. III.

QVÆLIBET vua recens aluum turbat, & ſtomachum inflat: quæ verò decerpta aliquandiu pependit, propterea quòd ea ventilatione magna humiditatis portio deceſſit, innocentior eſt, ac tum ſtomacho vtilis eſt, tum & appetentiam ciborum reſtituit, atque adeò ægris languentibúſve idonea eſt. In vinaceis & ollis ſeruatæ, ori ſtomachóque, gratæ ſunt: aluum ſiſtunt, (ſed veſicam & caput tentant) & ſanguinem excreantibus conueniunt. Similes porrò ſunt & quæ in

A Περὶ Ἀμπέλου οἰνοφόρου. Κεφ. α.

ΑΜΠΕΛΟΥ οἰνοφόρου τὰ φύλλα καὶ αἱ ἕλικες λᾶσαι καὶ ἐπιπλαστόμεναι, κεφαλαγίας παραύουσι, φλεγμονὴν τοῦ στόμαχου καὶ καῦσον στεὼ ἀφίστησι· καὶ καθ' ἑαυτὰ δὲ τὰ φύλλα, ψυκτικὰ καὶ συμπτικὰ ὄντα. καὶ ὁ ἐξ αὐτῶν δὲ χυλὸς πολὺς, ὠφελεῖ δυσεντερικοὺς καὶ αἱμοπτοϊκοὺς καὶ στομαχικοὺς καὶ κιναιδικούς. ἀποβρεχθέντες δὲ καὶ αἱ ἕλικες ἐν ὕδατι καὶ πολῆσαι, τὰ αὐτὰ ποιοῦσι. τὸ δὲ δάκρυον αὐτῆς ὅμοιον ὂν κόμμι, ἐκπηγνύμενον τοῖς στελέχεσι, λίθους ἐκπίνασι πινόμενον στεὼ οἴνῳ· ἰᾶται δὲ καὶ λέχηνας καὶ ψώρας καὶ λέπρας καταχριόμενον. ἁφὴ δὲ περιεχόμενον (ᾗ) τοπον. στεὼ ἐλαίῳ ἐγχριόμενον στομαχῶν, ψιλοῖ βλεφάρων τρίχας, καὶ μάλιστα ὁ ἀπὸ τῆς χλωρεύσης καιομένου κλήματος ἀφιδρούμενος ἰχώρ· ὃς καὶ μυρμηκίας ἐκβαλλόμενος ἐκβάλλει. ἡ δὲ ἐκ τῶν κλημάτων καὶ συμφύλων τέφρα, τὰ περὶ δακτύλιον ἀφαιρεθέντα κονδυλώματα ἐν θύμα, στεὼ ὄξει καταπλασθεῖσα θεραπεύει. ἐν γρέμματα, καὶ ἐχινοδήκτους ὠφελεῖ, καὶ σκολιὼσεις φλεγμονάς, ἢ σὺν ῥοδίνῳ ἐς πυγαίαν ἐς ὄξει καταπλασσόμενα.

B Περὶ Ἀμπέλου ἀγρίας. Κεφ. β'.

ΑΜΠΕΛΟΣ ἀγρία διττή. ἡ μὲν γὰρ αὐτῆς οὐ περιάγει τὴν σταφυλὴν, ἄχρι δὲ αἰθρίσεως ἀγλεῖ τὴν λεγομένην οἰναίθην. ἡ δὲ πιλεσφορεῖ, μικρόρραξ οὖσα, καὶ μέλαινα, καὶ συμπτική. Δύναμιν δ' ἔχει ταύτης τὰ φύλλα καὶ αἱ ἕλικες καὶ οἱ κισσοὶ, ὁμοίως τῇ ἡμέρᾳ.

F Περὶ Σταφυλῆς. Κεφ. γ'.

ΣΤΑΦΥΛΗ, ἡ μὲν πεπόσφατος πᾶσα ἐκπερᾶται· χυλίαις, ἐς ἐμπύημα τῶν στόμαχον· ἡ δ' ὀπτὴ χρόνον τινὰ κρεμασθεῖσα, ὀλίγον μετίσχει τούτων, (διὰ τὸ πολὺ τῆς ἰκμάδος ἀπεξηρᾶσθαι) βύστομάχός τε ὀπτὴ καὶ ὀρέξεως ἀναπλητική· ἐν ὀπτὸν πόλος πρὸς τὸν ἀσθενοῦντα. αἱ δὲ ἐκ τῶν G ἐμφύλων καὶ ἐκ τῶν βικῶν, βύστομοι, βύστόμαχοι, κοιλίας ἐφεκτικαί. (κύστεως δὲ καὶ κεφαλῆς ἄπονται) ἁρμόζουσι δὲ καὶ αἱμοπτοϊκοῖς. ὅμοιαι δὲ εἰσι καὶ αἱ εἰς τὸ

V. caret.

V. addit. nõn

V. addit. nõn

V. caret.

V quidam addit. ἀνάπνοαι

Cæ. addunt

γλώσσης ἐμβαλλόμενα. αἱ δὲ ἐκ τῶν ἐφθῶν μαλῶν καὶ γλυκέων, κακοστομαχώτεραι. σωτῆρι δὲ καὶ μετ' ὀμφακίου ὕδατος προσφερόμεναι. γίνονται δὲ αἱ τοιαῦται ἐπ' ὀλίγον οἰνώδεις, διψώδεσι δὲ καὶ πυρετοῖς καὶ χολικοῖς πυρετοῖς χρήσιμοι. ὃ δὲ ἐμφυλλον αὐτῶν ἀπόζεσιν, καταπλάττεται μετ' ἀλφίτων πρὸς φλεγμονὰς ἕλκεσι καὶ ἀπάγουσι μαστῶν· τὸ δὲ ἀφέψημα τὸ ἐμφύλλου, δυσεντερικοῖς καὶ κοιλιακοῖς καὶ ῥοϊκοῖς ὠφελεῖ ἐνέμασι· καὶ εἰς ἐδαφισμοὺς καὶ προσκλύσματα λαμβάνεται. Τὰ δὲ ἐξ αὐτῶν γιγαρτώδη, βύσματα· φρυγόμενα δὲ ἀπὸ ἀφίσου ὑπέπασσόμενα λεπτὰ, ἁρμόζει δυσεντερικοῖς, καὶ κοιλιακοῖς καὶ τοῖς ⊗ στόμαχον ἀλγοῦσιν.

Περὶ Σταφίδος. Κεφ. ρ'.

Ἡ δὲ σταφὶς φυσικωτέρα ὑπάρχει ἡ λευκὴ· ὠφελεῖ δὲ καὶ ἡ σὰρξ αὐτῶν ἐσθιομένη· ὄρθειρίας καὶ βῆχας καὶ νεφρικὰς καὶ κύστεως καὶ δυσεντερίας σὺν τοῖς γιγάρτοις ἐσθιομένη· καθ' ἑαυτὴν μιγνῦσα ἢ ἀλεύρῳ κεχειρεῖνῳ καὶ κριθίνῳ καὶ οὔῳ, καὶ τηγανισθεῖσα μετὰ μέλιτος καὶ λαμβανομένη· εἰς τὰ ἀποφλεγματισμοὺς καθ' ἑαυτὴν καὶ σὺν πεπέρει μαστιχωθεῖσα ὀδύντος. διδύμων τὰ φλεγμονὰς παύει, καταπλασθεῖσα μετ' ἀλεύρου κυαμίνου, καὶ κυμίνου. Ὑπονυκτίδας δὲ καὶ αἰθιοπικὰς καὶ χειρὸς καὶ τοῖς ἐπὶ ἄρθρα σπιλάδας καὶ χαλεπαίνας, χωρὶς γιγάρτων ἰᾶται λεῖα σὺν πεπέρει ὑπεπιθεμένη· πρὸς τὰ ποδάγρας ἁρμόζει, μετὰ ὑοπτέλακος καταπλασσομένη· ἡ ὄνυχας δὲ θαττον ἀφίστησι καλυθεῖσα ὑπεπλασθεῖσα.

Περὶ Οἰναίθης. Κεφ. ρα'.

Οἰνάνθη καλεῖται ὁ τῆς ἀγρίας ἀμπέλου καρπὸς, ὅταν τὸ ἄνθος ἐκβεβληθαι μέλλῃ ἀκόπτου ἀλλοῖον ὄξους ἔχοντα, συλλέγουσι καὶ ξηραίνουσι ὅπως ὀξυόεντος ὀσμὴν. καλλίστη δὲ γίνεται ἐν Συρίᾳ καὶ Κιλικίᾳ καὶ Φοινίκῃ. Δυνάμεις δὲ αὐτῆς στυπτικὴ· ὄθεν πινομένη, δυσεντερικὸς καὶ οὐρητικὴ, κοιλίαν ἐφίστησι καὶ αἵματος πτύσιν. ξηρὰ δὲ καταπλασθεῖσα, καὶ πρὸς

A mustum coniectæ fuêre. At quæ in sapa aut passo conditæ sunt, stomachum magis infestant. Seruantur & in aqua cœlesti quæ priùs solem passæ fuerunt: sed eæ parum vinosæ sunt, siticulosis tamen, ardentibus ac diuturnis febribus vtiles. Recondiri vinacei, inflammatis, præduris lacteq; turgentibus mammis cum sale imponuntur. Eorundem decoctum infusum, dysentericos iuuat & cœliacos, itémque fœminas fluxione vuluæ laborantes: sed & ad desessiones ac fotus vsurpatur. Cæterùm acinorum nuclei astringendi vim obtinent, stomachóque sunt vtiles: iidem tosti tritique ac polentæ vice inspersi, dysentericis prosunt, C itémque cœliacis ac stomachi dissolutione vexatis.

De Vua passa.
Cap. IIII.

VVA passa alba adstringentior est. Prodest esitata earum caro arteriæ, tussi, renibus ac vesicæ. Estur & cum nucleis per se contra D dysenteriam, itémque admista milij ac hordei farina & ouo, in sartagine cum melle fricta sumitur. Sed & eadem ad eliciendam è capite pituitam tum per se, tum etiam cum pipere commanducata proficit. Testium quoque inflammationes sedat imposita cum lomento fabarum & cumini farina. Epinyctidas verò, E carbunculos, fauos, putrescentiáq; articulorum vlcera, atque gangræna sine nucleis trita & cum ruta illita sanat. Conuenit & podagræ cum panacis succo adhibita: deniq; & mobiles vngues illita celeriùs extrahit.

De OEnanthe.
Cap. V.

F

OENANTHE vocatur, vitis syluestris fructus cùm floret. Condi verò debet in vas fictile non picatum, lecta priùs, & substrato linteo in vmbra siccata. Laudatissima in Syria, Cilicia & Phœnice. Vis ei astringendi vtriaquare pota, stomacho ac cien dæ vrinæ vtilis, aluũ sistit ac sanguinis excreationes. Contra fastidia & G

acorem ſtomachi ſicca & illita etiã efficax eſt. At in capitis doloribus tam viridis quàm ſicca cum aceto & roſaceo perfunditur. Cruenta vulnera & incipientes ægilopas, oris vlcera & verendorum nomas, trita & additis melle, croco, myrrha & roſaceo adhibita pro caraplaſmate, ab inflãmatione vindicat. Peſſis quoque ammiſcetur, ad cohibendum ſanguinem: & contra oculorum fluxiones ſtomachique ardores cum polline polentæ ac vino illinitur. Cinis verò crematæ in teſta candentibus prunis, facit ad oculorum medicamenta: quin & paronychias, pterygia, abſcedétes cruoréq; manantes gingiuas cũ melle ſanat.

A πρὸς ἀσαφῶδη καὶ ὀξύοπτα στόμαχον ποιεῖ. ἔστι δὲ καὶ καθυγιάσιος ἔμβρεγμα, σὺν ὄξει καὶ ῥοδίνῳ χλωρᾷ τι καὶ ξηρᾷ κατάπλασμά τε αἱμῶν ἀφλέγμαντον, καὶ ἀχμώδεων αἰγιλώπων, καὶ τῶν ἐπὶ στόματι οὐλῶν, καὶ νομῶν τῶν ἐπ' αἰδοίοις, σὺν μέλιτι καὶ κρόκῳ καὶ ῥοδίνῳ καὶ
B σμύρνῃ λεαινθῖσα. εἴς τε πτυαρεῖς μίγνυται πρὸς ὑπερχύσεις αἵματος. καὶ πρὸς ῥεύματα ὀφθαλμῶν καὶ καυσώδεσι στόμαχοι κατάπλασσε σὺν παλαιᾷ ἡφίτῳ καὶ οἴνου. καυθῖσα δὲ ὀστράκου ἀφρῷ πύρεσι ἄνθραξι, ποιεῖ πρὸς τὰ ὀφθαλμικὰ παρωνυχίας τε καὶ πτερύγια καὶ ὕλκα ἀφιστῶσα
C καὶ αἱμασταίμενα σὺν μέλιτι θεραπεύει.

De Omphacio. Cap. VI.

OMPHACIVM ſuccus eſt acerbæ vuæ ſeu Thaſiæ ſeu Aminææ nondum variantis. Oportet autem ante Canis ortum expreſſum ſuccum in aheno ex ære rubro, quod linteo ſit cooperrum, inſolare, vſquedum in denſitatem coëat, intereáque ſemper totum id quod ipſi vaſi concretum adhæſerit liquido reliquo permiſcere, atque noctu ipſum à locis ſubdialibus ſub tectum referre: quandoquidem obſtant nocturni rores, quominùs ſpiſſeſcat cogatúrve. Eligendum eſt flauum, friabile, perquàm aſtringens & linguam mordens. Sunt qui coctione ſuccum condenſent. Prodeſt
E contra tonſillas, vuam, oris vlcera, gingiuas humore flaccidas, purulétásque aures, cum melle aut paſſo: item ad fiſtulas, vetera vlcera nomásque, ex aceto. Dyſentericis & mulieribus fluxione vuluę laborantibus clyſtere infunditur. Oculorũ quoque claritati cõfert, eorundémque ſcabritiæ anguliſque arroſis cõuenit. Bibitur & ad recentem ſanguinis excreationem, etiam ex ruptis vaſis obortam. Sed eo admodũ diluto & pauco vtendum: ſiquidem
F potenter exurit.

Περὶ Ὀμφακίου. Κεφ. ϛ'.

ΟΜΦΑΚΙΟΝ, ἔστι μὲν χυλὸς ὄμφακος Θασίας ἢ φυλλὶς μίσπιλα ἀφρικαξούσης, ἢ Ἀμπελίας. δεῖ δὲ περὶ κυνὸς ἐπιτολὰς ἐκθλίβοντα τὸν χυλὸν ἐν λέβητι χαλκίῳ ἐρυθρῷ ἐσκεπασμένῳ ὀθονίῳ, μέχρις οὗ συστραφῇ, ὅλον αἰεὶ τὸ προσπηγνύμενον μίσγοντα τῷ ὑγρῷ νύκτωρ ἢ αἴρειν αὐτὸ ἀπὸ τῶν ὑπαιθρείων καλύπτειν δὲ αὐτὸ ἐπὶ τὸν σύστασιν· αὐστηρὸν δὲ καὶ δριμύν τὸν σύστασιν· ἀυστηρὸν δὲ καὶ δριμύν· ἐπιτήδειον δὲ καὶ ἐπὶ τὰ ἕλκη καὶ νομάς, σὺν ὄξει. ἐγκλύζειν δὲ ὅταν δυσεντερικῶν καὶ ῥοϊκῶν· ἔστι δὲ καὶ ὀξυδερκές· πρὸς δὲ ὀφθαλμῶν αἱρμόζει ἐς τὰ βρώσεσι χρωμένα· πίνεται δὲ πρὸς αἵματος ῥῆξιν ἡμωμένων· ὕδατι δὲ δεῖ χρῆσθαι λίαν καὶ ὀλίγῳ· ὑπερπικραίνει γὰρ ἰσχυρῶς.

al. ψιλίας Sic Ph.

V. inf.

Περὶ ποιότητος τοῦ οἴνου καὶ τῆς ἡλικίας. Κεφ. ζ.

De Vini natura pro ætatis ratione. Cap. VII.

VINA vetuſta neruos reliquáque ſenſuum inſtrumenta, lædunt, attamẽ guſtu ſuauiora iucundioráq; ſunt: quare vitánda iis qui internę alicui⁹ partis imbecillitatẽ ſentiũt.

ΟΙΝΟΙ οἱ μὲν παλαιοὶ, νεύροις βλαπτικοὶ καὶ τοῖς λοιποῖς αἰσθητηρίοις,
G πρὸς δὲ χεῦσιν ἡδίονες· ὅθεν ὅτι τοῖς αἰσθητικόν τι μέρος ἐχόντων ἐνδεῶς παρεμπτέον.

ὅτι μὲν τοι τῆς εὐυγίας χρήσιμος ἀλίγος τι καὶ ὑδαρὴς λαμβανόμενος ἀζλαβῶς. ὁ δὲ νέος, ἐμπνευματικός, δύσπεπτος, δυσόνιος, οὐρητικός. ὁ δὲ μέσος τῇ ἡλικίᾳ, εὐπεφυγὼς τὰ ἀμφότερα ἐλαττώματα. ὅθεν εὐκριτός ἐστιν ἐν τῇ ὑγιείᾳ καὶ ἀσθενείᾳ χρήσεσι.

Malum humores gignit.

Ex τῆς χρόας. Κεφ. η'.

Ἔτι ὁ μὲν λευκὸς, λεπτός τε καὶ διαπάδυτος καὶ διουρητικώτερος ὑπάρχει. ὁ δὲ μέλας, παχὺς καὶ δύσπεπτος. μέσης καὶ χρηστῶν ἐμπτικός. ὁ δὲ κίρρος μέσος ὢν, μέσην ἔχει καὶ τὴν πρὸς ἑκάτερα τούτων δύναμιν. αἱρετώτερος μὲν τοι ἐν τῇ ὑγιείᾳ ὁ λευκὸς ἔτι δὲ καὶ πρὸς τὴν ποιότητα διαφέρουσιν.

Leo. legit. in v. cod. λευκότατος.

Ex τῆς γλύκους καὶ τῆς μεμιγμένου. Κεφ. θ'.

Ὁ μὲν γὰρ γλυκὺς οἶνος, ἀδρομερής τε ὢν καὶ δυσδιάπνευστος· σωμάζει πνευματωτικός· χολίας τε καὶ ἑτέρων περιττικός, ὥσπερ καὶ τὸ γλεῦκος· ἧττον δὲ μεθύσκει. κύστιν δὲ καὶ νεφροὺς βλάπτει. ὁ δὲ αὐστηρὸς, οὐρητικώτερος· κεφαλαγίας τε καὶ μήνης ποιητικός. ὁ δὲ τρυφνὸς, βλητικώτατος πρὸς διάδοσιν σιτίων· χολίας τε σηπτικὸς, καὶ τὴν ἄλλην ῥευματισμῶν· ὁ δὲ ἁπαλὸς, ἧττον ἀπολείπεται τῶν εἰρημένων, καὶ ἧττον ὄφελος οὐρητικός. ὁ δὲ τεθαλασσευμένος, καυσώδης, διψοποιὸς, νεύρων καὶ κοιλίας κωτικὸς, δυσεντερικὸς, ἀνεπιτήδειος τοῖς ἐξ ἀφροδισίων. ὁ δὲ ἐκ τῆς φιλοπεδιάδος καφυλῆς, ὃ ὅτι τὴν κλημάτων ὀπὴν ἐκπιέζουσι καὶ τερβομένου· ἡδύοινος, γλυκὺς καλοῦμενος Κρητικὸς ἢ πρόζυπος ἢ πρόγυμνος· καὶ ὁ καλοφωμένου τῷ γλεύκει στέγος, ἢ ἕψημα καλούμενος. ὁ μὲν μέλας, καλούμενος δὲ μελαμψίθιος, παχὺς ἐστι καὶ πολύζυφος· ὁ δὲ λευκὸς, λεπτότερος. ὁ δὲ μέσος, μέσην ἔχει καὶ τὴν δύναμιν. ευπτικὸς δὲ πᾶς ὅστις, σφυγμικὴν ἀναπτητικὸς· ποιῶν πρὸς πόμα τὰ ἡσιάσιμα ὅσα χρὴ ἕλκεσιν ἀναφέρειν, πινόμενος σὺν ἐλαίῳ καὶ ἁλμυρίδι· ἢ πρὸς μηκώνειον δὲ καὶ φαεικὴν,

Vinum album.

Cornari' ἀπλῆς legendum suspicatur. Lac. vetus exemplar habet, μᾶζον. quam is Dioscoridi genuinam esse lectionem autumat.

Vinum crudum.

Aldi μελαμψίθιος

Nihilominus in secunda valetudine vinum eiusmodi paucum & aqua dilutum innoxiè sumitur. At nouú inflationes parit, ægrè coquitur, grauia facit insomnia, vrinásque ciet. Quod verò ætate medium est, vtroque illo vitio caret, proindéque ad vsum sanorum ægrorúmque deligendum.

Pro ratione coloris. Cap. VIII.

Insuper album est tenue ac stomacho vtile, faciléque in membra diuiditur. Nigrum verò, crassum est & ad concoquendum difficile, temulentiam facit & corpus auget. Fuluum, vtpote quod medium est, medias etiam inter vtrunque vires obtinet. Album tamen tum in secunda, tum & in aduersa valetudine laudabilius. Sed & vina sapore distant.

Pro saporum eorúmque quæ illis miscentur differentia. Cap. IX.

Siquidem dulce crassis partibus constat & ægrè de corpore expirat, stomachum inflat, aluum & intestina, vti & mustum, turbat: sed minùs inebriat, vesicæ ac renibus aptum. Austerum vrinas magis expellit, sed capitis dolorem facit, ac temulentiam gignit. Acerbum ad ciborum per membra digestionem accommodatissimum: aluum cæteráſque fluxiones cohibet. At vinum molle & sapore languidum, neruos minùs tentat, minúsque vrinas pellit. Vinum porrò aqua marina factũ stomacho aduersatur, sitim facit, neruos infestat, bonam facit aluum & à valetudine sese recolligentibus haudquaquá idoneum est. Passum autẽ quod uuis in cratibus sole siccatis aut in ipso farmento torrefactis exprimitur, Creticum cognomine, aut protropum aut pramniũ, itémque sapa quæ fit musto igni decocto, Græci Siræon seu hepsema appellant: nigra quidem si fuerint, qualia melampsithia dicuntur, crassa sunt & corpora multum alũt: at candida, tenuiora: quæ verò medio inter hæc colore sunt, medias quoque vires sortiuntur. Omnia tamen astringunt, languidos pulsus excitant, & faciunt aduersus venena quæcunque exulcerando nocent; ex oleo pora & vomitionibus reddita: itemq; cõtra meconiũ, pharicũ,

toxicum,cicutam & lactis in vētriculo coagulationem:necnon & cōtra renum ac vesicæ rosiones & exulcerationes : nihilominus inflationes pariunt, & stomacho aduersantur. Priuatim cōfert Melampsithium iis qui alui fluxione laborāt. Album magis cæteris emollit aluū. Gypso conditum neruos offendit, capitis grauitatē infert, viscera calore accendit,& vesicæ aduersatur: sed contra venena cæteris aptius. Picata aut resinata excalfaciunt & cōcoctionē adiuuāt,sanguinem excreantibus inimica. Quæ verò aparachyta, hoc est, maris expertia dicuntur, & sapam tamen admissam recipiunt , caput implent , remulentiam gignunt, de corpore difficulter expirāt, & stomachum malè habent.

A καὶ πεξικὸν, καὶ κώνειον, καὶ γάλακτος θρομβωδῶν· καὶ πρὸς κύστιν καὶ νεφροὺς ὀδαξμώδεις καὶ ἑλκωμώδεις. εἰσὶ δὲ πνευματικοὶ δὲ καὶ κεσόμαχοι. ἰδίως δὲ ὅτι τῷ πλεῖστα ῥευματίζειν ἐν μόζῃ ὁ Μελαμψίθιος. ὁ δὲ λευκὸς μαλακτικὸς κοιλίας τῷ ἄλλων μᾶλλον. ὁ δὲ πίττῃ γύψῳ ἐ-

B χων, καυστικὸς τῷ νεύρων, καὶ βαρικὸς, καὶ πυρώδης, κύστει ἄθλιος· πρὸς δὲ τὰ θανάσιμα τῶν ἄλλων βοηθητικώτερος. οἱ δὲ πίσσῃ ἢ ῥητίνῃ πιτύῃ ἢ ἐλάτῃ θερμαντικοὶ, καὶ πτελικοί· ἄθλοι δὲ πρὸς αἱμοπτοϊκούς. εἰ δὲ καλούμενοι ἀπύρηνοί, ἔχοντες δὲ ἔψημα μεμιγμένον, κεφαλῆς εἰσὶ πληρωτικοὶ,

C μίθος θρυπτικοὶ, δυσδιάπεπτοι, καὶ κοιλιοκεσόμαχοι.

V. πλευμονικὸν lego, πλευστικοὶ

V. ἄθλιον.

V. κλυσίδιον.

V. ἀπύρηνοι.

V. ἀδὲ φυσώδεις

A.ld. in vet. Lec. cōfice , πλευστικοὶ, τυφρικοὶ καὶ φυσώδεις.

Περὶ διαφορᾶς ἐν τῷ τόπῳ. Κεφ. ί.

Pro locorum differentia. C. X.

Inter Italica vina Falernū principem locum obtinet: quod inueteratum per quam facilè concoquitur, pulsus recreat & excitat,aluū astringit,stomacho vtile: sed vesicę noceat, atq; ils qui visus hebetudinē sētiūt,liberaliori potationi minimè idoneū. Albanū crassioribus quàm Falernum cōstat partibus, subdulceq; est,stomachum inflat & aluum emollit: sed cōcoctionem nō æquè adiuuat,neruosum verò gen minùs infestat. Sed & hoc ipsum vetustate austerum saporē concipit. Cæcubū cùm sit dulce,est & Albano crassius, corpus auget,& colorē cutis meliorem lætioremque facit: at iuuandæ concoctioni minimè idoneum est. Surrētinum valde austerū est: quare intestinorum & stomachi fluxiones cohibet,& cùm tenuibus cōstet partibus,caput minùs tētat: vetustate autem & stomacho vtile & iucūdioris euadit saporis. Adrianum & Mamertinum,quæ quidem in Sicilia gignuntur, ex æquo crassarum sunt partium, modicè astringunt & celeriùs inuetērātur , minúsque ob suam lenitatem neruos tētant. Prætutianum,quod & ipsum è locis circū Adriam deuehitur, est odoratū ac minùs asperum: haustum copiosius eo sese prodit indicio, quòd & ebrietatem diu seruat,& soporē cōciliat. Istricum Prætutiano simile est,sed vrinam vehementiùs pellit.

D Ὁ μὲν οὖν δοκῶν πρωτεύειν τῶν ἐν Ἰταλίᾳ οἴνων, Φάλερνος ὁ καλούμενος, παλαιωθεὶς ἀγαθὸν βύσσπλος, σφυγμῶν ἀναληπτικὸς, κοιλίας στρωτικὸς, καὶ βυσόμαχος· κύστει ἄθλιος, καὶ ἀμβλυωπόδοσι, καὶ πρὸς πολυπόσιόν ἀνάξιμος. ὁ δὲ Ἀλβανὸς ἀδρομερέστερος τοῦ φλέγματος, ἔστι γλυκὺς ἐμπιθυματῶν στόμαχον, κοιλίαν τε μαλάττων. (πίνεται τε ὑχόμοιος σταφυλῶν·) δυσπεπτώδης ἧττον καὶ κακωτικὸς παλαιωθεὶς δὲ καὶ οὗτος αὐστηρὸς γίνεται. ὁ δὲ

E Καικουβος γλυκὺς ὤν, ἀδρομερέστερος ἐστὶ τοῦ Ἀλβανοῦ· σφριγῶν τε καὶ βύσσεως ἀγωνικὸς· πίνεται δ' ἄπλετος. ὁ δὲ Συρεντῖνος, αὐστηρὸς ἰσχνῶς ἐστιν· ὅθεν ἑτέρων καὶ στομάχου ῥεύματα ἵστησι, κεφαλῆς τε ἧττον ἅπτεται), λεπτομερὴς ὢν παλαιωθεὶς δὲ, βυσόμαχος καὶ ἡδίων γίνεται). ὁ δὲ Ἀδριανὸς καὶ ὁ Μαμερτινὸς ἀγωνίσασθαι τὸ Σικελίᾳ, κατ' ἴσον εἰσὶν

F ἀδρομερῆς, μετρίως σύφοντες, καὶ πάχυνον παλαιούμενοι), πίπτει τε τῶν ὑδρώδεις ἄπλετοι), ὀλίγα τὸ εὐθὺς ἄλγος· ὁ δὲ Γεσπιάτης, καὶ αὐτὸς ἐν τῷ κατ' Ἀδρίαν κομιζόμενος τόπων, βλώδης καὶ λειότερός ἐστιν. οὗ δὲ

G λεγόμενος κολὶς πνεύματος, φυλάττει τὸ ἐφ' ἑαυτοῦ τοῦ μέθυ, καὶ καροῖ. ὁ δὲ Γρικὸς λεγόμενος, ἔοικε τῷ Πεσσινοῦντι, εὐρηπικώτερος ἐστὶν ἀρχήν.

V. πλευμονικὸν legendū suspicatur.

V. πλευστικοὶ.

V. quid. αἰσιμωτικοὶ.

V. ἀθυμίαν lego.

V. ἐλλιπὲς.

V. ἐμπιθυμάτων

V. ἐμπνευματικὸν

V. ἐμπνευματικὸν

V. ἐμπνευματικὸν

V. ἐμπνευματικὸν

V. ἐμπνευματικὸν

V. ἐμπνευματικὸν

V. quid. κεσόμαχον.

V. ἐμπνευματικὸν

Pl. prædicto.

ὁ λεπτὸς Χῖος, ἁπαλώτερος τ̃ πεπλησμένων, εὔπεπτος, πότιμος, ἧττον μεθύσκων, ῥᾳθύματος φλεγμονῆς, χρήσιμος εἰς τὰ ὀφθαλμικά· ὁ δὲ Λέσβιος, διαπάδτικος, χυμώτερος τ̃ Χίου καὶ εὐκοίλιος. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον κέκτηται δύναμιν ὁ κατ' Ἔφεσον γινόμενος, καλούμενος δὲ Φυγελίτης· ὁ δὲ ἀπὸ τ̃ Ἀσίας Μεσογείτης ἀπὸ τ̃ Τμώλου, κεφαλαγικὸς δὲ νεύρων σκληρικός ὁ δὲ Κῷος, καὶ Καλαμίτης, δεῖται μὲν θαλάττης πολλῆς μετέχειν, εὐφθαρτικὸς καὶ ἐμπυρματώδης, κοιλίας δὲ ταραχτικὸς νεύρων δὲ βλαπτικός.

Chium antedictus mollius est, probè nutrit, potui aptum est, ac minùs inebriat: fluxiones cohibet, oculorum medicamentis vtile. Lesbium facilè membra subit, Chio leuius, & aluo idoneum. Ephesium eandem vim habet, quod Phygelites nominatur. Verùm Asianum è Tmolo monte, Messogites appellatum, capitis dolorem affert ac neruos lædit. Coum verò & Clazomenium, quoniam copiosam maris aquam admixtam habent, facilè corrumpuntur, inflationes excitant, aluum turbant, ac neruis officiunt.

Περὶ Δυνάμεως τ̃ οἴνων.

Κεφ. ια'.

De vini generum facultate.

Cap. XI.

Κοινὸς δὲ πᾶς ἀμιγὴς οἶνος καὶ ἀκέραιος, αὐστηρός δὲ τ̃ φύσει, θερμαντικὸς, διαπάδτικος, δυσκοίλαντος, ὀρεκτικὸς, ὑπνοποιὸς, ῥωστικὸς, δὲ χρείας καὶ διαπνευστικός. ἐμφυσᾷ δὲ πολὺς, βοηθεῖ τοῖς κώλοις, ἢ κόπου, ἢ φαρμάκου, ἢ ἰξίας, ἢ μηκωνίου, ἢ λιθαργύρου, ἢ σμίλακος, ἢ ἀκόντου, ἢ μύκητος εἰλημένοις. πρός τε ἕρπητ δηγμοὺς καὶ πληγὰς πεφύκασι, ὅσα πλύνασα ἢ δακόντα καὶ ψύξει αἴρῃ ἢ ἀναπέπτει σώματος. ποιεῖ δὲ πρὸς ἐμπυρμάτων χρόας καὶ δύξη ὑπὸ χοληρίας καὶ πλατυσμοί, καὶ λύγξα σώματος, σὺν πίσσῃ τε χιλίας ῥευματισμούς. καὶ ἐφίζουσι, καὶ διαφορουμένοις ἁρμόζουσι, μάλιστα δὲ οἱ λευκοὶ καὶ παλαιοὶ καὶ εὐώδεις. εἰ μὲν οἱ παλαιοὶ καὶ γλυκεῖς, καὶ πρὸς τὰ πνεύμονος ἐκφροὶ ὄντες πεφύκασι. πρός τε τραύματα καὶ φλεγμονὰς, σὺν ἐλαίοις οἰνοσπογγιὰς ὑπιδήμους. καταπλάσσεται δὲ ὠφελίμως πρὸς τὰ θηριώδη καὶ φαγεδαινικὰ δὲ ῥευματιζόμενα ἕλκη. πρὸς δὲ τὴν τ̃ ὑγιείας χρῆσιν εὔκολοι οἱ ἀθάλασσοι, αὐστηροὶ καὶ λευκοί. διαφέρουσι δὲ τούτων Ⓐ Ἰταλικοί. ὡς ὁ Φαλέρνος, Συρρεντῖνος καὶ Καικυβος, ὅ, τε Σιγλινὸς δὲ ἄλλοι πολλοὶ Ⓑ ἀπὸ τ̃ Καμπανίας, καὶ ὁ * Πραιτιανὸς ἀπὸ τ̃ * Ἀδριανῆ, καὶ Σικελιωτικὸς, ὁ Μαμερτινὸς καλούμενος. ἐγεννήθη δὲ Χῖος, Λέσβιος, Φυγελίτης ὁ δὲ Ἐφέσῳ γινόμενος.

In vniuersum vinum omne meracum & sincerum ac sua natura austerum, excalfacit, facilè in membra distribuitur, stomacho conuenit, appetentiam ciborum inuitat, corpus alit, somnum conciliat, robur auget & colorem commendat. Potum liberaliùs, auxilio est cõtra assumptam cicutam, coriandrũ, pharicum, ixiam, meconium, argẽti spumam, taxum, aconita, fungósve: nec minùs contra serpentium morsus & omnium ictus morsúsve, quæ refrigerando necant aut stomachũ in vomitiones effundunt. Facit & ad diuturnam hypochondrij inflationem, rosionem atque distentionem: itémque singultum, ac stomachi, intestinorũ & ventris rheumatismos. Vina cõueniũt sudatoribus & quibus corpus immodico sudore digeritur, maximè quæ sunt alba vetera & odorata. At quæ sunt vetusta simul & dulcia, renum ac vesicæ vitijs sunt accõmodatiora: necnon vulneribus inflammationibúsque in succida lana commodè imponuntur. Quin & iisdem fera, phagedænica & affluentibus humoribus irrigua vlcera vtiliter fouentur. Porrò vina quibus aquæ marinæ nihil additum est, austera & alba, ad sanorum victus commodè vsurpantur. In his præstant Italica: vti Falernum, Surrentinum, Cæcubum, & permulta alia è Campano agro, itémque Prætutianum, Adrianum & Siculum, quod Mamertinum appellatur. Ex Græcis, Chium, Lesbium & Phygelites, quod in Epheso gignitur.

V. quidam scribi. Marc. sion legẽdum suspicatur: quo modo etiam legisse videtur Ruellius.

V. ἀμπελίτης

V. σπογγιὰς

Crassa verò & nigra, stomacho aliena sunt, flatúsque pariunt: attamen corpus augent. Tenuia autem & austera, stomacho quidem prosunt, sed carnes minùs alunt. At quę sunt valde vetera, tenuia & candida, vehementiùs vrinas ciunt, & dolores capitis inferunt, neruosúmque genus largiùs pota tentant. In media ætate, vt à septimo anno, potui saluberrima sunt. Modus autem pro ætate, anni tempestate, consuetudine & qualitate vini decernatur. Optimè verò præcipitur, vt ne litis immodica toleretur, & tantum potionis adhibeatur, quantum proluendis cibis sat sit. Siquidem ebrietas omnis, maximéque iugis frequentiórve, pernicioſa. Enimuerò largior perpotatio neruos obsessos indies remittere, morborúmque acutorum initia quotidie introducere consueuit. Attamen moderatè aliquot diebus vino indulgere, maximéque post aquæ potum, vtile. Ita nanque modo quodá quæ sub sensum deinde cadunt recrementa ex alto euocantur, & per cęca corporis spiracula repurgantur. Sed illi perpotationis aquam superbibere par est: siquidem medicationis alicuius gratia factę ex composito temulentiæ remedium affert.

A Ὁ δὲ παχεῖς καὶ μέλανες κακοστόμαχοι, φυσώδεις, σφικὸς μᾶλλον ἡμιπτικοί. Ὁ μὲν τοι λεπτοὶ καὶ αὐστηροὶ, εὐστόμαχοι, ἧττον δὲ σαρκοποιοί. οὐρητικώτεροι δὲ καὶ κεφαλαγικοὶ Ὁ σφόδρα παλαιοὶ καὶ λεπτοὶ καὶ λευκοὶ, ἄπονται δὲ τῶν νευρώδεις πλεοναζόντες. οἱ μέσοι δὲ τῇ ἡλικίας, ἄριστοι πρὸς πόσιν. ὡς οἱ ἀπὸ ζ' ἐτῶν. ἡ δὲ ποσότης, πρὸς τὴν ἡλικίας καὶ τὴν τοῦ ἔτους ὥρας, καὶ ἕξιν καὶ ποιότητα τοῦ οἴνου, ὁρίζέσθω. καὶ τὸ μὴ διψῆν δὲ ἄριστόν ἐστι παραίτιγμα, καὶ ὁ μετρίως βεβρεχθὼς τοῦ ὕδατος μέθη δὲ πᾶσα, καὶ μάλιστα ἡ συνεχὴς, ἐπιβλαβὴς· πάντα γὰρ νοῦσα πολυρροιμβδα καθ' ἑκάστην ἀναδίδωσι, καὶ παθῶν ὀξέων ἀρχὰς ἐμποιεῖ καθημέραι ἡ πολυποσία. μετρίως δὲ οἰνωθῆναι ἐπὶ πινομένῃ ἡμέρᾳ, καὶ μάλιστα ἐπὶ ὑδροποσίας, εὐφύιμον· μεταστομοῦσθαι γάρ πως, ἅς τε αἰσθήσεις αἰσχαθαίρει ἐκκρίσεις, καὶ ἀδήλως παροπτᾶν. δεῖ μέντοι γε μετ' ὀλίγον ὕδωρ πίνειν· ἀπαλλαξίας γὰρ ἥκιστα τῆς συγκεκριμένης οἰνώσεως, ὅπου ἐπάγεσθαι.

B C D

De vino Omphacite. Cap. XII.

Πεϱὶ Ὀμφακίτου οἴνου. Κεφ. ιβ'.

VINVM quod Omphacites appellatur, peculiariter fit in Lesbo, vua nondum planè matura, sed adhuc acerba, ad tres quatuórve dies in eratibus siccata Sole, donec racemi in rugas cõtrahantur. Ex iis postquam expressum est vinum, cadis *insolatur. Vim habet astringendi, stomacho amicam, & malacia laborantibus, ileosis, ægrè concoquẽtibus & stomachi dissolutione vexatis vtilem. Creditur & absorptũ pestilẽtibus affectibus auxiliari. Cęterùm huiusmodi vina non nisi post annos complures potui apta sunt.

Ὁ δὲ καλούμενος Ὀμφακίτης σκυάζεται ἰδίως ὁ Λέσβῳ, ἡλιοπεδιζόμενος μήπω τὴν πόμπα πεπειρω τῆς σταφυλῆς ὕσης, ἐπὶ ἡμέρας γ' ἢ δ'. ἕως αὐ ῥυσωθῶσιν οἱ βότρυες, καὶ μετ' ὀλίγον ἐκθλιβῆναι ἡλιάζεσθαι. εἶτα πεφαμμένοις οἴνος. Στυπτικὸν ἔχει τὴν δύναμιν καὶ βύσμαχον, καὶ κατώδυνον καὶ εἰλεώδεσι, καὶ τοῖς δυσπέπτοις ἅμα ἐκλελυμένοις τὸ στόμαχον ἀρμόζουσαν· δοκεῖ δὲ καὶ λοιμικοῖς ἀφεστῶσι βοηθεῖν καταῤῥοφούμενος. χρήζουσι δὲ οἱ τοιοῦτοι οἴνου ἐτῶν· πλεόνων ἄλλως γὰρ οὐκ εἰσὶ πότιμοι.

E F

De vino secundario & adynamo. Cap. XIII.

Πεϱὶ Δευτερείας καὶ ἀδυνάμου. Κεφ. ιγ'.

LORA, quam Græci deuterian, alij potimon appellant, paratur hunc in modum. In vinacea è quibus vini triginta metretæ expressæ fuerint, tres aquę metretas adiicito: ac vbi vinacea ipsa versaueris calcaueríſque, exprimito: expressum decoque ad tertias partes, & in singulos

Ὁ δὲ καλούμενος δευτερείας, ὃν ἔνιοι πότιμον καλοῦσι, σκυάζεται τῷδε τῷ τρόπῳ· εἰς τὰ σύμφυλα, ὧν ἐξεθλιψας οἴνου μετρήσας λ'. ἐπίχεε ὕδατος μετρήσας γ'. καὶ μίξας καὶ πατήσας ἐκθλιψον, καὶ ἀφέψησον εἰς τὸ τέταρτον. ἕψει δὲ ἐκάστῳ τῷ

G

ὑποπλεφλίνταν μετρητὴν μίξον οἴνου ξέ- A
στας ϛ'. καὶ μετὰ ἡμέρα ἁλὸς χοᾶς δύο εἰς χε-
ράμια. χρῶ δὲ αὐτῷ μετ' ὀλιγοτὸν πα-
χέος γὰρ ἐξίπλεως γίνεται. ἁρμόζει δὲ ἐφ'
οἷς διατάζουσιν οἶνον διδόναι, αἰσχαζόμε-
νοι δι' ὀκνηρίαν τῶν νοσούντων, καὶ ἔτι τῶν
νόσων αἰσλαμβανόντων χρονίως. Γίνε-
ται δὲ καὶ ἀδυνάμως λεγόμενος, τινὰ αὐτῶν ἔ- B
χοντα τὴν δυνατικὴν δυνάμιν. δεῖ δὲ ὅσον μι-
κρὸν ὕδατος τὰ τῶν γλυκέων μίγματα, ἑ-
ψῆσαι πρὸς πυρὶ μαλακῷ, ἄχρις αὖ
ἐξατμισθῇ τὸ ὕδωρ καὶ μετὰ τοῦτο ψύξαν-
τα, καταγλίζειν εἰς ἀγγεῖον πιπασμένον.
ἔνιοι δὲ θαλάσσης πλαγίας καὶ ὕδατος
ὀμβρίου καὶ μέλιτος καὶ γλυκέως ἴσα μί-
ξαντες καὶ καταγλίσαντες, ἡλιάζουσιν ἐ- C
πὶ ἡμέρας μ'. χρῶνται δὲ αὐτῷ πρὸς τὰ
αὐτὰ μετ' ὀλιγοτόν.

Περὶ Οἴνου ἐκ τῆς ἀλφίτου ζαφυλῆς.

Κεφ. ιϛ'.

Ὁ δὲ ἐκ τῆς ἀλφίτου ζαφυλῆς μέλας,
στυπτικὸς ὑποδάκνων, ἁρμόζει κοιλίᾳ
ῥευματιζομένῃ, & στομάχῳ· καὶ πρὸς τὰ D
αὐτὰ ὅσπερ σύψεως καὶ στολῆς χρείᾳ.

Περὶ Μελιτίτου οἴνου. Κεφ. ιε'.

Οἶνος Μελιτίτης δίδοται μὲν ἐν χρο-
νίοις πυρετοῖς, ἀσθενῆ στόμαχον ἔχου-
σιν· ὑπομαλάττει γὰρ τὴν κοιλίαν, ὑέρα
κινεῖ, στόμαχον ἀποκαθαίρει· ἁρμόζει καὶ
ἀρθριτικοῖς, καὶ νεφριτικοῖς, καὶ τοῖς ἀ- E
σθενῆ τὴν κεφαλὴν ἔχουσι· χρήσιμος δὲ καὶ
γυναιξὶν ὑδροποτούσαις· εὐώδης γάρ ἐστι
καὶ θρεπτικός. Παραφέρει δὲ τοῦ οἰνομέλιτος,
ὅτι ἐκ μὲν δὲ αὐσηροῦ οἴνου & παλαιοῦ
καὶ ὀλίγου μέλιτος σκυβάζει. ὁ δὲ μελι-
πίτης ποιεῖται. χοᾶς αὐσηροῦ γλυκέος,
μέλιτος χοᾶν ἕνα, & ἁλὸς κύαθον ἕνα. σκυ-
βάζειν δὲ δεῖ ἐν μεγάλῳ ἀγγείῳ, ἵνα τόπον
ἔχῃ πρὸς τὸ ἐκζεῖν, πολλαπάσσοντα
τῷ προφερομένῳ ἁλὸς κατ' ὀλίγον, ἄχρις
ἂν ἐκζέσῃ· παυσαμένου δέ, καταγλίζειν
εἰς ἕτερα χεράμια.

Περὶ Οἰνομέλιτος. Κεφ. ιϛ'. G

Οἰνόμελι δὲ παραφέρει, ὃ ἐκ τοῦ
παλαιοῦ οἴνου καὶ αὐσηροῦ καὶ μέλιτος
καλοῦ γινόμενον. ἥδιον γὰρ πνεύματι καὶ

residui congios salis binos sextarios addito, ac post hyemē in cados defundito. Eo post annum vtitor: celeriter enim exoleſcit. Conuenit porro ægris, quibus vinum propinare dubitamus, & cogimur tamen ipſorum deſideriis obtemperare: itémque à longa valetudine ſeſe recolligentibus. Fit & vinum quod vocant adynamon, viribus iiſdem quibus lora præditum. Pares aquæ & muſti menſuræ leniter ac lento igne feruefiunt, dum excoquatur aqua: reliquum vbi refrixerit, in vas picatum transfunditur. Alij aquæ marinæ & pluuiæ, & mellis atque muſti pares miſcent portiones, elutriant, & in ſole quadraginta diebus torrent. Huiuſmodi potu ad eadem illa omnia poſt annum vtuntur.

De Vino è labruſca expreſſo. Cap. XIIII.

VINVM è labruſca nigrum aſtringit: proindéque prodeſt alui ſtomachíque fluxionibus, & ad cætera valet quæ aſtrictionem contractionémque deſiderant.

De Vino Melitite. Cap. XV.

VINVM Melitites datur in longis febribus, iis qui ſtomacho ſunt imbecilli: leuiter enim aluum emollit, vrinas ciet ac ſtomachum expurgat. Prodeſt & articulario morbo obnoxijs, nephriticis & * capitis infirmitate laborantibus: vtile quoque mulieribus * aquam potantibus: ſiquidem odoratum eſt, corporáque alit. Diſtat à mulſo, quoniam fit illud è vino auſtero ac vetere & melle exiguo: melitites autem, adiecto ad quinque congios auſteri muſti mellis congio, & ſalis cyatho. Porrò in magno vaſe fieri ipſum oportet, quò locus amplior ad vehementer efferueſcendum pateat, antedicto ſale ſenſim aſperſo, quandiu efferbuerit: ac vbi feruere deſierit, in cados alios transfunditur.

* Plautus.
* Pl. vini abſti nentes.

De Mulſo. Cap. XVI.

MVLSVM præfertur, quod ex vetere vino auſtéroque & bono melle factum eſt. Tale ſiquidē mi-

nùs inflat, & celeriter in vsum vo-
nit. Ac vetus quidem corpus alit:
quod medię est ętatis, aluo vtile est,
vrinámque pellit. Sed à summo ci-
bo sumptum, nocet: inter initia ve-
rò potum, stomachum implet, dein-
déque tamen appetẽdi auiditatem
reuocat. Fit multum vt plurimum,
duabus vini metretis admixta vna
mellis. Aliqui quo prõptiùs perfici
exhiberique possit, mel cum vino
coquunt, atque ita transfundunt: Ali-
ij impensæ parcentes ad musti fer-
uentis sextarios sex vnum mellis
adiiciunt, ac vbi ferbuerit, elutriant:
dulce autem permanet.

De Aqua mulsa. Cap. XVII.

AQVA mulsa eadem quas mul-
sum vires obtinet. Cruda vti-
mur, cùm ventrem mollire volu-
mus, aut etiam vomitiones inuita-
re: quemadmodum facimus ijs qui
venena hauserunt, ipsum addito o-
leo propinantes. Decoctam verò
exhibemus exilis languidique pul-
sus hominibus ac infirmis, tussien-
tibus, peripneumonicis & iis qui
immodico sudore digeruntur. In-
ueterata condititiáque, quam aliqui
Hydromel propriè vocant, dum
mediæ est ætatis, loræ & adynamo
vino in recreandis viribus respon-
det, similémque vim adipiscitur:
quare iis qui membri alicuius in-
flammatione laborant magis quàm
lora ipsa accommodata est. Quę ve-
rò vetustior est, in partium inflam-
mationibus, aluóque astricta dam-
natur: at laborantibus ex stoma-
cho, aut cibum fastidientibus, suda-
toribúsve conuenit. Conficitur
porrò duabus aquæ cœlestis veteris
partibus ad vnam mellis adiectis &
insolatis: alij fontanam aquam mi-
scẽt, & ad tertias partes decoquunt,
atque ita recondunt. Nec desunt
qui Hydromelitis appellationem
tribuant Apomelini, quod elotis a-
qua fauis confici seruarique solet.
Id verò etiam meracius confici o-
portet: aliqui & ipsum coquunt. Æ-
grotantium potui minimè aptum
est, quoniam ceraginis plurimum
sibi vendicat.

De Aqua. Cap. XVIII.

DE aquis in vniuersum decerne-
re propter locorum proprieta-

Ταχέως παείσαται δὲ τοιοῦτον. ἔστι δὲ ὃ μὲν παλαιὸν, θρεπτικὸν δὲ ἧττον, διουρητικὸν· βλαπτικὸν δὲ, ὅτι τοῖς ἀπὸ λιπαρῆς πονοῦσιν δίψος ἐν ἀρχῇ, πλησμονὴν ὄρεξιν δὲ μετὰ ταῦτα κινεῖ. σκυβάλους δὲ πρὸς δύο μετρητὰς ὡς ὅτι τοπολὺ οἴνου, ἑνὸς μετρητοῦ μέλιτος μιγνυμένου. ⓐ δὲ, ὅταν τὸν αὐτὸν τρόπον ἑψήσωσι, μειοῦται τὸ μέλι τοῦ οἴνου· καὶ ὅταν παγλίζουσιν εἶναι δὲ λεπτύνεσθαι, γλυκύτης ζέουσα ξέσας ἐπιπολάζει· ἀμύητος μιγνύοντες, μετὰ τὸ ἀποζέσαι παγλίζουσι. μᾶλλον δὲ γλυκύ.

Περὶ Μήκωνος. Κεφ. ξ.

ΜΕΛΙΚΡΑΤΟΝ δὲ τὸν αὐτὸν τοῦ οἰνομέλιτι δυνάμιν κέκτηται· χρώμεθα δὲ τοῦ ἀφεψημένου, ὅταν ὦμεν κοιλίας μαλάξαι βουλόμενοι, ἢ ἔμετον κινῆσαι, ὡς ὅτι ἧττον θερμαίνει πεπεμμένον, διδόντες αὐτὸ μετ' ἐλαίου τοῦ δι' ὀξυφαρμάκου, ὅτι ἧττον μικροσφύκτων καὶ ἀσθενῶν καὶ πνευστικῶν καὶ περιπνευμονικῶν καὶ διαφορουμένων. Τὸ δὲ σκληρυῦν καὶ ἀποξηραῖνον, ὃ ἴδιόν ἐστι ὑδρομέλιτος καὶ ἡδονῆς, μᾶλλον αὐτὸ τῇ ἡλικίᾳ ὑπάρχει, αἱ λοιπαὶ τοῦ δυνατείας καὶ ἀδυναμίαι οἴνου, ὅσον ὅτι ἐν ταῖς δυνάμεσιν αἰσχυνόμενον ὅλον ὅτι ἧττον φλεγμαίνονται ἢ μέρος, ὅσῳ αὖ πλέον τῆς δώσεως. Τὸ δὲ παλαιότερον, ἀδύκιμον ὅτι ἧττον φλεγμαινόντων καὶ στρογγύλον ὅτι δὲ ἧττον σώματος πεπονθότων ἢ ἀνορέκτων ἐν ἀφορουμένοις, ὅτι τάχιον. Σκυβάζεται δὲ, ὅταν ἐν μέλιτος μέρος, δυοῖν ὕδατος ὀμβρίου παλαιοῦ μιγνυμένου, καὶ ἁλιαζομένου. ⓐ δὲ, πηγαῖον μίξαντες, ἀφεψοῦσιν εἰς τὸ τέταρτον, καὶ ἀποπίνουσι· καλοῦσι δέ τινες καὶ ὑδρομέλιτος ἐκ πλυνομένων τὸ χηλίων ὕδατι σκυβαζόμενον ὑδρόμελι, καὶ ἀποπλύνον. ὅτι δὲ αὐτὸ ἐκ τοῦ ἀφεψεῖν ποιεῖν. ⓐ δὲ, καὶ τοῦτο ἔφασαν. ἔστι δὲ ἄλλον ὅτι ποσοῦτον, ἀφ' ὃ πλεῖστον ἔχει κεφαλήμων.

Περὶ Ὕδατος. Κεφ. ν'.

ΥΔΑΤΟΣ τὸ μὲν ὡς ἐν τοῦ καθόλου ὅτι κεῖσιν δυσχερῆ ἔχει, ἀφ' ὃ τοῖς πό-

Lac legit in vc. olim.

Lac legit in vc. mi desiderio.

Sanè legit μαλάττειν.

Lac legit in vc. olim.

huiusmodi quidem cõfectura moderatior mitiórque est ipsa aqua marina.

De Aceto. C. XXI.

ACETVM refrigerat & astringit, stomacho est vtile, & appetentiam cibi excitat: erumpentem vndecunque sanguinem potu infestúve sistit: prodest alui fluxionibus, cum cibariis coctum: cruentis vulneribus idoneum est, ac inflammationes arcet, in succidis lanis aut spongiis impositum. Reprimit & procidẽtia sedis vuluæq; item gingiuas abscedentes & sanguine manantes. Est etiam efficax ad nomas, erysipelata, herpetas, lepras, lichenas & pterygia, si cum aliquo conuenienti misceatur: phagedænas vlcerum nomásque fotu continuo cohibet: podagricis calido fotu, cũ sulphure auxiliatur: fugillata tollit, cum melle inũctum. Contra capitis ardores, cum rosaceo in succidis velleribus aut spongia imponitur. Ad hydropem, auditum difficilem, auriúmque sonitus ac sibilos, feruentis vapor proficit: earundem quoque vermes instillatum necat. Panos coercet tepidi fotus, aut si imbuta eo spongia admoueatur: & pruritus permulcet. Contra venenatorum morsus, quæ refrigerando nocent, calidi fotus prodest: vti frigidi, contra eorum ictus quæ exurens virus eiaculantur. Calidum potũ atq; vomitionibus redditum, aduersus omnia venena efficax est: ac præsertim contra hausturn meconium cicutáinve, sanguinem in ventriculo conglobatum, lac ibidem coagulatum, fungos, ixiam, taxúmque, cum sale. Hausto voratas hirudines, si forbeatur, eiicit: tussim veterem mitigat, & recentem lacessit. In orthopnœa, calidum cõmodè forbetur. Sed & gutturis fluxiones gargarizatum inhibet: anginis & laxatæ columellæ conuenit: necnõ & calidum contra dentium dolorem colluitur.

De Oxymelite C. XXII.

ACETVM mulsum, quod oxymel vocant, hoc modo temperatur:

A ταγχίζουσι· μετεωρίζουσι δὲ γίνεται καὶ ἀποπνιγόμενον· διϊσχίζουσι τὸ πιοῦσαν τῆς θαλάσσης.

Περὶ Ὄξους. Κεφ. κα'.

ΟΞΟΣ ψύχει δὲ φύσει, βύσσμα χόν τε ὄν καὶ βύσσεκτικόν, γαλπτικόν τε αἱμορραγίας πάσης, πινόμενόν τε καὶ ἐγκαθιζόμενον καὶ ὑπὸ ῥευμάτων χειλίας σπωμένου· B τοῦ ταῖς ὀφθαλμίαις ἁρμόζει· βαιμόν τε ὄν δὲ ἀφλέγμαντον, σὺν ἐρίοις οἰσυπηροῖς ἢ σπόγγοις ὑπιτιθέμενον. φύλλα καὶ ὕσσωπον καὶ ἕδραν περιπλοκῆς· καὶ οὖλα ἀφεστῶτα καὶ αἱμορραγοῦντα· πρός τε νομὰς καὶ ἐρυσιπέλατα, ἕρπητας, λέπρας, λειχῆνας, πτερύγια, σὺν πηγανίνῳ ὑπιτιθέμενον. Φαγεδαινικά τε ἕλκη, C συνεχῶς ἐπιθυλεύμενον, καὶ νομὰς ἴσχει· σὺν ὀφελεῖ καὶ ποδαγρικοὺς καταθυλεύμενον θερμὸν μετὰ θείου. ὑπώπιά τε αἴρει, σὺν μέλιτι καταχριόμενον· πρός τε τὰς ἐγκαύσεις τῆς κεφαλῆς, σὺν ῥοδίνῳ καὶ οἰσυπηροῖς ἐρίοις ἢ σπόγγῳ· ὑδρωπικούς τε δυσηκόους ὑπατμιζόμενον θερμὸν ὠφε- D λεῖ, καὶ ἤχους καὶ συριγμοὺς ἐσταζόμενον, κτείνει σὺν τὸ ὠὸν σκώληκας. φύλλα καὶ φύγελλα, χλιαρὸν καταθυλεύμενα, ἢ μετὰ σπόγγων ὑπιτιθέμενα, καὶ κοπωμοὺς πραΰνει. πρός τε θηρίων δήγματα ὅσα ψύχει, καταθύλημα θερμὸν· ψυχρὸν E δ', πρὸς πυρῶσιν τῶν ἰοβόλων· ποιεῖ δὲ πρός τε θανάσιμα πώματα, πινόμενον θερμὸν δὲ ἐξεμούμενον, μάλιστα πρὸς μηκωνείου καὶ κωνείου πόσιν, καὶ αἵματος καὶ γάλακτος θρόμβωσιν ἐν κοιλίᾳ, πρός τε μύκητας καὶ ἰξίαν καὶ σμίλακα, σὺν ἁλσί. βδέλλας τε πεπωκυίας καταῤῥοφούμενον ἀποβάλλει· δὲ βῆχα χρονίαν παραύει, τὴν δὲ πρόσφατον ἐρεθίζει. δὲ μύζει δὲ καὶ πρὸς ὀρθόπνοιαν, θερμὸν καταῤῥοφούμενον· φύλλει δὲ ἀναγαργαριζόμενον καὶ τὰ ἐν τῷ στόματι ῥεύματα, στωμυλικοῖς τε ἁρμόζει, καὶ πρὸς κιρσίδα καὶ χαλασμένην καὶ πρὸς ὀδόντων πόνον, θερμὸν ἐγκαλυζόμενον.

Περὶ Ὀξυμέλιτος. Κεφ. κβ'.

ΟΞΥΜΕΛΙ σκευάζεται οὕτω· λαβὼν ὄξους κοτύλας ε. καὶ ἁλὸς θαλασσίου

μυαῦ μίαν, μέλιτος μνᾶς ί. ὕδατος κοτύλας ί. μίξας ἕψησον, ἄχρις οὗ δικάκις ἀναβράσῃ. καὶ ψύξας καταγλίσον. Δοκεῖ δὲ λαμβανόμενον πάσχε ἄγαν, ὠφελῆσαι ἰσχιαδικοὺς, καὶ ἀρθριτικοὺς καὶ ἐπιληπτικούς.

Cora n retinet καὶ

ἀρκεῖ δὲ καὶ πρὸς τὰ ἐκ τοῦ ἐχίδνης τῆς τῶν καλουμένων σπετῶν δηχθέσι, καὶ τοῖς μηκώνειον ἢ ἰξίαν πιοῦσιν. ἀναγλύφει δὲ καὶ συναγχικοῖς ὠφέλιμον.

A Aceti heminas quinque, salis marini minam vnam, mellis minas decẽ & aquæ sextarios quinque pariter coquito, dum decies efferbuerint: mox vbi refrixerint, diffundito. Cõstat porrò sumptum crassos humores extrahere, atque ischiadicis, arthriticis & comitialibus opitulari. Est & auxilio cõtra morsum viperę & lacertæ quam sepa vocant, itémque contra haustum meconium, ixiámve. Anginis denique vtiliter gargarizatur.

Περὶ Ὀξάλμης. Κεφ. κγ'.

De Oxalme. C. XXII.

ΟΞΑΛΜΗ ὠφελεῖ κατὰ πλυομένη τοὺς νομὰς, σηπεδόνας, νεώδη ἕλκη, καὶ τὰ ἀπὸ τῶν ἰοβόλων δήγματα. γίνεται δὲ καὶ τοῖς ὑπὸ τῶν λιθοτομηθέντων αἱμορραγίας, βύσσους μὲν τῷ χειρουργίᾳ θερμὴ ἐγκλυζομένη, καὶ ἕδραν περιπλωκῦας· ἐγκλύζεται δὲ ὅτι τῶν μὲν νομῶν δυσιπεικῶν διὸ ἐπεγχυματίζειν γάλακτι. καταῤῥοφουμένη δὲ καὶ ἀναγλαριζομένη, ὀδόντας κινήσεις σμηχὰ δὲ καὶ κίνυρα καὶ ἀχῶρας.

C Loc. addit. ex v. cod. περὶ ὀξυμέλιτος.

A Cetvm salsum seu acida muria, quam oxalmen vocant, fotu cõtra nomas, putrida vlcera, canum morsus & venenatos ictus, auxiliatur. Sistit & sanguinis eruptiones quę post excisos calculos eueniunt, siquidem post operationem statim calida in vulnus infundatur: ac prociduam sedem reprimit. Dysentericis etiamnum si nomas sentiant, infunditur: at oportet illico post lac insuper infundere. Hirudines eadẽ sorbitione & gargarizatu necat: furfures denique & manantia capitis vlcera exterget.

Περὶ Θυμοξάλμης. Κεφ. κδ'.

De Thymoxalme. Cap. XXIIII.

ΘΥΜΟΞΑΛΜΗ, ἣν ἐχρῶντο οἱ ἀρχαῖοι ὅτι τῶν ἀσθενῆ τὸ στόμαχον ἐχόντων, καὶ πρὸς ἃ πλατέρυγας κυάθους τοῖς ὕδωρ θερμὸν περιπώτης, καὶ ὅτι ἀρθριτικῶν καὶ πνευματουμένων. ἄγει δὲ πάχεα καὶ μέλαινα. σκευάζεται δὲ οὕτω. θύμου λείου ὀξυβαφον, ἁλὸς ἴσον, ὑσσώπου, πηγάνου, γλήχωνος, ἑκάστου ὀλίγον, βαλὼν εἰς ἄγγος, ὅπου χεῖ ὕδατος κοτύλας ς'. ὄξους ἡμικοτύλιον, καθεψήσας τι ὀλίγον ἀφαιρίζε.

D Thymoxalme Veteres vtebantur, dabántque laborantibus imbecillitate stomachi, itémq; arthriticis & inflatione vexatis, ternos quaternósve cyathos aqua calida dilutos: humores crassos atrosq; trahit. Hoc verò modo fit: Thymi triti acetabulum, salis idem modus, polentæ, rutæ, pulegi, singulorum exiguę portiones in vas coniiciuntur, & aquę terni sextarij, aceti totidem cyathi affunduntur, atque circumpolito linteo sub dio exponuntur.

Defunt in Am. & ad nostra usq; sententiam.

E

Περὶ Σκιλλητικοῦ ὄξους. Κεφ. κε'.

De aceto Scillino. Cap. XXV.

ΤΟ δὲ Σκιλλητικὸν ὄξος σκευάζεται τῷδε τῷ τρόπῳ καθάρας λευκὴν σκίλλαν ἐκκόπτεται καὶ διείρας λίνῳ ὡς τὰ μάλιστα τοὺς τόμους ἀλλήλων, ξηράνας ἐν σκιᾷ ὅτι ἡμέρας μ', λαβὼν μνᾶς μίαν ἐξ αὐτῆς καθεὶς εἰς ξέστας ὄξους καλοῦ ιβ. ἄφες τὴν ἡλίῳ ἡμέρας ζ. βρέχεσθαι, τυμπάσας τὸ ἀγγεῖον ἐπιμελῶς· μετὰ δὲ ταῦτα ἀνελόμενος τὴν σκίλλαν καὶ ἐκπιέσας, αὐτὴν μὲν ῥῖψον· τὸ δὲ ὄξος ἁλίσας, καταχύζε καὶ ἀποθοῦ. ἔνιοι δὲ μετὰ τοῦ ὄξους ξέστας ε. ἐκπιέσαντες διηθοῦσι καὶ ἀποτιθέασιν.

F Scillinvm acetum hoc paratur modo: Expurgatam scillã quę candida sit concidito, sectásque taleolas lino traiectas modicis interuallis, vt ne se cõtingant, suspendito, atque ita siccato in vmbra quadraginta diebus. Earũ minã in aceti boni sextarios duodecim immergito, & vase diligenter operculato septenis diebus in sole macerari finito: postea scillam extimito, & expressam abiicito: acetum verò percolatũ in vas diffundito atq; reponito. Aliqui scillæ minã vnã aceti sextariis

V. addit. quædã hic ex v. cod.

quinque amniſcent. Alij poſtquam extempore ſcillam repurgarũt citra exiccationem, parem eius menſuram adiiciunt, & ſenis menſibus macerari patiuntur. Ac tale quidẽ acetum maiorem incidendi vim aſciſcit. Porrò Scillinum acetum gingiuas laxas & humore ſuperfluo prægnantes commodè aſtringit, caſdémque firmat: emotos dentes ſtabilit, putridis oris vlceribus & graueolentię egregiè medetur: fauces ſorbitione durat calloſásque reddit, vocem denique expedit, ac limpidam canoramq; facit. Sed & ſtomachicis, ægrè cibum cõcoquẽtibus, comitialibus, vertiginoſis, melancholicis & mente captis exhibetur. Datur & contra vuluarum ſtrangulationes, lienes prętumidos & iſchiada. Imbecillos admodum recreat: corporis ſalubritatem colorẽq; meliorẽ præſtat. Oculorũ quoque aciẽ exacuit, atq; tarditatẽ auriũm inſtillatione infuſionéve purgat. In ſumma ad omnia efficax eſt, præterquam ad internas exulcerationes, capitis dolores neruorúmq; vitia. Cæterùm datur quotidie ieiunis ſorbendum, inter initia quidem quãtitate exigua: ſed ea deinde paulatim augetur ad cyathum vſque. Nonnulli binos cyathos, aut etiam amplius, exhibent.

μίσγειν. ⓐ δὲ, αὐτὴν καθαίροντες δίχα τῦ ξηραίνειν, τὸν ταθμὸν ἴσον βάλλουσι, καὶ ἐῶσι μῆνας ς'. γίνε) δ' τὸ τοιῦτον τιμιώτερον. Εὔλυτεῖ δὲ διαφλυζόμενον τοὺς οὖλα μυδῶντα, ἕλκη τε τερῶδη οὐῶν αὐτά, καὶ ὀδόντας κινουμένους· καὶ ἅμα τὸ στόμα σπογγιὰς καὶ δυσωδίας ἰᾶται· καταρροφούμενον δὲ, τὸν τε βῆχα τρεῖ καὶ τυλώδη ποιεῖ, καὶ τὸν ἦχον βύπτει καὶ λαμπρὸν ἀποτελεῖ. παραλαμβάνεται δὲ πρὸς στομαχικοὺς καὶ δυσπνοϊκῶς, ὀπιληπτικοὺς, σκοτοδινιῶντας, μελαγχολικοὺς, ἀπηλιθωμένους· ἔτι δὲ καὶ πρὸς ὑστερικὰς πνίγας, καὶ σπλῆνας ὑπερόγκους καὶ ἰσχιάδας· ἀναλαμβάνει δὲ καὶ θηλείας ἀθενεῖς· καὶ τὸ σῶμα ὑγιεινὸν καὶ εὔχροον καθασκευάζει. ἔστι δὲ καὶ ὀξυδερκές· καὶ πρὸς δυσκοίλους ὑσταλῶν δυνατὸν, ἐὰν ὑ ἐγχριματίζηται. καὶ καθόλου πρὸς ἅπαντα ὑγιεινῆ, πλὴν ἑλκώσεων τῶν ἔντος, κεφαλαλγιῶν καὶ ἐνδειξῶν. δίδου δὲ καθ' ἡμέραν ῥοφεῖν νήστει πλὴν μιᾶς ἐγχυλὴ φλίγου, καταβεβρεγὼ δὲ προσαύξειν ἄχρι κυάθου. πίνες δὲ κυάθους β'. διδόασι δὲ καὶ πλείους.

Drug. exempl. περιττῶν.

Περὶ Σκιλλιτικοῦ οἴνου.

Κεφ. κς'.

ΓΙΤ & ἐ Scilla vinum hoc modo: Diſſectam, vti dictum eſt, ſcillam ſole aſſiccato, dein contuſam eius minã tenui cribro incernito, & linteo raro illigatam in vicenos ſextarios muſti recentis ac boni demergito: atque vbi trimeſtri ſpatio maduerit, elutriatum vinum obſtructo diligẽter vaſe recõdito. Licet quoque humida ſcilla vti, in orbiculos rapi modo diſſecta, ſed duplicato pondere. Cæterùm vinum id quadraginta diebus inſolari oportet, & valde inueteraſcere. Sed & inſuper alia eſt antedicti vini parandi ratio. Scilicet Scillæ diſſectæ ac repurgatæ minæ tres in muſti boni metretam Italicum adiiciuntur, & ſenos menſes vaſe obſtructo macerari ſinuntur: poſt id tempus defæcatum transfuſúmque vinum reconditur. Vtile porrò eſt cõtra cru-

Ε ⟨⟩ Δε ἀπὸ τῆς Σκίλλης οἶνος γίνεται οὕτως· καταπτυῶν ὡς εἴρηκα πλὴν σκίλλαν, ξήρανον ἐν ἡλίῳ, ἔπειτα χύψας αὐτῆς μνᾶν μίαν καὶ διαπόησας λεπτῷ κοσκίνῳ, ἐνδῦσον ὀθονίῳ ἀραιῷ, καὶ κάθες εἰς ὑγιεινὸς καλοῦ καὶ παλαιοῦ ἀμφορέως ξέστας κ'. πείμπλει τε ἕως ἐγχλιῶσι. μετὰ δὲ ταῦτα μετενέγκας τὸν οἶνον εἰς ἕτερον ἀγγεῖον, ἀπόδου ἀφεψησάμενον ὑπομέλιτος. ἔνεστι δὲ καὶ ὑγρᾷ τῇ σκίλλῃ χρῆσθαι, ὑπερτίθεντα αὐτὴν γογγυλίδος δίκην, καὶ πλὴν ἕλκεσι διπλασιάσαντα· δεῖ δὲ ἡλιάζειν ὑπὲρ ἡμέρας μ'. καὶ παλαιοῦν ἄγαν. Εὖ δὲ καὶ οὕτω σκευάζεται ὁ παρειρημένος οἶνος· λαβὼν σκίλλης ὑπερτιμωμένης καὶ κεκαθαρμένης μνᾶς γ'. κάθες εἰς ὑγιεινοῦ μετρητοῦ Γαλατικοῦ, καὶ μῆνας ἐξ ἔασον πωμάσας, εἶτα ὑλίσας καὶ μετενέγκας ἀπόδου. Εὔλυτεῖ δὲ πρὸς ἀπε-

Vinum Scillinum.

Fit & è Scilla vinum hoc modo: Diſſectam, vti dictum eſt, ſcillam ſole aſſiccato, dein contuſam eius minã tenui cribro incernito, & linteo raro illigatam in vicenos ſextarios muſti recentis ac boni demergito: atque vbi trimeſtri ſpatio maduerit, elutriatum vinum obſtructo diligẽter vaſe recõdito. Licet quoque humida ſcilla vti, in orbiculos rapi modo diſſecta, ſed duplicato pondere. Cæterùm vinum id quadraginta diebus inſolari oportet, & valde inueteraſcere. Sed & inſuper alia eſt antedicti vini parandi ratio. Scilicet Scillæ diſſectæ ac repurgatæ minæ tres in muſti boni metretam Italicum adiiciuntur, & ſenos menſes vaſe obſtructo macerari ſinuntur: poſt id tempus defæcatum transfuſúmque vinum reconditur. Vtile porrò eſt cõtra cru-

ψίας ἢ ἀχλυώδεις ἕξεως, καὶ τοὺς ἀπὸ μυῶν τῶν τοιούτων ἐφ' ὧν τι πάχος χιλίας καθάρσεται ἢ σησαμόχρως. πολυικοῖς δὲ καὶ χολικοῖς, ἢ σπληνικοῖς, ἢ ὑδρωπικοῖς, ἰκτερικοῖς, δυσουρικοῖς, στραγγουριώδεσι, πνευματωδέσι, παραλυτικοῖς, ῥίγεσι χρονίοις, σκοτωματικοῖς, ἀπόσμασι καταμηνίων τὰ ἀγωγὰ ἔχουσι δι' ὑδέρα λυπεῖ. ἀμείνων δ' ὁ παλαιότερος. φυλάσσεται δ' ἐπὶ ἔτη τὸ χρῆσιν ἔν τι πυρετοῖς, καὶ ὅτι τῶν ἐντὸς ἐχόντων ἕλκος.

A dilates & ciborum corruptiones: ité iis qui cibum reuomunt, necnon & iis quorum ventrem ſtomachúm ve craſſi humores obſederint. Prodeſt & lienoſis, habitu malo prędítis, hydropicis, regio morbo & vrinæ difficultate laborantibus, torminoſis, inflatione vexatis, paralyticis, diuturnis rigoribus, vertiginoſis atque B cõuulſis. Mẽſes deniq; pellit, minimeq; neruos infeſtat. Fit porrò vinũ eiuſmodi vetuſtate meli°. Sed cauẽdus ipſi° vſus tũ in febribus, tũ & in exulcerationibus interaneorum.

Περὶ Θαλασσίου οἴνου. Κεφ. κζ.

De vinis aqua marina factis.

Cap. XXVII.

Οἱ δὲ ἀφ' ἁλὸς οἶνοι ποικίλως σκευάζονται· εἰ μὲν γὰρ βύβλους αὖται μὴ τὸ πνιγηθεῖσαι ἢ σαφυλίῳ, μιγνύουσι θαλασσαν. ἔνιοι δὲ καὶ ἐπιλεπιδίοισι, καὶ ὅτω παρδοι, μιγνύντες θαλασσαν. οἱ δὲ, σαφιδώσαντες ἢ σαφυλίῳ, ἐρίχουσι εἰς πίθους μὴ θαλάσσης, καὶ ὅτω παπωῖτις ἐκβλίβουσι. γίνεται δὲ ὁ τοῦτος γλυκύς. εἰ μὲν γε καὶς ἢ γιῦσι αὐστηρότεροι σκευάζοιντο, τοῦτοι καὶ ὑπὸς πυρετῶν καθαιρεῖ, εἰ μὴ παρῇεν ἀμείνους, καὶ ὑπὸς κοιλίας ὑπαγωγεῖ, καὶ ἐμπύους, σπληνικοῖς, καὶ ὅσοι ὑπὸ τῶν Αἰμιναίων φαύλων κεφαλῆς. καχεκτικοῖς μὲν τι καὶ οὗτοι, καὶ πνευμάτων ῥηκτικοί. Οὐκ ἄχρηστον δ' ὑποχάλαι νομίζομεν καὶς τὸ πλήρη τοῦ ἰσχνείου τοῖς φιλιπνεῦσι ῥιᾶσθαι, καὶ τοῦ τῶν ποικιλωτέρων οἴνων σκευασίαν· οὐχ ὅτι πολλή τις ὄντι ἢ ἀναγκαία ἡ χρῆσις αὐτῶν, ἀλλ' ἵνα μηδὲν αὐτῶν ἐλλείπειν δοκῶμεν. εἰσὶ δ' αὐτῶν ἔνιοι, ἔτι σπουδάζοντες εἰς τὴν χρῆσιν ἰσχνοὶ διὰ τὴν κυδωνίαν ἢ ἀπίαν καὶ μηλίαν, ἔτι δὲ καὶ ὁ ἀφ' ἡμύρτων σκευαζόμενος.

Addit Lac ex v. cod. καὶ ποικίλ-ως.

C Aliqui enim protinus vt decerptæ calcatæq; ſunt vuæ, aquá maris admiſcent: nõnulli priùs in cratibus vuas ſole ſiccant, iiſq; deinde calcatis mariná adiiciũt. Alij paſſas priùs vuas in doliis aqua marina macerát, móxq; calcatas exprimunt. Et eiuſmodi quidẽ vinũ dulce euadit. Quę tamẽ auſteriore guſtu tẽperátur, e- D tiá in febribus ſubſidio ſunt, ſiquidẽ meliora defuerint. Valent & ad aluum ſubducendam, proſúntque purulenta excreantibus, iiſque qui aluo ſunt dura, quique facilè ex vinorum Aminæorum vſu capite tentátur: attamen & huiuſmodi vina ſtomacho aduerſántur, flatúsque pariunt. Porrò quo plenioré habeant E hiſtoriam ij qui huius ſtudio tenentur, haud inutile duximus multiplices variè conficiendorum vinorum formulas infrà deſcribere: nõ quòd frequẽs aut neceſſarius eorum exiſtat vſus, ſed nequid omiſiſſe videamur, quod ad vinorum tractatum pertinet. Sunt autẽ ex factitiis illis nonnulla minoris operæ & laboris, F quæ tamẽ in vſum veniunt: vti quæ ex coroneis malis, pyris, filiquis, itémque myrti baccis concinnãtur.

Περὶ Κυδωνίτου οἴνου. Κεφ. κη.

De vino Cydonite. Cap. XXVIII.

Ὁ μὲν οὖν Κυδωνίτης, ὃν ἔνιοι μηλίτην καλοῦσι, σκευάζεται ὧδε· μήλων κυδωνίων ἐξελὼν τὸ σπέρμα, καὶ τρίψας ὡς γλυκίδα, εἰς μετρητὴν γλεύκους χάλασον μνᾶς ιβ'. καὶς ἡμέρας λ'. εἶτα διυλίσας ἀπόθου. σκευάζεται δὲ καὶ ὧδε· δεῖ μὲν τὸ κόψαι καὶ ἐκθλίψαι τὰ κυδώνια, τῷ χυλῷ τούτου μίξαι τοῖς ιβ'. ξέσας, ἕνα

Vtrum Græcus, Ai ſubdiſtinctas vel ſubtrahas. Al. ſubtrahas alij.

G Itaque Cydonites, quod alio nomine melites appellatur, ita fieri conſueuit: Mala cotonea exemptis ſeminibus fruſtatim raporum modo concidũtur, eaq; duodecim minarũ põdere in muſti metretam demittũtur, & inibi ad triginta dies eſſe ſinũtur: tãdem excolatum vinũ reponitur. Paratur & hoc modo: Ad ſucci cotoneorũ tuſorũ preſſorúmq; ſextarios duodenos, mellis ſextarios ſingulos

adiicere

adijcere oportet, atq; ita recōdere. Vinum id aſtringit, & ſtomacho vtile eſt: itémque prodeſt dyſentericis, hepaticis, nephriticis & ægrè meientibus.

De Melomelite. Cap. XXIX.

Melomeli, quod & Cydonomeli nominant, fit in hunc modum: Cotonea mala ſeminibus exemptis in tantam mellis copiá cōiiciuntur, vt eo ſubmerſa cōtegantur obruātúrve. Id poſt annum iucundū ac ſuaue redditur, mulſo nō diſſimile. Preſtat autem eadé quę ſuperior confectio.

De Hydromelo. Cap. XXX.

Fit Hydromelon, mēſura vna melomelitis è cotoneis facti ad duas aquæ coctæ & per Caniculæ æſtum inſolatæ addita: ac vis huius eadem quoque eſt.

De Omphacomelite. Cap. XXXI.

Omphacomelitis faciendi ratio hæc eſt: Vuas acerbas nondum variātes tribus diebus inſolato, deindéque exprimito: & ad ternas ſucci partes, mellis optimi deſpumati ſingulas partes adijcito: mox cōfectionē in fictilia diffuſam inſolato. Vim reprimendi ac refrigerandi habet; proindéq; ſtomachicis & cœliacis conuenit. Vſus autē poſt annum eſt.

De vino Apite. Cap. XXXII.

Fit & è pyris, perinde atque è cotoneis, vinum Apites nomine, ita tamen vt pyra non magnopere matura ſint. Quin & è ſiliquis etiam, meſpilis & ſorbis ſimili modo vina temperantur. Omnia porrò hęc genera aſtringunt, & acerba ſtomachóque vtilia ſunt, atque internas fluxiones cohibent.

De OEnanthino. Cap. XXXIII.

OEnanthinum vinum hoc modo concinnatur: Sumito florum ſiccorū è vite ſylueſtri pubeſcente minas duas, & in muſti metretam mittito, inibíq; dies triginta macerari finito: mox vinum excolatum recondito. Facit ad ſtomachum imbecillum ciuſdémq; faſtidium, cœliacos atque dyſentericos.

De vino Rhoite. Cap. XXXIIII.

Vinum è Punicis, quod rhoiten vocant, fit in hunc modum: Punica

A ξέσην μέλιτος, καὶ οὕτω χρὴ ἀποθέσθαι. Ἐστὶ δὲ στυπτικὸς, διὰ στόμαχος, δυσεντερίοις ἁρμόζων, ἡπατικοῖς, νεφριτικοῖς τε καὶ δυσουροῦσι.

Περὶ Μηλομέλιτος. Κεφ. κθ'.

Καὶ Μηλόμελι δέ, ὃ καὶ κυδωνόμελι ὀνομάζεται, σκευάζεται οὕτω· μήλων κυ-
B δωνίων ἐξαιρεθέντων τὰ σπέρματα ἐν ἁλπῶντων εἰς μέλι ὅτι πλεῖστον, ὡς τὰ σπερμάτια ὑποφαίνεσθαι, κεῖται τοιοῦτος μετ' ὀλίγον χρόνον, ὀνομέλιτα ἐοικώς· ἁρμόζει πρὸς ἃ καὶ τὸ πρὸ αὐτοῦ σκευασία.

Περὶ Ὑδρομέλιτος. Κεφ. λ'.

Ὑδρόμελι δὲ σκευάζεται, μιγνυμένου
C τοῦ ὕδατος τοῦ κυδωνίου μελομέλιτος μετρητοῦ ἑνὸς πρὸς ϛ'. μετρητὰς ἀφεψημένου ὕδατος καὶ ἡλιαζομένου ἐν λευκοῖς ἐπὶ κύνα. Δύναμις δὲ καὶ τούτου ἡ αὐτή.

Περὶ Ὀμφακομέλιτος. Κεφ. λα'.

Ὀμφακόμελι δὲ σκευάζεται τοῦτον τὸν τρόπον· λεβὼν ὄμφακος μόστου πιεζῆ-
D σαι, ἡλίαζε ἕως ἡμέρας γ'. ἐν μέσῳ ταύτῃ ἐκθλίψας, ἔκβαλε πρὸς γ' μέρη τοῦ χυλοῦ, μέλιτος καλλίστου ἀπηφρισμένου μετρητοῦ μέρος ἕν· καὶ ἡλίαζε καταζήσας εἰς κεράμους. Δύναμιν δ' ἔχει σταλτικὴν, ψυκτικήν· ὅθεν ἁρμόζει στομαχικοῖς, κοιλιακοῖς. ἡ χρῆσις δ' αὐτοῦ μεῖ ὁμοίως.

E Περὶ Ἀπίτου οἴνου. Κεφ. λϐ'.

Ἀπίτης σκευάζεται ὁμοίως, ὥσπερ καὶ ὁ κυδωνίτης. μὴ λίαν δὲ ἑψωσθαι ἄπιοι πέπειροι. καὶ ὁ τῶν μεσπίλων δέ, καὶ ὁ τῶν μεσπίλων καὶ οὔων, ὁμοίως σκευάζεται. πάντες δὲ εἰσὶ στυπτικοὶ, τρυφεροὶ, διὰ στόμαχοι, ῥεύματα ἔνδον ἐπι-
F σχοντες.

Al. in ver. cod. legitur, ὥσπερ ὁ ὀπώρου τῶν κυδωνίων ἢ μηλώνιος movenda.

Περὶ Οἰνανθίνου. Κεφ. λγ'.

Ὁ δὲ Οἰνανθίνος σκευάζεται οὕτω· λεβὼν ὀχείας ἀμπέλου ὃ ἄνθος τρισὶν ξηροῖς μναῖς ϛ'. εἰς μετρητὴν γλεύκους, πεφθὲς ἡμέρας λ'. εἶτα διυλίσας ἀπόθου. Ποιεῖ δὲ πρὸς ἀπονίαν στομάχου, ἀπορεξίαν, κοιλια-
G κοὺς, καὶ δυσεντερικούς.

Περὶ Ῥοίτου οἴνου. Κεφ. λδ'.

Ὁ Ῥοίτης δὲ οἶνος σκευάζεται οὕτως. ῥοὰς ἀπυρήνους λεβὼν ἑψήσας καὶ ἀπο-

θλίψας Ⓐ χυλὸν τῶν κόκκων ἀπόβου, ὑ ἀφεψήσας εἰς πεπον οὕτως ἀποτίθεσο. Ποιεῖ δὲ πρὸς τὰ ἐντὸς ῥήγματα καὶ πυρετοὺς ῥοώδης. ἔστι δὲ εὐστόμαχος καὶ στρογγυλικὸς χυλίας, Ⓒ οὐρητικός.

A matura lignosíque nuclei expertia sumito, acinisq; expressum succum, aut ita vt est, aut ad tertias decoctũ reponito. Efficax est contra fluxiones internas & febres alui ꝓfluuio comitatas. Est & stomacho vtile; aluúmq; astringit & vrinã mouet.

Περὶ Ροδίτου οἴνου. Κεφ. λέ.

Ροδίτης δὲ οὕτω σκευάζεται· ῥόδων ξηρῶν κεκομμένων μναῖ μίαν ἐνδήσας εἰς ὀθόνιον, καθεὶς εἰς γλεύκους ξέστας ὀ· μετὰ δὲ ϛς μῆνας, διυλίσας μεταγλίζει καὶ ἀποτίθεσο. Χρήσιμος δὲ ἀπυρέτοις πρὸς στόμαχου πόνους καὶ πόνους ὑπὸ πινόμενος, πρός τε καθύγρους κοιλίας καὶ δυσεντερίας. σκευάζεται δὲ καὶ ἀπὸ χυλοῦ ῥόδων, καὶ μέλιτος μιγνυμένου, ὃ καλεῖται Ροδόμελι. ἁρμόζει πρὸς ταῖς ἐν ἕδρᾳ τραχύτησας.

B C

Alii. Δυσεντερίαν

Rhodites seu rosaceũ sic fit: Rosarum siccarum tusarúmq; minam illigatá linteolo in musti sextarios octo conijcito: & post tres menses colo traiectum transfundito atque reponito. Vtile est ijs qui febri carent ad stomachi cochiones iuuandas, eiusdémque dolores lenimẽdos, à cibo potum: nec non & cõtra humidas aluos ac dysenterias. Fit quoque è succo rosarum ammixto melle quod Rhodomeli vocant, arteriq; scabritijs vtile.

Περὶ Μυρσίτου οἴνου. Κεφ. λϛ'.

Μυρσίτης δὲ σκευάζεται οὕτω· δεῖ μύρτα μέλανα τρυγήσαι ἤδη μαλάττοντα, κόψαι καὶ ἐκθλίβειν Ⓐ χυλὸν δ' ὀρυγέως καὶ καταγλίζειν. ἔνιοι δὲ καὶ ἀφεψοῦσιν εἰς πέπον. Ⓓ δὲ, καὶ τρυγήσαντες μίσγουσι τῇ χοίνικι κοπτοῦ πρὸς κοτύλας ὕδατος, καὶ οἴνου παλαιοῦ ὅσον αὐτό, οὕτω τε ἐκθλίβουσι καὶ ἀποτίθενται. Ἰσχνῶς δὲ ἐστὶ στυπτικὸς καὶ εὐστόμαχος, ῥευματιζομένῳ τε στομάχῳ καὶ κοιλίᾳ χρήσιμος, πρός τε τὰς ἐντὸς ἑλκώσεις καὶ ῥοῦν· μελαίνει δὲ καὶ τρίχας ἐν κεφαλῇ.

D E

Orib interpretẽ. Austeri.

De vino Rhodite. Cap. XXXV.

Rhodites seu rosaceũ sic fit: Rosarum siccarum tusarúmq; minam illigatá linteolo in musti sextarios octo conijcito: & post tres menses colo traiectum transfundito atque reponito. Vtile est ijs qui febri carent ad stomachi cochiones iuuandas, eiusdémque dolores lenimẽdos, à cibo potum: nec non & cõtra humidas aluos ac dysenterias. Fit quoque è succo rosarum ammixto melle quod Rhodomeli vocant, arteriq; scabritijs vtile.

Περὶ Μυρσίνου οἴνου. Κεφ. λζ'.

Μυρσινίτης δὲ σκευάζεται οὕτω· δεῖ λαβόντα τῶν μελαίνων μυρσινῶν τοὺς ἀκρέμονας καὶ τὰ φύλλα σὺν τοῖς μύρτοις κόπτειν, καὶ βάλλειν εἰς τοὺς τρεῖς τοὺς γλεύκους χοᾶς, τῆς μυρσίτης κεκομμένης μνᾶς ί. καὶ ἕως ἂν ἀπὸ δύο ὑπολειφθῶσιν ἢ τὸ ἥμισυ, καὶ διυλίσαντα ἀποτίθεσθαι. Ποιεῖ δὲ οὗτος πρός τε ἀλφοὺς καὶ πίτυρα, ἐξανθήματα, οὖλα, παρείαθμα, ὦτα πυορροοῦντα· φύλλει καὶ ἱδρῶτας.

F G

De vino Myrsinite. C. XXXVII.

Myrsinites ita temperatur: nigræ myrti teneri ramuli cum suis baccis ac folijs tusi decem minarum pondo in tres musti congios merguntur, coquuntúrque donec duo superfint, aut certè dimidium: tandémque colatum id vinum ad vsus reconditur. Contra manantia capitis vlcera, furfures, papularum eruptiones, gingiuarum ac tonsillarum inflammationes & aures purulentas efficax est, ac sudores quoque cohibet.

Περὶ Σχοίνου οἴνου. Κεφ. λή.

Καὶ ὁ Σχοινίτης δὲ ὁμοίως τῷ μυρσινίτῃ σκευάζεται.

De Lẽtiscino vino. C. XXXVIII.

Lentiscinum ſimiliter atq; myrſinites temperatur.

De vino Terebinthino. C. XXXIX.

Nec secus Terebinthinum. Nam & harũ arborũ ramuli sumi debẽt, in quibus fructus insit. Sed & assimilis sunt ista vina facultatis: siquidẽ astringunt, stomacho vtilia sunt, & fluxionibus stomachi, intestinorũ ac vesicæ, itemq; sanguinis profluuio accõmodatur: vlcera omnia fluxioni obnoxia fotu ad cicatricẽ perducunt: vuluæ denique ac sedis rheumatismos infessione cohibent.

Περὶ Τερμινθίνου οἴνου. Κεφ. λϑ'.

Καὶ ὁ Τερμίνθινος ὁμοίως. ἔστι γὰρ καὶ ἐκ ζύτων οἱ ἀκρέμονες λαμβανόμενοι. καὶ παραπλησίας εἰσὶ δυνάμεως, στυπτικοὶ καὶ βύσσματι, ῥεύμασί τε ἁρμόζοντες στομάχου, ἐντέρων, κύστεως, αἱμορραγίαις· καὶ συλλύσει δὲ καὶ ῥευματικὰ πάντα ἕλκη, ἐπουλοῦμενοι τοὺς τε κατὰ ὑστέραν καὶ ἕδραν ῥευματισμοὺς ἐλλοῖσιν, ἐκκαθίζουσι.

De vino Palmeo. Cap. XL.

Palmeum vinũ vt conficias, palmulas, quas chydæas quasi vulgares vocant, cásq. maturas in doliolum imo pertusum & arundine picata ob structũ demittito, ita vt foramen lino obturatũ sit. Tùm denis chœnicibus ternos aquæ congios affundito: quòd si non admodũ dulce id esse libeat, quinos congios infundito, & ad dies decẽ macerari illas finito. Exacto eo spatio, hoc est, die vndecima detracto ab arundine linteo, vinũ crassum ac dulce excipito, atq; reponito. Suaue illud quidẽ, sed capiti noxium: cõtra fluxiones, propter astrictoriã vim, efficax: eandẽ ob causam stomachicis, cœliacis & sanguinẽ excreãtibus conuenit. Sunt qui addita rursum pari aquæ mensura, manantem deinde liquorem excipiunt: id quod tertiò, quartò & quintò faciunt, non item amplius: quando quod reliquum ab his est, accescit.

Περὶ Φοινικίτου οἴνου. Κεφ. μ'.

Φοινικίτης· λαβὼν φοίνικας ξηροὺς καὶ χυδαίους πεπίρους, βάλε εἰς πιθάκνιον τετρημένον ἐν τῷ πυθμένι, καὶ ἐσφήνωσον καλάμῳ πεπατωμένῳ. ὃ δὲ τρῆμα λίνῳ βεβύσθω. ἔπειτα δὲ τοῖς δέκα χοίνιξιν, ὕδατος χοᾶς γ'. εἰ δὲ μὴ λίαν αὐτὸ γλυκὺ θέλεις εἶναι, πέντε χοᾶς ἐπίχεε. ἔα δὲ ἐπὶ ἡμέρας ι'. τῇ ια'. ἀφαιρῶν δὲ ἀπὸ τοῦ καλάμου ἔγνωσται, ἀπὸ δὲ χύλου οἶνον παχὺν καὶ γλυκύν, ἐκπίνεσθαι. Ἔστι δὲ ἡδὺς μέν, κεφαλαλγὴς δὲ ποιεῖ πρὸς ῥεύματα, διὰ τὸ συφλοῦσθαι στομαχικοῖς καὶ χειλιακοῖς, καὶ αἱμοπτοϊκοῖς ἁρμόζει. ἔνιοι δὲ τὴ αὐτὸ πάλιν τοῖς ὕδασι μίσγοντες δέχονται, καὶ τοῦτο τρίτον ποιοῦσι, καὶ τέταρτον, καὶ πέμπτον· ὅτι λοιπὸν ὀξίζει.

Sunt qui addunt, & bis, quos citra vicem expressit Ruellius.

De vino Catorchite. Cap. XLI.

Catorchites, quod aliquibus sycites quasi ficatũ appellatur, in Cypro similiter palmeo conficitur: sed hoc interest, quod in hoc præparando nonnulli pro aqua recens pressorũ vinaceorũ diluti tantundẽ adijciunt. Sumuntur in hũc vsum caricæ nigræ, quæ chelidoniæ puniceæve seu purpureæ appellantur: atque macerantur, vti anteà dictũ est. Post dies decem liquor excipitur, atque iterùm ac tertiò diluti vinaceorum par modus affunditur. Simili modo spatijs intercedentibus excipitur & quarta & quinta infusio: qua similiter acescẽte, vice aceti vtũtur. Porrò vinũ eiusmodi tenuium est partiũ: flatus gignit, stomacho aduersatur, & fastidium creat: bonam tamen facit aluum, & vrinam ciet: menses quoque trahit, & lactis vbertatem præstat:

Καὶ ὁ Καλορχίτης δέ, ὃν ἔνιοι συκίτην καλοῦσιν, ἐν Κύπρῳ σκευάζεται ὁμοίως τῷ φοινικίτῃ· διαφέρει δέ, ὅτι ἐκεῖ τοῦτο ἔνιοι αὐτὶ ὕδατος, στεμφύλων ἀποβρεγμα νεοθλίπτων τόσον μίσγουσιν. ἰσάδες γὰρ λαμβάνουσιν αἱ χελιδόνιοι καλούμεναι, ἢ φοινικαῖ μέλαιναι γ' εἰσί, καὶ ἀποβρέχουσιν ὡς προείρηται. μεθ' ἡμέρας δέκα ἐκλαμβάνεται τὸ ὑγρόν, καὶ ἐκ δευτέρου καὶ τρίτου ἐπιχεῖται τοῦ ἐκ τῶν στεμφύλων ἀποβρέγματος τόσον αὐτὸ μέτρον· ὁμοίως δὲ ἐκ διαστημάτων ἐκλαμβάνεται τὸ δ'. καὶ ε'. ἀπόβρεγμα ὁμοίως ὀξίζον, ὡς αὐτὶ ὄξους χρῶνται. Λεπτομερὴς δὲ ἔστι καὶ φυσώδης καὶ κακοστόμαχος, ἀποστρέφων ὄρεξιν, βυκείλιος μέντοι καὶ ὑρητικός. καθαρσιακὸς δὲ καὶ ἐμμηνωγὸς, καὶ γάλακτος δυσφιλὴς ποιεῖ,

αἷμα δὲ φαῦλον κατασκευάζει, καὶ ἐλεφαντιάσεως ἐπὶ πλεῖστον, ὡς καὶ τὸ ζῦθος. ἔνιοι δὲ καὶ ἀλῶν εἰς ἓξ χοᾶς ἑξάρια ἐμβάλλουσι δύο. ἄλλοι δὲ, ἄλμης κεράμιον, δυομιπάβλητον καὶ εὐκοίλιον ἔστωσ διαγούμενοι. εἶτα δὲ, καὶ θύμον καὶ μάραθον ἐπιπασσίλιαστ τοῦ πυθμένος, εἶτα τοὺς ἰσχάδας, καὶ ἐναλλὰξ τοῦτο ποιοῦσιν, ἄχρις οὗ πληρώσωσι τὸ ἀγγεῖον.

Περὶ Συκομορίτου οἴνου. Κεφ. μβ'.

Σκευάζεται δὲ ὁ ἐκ τῆς Συκομόρου ὡσαύτως. ὄξος δὲ γήρᾳ δριμύ, διὰ τὸ μὴ ἐξικνεῖσθαι τὴν δύναμιν αὐτῶν φυλάσσειν τὴν γλυκύτητα τοῦ ὑγροῦ.

Περὶ Ρητινίτου οἴνου. Κεφ. μγ'.

Ὁ δὲ Ρητινίτης καὶ κατὰ τὰ ἔθνη σκευάζεται· πλεονάζει δὲ ἐν Γαλατίᾳ, διὰ τὸ ἀποξηραίνεσθαι ἐν οἴνοις ἀπεπλύτου μόνωσις τῆς σαφύλης, διὰ τὸ ψύχειν, εἰ μὴ ὀλιγάπλακτος πυκνότης. κέρνᾶται δὲ σὺν ὀξυλαίῳ ἡητίνῃ, καὶ τοῦ κεραμίου μίγνυται ἡμικοτύλιον. καὶ οἱ μὲν, ἀπηθοῦσι μετὰ τὸ ἀποζέσαι χωρίζοντες τὸν ῥητίνην. ἐν δὲ, ἐᾶσι. παλαιοῦνται δὲ γίνονται ἡδεῖς. Γαῖτις δὲ κεφαλαλγεῖς ἐν τοιούτοις καὶ σκοτωματικοὶ, πυκνοὶ μὲν τοῖς καὶ οὐρητικοὶ, καὶ καταῤῥοίζοις καὶ βήσσοις ἀρμόζοντες· χειλιακοῖς, δυσεντερικοῖς, ὑδρωπικοῖς, ἐν ῥοιζώσαις γυναιξί· τοῖς δὲ ἐν βάθει εἰλκωμένοις, ἔκλυσμα. συκικώτερος μέν τοι τοῦ λευκοῦ ἐστιν ὁ μελανίζων.

Περὶ Στυβιλίτου οἴνου. Κεφ. μδ'.

Στυβιλίτης δὲ σκευάζεται, ἐναποβρεχομένων τοῦ γλεύκους στροβίλων πρόσφατων καὶ τεθλασμένων. ποιεῖ δὲ τὰ αὐτὰ τοῦ ῥητίνου. ἐὰν δὲ γλεύκους ἐναποβρέξας τις τοὺς στροβίλους ἑψήσῃ, ἁρμόζει καὶ φθινώδεσιν ἱκανῶς πινόμενος.

Περὶ Κεδρίνου. Κεφ. με.

Ὁ δὲ Κέδρινος ἢ Ἀρχεύθινος, ἢ Κυπαρίσσινος, ἢ δαφνινος, ἢ πιτυΐνος, ἢ ἐλάτινος, σκευάζεται ὁμοίως. χρὴ γὰρ τὰ ξύλα νεότμητα σχίζοντας, ὅτε τὸν καρπὸν ἐκδίδωσι, πτύνας πρὸς ἥλιον ἢ ἐν Καλαμείᾳ, ἢ ἐν πυρεῖ ὡς τὸ σανιδρῶσαι, καὶ μίσγειν τοῦ χοὶ

Locus addit ex v. cod. ὁ ῥήτινος.

A at vitiosum sanguinẽ creat, & elephantiasin infert, vti & zythũ. Aliqui senis amphoris denos salis sextarios adijciũt: alij muriæ amphorã. Sic enim ægriùs vitiari, & aluo idoneum reddi existimant. Alij etiam thymum & fœniculũ in fundo substernunt, deindéq; caricas componunt, atque ita vicissim, donec vas B expleuerint.

De vino è Sycomoris factitio. Cap. XLII.

Fit & è Sycomoris vinum eodé modo, sed in acetũ acre degenerat: quoniã non ita prẽualet vis eorum, vt manãtis liquoris dulcedo retineri possit.

C *De vino Resinato. Cap. XLIII.*

Resinatum vinum passim apud varias gentes factitari solet, sed plurimũ in Galatia: quoniã illic prę frigore nõ matureſcẽte vua vinũ facilè coaceſcit, nisi picea resina condiatur tẽperetúrve. Tunditur autẽ cum cortice resina, & amphoræ dimidia hemina permiscetur. Aliqui D vbi efferbuit, excolant separántque resinã: alij eãdẽ relinquũt. Hęc porrò vina vetustate suavia redduntur. Sed omnia capitis dolorẽ & vertiginẽ faciunt: concoctionẽ tamẽ adiuuant, & vrinam cient: destillatione vexatis ac tussientibus prosunt: itẽ cœliacis, dysentericis, hydropiE cis, & fœminis vuluæ fluore laborãtibus: profundioribus exulcerationibus eadem infundũtur. Cæterùm in hoc genere nigricans albo magis constringit.

De vino Strobilite. Cap. XLIIII.

Strobilites fit, maceratis in musto strobilis recẽtibus & contusis, præbẽtque resinati effectus. Quod si F quis strobilos musto præmaceratos decoxerit, abundè potum ijs cõducet qui tabitudine conficiuntur.

De Cedrino vino, & alijs. Cap. XLV.

Cedrinum, Iuniperinum, Cupressinum, Laurinũ, Pineũ & Abiegnũ, simili ratione concinnantur. Arborum enim, dũ fructus edunt, cæsam recẽs materiem assulosè diuidere, & Soli aut balneo, igniue admouere oportet vti consudet, congióque

vini minam vnam permiſcere, atq; ita duorũ menſium ſpatio ſinere: tũ demum transfundere, Soli exponere, tandémq; recondere. Porrò factitiorũ huiuſmodi vinorũ vaſa impleri debẽt: nanque illa non expletis vaſis aceſcunt. Nihilominus medicata vina rectè valentibus haudquaquam idonea. Cæterùm iſthæc omnia excalfaciũt, vrinam cient & leuiter aſtringunt. Laurinum tamẽ vehemẽtius excalfacit. Fit quoque vinum è Cedri maioris fructu, in vnum muſti congium addito baccarum contuſarum minæ ſemiſſe. Sed diebus quadraginta inſolari, ac ijs exactis, defęcatum in vaſa transferri debet.

A τῦ οἴνου μνᾶν μίαν, καὶ παμίξαι ζᾷ τι ἐᾶν μελιτος β'. εἶτα μεταλήζειν, καὶ ἡλιάσθαι ζας ἀποτίθεσθαι. πληρεῖν δὲ δεῖ τὰ ἀγγεῖα τῶν σκευαζομένων οἴνων. ἀποξυᾷ γὰρ τὰ ἀπόκενα. ἔστι μὲν τοι ⓐ φαρμακώδης οἶνοι τοῖς ὑγιαίνουσι. θερμαντικοὶ δὲ πάντες, οὐρητικοὶ, διαφορητικοί. ὁ μὲν τι

De Iuniperino vino. Cap. XLVI.

Fit & è baccis Iuniperi, ſimiliter vt è cedri fructu, & ad eadẽ valens.

B δάφνινος, θερμαντικώτερος. γίνεται δὲ καὶ ἐκ τῦ καρποῦ τῆς μείζονος κέδρου οἶνος. Dal. μείονος δεῖ δὲ τοῦ χοῦ τῦ γλεύκους ἡμιμναῖον κεχυμένων τῆς κεδρίνων μίξαι· ἡλιάσαι τε ἐφ' ἡμέρας μ'. μεθ' ἃς δὲ ταῦτα διυλίζειν, & μεταλήζειν.

De Cedrite. Cap. XLVII.

Cedrites hoc modo fit: Cedriam dulci aqua lauant, & ſingulas amphoras ſingulis cyathis proluunt, & ita muſto replent. Hoc quoque vini genus excalfacit, attenuat, tuſſi antiquæ citra febrem vtile, necnon & pectoris laterúmq; dolorib⁹, torminibus ac vẽtris & inteſtinorũ vlceribus, puruleta excreãtibus, hydropicis, & mulieribus vuluæ cauſarijs. Facit & aduerſus lumbricos atq; rigores: cõtra venenatorũ morſus auxiliatur, ac ſerpẽtes necat: auriũ deniq; doloribus inſtillatũ medetur.

Περὶ Ἀρκευθίτου οἴνου. Κεφ. μς'.

C Γίνεται καὶ ἐκ τοῦ τῆς ἀρκευθίδων καρποῦ, ὁμοίως τῇ κεδρίτῃ, τὰ αὐτὰ ποιῶν.

Περὶ Κεδρίτου. Κεφ. μζ'.

Κεδρίτης δὲ γίνε) οὕτω· κεδρίαν πλύναντες ὕδατι γλυκεῖ, ἀγγεῖοις ἑκάστοις ἡμιχόοις κυάθῳ ἑνὶ, καὶ οὕτω τὸ ῥοῦν γλεύκει. θερμαντικὸς δὲ καὶ οὗτος γίνε), καὶ λεπτυντικὸς, βηχὶ παλαιᾷ ἁρμόζων δίχα πυρετῶν, καὶ πόνοις θώρακος, πλευρᾶς, στόφυις, ἕλκεσι ζῆς ἐν κοιλίᾳ καὶ ἐντέροις, ἐμπύοις, ὑδρωπικοῖς, ὑστερικαῖς· ποιεῖ καὶ πρὸς ἕλμινθας, καὶ πρὸς ῥῖγη· βοηθεῖ ἡπιοδίκτοις, καὶ ἑρπητὰ κτείνει· ὠταλγίας τε ἐκπυοῦμενος ἰᾶται. Deeſt in Ald.

D

De vino Picato. Cap. XLVIII.

Vinum picatũ ex liquida pice & muſto tẽperatur. Picem autem primum marina aut muria tantiſper eluere oportet, dũ inalbuerit, & ſincera maris aqua defluat: mox aqua dulci iterũ proluenda. Tũm in congios octo muſti additur vncia picis vna aut altera, atque ita ſinitur. Pòſt vbi efferbuerit atque ſubſederit, in vaſa diffunditur. Hoc genus vini excalfacit, concoctionem adiuuat, abſtergit atque purgat: proindéque vtile doloribus pectoris, aluí, iocineris, lienis & vuluarũ, ſi ſine febre ſint, itémque veteribus rheumatiſmis & profundis exulcerationibus. Eſt & efficax contra tuſſim, tardam concoctionem, inflationes & anhelationes: luxatis denique, præſertim in ſuccida lana, imponitur.

Περὶ Πισίτου οἴνου. Κεφ. μή.

Οἶνος πισίτης σκυά(ε) ὀξὺ πίαιτης ὑγρᾶς, καὶ γλεύκους. δεῖ δὲ τὴν πίαιταν πρῶτον πλυθῆναι θαλάσσῃ ἢ ἅλμῃ ἐφ' ἱκανὸν, μέχρις ἂν λευκανθῇ, & ἡ θάλασσα καθαρὰ ἀπορρέῃ, ἔπειτα ὕδατι γλυκεῖ· καὶ τοῖς ἡ. χοεῦσι μίσγειν οὐγγίας πίαιτος ἀ. ἢ Γ'. & ἐᾶν· μετὰ δὲ ταῦτα ζέσαι καὶ καθαρθῆναι, καὶ διαλήζειν. Ἔστι δὲ θερμαντικὸς, πεπτικὸς, σμηκτικὸς, αἱματοθραυστικὸς· βοηθεῖ τοῖς πρὸς ἡπατικὰ, κοιλίαν, ἥπαρ, σπλῆνα καὶ ὑστέρας πόνοις δίχα πυρετῶν, καὶ χρονίοις ῥεύμασι, καὶ ἕλκεσι τοῖς ἐν βάθει· ποιεῖ καὶ πρὸς βῆχας, βραδυπνοίας, πνευματώσεις, ἄδηματα· καὶ πρὸς τρέμματα δὲ μᾶλλον μετ' οἰσυπηρῶν ἐλαίων. Ἐκπυοῖ

E

F

Περὶ Ἀψινθίτου οἴνου. Κεφ. μθ'. A *De vino Abſinthite. Cap. XLIX.*

Ἀψινθίτης δὲ ποικίλως σκευάζεται. ④ εἷς γὰρ ζεῖς μί. καὶ ἡ. ξέσας τῆς Γαλατικῶν κεραμίου, μίξαντες ἀψινθίου Ποντικοῦ λίτρας μιας, ἕψουσι μέχρι ὃ γ'. ἀποληφθῇ. ἔπειτα παρασπείσαντες γλεύκους ξέσας ς'. ⑤ ἀψινθίου ἡμίλεβρον ὀθονίῳ λεπτῷ μίξαντες, καταγίζουσι καὶ παραζέουσι δὲ διυλίζουσιν. ④ δὲ, μοῦραν ἀψινθίου εἰς τὸ κεράμιον καθιᾶσι, κόλαντες καὶ ἐνδήσαντες εἰς ὀθόνιον ἀραιόν, ἐῶσιν ὑπὲρ μιλιὰς δύο. ④ δὲ, ἀψινθίου οὐγγίας γ'. ἔνιοι δὲ τέσσαρας, καὶ νάρδου Συριακῆς, κινναμώμου, κασίας, ἀρίνου ἀνθους, καλάμου, ἐλάτης Φοινίκης, ἀνὰ οὐγγίας ς'. καθιᾶσιν εἰς μετρητὴν γλεύκους, ἢ εἰς ὅλμον κόλαντες καὶ σφηκώσαντες, ἐῶσι δίμηνον ἢ τρίμηνον· εἶτα διυλίσαντες καὶ μεταγίσαντες, ἀποδίδενται). Οἱ δὲ, εἰς γλεύκους μέτρητὴν νάρδου Κελτικῆς < ιδ'. καὶ ἀψινθίου < μ'. καθιᾶσιν εἰς ὀθονίῳ δήσαντες· ἐῶσι μῆνας μ'. μεταγίζουσιν. ④ ὃ, εἰς ζεῖς ξέσας κ'. τῶν γλεύκους λίτρας ἀ. ἀψινθίου ἐμβάλλουσι, καὶ πιτυΐνης ξηρᾶς ῥητίνης οὐγγίας β'. μετὰ δὲ ἡμέρας ί. διυλίσαντες, ἀποτίθενται. Ἔστι δὲ εὐστόμαχος, οὐρητικὸς, χρήσιμος βραδυπεπέσι, ἡπατικοῖς τε καὶ νεφριτικοῖς, καὶ ἰκτερικοῖς, αἰωρέκλοις, καὶ κωλικοῖς στόμαχον καὶ τοὺς ὑποχονδρίων πόνους χρόνιον, καὶ φῦσος ἐμπνευματώσεις, ἕλμινθας στρογγύλας, ἔμμηνα ἐπισχόμενα· φῦσός τε ἰξίου πόσιν σπλῆνος παθεῖς καὶ ὀξυμούμενος ἀρμόζει.

Sunt qui legant ἐξους Cornarius legit γλεύκους ξέσας ς'.

Lacunas addit ex v. cod. ἐς ὀθόνιον. Sunt qui ita legant hoc loco ex vet. codicibus, καὶ τοῦ μετρητοῦ τοῦ γλεύκους ἐμβρίζουσι quæ ſcriptura ab Hermolao & Ruellio expreſſa eſt. Lacuna verò ſic legi poſſit: εἰ δὲ μοῦραν ἀψινθίου καλάμου τε καὶ ἀνίσου, καὶ κόλαντες τὰ τε ὀθόνια κρεμάσαντες, εἰς τὸ κεράμιον τοῦ γλεύκους ἐμβάλλουσι καὶ διὰ μέσου ὑάλου.

Ald. ε'. et Lac. legit, εἰς ζεῖς ὀθόνια ξέσας.

BASINTHITES variè conficitur. Aliqui enim in duodequinquaginta ſextarios, Italicarum amphorarũ additam abſinthij Ponticí libram decoquũt ad tertias partes. Dein vbi inſuper affuderint ſex muſti ſextarios, & abſinthij ſelibrá diligẽter permiſcuerint, in vas diffundunt: cumque ſubſiderit, excolant. Alij abſinthij minam tuſam & linteolo raro deligatam in muſti amphoram demittunt, imbiq; duobus menſibus macerari patiuntur. Alij abſinthij quadrantem trientémve, & nardi Syriacæ, cinnamomi, caſſiæ, floris iunci odorati, calami & palmę elates ſingulos ſextantes prius in pila tuſos in muſti metretam conjiciunt, & obſtructo vaſis ſpiraculo duũm triúmve menſium ſpatio dimittunt, tandémque defæcatum vinum trãſfundunt ad vſus. Sunt & qui in muſti cadum addant nardi Celticæ vncias xiiij. & abſinthij vncias xl. linteo illigatas: poſt quadrageſimũ verò diem clutriant. Alij deniq; in viginti muſti ſextarios abſinthij libram, & reſinæ pini ſiccæ ſextantem immittunt, & poſt dies decem vinum excolant atque recondunt. Vtile eſt ſtomacho: vrinam ciet: tardam concoctionem accelerat: hepaticis, nephriticis, regio morbo laborantibus, cibum auerſantibus, & ſtomacho malè affectis auxiliatur. Valet & contra diuturnam hypochondriorum diſtentionem, inflationes, teretéſque lumbricos & remoratos menſes. Denique prodeſt & contrà hauſta ixiæ venena, maiore copia potum, identidémque vomitione redditum.

Περὶ Ὑσσωπίτου οἴνου. Κεφ. ν'.

Ὑσσωπίτης δὲ ὁ ἀπὸ τῆς Κιλικίου ὑσσώπου κάλλιστός ἐστι· σκευάζεται δὲ ὁμοίως τῷ ἀψινθίτῃ. δεῖ δὲ τῷ κεραμίῳ τοῦ γλεύκους λίτραν μίαν τῆς ὑσσώπου κεκομμένων τῶν φύλλων προσδιδόναι, ἐνειλιοῦντας εἰς ὀθόνιον ἀραιόν. συγκαθιενται δὲ λιθάρια, ἵνα τῷ πυθμένι προσκαθίσῃ ὁ ἔνδεσμος· μεταγίζει δὲ δι' ἡμέρας μ'. διυλίζων. ἁρμόζει δὲ καὶ πρὸς τὰ ἐν θώρακι καὶ πλευρῷ καὶ πνεύμονι πάθη, ἕως

De vino Hyſſopite. Cap. L.

Hyſſopites è Cilicio hyſſopo maximè laudatur, fitq; haud ſecus atque abſinthites. Scilicet foliorum hyſſopi tuſorum libra linteo raro inuoluta in amphoram muſti conjicitur. Intra linteolum verò ſimul etiá immittũtur lapilli, vt degrauatus ponduſculo faſciculus fidat, petátque fundum. Vinum poſt xl dies, defæcatum clutriatur. Contra pectoris, lateris & pulmonis vitia, veterẽ tuſ-

sim & anhelationem prodest. Vrinam quoque cit, atque torminibus febriúmque rigoribus circuitu redeuntibus auxiliatur, ac menses denique mouet.

A χας τε παλαιάς, καὶ ἄθμα· ἔστι δὲ καὶ ὀρπτικὸς, καὶ προφουμάτοις ἁρμόζει, τοῖς τε ῥίγη τὰ ἐν τεσσάροις· κινεῖ δὲ καὶ ἔμμηνα.

De vino Chamædryite. Cap. LI.

Chamædryites simili quo hyssopites modo fieri solet. Excalfacit atque discutit, ideóq; conuulsis, regio morbo, vuluę inflationibus, tardæ cōcoctioni & incipienti hydropi subuenit. Cæterùm inueteraſcés præstantius euadit.

Περὶ Χαμαιδρυίτου οἴνου. Κεφ. να'.

Καὶ ὁ Χαμαιδρυίτης ὁμοίως τοῖ ὁσπωπίτῃ σκευάζεται· θερμαντικὸς ὢν καὶ
B διαλυτικὸς· ἁρμόζει σπασμοῖς καὶ τετάνοις, ὑστερικαῖς πνευματώσεσι, βραδυπεψίαις, ὕδρωπι δὲ χρηδίῳ. ἀμείνων δ' παλαιούμενος γίνεται.

De vino Stœchadite. Cap. LII.

Simili quoque modo Stœchadites cōficitur: sed in congios sex, minam stœchadis vnam addere oportet. Humores crassos dissoluit, & inflationes, lateris ac neruorum dolores atq; perfrictiones discutit. Datur & vtiliter comitialibus cum pyrethro & sagapeno.

Περὶ οἴνου Στοιχαδίτου. Κεφ. νβ'.

Σκευάζεται καὶ Στοιχαδίτης ὁμοίως. δεῖ δὲ τοῖς τ' χοεῦσι μνᾶν μίαν στοιχάδος
C διδόναι. διαλύει δ' πάχη καὶ πνευματώσεις, καὶ πόνους πλευρᾶς καὶ νεύρων, & καταψύξεις· δίδοται δ' καὶ ὀπισθοτονικοῖς ὠφελίμως μετὰ πυρέθρου καὶ σαγαπηνοῦ.

De aceto è Stœchade. Cap. LIII.

Ad eadem quoque fit acetum è Stœchade, herba ipsa vti antè dictū est aceto macerata: eosdē verò implet effectus.

Περὶ ὄξους Στοιχαδίτου. Κεφ. νγ'.

Γίνεται καὶ ὄξος ἀπὸ Στοιχάδος τροὸς τὰ εἰρημένα, ὁμοπερεχομένης ὄξει τῆς
D τοιάδος, ὡς προεῖρηται. ποιεῖ δὲ τοὺς τὰ αὐτά.

De vino è Betonica. Cap. LIIII.

Fit vinum Cestrites è betonica, quam cestron psychotrophon appellant. Herba semine maturo prægnans cum suis ramulis minæ pondo in vini congios duos adijcitur, septémque mensium spatio dimittitur, tandémque transfunditur. Ad multa intestina vitia, vti & frutex ipse, pollet. Et vt in vniuersum dicatur, quælibet factitia vina eorum ex quibus finguntur sibi vires ascisciunt. Quare ijs qui illorum naturas pernouerint, fuerit etiam ex facili vinorum vires cōiectura consequi: veruntamen vinorum vsus febricitantibus abdicādus. Fit etiamnum è betonica acetū, ad eadē vitia vtile.

Περὶ Κεστρίτου οἴνου.

Κεστρίτης· κεστροῦ
E δ'. εἰς γλεύκους ξέστας δ'. ἐν ὀγδοήκοντα λάκκοις τροὸς μνᾶς γ'. καὶ μετὰ ἔτη. ἁρμόζει τροφοῖς, ἀποσμαῖς, ῥήγμασι, πόνοις πλευρικοῖς, πνευμάτων διαδρομαῖς, δυσεντερίαις.

Lac legit in vet. cod. pro eo quod hic est ὁ δαίμων αὐτῆς.

De vino Tragoriganite. Cap. LV.

Tragoriganites fit quaternis tragorigani drachmis linteolo colligatis, in quaternos musti sextarios coniectis, & post tertium mensem transfusis. Prodest torminibus, conuulsis, ruptis, lateris doloribus, flatuum discursationibus ac difficilibus concoctionibus.

F

G

V. infera μέλιτος

Περὶ Βουνίτου οἴνου. Κεφ. νϛ'.

Οἶνος ἀφ' ὁ Βουνίου βουνίου < ϛ'. κόλυφας, καθὼς εἰς κοτύλας γλεύκους τέσσαρας, καὶ τ' ἄλλα ὁμοίως ποίει. Ἁρμόζει δὲ στομαχικοῖς καὶ κακοπνοίοις διʼ ὁπλομαχίαν, καὶ ἱππασίαν πολλήν.

Περὶ Δικταμνίτου οἴνου. Κεφ. νζ'.

Δικταμνίτης· δικτάμνου < ιϛ'. εἰς γλεύκους κοτύλας ι'. ἀκίβρεχε ὁμοίως. Ποιεῖ δὲ ἀποπνοίους στόμαχον, ἄγει καὶ λόχια καὶ ἔμπλεκτα.

Περὶ Πρασίτου οἴνου. Κεφ. νη'.

Ὁ ἀφ' πρασίου· πρασίου τῆς ἀκμαίου φύλλα κόλυφας βοτρύος β'. καθὼς εἰς μετρητὴν γλεύκους, καὶ τ' ἄλλα ὁμοίως ποίει. Ἁρμόζει δὲ τοῖς περὶ θώρακα, καὶ πρὸς ὅσα ὁ πράσιος.

Περὶ Θυμίτου οἴνου. Κεφ. ιθ'.

Θυμίτης· θύμου κεκομμένου καὶ σεσησμένου οὐγγίας ρ'. ἐνδῆσας εἰς ὀθόνιον, καθὼς εἰς γλεύκους κεφάλαιον. Ἁρμόζει πρὸς δυσπεψίας, ἀηδιαστίας, δυσεντερίας, νεύρων πόνους, σπαργανδρίων, φύσας χειμερινὰς, καὶ πρὸς ἰοβόλα πᾶσα ψύχοντα & σήπουσα.

Περὶ Θυμβρίτου οἴνου. Κεφ. ξ'.

Θυμβρίτης ὁμοίως σκευάζεται. καὶ πρὸς τὰ αὐτὰ ποιεῖ, πρὸς ἃ καὶ ὁ θυμίτης.

Περὶ Ὀριγανίτου οἴνου. Κεφ. ξα'.

Ὀριγανίτης δὲ ὀρίγανου Ἡρακλεωτικῆς σκευάζεται, ὁμοίως δὲ θυμίτῃ· ποιεῖ πρὸς τὰ αὐτά.

Περὶ Καλαμινθίτου, γληχωνίτου καὶ ἀβροτονίτου οἴνου. Κεφ. ξϐ'.

Καλαμινθίτης, γληχωνίτης, ἀβροτονίτης, ὁμοίως σκευάζονται τῷ ἀφ' θύμου· Ποιοῦσι δὲ στομαχικοὺς καὶ ἀηδιαστικοῦσι, καὶ πρὸς ἴκτερον· οὐρητικοὶ γάρ εἰσιν.

Περὶ Κονυζίτου οἴνου. Κεφ. ξγ'.

Οἶνος Κονυζίτης ὁμοίως σκευάζεται· ἔστι δὲ πάντων μᾶλλον θηριακός.

Περὶ Ἀρωματίτου οἴνου. Κεφ. ξδ'.

Ὁ δὲ Ἀρωματίτης οὕτω καταπυκά-

Goup. aliter, ὑπὲρ μῆνα < ἀ. εἰς γλεῦκος &c cum Hermolao consentit.

De vino Bunite. Cap. LVII.

A E Bunio fit vinum nomine Bunites, binis drachmis Bunij tusi in musti quaternas heminas missis, & cæteris eodem modo factis. Cõfert stomachicis & armorũ certaminis equitandive lassitudine oppressis.

De vino Dictamnite. Cap. LVIII.

B Dictamnites cõficiendi ratio hæc est: Dictamni quaternas drachmas in octonis musti heminis similiter macerato. Facit aduersus stomachi fastidia, & purgamenta à partu, mésésque ciet.

De vino Prasite. C. LVIII.

Ad vinum è Marrubio conficiendum, foliorum marrubij adulti tusorum chœnices duas in musti metretam demittito, cæteráque consimiliter facito. Conuenit hoc vinum pectoris vitiis, atque omnibus, quibus & ipsum marrubium.

De vino Thymite. C. LIX.

Thymites sic fit: Thymi tusi & cribrati drachmas centũ linteo illigatas musti amphoræ indito. Valet cõtra difficiles coctiones, cibi fastidia, graues ructus, neruorũ & præcordiorũ dolores, frigoris hyemalis horrores: itémq; aduersus animalia virus eiaculantia, quę quidẽ ictu suo locum refrigerant & putrefaciunt.

D

De vino Thymbrite C. LX.

Simili modo è Thymbra vinum fit: quod eadem quæ Thymites præstat.

E

De vino Origanite. C. LXI.

Sic & Origanites ex origano Heracleotico conficitur, haud secus atque Thymites, & ad eadem quoq; est efficax.

De vinis è Calamintha, Pulegio & Abrotono. C. LXII.

F E Calamintha, Pulegio & Abrotono vina fiunt, eodẽ quo Thymites modo. Prosunt stomachicis & cibum auersantibus: ac valent etiamnum ad morbum regium, propterea quòd vrinas cient.

De vino Conyzite. C. LXIII.

G Similiter & è Conyza vinum fit: quod contra venenata præ cæteris est efficax.

De vino Aromatite. C. LXIIII.

Vinum Aromatites ita componi-

tur: Palmæ, aſpalathi, calami, nardi Celtici, ſingulorum vncias ſingulas poſtquam contriueris, paſſo ſubigito: indéque factas grandiores offas in muſti auſteri ſextarios duodecim deijcito, & operculato vaſe quadraginta dies macerari ſinito: excolatum deinde vinum recondito. Eſt & altera eius parandi ratio: Calami drach. viij. phu drach. vij. coſti drach. ij. nardi Syriaci drach. vj. caſſiæ drach. viij. croci drach. iiij. amomi drach. v. aſari drach. iiij. Hæc, inquam, omnia ſimul trita & linteo colligata in muſti metretam demergito: & poſtquam vinum deferbuerit, transfundito. Facit ad pectoris, lateris & pulmonis dolores: difficilē vrinæ, rigoribus, retardatis menſibus, atque ijs qui per gelidæ hyemis rigorem iter faciunt, potu auxiliatur. Conuenit & ijs qui humores craſſos gignunt: colorē quoque meliorem hilariorémque facit, & ſomnum conciliat, doloréſque leuat, veſicæ ac renum vitijs vtile.

A ζεται· φοίνικες, ἀσπαλάθου, καλάμου, ναρδου Κελτικῆς, ἑκάστου *χοίνικα λειώσας, ἔφεψον γλυκεῖ. καὶ ποτίσας βύμαζάθης μάζας, βάλε εἰς Γλεύκεως αὐστηροῦ ξέστας ις', καὶ ἔασον ἡμέρας μ'. σφιγξάσας δ' ἀγγεῖον εἶτα διυλίσας, ἀποτίθεσο· σκυβάζει δὲ ἕκαστος καλάμου ὁλ- B κὴ ἡ. φοῦ < ζ'. κόστου < β'. ναρδου Συριακῆς < ς'. κασσίας < ἡ. κρόκου < δ'. ἀμώμου < ἑ. ἀσάρου < δ'. Ταῦτα ὁμοῦ λειώσας καὶ ἐν ὄνῳ δήσας χάλασον εἰς μετρητὴν γλεύκους, καὶ μετὰ δ' ἀποζέσαι ⟨Φ⟩ οἶνον μεταγάλιζε. Ποιεῖ δὲ πρὸς πόνους ἥπατος, πλευροῦ, C πνεύμονος. δυσουρίαις τε καὶ ῥίγεσιν, ἐμμηνίοις ἀποσχέσεσι, καὶ τοῖς ἀφ' ὑγρᾶς ὀδύνοισιν ἁρμόζει πινόμενος· ἐν πρὸς δυ' πάχος ὑγιαίνοντας· εὐεκτικὸν δὲ καὶ εὐχροίας, ὑπνωτικός τε ἐστὶ καὶ ἀνωδύνους, τοῖς περὶ κύστιν ἐκ νεφροῦ ἁρμόζων πάθεσι.

Περὶ οἴνου τοῦ ἐκ σμύρνης, πεπέρεως, D καὶ ἴριος. Κεφ. ξέ.

Fit & vinum ad deſtillationes, tuſſim, cruditates, inflationes & ſtomachi ſuperfluos humores. Myrrhę drach. ij. piperis albi drach. j. iridis drach. vj. anniſi drach. iij. Iſta penitus cōtuſa & linteolo illigata in ſex vini ſextarios conijcito: vinum poſt triduum excolato, & in lagena recondito. Ab inambulatione meraculum cyathi vnius menſura propinatur.

Σκευάζεται δὲ οἶνος πρὸς καταῤῥοας, βῆχας, ὠμότητας, ἐμπνευματώσεις καὶ πλάδον στόμαχου· σμύρνης < β'. πεπέρεως λευκοῦ < ἁ. ἴριος < ς'. ἀνίσου < γ'. Ταῦτα ὁλόκοπα σὺν δήσας εἰς ὀθόνιον, κάθες εἰς ξέστας ς'. οἴνου· μετὰ δὲ E πέντε διυλίσας, ἀποτίθεσο εἰς λάγηνον. ἐν πόσει μετὰ περίπατον δίδου ἀκράτου, κύαθον ἁ.

Lac. inſerit ex v. cod καὶ ἄλλως ἀπὸ σταφίδος

G. Hæc ita legantur in vet. libris. οἴνου ⟨ς'.⟩ ταῦτα ὁλόκοπα σὺν δήσας εἰς Hermolaus legit.

Περὶ Νεκταρίτου οἴνου. Κεφ. ξς'.

De vino Nectarite. Cap. LXVI.

Nectarites paratur ex helenio, quod alij Medicā, alij ſymphytum, aliqui verbaſcum Idæum, alij oreſtion, alij denique nectarion appellant. Radicis helenij ſiccæ vncias v. linteolo colligaras in muſti ſex congios addito, & poſt tertium mēſem diffundito. Facit ad ſtomachi & pectoris vitia, ac vrinas quoque pellit.

Ὁ δὲ Νεκταρίτης σκευάζεται ἐκ τῆς ἑλενίου· ὃ ἔνιοι Μεδικὴν, οἱ δὲ σύμφυτον, οἱ δὲ, Ἰδαῖον φλόμον, οἱ δὲ, ὀρέστειον, οἱ δὲ, νεκτάριον F καλοῦσιν· ἑλενίου ῥίζης ξηρᾶς ὑγιείας ἑ. ἐνδήσας εἰς ὀθόνιον, κάθες εἰς χόας ς'. Γλεύκους, ᾧ μετὰ γ' μῆνας ἀπόχει. Ποιεῖ δὲ πρὸς στόμαχον, θώρακα· ἄγει δὲ καὶ οὖρα.

Paris. exc. θωρακικάς

De vino è Nardo Syriaco, Celtico & Malabathro. Cap. LXVII.

E Syriaca nardo & Celtica, malabatróq; vinū factitatur in hūc modū: ſingulorū minę ſemiſsē in binos muſti cōgios mittito, & poſt bimeſtre colato: cyathū vnū cum tribus

Περὶ τοῦ ἀφ' Συριακῆς ναρδου καὶ Κελτικῆς ἐκ Μαλαβάθρου οἴνου. Κεφ. ξζ'.

Ὁ δὲ ἀφ' Συριακῆς ναρδου, ἐκ Κελ- G τικῆς, καὶ μαλαβάθρου, σκευάζεται οὕτως· ἑκάστου ἡμίμναιον λαβών, εἰς δίχοινα Γλεύκους κάθες, καὶ μετὰ μῆνας β'. διύλιζε. δίδου δὲ καὶ κύαθον ἑ. πρὸς πῆξ

ὕδατος. ποιεῖ νεφριτικοῖς, ἰκτερικοῖς, ἡπατικοῖς, δυσουροῦσιν, ἀχροῦσι, στομαχικοῖς. Ald. ὀγκίαν β. ⟨ι⟩ δὲ ἀκόρου οὐγκίας ἀ ἢ β'. Κελτικῆς ναρδου οὐγκίας γ'. εἰς κεραμίσκον γλεύκους σκυβάζουσιν.

Περὶ Ασαρίτου οἴνου. Κεφ. ξή.

Ασαρίτης. Ασάρου οὐγγίας γ'. κάλυκες εἰς γλεύκους κοτύλας ιβ'. ὁμοίως. ἔστι δὲ διουρητικός, ὑδρωπικοῖς ἁρμόζων, καὶ ἰκτερικοῖς, ἡπατικοῖς, ἰσχιαδικοῖς.

Περὶ τοῦ ἀφ' ἁγίας Ναρδου οἴνου. Κεφ. ξθ'.

Ο δὲ ἀφ' ἁγίας Νάρδου· νάρδου ἁγείας τῆς ῥίζης τοῦ σφάτου λειώσας στεσομένης κάλυκος οὐγγίας ἡ. εἰς χοῦν γλεύκους ὁμοίως. καὶ ἔα μεῖναι β. χρήσιμος ἡπατικοῖς, δυσουροῦσι, πνευματικοῖς, στομαχικοῖς.

Περὶ Δαυκίτου οἴνου. Κεφ. ο.

Δαυκίτης. Δαύκου τῆς ῥίζης ὁλκὴ σπου * < ς'. εἰς γλεύκους κεραμίου κάλυκος ὁμοίως, καὶ μετάγλιζε. ποιεῖ δὲ πρὸς πόνους θώρακος, ὑποχονδρίων, ὑστέρας· ἄγει ἔμμηνα, ἐρυγὰς κινεῖ, καὶ οὖρα· ἁρμόζει βηχί, ἀσθμασι, ῥήγμασιν.

Περὶ Ελελισφακίτου οἴνου. Κεφ. οά.

Ελελισφακίτης ὁμοίως· ἐλελισφάκου οὐγγίας ἡ. ὁμοίως εἰς γλεύκους ἀμφορέα, ὅ ἐστι κεραμίου, καλῆς. ποιεῖ δὲ πρὸς νεφρῶν πόνους, καὶ κύστεως καὶ πλευρῶν, αἵματος αἰαγωγάς, βῆχα, ῥήγματα, ἀσθμαίνοντα, ὀλισθήματα, ἔμμηνα ἐκτρωθέντα.

Περὶ Παναξίτου οἴνου. Κεφ. οβ'.

Παναξίτης. Πάναξος οὐγγίου ἀ. εἰς χοᾶ γλεύκους καθεὶς ὁμοίως μετάγλιζε. ποιεῖ ἀσθμασι, ῥήγμασι, ὀλισθήμασιν, ὀρθοπνοίαις· λεπτυντικὸς πάχους σπλήνων· ποιεῖ δὲ καὶ πρὸς τρόφους, ἰσχιάδας, βεβαδυπνοίας· καταμήνια ἄγει καὶ ἔμβρυα· ὑδρωπικοῖς καὶ φθειριῶσι ἁρμόζει.

Περὶ Ακορίτου οἴνου. Κεφ. ογ'.

Ακορίτης, ὃν καὶ ὁ ἀπὸ γλυκυῤῥίζης ὁμοίως σκευάζει. δεῖ γὰρ ἑκάστου ὑγίας π'. εἰς χόας ς'. πρὸς μῆνας γ'. ἀποῤῥίζης μείζ-

A aquæ exhibeto. Bene facit hoc vinum nephriticis, ictericis, hepaticis, vrinæ difficultate laborantibus, decoloratis & ſtomachicis. Sũt qui acori vnciam vnam aut alteram, & Celticæ nardi vncias ii in muſti amphoram adijciunt.

De vino Aſarite. C. LXVIII.

B Aſariten ſic cõficito: Aſari vncias iij. in muſti heminas duodecim itidem adijcito. Id vini genus vrinam ciet, atque hydropicis, regio morbo laborantibus, hepaticis iſchiadicíſque conuenit.

De vino è ſylueſtri nardo. Cap. LXIX.

C E ſylueſtri nardo ſic fit: Radicis ſylueſtris nardi recentis ac tritę cribratæq; vncias viij. in muſti congiũ ſimiliter addito, & duos menſes ineſſe patitor. Vtile hepaticis, vrinæ difficultate laborantibus, inflatis atque ſtomachicis.

De vino Daucite. Cap. LXX.

D Daucites ſic: Radicis Dauci planè cõtuſæ vncias vj. muſti amphoræ ſimiliter indito, atque tranſfundito. Facit ad pectoris, præcordiorum ac vuluæ dolores: menſes pellit, ructus cit & vrinas: prodeſt denique tuſſi, conuulſis atque ruptis.

De vino è Saluia. Cap. LXXI.

E Vinum è Saluia ſimiliter cõficito: Saluiæ vncias viij. in muſti amphoram, quæ eadem cum ceramio eſt, ſimili modo mittito. Valet cõtra renũ, veſicæ & laterũ dolores, ſanguinis excreationes, tuſſim, rupta, vulſa, contuſa & menſes ſuppreſſos.

De vino Panacite. Cap. LXXII.

F Panacis vnci á j. in muſti cõgium vnũ demittito, ac ſimiliter elutriato. Prodeſt vulſis, ruptis, contuſis & orthopnœæ: lienis craſſitiem extenuat: eſt & efficax contra tormina, coxẽdicum dolores & tardas concoctiones: menſes & partus extrahit: hydropi & venenatorũ morſibus auxiliatur.

De vino Acorite. Cap. LXXIII.

G Vina ex acoro & è dulci radice cõſimili modo fiunt. Oportet enim ſingulorum vncias octonas in ſenis vini congijs tribus menſibus macerare, moxq; vinũ in vaſa transferre.

Ald. ὀγκίαν β. ⟨ι⟩ Rurſus ι ex ε legiſſe videtur.

Deeſt in Ald. cod. & ad noſtra transfertur.

V. ſ habet.

V. Λαγωπλίαις

C. Alter ἀγκίαν ἕ. quam ſcripturam interpretes ſequuntur. Marcellus tamen < ἑ legit.

Faciunt ad lateris pectorisq; vitia, & vrinas mouent.

De vino Selinite. Cap. LXXIIII.

Seminis apij maturi, recentis & cribrati vncias nouem linteolo colligatas in musti amphoram similiter demittito. Cibi appetẽtiam facit, atque stomachicis & vrinæ difficultate laborãtibus auxiliatur: halitum quoque commendat.

De vinis Marathrite & Anethino. Cap. LXXV.

Ex Fœniculo, Anetho & Petroselino vina eodẽ modo concinnantur, ad eadem efficacia.

De vino è Salis flore. C. LXXVI.

Paratur & è Salis flore vinum ad purgandum efficacius, quàm quod aqua marina tẽperatur. Verùm fauces, renes, vesicam & stomachũ infestat. Quare neq; in secũda, neq; in aduersa valetudine vtile censetur.

De vino Phthorio, seu Abortiuo. Cap. LXXVII.

Fit & vinum quod partus enecat, abortúmve facit. Scilicet dum seruntur vites, veratrum aut cucumis syluester, aut scammonium earũ radicibus adiungitur circumponitúrve. Ita siquidem vuę illorum vires sibi asciscũt ac in sese trahũt, proindéq; vinũ ex ijs depromptũ abortiuum euadit. Datur verò ieiunis mulieribus quæ antè vomuerint, aqua mistum cyathorum octo mensura.

De vino Thymelaite. C. LXXVIII.

Ramorum Thymelææ cum suis folijs & fructu drachmas triginta in tres musti congios mittito, & leui igne coquito, donec congij duo supersint: deindéq; excolatum vinum recondito. Aquosa purgat excrementa, & lienem absumit.

De vino Chamelaite. C. LXXIX.

Chamelææ fruticem dum floret cum folijs tusum cribratúmq; duodecim drachmarum põdere in musti congium addito, ac post duos menses vinum trãsfundito. Hydropicis, hepaticis atque delassatis auxiliatur, itémque fœminis quæ à partu ægrè purgantur.

De vino Chamæpityino. C. LXXX.

Chamæpityinum simili modo concinnatur, & ad eadem cõuenit, vrinæ ciendæ vi præditum.

Α γίζιν. Ποιοῦσι δὲ καὶ πρὸς πλευρὰν καὶ ἡπαρ, καὶ οὖρησιν.

Περὶ Σελινίτου οἴνου. Κεφ. οδ'.

Σελίνου σπέρματος ὠμοῦ, νέου, στεφομένης οὐγγίας ἓξ. ἐνδῆσαι εἰς ὀθόνιον, βάλλε εἰς κεράμιον γλεύκους ὁμοίως. Ποιεῖ δὲ ὄρεξιν τοῖς στομαχικοῖς ἁρμόζει, καὶ δυσουρίαν. ἔστι δὲ καὶ εὔπνους. Β

Περὶ Μαραθρίτου καὶ Ἀνηθίνου οἴνου. Κεφ. οε.

Καὶ Μαραθρίτης δὲ καὶ Ἀνηθίνος, καὶ Πετροσελινίτης ὁμοίως σκευάζονται, πρὸς τὰ αὐτὰ ποιοῦντες.

Περὶ Ἁλοσανθίνου οἴνου. Κεφ. ος'.

Σκευάζεται καὶ δι' ἁλὸς ἀνθους, καθαρικώτερος τοῦ ἀφ' ἁλὸς πηγῆς. κακοῖ δὲ φάρυγγα καὶ νεφροὺς, κύστιν, στόμαχον· ὅλως οὔτε πρὸς ὑγείαν, οὔτι πρὸς πάθη χρήσιμος ὁ ζιοῦτος. C

Περὶ Φθορίου ἐμβρύων οἴνου. Κεφ. οζ'.

Γίνεται δὲ καὶ Φθόριος ἐμβρύων οἶνος. Φυτινομίναις γὰρ ταῖς ἀμπέλοις συμφύεται ἑλλέβορος ἢ σίκυος ἄγριος, ἢ σκαμμωνία, ὧν ἀναλαμβάνει ἡ φυλὴ τὴν δύναμιν. καὶ ὁ ἐξ αὐτῶν οἶνος γίνεται φθόριος. Γίνεται δὲ παρεμπιπτούσης τῆς κυάθων πλήθος ἡ. κεκραμένος. D

Περὶ Θυμελαίτου οἴνου. Κεφ. οη'.

Ὁ Θυμελαίτης. τῶν χλωρῶν σὺν τοῖς φύλλοις καὶ τῷ καρπῷ < λ'. βάλε εἰς γλεύκους χοᾶς γ'. καὶ σκεύαζε ἕψων κούφως. ἄχρις οὗ ϛ'. ἀπολειφθῶσι χόες, καὶ διυλίσας ἀποτίθεσο. Καθαίρει ὑδατώδη, καὶ χολώδη τὰ κοιλίας. Ε Vide vinum.

Περὶ Χαμαιλαίτου οἴνου. Κεφ. οθ'.

Χαμαιλαίτης. ἐπιδὺς αἰθὴρ ὁ θάμνος, μετὰ τῶν φύλλων κόψας καὶ σώσας βάλε < ις'. εἰς γλεύκους χοῦν, καὶ μετὰ μηνῶν β'. μετάγλυκε. Ποιεῖ δὲ ὑδερικῶν, ὑπατικὰς, κεκοπωμένους, καὶ τοὺς ἐκ τοκετοῦ δυσκαθάρτους. F Aldi. ὑγιεινὸν.

Περὶ Χαμαιπιτύινου οἴνου. Κεφ. π'.

Χαμαιπιτύινος ὁμοίως σκευάζεται, καὶ πρὸς τὰ αὐτὰ ἁρμόζει, διουρητικὸς ὤν. G

Περὶ Μανδραγορίτου. Κεφ. πά.

De Mandragorite. Cap. LXXXI.

Μανδραγορίτης. ζωμὸς φλοιοῦ τῆς ῥίζης κεκομμένου, ἕως εἰς λίνον ἡμιμναῖον, καὶ κάρδης εἰς μετρητὴν γλεύκους σταφυλῆς μιλίους γ'. εἶτα μεταλίζε. ἡ μίση δόσις, ἡμικοτύλιον· πίνεται δὲ γλυκέος σταφυλιδομφοῦς εἰς δικοτύλιον. φασὶ δὲ κοιμίζειν καὶ καφῶ κοτύλιον αὐτὸ χοὶ ἑνὶ μιχθέντα, καὶ πολεῖσθαι· μετὰ ξέστου δὲ οἴνου, κύαθος εἷς τοὺς ἀναιρεῖ· Ἔστι δὲ ἡ σύμμιξις χρῆσις αἰσθητικὸς· ῥευματων παχυτικὴ· ὀσφρανόμενος δὲ καὶ ἐγκλυζόμενος ὃ αὐτὸ ποιεῖ.

Vinum è Mandragora ita conficito: Corticem radicis mandragoræ concidito: seminentorum minæ semissem lino traijcito, & in musti metretam demittito, inibique esse finito ad menses tres, tandémque diffundito. Media potio, heminæ dimidium: bibitur verò passo in duplum addito. Aiunt porrò ipsius heminam vni congio mistam potu somnum & soporẽ inducere. Vnicus verò cyathus cum sextario vini potus, enecat. At moderatus ipsius vsus doloris sensum aufert, atq; fluxiones incrassat. Cæterùm & olfactu & infusione idem præstat.

Περὶ Ἐλλεβόρου. Κεφ. πβ'.

De Elleborite. Cap. LXXXII.

Ἐλλεβορίτης. εἰς χοῦν γλεύκους θαλασσαυμβρίου, μέλανος ἐλλεβόρου < ιβ'. λείου βάλε εἰς ὀθονίῳ καθαρῷ, μετὰ χὴ δὲ ὅταν ἀναζέσῃ εἰς ἁλὸς θαλάσσου χοῦν *οὐγγίας ιϛ'. ἢ ιδ'. ὁλοχερῶς στεφανώσας βάλε, καὶ μὲθ' ἡμέρας ἓνας δυλίσας χρῶ. πόσις ξ' κύαθον ἀ, πρὸς χιλίας λυσιν μὲθ' ὕδατος ἐκ βαλανείου, ἐμμεμιγμένον ἀπὸ δείπνου. ἢ ὑγιεῖσι < κ'. χρῖσις *ὑγιείας ιϛ'. στάχυος Συριακῆς ὑγιείας ιγ'. στ ὀποφύλλα ἐν ὀθονίῳ δύσας, κρεμάσας εἰς κεδρίλας ιδ'. Κώδ οἴνου ἐπὶ ἡμέρας μ'. εἶτα ἀποθήσας πόσις ῥία ἡμικοτύλια. ἢ εἰς γλεύκους κεράμιον θαλάσσης πελαγίας ἑφθομένης ξέστας ιβ'. ἐλλεβόρου λευκοῦ λίτρας ς'. ἔμβρεχε ἡμέρας μ'. καὶ ἀποθήσας χρῶ. ἢ ἐλλεβόρου < ιβ'. ἀφρονίτρου < δ'. γλεύκους κοτύλας ιβ'. βρέχε ἐπὶ ἡμέρας ιϛ'. καὶ ἀποθήσας χρῶ μεθ' μιλίους ἓξ. τοῦτο καὶ βρέφη ἐκτιτρώσκει. ἢ καὶ *ἐχθιλεπιδδομφοῦς σταφυλῆς βάλε εἰς γλεύκους μετρητὴν (ἔστι δὲ ὁ μετρητὴς χόες ὀκτὼ) καὶ βάλε γύψου εἰς ⊗ οἴνου < κ'. καὶ ἔασον ἡμέρας β'. καὶ κάδος ἐνδιδυμον ἐλλεβόρου μέλανος οὐγγίας λ'. χοίνου οὐγγίας λ'. καλάμου οὐγγίας λ'. ξηρευθρίδων ἡμιχοίνικον καὶ δ'. σμύρνης δὲ καὶ κρόκου ἀνὰ οὐγγίαν ἀ. σπειλήσας ὀθονίῳ κρέμασον ἡμέρας τεσσαράκοντα μίαν ἐ. Ἐκ τούτων ποτὲ πᾶσι συνεχῶς ἐπιδίδου ἀνὰ σπυρίδιον ἓν ἐν ὀθονίῳ δεδεμένον ἡμέρας ἑπτὰ ἐ. ἐν ὑδρίᾳ ἐν ᾗ ἐστὶν ὁ οἶνος ἐκ τοῦ ἐλλεβόρου. ἐὰν δὲ ἐπιδιδῷ ἡ γαστὴρ, ἐπιδίδου ἕως ἂν ἐκκαθαρθῇ. ἐὰν δὲ μὴ ἐπιδιδῷ

bus quadraginta ſuſpendito. Poſtea excolato, & binos ternóſve cyathos dilutos exhibeto. Purgat à partu & abortu fœminas: fœtus quoque extrahit, éſtque contra vuluæ ſtrangulatus efficax.

De Scammonite. Cap. LXXXIII.

Scammonites ſic fit: Radicis ſcammoniæ per meſſes effoſſæ tritæ & linteo illigatæ drach. xv. in muſti congium vnũ mittito ad dies triginta. Purgat aluum, ac bilem & pituitam detrahit.

De Metallicis omnibus, & primùm de Cadmia. Cap. LXXXIIII.

EX Cadmiæ generibus optima eſt Cypria, quæ botryitis, hoc eſt, racemoſa cognominatur, dẽſa, modicè ponderoſa & in leuitatem magis declinans, extima ſui parte racemoſa, colore cinereo, quæq; cõfracta intus cineracea & æruginoſa conſpicitur. Proxima huic habetur quæ extra quidẽ pene cærulea eſt, intus verò candidior, intercurrẽtibus lineis ſeu maculis onychitæ lapidi ſimilibus: tales enim ſunt quæ è fodinis veteribus eruuntur. Eſt & quæ placitis, quaſi cruſtoſa, dicitur, lineis intercurrentibus ceu zonis quibuſdam cincta: quapropter eam etiã zonitin appellauere. Eſt & alia quæ oſtracitis quaſi teſtacea nominatur, gracilis & magna ex parte nigra, terrea aut teſtacea ſuperficie: ſed candida improbatur. Oculorũ autem medicamentis botryitis nomine & onychitis, vtiles: reliquæ emplaſtris & medicaminibus quæ arida inſperguntur ad trahẽdas cicatrices. Et ad iſta quidem prodeſt Cypria: nam quæ ex Macedonia, Thracia & Hiſpania defertur, inutilis cenſetur. Cadmiæ effectus aſtringere, caua explere ac ſordes purgare. Sed & cutis ſpiracula obducit, ſiccat, cruſtas inducit, excreſcentia in carne cohibet, atque vlcera quæ cacoëthe vocantur, ad cicatricem perducit. Gignitur porrò & Cadmia quędá è fuligine, quę dũ excoquitur ęs (egeſta flãmis flatúq;) lateribus cameriſq; fornacũ applicatur. Sunt verò hæ prægrandes ac ferreæ à metallicis aceſtides appellatæ, per ſumma faſtigia concamerationum ſe ſuccedentium ſtillantes. Quæ ſi ſuccenſæ ſint, ſuffitu ſuo ſtillam ſuccendunt. Quæ ſi ſuccenſæ ſint, ſuffitu ſuo ſtillam ſuccendunt. Quæ ſi ſuccenſæ ſint, ſuffitu ſuo ſtillam ſuccendunt.

A μέρας μ'. εἶτα διύλιζε καὶ δίδου κυάθους γ'. ἢ β' καθ' ὥρας. Καθαίρει δὲ ἐκ τοκετῶν καὶ ἐκ τρωσμῶν· καὶ ἀπὸ ὃ καὶ ἔμβρυα καὶ ὑπὸς δὲ ὑστερικὰς πίγας ποιεῖ.

Περὶ Σκαμμωνίτου. Κεφ. πγ'.

Σκαμμωνίτης σκαμμωνίας τῆς ῥίζης

B < ιδ. ὀρυττομένης ὑπὸ πυραμητὰς ἐμβαλεῖς γλυκέος χοῦ ἵνα λείας, δήσας ὑπὸ ὀθονίῳ ὅτι ἡμέρας λ'. Καθαίρει δὲ καὶ λίαν, ἄγαν χολὴν καὶ φλέγμα.

Ex Ruell. emendat. legit.

Sambin. v. cod. margine hæc legit. γένεται ἡ καλουμένη σκαμμωνία καὶ ἄγαν ἀσθενὴς καὶ ἀκαθαρτος γινομένη Alii ἀγαθ. Lac. καὶ τὸ legit < ιε'. Ruell. < ι.

Περὶ παντὸς λίθου μεταλλικοῦ.

Περὶ Καδμείας. Κεφ. πδ'.

C Καδμεία ἀρίστη μὲν ἔστιν ἡ Κυπρία, καλουμένη βοτρυῖτις, πυκνὴ, βαρεῖα μέσως, καὶ μᾶλλον ὅτι ὃ κουφότερον ῥέπουσα, ἔχουσα τὴν ὑπιφαίνουσαν βοτρυώδη, χρῶμα ἡ σποδοειδὲς, πλαθεῖσα δὲ ἔντορος ἔνδοθεν καὶ ἰώδης. ἐγγυτέρω δέ ἐστιν ἡ ἔξωθεν μὲν κυανίζουσα, ἔνδοθεν δὲ λευκοτέρα, σχιστὴ ἔχουσα

D ἐμφερῆ ὀνυχίτῃ λίθῳ. ζωσταὶ γάρ εἰσιν αἱ ἐκ τῶν παλαιῶν μεταλλων ὀρυττόμεναι. Ἔστι δὲ καὶ πλακώδης τις λεγομένη, ὥσπερ ζώνας ἔχουσα τὰς λιθοφυσὶς ὀνομαζομένας καὶ ζωνῖτιν αὐτὴν ἐκάλεσαν. καλοῦσι δέ τινες καὶ ὀστρακῖτιν, ἰχνὴ, καὶ ὡς ὀστρακῖτιν μέλαιναν, γραώδη δὲ ἡ ὀστρακώδη

E κεχρημένη ὑπιφανείᾳ. Φυλλὶς δὲ ἡ λευκὴ. Χρησιμεύει δὲ πρὸς μὲν τὰ ὀφθαλμικὰ φάρμακα ἡ βοτρυῖτις ἐὰν ὀνυχῖτις καλουμένη· αἱ δὲ λοιπαὶ εἰς ἐμπλάστρους καὶ ξηρὰ, καθυλλὴν δυνάμεις. ἡ δὲ πρὸς ταῦτα χρησιμεύει ἡ Κυπρία ἡ γὰρ ἐκ Μακεδονίας καὶ Θράκης καὶ Ἰβηρίας κομιζομένη,

F ἄχρηστος. Δύναμιν δὲ ἔχει συστατικὴν, κολλαμάτων αἱ ἀναπληρωματικὴν, καθαρτικὴν ῥυπτικῶν. παρεμπλάσσει δὲ καὶ ξηραίνει καὶ ἑλκεσι, καὶ σὺν μέλιτι τὰ ἐκ τραυμάτων, καὶ τὰ κακοήθη τῶν ἑλκῶν ἀποκλείει. Γενᾶται δὲ ἡ καδμεία ἐκ τοῦ χαλκοῦ καμινευομένου, προσιζανούσης τῆς λιγνύος τοῖς τοίχοις καὶ τῇ καμάρᾳ τῆς καμίνου. εἶτα δὲ

G αὖται σβεσθεῖσαι παμμεγέθεις, ὑπὸ τῶν μεταλλουργῶν καλούμεναι ἀκτίδες, καὶ τὰ κορυφὴν σεσημμέναι, παρὰ δὲ κατὰ-

Ruell. aeruginosa legit.

Marcellus legendum suspicatur.

Ita v. cod. quem secutus est Marcellus: at vulg. exempl. γυαλὸς δὲ ὁ ὕαλος.

V. κατασκὸν δυνάμεως σαφεστέρα.

V. Ἐρμῆ. Ita & Cariac.

Lac. legit ex v. cod. γένεται δὲ καὶ καδ.

Plerique Interpretes pro Gallo legisse videntur.

Vnoxaλκον

χεσθαι καὶ ἐφιζάνειν τὰ διαφερόμενα A
σώματα ἀπὸ τοῦ χαλκοῦ. ἄνευ δὲ καὶ
μᾶλλον ἐφιζάνουσα ὀλίγα σώματα ποιεῖται, καὶ
ποτὲ μὲν ἐν εἴδους αὐτῆς, ποτὲ δὲ δύο, ἢ ἅπαν-
τα μόνα ἀποτελεῖται. μεταλλουργεῖται δὲ
ἐν τῷ περιπεπυρωμένῳ * Σολέως ὄρους
τοῦ λεγομένου Πυρίτου λίθου καλουμένου·
ἐν δὲ τῷ αὐτῷ ὄρει εὑρίσκεται οἱονεὶ σχη- B
ζώματά τινα χαλκίτεως, μίσυος, σω-
ρείτου, μελαντηρίας, κυανοῦ, χρυσοκόλ-
λης, χαλκάνθου, διφρυγοῦς. εὑρίσκεται δὲ καὶ
ἐν μεταλλικοῖς φασὶ λιθίνοις εὑρίσκεσθαι
καδμείαν, πλανώμενοι ὑπὸ λίθων
πολλῶν ἐμφέρειαν ἐχόντων· ὥσπερ καὶ ὁ
ἐν τῇ Κύμῃ λίθος εὑρισκόμενος, δυνά- C
μιν δὲ οὐδεμίαν ἐνδεικνύμενος. διαγι-
νωσκομένων αὐτῶν ἐκ τοῦ κουφοτέρους
αὐτοὺς εἶναι τῆς Καδμείας, καὶ διαμασω-
μένοις μὴ διαπεινεῖς ἐν τῇ γεύσει. ἀ-
γέμακτοῦν δὲ ὀδόντας * ἐν τῇ γεύσει
εἰ λίθος εἴη ἐν τῇ διαμασήσῃ. εἰ δὲ
καδμεία εἴη, ἀνέχεσθαι τῆς διαβρά- D
σεως * σωροικνύσης αὐτῆς. ἔτι διακρίνε-
ται καὶ τοῦ πυρὶ μὲν καδμείαν λειοτερ-
γηθεῖσαν σκιὰ ὄζει, καὶ ξηραινθεῖσαν ἐν ἡ-
λίῳ * ἐκπέζειν. ἡ δὲ λίθος μὴ πάσχει
τοῦτο. καὶ ἐν τῷ διαλύεται μὲν τὸν λίθον
τετριμμένον πυρὶ ἀποπνεῖν, καὶ ἡ ἐξ
αὐτοῦ καπνὸν ὁμοιοῦν ἐοικὸς ἀρχῇ τοῦ πυ- E
ρί· πυρὶ δὲ καδμείαν μένειν τε καὶ διαλύεσθαι αἰθάλῳ μηλίζουσαν καὶ χαλ-
κοφανῆ, ὡσπερεὶ ζώνῃ τινὰ ποικίλῃ.
ἔτι ὁ μὲν λίθος πυρωθεὶς καὶ ψυχεὶς ἀλ-
λοιωθήσεται τοῦ χρώματος, καὶ κουφότε-
ρος ἔσται. ἡ δὲ καδμεία κατ' οὐδὲν με-
ταβάλλει, εἰ μή τις αὐτὴν ἐφ' ἡμέρας * ἡ- F
μέρας ἐγκαύσῃ. γλυκαίνεται δὲ καὶ ἐκ τοῦ
ὀξυμέλιτος λευκοτέρα ἐστὶ καὶ κουφοτέρα γίνε-
ται. χρῆται δὲ αὐτῇ διαμασωμένοις. καυστέον δὲ τὴν
προφρηθεῖσαν καδμείαν, ἐγκρύπτοντας εἰς
αὐθράκας, ἕως οὗ διαφανὴς γένηται, καὶ
περιφολυγήσῃ εἰς σιδήρου σκωρίαν· εἶτα
ἐκ τοῦ ὄξους * σβεννύναι ἀμυναίῳ· αὐτὴν δὲ εἰς τὰ G
ψωρικά, ὄξει. ἐνίοις δὲ αὐτὴν οὕτω καῦσαν

merate, vt quę ab ęre sursum ferun-
tur corpuscula inibi detineantur &
inhæreścát: hæc cũ spissiùs adhære-
scunt, in vnum corpus coalescunt,
atque vnum modò cadmiæ genus,
modo duo, modò omnia efficiun-
tur. Conficitur & Cadmia cremato
lapide cui Pyritæ cognomen est, è
monte qui Solis incumbit eruto. In
eodé vero monte reperiuntur quæ-
dam quasi venæ chalciteos, misyos,
soreos, melanteriæ, cærulei, chryso-
collæ, atraméti sutorij, atque etiam
diphrygis. Nec desunt qui cadmiã
in lapidum fodinis inueniri tradãt,
decepti non parua lapidũ quorun-
dam cũ cadmia similitudine, qua-
lis inuenitur & apud Cumas lapis
nullam sui vim ostendens. Atque hi
eo deprehenduntur, quòd sunt ca-
dmia leuiores, itémq; commandu-
cati gustum ac ipsos etiam dentes
offendunt: at cadmia, quippe quæ
dentibus cedat, sine offensa mandi
potest. Alio insuper discerni pos-
sunt argumento: Cadmia siquidem
in farinam detrita & aceto subacta
atque in sole siccata coit, quod la-
pidi non accidit. Adhæc tritus lapis
igni impositus dissilit, & fumum
ab ignis ipsius fumo haudquaquam
diuersum emittit. Cadmia vero
quieta manet, fulginémque reddit
ad luteum vergentem, cręóque co-
lore splendẽtem, ceu zonam quan-
dam variam. Insuper lapis ignem
expertus deindéque refrigeratus
colorem mutabit, ac leuior quoque
fiet: sed cadmia nullatenus euariat, nisi quis eam multis horis cre-
mauerit. Fit & in argenti fornaci-
bus candidior & minùs ponderosa,
sed viribus impar. Vritur porrò an-
tedicta cadmia carbonibus obru-
ta, donec translucida euadat & ferri scoriæ modo bullet: dein extin-
guitur vino Aminæo: sed quæ ad
psorarum medicamenta præpara-
tur, aceto. Nonnulli verò hoc mo-
do exustam vino subigunt, rur-
súmque in olla cruda torrent, do-
nec pumicosa videatur, iterúm-
que tritam ex vino tertiò vrunt,
vsquedum prorsus in cinerem re-

Vide lapidem ad Cumas.

Lege in vet. cod. ὀγδοήκοντα. Ita & Orib.

καταλείαντες οἶνῳ, καὶ πάλιν πάλιν ἐν ὑμῇ χύτρᾳ, μέχρι καταρρώδης τὴν ὄψιν γένη-
ται· πάλιν δὲ μετ' οἴνου λειοτριβήσαντες, πίτυι καίοντι, μέχρι τελείως εἰς σποδὸν

digatur, nihil ſcabritiæ retinens: atque hac ſpodij vice vtuntur. Lauatur autem trita in mortario, aqua ſubinde effuſa, dum nihil ſordidi ſupernatet: túmque in paſtillos coacta reponitur.

De Pompholyge. Cap. LXXXV.

POMPHOLYX à ſpodo ſpecie ſola diſtat, non item genere. Siquidem ſpodos quodammodo nigricat & plerunque póderoſior eſt, ſcintillarum, pilorú ac terræ plena, quaſi purgamétum quoddam quod ab æratiarum officinarú pauimentis atque fornacibus euerritur atq; deraditur. Pompholyx verò pinguis eſt & candida, inſupérque leuiſſima, vt in aërem euolare poſſit. Et huius quidem duo ſunt genera: vnum ad aëris colorem vergens & ſubpingue: alterú perquàm candidum, ſummámq; leuitaté nactum. Fit verò candida pompholyx, cùm in liquando perficiendóq; ære fabri detritam cadmiam cumulatiùs inſperſerint, eo ſcilicet conſilio vt illá reddant meliorem. Etenim quæ ab hac effertur fauilla, candidiſſima eſt atque in pompholygem coit. Neq; verò ſolùm factitarut pompholyx ex æris materia, interea dum illud coquitur atque perficitur, ſed & è cadmia follibus proflata, conſultò vt illa gignatur. Eius autem faciundæ ratio hæc eſt: In domo gemina contignatione operta extruitur caminus, & in eo tabulatú verſus mediocris feneſtra quæ ſupernè pateat. Ædiculæ verò paries camino proximæ anguſto foramine ad ipſam fornacem vſque perforatur, fiſtulæ follis excipiendæ gratia. Habet & oſtium mediocre pro ingreſſu egreſſúque ab artifice fabricatú. Huic ædiculæ altera præterea contigua eſt, in qua & folles & is cui ſufflandi cura demandatur ſuo munere funguntur. Quod ſupereſt carbones inditi fornaci ſuccenduntur: ac deinde qui aſtat artifex cadmiam minutim cõtritam inſpergit à locis ſupra fornacis verticẽ extructis. Idem negotium obit miniſter artificis, ſimul & carbones identidẽ ingerit, vſq; dum quicquid cadmiæ inditú eſt abſumptú fuerit.

τὸ πνεῦμα ἅμα δὲ αἰθαλιαὶ συνεμβάλλῃ, ἄχρις αὖ ὃ συνεστήκει πλῆθος ἀναλώσῃ.

Α αἰαλυξῇ μηδὲν ἔχουσα ψαχύ· ἐπὶ αὐτῇ ἀσβόλου χεῖται τῇ ἰδιαύτῃ. πλύνεται δὲ ὑγρᾷ πολλάκις τῷ ὕδατι μηδὲν ἐφιζῆται ῥύπαρὸν, καὶ ἀναπλασθεῖσα ἀποξύνεται.

Περὶ Πομφόλυγος. Κεφ. πέ.

ΠΟΜΦΟΛΥΞ ἀσβόλου εἰδικῶς διαφέρει. χημικὴν γὰρ ἔχει τὴν ἐλλαγήν. ἡ μὲν γὰρ ἀσβόλη μελανίζει καὶ βαρυτέρα ἐστὶ τῷ πλέον, ἔμπλεως καρφῶν καὶ πεταλῶν καὶ γῆς, ὡσανεὶ ἀπόψυγμά τι καὶ σύρμα τῶν ἐν ταῖς χαλκουργίαις ἐδάφων καὶ καμίνων οὖσα· ἡ δὲ πομφόλυξ λιπαρὰ ὑπάρχει καὶ λευκή, ἔτι δὲ κουφοτάτη ἐστὶ διὰ τὸ ὅτι πολλοῦ, ὡς ἀεὶ ἐκ τούτου δύο ἐστὶν εἴδη. τὸ μὲν, ἀργιζον καὶ ὑποπίμελον· τὸ δὲ, λίαν λευκὸν, καὶ ἄκρως ἔχον κουφότητος. γίνεται δὲ ἡ λευκὴ πομφόλυξ, ὅταν ἐν τῇ κατεργασίᾳ καὶ πλείονος τοῦ χαλκοῦ πυκνότερον. ἐν τῷ χαλκουργείῳ συμμπάσασι λεπτομερεσμένῳ καὶ ὑμένι, βελτίονα αὐτὴν βουλόμενοι. ἡ γὰρ ἀπὸ τούτου ἀφαιρεθεῖσα αἰθάλη, λευκοτάτη οὖσα πομφολυγοῦται. οὐ μόνον δὲ ἐκ τῆς τοῦ χαλκοῦ κατεργασίας τε καὶ ὕλης γίνεται πομφόλυξ, ἀλλὰ καὶ ἐκ καδμείας τοιαύτης συμμιγνυμένης ἐκφυσωμένης εἰς ἠθμὸν αὐτῆς. ποιεῖται δὲ οὕτως· ἐν οἴκῳ διπλῷ καταστενάζεται κάμινος, καὶ κατὰ ταύτην πρὸς τὸ ὑπερῷον ἐκ τομῆς σύμμετρός τις καὶ ἐκ τῶν αὐτῶν μερῶν αἰωρεῖται. ὁ δὲ τοῖχος τοῦ οἰκήματος ᾧ πλησιάζει ἡ κάμινος, πεπᾶται λεπτῷ πρόμαλι ἄχρις αὐτῆς τῆς χώνης εἰς τὸν ἠθμὸν φυσητῆρος· ἔχει δὲ καὶ θύρας συμμέτρους πρὸς εἴσοδον καὶ ἔξοδον κατεσκευασμένας ὑπὸ τῷ πυρίπνῳ στεγῶσαι δὲ τοῦτο τὸ οἰκήμα ἕτερος οἶκος, ᾧ αἱ φύσαι καὶ ὁ φυσητὴρ ἐργάζεται· λοιπὸν ἀνθρακες ἐπίβαλλονται τῇ καμίνῳ καὶ πυροῦνται, ἔπειτα σαρεῖται ὁ πυρίτης ἐμπάσαι λελεπτοχοημμένῳ πηλῷ καδμείδι ἐκ τῆς χοάνης τόπων. ὑπὸ χεῖρά τε τὸ αὐτὸ

Πομφόλυξ ἀσβόλου εἰδικῶς διαφέρει. Simb. ἰουμφέ legit.

V. κατασύρματα

G. verba hæc nõ ſunt in vetere altero, ſed vulgata lectio rectior.

Meurſ. legit ἐκκαυ

Interpretes videntur legiſſe κατέσκαπται.

Al. διστῷ

V. add. διστῷ

Forte, ἐν ὃ

ἐκθυμιωμένης ὑπ' αὐτῆς, ὃ μὲν λεπτομερὲς καὶ κοῦφον, εἰς ☉ ἄνω ἀναφέρεται δίκην, καὶ προσιζάνει τοῖς τοίχοις αὐτῆ καὶ τῇ ὀροφῇ. τὸ δὲ σῶμα τὸ παχύμερον ὑπολειπόμενον ἐν τῇ ὑπιφερομένῃ, κατ' ἀρχὰς μὲν ταῖς ἐπηωρισμέναις τῇ ὑδάτων πομφόλυξιν ἐοικὸς γίνεται, ὕστερον δὲ πλείονος τῆς αὐξήσεως συμβαινούσης ἐείκει τοῖς λύπαις ἀφομοιοῦται. ὃ δὲ βαρύτερον εἰς τὸν ὑπὸ πόδα χωρεῖ τόπους· καὶ τοσοῦτον μὲν τῇ καμίνῳ, τοῦτο δὲ τῷ ἐδάφει τοῦ οἴκου· ὃ καὶ φαυλότερον τοῦ λεπτομεροῦς ἡγητέον, διὰ τὸ γεώδους καὶ ἐμπλέον ἀκαθαρσίας εἶναι ἐν τῇ συγκομιδῇ. ἔνιοι δὲ μόνας οὕτως οἴονται γίνεσθαι τὰς τοιαύτας ἀποδόσεις. ἀρίστην δὲ ἡγητέον τὴν Κυπρίαν, ἐν τῷ ὄζει φυσαρῶδη ἀποφορὰν μὲν ἔχουσαν χαλκοῦ, χρόαν δὲ παρίζουσαν ποσῶς, ἐπὶ δὲ βορβορίζουσαν ἐν τῇ γλύσει· καὶ ἐπ' αὐθαίρετος διαπύρου ὑπτίᾳ ἄδηλος, ὑπιζεῖ ἀεροχρόους γινομένη. ὑπιμελῶς δὲ προσεκτέον τοῖς τοιούτοις κριτηρίοις. δόλοῦται γὰρ ὑπό τινων ζωμοχάλλῃ, ἢ πυθμέσιν ὀρνιθείοις ἢ θαλασσίοις, ἢ κεκαυμένοις ὀλιγίστοις, καί ποτε ἄλλοις τοιούτοις παπλησίοις. εὐχερὴς δὲ ὁ διάγνωσις. σύνεστι γὰρ τὴν τοιαύτην ἐν τῇ δοκιμασίᾳ ὑπὸ ταύτων διείσκεσθαι. πλυτέον δὲ κοινῶς πομφόλυγα ☉ ξύπνον πιστόν· ἐνδύσας αὐτὴν ἐν καθαρῷ ὀθονίῳ μέσως ἔχουσαν ἀραιότητος, ἢ ξηρὸν ἢ ὕδατι τετρυμμένῳ, κἄπειτα εἰς λεκανίδιον ὕδωρ ἔχουσαν ὄμβριον, καὶ ἔγκλυζε ὧδε καὶ κἀκεῖσε διαφέρων ☉ ἐνδίσμιον. οὕτω γὰρ ὁ μὲν ἰλυώδης καὶ πάχιμον αὐτῆς ἀπορρύσεται, ὁ δὲ σκύβαλον πρὸς ἐν τῷ ὀθονίῳ μενεῖ. εἶτα ἐάσας καταζῆναι, ἀπόπτησον τὸ ὕδωρ σὺν τῇ σποδῷ. καὶ πάλιν ἄλλο ὑπιχέας ἀνατάραττε καὶ ἀπόχεε. καὶ ταῦτα ποίει ἀπτηδῶν τε καὶ ἀποχέων, μέχρις οὗ μηδὲν ἀμμώδες ὑφίζοιτο. λοιπὸν τὸ μὲν ὕδωρ ἐξίπτασον, τὴν δὲ σποδὸν ξηράνας ἀπόθου. τινὲς δὲ ξηράναντες ἐφ' ὅσον ἐνδέχεται, τὴν χερσὶ λειάναντες μετ' ὑδάτος, καὶ μηλωθῇ τὴν σύστασιν ποιήσαντες, ἀνθοῦσι δ' ὀθονίῳ περιπάσσουσι

A Porrò dum ipsa vritur, egesta flammis flatibúsque pars tenuis ac leuis in superius cœnaculum effertur, atque ipsius parietibus tectóque adhæresc it. Inde verò conflatum corpus, inter initia quidem bullarum in aqua surgẽtium similitudiné refert: at postea incremento subinde accedẽte, lanarum carptarũ flocculos imitatur. Quod autẽ ponderosius est, in ima loca concedit, & partim quidẽ fornaci, partim etiã domus pauimento circunfunditur. Et hoc quidem tenuiore deterius existimandũ est, ideo quòd dum colligitur, terræ spurcitiæq; non parum ascisc at. Sunt qui hoc tãtùm modo antè memoratã spodon fieri arbitrantur. Optima autẽ cẽsetur Pompholyx Cypria, quæ aceto subacta odoré æris præstat, & colore æruginé quodammodo refert, insupérq; gustu cœnum sapit. Atq; si fraudem non experta ignito carboni imponatur, inferuescit aëreum cõtrahés coloré. Cæterùm antedictis notis diligenter attendendũ est. Siquidé à nonnullis taurino glutine, aut pulmonibus agninis vel etiã marinis, aut crematis grossis & quibusdam aliis consimilibus adulteratur: id quod tamé facile est deprehẽdere. Quippe in his explorãdis nihil eorũ cõperietur quæ antedicta sunt. Porrò Pompholygem in vniuersum ita lauari oportet: Linteolo mũdo modicéq; raro illigatam seu aridã seu aqua subactã in peluim demittito, quæ pluuiam aquam contineat: linteolum cui illigatur aquę immergito, ipsum huc atq; illuc peragitans. Sic enim illius pars limosa & vtilis præterfluet: omne verò crassamen intra linteolum retinebitur. Posteaquam verò resid ere fueris, aquam cinere excolato: ac vbi aliã rursum affuderis, agitato & effundito, toticésque aquam permutato, cæteráque similiter facito, dum nihil arenosi subsidat: demum aquam exprimito, & siccatum cinerem reponito. Sunt qui postquam pompholygem quantum maximè licuit, exiccarunt, eam manibus in aqua conterunt, donec mellis crassitudinem habeat: deinde linteo

fauctibus excepturi vasis obtẽto, aut etiam laxiùs deligato colant, & quo facilius transmittatur, infusa linteo largiore aqua cinerem conturbant: mox spumosum quod traiectũ est & vasi supernatat, concha excipiunt, atque fictili nouo ad vsus recondunt. Quod verò resedit sensim cribratum in aliud vas transfundunt, relicto arenoso quod pessum ierat. Rursus lapidosa sidere patiũtur, & in vas aliud mundum excolant: atque hoc identidem faciunt, donec cinis purus & arenæ expers euaserit. Alij pompholygem totam & omnibus sui partibus cõstantem aquæ paulatim inspergunt, arbitrati fore vt antedictæ arenæ lapilliq; insita grauitate vasis fundum petãt, pili autem & paleæ, cæteráque eiusmodi sua leuitate in sublime tollantur. Tandem vbi cinerem medium sepositum & in pilam coniecerunt, cum veluti cadmiam eluunt. Lauatur & vino Chio aqua marina diluto, iuxta modos quos supra cõmemorauimus: & ita redditur astringẽtior, quàm dum aqua eluitur. Vis Pompholygis astringere, refrigerare, explere, purgare, spiracula cutis obducere, & quadantenus exiccare. Quòd si spodiũ torrere opus fuerit, diligenter tritum & aqua irrigatũ cogito in pastillos, fictilique nouo subiectis leuibus prunis orbiculos assiduè versato, dum assiccati fulueſcant. Cæterùm minimè ignorandum ex auro quoque & argento, insupérque plumbo fieri spodium: verùm post cupreum, plumbeum maximè commendatur.

A αὐτὸ τῷ ὑποδίχεσθαι μέλλοντι ἀγλείῳ, ἢ καὶ ἀποδιοσμῖες οὐλίαι ἀποτελοῦσιν. ὁρῶς δὲ ῥᾳδίως διεξελθεῖν, δι' ψιλὲς ὕδωρ ἐπιχέαντες ἐφ' ὀργάνῳ, αἱ ἀπορέουσι τὴν ἀποδύν· εἶτα τὸ διυλισθὲν καὶ ἐπινηχόμενον αὐτῆς τῷ ἀγλείῳ ἀφρῶδες ὂν, αὐτόθεν μύαξι αἱ λαμβάνουσιν, ἀποθέμεναι εἰς ὀστράκινον χαλκοῦν ἀγλέον. τὸ δὲ ἐγκαθήμενον ὁρᾶς διασποδμῖες, μεταχέουσιν εἰς ἕτερον ἀγλέον, ἀπολείποντες τῇ σὺν τῷ πυθμένι ἀμμώδες· πάλιν δὲ ἐάσαντες ἱζανθῆναι τὰ λιθώδη, εἰς ἄλλο ἀγλέον καθαρὸν ἀπηχοῦσι· καὶ τοῦτο πολλάκις ὁρῶσι, ἕως ἂν καθαρὸν καὶ ἀμέτοχον ἄμμου γλίπται ἡ ἀποδύς. ἄλλοι δὲ ὡς ἔστιν ὁλομερὴς εἰς ὕδωρ κατ' ὀλίγον ἐμπάσουσι, τῇ προφρημένῳ εἰρημένοι ἄμμον μὴ ἐν τοῖς λιθώδεσι τῷ ἰδίῳ βάρει εἰς τὸν πυθμένα τοῦ ἀγλέου καταῤῥυήσεσθαι· τείχας δὲ ἐν καρφὶ καὶ τὰ ὅμοια ἐπαμορηθήσεσθαι διὰ τὴν κουφότητα· λοιπὸν χωρίσαντες αὐτῶν τὴν ἀποδὺν ἐν μέσῳ ὕδατι, καὶ εἰς ὑάλου βαλόντες, πλύνουσιν ὡς καὶ μίαν· πλυνέον δ' ἐν οἴνῳ Χίῳ τεθαλασσωμένῳ, ἢ τοῖς προφρημένοις ὄξεσι· καὶ γίνεται συμπικνοτέρα ἡ ὕδατι πλυνομένης. Δύναμιν δὲ ἔχει ἡ πομφόλυξ συμπικτικὴν, ψυκτικὴν, διαπληρωτικὴν, καθαρτικὴν, προσταλτικὴν, καὶ ποσῶς ξηραντικήν*. ἐὰν δὲ ὀπτήσας δίς τὴν ἀποδύν, λεπίδας ὀπτὰ μέλασ αὐτὴν καὶ διαδύσας ὕδατι, ποιήσας ἐμπλάσεις, ἐς ἐπ' ὄστρακον χαλκοῦν· ὀπτᾶται δὲ τοῦτο ὀπὶ λεπτὸν καὶ κούφως διθρακιαῖ, καὶ τρίφεται τοῖς κυκλίσκοις συνεχῶς, ἄχρις ἂν πυῤῥοὶ ἐν ξηροὶ γένων. γνωστέον δὲ ὅτι ἐκ τοῦ χρυσοῦ καὶ ἀργύρου, ἔτι δὲ καὶ μολύβδου γίνεται ἀποδιά· καὶ ἔστι μετὰ τὴν κωφρίαν ἡ ἐκ τοῦ μολύβδου ἀείση.

Lac. ex ver. cod. καπνίσει. Id. γνωστέον. Sic etiam legit Orib.

De Antispodis, hoc est, Spodi succedaneis. Cap. LXXXVI.

QVANDOQVIDEM deficiente sæpenumero Spodio, Antispoda quæ in illius locum sufficiuntur, non mediocrem præbent vsum, interesse fuerit ostendere, quænam ea sint quæ similiter pollent, & quo modo vsurpari debeant. Folia itaque myrti sumito cum floribus & baccis adhuc immaturis, eáque in ollam crudam conijcito,

Περὶ Ἀντιποδῶν. Κεφ. πϛ'.

ΕΠΕΙΔΗ δὲ καὶ τὰ Ἀντίποδα ἰσχνῶς εὑρίσκεται, ὑστερόσης πολλάκις ἀποδοῦ, τὰ ἰσοδυναμοῦντα αἰανγκαῖον ὄξιν ὑποδείξαι, ἵνα τε ὑπάρχει, καὶ οὗ ὄξιον παραλήψεται. λαβὼν τοίνυν μυρσίνης τὰ φύλλα σὺν τοῖς ἄνθεσι καὶ τοῖς μύρτοις ἀώροις ἔτι οὖσιν, ἔμβαλε εἰς ὠμὴν χύτραν,

Ald. in marg. add. περὶ

καὶ ἀλειπλάσας τὸ πῶμα καὶ λατετημένον συνεχέσιν ὀπαῖς, δὸς εἰς κάμινον κεραμικήν. ὅταν δ' ὀπτηθῇ ὁ κέραμος, εἰς ἄλλην χύτραν ὠμὴν μεταφράσας αὐτὸ καὶ πάλιν καλοπληθίσας καὶ τὰ δεύτερα, ἐξελὼν πλύνε καὶ χρῶ. ὡσαύτως δὲ καὶ θαλλίαν σκευάσας προσλαμβάνε. ἔστω δὲ τῆς ἀγρίας ἐλαίας εἰ δὲ μή, τῆ ἡμέρᾳ σὺν τοῖς ἄνθεσιν· εἰ δὲ μή, μῆλα κυδώνια κεκοπτημένα καὶ ἐξοχεισμένα, ἢ κηκίδα, ἢ ῥάχη λινῆ, ἢ ἄωρα συκάμινα λευκὰ προεξηραμένα ἐν ἡλίῳ, ἢ ἄχινον, ἢ τέρμινθον, ἢ οἰναίθην, ἢ βάτου τὰ ἁπαλὰ φύλλα, ἢ πύξου κόμας, ἢ τὴν λεγομένην ψευδοκύπειρον σὺν τῷ ἄνθει. τινὲς δὲ κράδας συκῆς, προεξηραμένας ἐν ἡλίῳ, ὡσαύτως σκευάζουσιν· ἄλλοι δὲ ταυρείῳ κόλλᾳ· εἶτα, εἶτα οἱ συπτικοὶ, ῥαχία πίσσῃ ἢ μέλιτι δεύσαντες, ὁμοίως σκευάζουσι. χρῆσις δὲ πάντων τῶν εἰρημένων πεποίηται εἰς τὰ αἰτιασόδια.

Add. Lacuna ex v. cod. Augs.

Ald. interserit βοτείων

Al. ψευδοκύπειρον

Hic posterior periodum addidit Goupylus ex veteribus libris.

Περὶ κεκαυμένου Χαλκοῦ. Κεφ. πζ.

ΟΑΣ ΚΕΚΑΥΜΕΝΟΣ χαλκὸς ἔστι χαλκὸς, ὁ ἐρυθρὸς, ὃς ἐν τῇ βαφῇ κιννάβαρίζων ὁ μέλας, πλέον ἢ δεῖ κάκαυ). σκευάζεται δὲ ἐκ τῶν πλοίων τῶν λελυμένων πλοίων, συμβεβλημένων ἐν ὠμῇ χύτρᾳ, ὑποπασσομένου θείου μετὰ ἀλῶν ἴσων, καὶ ὑποπασσομένων ἑνὸς μέρους. πεμμαθεῖσα δὲ ἡ χύτρα καὶ ὑποζευχθεῖσα πηλῷ κεραμικῷ, δίδοται εἰς κάμινον, ἄχρις οὗ τελείως ὀπτηθῇ. ⓐ δέ, ἀντὶ τοῦ θείου καὶ τῶν ἁλῶν συμπήγεια παραμπάσσουσιν. ἔνιοι δὲ ἄχα τοῦ θείου καὶ τῶν ἁλῶν συμβάντες ἐν χύτρᾳ, καίουσιν ἐφ' ἡμέρας ἑπτά. ⓐ δέ, τῷ θείῳ μόνῳ χρῶνται, ἀποβολεύοντες μίσυι. ἄλλοι δὲ χέοντες τοῖς πλοίοις χρῖμ συμπηγίᾳ μετὰ θείου καὶ ὄξους, καίουσιν ἐν ὠμῇ χύτρᾳ. ἄλλοι δὲ ἐν χαλκῇ χύτρᾳ ὄξει καταῤῥαίνοντες αὐτοὺς, οὕτως ὀπτῶσι. μετὰ δὲ τὸ καῦσαι, πάλιν τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν ὅτι πολλάκις, ἔπειτα ἀποτιθέασι· θεωρεῖται δὲ ὁ ἐν Μέμφιδι κάκωμος· ἔπειτα ὁ ἐν Κύπρῳ. Δύναται δὲ σύφειν, ξηραίνειν, λεπτύνειν, καταψύλλειν, ὅταν τὰ ὄμματα, ἀναθαίρειν, ἕλκη ἀπολεῖν· σμήχει τὰ ἐν ὀφθαλμοῖς, τίθεται τὰ ὑπερσαρκοῦντα, νομαί· ἰσχάει· κιρρὶ δὲ καὶ ἑμέτους μετ' ὕδρο-

& oblito operculo crebris pertuſo foraminibus, indito figlinę fornaci. Cúmq; figlinum percoctum fuerit, in aliud fictile crudum illa transferto: & hoc altero rurſum peraſſato, exempta lauato, & vtitor. In eundē vſum ſimiliter etiam præparare licet cauliculos ſylueſtris oliuæ cum ſuis floribus, ſiquidem habeantur: ſin minùs, ſatiuæ: atque horum penuria, mala quoque cydonia conciſa nucleis exemptis, aut gallam, aut panniculos lineos, aut mora immatura, id eſt, candida in ſole priùs arefacta, aut lentiſcum, aut terebinthum, aut œnanthen, vel tenera rubi folia, vel buxi comam, vel pſeudocyperum appellatam cum flore. Aliqui ficulneos ramulos in ſole antea ſiccatos eodem modo præparant: alij taurinum gluten: alij ſuccidas lanas aſperas, pice aut melle imbutas. Cæterùm antedicta iſthæc omnia in ſpodij vicem vſurpantur.

De AEre vſto. Cap. LXXXVII.

AES vſtum probatur rubrum, & quod dū teritur, colore cinnabarim imitatur: nigrum, plus quàm deceat exuſtum eſt. Fit autem è clauis diſſolutarum nauium in fictili crudo compoſitis, ſubſtrato ſulphure cum ſalis pari pondere, & ijſdem his viciſſim inſparſis. Olla operculata etiam circumlito creta figulari ſpiramento inditur fornaci, donec figlinū planè percoquatur. Alij pro ſulphure & ſale, alumē inſpergunt. Quidam ſine ſulphure & ſale compoſitos in olla clauos ad multos dies vrunt. Alij ſolo ſulphure vruntur: claui tamen ſic vſti fuligine inficiuntur. Alij oblitos ſciſſili alumine clauos, additis ſulphure & aceto, fictili crudo cremāt. Alij deniq; in ænea olla aceto aſperſos vrunt, deindéque iterum ac tertiò idem faciunt, poſteáque recondunt. Principem locū obtinet, quod in Memphide combuſtum eſt: proximum, quod in Cypro. Vis ipſius aſtringere, exiccare, extenuare, reprimere, attrahere, repurgare, vlcera ad cicatricem perducere, oculorum vitia exterere, excreſcentia in carne abſumere, & nomas cohibere. Facit & vomitiones ex hydro-

melite potú, aut cum melle delin-
ctú illitúmve. Porrò lauatur vt Cadmia, mutata quater die aqua, donec ſpumæ nihil prorſus innatare videatur. Quin & æris ſcoria ſimili modo lota, eandem quoq; vim, ſed imbecilliorem, obtinet.

A μέλιτος πολὺς ἢ ἐκλειχθεὶς σὺν μέλιτι, ἢ
ἔλαιον χειόμενος πλυνῇ ὃ τ' ὡς ἢ καδμεία,
τετράκις τῆς ἡμέρας ἀναμένη τὸ ὕδα-
τος, ἄχρι μηδεμία ἐφίσηται λέπνη. καὶ
ἡ σποδιὰ δὲ αὐτῆς, ὡσαύτως πλυνομένη,
τὴν αὐτὴν ἴσχει δύναμιν, ἀσθενεστέραν μέν τοι.

Marcellus minus recte hæc ζόμενον legendum ſuſpicatur Cornarius, λέπνιδ eſt, vt ipſe vult, ſcoriæ.

De Flore æris. Cap. LXXXVIII.

FLOS æris, quem nonnulli clauorum veterum pſegma, quaſi ramétum, nominarunt, optimus cenſetur qui friabilis eſt, & dum teritur valdè rufus, milio forma ſimilis, exiguus, põderoſus, mediocriter ſplẽdens, quíq; inſuper delimatam æris ſcobem minimè recepit, qua quidé adulterari cõſueuit: ſed eo fraus deprehenditur, quòd ſcobs illa dentibus appreſſa dilatatur. Fit autẽ ille, cùm ęs fornacibus metallicis fuſum in receptacula delapſum fuerit per cola tubulorum ad ea pertinẽtium. Tùm enim ij qui repurgãdis metallorum inquinamentis præfecti ſunt aquam puriſſimá ęri affundunt, eius refrigerãdi gratia. Hac verò repentina denſatione cõcretionéq; velut expuitur & emicat antedictus flos. Porrò aſtringit is & excreſcẽtia cohibet: deterget ea quæ pupillis oculorum officiunt atque caliginẽ offundunt, ſed magnopere mordet. Quaternũm etiã obolorum põdere datꝰ, craſſos humores extrahit: quin & abſumit nariũ carnoſa vitia, itéq; ſedis: papularũ eruptiones cum vino cohibet. Cæterùm is qui candidus eſt, cõtra diuturnas auriũ grauitates tritus, in eas per fiſtulam flatu impellitur: reprimit & vuam atque tonſillas farina eius cum melle admota.

B ΧΑΛΚΟΥ δὲ ἄνθος, ὅ τινες τῶν πα-
λαιῶν ἧλων ψῆγμα ἐκάλεσαν, ἄρι-
στον ἔστι δ' εὔθρυπτον καὶ κατάπυρρον τὸ δὲ
λεαινόμενον, κεγχρώδες τι τῷ ῥυθμῷ
καὶ βαρὺ καὶ βαρὺ καὶ μέσως στίλβον,
ἐπὶ δὲ ῥινισμάτων χαλκοῦ ἀμέτοχον, οἷς
δόλοῦται. ἐλέγχεται δὲ πλατυνομένῳ
αὐτῶν ταῖς τῶν ὀδόντων ἐπερείσεσι. γίνε-
ται δὲ οὕτως· ὅταν γὰρ μεταλλικαῖς χώ-
ναις πολὺς ὁ χαλκὸς εἰς τοὺς δεξαμενοὺς
καταῤῥυῇ διὰ τῶν ἡμῶν τῶν διηκό-
των σωλήνων, διὰ καθαίροντες τὴν ἀ-
καθαρσίαν οἱ τοῖς οὕτως ὄντες, ὕδωρ
ὀπιχέουσιν ἀκραιφνέστατον αὐτῷ, ψύξεως
ποιησόμενοι· ἐκτὸς οὖν τῆς ἀφριδίου
πυκνώσεως καὶ συναγωγῆς, ὥσπερ ἐκ-
πέτεται καὶ ἐπιπολῆς ὁ τοιοῦτος ἀνθος.
σύφει δὲ καὶ ἕδρα καὶ καταφύλλει τοὺς
ὑπερσαρκεῖς· καὶ σμήχει τὰ τῆς κόρης
ὑπισχνούμενα, δάκνον ἀσφῶς. ἔστι δὲ καὶ
πάχος ἀγαγεῖν, τετραωβόλου πλῆθος δι-
δόμενον· ἐκτίνει δὲ καὶ τὰ ἐν μυκτῆρ-
σι σαρκώματα καὶ δακτυλίους, ἕλκω-
θήματα σὺν οἴνῳ φίλει. καὶ τοὺς δυσ-
χώφους χρονίους τὸ λευκὸν ἐμφυσᾶται
διὰ σίφωνος λεῖον· φίλει δὲ καὶ κιονίδας
καὶ παιδιάθμια, λεῖον σὺν μέλιτι προσα-
πτόμενον.

V. ὑπάρχον

Al. add. ῥινισμάτων quam vocem expreſſit Ruellius.

C

D

Al. κρύπτει

De Squamma æris. C. LXXXIX.

SQUAMMA Cypriarum officinarum clauis excuſſa, cõmendatur quæ craſſa eſt, & helitis, quaſi clauaris, nominatur: at vitioſa cenſetur quæ ex cãdido ære decutitur, quippe quæ tenuis & inualida ſit. Hanc ideo damnamus: illam verò deligimus quę craſſa fuluáque eſt, & aceti reſperſu æruginem contrahit. Vim habet reprimendi, attenuandi, nomas cohibendi, putrefaciendi & cicatrices obducendi. Pota verò ex aqua mulſa, aquas ſubducit. Aliqui

F Περὶ Λεπίδος. Κεφ. πθ'.

ΛΕΠΙΣ δὲ ἡ ἀπὸ τῶν Κυπρίων χαλ-
κουργικῶν ἧλων παχεῖα, καλουμένη
δὲ ἡλῖτις, καλή. φαύλη δὲ ἡ ἐκ τοῦ χαλ-
κοῦ λευκοῦ λεπὶς ἐκθεσις ὑπάρχουσα.
ταύτῃ ἀποδοκιμάζομεν, ἐγκρίνοντες τὴν πα-
χεῖαν ἐγκιρρον, καὶ ὄξος ὑπερβαλομένην
ἰώδη. δύναμιν δὲ ἔχει καθαρτικήν,
λεπτυντικήν· νομῶν ἐφεκτικήν, σπε-
πτικήν, ἀπυλωτικήν· συνομὴν δὲ
μετὰ μελικράτου, ὕδωρ ἄγει. πινὲς

Al. πυρίων μετάλλων κατάρ.

Al. φακοειδ.

V. καθαρτικήν.

Al. add. σαρκ. Al. ξηραντικ.

δὶ φυρῶντες αὐτὴν μετ' ἀλεύρου, εἰς καλα-
πτῆριον διδόασι. μίγνυται δὲ καὶ ταῖς ὀφθαλ-
μικαῖς δυνάμεσι· ξηραίνει γὰρ καὶ βλέφα-
ρα καὶ τραχύα, ἀποπίνουσα, καὶ τὰ ῥεύ-
ματα. πλύνεται δὲ οὕτως· καθαίρας
τῆς ξηρᾶς λεπίδος ἡμιμναῖον, βάλε εἰς
γύαλον μετ' ὕδατος διαυγοῦς, καὶ στυπα-
σάμενος τῇ χειρὶ ἐπιμελῶς, ἄφες οὗ ὑ-
ποσῇ ἡ λεπίς, ἀφαίρει τὰ ὑφεστῶτα, ἀ-
ποχέας τὸ τὸ ὕδωρ, ἐπιχέων ὀμβρείου ὕδα-
τος κύαθον ἀ. πλατύνας τῇ χειρὶ πεί-
σας οὕτως εἰς τὴν γύαλον, οἱονεὶ ἀποψήχων
ἐπειτα δὲ ἄρξηται ὀλισθαίνειν πρὸς γλισχρό-
τητα, καὶ μικρὸν ὕδωρ προσεπιχέας ἄφες
κυάθους ς'. πείσας οὕτως· εἶτα λαβὼν τὸ
πλευρὸν τῆς γύαλος, πείσας οὕτως καὶ ἐκχύ-
σας αὐτοῦ τὸ ἀπορρέον εἰς πυξίδα ἐρυθρὸν
χαλκοῦν. τοῦτο γάρ ἐστι τὸ ὡσανεὶ
ἄνθος τῆς λεπίδος καὶ εὔτονον τῇ δυνάμει,
καὶ βέλτιστον εἰς τὰ ὀφθαλμικά. τὸ δὲ
λοιπὸν, ἄτονον. καὶ τὸ καταλειφθὲν δὲ ὁ-
μοίως πλυθὲν, αἰσιωτέρως ἂν μαλθα-
κίαν γλισχρότητα ἀποκρίνη. τὸ δὲ λοιπὸν
σκεπάσαντα δεῖ ὀθονίῳ ἐᾶσαι ἀχύντον ἐ-
πὶ δύο ἡμέρας, εἶτα ἀποχέαντας τὸ ἐφε-
στηκὸς ὕδωρ καὶ ξηράναντας, ἀποτίθεσθαι
εἰς πυξίδα. ἔνιοι δὲ καὶ ταύτην πλυνάμε-
νοι, ὡς τὴν καθαρὰν ἀποτίθενται.

Περὶ Λεπίδος σμώματος. Κεφ. ς'.

ΛΕΠΙΔΟΣ δὲ σμώματος δύναμίς
ἐστιν ἡ αὐτὴ τῇ τοῦ χαλκοῦ λεπίδι. καὶ
πλύσις καὶ ἀπόθεσις ὁμοία· ὀλίγῳ τι ἧτ-
τον χιλίας καθαίρειν λείπεται τῆς τοῦ
χαλκοῦ.

Περὶ Ἰοῦ ξυστοῦ. Κεφ. ςά.

ΙΟΝ δὲ ξυστὸν οὕτω σκευαστέον· εἰς πι-
θάκνιον ἢ ἄλλο ὅμοιον ἀγγεῖον ἐγχύας
ὀριμύτατον ὄξος, ὀβελὸν καθέψον χαλ-
κοῦν ἀγγεῖον, καλὸν μὲν εἰ καινουργοῦς·
εἰ δὲ μή γε, ἰσόπεδον· ἔστω δὲ ἐσμηγμένον
καὶ ὅλως πολλὴν μαλθακίαν ἔχον. ἄφες δὲ ἡ-
μέρας δέκα αἰσιωτάτους ὃ πῶμα, ἀ-
πόξυε δὲ ὀβελίσκον τὸν ἰόν· ἢ λεπίδα ἀ-
πὸ τοῦ αὐτοῦ ποιήσας χαλκοῦ, ἐγκρέμα-
σον εἰς τὸ ἀγγεῖον, ἵνα μὴ ψαύσῃ τοῦ ὄξους· καὶ ἄφες τὰς ἴσας ἡμέρας ἀπόξυε.

Al. ἀποψήχοντα δὲ

Al. ἄτονον

cum farina ſubactã exhibent in catapotio. Additur & ad oculorũ medicamenta: ſiquidem & genarum ſcabritiã abſumit, & fluxiones exiccat. Lauatur autẽ hoc modo: Siccæ æris ſquammæ expurgatæ minam dimidiam cum aqua limpida in pilam coniicito, & manu diligenter miſceto, donec ſquamma ſubſederit: quæ ſuperſtant abiicito, & effuſa priore aqua, pluuiæ cyathum vnum affundito: túmque diducta manu ſquammam, quaſi deſtringenda ſit, vehementer in mortario cõfricato. Cùm verò cœperit lentorem quendam remittere, paulatim aquam ad ſex cyathos vſque ſuperinfundito, validè interim terẽs: deinde manu ſquammam ad latus mortarij conuertito, ibíque firmiter apprimito: & expreſſum humorem qui defluxerit pyxide ex ære rubro facta excipito. Hoc enim eſt veluti flos ſquammę, valens viribus, & ad oculorum medicamẽta cum primis efficax: quod reliquum eſt, inutile ac imbecillum. Attamen & quod relictũ eſt ſimiliter lauato, donec nullũ prorſus lentorẽ ex ſe remittat, tandémque opertum linteolo ad biduum conquieſcere finito: poſtmodum diffuſa extãte aqua, reliquum ſiccatum pyxide recondito. Sed & hoc nonnulli cadmiæ inſtar elotum reponunt.

De Squamma ſtomomatis. Cap. XC.

SQVAMMÆ ſtomomatis eadem vis. Simili quoque modo lauatur atque reconditur: attamẽ ad aluum purgandam inefficacior.

De Æruginę raſili. Cap. XCI.

ÆRVGO raſilis his fit modis: In cadum aut aliud conſimile vas acetum quàm acerrimum infundito, atque illi ſuperponito inuerſum vas æneum, præſertim concameratum: ſin minùs, planum. Sit verò id probè deterſum, nullúmque habeat ſpiramentum. Decima deinde die ſublato operculo, æruginem inhærentem deradito. Aut ipſam æris laminam in vaſe ſuper acetũ ita ſuſpẽdito, vt ne ipſum attingat: & totidẽ poſt dies radito.

Aut massulam seu lamellam æris vná pluréſve vinaceis nõ recentibus, ſed iam aceſcentibus, condito, ac ſimiliter inuertito. Quinetiá ęruginẽ facere licet ex delimata æris ſcobe, nec non & è laminis quibus interiectæ auri bracteæ malleo ducũtur, ſi quis eas aceto reſpergat & ter quatérve verſet, donec omni ex parte æruginem contraxerint. Tradunt & ęruginis duo genera in Cyprijs gigni fodinis, vnũ quidẽ quod ſupra lapides quoſdam efflorescit æris miſcellam ſortitos, alterũ verò quod per Caniculæ æſtus è ſpecu quodá extillat: addúntq, illud paucũ & optimũ eſſe, hoc quod è ſpelúca manat, copioſum quidẽ & boni coloris, at vitioſum, quod lapidoſa plurima intermixta habeat. Adulteratur porrò ęrugo tũ alijs multis ammixtis, tum vero his maximè quæ ſequuntur: aliqui enim pumicé, quidam marmor, alij atramentũ ſutorium illi admiſcẽt. Sed pumicé & marmor deprehendemus, ſi manus ſiniſtræ pollicẽ madefaciamus, & altero æruginis portiunculam ipſi affricemus. Siquidem quicquid eſt æruginis diffundetur: pumicis autem marmoriſque partes diſſolui diſſiparique minimè poterunt, ac demum crebro affrictu humoriſqi permixtione inalbeſcent. Quin & dentium appreſſu vitium licet deprehendere: quoniam quæ ſincera eſt, læuis occurrit ac ſine aſperitate. Atramentum vero ſutorium igne coarguitur. Nanque ſi laminæ aut fictili æruginẽ ita adulteratam inſperſeris, & horum alterutrum feruenti cineri aut prunis impoſueris, mutato colore rubeſcet quæ atramento ſutorio mixta fuerit: propterea quòd id victum talem ſuapte natura ſortitur colorem.

A εἰς τὰ ξέμφυλα μὴ προσφαλῶς ὄντα ὀξίζοντα ἐξηρύλας μάζαι ἢ λεπίδα μίαν ἢ καὶ πλείονας, ὡσαύτως ἀναστρεφε. ἔνεστι δὲ καὶ ἐκ ῥινισμάτων ποιῆσαι ἢ λεπίδων, αἷς σβεσθέντα τὰ χρυσᾶ πίναλα ἐλαιοῦται, ἐαί τις αὐτὰ ὀπτήσαντα ἔχει, ἀναλυτὴ τρὶς ἢ τετράκις, ἀλγεῖς αὖ πανB τελῶς ἰωδῆ. γίνεται δέ φασι τῦτον τὸν ἰὸν ἐν τοῖς Κυπριακοῖς μεταλλοις, ἔστι μὲν, λίθοις ποὶν ἐπανθοῦντα ἔχειν τὸν χαλκόν. τὸν δ', ἐκ τινος σποδαίας σαζόντα ἐν τοῖς ὑπὸ κύνα καύμασι τῆ τῦ μὲ, ὀλίγον τε ἢ καλλιον εἶ τῦ δ' οὐκ τῦ σποδαίας, διαψιλῆ μὲ ὀπτήσῃ δ' ἄριστον, φαῦλον δ' ὑπάρχειν, ὅτι C τὸ πολλοῖς αἰσχεμίζεσθαι λιθώδεσι. δοκῦσι δὲ ἢ σπόγοις πολλοις μιγνύμενος, μᾶλλον δ' ὕδασι· τινὲς μὲν γὰρ, κισήρει· ἔστι δ', μαρμάρῳ, ἄλλοι δὲ, χαλκάνθῳ κακοῦσιν αὐτόν. καταλαμβάνομεν δὲ τὸν μὲν κίσηρι καὶ τὸ μάρμαρον, ὅτι τῦ πολίσαι ἢ ἔστιν αὐτίχρα τῆς διανύσου χροὸς, καὶ τῷ ἑτέρῳ D προσπεσόντι μέρεσι ἰῦ· συμβαίνει γὰρ τὸ μὲν αὐτὸ ὅτι χιᾶσθαι, τὰ δ' ἀπὸ τῆς κισήρεως ἢ μαρμάρου μέρη ἀδιάχυτα μένειν, καὶ τελὲς ἀπολευκαίνεσθαι τῇ ὀπτιπλέον ὑδατεύσῃ καὶ τῇ τῦ ὑγροῦ παραπλοκῇ· μὴν ἀλλ' ὅτι τῆς ἢ τῶν ὀδόντων ἐπιρείσεως· λέγει γὰρ ὑποπίπτειν καὶ οὐE παχὺ τὸ ἀμιγές. τὸ δὲ χαλκανθὲν ἀπολέγχεται τῷ πυρί. εἰ γάρ τις ἐμπλάσας τὸν οὕτω δεδολωμένον ἰὸν ὀπὶ λεπίδα ἢ ὄστρακον, καὶ τὸ ἕτερον ἰούτων ἐπιθήσῃ ἐν θερμῇ τίφρᾳ ἢ ἐπὶ ἀνθρακι, μέλαν ἀλλεῖ καὶ ἐρυθραίνεται ὁ χαλκανθὼδης. ὅτι δὲ φύσει κεκόμμενον αὐτὸ τοιαύτην ἔχειν χροιάν. F

Aduleteratur

Orib. addit, ἐστὶ δὲ ὁμοία.

V. πρώην

V. ψαῦστῆ

V. χαλκανθὼδες

De Æruginc Scolecia. Cap. XCII.

Æruginis quæ Scolecia dicitur duo ſunt genera: quędam enim foſſilis eſt, altera factitia ad hunc modum: In mortariũ Cyprij æris, quod & piſtillum ex eadẽ materia factũ habeat, aceti albi actiſq; dimidiam heminam infundito, teritóque tantiſper dum ſtrigmenti craſſitudinem aſciſcat: deinde indito aluminis rotundi drachmam vnam

Περὶ Ἰοῦ σκώληκος. Κεφ. ϛϚ.

Τῦ δ' λεγομένου Σκώληκος ἰῦ διττὸν εἶδος ὑπάρχει· ὁ μὲν γὰρ, ὀρυκτός ἐστιν· ὁ δὲ, σκευάζεται ὧδε ς· εἰς ὑείαν Κυπρίου χαλκοῦ, ἔχουσαν δὲ καὶ διδυμὰ ἀπὸ τῆς αὐτῆς πεποιημένον ὕλης, ἐγχέας ὄξους λευκοῦ καὶ δριμέως κοτύλης ἥμισυ, τρίβε ἕως οὗ γλισχρὸν ἢ· εἶτα ἔμβαλε στυπτηρίας ϛρογγύλης· ϟ ά. Ald. ὀξυ. ρ.

Group aliter cum ὁ δὲ ἀνάπαλιν antecedente negatione: cum quo facit Hermolai interpretatio.

καὶ ἀλὸς ὀρυκτοῦ ἁλμυροῦς, ἢ θαλασσίου ὡς ὅτι λευκοτάτου καὶ κεροειδεστάτου· εἰ δὲ μή γε, πίσσου τὸ ἴσον. εἶτα λεάνει ἐν ἡλίῳ ἐν ταῖς ὑπὸ κύνα καύμασιν, ἕως τῇ ἰδίᾳ χροιᾷ ἰώδης, τῇ δὲ συστάσει γλοιώδης γένηται· καὶ οὕτως ἀναπλάσασι σκώληκας ταῖς Ῥοδιακαῖς ὁμοίους, ἀποπήσσει. ἐνεργὴς δὲ ἐὺ χρῶς γένηται ἄγαν, ἐὰν ὀξυος μὲν λάβῃ μέρος ἕν, οὔρου δὲ παλαιοῦ μέρη δύο, τὰ δὲ ἄλλα, ὡς προείρηται. τινὲς δὲ τὸν ἀποπεπυγμένον ἐν τῷ ξυστῷ κόμμι μίξαντες ἀναπλάσουσι, καὶ πωλοῦσιν, ἰὸν παραπεπόνον ὡς φαῦλον. ἔστι δέ τις καὶ ὑπὸ τῶν χρυσοχόων γινόμενος ἰός, ὃν θυίας καὶ διδύμους καυτηρίῳ χαλκοῦ, ἐπὶ δὲ ὕδατος παιδίου, ᾧ δὴ χρῶνται κολλῶσιν. ἀναλαμβάνει δὲ καὶ αὐτὸς οἱ προφερόμενοι ἰοὶ κεκαυμένῳ χαλκῷ, μᾶλλον δὲ ἐρρωμένοι τοῦτ' ἐνεργάζεται. ἰσχὺν δὲ ὅτι προέχει μὲν αὐτῶν ὁ ὀρυκτὸς σκώληξ ἐχόμενος δὲ ἐστιν ὁ ξυστὸς εἶτα ὁ σκευαστός· δηκτικώτερος μέν τι καὶ μᾶλλον σύφων ἐστὶ τὴν ἀρχήν. ὁ δὲ τῶν χρυσοχόων ἀναλαμβάνει δὲ ξυστῷ. Δυνάται δὲ πᾶς ἰὸς σύφειν, θερμαίνειν, ἀποσμᾶν τοὺς ἐν ὀφθαλμοῖς οὐλὰς δὲ λεπτύνειν, δάκρυον ἄγειν, νομὰς ἴασθαι, τραύματα ἀφλέγμαντα τηρεῖν, ἀπυλεῖν ἕλκη σὺν ἐλαίῳ καὶ κηρῷ· σὺν μέλιτι δὲ ἐφεστῶτες, τύλους καὶ τὰ ῥυπαρὰ τῶν ἑλκῶν ἀναθαίρεσιν ἀμμωνιακῷ δὲ ἀναληφθέντες εἰς χαλύβια, συείλλας καὶ τύλους ἐκπίπτουσι· χρήσιμοι δὲ καὶ πρὸς ἐπουλίδας καὶ τοὺς τῶν οὐλῶν ἐξοχάς. ἰσχνοῦσι δὲ καὶ βλέφαρα λεπτοῖσι σὺν μέλιτι ἐγχριόμενοι· δεῖ δὲ πυελᾷ μετὰ τοῦ ἐγχρίειν κατόπιν ἐξ ὕδατος θερμοῦ ἀναληφθέντες δὲ ῥητίνῃ τερεβινθίνῃ σὺν χαλκῷ ἢ νίτρῳ, λέπρας ἐξαίρουσι. καυστέον δὲ ὅτι ἂν ἐθέλῃς ἰὸν ὕπω θλάσας αὐτὸν εἰς ὀλοχρέστατα μέρη, καὶ τηγανίῳ κεραμίῳ ὀστρείοις, ἀπυρείσας ἐπ' ἀνθράκων ἀφύπνων, κινῶν ἕως ἂν μεταβάλλῃ καὶ ἐπισπασθῇ τῇ χρόᾳ· λοιπὸν δὲ ψύξας, ἀποπήσσει καὶ χρῶ. λυεῖ δὲ ἐν ὠμῇ χύτρᾳ καὶ οἷσιν αὐτὸν, ὡς προείρηται. ὄξος εἰς τὸ αὐτὸ δὲ πεφθὲν κεκαυμένος μεταβάλλει χρῶμα.

A cũ ſalis foſſilis trãſlucidi, aut marini quàm albiſſimi ſolidiq; aut certè nitri pari pondere: atque æſtuoſiſſimis diebus circa Canis ortum in ſole ſubigito, donec æruginis colorem & ſtrigmenti ſpiſſitudinem cõtrahat: tandémque vbi in vermiculorum Rhodiacis ſimilium ſpeciem coëgeris, recondito. Efficax autem &
B valde boni coloris redditur, ſi duæ partes vrinæ veteris cum vna aceti adiiciantur, & reliqua, vti dictum eſt, peragantur. Sunt qui æruginem raſilem quæ in apparatu voto non reſponderit ammixto gummi digerant in paſtillos, & ita vendunt: ſed genus id ceu vitioſum repudiãdum eſt. Fit & ab aurificibus æruginis quędã qua aurũ ferruminant, ducta ſcil. vrina pueri impuberis in mortario cupreo piſtilli ope ex eadem materia confecti. Porrò antedicta prorſus omnia æruginum genera vſto æri reſpondent, ſed magis effectu valent. Sciendum verò inter ipſa Scoleciam foſſilem principatũ tenere: proximum locum dari raſili: poſtremum factitiæ. Mordaciſſima tamen hæc eſt, atque magis aſtringit: at aurificum æruginis genera omnia aſtringunt, excalfaciunt, oculorum cicatrices exterunt & attenuant, lacrymas cient, nomas ſiſtunt, vulnera ab inflammatione tuentur: vlcera ex oleo ceráque ad cicatricem perducunt: callos & ſordida vlcera purgant cum melle cocta: ammoniaco excepta & collyrij modo in fiſtulas adacta, earũ callos abſumunt. Sunt & ad gingiuarũ excreſcentias & extuberationem vtilia. Magnopere quoque extenuant genarum craſſitiem, cum melle inuncta: verùm poſt inunctionẽ ipongia ex aqua calida locus fouendus eſt. Eadem ſubacta cum reſina terebinthina, addito ære aut nitro, lepras tollunt. Cæterum æruginem quácunque velis vti oportet in hũc modũ: Ipſam minutiſſimè friatam fictili patellæ ſubiectis flagrantibus prunis imponito, verſatóque donec
G ſeſe mutet, & coloré cinereũ quodámodo referat: poſteà refrigeratã reponito ad vſum. Sũt qui cruda olla eã vrãt, vti dictũ eſt: ſed nõ prius eũdẽ vndiq; coloré cremata reddit.

V. addę ἰοπέδης

Coeruleũ fuit qui adiicitur.

V. σίνας

plin. vſtam id. laſcat.

De ferrugine, seu ferri rubigine. Cap. XCIII.

Pl. stomachi profluvia impositæ refrigerat.

RVBIGO ferri restringit, fluorem muliebrē subdita sistit, potúque conceptionem impedit. Illita ex aceto, erysipelatis & papularum eruptionibus medetur. Perquam vtilis ad digitorum paronychias, pterygia, genarum scabritias & condylomata. Gingiuas eadem firmat, & podagricis inunctione prodest, & alopecias expler. Vinum aquáve in qua candens ferrum restinctum fuerit, potu cœliacis, dysentericis, liénosis, cholera laborantibus & stomacho dissoluris auxiliatur.

De recremento, siue scoria ferri. Cap. XCIIII.

SCORIA ferri eadem potest quæ rubigo, sed efficacia minore. Cōtra aconiti venenum ex aceto mulso pota opitulatur.

De Plumbi lotura. Cap. XCV.

COMPARATVR & plumbum elotum hūc in modum: In mortarium plumbeum vbi aquá iniecetis, pistillo plumbeo terito, vsquedū aqua nigrescat & limi modo crassescat. Linteolo deinde colato, aquá insuper affundēs, quò facilius quicquid resolutum est traijci incernive possit. Hoc ipsum iterū atq; iterum facito, vsque dū sat esse tibi videatur. Pòst vbi lotum plumbum cōsederit, priore aqua effusa nouá affundens, vt cadmiam lauaro, dum nihil ampliùs nigritiæ supernatet: tandē coactos inde pastillos reponito. Quidam puri plumbi limaram scobem mortario pistillóque lapideis aut manibus ex aqua terunt, ministro sensim aquam affundente, quæ hoc modo liuorem contrahit. Hac vbi subsederit effusa, pastillos illico fingunt. Nam quod diutius conteritur, cerussæ simile redditur. Alij elimatæ scobi plumbaginis pauxillum adijciunt, asserentes elotum ita plumbum præstantius euadere. Potest refrigerare, astringere, spiracula cutis obducere, mollire, caua explere, sistere oculorum fluxiones & vlcerum excrescentia. Sanguinem quoque supprimit,

Lut. strassenum lotum deprauat.

A Περὶ Ἰοῦ σιδήρου. Κεφ. ϟγ'.

Ἰὸς δὲ σιδήρου ῥύφει, ῥοιῶ τε γυναικείῳ παρεμβολὰς ἴσχει. πυώδεσί τε ἀνωμάλοις ἀσυλλήψιαν ποιεῖ. ὀπτᾷ δὲ ζωὸν ὄξει, ἐρυσιπέλασί τε καὶ ἐξανθήμασι ἰᾶται. πρός τε παρωνυχίας καὶ πτερύγια καὶ τραχέα βλέφαρα βύσσης, ἢ κονδυλώμα-

B τα. καὶ οὖλα κρατύνει, ποδαγρικοῖς τε ὠφελεῖ ὀπτᾶται, καὶ ἀλωπεκίας δασύνει. σίδηρος δὲ πεπυρωμένος σὺν ὄξει ἢ οἴνῳ ἢ πυώδεσι, ἁρμόζει χειλιακοῖς, δυσεντερικοῖς, κατηλωκοῖς, χολερικοῖς, καὶ στομάχῳ διαλελυμένῳ.

Περὶ Σκωρίας σιδήρου. Κεφ. ϟδ'.

C Ἡ δὲ σκωρία τοῦ σιδήρου δύναται ὅσα καὶ ὁ ἰὸς τοῦ σιδήρου· ἐπ' ἔλαττον δέ· βοηθεῖ δὲ ἀκονίτῳ μετ' ὀξυμέλιτος πομθεῖσα.

Περὶ Μολίβδου πεπλυμένου. Κεφ. ϟε.

ΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ἡ πεπλυμένος μόλιβδος τοῦτον τὸν τρόπον· εἰς μο-

D λυβδίνιον βυθὸν ὕδωρ, τρίβε μολυβδίνῳ δοίδυκι, ἕως ἂν μελανθῇ τὸ ὕδωρ ὑπὸ ῥύπου ἰλυώδους· εἶτα διύλισον αὐτὸ διὰ ὀθονίου, παρασκεύαζε τὸ ὕδωρ, ἵνα πάλιν τὸ σμηγματῶδες ὑλισθῇ· καὶ ποίει τοῦτο πάλιν, ἄχρις ἂν σοι αὐτάρκως ἔχειν δόξῃ. εἶτα ἐασας καθεζῆσαι τὸ πεπλυμένον, ἀποχέας τὸ

E ὕδωρ καὶ ἄλλο ἐπιχέας, πλυνε ὡς πρὸ τοῦ καδμείᾳ, ἄχρις ἂν μηκέτι ἐφίσταταί τις μελανία· ἀναπλάσας δὲ ξηράνας, ἀποθοῦ. ᾧ δὲ, καθαρὸν μόλιβδον ῥινήσαντες, τρίβουσι τὸ λίθῳ βυβλίνῳ, ἢ πρὸς χαρτὶ μὴ ὕδατος ἐπιστάντος· ἔστι δὲ χεῖρον κατὰ ὀλίγον ἐπιχέοντες τὸ μελανθὲν

F ὕδωρ ἑάσαντες καθεζῆσαι καὶ ἀποχέαντες, αἰεὶ πλύνουσιν ἕως. τὸ γὰρ ἐφ' ἑκανὸν τριβόμενον, γίνεται ψιμυθίῳ ὅμοιον. ἔνιοι δὲ τραγακανθίνοις τοῖς ῥιζώμασιν ὀλίγῳ μολίβδαινον, φάσκοντες βελτίονα εἶναι ᾧ οὕτω πλυνόμενον μόλιβδον. Δύναται δὲ ψύχειν, σύφειν,

G παρεμπλάττειν, μαλάττειν, πληροῦν τὰ χειλώματα, γίλλειν τὰ ὑπὸ τοῖς ὀφθαλμοῖς ῥεύματα, καὶ τὰ ὑπερσαρκοῦντα τῶν ἑλκῶν. ἔτι δὲ καὶ ἴσχυμος·

V. addit lenyfin

καὶ πρὸς τὰ ἐν τῷ δακτύλῳ ἕλκη, καὶ δυ- A
λώματα, αἱμορροΐδας, μετὰ ῥοδίνου· καὶ
τὰ δυσκατούλωτα· καὶ καθόλου ποιεῖ ὅσα
καὶ ἡ σανδὸς, δίχα τοῦ ἐξαιρεῖν. ὁ δὲ ἀκέραιος
μόλιβδος τοῖς τριβομένοις βοηθεῖ τῇ τοῦ
θαλασσίου σκορπίου καὶ δρακόντιος πληγῇ.
Περὶ Μολίβδου κεκαυμένου. Κεφ. ϟϛ'.

ΚΑΙΕΤΑΙ δὲ ὁ μόλιβδος ὅπως λεαίνῃ B
μολίβδου ἐλάσματα ὡς ὅτι λεπιώτατα, ἐπίπλας εἰς χυτρίδιον λοπάδα, καὶ ὅτι πάσας θεῖον, πάλιν ἕτερα ἐπίπλας πίτυλα, καὶ θεῖον ὅτι πάσαι, καὶ πάλιν ἕτερα, καὶ τοῦτο ποιεῖ ἄχρις οὗ πληρώσῃς τὴν λοπάδα, εἶτα ἐπιτίθησι· αἰφθήσεται δὲ μολίβδου, κινεῖ σιδήρῳ ἄχρις οὗ ἀποτεφρωθῇ τε- C
λέως· καὶ μηδὲν ἔχῃ μολιβδώδες· εἶτα ἀναι- Lac. legit in vet. cod. μηδὲν ἐπιτίθησι μολιβδώδους.
ρεῖ σκεπάσας τὸν ῥύπωνα· βλάπτει γὰρ
ἡ ἀποφορά. ἡ ῥινίσματα μολίβδου βαφέων
μετὰ θείου εἰς λοπάδα, οὕτω καίει· ἄλλοι δὲ,
εἰς χύτραν ὠμὴν βαλόντες τὰ πίτυλα
ὡς εἴρηται, καὶ μίσῳ ἐπιχρίσαντες, ἢ ἐπ' ἐξά-
ρας τιθέντες ὀπτῶσι· καὶ ὀλίγον ὄντες ἀναπνοὴν, καίουσιν. οἱ δὲ, ψιμυθίου πρὸς ἐμπάσσουσιν αὐτὰ τοῦ θείου ἢ κηρωτῆς. ἄλλοι δὲ, ἀκεραίοις ταῖς λεπίσι ὀπτιζόντες, ὀξεῖ πυρὶ χρῶνται, καὶ κινοῦσιν ὀπτιζομένως σιδηρίῳ. ἄχρις οὗ ἐκτεφρωθῇ. ἔστι δὲ δυσχερὴς ἡ τοιαύτη καῦσις· καὶ ὅτι πλέον δὲ καίεις, οὕτω λιθαργύρου λαμβάνει τὸ E
χρῶμα. ἡμῖν μὲν οὖν ἀρέσκει ἡ πρώτη καῦσις. δεῖ δὲ πλυθῆναι αὐτοὺς ὡς τοὺς καδμείους, καὶ ἀποτίθεσθαι. Δύναμιν δὲ ἔχει ἰῶδη καὶ ὁ πεπλυμένος μόλιβδος, ἀποπυητίρας δὲ μᾶλλον.

Περὶ Σκωρίας μολίβδου. Κεφ. ϟζ'.

ΣΚΩΡΙΑ μολίβδου, ἀρίστη ὅτι ἡ ψιμυ- F
θιοφανὴς, πυκνὴ καὶ δύσθραυστος, μηδὲν ἔχουσα μολιβδώδες, μηλοειδὴς δὲ τῷ χρώματι καὶ ὑελίζουσα. δύναται δὲ τὰ αὐτὰ τῷ κεκαυμένῳ μολίβδῳ, σύφουσα μᾶλλον. πλύνεται δὲ ἐν ὄξους ὀπτοχυμένου ὕδατος καὶ ἀποχυμένου τοῦ ἐφεστηκότος μηλίνου χρώματος. πολλάκις G
τὸ τοῦτο γίνεται, ἄχρις οὗ ἀναλωθῇ ἡ σκωρία. ὅτε, τὸ λεπτὸν ἐπισαίνεις ὑποστᾶσαν αὐτὸ, ἀποχέομεν τὸ ὕδωρ, καὶ ὕπως ἀναπλάσομεν.

ac prodest contra sedis vlcera, condylomata, & hæmorrhoidas, ex rosaceo: itē ad ea quæ ęgrè cicatricem ducunt. Deniq; spodij effectus præbet, nisi quòd crustas haudquaquā inducit. Cæterùm sincerum plumbum affrictu, marini scorpionis draconisque ictibus auxiliatur.

De Plumbo vsto. Cap. XCVI.

VRITVR plumbum sic: Sumito plumbi laminas quàm minutissimas, & nouæ patinæ imponito, ac sulphur inspergito: rursúmq; laminas alias addito, ac sulphur itidē inspergito: atq; ita vicissim tū laminas tū sulphur insternito, donec vas expleueris, deindéq; succendito. Flagrans autē plumbū ferrea rude versato, vsquedum perfectè redigatur in cinerem, nihilque supersit quod plumbum referat: tum demùm obstructis naribus eximito, quoniam halitus plumbi noxius est. Aut lima quæsitam plumbi scobem cum sulphure indito patellæ, atq; sic vrito. Alij laminas crudo fictili, vti dictū est, inditas imponunt fornaci aut foco, & circumlito operculo datóq; exili spiramento, vrūt. Non desunt qui pro sulphure cerussam aut hordeum intersternant. Alij postquam sinceras laminas imposuerunt, acri igne vtuntur, & rudicula ferrea vehementer agitant, dum in cinerem soluantur. Sed difficilis huiusmodi vsus: & si amplius vrantur, spumæ argenti colorem cōtrahunt. Magis tamē nobis placet prima vrendi ratio. Debet verò plumbum vstum lauari sicut cadmia, atque ita reponi. Cæterùm vim habet eandē quam plumbum elotum, sed efficaciorē.

De Scoria plumbi. Cap. XCVII.

RECREMENTVM plūbi, scoriam vocant, optimum est quod cerussam repræsentat, densum, fractu contumax, nihil plumbosi habens, quódque ad luteum colorem accedit & vitrum imitatur. Eadem quæ plumbum exustum potest, sed magis astringit. Lauatur in mortario affusa aqua & refusa summa aquæ parte quę luteum colorem traxerit. Iteratur id sæpius, dum recrementum absumptum fuerit. Tandem vbi subsederit, effusa aqua diuiditur in pastillos.

De la-

De Lapide plumbario. Cap. XCVIII.

LAPIS molybdoides à plumbi similitudine dictus, vim habet recremento haud abſimilem: eo eodem quoque modo lauatur.

De Stibio. Cap. XCIX.

STIMMI optimũ quod eſt ſplendidiſſimum & radians, dum frangitur cruſtoſum, quódque nihil terreni aut ſordidi habet, éſtque friabile. Hoc nonnulli ſtibi, aliqui platyophthalmon, alij larbaſon appellarunt. Vis eius ſpiracula cutis obducere, aſtringere, refrigerare, excreſcentia in carne cohibere, vlcera ad cicatricem perducere, ſordes & vlcera oculorum expurgare. Siſtit & ſanguinem è cerebri membrana profluentem: & vt in vniuerſum dicatur, vis vſto plumbo ſimilis eſt. Priuatim ambuſta igni in cruſtulas erumpere non patitur, cum adipe recenti illitum: quæ verò cruſtam contraxêre, ad cicatricem perducit, additis cera & exigua ceruſſa. Torretur autem farina ſubacta circumlitum & carbonibus obrutum, donec carbunculetur cruſta: exemptúmque reſtinguitur mulieris lacte quæ marem pepererit, aut vetere vino. Vritur vero prunis impoſitum ſufflatumque, quoad igneſcat: ſi enim amplius vratur, plumbi inſtar eliqueſcit. Cæterùm lauatur cadmiæ & æris modo: ſunt tamen qui ceu plumbi recremẽtum eluãt.

De Molybdæna ſeu plumbagine. Cap. C.

PLVMBAGO probatiſſima eſt, ſpumæ argenti æmula, flaua, modice ſplendens, ac dum teritur fulua, quæque cocta in oleo iocineris colorem trahit. Vitioſa, quæ aërium aut plumbeum colorem refert. Gignitur in auri argentiq; fornacibus. Eſt & foſſilis quædam, quę ad Sebaſtiam & Corycum reperitur: ac in eo genere probatur magis, quę neq; ſcoriæ ſpeciẽ præ ſe fert, neq; lapidoſa eſt, ſed flaua ac nitẽs. Vim habet ſpumæ argẽti & ſcoriæ plũbi ſimilẽ: ſed & vritur lauatúrq; ſimili modo. Additur tamẽ hæc aptiùs in emplaſtra lenia, quæ lipara vocant, & ea quæ nõ alligãtur, idq; nõ inutiliter.

A Περὶ τῆς Μολιβδοειδοῦς λίθου. Κεφ. ϙ'.

ΚΑΙ ὁ Μολιβδοειδὴς δὲ λίθος, αἰάλωτον ἔχει τὴν δύναμιν τῇ σκωρίᾳ. πλύνεται δὲ ὁμοίως.

Περὶ Στίμμεως. Κεφ. ϙϑ'.

ΣΤΙΜΜΙ ὁ κράτιστόν ἐστι τὸ στιλπνότατον καὶ λαμπυρίζειν, ὃ τῇ θραύσει πλακώδες, μηδὲν ἔχον γεώδες ἢ ῥύπαρὸν, διαχρῶς τὸ θλώμενον. τοῦτο οἱ μὲν στίβι, οἱ δὲ, πλατυόφθαλμον, οἱ δὲ, λάρβασον ἐκάλεσαν. Δύναμιν δὲ ἔχει ἐμπλαστικὴν, συμπυκνωτικὴν, ψυκτικὴν, σαλπικὴν τῶν ἐπὶ σφακελισμῶν, ἀποπυλωτικὴν ἑλκῶν, καὶ καθαρτικὴν ῥύπαρῶν ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἑλκῶν. ἐπέχει δὲ καὶ τὰς ἐκ μήνιγγος ἀμορραγίας· καὶ καθόλου δὲ ἐμφερὴς ἐστὶν ἡ δύναμις αὐτοῦ τοῦ κεκαυμένου μολίβδου. ἰδίως δὲ τὰ παρακαύματα οὐκ ἐᾷ ἐξανθεῖν, σὺν τῷ ἅπαξ καταχρισθέντα ἐπὶ ῥητῇ ἀποπυλοῖ τὰ ἐξανθοῦντα, κηρῷ ἐν ὀλίγῳ ψιμυθίῳ μιχθέντων. ἐπὶ ἀπαγομένων δὲ τῶν στάσεων λαδὸν καὶ ἐγκυβέρνεις αἴθρας, ἄχρις οὗ αἱ θραῦσις ᾖ τὸ στέαρ. ἐξαιρεθὲν δὲ σὺν ὑπὸ γάλακτι ἀρρενοτόκου γυναικὸς, ἢ οἴνῳ παλαιῷ. καίεται δὲ ἐπ' αἰθράκων ὑπτιωθὲν καὶ ἐμφυσηθὲν ἄχρι πυρώσεως· ἐὰν γὰρ ὑπερπλέον καῇ, μολιβδοῦται. πλύνεται δὲ ὡς ἡ καδμία καὶ ὁ χαλκός. ἔνιοι δὲ ὁμοίως τῇ τοῦ μολίβδου πλύσει σκωρίᾳ.

Περὶ Μολιβδαίνης. Κεφ. ρ'.

ΜΟΛΙΒΔΑΙΝΑ δὲ ἀργίζη ὅστις ἡ λιθαργυρόφατνις, ξανθὴ, ἰσοσίλβουσα καὶ χιρρὰ ὡς τοῦ λειοτερίζεσθαι, ἐψηθεῖσα τὸ ἐλαίῳ, ἡ παπειδὴς τῷ χρώματι γίνεται. ἡ δὲ ἀεργίζουσα ἢ μολιβδόχροος, φαύλη· ἁλυᾶται δὲ ἐξ ἀργύρου καὶ χρυσοῦ. ἔστι δέ τις καὶ ὀρυκτὴ ἐν Σεβάστειαι καὶ Κώρυκον διεισκημένη. καὶ ταύτης ὀστρακίτις ἡ μὲν σκωροειδὴς, μὴ δὲ λιθώδης, ξανθὴ δὲ καὶ σίλβουσα. Δύναμιν δὲ ἔχει ὁμοίαν λιθαργύρῳ καὶ σκωρίᾳ μολίβδου· πλύνει δὲ καὶ καίουσι τῷ αὐτῷ. μίγνυται δὲ ὑπὸ τηδιότερον αὐτὴ, καὶ ταῖς λιπαραῖς καὶ ἀνεπιδήκτοις· ἐπὶ λάτρους χρωμένοις.

οὖσα ξηραντικὴ καὶ ἀπουλωτικὴ· ταῖς μὲν A
ξειλοπλαστικαῖς δὲ συμπτικαῖς οὐχ ἁρμό-
ξει δυνάμεσιν.

Περὶ Σκωρίας ἀργύρου. Κεφ. ρά.

Ald. Ἐμπλαστα perperam. Ἐμπλαστρα enim dicitur, quoniam cum vnguine e cutis eximitur, longissime trahitur.

Η Δὲ τοῦ ἀργύρου Σκωρία καλεῖται ἕλκωσμα, ἢ ἔγκαυμα· τὴν αὐτὴν δὲ ἔχει δύναμιν τῇ μολυβδαίνῃ. ὅθεν ἐμπλάστροις φαιαῖς μίγνυται καὶ ἀπουλωτικαῖς, συστατικὴ οὖσα καὶ ὀπτασιτική. B

Περὶ Λιθαργύρου. Κεφ. ρβ'.

Λιθάργυρος, ἡ μὲν γίνεται ἐκ τῆς μολιβδίτιδος καλουμένης ἄμμου θερμαινομένης, χωνευομένης ἄχρι τελείας ἐκπυρώσεως. ἡ δὲ ἐξ ἀργύρου· ἡ δὲ ἐκ μολίβδου. Ἀριστη φέρει δὲ ἡ Ἀττική· δευτερεύει δὲ C
Sunt qui addant, ἡ Πορτόλιος καὶ Βαίας. ἡ Γαδειτανή· μετὰ ταύτην ἡ ἐν Δικαιαρχίᾳ, καὶ ἐν Καμπανίᾳ, καὶ Σικελίᾳ· πλείστη γὰρ ἐν τούτοις τοῖς τόποις θερμαινομένων ἐλασμάτων ἐκ φλογεμβολίων. καλεῖται δὲ ἡ μὲν ξανθὴ καὶ σιλβουσα, χρυσῖτις, ἥτις ἐστὶ χρυσίτου. ἡ δὲ ἐν Σικελίᾳ, ἀργυρῖτις· ἡ δὲ ἐκ τοῦ ἀργύρου, Καλαυρῖτις· D
Fallopius Aauitis legendum putat, à Lauro monte.
Δύναμιν δὲ ἔχει συστατικὴν, μαλακτικὴν, χηλωματίων πληρωτικὴν, σαλπικὴν τε ἐκ θερμοῦ τοῦ ἐν ἀπουλωτικὴν, ψυκτικὴν, πρὸς ἐμπλαστικήν. καύσεις δὲ αὐτὴν οὕτω· κατακόλας εἰς καρύων μεγέθη, καὶ ὀπτὰς ἐστ' ἂν θρυπτὰς, ἐκλεπίσας τε ἄχρι πυρώσεως, καὶ ἐκμάξας E τὴν ἐκλειπούσαν ἀκαθαρσίαν, ἀποτίθου. ἔνιοι δὲ ὀξυῒ ἢ οἴνῳ σβέσαντες αὐτὴν ὀπτῶσιν, πάλιν πάσσοντες, καὶ ταῦτα ποιοῦντες ἀποπλύνουσι. πλυνεῖ δὲ ὡς ἡ καδμεία. λευκαίνει δὲ ὧδε· λαβὼν τὴν ἀργυρίτιδος λεγομένης, εἰ δὲ μή γε, τὴν ἄλλης καταθραύσας εἰς μεγέθη κυάμων ὅσον χύτρα Ἀττικὴ, βάλλων τε εἰς καινὴν χύτραν, ὀπτὴν ὕδωρ, προσεμβαλὼν πυρῶν λευκῶν χοίνικα, καὶ ἰδίᾳ τὸ ὀγδοϊκὸν καθαρῶν ἀραιῶν κριθῶν δράκα δύσας, ἀπὸ τῶν ὠτῶν τὴν χύτραν κρέμασον, ἕως ἂν ῥαγῶσιν αἱ κριθαί. εἶτα καταβάσας πάντα εἰς κρατῆρα πλατύστομον κεραμοῦν, τοῖς μὲν πυρροῖς ῥίψον χοίνικα, τὴν δὲ λιθαργύρου πλοῦν ἐπιχέας ὕδωρ, διαίρει ταῖς χερσὶ προστρίβων ἅμα· εἶτα αἰελόμβος τε αὐτὸν καὶ ξηράνας, τρίβε τὸ ἰδίᾳ Θηβαικῇ, quippe quæ carnem recreat & cicatricem obducit. At vero glutinantibus detergentibúsque compositionibus haudquaquam conuenit.

De argenti Scoria. Cap. C I.

RECREMENTVM argenti, quod helcysma seu encauma vocatur, eandem quam molybdæna vim habet. Quamobrem emplastris fuscis & cicatricem inducentibus miscetur: vtpote cum astringat, & spiracula cutis obducat.

De argenti Spuma. Cap. C I I.

SPVMA argenti quædam fit ex arena, quam molybditin vocant, in fornacibus cóflata, donec perfecte igni incandescat: altera ex argento: tertia ex plúbo. Probatissima est Attica: proxima Hispaniensis. Has sequitur quæ fit Puteolis Cápaniæ, & in Sicilia. Plurima enim hisce locis è flagrantibus laminis plumbeis gignitur. Quæ flauo colore splédet, chrysitis appellatur, omniũ optima: quæ in Sicilia, argyritis: quæ ex argento, Calabritis. Vis autem astringere, mollire, explere caua, excrescétia in carne reprimere, cicatricẽ inducere, refrigerare, spiracula cutis obducere. Vres porro argẽti spumam in hunc modum: Ipsam in frusta diuidito, quę nucládium magnitudinem æquent: hæc prunis imponito, & ita follibus accendito vt cóflagrent: tum abstersa quæ inſidet spurcitia reponito. Aliqui vbi ter aceto aut vino restinxêre, rursum vrunt, & hoc facto recondunt. Abluitur vt cadmia. Candor vero datur ad hunc modum: Sumito de ea quæ argyritis nominatur, aut, si deficeretur, de alia quapiam in partes fabarũ magnitudine contracta, quantum capit Attica chœnix: ac vbi fictili nouo indideris, aquam superfundito, adiectáque candidi tritici pari mensura, priuatimque hordei pugillo intra linteolũ mundũ & rarũ de vasis auricula suspẽso, coquito donec rúpatur hordeũ. Deinde quũ omnia in nouum craterẽ oris amplitudine studeris, triticũ quidẽ seorsũ abiicito: spumá vero argẽti infusa aqua lauato, simulq; manibus vehemẽter cõtricato: demum exemptá affricatámq; in Thebaico mortario terito,

talidam affundens, donec ea penitus soluta fuerit. Excolata aqua, iterum tota die terito, & vesperi infusa calida finito: postero mane hac vbi eliquaueris, aliam infundito, atque ita ter die excolato. Idem septenis diebus repetito. Post id tempus additis ad singulas spumę argẽti minas quinis salis fossilis vncijs, affusáque aqua calida, ter die terito & ammixta aqua excolato. Cùm inalbuerit, calida infusa idem facito, dum nullam prorsus salsuginem resipiat. Tandem ardentissimo sole siccatam electo priùs humore recondito. Sin aliter voles, argyritidis spumæ minam vnam diligenter terito, deindéque addito triplo sale fossili trito in ollam nouam coniicito, infusáque aqua ita vt supereminear, moueto quotidie mane & vesperi, aquam superinfundens, priore nequaquam effusa. Hoc idem facito tricenis diebus: nanque nisi moueatur, in testæ duritiem concrescit. Posthęc effusa leniter muria, argenti spumam in Thebaico mortario terito, coniectámque in fictile infusa aqua manibus diligenter agitato: aquam subinde mutato, donec nullum salsuginis præbeat indicium. Demum quod ex argenti spuma candidum apparet in aliud vas transferto, & redactum in pastillos plumbea pyxide condito. Alij spumam argenti ad fabarum magnitudinem confractam in ventre suillo crudo ex aqua coquunt, dum viscus velut eliquescens dissoluatur, indéque exemptum & cum pari sale tritam abluunt, vti suprà dictum est. Sunt qui salis libram vnam & spumæ argenti tantundem in sole ex aqua terant, hac subinde mutata, dum candor ei concilietur. Alia ratio: Sumito quantam vis argenti spumam, ac vbi lana candida inuolueris, fictili nouo indita aquâ cum fabarum recentium repurgararumq; pugillo decoquito. Cúmque fabæ disruptę dehiscent, lanaq; denigrata fuerit, exemptam argenti spumam & altera lana

A ὀπτιχίων θερμὰ ὕδωρ, ἕως αἱ ἀφαλυθῇ, καὶ ἀπηθήσας τὸ ὕδωρ πάλιν τρίβε δι' ὅλης τῆς ἡμέρας· εἰς ἑσπέρην δὲ ὀπτιχίας ὕδωρ θερμὸν, ἔασον· καὶ τῷ ἀπηθήσας ἄλλο ὀπτίχι, καὶ ἀπηθῇ τῆς ἡμέρας τρὶς. τοῦτο ποίει ὀπὶ ἡμέρας ζ'. εἶτα μίξας τῇ μνᾷ τῆς λιθαργύρου ἁλῶν ὀρυκτῶν *

B ἑ. θερμόν τι ὑδαχίων, λέαινε τρὶς τῆς ἡμέρας, ἀπηθῶν καὶ μιγνὺς ὕδωρ. ὅταν δὲ λευκὴ γένηται, θερμὸν ὀπτιχίων τὸ αὐτὸ ποίει, ἄχρις αἱ μυδριμιαῖς ἔμφασιν ἀλυκότητος ἔχῃ. καὶ ξηράνας ὀξυπάτῳ ἡλίῳ, τρυγικαλλίου πλὴν ἰκμάδα, ἀποτίθεσο. εἰ δὲ μὴ, μνᾶν μίαν λαβὼν

C τῆς ἀργυρείτιδος, λέαινε ὀπτιμελῶς. καὶ τρίψας αἶψον ἁλῶν τριπλάσιον, λεῖον, ὀρυκτῶν· καὶ βάλε εἰς χηνεῖον χύτραν. ὀπτιχίας τὶ ὕδωρ, ὡς τὶ ὑπερέχοι αὐτῆ, κἀπὶ ἑπτὰς ἡμέρας τρῖβε καὶ δείλης τρίβε τὸ παρὸν ὀπτιχίων ὕδωρ, μανδὺν τῷ τρίβοντι ἀπεχέων. καὶ ποίει τοῦτο ὀπὶ ἡμέρας λ'.

D μὴ κινουμένου γὰρ ἀποπραυσται. μεθ' ἃ δὲ ταῦτα ἀποχίας τρίβε τὴν ἄλμην, ἐν Θηβαϊκῇ ὐλίᾳ τὸν λιθάργυρον λέαινε, καὶ βαλὼν αὐτὸν εἰς κεραμεοῦν ἀγγεῖον, ὀπτιχίας τὶ ὕδωρ, κίνει ταῖς χερσὶν ὀπτιμελῶς, ἀποχέων ὃ τρίβοντι καὶ ὀπτίχιον ὃ ἕτερον, ἄχρις αἱ μυδριάσιν ἔμφασιν

E ἀλυκότητος ἔχῃ. εἶτα ἀποχέας ὃ λευκὸν τῆς λιθαργύρου εἰς ἄλλο ἀγγεῖον, αἰώρησον τροχίσκον, καὶ ἀπόδυσον εἰς μολιβδίνῳ πυξίδα. εἰ δὲ, κεφαλωθρυόμενος εἰς μεγάλην κυάμων τὸν λιθάργυρον, καὶ βαλόντες εἰς χύτραν χοιλίαν ὠμὸν ἕψησον ἐν ὕδατι, ἄχρις αἱ πατερωθῇ ὃ

F σαρκίδιον· εἶτα ἐξελόντες καὶ μὴ ἴσον ἁλῶν τρίψαντες, πλυνέσιον ὡς τρεφέρηται. ἔνιοι δὲ ἁλῶν λίτρας μίας καὶ λιθαργύρου ξέστου τρίβουσιν ἐν ἡλίῳ μιᾷ ὕδατος, στυπτηρίας ἀποχέοντες ἄχρις αἱ λευκὸν γένηται· ἢ καὶ οὕτω· λαβὼν τῆς λιθαργύρου ὅσον θέλῃς, καὶ εἰλύσας

G ἐρίοις λευκοῖς, καὶ θὶς εἰς κεραμίαν χύτραν χηνεῖον, ὑδατίδες τε ὕδωρ καὶ κυάμων καθαρῶν καὶ νέων δράκα μίαν, ἕψε. ὅταν δὲ οἱ κύαμοι διαῤῥαγῶσι, τότε τὰ ἔριον * λεανθῇ, ἐξελὼν τὸν λιθάργυρον, * καὶ ἑτέρῳ

V. fubiicit, καὶ ἀπόδυε λίθον καὶ ἐν τόπῳ

εἰλήσας ἐᾶν, ὃν δὲ πέμπτον ἕλε, κύαθον ὑδρηδοὺς ὕδατος, κύαθον τὸ ἴσον πλῦνος· καὶ τὰ αὐτὰ ποίει τοῖς πρόσθεν ἐν πείσει· καὶ καθόλου ἕως τὸ ἔλαιον μηκέτι βάπτηται. καὶ τὸ λοιπὸν καταξήσας εἰς ὑάλους τρεῖς < π'. Ἀττικὰς λιθαργύρου, μίξον ἁλὸς ὀρυκτοῦ λίτρας ᾱ· καὶ λέαινε. Ἀφελὼν τὸ ὑπόδες νίτρου πολὺ λευκοτάτου διφλημμένου μὲν ὕδατος ὁλκὰς μζ'. καὶ πάλιν τρίβε ἄχρις οὗ ἡ λιθάργυρος ἱκανῶς λευκὴ γένηται. εἶτα δὲ [B] κατὸψήσας αὐτὸν εἰς κεκαμμένῳ πλατύστομον ἀγγεῖον, καὶ περιστήσας δαψιλὲς ὕδωρ, ἐάσας τι κατασῆσαι, τὸ μὲν ἀπόθεσον ἕτερον δὲ ὑπόδες ὕδωρ καὶ ταῖς χερσὶν εὐαλάξας, πάλιν ἐάσας κατασῆσαι ἀπόθεσον. σὐαλλάξ δὲ τοῖς προσθημένοις ποίει, ἕως οὗ καθαρὸν ἄγαν τὸ ἀπορρέον ὕδωρ, καὶ γλυκὺ καὶ ἀλυκότητος ἀμέτοχον γένηται· ὅτι πᾶσι δὲ καταξήσας αὐτὸν εἰς λοπάδα κεκαμένου καινὴν, ἀποθημένου πρωῒ πρὸς τοῦ ὑγροῦ, ἧς ὁ ἥλιος ἡμέρας μ'. ὑπὸ κυνὸς, καὶ ξηράνας χρῶ. δοκεῖ δὲ ἁπαλυμένη ἁρμόζειν εἰς τὰ ὀφθαλμικὰ, καὶ οὐλὰς ἀφιστᾶσι, καὶ ἐρράκωμένα πρόσωπα, καὶ αὐλοὺς ἐμπλέα.

Περὶ Ψιμμυθίου.

Κεφ. ργ'.

Ψιμμύθιον δὲ γίνεται οὕτως· εἰς πιθάκνιον πλατύστομον ἢ εἰς κεκαμμένα χάλκεα ἐξ ὄχους ῥιμμάτων ὄξος, ἀπίρασον μολιβδίνιον πλίνθον ὅτι τὸ σῶμα [C] τῆς κεκαμμένας, περιπεφλιμμένου καλαμίνου ψαθίου αἰωρῆν τι αὐτῆς ὑπόρρινον σκεπάσματα, πρὸς δὲ μὴ ἀφιπτάσθαι τὸ ὄξος, ὡς αὐ ἀφλυῆν, καὶ συγκαπάρυσσα ἀφανίσῃ. καὶ ὃ μὲν ἐπαιωρούμενον καὶ καθαρὸν ὑγρὸν ἀπόθου· τὸ δὲ [D] γλοιώδες εἰς ἀγγεῖον ἐξυτόν, καὶ ξηράνας τὸν ἥλιον. εἶτα ἀλέσας τὸ κεκμηλωνι, ἢ λεπτότερον ἄλλως καὶ σηθὸν, καὶ πάλιν ξαῦτα λοιπὸν τῷ τριμμένου λεπτοτάτῳ καὶ σηθὸν· σὐαλλάξ τε τὰ αὐτὰ καὶ τρίβε καὶ τέταρτα πάντων. ἄμφιον δὲ ὅτι τὸ τρῶτον ἀπόσπα, ὃ καὶ εἰς τὰ ὀφθαλμικὰς τρόχλιτον δυόαμφ.

A obuolutam iterum coquito, cyathum aquæ & parem fabarum modum adiiciens: eadem tertiò, quæ ſuprà, facito, & in ſumma vſquedum lana non ampliùs inficiatur. Tandem trásferens in mortarium, ad octogenas ſpumæ argenti drachmas Atticas, ſingulas ſalis foſſitij libras adiicito, & terito. Ac interiecto aliquo temporis ſpatio nitri B quàm albiſſimi cum aqua diluti drachmas xlvij. indito: atque iterum terito, donec argenti ſpuma candoris ſatis contraxiſſe videatur. Ita autem vbi fuderis eam ex alto, in fictile oris ampli affuſa inſuper largiore aqua, ac ſubſidere ſiueris, hanc quidem colato: nouam autem C ſuperadiiciens aquam, manibus probè verſato, ac ſinito rurſum vt conſidat: demúmque per colum traiicito. Alternis eadem proſequere, dum quæ effluit aqua valdè pura, dulcis & ſalſitudinis expers euaſerit. Poſtremò in fictile nouũ tranſlatam exoolato ſenſim omni humore Soli quadraginta diebus ſub Ca- D niculæ ſydus exponito, & ſiccata vtitor. Cæterùm conſtat elotam conferre ad oculorum medicamenta, & ad cicatricum fœditates tollendas, itémque ad facies rugoſas ac maculoſas.

De Ceruſſa. Cap. CIII.

CERVSSA fit hoc modo: Infuſo in vrceum oris lati, aut in fictilem E vrnam aceto quàm acerrimo, maſſam plumbeam ad fictilis os ſubſtrata priùs arundinea tegete firmato: ſuperiicitóque velamina, ne quà interſpiret acetum, donec illa reſoluta fuerit, deſtillánſque ceciderit: tunc excolato humore puro qui ſuperſtat, craſſamentum in vas transfundito. Hoc deinde ſiccandum in ſole, móxque truſatili mola F aliáve ratione terendum cribrandúmque. Poſtea quod ſupereſt duri ſolidive in tenues partes redigendum, itidémque cribrandum: viciſſim eadem tertiò quartóque facienda. Melior quæ prima cribro excreta eſt, & hæc quoque ad me- G dicamenta oculorum aſſumenda.

Secundum locum tenet ſequens, ac deinceps reliquæ ſuo ordine. Nec deſunt qui firmata circa mediũ vas matta ſcirpea, ita vt acetum penè contingat, laminá maſſámve plumbeam ſuperimponunt, ac indito operculo circumlitóque dimittunt. Poſt dies decem amoto operculo inſpiciunt, ac ſiquidem reſoluta materia fuerit, reliqua, vti ſuprà diximus, exequuntur. Quòd ſi quis eam velit in paſtillos digerere, aceto acri ſubigenda, móxque diuidenda in paſtillos, qui ſiccentur in ſole. Æſtate tamen ſupradictum opus obeundum eſt: ita enim candida atque efficax redditur. Sed & hyeme paratur, vrceis ſupra furnos, balnea aut fornaces impoſitis: qui enim fur ſum fertur calor, idem quod ſol præſtat. Porrò laudatiſſima cenſenda quæ fit in Rhodo, Corinthi aut Lacedæmone: proxima, quæ Puteolis. Torretur autem hoc modo: Flagrantibus igni carbonibus fictile nouum, maximéque Atticum, imponito, eique tritam ceruſſam inſpergito, & aſſiduè verſato: cúmque cinereum colorem traxerit, exemptam refrigerato, atque ita vtitor. Vrere verò ſi libuerit, tritam concauæ patinæ indito, & prunis impoſitam ferulacea rudicula miſceto, donec ſimilis ſandarachæ fiat, extractáque vtitor. Quæ verò ita parata eſt, ſandyx à quibuſdam appellatur. Lauatur itidem ceruſſa cadmiæ modo. Vis ei refrigerare, ſpiracula cutis obducere, mollire, explere & attenuare, inſupérque excreſcentia leniter reprimere, & cicatricem inducere: in eóſque vſus miſcetur ceratis & emplaſtris lenibus quæ lipara vocantur, itémque paſtillis. Sed ex eorum eſt genere, quæ (ſumpta) lethalem vim obtinent.

A δὶς τριβὴ δὲ τὸ ἐχόμενον, καὶ τῷ πάχει τὰ λοιπά. ὑπὲς δὲ τὸν μέσον τὸ ἀγγεῖον κατερείσαντες, ἢ ῥίπτουσι διαπλάκωσιν, ὡς μικρὸν ἅπτεσθαι τοῦ ὄξους. ὃ δὲ σῶμα αὐτοῦ πωμάσαντες καὶ ἀποχρίσαντες ἐῶσι. καὶ δι' ἡμερῶν ἀφαιρούμενοι τὸ πῶμα θεωροῦσιν· ὅτι δὲ λελυθῇ, πᾶν ἄγουσι ὁμοίως τοῖς προειρημένοις. εἰ δὲ ἀναπλάσαι τις αὐτὸ βούλοιτο, ὀξεῖ δριμεῖ φυράσαι, καὶ οὕτως ἀναπλάσαι, καὶ ξηρᾶναι τὸ ἥλιῳ. θέρους μὲν οὖν ἄριστον τὰ προειρημένα· οὕτω γὰρ λευκὸν καὶ εὐπρεπὲς γίνεται. σκυάζεται δὲ καὶ χαλκοῦς, τῷ πιθακνῇ χαράσσων ὕπνον ἢ βαλανείου ἢ καμίνου πλησίον· ἡ γὰρ αὐτὴ θερμασία τὸ αὐτὸ δρᾷ τῷ ἡλίῳ. κάλλιστος δὲ γίνεται ὁ ἐν Ῥόδῳ σκυασθείς, ἢ ἐν Κορίνθῳ, ἢ ἐν Λακεδαίμονι. δὶς τριβὴ δὲ ὁ ἐν Διοσκορίας· ἐπιτίθεσι δ' αὐτῷ καὶ ὄξος τοῦτο. εἶτ' αἰθράκων πεπυρωμένων θεὶς ὄστρακον κεραμεοῦν [καὶ μάλιστα Ἀττικὸν] ἐμπλάσσου λεῖον τὸ ψιμύθιον, καὶ κονίᾳ σπογγιᾷ. ὅταν δὲ τῇ χρόᾳ ἐναπόδυσιν λάβῃ, αἰεὶ λέμφους ψύχε καὶ χρῶ. καῦσαι δὲ θέλων, εἰς κοίλλιον λοπάδα λεῖον ὀπτίδος, ὀστρείς τε ὀπτὶ σὺν αἰθράκεσι, πάρθηκι κονᾷ ἕως αὐτῷ χρόαι ἐοικὲς σπόδιον ἐχῃ γένηται· καὶ αἰεὶ λέμφους χρῶ. ὃ δὲ ὅτῳ σκυασθεὶς, σπόδυξ ἐστὶ λίαν λίγεται. πλύνεται δὲ τὸ ψιμύθιον ὁμοίως τῇ καδμείᾳ. δύναμιν δ' ἔχει ψυκτικὴν, ἐμπλαστικὴν, μαλακτικὴν, πληρωτικὴν, λεπτυντικὴν· ἔτι τὰ περαίως καταλυτικὴν ἐχόντων, καὶ καταυλωτικὴν, μιγνυμένου καὶ ῥητίνῃ καὶ λιπαραῖς ἐμπλάστροις, καὶ ἐγχίσμασι. ἔστι δὲ καὶ τῶν αἱρετικῶν.

B

C

D

E

F

G

V. casta.

V. lenitoriam

De Chryſocolla. Cap. CIIII.

CHRYSOCOLLA laudatiſſima Armeniaca, colorem porri lætè virentis quàm ſimillimè reddens. Secundum locum ſibi vendicat Macedonica, & proximum huic Cypria: quo in genere præferenda quę pura eſt. Damnatur quæ terram & calculos collegerit. Porrò antedictæ laudandæ ratio hæc eſt: Tuſam iniice in mortarium, & affuſa aqua ad pilam expaſſa manu

Περὶ Χρυσοκόλλης. Κεφ. ρλ'.

ΧΡΥΣΟΚΟΛΛΑ ἡ ἀμφιβρὶς ἡ Ἀρμενιακὴ, τῇ χρόᾳ καταπόρως παραίζουσα· δευτερεύει δὲ ἡ Μακεδονικὴ, εἶτα ἡ Κυπρία, ἧς τούτης ἡ καθαρὰ προτιμητέον ἐστὶ γῆς καὶ λίθων ἐμπλεων ἀποδοκιμαζόντων. πλυτέον τε ἡ προειρημένη ὕπερ κύφας αὐτὴν ἐμβαλὸν εἰς ὑγίαν, καὶ ὀπτίχνης ὕδωρ πρίζει πλατεῖα τῇ χειρὶ πρὸς

τὴν ἴγδιν βύτου. εἶτα ἐάσας ἀποκα-
θῆναι, ἀπόπλυνον. καὶ ἔτι ἐφ' ὑπογείας
ὕδωρ, πάλιν τρῖε· ταῦτα δὲ ποίει ἕως ἂν λε-
ῖόν ᾖ, ἔως καθαρὸν καὶ εἰλικρινὲς ᾖ τὸ φάρ-
μακον. λοιπὸν ξηράνας ἐν ἡλίῳ, ἀπόθου. καὶ
χρῶ ἐὰν δὲ καῦσαι θέλῃς, χρῆται τῷ ὀστρά-
κῳ. λειαίνει αὐτῆς ὃ αὐτάρκης, ὑπτίαν
εἰς τήγανον, καὶ ἀποθυέτω αἰθρίᾳ, ἕως
τὰ ὑγρὰ ποίᾳ ὡς τραγήματι ὅτι μά-
λιστα. Δυνάμεως δὲ ἔχει ἡ χρυσοκόλλα σμη-
κτικῆς οὐλῶν, κατασαπτικὴν σαρκωμά-
των, ἕ αἰακαθαρτικὴν. φυσητικήν τι· καὶ
θερμαντικῆς, σπαστικῆς τραχείας μὲν τὸ
ὀστοῦν δάκνει. ἔστι δὲ καὶ τῶν ἐμετικῶν
κινούντων, καὶ αἱματῶδη διαπράττων.

Περὶ Ἀρμενίου. Κεφ. ρα'.

ΑΡΜΕΝΙΟΝ δὲ τραχύτερον ὂν λεῖον
καὶ ὃ χρῶμα κυάνεον, ὁμαλόν τι ἄγαν
καὶ ἄλιθον, εὐθρυβές. Τὰ αὐτὰ ποιεῖ τῇ
χρυσοκόλλῃ, σβεστικῆς ὀδόντων μόνον λε-
πτομερέστερον αὐτῆς. ἔστι δὲ καὶ τῶν ἐμετι-
κινούντων, καὶ αἱματῶδη διαπραττόντων.

Περὶ Κυάνου. Κεφ. ρβ'.

ΚΥΑΝΟΣ γίνεται μὲν ἐν Κύπρῳ
ἐκ τῶν χαλκουργῶν μετάλλων· ὁ δὲ
πλείων ἐκ τῆς αἰγιαλίτιδος ἄμμου, βυ-
σοειδώδης κατά τινας σπηλαιώδεις ὑπο-
σκαφὰς τῆς θαλάσσης, ἣν τινες ἐξαφείρη-
σαν. ἀριστεύει δὲ τὸ σφόδρα κατακορὲς.
κνᾶται δὲ ὡς χαλκῖτις, καὶ πλύνεται ὡς
καδμεία. Δυνάμεως δὲ ἔχει κατασαπτι-
κὸν ἐν μετρίῳ σπαστικόν, ἐκφορητικόν
τι καὶ ἑλκωματικόν.

Περὶ Ἰνδικοῦ. Κεφ. ργ'.

ΤΟΥ δὲ λεγομένου Ἰνδικοῦ, τὸ μὲν αὐ-
τοφυόμενον γίνεται, οἱονεὶ ἔκβλημα ὂν
τῶν Ἰνδικῶν καλάμων. Ὃ δὲ βαφικόν ἐστι,
ἐπιθυλισμὸς πορφυρεῖ ἐπαιωρουμένος
τῇ χαλκείῳ, ὃν ἀποσύροντες ξηραίνου-
σιν οἱ τεχνῖται. ἄριστον δὲ ἡγητέον εἶναι ὃ
κυανοειδές τι καὶ ἔγχυλον, λεῖον. Ἔστι δὲ τῶν
συφόντων ἐλαφρῶς καὶ ῥαστόντων φλεγ-
μονὰς καὶ οἰδήματα· διακαθαίρει δὲ καὶ
κατεσθίει ἕλκη.

A vehemẽter affricato: mox vbi considere permiseris, excolato. Alteram infundens aquam, rursum terito: atque hæc vicissim repetito, donec pura sinceráq; spectetur. Tandẽ siccato in sole, & ad vsus recondito. Quod si vrere volueris, vrico in hũc modum. Vbi ex ea trioeris quantũ sat esse videbitur, patellæ supra car-
B bones imponito, & alia facito quæ in vrendis antè memoratis metallicis recensita fuere. Vis chrysocollæ cicatrices exterere, excrescentes carnes coercere, itémque repurgare, astringere, excalfacere, & cum aliquantula mordacitate leniter exedere. Est verò ex eorum genere quæ vomitiones concitant & necẽ,
C inferre possunt.

De Armenio. Cap. CV.

ARMENIVM præferendum quod est læue, colore cæruleo, perquàm æquabile, calculorum expers atque friabile. Eadem quæ Chrysocolla præstat: distat hoc vno, quod est inefficacior. Sed & vsum habet
D ad pilos in palpebris augendos.

De Cyano siue cæruleo. Cap. CVI.

CYANVS in Cypro quidem procreatur ex ærariis metallis, at copiosior ex arena littorali temperatur, quæ quidem secundum quasdam speluncarum instar excauatas maris suffossiones inuenitur: & hic
E quoque magis probatur. Eligi debet qui valdè saturo est colore. Vritur porrò, vt chalcitis, & lauatur, vti cadmia. Vis reprimere & modicè exedere, crustas gignere & exulcerare.

De Indico. Cap. CVII.

F EX Indici generibus vnum sponte naturæ prouenit, veluti spuma marisve eiectamentum, Indicis arundinibus adhærescens: alterum dant infectorum officinæ, éstque purpureus quasi flos æreis innatans cortinis, quem derasum artifices siccant. Optimum porro censendum quod cærulei speciem præbet,
G atque etiam succosum est ac læue. Inter medicamenta est quæ leniter astringunt, & inflammationes ac œdemata rumpunt. Vlcera quoque purgat & reprimit.

De Ochra. Cap. CVIII.

OCHRAM eligere oportet leuissimam ac penitus luteam, saturo colore, minimè lapidosam, friabilem & natione Atticam. Vrenda etenim & lauanda hæc est, cadmiæ modo. Vis eius putrefaciendo exedere, inflammationes & tubercula dissipare, excrescentia in carne reprimere, caua cum cerato explere, & callos articulorúmve tophos cõminuere.

De Cinnabari. Cap. CIX.

CINNABARIM falso putant nonnulli cum eo quod minium appellatur vnum & idem esse. Minium enim in Hispania ex lapide quodam argentariæ arenæ permisto temperatur. Lapis is haud alioqui cognoscitur: sed dum in fornace excoquitur, in floridissimum ardentissimúmque colorem transit. Halitum vero in metallis strangulantem expirat: ideóque metallici faciem vesicis obuelant, vt per illas spectent, neque tamen vaporem noxium respirando trahant. Inde parato minio pictores ad sumptuosa parietum ornamenta vtuntur. Cinnabaris autem de qua hic agitur, ex Africa quidem inuehitur, at magno constat, & vsque adeo rara est, vix vt versicoloribus pictorum lineis satisfaciat. Est porrò altè & abundè colorata, & eam ob causam quidam sanguinem esse draconis existimauerunt. Vim habet Cinnabaris eandem quam lapis hæmatites, ad oculorum medicamenta vtilem, imò etiam efficaciorem: magis enim astringit & sanguinem cohibet. Igni quoque ambustis & papularum eruptionibus cerato excepta medetur.

De Hydrargyro, seu argento viuo. Cap. CX.

FIT Argentum viuum è minio, quod & ipsum abusiuè Cinnabaris dicitur. Impositá siquidem patinæ fictili concha ferrea Cinnabarim continente, calycem seu operculum adaptant, quod vndique luto superillinunt, deindéque carbonibus succendunt. Tum quæ calyci adhæresc[it] fuligo, derasa refrigerataque in argentum viuum coit. Quinetiam inuenitur quod, dum

vl. fudor. Vel, dũ enitur argentum, inuenitur quod in fili-

A Περὶ Ὠχρας. Κεφ. ρη'.

ΩΧΡΑΝ ὃ λιπαρέον τε καὶ κουφοτάτην, καὶ μιλτώδη δέλεαρ· καθαιρετικὴ δὲ καὶ ἀλιθον καὶ θ' ἕρπητα, Ἀττικὴν δὲ τὴν ἡδίστην καυστέον δὲ καὶ πλυτέον καὶ ταύτην ὡς τὴν καδμίαν. Δύναμιν δ' ἔχει σηπεδαστικὴν, σπεδαστικὴν φλεγμονῶν & φυμάτων κατατελῆ τε τὰ ὑπερσαρκοῦντα· καὶ τὰ κοῖλα πληροῖ σὺν κηρωτῇ, καὶ πώρους ἀρύπτει.

Ad. in quibusdam συντιθεῖσι. Sunt qui συντιθέασι tantum legant.

G. verba hæc σὺν κηρωτῇ non sunt in altero, quæ etiam Hermolaus non agnoscit.

B Περὶ Κινναβάρεως. Κεφ. ρθ'.

KINNABARI οἴονταί τινες ταυτὸν ὑπάρχειν τῷ καλουμένῳ ἀμμίῳ, πλανώμενοι· ὃ μὲν γὰρ ἄμμιον σκευάζεται ἐν Ἰσπανίᾳ, ἐκ λίθου τινὸς μιμουμένου τὴν ἀργυρείαν ψάμμον, ἄλλως δ' οὐ γινώσκεται. ἐν δὲ τῇ χώνῃ μεταβάλλει εἰς βύσσινον χρῶμα· ἔχει δὲ τὴν ἀποφορὰν ἐν τοῖς μετάλλοις πνιγώδη. παρέπονται γοῦν οἱ θειώδεις τοῖς τοιούτοις φύσεσι, τοῖς τὸ βλέπειν μὲν, μὴ ἀναπνεῖν δὲ ἀέρα. χρῶνται δ' αὐτῷ οἱ ζωγράφοι εἰς τὰ πολυτελῆ τοῦ τοίχου κοσμήσεις. Τὸ δὲ κιννάβαρι τοῦτο κομίζεται μὲν ἀπὸ Λιβύης, πωρώδεται δὲ πολλῷ καὶ τοσοῦτον ὥστε, ὡς μάλιστ' ἐξαρκεῖν τοῖς ζωγράφοις εἰς τὴν τῶν γραμμῶν ποικιλίαν. ἔστι δὲ καὶ βαρύχροον, ἢ βαθύχροον· ὅθεν νομίσαι τινὲς αὐτὸ εἶναι αἷμα δράκοντος. Δύναμιν δ' ἔχει τὸ κιννάβαρι τὴν αὐτὴν τῇ αἱματίτῃ, ἁρμόζον εἰς ὀφθαλμικὰ, μᾶλλον δὲ σύφορον ὅτι δ' ἰσχυρὸν καὶ πυκνοῦσα καὶ ἐξανθήματα ἀναλαμβάνει κηρωτῇ θεραπεύει.

Ald. in quibusdam ταυτὸν. Sunt qui ταυτὸ tantum legant.

Aliquid hoc loco desiderari suspicatur Marcellus.

V. ὁ δὲ κεραμὸς ἐπικεῖται τῇ χώνῃ

F Περὶ Ὑδραργύρου. Κεφ. ρι'.

ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ ὃ σκευάζεται ἀπὸ τοῦ ἀμμίου λεγομένου, καταχρηστικῶς δὲ καὶ τούτου κιναβαρίου λεγομένου. φασὶ γὰρ ὅτι λεπάδος χαλκοῦς κάλυκι σιδηρεῷ ἔχουσα κιννάβαρι, ἐπικαθάπτουσιν ἄμβικα ἐπαλείφαντες πηλῷ, εἶτα ἀνθρακιοῦσιν ἄνθρακι· τὸ γὰρ προσίζουσα τοῦ ἄμβικος αἰθάλη ἀποξεσθεῖσα καὶ ἀποψυχθεῖσα, ὑδράργυρος γίνεται. διείργεται δὲ ὁ τοῦ μεταλλάσσεσθαι

Ald. ἀμμίου

ἀργύρου ὁ τῆς στέγης καὶ σταλαγμιὰ συνιστῶσα· ἔνιοι δὲ ἰσχυρίζονται καθ' ἑαυτὸν ὑπὸ τῶν μετάλλων βυθίσκεσθαι τὸν ὑδράργυρον. φυλάσσεται δὲ ἐν ὑαλίνοις ἢ μολυβδίνοις ἢ κασσιτερίνοις ἢ ἀργυρέοις ἀγγείοις· τὸν γὰρ ἄλλον πάντα διαβιβρώσκει, καὶ πᾶν ἀπορρήγνυσι. Δύναμιν δ' ἔχει φθαρτικὴν πεθέσα· τὴν βάρος ἀφανίζουσαν τὸ σῶμα. βοηθεῖται δὲ γάλακτι πολλῷ πινομένῳ καὶ ἐξεμουμένῳ, ἢ οἴνῳ σὺν ἀψινθίῳ, ἢ ἀφεψήματι στελίνου, ἢ ὁρμίνου σπέρματι ἢ ὀρίγανον, ἢ ὑσσώπου σὺν οἴνῳ. [ῥῆμα δὲ χρυσοῦ, τουτέστι ξύσμα λεπτότατον, πινόμενον, ὑδραργύρου ἐστὶ φαρμακὸν βοήθημα.]

Ista quæ ad calcem conclusa sunt, adduntur ex veteribus libris & interpretibus.

De rubrica Sinopica. Cap. CXI.

RVBRICA Sinopis maximè probatur densa, grauis, iocineris colorem referens, calculorum expers, concolor, quæque dum diluitur longè latéque diffundi solet. Effoditur in Cappadocia spelúcis quibusdam, expúrgatáque defertur in Sinopem vrbem, in qua vænundatur: atque inde etiam cognomentum accepit. Vim habet exiccatoriam & emplasticam: quapropter vulnerarijs emplastris cõmiscetur, vti etiam pastillis exiccantibus & adstrictorijs. Aluum quoque sistit tum ex ouo sumpta, tũ etiam clystere infusa. Datur & eadẽ hepaticis.

Περὶ Μίλτου Σινωπικῆς. Κεφ. ριά.

ΜΙΛΤΟΣ Σινωπικὴ κρατίστη ἡ πυκνή, ἡ βαρεῖα, ἡ παίζουσα, αἵματος, ὁμοίχρους, πολύχρους ἐν τῇ αὐτῇ. συλλέγεται δὲ ἐν τῇ Καππαδοκίᾳ ἐν σπηλαίοις τισί. διυλίζεται δὲ καὶ φέρεται εἰς Σινώπην καὶ πωλεῖται. ὅθεν καὶ τὴν ἐπωνυμίαν ἔσχηκε. Δύναμιν δ' ἔχει ξηραντικὴν, ἐμπλαστικὴν· διὸ καὶ ἐμπλάστροις τραυματικῆς μίγνυται, καὶ ἐσχίσεσι ξηραντικῆς καὶ στυπτικοῖς. ἴσχει δὲ καὶ χιλίαν ἐν οἷς λαμβανομένη καὶ ἐγκλυζομένη· δίδοται καὶ ἡπατικοῖς.

Αἱματίτου.

De rubrica fabrili. Cap. CXII.

RVBRICA fabrilis ad omnia Sinopide inferior est. Optima Ægyptia & Carthaginensis, calculorum expers atque friabilis. Nascitur & in Iberia quæ ad occidentem spectat. Fit quoque, exusta ochra & degenerante in rubricam.

Περὶ Τεκτονικῆς. Κεφ. ριβ'.

ΗΔΕ τεκτονικὴ ἥττων ἐστὶ πάντα τῆς Σινωπικῆς· ἀρίστη δὲ ἡ Αἰγυπτία καὶ ἡ Καρχηδονική, ἄβιθυος, ἀψαμμος. γίνεται καὶ ἐν τῇ πρὸς ἑσπέραν Ἰβηρίᾳ, τῆς ὤχρας καιομένης [καὶ μεταβαλλούσης] εἰς μίλτον.

V. inferit μίλτος

V. ocras.

Περὶ Λημνίας γῆς. Κεφ. ριγ'.

ΗΔΕ Λημνία γινομένη γῆ, ἔστιν ἔκλυσις ὑπονόμου αἰπεώδους, ἀναφερομένη ἀπὸ Λήμνου τῆς νήσου, ἐχούσης ἑλώδη τόπον, καὶ ἐκεῖθεν ἐκλείγεται καὶ μίγνυται αἵματι αἰγείῳ· ὧν οἱ ἐκφανῶς θεῖοι αἱματοπλάστοντες καὶ σφραγίζοντες εἰκόνα αἰγός, σφραγῖδα καλοῦσιν αὐτούς. Δύναμιν δὲ ἔχει ἀντιδότου θαυμασίως φαρμάκων ἔξοχον, πινομένη σὺν οἴνῳ, καὶ προληφθεῖσα ἐξεμεῖσθαι αἰδοκάζει τὰ δηλητήρια.

De Lemnia terra. Cap. CXIII.

LEMNIA terra defertur è cuniculoso quodam specu Lemni insulæ, in quo nascitur. Scilicet palustris inibi locus est, è quo eruitur & hircino sanguini permiscetur. Hanc dein incolæ coactam in pastillos capræ imagine signant: vnde & sphragida ægos, hoc est, capræ sigillum appellauêre. Vim antidoti habet cõtra pernicioſa venena singularẽ. Siquidẽ pota cum vino & præsumpta, foras venena vomitione pellit.

Prodest & contra ictus morsúsque animalium, quæ exitiale virus eiaculantur. Antidotis quoque immiscetur. Sunt qui hac etiam ad expiationes vtantur. Est & eadem dysenteriæ vtilis.

De Atramento sutorio.

Cap. CXIIII.

ATRAMENTVM sutorium genere quidem vnum & idem est, siquidem liquor est concretus: at speciales differentias tres habet. Enimuerò vnum liquoribus stillatim in cuniculos quosdam percolatis concrescit: quamobrem ab ijs qui Cypria metalla tractant, stillatitium appellatur. Peteesius hocipsum pinarium vocat: alij stalacticon, id est, stillatitium. Alterum latenter stagnat in speluncis, posteáque tráfusum in excauatas scrobes, concrementum capessit: hoc iccirco pecton, id est, concretitium propriè nominatur. Tertium coctile dicitur, & in Hispania confici solet, sed maximè decolor & bonitate deterrimum esse constat. Ratiò parandi hæc est: Dilutum aqua decoquunt, mox in ˇ conceptacula transfusum residere patiuntur. Hoc statis diebus cogitur, & in complures diuiditur tessellatas formulas, quæ quidem racematim inter se cohærescunt. Optimum censetur, quod cæruleum est ac ponderosum, densum & ˇ transluces: cuiusmodi stillatitium est, quod ab aliis lonchoton, quasi lanceatum, appellatur. Proximum, concretitium. Coctile verò inficiendis denigrandísque pannis aptius cæteris esse compertum est: sed ad medicinæ vsum inualidius esse experimenta docent. Valet adstringere, calfacere & crustas inducere. Lata ventris animalia necat drachmæ pondere deuoratum, aut cum melle delinctũ: vomitus ciet: & aduersus hausta fungorum venena ex aqua potum auxiliatur. Purgat & caput aqua dilutum, & in vellere naribus instillatum. Cæterùm vritur, vti mox in chalcitidis mentione ostendemus.

Vt. optimum legunt

Vtile, quam fortasse melius.

De Chalciti. Cap. CXV.

PRÆFERENDA Chalcitis æris speciem referẽs, friabilis, nec lapidosa, nec inueterata, intercursan-

A ἁρμόζῃ ὃ καὶ πρὸς τὰ τῶν θανασίμων ἰοβόλων πληγὰς καὶ δήξεις. μίγνυ) δὲ καὶ αἱτιδίτης. χρῶνται δέ τινες καὶ εἰς πλατεῖαν αὐτῆ. ἔστι δὲ ἐ δυσεντερίας χρήσιμος.

Περὶ Χαλκάνθου. Κεφ. ριδ'.

B ΧΑΛΚΑΝΘΟΣ πᾶν μὲν ἓν ἐστὶ καὶ ταυτὸν τὸ ἀρχῆ. ὑγρὸν γάρ ἐστι πυκνὸς εἰδικὰς διαφορὰς πέφυκε. ὃ μὲν γὰρ ἐξ ἁλισμῶν διηθυμένων ὑγρῶν εἴς τινας ὑπονόμους συνίσταται· ὅθεν καὶ σταλακτὴς καλεῖται ὑπό τ τῶν Κυπριακὰ μέταλλα ἐργαζομένων. Πετησίος δὲ αὐτὸ καλεῖ πινάειον· ὁ δὲ, σταλακτικὸν, πικτὸν, ἐφθὸν, ἀσκαρὸν, λογχωτὸν. ὃ δὲ,

C ἀφανὲς λιμναζόμενον ἐν αὐλαίοις, ἔπειτα μεταχόμενον εἰς βόθρους, τὴν πῆξιν λαμβάνει. ὃ δὴ καὶ πικτὸν ἰδίως ὀνομάζεται. ὃ δὲ τρίτον, κεκλῆσθαι μὲν ἐφθὸν. σκυβάζει) δὲ ἐν Ἰβηρίᾳ. σκυβάλιον ὃ ἔχει πλειόστην, ἄχρηστόν τε καὶ ἀσθενέστατον ὑ-

D πάρχον. ὕδατι διέντες αὐτὸ ἕψουσιν, εἶτα εἰς τὰς ἑξαμβυας καταφέσαντες, ἐῶσι. τοῦτο δὲ πήγνυ) τε ταῖς ἡμέραις ἡμέρας, εἰς πολλὰ διαιρούμενον κυβοειδῆ σχήματα, βοτρυδὸν ἀλλήλοις ᾽ συνεστῶτα. ἄριστον δ᾽ αὐτὸ ἡγητέον τὸ κυάνεον καὶ βαρὺ,

E * πικτόν τε καὶ διαυγές· οἷόν ἐστι τὸ σταλακτὸν, ὑπὸ δὲ ἡμῶν δὲ λογχωτὸν καλούμενον· ἐχόμενον δὲ, τὸ ˇ πικτόν. ὃ δ᾽ ἐφθὸν, πρὸς μὲν βαφὰς καὶ μελάσματα ᾽᾽ ὁπωσδήποτε τὴν ἀρχὴν δοκεῖ εἶναι· πρὸς δὲ ἰατρικὰ, ἀσθενέστερον ἢ πρὸς δύσεις. Δώσουσι δὲ σὺν ὕδατι, θερμῷ, ἑφθοῦ ἕλμινθας πλατείας αἴρει < ἀλλοίως

F πινόμενον, ἢ μετὰ μέλιτος ἐκκλύζομενον ἐμέτους τε κινεῖ καὶ μύκητας ἀναιρεῖ βοηθεῖ· σὺν ὕδατι πολλῷ κεφαλαλγίαι τε καθαίρει ἐνεθὲν ὕδατι, καὶ δι᾽ ἑλίου ῥινὶ ἐγχυθέν. χρῶνται δὲ, ὡς ὑπογεγράψομεν αὐτίκα ὅτε τῆς χαλκίτιδος.

Περὶ Χαλκίτιδος.

G ..... Κεφ. ριε'.

ΧΑΛΚΙΤΙΣ πρόσφατον μὲν χαλκοειδὲς καὶ διαθρυπτὸν, ὑγιὲς τε καὶ οὐ παλαιὸν, ἔτι δὲ ἴσης ὑπομίκτης καὶ

Sic Lacuna legit meus cod. Vulg. ex ἀπαλὰ ἐγχαλίζοντες V quidam ἀοθένως ἀναλίζοντες.

G. alter ἀχρήστου. quam scripturam Hermolaus non sine iudicio retinuit, itémque Lacuna.

G alter, σωτηρίαν, quod verbum huic accommodatius est. Orib. σωτήριον καὶ χρήσιμον

Ald. τοκτὸν.

V. διαυγὲς.

ἀποστλεύσας ἔχουσαν. Δύναμιν δὲ ἔχει ἁ
G. V. ἰουλίδι, vt Ruellium expressit. Sed vulgatam scripturā rectam esse, ex Galeno intelligitur.
ψυπτικὴν τε καὶ θερμαντικὴν, καὶ ἐκπυ-
ρωτικὴν· ἀποκαθαρτικὴν τῶν ἐκδεδομένων καὶ
ῥηγνυμένων. ἔστι δὲ καὶ τῶν μετεώρως
*ψυφόντων. ποιεῖ δὲ καὶ τοὺς ἐρυσιπέλα-
τας, ἕρπητας· αἱμορραγίας τε ἐξ ὑστέρας
καὶ μυκτήρων σὺν τοῦ χόλου χυλῷ· ξηραί-
νει δὲ τοὺς τε ἐπουλίδας καὶ νομὰς καὶ πα-
ρείαθμια. κεκαυμένη δὲ, τοὺς τὰ ὀφθαλ-
μικὰ μᾶλλον χρησιμωτέρα λεία σὺν μέλι-
τι. τετυλωμένα μὲν βλέφαρα καὶ τρα-
χία ἀποτίλει καὶ σμήχει. σύριγγας δὲ αἴρει
σὺν κολλυρίου σχήματι ἐμπλαττομένη.

Περὶ Ψωρικοῦ. Κεφ. ρις'.

Σκευάζεται δὲ ἐξ αὐτῆς τὸ καλού-
μενον ψωρικὸν, διπλασίονος χαλκίτεως
τοῖς ἁπλοῦ καὶ δμείοις μιγνυμένου, καὶ
σὺν ὄξει λειαινομένου. δεῖ δὲ ἐν καμίνῳ
ἀγγείῳ κατορύσσειν ἐν κοπρίᾳ ἐν τοῖς ὑπὸ
κύνα καύμασιν ἡμέρας μ'. γίνεται δὲ δρι-
μύτερον, δυναμένου ὅσα καὶ ἡ χαλκῖτις.
ἔνιοι δὲ ἴσα μίξαντες οἴνῳ λειαίνουσι, καὶ τὰ
αὐτὰ ποιοῦσι. καυστέον δὲ αὐτὸ ἐν ὀστρά-
κῳ καινῷ ἐν πηλίνοις, καὶ διαπύρωσις αὖ-
θραξιν ἀναφέρουσα μύρων. μέλλον δὲ ἔτι τῆς
καύσεως, ὅτι μὲν τῶν πολύχρων, τὸ ἐπομ-
φολύγωσι καὶ καλῶς ξηρὸν ῥήγνυσθαι· ὅτι
δὲ τῶν λευκῶν, ἡ ὅτι τὸ διανθίσειν μέλ-
Sic vetus cod. at vulg. ex. simpliciter habetur μανθάνει
λον. ὅταν γὰρ * αἱματώδης καὶ μιλτώ-
δης γένηται τὴν χρόαν καὶ βαθὺς, αἰρε-
τέον αὐτό. τὴν τε παρεσκαμμένην ἀκα-
θαρσίαν ἀποφυσητέον καὶ ἀποδετέον.
ὅπλᾶται δὲ ἐπ' αἰθράκων ἐμφυσωμένων, μέχρι τοῦ ὑπωχρον αὐτὸ γένεσθαι· εἶτα
ἐπ' ὀστράκου καὶ διαπύρων αἰθράκων
τρεφομένη πυκνῶς, ἕως ἂν πυρωθῇ καὶ
μεταβάλλῃ τὴν χρόαν.

Περὶ Μίσυος. Κεφ. ριζ'.

ΜΙΣΥ δὲ τὸ ἐκλεκτέον ὃ Κύπριον,
χρυσοφανὲς, σπληνῶδες, καὶ ὃ τῶν
θραυσθῆναι χρυσίζον, καὶ ἀποστίλβον ἀστεροειδῶς. Δύναμιν δὲ ἔχει ἡ καῦσις τὴν
αὐτὴν τῇ χαλκίτιδι, διὰ τὰς τοῦ ψωρικοῦ
κατασκευὰς, ὃ τῶν μᾶλλόν τι καὶ ἧττον
διαφέρει. Ὃ δὲ Αἰγύπτιον, τοῖς μὲν τ'

tibus venis oblongis splẽdentibúsque. Huic adstrictoria vis est, excalfaciens & crustas vlceribus obducens: repurgat quæ oculis & eorundem angulis hærent. Est & in genere leuiter exedentium. Quinetiam efficax est ad erysipelata & herpetas, itémque sanguinis è vulua & naribus eruptiones cum porri succo. Eius farina gingiuas excrescentes, nomas, tonsillásque compescit: vsta eadem & cum melle trita, oculorum medicamentis longè vtilior redditur. Callum quidem scabritiémque palpebrarum absumit abstergitque: fistulas verò collyrij modo indita sanat.

De Psorico. Cap. CXVI.

Efficitur porrò ex ipsa medicamentum, psoricum dictum, duabus eius partibus * vni cadmiæ additis, & ex aceto tritis. Oportet autem in fictile conijci, quod fimo obruatur diebus quadraginta per Caniculæ ardores. Sic enim medicamentum acrius euadit, atque idẽ quod chalcitis potest. Sunt qui mixtas pares vtriusque portiones in vino terunt, & eadem illa prosequuntur. Vritur Chalcitis fictili nouo indita, & ignitis carbonibus imposita. Sit verò modus vstionis, metallicorum quæ quidem humore multo abundauerint, dum bullulas edere desierint, ac perfectè inaruerint: reliquorum verò, dum in floridiorem colorem mutata fuerint. Cùm ergo chalcitis sanguineum ac miniatum colorem interiùs altiúsve contraxerit, tùm demum igni eximenda est: mox insidente spurcitia flatu depulsa reponenda est. Torretur etiamnum perflatis carbonibus, vsquedum subluteo colore pallescat, aut fictili subditis candentibus prunis subinde versata, donec ignescat colorémque mutet.

vel, inter cadmiæ temperatiã

De Misy. Cap. CXVII.

MISY assumendum natione Cyprium, auri speciem præ se ferens ac durum, quódque dum friatur aureis micet scintillis, ac stellæ modo radiet splendescátve. Vstionem autem ac vim etiam habet cum Chalcitide eandẽ, præterquàm quòd psoricum ex eo non conficitur, intensioríque ac remissioris facultatis ratione hoc ab illa differt. Ægyptium porrò ad cætera quidem præ-

fertur, tanquam efficacius: sed ad ocularia medicamenta, supradicto longè inferius est.

De Melanteria seu atramento metallico. Cap. CXVIII.

MELANTERIA quædam in faucibus fodinarũ, quibus æs erutũ fuerit, salsuginis modo cõcrescit: altera verò in summa facie supradictorum locorum coit, quæ quidem etiam terrena est. Sed & inuenitur in Cilicia, & aliis quibusdam regionibus, fossilis quædã. Præstat in Melanteriæ genere, quæ sulphuri est coloris, læuis, æquabilis, pura, & quę contactu aquæ confestim nigrescit. Cæterùm vim causticam eandem obtinet, quam & misy.

De Sory. Cap. CXIX.

SORY existimauere nonnulli esse melanteriam, sed falsò: siquidem peculiare genus est, illi tamen haud ita dissimile. Verùm Sory virosum magis est, ac nauseam mouet. Inuenitur in Ægypto & aliis quibusdam regionibus, vt & in Africa, Hispania & Cypro. Maximè verò laudatur Ægyptium, quódque friãti nigrius apparet, crebris oraminibus peruium & subpingue, insupérque astringens & hausțu olfactúque virosum, atque adeo subuertendi stomachi vim habẽs. Quod autem inter friandum misyos modo nõ scintillat, & alterius generis esse, & inualidum censendum est. Vim & vstionem supradictis similem habet: dolori dentium cauernis inditum medetur: eosdem labantes firmat: ischiadicis ex vino infusum auxiliatur: illitum cum aqua varos extinguit. Miscetur & medicamẽtis quæ pilos denigrant. Hæc verò in communi & alia ferè omnia quæ vstionem experta non sunt, vstis potentiora censeri debẽt: salem excipio, vini fæcem, nitrum, calcem & consimilia, quæ quidẽ cruda, remissiora sunt. Cremata siquidem, viribus efficaciora redduntur.

De Diphryge. Cap. CXX.

DIPHRYGIS tria genera esse creduntur: vnum enim metallicum est, quod in Cypro sola

ἀμβλυωπίαν διαφέρει ἐμπλαστικώτερον ὄν. τοῖς δὲ ταῖς ὀφθαλμικαῖς δυνάμεσι, πολλῷ λείπεται τῶν τοιουτρυμάτων.

Περὶ Μελαντηρίας. Κεφ. ριη.

ΤΗΣ δὲ Μελαντηρίας, ἡ μὲν τῆς τῶν ὀρυγμάτων χωμίοις, ἀφ' ὧν αἱ μεταλλεῖαι χαλκοῦ, διαπέφυκε ἀλμυρὶς ἐοικυῖα γῆ. ἡ δὲ, ἐκ τῆς αὐτῆς διαφανείας τῶν τοιουτρυμάτων πέφυκεν, ἥ τις καὶ γηώδης ἐστίν. διείσκεται δὲ τις καὶ ὀρυκτὴ ἐν Κιλικίᾳ καὶ ἐν ἄλλοις τισὶ τόποις. διαφέρει δ' αὐτῆς ἡ ἀπὸ χρυσοῦ, λεία, ὁμαλὴ, καθαρὰ, καὶ ἐν τῷ ὕγρῳ ὕδατος μελανομένη ταχέως. Δύναμιν δὲ ἔχει καυστικὴν, πλὴν αὐτῆς τῷ μίσυϊ.

Περὶ Σώρεως. Κεφ. ριθ'.

ΤΟ δὲ Σῶρυ ἔνιοι ὑπέλαβον Μελαντηρίαν πλασμάτιον· ἴδιον γάρ ἐστι γένος, οὐκ ἀφίμιον· βραῶδες δέ τι ἔχει δὲ τὸ Σῶρυ καὶ ναυτίας ποιητικήν. διείσκεται δὲ ἐν Αἰγύπτῳ, καὶ ἐν ἄλλοις δὲ τόποις, ὡς ἐν Λιβύῃ καὶ Γαδείροις τῆς Κύπρου. τοῦ χρηστὸν δὲ τὸ Αἰγύπτιον, καὶ ἐν τῷ ἀφρωδῆ μελάντερον φαινόμενον· καθαπτόμενον τὸ πολλὰς ἔχον, καὶ ὑγρολίθριον ἐπὶ δὶ ὕφους, καὶ πρὸς πλὴν καπνοῦ ἢ ὀσμῆς βραῶδες, καὶ αἰσθητικὸν στόματος. τὸ δὲ μὴ λαμπυρίζον ἐν τῷ ἀφρῷ ἑτέρως ἔχοντι, ἐπεσχημένες τε καὶ ἀδυνὲς εἶναι. Δύναμιν δὲ ἔχει καὶ καῦσιν πλὴν αὐτῆς τοῖς προειρημένοις· ἰᾶται δὲ καὶ ὀδοντοπαλγίας ἐμπλήμενον εἰς τὰ βρώματα, καὶ ἕδρας ὑγροὺς· ἰσχιαδικοῖς δὲ ὀδύναις κρατύνει· καὶ ἰχναδικοῖς βοηθεῖ μετ' οἴνου ἐγκλυζόμενον· ἰσθμοὺς τε ἕλκεσι, μεθ' ὕδατος καταχριόμενον. μίγνυται καὶ εἰς περιῶν μελάσματα. κοινῇ δὲ ἔχει ὅλη τούτων χρόα καὶ τὴν ἄμυλον πάντων, δυναμικώτερα τὰ ἄκαυστα τῶν κεκαυμένων ἡμιτόνιον πλὴν ἁλῶν καὶ πυρὸς, καὶ νίτρου καὶ πισσοῦ καὶ τῶν ὁμοίων, ὅσα ὑγρὰ ὄντα αὐίεται. καυόμενα γὰρ, πλὴν δυνάμεων ἐμπλαστότερα γίνεται.

Περὶ Διφρυγοῦς. Κεφ. ρκ'.

ΤΟΥ δὲ Διφρυγοῦς τρία ἡμιτόνια εἴδη. τὸ μὲν γὰρ μεταλλικόν ἐστιν, ὃ δὴ ἐν Κύπρῳ

μόνη γίνεται· πηλῶδες γὰρ ὄν, αἰαφέρεται ἐκ βυθοῦ πηδῶν τῷ ἐκεῖ τόπων· εἶτα αἰνεχθὲν ξηραίνεται ὑπὸ ἡλίου, καὶ μὴ ἔωθεν φρυγανίοις κεκλιμένοις κάεται· ὅθεν καὶ διφρυγὲς ἐκλήθη, ἀπὸ τοῦ ὑπὸ ἡλίου καὶ τῶν φρυγάνων καίεσθαι καὶ ξηραίνεσθαι, καὶ οἱονεὶ φρύγεσθαι. τὸ δὲ ἕτερον, τῷ καταπυρωθέντι χαλκῷ ὅμοιον ὑποστάθμης τινὸς καὶ πρόσ ὑπαρχὴν μὴ γὰρ τηνικαῦτα τῷ ψυχροῦ ὕδατος βαπτίζουσιν, ὡς αἰωτήρα ἐφάμεθα· βαπτίζουσι δὲ αἴθοντες χαλκοῦ ἀφεψόμενοι, μὴ τηνικαῦτα αἱαίρεσιν τοῦ χαλκοῦ βιαίονται ὑπὸ τῆς χώνης ἐγκείμενον πρὸ πυθμένι αὐτῆς τὸ τοιοῦτον εἶδος, τηνικαῦτα τε σύμφυτον καὶ τηνικαῦτα γλοιῶδες χαλκοῦ ἔχον. τὸ δὲ τρίτον σκευάζεται οὕτω. λίθον τὸν λεχθέντα πυρίτην σκευάζοντες εἰς κάμινον οἱ περὶ τοὺς τοίχους ὄντες, καίουσι ἕως ἡμέρας ἑπτὰ ὡς τὰ πολλὰ· ὅταν δὲ ἡ χρόα μαλακώδης γένηται, αἰελόμενοι ἀποτίθενται. τινὲς δέ φασιν ὑπὸ μόνης τῆς τοῦ χαλκοῦ λίθου ἀποπλύσεως ὕλης γίνεσθαι τὸ περιεργαζόμενον· ὅταν ὑπὸ πηλοῦ ἐσα ὑπὸ παῖς λεχθείσαις ἄλωσιν, εἶτα ἐμβάλῃ εἰς τοὺς ἄθρους, καὶ ὑπὸ τοῦτο καίηται. τόν τε γὰρ κάκλῳ τόπον τῶν βοθρων ὅτι λαμβάνει, καὶ μὴ τηνικαῦτα τὸν λίθον οὐδὲν ἧττον βιαίονται. περιχρίουσι δὲ αὐτὸ τῇ χώνῃ ἐγχαλκον, γύψον, τε καὶ ἀναξηραίνουσι τηνικαῦτα γλοῶσιν. ὅταν δὲ κεκαυμένον ὀξεῖα ἀκτὶς ἰῶ δὲ καίοντες ὑπὸ διφρυγοῖς πυρὶ ἀσκοῖσι. δυώδεσιν ἔχει συμπικὸν τε, ἀναλγητικὸν τινα μύων, σμηκτικόν τε καὶ ξηραντικὸν, καὶ καταπλητικὸν ὑπὸ ἐρυσιπέλατος, ἀποπλυτικὸν κακοήθων καὶ ἐρπυστικῶν. διαφορᾷ δὲ ἀποχήματα ἀναλήθειν τερεβινθίνῃ ἢ κηρωτῇ. Περὶ Ἀρσενικοῦ. Κεφ. ρκά.

ΑΡΣΕΝΙΚΟΝ καὶ τὸ αὐτὸ δύναται μέλλα τῇ σανδαράχῃ. δεῖσον δὲ ἐστὶ τὸν τὸ πλακώδες καὶ χρυσίζον τῇ χρόᾳ, ὃ τε πλάκας λεπιζομένας ἔχον ὡς αἰὲὶ ὑπὸ καιόμενας ἀλλήλαις· ἔστι δὲ ἀμυγὲς ἑτέρας φύσεως. τοιοῦτον δὲ ὄν ἐστὶ τὸ θρυλούμενον ἐν Μυσίᾳ τῇ ἐν Ἑλλησπόντῳ. ἔστι δὲ αὐτοῦ δύο εἴδη. τὸ μὲν ἕν, οἷον περίρηται· τὸ δὲ ἄλλο, βωλῶδες· καὶ σανδαράχῃ τῇ χρόᾳ, ἐκ Πόντου καὶ Καππαδοκίας φερόμενον. διυπερβύει δὲ τὸ τοιοῦτον.

A nascitur. Ita enim vt lutosum est, ex imo quodam inibi gurgite eruitur: erutum deinde Sole siccatur: mox circũpositis cremis vritur. Diphryges ideò vocatũ est, quod & a sole & a cremis farmẽtisve vratur, arefiat inquã & quasi torreatur. Alterũm, dum conficitur æs, illius quasi fæx quędam subsidet: siquidem post frigidę affusionem, vti superiùs retulimus cũ de æris flore disserẽremus, sublato ære, fundo fornacis inhærẽs id genus inuenitur, æris tum astrictione tum etiam sapore prędituꝫ. Tertium sic fit: Lapidẽ pyriten dictum qui ista tractant dies multos vti calcem cremant in camino: dẽ vbi colorem rubricę contraxerit, exemptum recondunt. Quidam verò asserunt hoc è sola materia fieri, è qua lapis ærosus pficitur, quando in dictis areis assata indeq; in scrobes translata peruritur. Nam & locum foueas ambientem occupat, & exẽtis lapidibus nihilominus inuenitur. Præfertur quod saporem æris reddit, ęruginẽ prę se ferens, astringens & vehementer exiccans linguam: id quod sibi exusta ochra nõ vendicat, quæ tamen cremata diphrygis loco vænit. Vis ei astringere, validè perpurgare, extergere, siccare, carnis excrescentias cohibere, vlcera cacoëthe & quæ serpũt ad cicatricem perducere. Abscessus quoque terebinthina aut cerato exceptum discutit.

De Arsenico seu auripigmento.
Cap. CXXI.

AVRIPIGMENTVM in iisdẽ metallis, quib⁹ sãdaracha, gignitur. Optimũ existimatur crustosũ, auri colore micãs, quodq; crustas eas habet ferè sẽper sibi inuicẽ squamatim incumbẽtes: insup ęrq; impermixtũ est & omnis alienę materię expers. Tale est quod in Mysia Hellespõti nascitur. Sũt autẽ illius duo genera: vnũ quidẽ, quale antè cõmemoratũ est: alterum, glebosum & colore sandarachæ simile, quod è Ponto & Cappadocia defertur: & hoc quidem secundum locum tenet. Porrò

Sic Ald. cod. At Pata. βαλανοειδὲς καὶ ἀχνῶδες καὶ σανδαραχίζον τὸ χρῶμα· διυπερβύει δὲ καὶ ἐπὶ τοῦτο ὁμοίως ἐπιτίθεται. atque hinc omissa expressoris interpretes.

Porrò torretur auripigmẽtum hoc modo: Testæ nouæ inditum carbonibus ignitis imponito, assiduéque versato, donec igne flagret colorémque mutet: deinde refrigeratũ tritúmque recondito. Vim habet septicam, astrictoriam, & crustas inducentẽ cum feruore ac violento morsu: reprimit & quicquid excrescit, ac pilos detrahit.

De Sandaracha. Cap. CXXII.

SANDARACHA præfertur ad satietatem rufa, fragilis, friabilis, pura, & quæ cinnabaris colorem imitatur, insupérque sulphuris virus redolet. Vis & vitio eadem, quæ auripigmento. Sed & alopecias explet resina excepta, & scabros vngues cum pice remouet. Contra pedicularem morbum ex oleo efficax est: tubercula cum adipe discutit. Prodest etiam ad narium oríſque vlcera & exteras papularum eruptiones, cum rosaceo: itémque ad condylomata. Datur & purulenta excreantibus è mulso. Quin & aduersus veteré tussim cum resina suffitur, nidore per fictulã in os attracto. Vocem deniq; limpidam & canoram facit cum melle delincta, & suspiriosis cum resina in catapotio datur.

De Alumine. Cap. CXXIII.

OMNE propemodũ aluminis genus in Ægypto & in iisdem metallis inuenitur: est enim quod scissile dicitur, veluti flos gleboſi. Gignitur & in aliis quibusdã locis, in Melo, Macedonia, Liparis, Sardinia, Hierapoli Phrygiæ, Africa, Armenia & compluribus aliis regionibus, sicut & rubrica. Sunt autẽ eius species plurimæ. Verùm ad medendi vsum scissile, rotundum & liquidum expetuntur. Optimum verò scissile: & in hoc genere laudatissimum quod recens est, candidissimum, calculorum expers, graueolẽs & perquàm astringẽs, insupérq; nec glebæ modo nec assulosè compactum, sed sigillatim quasi in capillamenta canescentia dehiscens: quale est quod Trichites, hoc est, capillare appellatur, in Ægypto prouenies. Reperitur quoque lapis huic alumini persimilis, qui tamen

A ὀπίζαται δὲ οὕτως. ἐπ' ὀστράκου καινῦ ἐπιῤῥαίνοντες αὐτὸ, ἕως ὅτου διαπύρωθῇ ἄθραυστος καὶ τρυφερὸς συνεχῶς. ὡς δ' αὐ πυρωθῇ καὶ μεταβάλῃ, ψύξας καὶ λεάνας ἀποτίθεσθαι. Δύναμιν δ' ἔχει σηπτικήν τε καὶ στυπτικὴν καὶ ἐσχαρωτικὴν μετὰ πυρώσεως καὶ διαιτᾶν δήξεως· ἔστι δὲ καὶ τῶν σαρκοφύων, ψιλοῖ τε τρίχας. G hæc verba sic legantur in vtroque ἰσχναίνει ἀποτεθὲν μετὰ τὸ ἐσχαρωθῆναι ἢ πυρωθῆναι ἢ τὸ ἐσχαρωθῆναι μᾶλλον ἐστὶ. Al. vnde.

B Περὶ Σανδαράχης. Κεφ. ρκϛ.

ΣΑΝΔΑΡΑΧΗΝ δὲ προκρίνουσι τὴν κατάχρῃ, πυῤῥαὶ, εὔθραυστον, ἀλεόμενόν τε καὶ καθαράν, κιννάβαρίζουσάν τε χρόαν, ἔτι δὲ ἡδὺν ἀποφορὰν ἔχουσαν. Δυνάμιν δὲ ἔχει ὁπίσην τὴν αὐτὴν τῷ ἀρσενικῷ· περατικὴ δὲ καὶ ἀγωπικὴς ἀναλυ- Oribasius.

C τικὴ ῥητίνῃ, καὶ λεπροὺς ὄνυχας σὺν πίσσῃ ἀφίησι· καὶ πρὸς φθειριάσεις σὺν ἐλαίῳ πολὺ· φύματά τε σὺν σίαπι διαφορεῖ. ἁρμόζει δὲ καὶ πρὸς τὰ ῥινὸς καὶ τόμωσιν ἕλκη, καὶ πρὸς τὰ λοιπὰ ἕλκη φύματα, μετὰ ῥοδίνου· καὶ τοῖς κονδυλώμασι δίδοται καὶ ἐμπυικοῖς, σὺν οἰνομέλιτι. καὶ Drag. μίστη καὶ ἔλαιον

D ὑποθυμιᾶται σὺν ῥητίνῃ καὶ πρὸς παλαιὰ βῆχα, διὰ σίφωνος ἐλκομένου καὶ ἀτμοῦ τῶν τόμων. φωνὴν τε ἀποκαθαίρει συλλειχθεὶς σὺν μέλιτι, καὶ διαθλιπτικοῖς σὺν ῥητίνῃ κατὰ πότον δίδοται.

Περὶ Στυπτηρίας. Κεφ. ρκζ'.

ΣΤΥΠΤΗΡΙΑΣ δὲ γένεσιν πολλῶν εἴδους, ὅτι τὴν αὐτὴν τῷ Αἰγυπτίῳ μεταλλῶν εὑρίσκεται· ἔστι γὰρ σχιστὴ, οἱονεὶ τῆς Βωλίτιδος αἶσος. γεννᾶται δὲ καὶ ἐν ἄλλοις μὲν τόποις, ἐν Μήλῳ, ἐν Μακεδονίᾳ, ἐν Λιπάραις, καὶ Σαρδονίᾳ, καὶ Ἱεραπόλει τῆς Φρυγίας, Λιβύῃ, Ἀρμενίᾳ, καὶ ἐν ἄλλοις δὲ τόποις πλείοσιν, ὥσπερ καὶ μίλτος· ἔστι δὲ αὐτῆς εἴδη πλείονα, πρὸς δὲ ἰατρικὴν χρῆσιν λαμβάνεται τὴ σχιστή τε καὶ τὴ στρογγύλη καὶ τὴ ὑγρά. ἀείστη δὲ καὶ ἀρχὴ τὴ σχιστὴ, καὶ ταύτης τὴ πρόσφατος καὶ λευκὴ ἄγαν, καὶ ἄλιθος καὶ βαρίζουσα, σύφωσά τε βύτινος· ἔπειτα δὲ τὴ πεπιεσμένη βωλώδη τὴ σχιδακώδη, ἀλλ' ὀξασμένη κατὰ μοναδὰς πολιὰς θριξὶν ἐμφερῶς, οἷα ἔστι τὴ λεγομένη Τριχίτις, γεννᾶται δὲ ἐν Αἰγύπτῳ. φαίνεται δὲ καὶ λίθος ἐμφερὴς αὐτῇ ἄγαν, ὃν διαχρίτιον τῶν τῆς V. ἀχλὺν ἀείστη ἐστὶ τὴ σχιστὴ, &c.

γλίσιος κριτηρίῳ μὴ ἐύφορα. τῆς δὲ γρογγύλης ἡ χλωροΐπτος, ἀδόκιμος ὑπάρχει· γνωρίζεται δὲ ἐκ τῆ χρίματος. παιεγλυπτία δ' αὐ ἐστὶν ἡ φυσικῶς γρογγύλη καὶ πομφολυγώδης, ὑποόλευκός τε καὶ ἐύφουσα ἐρρωμένως, ἔτι δὲ πασὶν ὠχρότητος ἅμα καὶ λιπαρείας ἔχουσα· ὡρὸς ὑ ζύτους ἀλιθὸς τε καὶ βιβρυδὴς, καὶ ἥκει Μηλία ἢ Αἰγυπτία. ἔστ ὑ ὑγρᾶς τὴν μάλιστα λιφαρὴν ὡροχρῖτον καὶ γαλακτώδη, ὁμαλήν τε καὶ διάλευκον χυλώδη, ἔτι ὑ ἄλιθον καὶ πυρώδες ἀποπτύουσαν. Δύναμιν ὑ ἔχουσι θερμαντικὴν, συπτικὴν, ἀποκαθαρτικὴν τ' ὀπτισχιτώνων τ' κόραις· τήκουσαν ὑ ἐν ταῖς ὀπὶ τῶν βλεφάρων ἕλκας, ἐ τὰ ἄλλα ὑπόξυρα ῥώματα. σύνεργιτέραν δὲ τῆς γρογγύλης τὴν ὀξυτέρην. καίονται δὲ καὶ ὀπλῶνται, ὡς χαλκῖτις· ἴχροσι δὲ καὶ σπιλώδεσι, αἱμορραγίαις· οὖλα πλαδῶντα γίλοισι· καὶ ὀδόντας στομώδεις κρατύνουσι σὺν ὄξει ἢ μέλιτι. ἀφθας δὲ ὠφελεῖ σὺν μέλιτι, καὶ ἕδρα θύματα καὶ ῥεύματα ἐν ὠσὶ, σὺν πολυγόνῳ χυλῷ· λέπρας δὲ ἁρμόζουσι σὺν κεράμου φύλλοις, ἢ σὺν μέλιτι ἐφηδῦσαι καὶ κνησμοῖς, ὄνυξί τε λεπρώσεσι καὶ πτερυγίοις καὶ χειμετλοις, σὺν ὕδατι καταιονούμεναι. σὺν πυρῷ δὲ ὄξους καταχριόμεναι μετὰ κηκίδος ἴσης κεκαυμένης, πρὸς φαγεδαινικά· ὡρὸς δὲ νομας, σὺν ἁλὶ διπλοῖ. πιτυρισάσεις δὲ σὺν ὀρόβῳ καὶ πίσῃ ὑγρᾷ σμήχουσι καταχριόμεναι· κνίδων τε καὶ φθειρῶν καὶ πυρικαύτων, σὺν ὕδατι καταχρίεσθαι, βοήθημα. οἰδήμασί τε ὑ μασῶν καὶ βουβώνων δυσωδίαις καταχρίουσι. ἡ δὲ Μηλία ὑ ὡρὸς ἀσυλληψίαν συνεργεῖ, ὡρὸ τῆς συνόδου ἐμβαλοῦσα τῷ στόματι τῆς ὑστέρας· καὶ ἔμβρυα ἐκβιβάζει· ἐπουλοῖ τε ὑ ταῖς φυλαῖς καὶ παιδαρθρίοις ἐπιτίθειον· καὶ σώμασι, καὶ ὡρὸς ὦπα καὶ αἰδοῖα ζωὴ μέλλη ἐπιχρίεσθαι.

Περὶ Θείου. Κεφ. ρκδ'.

ΘΕΙΟΝ δὲ ἄριστον ἡγητέον, ὃ ἄπυρον καὶ λαμπυρίζον τῇ χρόᾳ, ἰλαφρύες τε ὑ ὄζιον. τὸ δὲ πεπυρωμένον, τὸ χλωρὸν

A gustus iudicio internoscitur, quòd nõ astringat. Damnatur in rotundi genere, quod manu artéve tale effictũ est: sed ex figura deprehẽditur. Assumẽdum autẽ quod sponte naturæ rotundum est, bullis turgens, candido propius, & valenter astringens, prætereáque nonnihil palloris cum quadam pinguitudine præ

B seferens: ad hæc calculorum expers ac friabile, & natione Melium aut Ægyptium. Liquidum præfertur maximè pellucẽs, lacteum, planum & æquabile, atq; omni ex parte succosum, insupérque minimè lapidosum, & quẽdam caloris igniculum expirans. Vim habẽt excalfaciendi, astringẽdi, & expurgãdi quę pu-

C pillis oculorũ caligine offendũt, palpebrarum quoq; carnes aliásq; excrescentias absumendi. Sciffile porrò efficacius rotundo censendũ est. Vruntur verò torrentúrq;, chalcitidis modo. Vlcerũ putrescẽtia compescunt, & sanguinis eruptiones inhibẽt, gingiuas humore nimio flaccidas comprimunt, mobiléſq; den-

D tes cũ aceto aut melle firmant. Oris vlceribus, quas aphthas vocant, ammixto melle prosunt, itémque papulis & aurium fluxionibus, cũ polygoni succo. Lepris conueniunt cũ brassicæ foliis aut melle cocta: necnon & pruritui, vnguium scabritijs, pterygijs & pernionibus, fotu ex aqua. Valent cum aceti fæce & gallæ

E crematæ pari pondere ad phagedẽnas vlcerum, & ad nomas cum salis duplo. Furfures cum eruo & liquida pice illita exterũt. Ad lendes, pediculos & ambusta cum aqua inuncta auxilio sunt. Contra œdemata & graue alarum inguinúmq; virus illinuntur: Ex Melo autẽ aduectum,

F etiam mulieribus præstat ne concipiant, ante coitum ori vuluæ inditum: fœtus quoque pellit. Aluminũ deniq; genera gingiuis excrescentibus, vuæ ac tõsillis accommodantur: itémque ori, auribus ac verendis cum melle illinuntur.

De Sulphure. Cap. CXXIIII.

SVLPHVR optimũ existimatur,

G tur, quod viuũ ignémve minimè expertum est, & spẽdido colore nitet, translucens & calculorum expers. In genere autem sulphuris ignem experti probatur, quod viret

Ald. πεφθὸν
Addit Lac. ex v. cod. καὶ σπόγγοις ἐπιτιθέμενον πλατὺ πάσῃ νόσῳ θερμασίας σημαίνει, ὅ τὶ ἀεφθὲς χλιαρὸν liquidum alumen est, quod Placitus nomine ex Philadelphia adfert, quóque lanarum infectores vtuntur.
Al. ἀνθιστάμενον

Deest ὑγρᾷ in vulg. exempl. sed addit Lac. ex vet. cod.

Lac. sic legit in vet. cod. ἀδ δὲ Μηλία ἡ σὺν ὑγιεινῷ ἐμβαλοῦσα τῷ στόματι τῆς ὑστέρας πρὸ τῆς συνόδου πεσσὸν ἐκβάλλει. hoc est, Melũ ad mẽses eliciendos valet, præstatq; mulieribus ne cõcipiant, appositũ ante cõgressum, cum lana. Goup. vet. libri add. καὶ σμύρνα, quod Hermolaus expressit & Myrrha.

ac præpingue ſpectatur. Plurimum in Melo & Lipara gignitur. Priore loco commemoratum ſulphur, calfacit, diſcutit & maturat celeriter. Tuſſientibus, purulenta excreantibus & ſuſpiriioſis prodeſt, tum in ouo ſumptum, tum etiam ſuffitum: præterea partus vſti nidore extrahit. Lepras itémque lichenas & ſcabros vngues aufert, cum terebinthi reſina. Ex aceto autem illitum, eſt quidem ad lepras efficax, ſed & vitiligines tollit. Scorpionum etiam ictibus addita reſina medetur. Cum aceto verò, draconis marini & ſcorpionum ictus ſanat. Pruritus totius corporis ſedat, nitro miſtum & affrictum. Regium quoque morbum emendat, inſperſum fronti cochlearis menſura, aut in ſorbili ouo ſumptum. Facit & ad grauedinem ac deſtillationes: ſudores quoque conſperſum inhibet: podagricis cum aqua & nitro illitum conducit: grauitatē auditus, ſuffiti nidore raptum per fiſtulam hauſto, ſanat. Lethargicos ſuffitu excitat. Sanguinis eruptionem ſiſtit: ac deniq; contuſis auribus cum vino & melle illitum medetur.

Α τε καὶ βύλιτος. γίνεται δὲ πλεῖστον ἐν Μήλῳ καὶ Λιπάρᾳ. δραμεῖν δ' ὃ πρόσθεν θερμαντικόν τε καὶ διαφορητικὸν καὶ πεπαίνει ταχέως. βῆχάς τε καὶ ἐμπύους καὶ ἀθμαλίκους ὠφελεῖ ἐν ᾠῷ λαμβανόμενον καὶ ὑποθυμιώμενον· πρὸς δὲ τοὺς τοκετοὺς ἔμβρυα καπνοῦ ὑποθυμιαθέν· καὶ λέπρας, ἔπι δὲ λειχῆνας καὶ ὄνυχας λεπρούς αἴρει, πρόσθεν μιχθὲν ῥητίνῃ σὺν ὄξει δὲ καταχριόμενον, ποιεῖ μὲ καὶ πρὸς λέπρας· αἴρει δὲ καὶ ἀλφούς. ἰᾶται καὶ σκορπίων πληγάς, μιχθὲ ῥητίνῃ· σὺν ὄξει δὲ, καὶ δ' ἐχενηΐδιον θαλάσσιον καὶ σκορπίων πληγὰς ἰᾶται. παύει καὶ τὸν καθ' ὅλον τὸ σῶμα κνησμούς, ξὺν νίτρῳ σμηχόμενον· ἀποκαθαίρει δὲ καὶ ἕκτερον, κοχλιαρίου πλῆθος ἐπιπασσόμενον τῷ μετώπῳ, ἢ μετὰ ὠοῦ ῥοφητοῦ λαμβανόμενον. καὶ τοὺς κόρυζας δὲ καὶ καταῤῥοους παύει· καὶ ἱδρῶτας στέλλει καταπασσόμενον· καὶ ποδαγρικοῖς ξὺν νίτρῳ καὶ ὕδατι καταχριστὸν συμβάλλεται· καὶ δυσηκοίας ὑποθυμιώμενον δι' σίφωνος διαπνεῖ· καὶ λιθαργικοὺς, ὑποθυμιώμενον· αἱμορραγίας τε ἴσχει. πλέοσί τε ὠῶν σὺν οἴνῳ καὶ μέλιτι καταχριόμενον ἰᾶται.

Add. ex Marcell. quod expressit Marcellus.

De Pumice. Cap. CXXV.

PVMICIS probatio, vt ſit quàm maximè leuis, multicauus ſeu ſpongioſus, ſciſſilis ac minimè lapidoſus, inſupérque teri facilis atque candidus. Cremari autem oportet in hûc modum: Sumito eius quantum libuerit, & prunis candentibus obruito: ac vbi igne flagrauerit, extractum vino odorato reſtinguito: iterúmque incenſum pariter extinguito. Tertia vſtione exemptum finito perſe refrigerari, tandémq; ad vſus condito. Vis eius aſtringere & gingiuas abſtergere: purgat cum calfactione quæ pupillis caliginem offundunt: explet vlcera & ad cicatricem perducit, inſupérque excreſcentia cohibet. Fit & è farina eius dentifricium. Corpori denique cruſtam obducit, éſtque pilis abolendis aptus. Theophraſtus autor eſt, ſi quis in feruentis muſti cadum pumicē immiſerit, vini feruorem confeſtim deſinere.

Πεὶ Κισήρεως. Κεφ. ρκέ.

ΚΙΣΗΡΙΝ δὲ τὸν κεκριτὸν τὸν ἄγαν κοῦφόν τε καὶ πολύκενον, ὁποῖόν τε καὶ ἅλιζον, ἔπι δὲ ψαμμῶδές τι καὶ λευκόν. καυστέον δὲ οὕτω· λαβὼν αὐτῆς ὁπόσον αὐθέλῃς, διαπύροις ἐγκρύψας ἀνθράξιν· ὡς δ' ἂν ἐκπυρωθῇ, αἰειλόμενος σβέσον οἴνῳ βύωδει· καὶ πάλιν πυρώσας σβέσον. τὸ δὲ τέταρτον αἰειλόμενος αὐτὴν, καθ' ἑαυτὴν ἐᾶν ψυχθῆναι, καὶ ἀποθέμενος χρῶ. Δύναμιν δ' ἔχει συστατικήν τε καὶ σμηκτικὴν ἅμα, ἀποκαθαρτικὴν τῶν ἐπισκοτούντων τοῖς κόραις μετὰ τῆς διαφορήσεως· ἑλκῶν τε σπληρωτικὴν καὶ καταυλωτικήν· ἔπι δὲ καὶ καταφαλλιτικὴν· ἐπέχει δὲ καὶ σηπεδονικὴν ὀδόντων λύσιν· καὶ ἐξαρθρωτικὴν σώματος· καὶ εἰς φλεγμονὰς τειχῶν ἐπιτήδειον. Θεόφραστος δὲ ἱστορεῖ, ἐὰν εἰς ζέουσάν τις αὐτοῦ πίθον καθῇ κίονα, παύεσθαι τὸ ζέσαν τοῦ οἴνου.

V. addit. ξὺν ὕδατι quod expressit Marcellus.

V. καὶ ἀνωτικὴν. al. ἀνατικὴν.

V. καὶ ὃ τρίτον δ' ἐκπυρώσει ἐκ ψυχόμενον.

Lacuna addit ex vet. cod. ἡ δὲ λίτραν.

In quibusdā codicib. teste Marcello, ista desinunt ad caput vſque calcem.

Περὶ Ἁλῶν. Κεφ. ρκϛ'. A

De Sale. Cap. CXXVI.

ΤΩΝ δὲ ἁλῶν εὐεργέστερον μέν ἐστι τὸ ὀρυκτόν. τούτου δὲ καθ' αὑτὸ μὲν τὸ ἅλιθον καὶ λευκὸν καὶ διαφανές, πυκνόν τε καὶ ὁμαλὲς τῇ συγκρίσει· ἰδίως δὲ τὸ Ἀμμωνιακὸν τῷ ἠλῷ, εὐχροόν τε καὶ εὐθρύπτου τοῦ διαφύσεις ἔχον. τοῦ δὲ θαλασσίου τὸ πυκνὸν καὶ παχὺ καὶ λευκὸν καὶ ὁμαλές. B κάλλιστον δὲ ἐν Κύπρῳ καὶ Κύπρου τῇ Σαλαμῖνι γένει καὶ Μεγάροις, καὶ ἐν Σικελίᾳ καὶ Λιβύῃ. ἐν δὲ τοῖς λεγομένοις δὲ, καὶ τὸ λιμναῖον προέχριτον. ὑπερέχειν δέ αὐτῶν ἐστι τὸ Φρύγιον, καλούμενον ὑπὸ Τατ-τῶν. Δυνάμεις δὲ ἔχουσιν ἅπασι περιπλησίους ἅλες κοινῶς πολύχρηστον, συστατικόν C τε καὶ σμηκτικὸν, καὶ ἀπόκαθαρτικὸν καὶ διαφορητικὸν, ἔτι δὲ καταπλαστικὸν καὶ ἐκκωϊστικὸν, καὶ ἐκκαρωτικὸν, τῷ μᾶλλον καὶ ἧττον διαφέρειν. εἰσὶ δὲ καὶ σπυδόντων ἐφεκτικοί. καὶ σμήχεσι φωριασῶν μίγνυται. γίλωσι καὶ τοῖς ἐν ὀφθαλμοῖς ὑπερσαρκίαις, καὶ πτερύγια τέμνουσι, καὶ τοῖς ἄλλαις D σαρκὸς ἐξοχαῖς αἴρουσι· καὶ κλυσμοῖς εὐθέως· καὶ κόπου λυτήριοι, σὺν ἐλαίῳ χριόμενοι καὶ πρὸς τοῖς ὁμαλοῖς τῶν ὑδρωπικῶν. πυέσι τε καὶ διὰ αὐτῶν ἐν σακκίοις, περιωδυνίαν ἀλγημάτων. καὶ κεντρισμοῖς δὲ παύουσι μετ' ἐλαίου καὶ ὄξους συγχριόμενοι πρὸς πυέλ, ἄχρις οὗ ἱδρώσωσιν. ὁμοίως δὲ λιχῆνας ἐν ψώρας ἐν λέπρας. συναγωγοῖς τε κυφίζουσι, σὺν μέλιτι ἐν ὄξει καὶ ἐλαίῳ διαχριόμενοι. πρὸς δὲ πρίαδμα ἐν κιρσίδας, σὺν μέλιτι ὀπτοί. καὶ ἄφθας καὶ ἕλκων πλάσεσι, καὶ πρὸς φαγεδαίνας σὺν διφίτῳ κεκαυμένοι "* κατα-πλάσσουσι. πρὸς δὲ σκορπίων πληγὰς, F σὺν λιβανωτίρμῳ· πρὸς δὲ ἐχεων δήγματα, σὺν ὀριγάνῳ καὶ μέλιτι καὶ ὑσσώπῳ· πρὸς δὲ κεφάλου, μετὰ πίσσης ἢ κεδρίας ἢ μέλιτος· πρὸς δὲ σκολοπένδρας δῆγμα, σὺν μέλιτι ἐν ὄξει· πρὸς δὲ σφηκῶν πληγὰς καὶ *τιπ-πόνων, ἐν πρὸς ψυδράκια καὶ ἐν κεφαλῇ, θύμους τε ἐν φύματα, σὺν σταφίδι ἢ σταφυλῇ ἢ μέλιτι, δοθιῆνας διαφορῆσαι. καὶ ὄρχεων οἰδήμα- G τα σὺν ὀριγάνῳ ἐν ζύμῃ θαλλοῦ πεπαίνουσι.

Vulg. exiret.

Com. κατασπῶσιν

Vulg. δοθίνας

INTER Salis genera efficaciſſimum foſſile. Et in hoc ipſo genere cõmuniter quidẽ laudatur calculis vacãs, candidum & pellucidum, dẽſum & æquabili compage: peculiariter verò natione Ammoniacũ, quod quidẽ & findi facilè poteſt, & rectis eſt ſciſſuris. In marino ſale eligendus eſt denſus, candidus & æquabilis. Probatiſſimus in Cypro ſit & Salamine Cypri & Megaris, itémq; in Sicilia & Africa. Sed inter hæc ipſa ſalis genera lacuſtris præfertur: cẽſetúrq; validiſſimus Phrygius, qui Tattæus vocatur. Antedictorum ſalis generũ natura in communi eſt ad multa per quã vtilis, aſtringens, abſtergẽs, repurgans, diſſoluẽs diſſipánſve, ac inſuper reprimens, extenuãs & cruſtas inducẽs: ſed intenſioris remiſſioriſque facultatis ratione inter ſe differũt. Quin & vlcera putreſcentia cohibent, & ſmegmatis ſeu medicamentis pſoras abſtergentibus ammiſcẽtur. Excreſcentia in oculis reprimunt, pterygia cõſumunt, cæteráſque carnis extuberationes tollunt: clyſteribus vtiliter infundũtur: laſſitudines etiã diſcutiunt, ex oleo illita. Contra hydropicorum œdemata auxiliantur, doloréſq; ſacculis indita fotu mitigant, & pruritus ſedãt ex oleo & aceto infricata ad ignem, dum ſudor prouocetur. Similiter & lichenas, pſoras ac lepras. Anginas ex melle, aceto & oleo inunctione leuãt. Toſta tonſillis vuæq; cum melle adhibentur. Cremata verò, vlceribus oris quas aphthas vocant, humidis gingiuarũ vitiis & phagedænis vlcerum cum polenta inſperguntur. Aduerſus ſcorpionum ictus, cum lini ſemine: cõtra viperarum morſus, cum origano, melle & hyſſopo: aduerſus ceraſten, cum pice, aut cedria, aut melle auxiliantur. Contra ſcolopendræ verò morſus, ex melle & aceto: aduerſus veſparum ictus & tenthredinum, itémque ad capitis pſydracia, thymos atque tubercula, ſeuo excepta vitulino. Furunculos cum vua paſſa aut ſuillo adipe aut melle diſcutiunt. Teſtium tumores cum origano & fermento citiùs maturant.

vel à putrefacere vindicãs

Crocodilorum morsibus auxiliantur trita, in linteolo inuoluta & in acetú intincta, fasciis insuper additis quibus partes affectæ constringantur. Prosunt & ad virulentarum bestiarú morsus & sugillata faciei, cum melle. Contra haustum opium & fungos cum aceto mulso bibuntur. Luxatis cum farina & melle imponuntur. Ambustis igni cum oleo imposita, pustulas erumpere nõ
Pl. sepiunt patiuntur. Podagricis itidem adhibentur, & aurium doloribus cum aceto. Erysipelata & vlcera quæ serpunt cum aceto illita, aut cum hyssopo imposita cohibent. Vri porrò
fortè absp. salem oportet fictili diligenter operculato ne dissiliat, conditóque prunis, vsquedum igni candefiat. Aliqui fossilem subacta farina oblitum carbonibus subijciunt, ibique tandiu sinunt, dum illa exusta fuerit. Sed & sal communis vri hoc modo potest: aqua semel ablutum ac deinde siccatum in ollam mitto, obditóque operculo ignem succendito, tandémque salem moueto, donec haud ampliùs exiliat.

A καὶ χροοδιλοδήκτοις βοηθοῦσιν, ὲν δὲ ὀθονίοις λῖτοι, καὶ βαπτόμενοι εἰς ὄξος, ἐπιφορήμασι τῶν μαρῶν ἕλκεσι τοῖς ἐν δίσμοις. θηριοδήκτοις τε βοηθοῦσι, καὶ πρὸς ὑπόπια προσώπου σὺν μέλιτι· καὶ πρὸς ὀπισθοτόνους πόσει, καὶ πρὸς μυκήσεις σὺν ὀξυμέλι πιτύρωσι· πρὸς ὀφθαλμίας τρίμμασι, σὺν ὀξυμέλι καὶ
B μέλιτι· πρὸς πυρίκαυστα ὀφθαλμῶν σὺν ἔλαίῳ ἐπιτιθέασιν, ὡς ἐκλοι φλυκταινῶδες. ποδαγρικοῖς τε ὁμοίως ἐπιτίθεται, πρὸς αὐτομόλους τε σὺν ὄξει ἐρεσιπελατά τε καὶ ἕρπητας ἱέρεσι μετ' ὄξους καταχριόμενοι, ἢ καταπλασθέντες σὺν ὑσσώπῳ. καυσίον δὲ αὐλοὺς εἰς ὀστράκινον ἀλιξον ἐμβαλόντας καὶ ἐπιμελῶς πω-
C μάξαντας, ἵνα μὴ ἐξαγῶ, αἰθραχιᾶ τε ἐξηρύσαντας ἄλας ἐκ πυράσεως. τινὲς δὲ τοὺς ὀρυκτοὺς καλοῦσι περιπλασταίους, εἰς αἰθραχας ὑποβάλλοντες ἑῶσιν, ἄλας αὖ τὸ φῶς καταχαῆ. ἔνιοι δὲ τοὺς κοινοὺς ἁλας ἅπαξ τοῦ ἔτους καίειν. ἀποκλύσας αὐτοὺς ἅπαξ ὕδατι, καὶ ἑώσας ξηρανθῆναι, ἐμβαλὼν εἰς χύ-
D τραν, καὶ πωμάσας ὑπέκαιε, κινῶν ἕως αὖ μηκέτι ἅλλωται.

Marcellus πυρώμενον ex Plinio legendum suspicatur.

Malim, εἰσίτω

De Spuma salis, seu spuma maris arida. Cap. CXXVII.

Spuma maris arida, ramentum purgamentúmve maris spumosum est, quod in exilibus petris reperitur. Ei vis eadem quæ sali.

Περὶ Ἀχνὸς ἁλός. Κεφ. ρκζ.

Ἁλὸς ἄχνη ἐπίκλυσμά ἐστιν ἁλὸς ἀφρώδες, θρυπτόμενον ἐπὶ τῶν πετρῶν. Δύναμιν δὲ ἔχει τὴν αὐτὴν τῆς ἁλός.

De Muria, seu Salsugine. Cap. CXXVIII.

Muria salis effectus præbet; abstergítque: dysentericis vtiliter infunditur, quorum intestina nome corripuit: itémque ischiadicis iam
Pl. vetustis diuturno dolore vexatis. Fotu verò aquæ marinæ vicem pensat.

Περὶ Ἁλμης. Κεφ. ρκη.

E Ἁλμη τὴν αὐτὴν τοῖς ἁλσὶν ἔχει ἐνέργειαν, σμηκτικὴν δυσεντερικοῖς τε ἐπὶ τοῖς κῶλοις ἔγκλυσμα, καὶ ἰσχιαδικοῖς χρήσιμον. πρός τε καταψύλους ἁρμόζει· ὧν θαλάττια ἐστὶ χρησίμωτερα.

De flore Salis. Cap. CXXIX.

Flos Salis è Nilo quidé flumine defluit, sed & stagnis quibusdá innatat. Assumendus qui croci coloré imitatur, & odore quodámodo est ingratiore, veluti garũ: interdũ etiá magis graueolés, gustu mordaciore ac subpinguis. Fucatus autẽ rubrica aut grumosus, improbatur. Præterea verus ac sincerus nõ nisi oleo resoluitur: adulteratus, nõnulla ex parte etiam aqua diluitur. Ad vlcera quæ cacoëthe, quasi maligna, vocãt, phagedænas, genitalíú nomas & purulẽtas aures efficax est. Oculorú hebetudi-

Περὶ Ἄνθους ἁλός. Κεφ. ρκθ.

F Ἁλὸς ὁ ἄνθος καταῤῥεῖ μὲν ὑπὸ Νείλου πλαμῶν (φύεται) δὲ λίμναις ποτὲ. πεφάλαι πλέον δὲ τὸ κροκίζον τῇ χρόᾳ· ὑπανθοῦσι δὲ ἧσσον χάρος. ἔνιοτε δὲ καὶ δυσωδέστερον μᾶλλον δὲ τῇ γεύσει δηκτικώτερον καὶ ὑπολιπαρόν. δεῖ δὲ ἐμμελῆ τὴν θερμότητα ἔχειν, φαῦλον ὑπῆλιον. ἔτι τὸ ἀκίραστον ἔλαίῳ συναιρέσεως μέτον. δεῖ δὲ διαλελυμένον δὶς, ἓν μέρος
G καὶ ὕδατος. Τοῖς δὲ πρὸς τὰ κακοήθη καὶ φαγεδαινικὰ ἕλκη, καὶ νομὰς τὰς ἐν αὐτοῖς, καὶ ὦτα πυορροοῦντα· καὶ ἀμβλυωπίας

Galter. ἀλιπάστου, vt legit Hermolaus.

Ald. ἐμμελῆ τὴν

καὶ τοὺς οὐλὰς αἴρει καὶ λευκώματα. μίγνυται καὶ ἐμπλάστροις ἐπὶ μύρσις εἰς χρῶσιν, ὡς καὶ τὸ ῥοδινον· ἔστι δὲ καὶ ἰδρώτων κινητικὸν· κωλίας παραλυθέν, σὺν οἴνῳ καὶ ὕδατι λαφθέν· κακοστόμαχοι. μίγνυται καὶ ἀκόποις, καὶ σμήγμασι πρὸς τετρῶσι λεπτυσμὸν· καὶ καθόλου ὄξει δριμεῖ, πυρωτικόν, ὥσπερ οἱ ἅλες.

Vulg. exempl. ἀνακόμοις.

A nes, cicatrices albuginésque tollit. Emplastris vnguentisq; coloris gratia miscetur, vti & rosaceo. Sudorē quoque ciet: aluum turbat in vino & aqua sumptus, stomachóque est inutilis. Additur & acopis, & smegmatis quæ extenuandorū pilorum gratia componuntur: ac in vniuersum acris est atque igneę feruentisque naturæ, vti sal.

Plinius lib.

B

Περὶ Νίτρου. Κεφ. ρλ'.

De Nitro. Cap. CXXX.

Νίτρον κεχριτόν ὃ καὶ ῥοδωπὸν ἢ λευκὸν πλὴν χρόᾳ, καταπεπτημένον, οἱονεὶ σπογγώδες τι. ζιοῦσιν δὲ ὄξει τὸ ἐκ τῶν Κουνείων. Δύναμιν ἔχει μετασυγκριτικήν.

Oribasius.

Νitrum præfertur leue & roseo colore aut candido, perforatum, perinde quasi spongiosum fistulosúmve quiddam. Tale verò est, quod è collibus tumulisve affertur. Vim habet humores ex alto euocandi.

Plinius lib.

C

Περὶ Ἀφροῦ νίτρου. Κεφ. ρλά.

De Spuma nitri. Cap. CXXXI.

Ἀφρὸς δὲ νίτρου, ἄριστος μὲν εἶναι δοκεῖ ὁ κυφόπαλος καὶ πλακώδης, εὔθρυπτός τε καὶ ἐμπόρφυρος, ἢ ἀφρώδης, ἔπειτα δὲ δακτυλιώδης· οἷος ἐστὶν ὁ ἐκ Φιλαδελφίας κομιζόμενος τῆς ἐν Λυδίᾳ. δευτερεύει δὲ ὁ Αἰγύπτιος. γίνεται δὲ καὶ ἐν Μαγνησίᾳ τῇ Καρίας. Δύναμιν ἔχει καυστικὴν σύν τε τῷ νίτρῳ καὶ ἰδίᾳ· ἐκ περιουσίου δὲ τοῦ νίτρου ἐμφερῆ. ἐκ περιουσίου δὲ τὸ νίτρον καὶ τρόφους παύει λαυθὲν μετὰ κυμίνου καὶ πολὺ μᾶλλον ὑδρομέλιτος, ἢ μετὰ ἑψήματος, ἢ πρὸς τὴν διαφορὰν δυναμένων πνεύματα, οἷς πηγάνου ἢ ἀνήθου. ἔστι δὲ καὶ περιοδικῶν σύγχρισμα πρὸ τῆς παροξυσμοῦ. μίγνυται καὶ διαφορητικαῖς καὶ ἐπισπαστικαῖς καὶ λεπρικαῖς ἐμπλάστροις, καὶ λεπτυντικαῖς. σὺν ὕδατι δὲ θερμῷ ἢ οἴνῳ ἐγχριόμενον, ἐμπυημάτων τε καὶ ἤχους ὦτων ἰᾶται, καὶ πυορροίας. καθαίρει δὲ καὶ ῥῦπον, σὺν ὄξει ἐγχριόμενον. κυνοδήκτους τε ἰᾶται σὺν σίαλι ἢ οὔρῳ. ἀνασμοῖ δὲ καὶ δυσιλιγγιάσεις, αἷς λαφθὲν τερμινθίνῃ ῥητίνῃ· μετὰ σύκων δὲ, ὑδροπικοῖς ὄξει καταπλασθὲν σὺν μέλιτι δὲ ἐγχριόμενον, ὀξυδερκίας τε πρὸς μύκησιν σὺν ὀξυκράτῳ πολὺν ἀμαυροῖ· πρὸς δὲ βουπρήστας, σὺν ὕδατι· πρὸς ταῦρον δὲ αἱμαίνοντα σὺν σιλφίῳ· ἀπορροῦντά τε χρήσιμον καταπλασθέν· παραλυτικοῖς τε ὀπισθοτονικοῖς παλαιοῖς σὺν κηρωτῇ, καὶ τρέμουσι μίγνυται καὶ ἄρτῳ ὠφελίμως ἐπὶ τὴν γλῶτταν παραλελυμένην.

Manhioli codex, αἰγίλῳ, & prius.

Lac. legit in vet. cod τρίμασι τε καὶ τρεμουσίοις καὶ ἰσχιάσι &c. ita quos tremor aut torminosus dolor infestant.

D

E

F

G

Spuma nitri, optima censetur leuissima, crustosa, friabilis, colore penè purpureo & spumosa, insuperq; mordens, qualis ex Philadelphia Lydiæ defertur. Secundas tenet Ægyptia. Quin & in Magnesia Cariæ gignitur. Sali parem vim & vstionē hæc habet, æquè ac nitrum ipsum. Sed hoc ampliùs etiam torminа sedat, si cum cumino tritum bibatur in hydromelite, aut decocto aliquo eorum quæ flatus discutiendi vi prædita sunt, vti rutæ vel anethi. In febribus circuitu redeuntibus illinitur ante suspectam accessionem. Miscetur & emplastris discutientibus, extrahētibus, extenuantibus & lepras exterentibus. Cum aqua autem calida aut vino infusum, auriū inflationes ac sonitus, easdémque purulētas sanat. Sordes etiam eiusdem partis expurgat, cum aceto instillatum. Canum morsibus ex asinino adipe aut suillo medetur. Resina exceptum terebinthina furunculos aperit. Tusum cum ficubus, hydropicis illinitur: & cum melle inunctum, claritatem visus adiuuat. Succurrit venenis fungorū, ex posca potum: bupresticū vero, ex aqua: iis qui sanguinem tauri biberint ex silphio datur: atrophis, hoc est, cibū non sentiētibus, adhibitū prodest, & opisthotonis iam remissionibus cū cerato, itémq; luxatis: in paralysi linguæ pani vtiliter permiscetur.

Plinius, qui sacrum id silphium.

Aliqui ſupradicta ignitis indita carbonibus vrunt, ſubiecta prius teſtâ noua, donec incanduerint.

De Face. Cap. CXXXII.

ELIGENDA Fæx maximè à vino vetere Italico: ſin minùs, ab alio conſimili. Nam aceti fęx intenſioribus eſt prædita viribus. Crematur vt alcyonium, antè diligenter exiccata. Sunt qui teſtæ nouæ inditam igni largo vrant, vſquedum altiùs tota incanduerit. Alij ignitis carbonibus fæcis glebam obruunt, & ſimiliter faciunt. Experimentum eſt legitimè vſtæ, vt candido aut aërio colore cóſpiciatur, & linguam tactu vrere videatur. Eadem vrendæ fæcis aceti ratio. Vim porrò fæx habet ſupramodum vrendi, detergendi, cicatricem inducendi, aſtringendi, & vehementer exedendi ſiccandíque. Sed recenti vtendum eſt, quoniam celeriter expirat & exanimatur: proinde non niſi tecta & vaſe aliquo condita incluſáve reponi debet. Lauatur eadem, vti pompholyx. Quæ vſtionem experta non eſt, œdemata per ſe & cum myrto cohibet: ventris ſtomachíque rheumatiſmos adhibita ſiſtit: muliebre profluuiũ abdomini & verendis impoſita mitigat: panos nondum exulceratos, itémque tubercula diſcutit. Turgétes mammas ſuíque lactis impatientes cum aceto perũcta extinguit. Cremata verò, ſcabros vngues cum reſina aufert: addito lentiſcino oleo illita nocte tota, flauum reddit capillũ. Lota oculorum medicamentis, vti ſpodium, miſcetur: & talis etiã eorundem cicatrices atque caligines abſtergit.

De Calce viua. Cap. CXXXIII.

CALX viua hoc modo fit: Marinorum buccinorum teſtas igni condito, aut ardéti clibano per noctem immittito. Poſtera die ſi candidiſſimæ fuerint, eximito. Sin minùs, iterum vrito, vſquedum vehemẽter inalbuerint. Dein vbi in frigidã leuiter eas immerſeris, ollę nuę indito, & exactè pannis operiẽs, noctem vnam conquieſcere ſinito.

Α ἔνιοι δὲ καίουσι τὰ ὀστρακόδερμα, ἐπ' ἀνθράκων πεπυρωμένους ἀπερισκάμμοι, ὀστοῦν παχέως πίνου χηνὸς ὑστράκου, ἕως ἂν ἐκπυρωθῇ.

Περὶ Τρυγός. Κεφ. ρλϐ'.

ΤΡΥΓΑ ὁ τῶν ἁλιπλέον μάλιστα λαμπτηρίων ἀπὸ οἴνου παλαιοῦ Γαλατικοῦ· εἰ Β δὲ μὴ, ἀπὸ ἄλλου ὁμοίου. ἡ γὰρ ἀπὸ ὄξους, ὀλιγίστην τὴν δύναμιν καυστικὸν ἔχει· ὡς δὲ μὴ κυνόδοντι παραπλήσιον ὀπτιμέλως. λυτὰς δὲ ἐπ' ὀστράκων χηνείων ἕψουσι καίοντες πυρὶ δαφνίνῳ, ἕως ἂν ἐμπυρωθῇ καὶ βάθος. οἱ δὲ εἰς ἄνθρακας πεπυρωμένους ἐγχρύψαντες βάλλουσι, τὸ ὅμοιον ποιοῦσι. σημεῖον δὲ τῆς δεούσης καύσεως ἡ πτίσις, τὸ λευκὸν C ἢ ἀεροειδὲς τοῦ χρώματος. καὶ τὸ στόμα ἐπιθιῶσθαι τῇ γλώσσῃ οἱονεὶ φλέγεσθαι αὐτήν. ὡσαύτως δὲ καὶ ἡ ἀπὸ ὄξους καίεται. Δύναμιν δὲ ἔχει καυστικὴν σφοδρὰν, καὶ σηπεδονικὴν, καὶ πυλωδικὴν, συμπικτικὴν, ἐπουλωτικὴν ἄγαν καὶ ξηραντικωτάτην. χρηστέον δὲ D τῇ πυκνῇ στρογγύλῃ ὄσῃ· ταχὺ γὰρ ἀφανίζεται· ὅθεν οὐδὲ ἀσκέπαστον, οὐδὲ χωρὶς ἀγγείου αὐτικὰ ἀποθετέον. πλυνὲν δὲ αὐτὴν, ὡς πομφόλυξ. ἡ δὲ ἄκαυστος, γέλλα οἰδήματα καὶ καθ' ἑαυτὴν καὶ μετὰ μυρσίνης· κοιλίας τε καὶ στόμα χορηγεῖται ξόμενον καὶ παλαιούσας ἕλκη· ἐρωῶν γυναικεῖον κατ' ἔτος καὶ αἰδοίου καταπλασθὲν E μένη, παραυτίκα· καὶ φύγεθλα δυσχεῖα διαφορὰς καὶ φύματα· μαστοὺς τε ἀναφλεγμαίνοντας ῥέοντας γάλακτος σβέννυσι, σὺν ὄξει καταχρισθεῖσα. ἡ δὲ κεκαυμένη, λεπτοῖς ἀφίστησιν ὄνυχας σὺν ῥητίνῃ· καὶ μετὰ χυμοῦ ἐλαίου συγχρισθεῖσα τύλους ὅλους, ξαυθὰς ποιεῖ τοὺς τρίχας. πλυθεῖσα δὲ μίγνυται εἰς τὰ ὀφθαλμικὰ, ὡς κονδύς· σμήχει τε οὐλὰς καὶ ἀχλῦς τοὺς ἐν ὀφθαλμοῖς ἡ τοιαύτη.

Περὶ Ἀσβέστου. Κεφ. ρλγ'.

ΑΣΒΕΣΤΟΣ γίνεται οὕτως· τὰ θαλαττίων κηρίκων τὰ ὄστρακα λαβὼν, πυρὶ ἔγκρυψον, ἢ εἰς κλίβανον σκάπυρον καθεὶς ἄφες ἑνὸς κατρεῦσαι· τῇ δὲ ἐχομένῃ, ἐὰν μὲν G λευκοπάτη γένηται, αἴρελου· εἰ δὲ μὴ, πάλιν ἐμβαλὼν αὖ ἰσχυρῶς λευκανῇ. εἶτα ἀποβάλλας αὐτὰ εἰς ψυχρὸν ὕδωρ, ἔμβαλε εἰς χύτραν χηνεὶν, καὶ σκεπάσας αὐτὰ ῥάκεσιν ὀπτιμέλως, ἕασον οὕτω θᾶττον μίαν·

πωφὶ δὲ αἰελόμβιος ἀπυληφῶν ὃ πρωτελὲς τῆς κατεργασίας, ἀπλῶς σο. σκυβάζεται δὲ καὶ ἐκ λίθων κοχλάκων καμπύλων, καὶ ἐκ τῆς χυδαίας μαρμάρου, ἣ χρῆται πρὸς τἄλλα. Δύναμιν δὲ ἔχει πᾶσα καπῶς ἀσβέστου πυρωτικὴν, διαπτικὴν, καυστικὴν, ἐσχαρωτικήν. μιγνυμένη δέ πως ἑτέροις, ὡς σταπτὶ ἢ ἐλαίῳ, γίνεται πεπτικὴ, μαλακτικὴ, διαπεδασικὴ, καταυλωτικὴ. ἐνεργεστέραν δὲ αὐτῆς ἡγητέον τὴν πρόσφατον καὶ ἄβροχον.

V. addit ὑγρῷ

Περὶ Γύψου. Κεφ. ρλδ'.

ΓΥΨΟΣ δύναμιν ἔχει συπτικὴν, ἐμπλαστικὴν αἱμορραγίας τε καὶ ἱδρώτων ἐφεκτικήν. πολεῖται δὲ πίνεται τῷ κυάθῳ ὕδατος.

Περὶ Τέφρας κληματίνης. Κεφ. ρλε'.

ΤΕΦΡΑ κληματίνη δύναμιν ἔχει καυστικὴν· σὺν ὀξυγλίῳ δὲ ἢ ἐλαίῳ καταπλασθεῖσα, θλάσματα νεύρων καὶ ἄρθρων λυγίσματα καὶ συστροφὰς νεύρων ὠφελεῖ σὺν νίτρῳ δὲ καὶ ὄξει, σαρκώσεις ὀφέως σήπει· καταπλασθεῖσα δὲ σὺν ὄξει, ἐρπητόδηκτα καὶ κυνόδηκτα ἰᾶται· ἐσχαρωτικῶς τε μίγνυται. καὶ γίνεται ἡ ἐξ αὐτῆς κονία πρὸς πτώματα, καὶ μύκητας σὺν ὄξει καὶ ἁλσὶ καὶ μέλιτι.

V. μίγνυται

V. εστι.

Περὶ Ἀλκυονίου. Κεφ. ρλς'.

ΤΟΥ δὲ Ἀλκυονίου πέντε γνωρίσματα εἴδη ὑπάρχειν. ὃ μὲν γὰρ πυκνόν ἐστι καὶ σφυρόν, καὶ τῷ ἰδίῳ ἀποζέσαν, ἐπὶ τὸ βρωμῶδες καὶ βαρύ, καὶ ἰχθύος ὄζον, ὁ δὲ πλῆσον ὅτι τῷ ἰοειδεῖ βύρσῃ). ὃ δὲ ἐξῆς κατὰ μὲν τὸ χρῶμα περυσίνῳ ὀφθαλμικῷ ἢ ἀποζέσαν ἔοικε, κοῦφον τέ ἐστι καὶ πολύκενον, καὶ φυκώδη ἀποφορὰν ἔχον. ὃ δὲ τρίτον σπογγικαῖς δίκαι ὑπάρχει ὡς τύπῳ, καὶ τῇ χρόᾳ πορφυρώτερον, ὃ τινες Μιλήσιον καλοῦσι. τὸ τέταρτον τοῖς ἐρίοις αἰσυπηροῖς ὅμοιον, πολύκενον, κοῦφον. ὃ δὲ πέμπτον ἔοικε μὲν κατὰ χρῶμα μύκητι, ἀσπόμου τέ ἐστι καὶ τραχὺ, ἔνδοθεν μὲν κατηρεῖ κατά τι ἔοικος, ἔξωθεν δὲ λεῖον, δριμὺ, ὁ πλεῖστον ἐν τῇ Προποντίδι κατὰ τινὰ καλουμένην Βέσβι-

V. πέμπτον

Orib. addit συλλογιστὶς

Al. βίμβλινον

A Mane calcem perfectoomni opere elaboratam extrahito, atq; recondito. Conficitur & e silicibus calculisve littoreis igne crematis, nec non & è vulgari marmore: & hæc quidem cæteris antefertur. Vis omni calci in commune ignea, mordens, adurens & crustas inducens. Mista tamen alijs quibusdam, vt adipi oleóve, concoquendi, molliendi, dissipandi, discutiendive & vlcera ad cicatricem perducendi vim ascisci. Efficacior porro existimatur quæ recens est, nec aquis aspersa.

B

De Gypso. Cap. CXXXIIII.

GYPSVM vim habet astrictoriã & emplasticam. Sanguinis eruptiones sudoréq; cohibet, sed potum strangulando iugulat.

C

De Sarmentitio cinere. Cap. CXXXV.

SARMENTORVM cinis vrendi vim habet. Cum axungia autem oleóve illitus, neruorum contusionibus, articulorum contorsionibus ac neruorum collectionibus nodísve prodest. Cum nitro & aceto, carnis excrescẽtias in scroto reprimit. Idem serpentium canúmque morsibus illitus ex aceto medetur, atq; etiam crustas obducentibus medicamentis admiscetur. Fit & ex eo lixiuium contra præcipitationes & fungorum venena, cum aceto, sale & melle.

D

E

De Alcyonio. Cap. CXXXVI.

ALCYONII quinque esse genera compertũ est. Vnum enim spissum est, acerbi saporis, spongiosa facie, insupérque viro sum, graue ac piscem olens: quod quidem plurimum in littoribus inuenitur. Alterum oculorum prærygio aut spongiæ simile, leue & multicauum, odore ferè algæ. Tertium vermiculi forma & colore penè purpureũ est: quod Milesium quidam vocant. Quartum succidis velleribus non dissimile, multis inanitatibus hians ac leue. Quintum figura fungi, inodorum, & intus quidem asperum, quodammodo pumicosum, foris vero læue, acre: quod plurimum in Propontide circa insulam Bethy-

F

Pl. addit ad βροῦ

C

cum appellatã gignitur, patrio nomine halos achnen, quaſi maris ſpumam aut lanuginem, vocant. Duo quidem priora in ſmegmata fœminarum aſſumuntur, contra lentigines, lichenas, lepras, vitiligines, nigritias & maculas in facie reliquóque corpore. Tertium verò, iis qui difficili vrina vexantur, aut arenulas in veſica colligunt idoneum eſt: itémque nephriticis, & ad hydropem lieniſque vitia. Vſtum autem & ex vino illitum, alopecias replet. Poſtremum dealbandis dentibus aptum eſt: aſſumitur & in alia ſmegmata pſilothráq;, cum ſale miſtũ. Quòd ſi quis aliquod ex hiſce alcyonij generibus cremare voluerit, addito ſale in crudam ollam mittat, lutóque oblito eius ſpiraculo fornaci mandet: & cùm figlinum percoctum aſſatúmve fuerit, extrahat & ad vſus recondat. Cæterùm lauatur vti cadmia.

Α κονιῶσιν ἀλυτᾶται, ὁ δὲ πτερωτὸς ἁλὸς ἄχνην καλοῦσιν ἔριόν τε μᾶλλον καὶ τὸ θῆλυ, εἰς σπέρματα γυναικῶν, καὶ πρὸς φακοὺς, λειχῆνάς τε καὶ λέπρας, ἀμφορίς τε καὶ μελανίας καὶ αὐλὸς τοῦ ὅλου σώματος. Β δυσουρούντας καὶ ἀμμώδη συλλέγοντας τὴν κύστιν· καὶ πρὸς νεφρικούς, τοὺς ὑδρωπικούς, σπληνώδεις. καὶ ἐν ᾗ κατεπλάσθη σὺν οἴνῳ, ἀλωπεκίας δασύνει. Τὸ δ' ὕστατον, ὀδόντας λευκαίνει δυόμενον. παρεμβάλλεται δὲ καὶ πρὸς ἄλλα σπέρματα ἡ ψίλωθρα, μιγνύμενον σὺν ἁλί. Λέσβιον V. Nicandrum

C καίουσι δέ τινες τοῦτον βουλόμενοι, μετ' ἁλῶν εἰς ὠμὸν χύτραν ἔμβαλε, καὶ περιαλείψας τὸ στόμα αὐτῆς πηλῷ, δὸς εἰς κάμινον· ὅταν δὲ ὀπτηθῇ ὁ κέραμος αὐτῆς, ἀναλέμενος ἀπόδου καὶ χρῶ. πλύνεται δὲ ὡς ἡ καδμεία.

De Adarce. Cap. CXXXVII.

GIGNITVR in Galatia quod Adarces appellatur. Eſt autem tanquam concreta ſaliſilago, quę humidis & paluſtribus locis ſiccitate emergit, & circa arundines gramináve concreſcit, colore flori lapidis Aſij ſimilis, tota verò forma molli, & multiforo alcyonio proxima, vt videri poſſit alcyonium paluſtre. Ad exterendas lepras, maculas à ſolis ardore contractas, lichenas, lentigines, ſimiliáque vitia, accommodatur: & in ſumma vis ei acris. Sed & humores ex alto euocat: quamobrem & iſchiadicis opitulatur.

Περὶ Ἀδάρκου. Κεφ. ρλζ'.

D ΟΑΔΑΡΚΗΣ πρόσαγορευόμενος Ἀδάρκης, γίνεται μὲν ἐν Γαλατίᾳ· ἔστι δὲ ὡς ἁλίπαγος ὑφαλμυζόντων, καθ' ὑγρῶν καὶ τελματωδῶν τόπων ἐν ξηρασίᾳ ἐπιγινόμενος, καὶ περιφυόμενος καλάμοις καὶ χορταίοις. ἔοικε δὲ τὴν χρόαν αὐτῇ Ἀσίας λίθου, τὴν δὲ ὅλην τύπῳ, ἀλκυονίῳ Ε τῷ μαλακῷ καὶ πολυκύτῳ· καὶ ἔστιν οἱονεὶ λιμναῖον ἀγχυόνιον. Εὐθετεῖ δὲ πρὸς ἐκδοραὶ λεπρῶν καὶ ἐφηλίδων καὶ λαχάνων, καὶ φακῶν, καὶ τῶν ὁμοίων. καθέλκει δὲ ἰσχιαδικούς, καὶ μίασμα πριαπικὸν, ὠφελεῖ καὶ ἰσχαδικούς. V. Nicandrum V. Xenocratem

Περὶ Σπόγγων. Κεφ. ρλή.

De Spongijs. Cap. CXXXVIII.

ESPONGIIS alias nonnulli mares appellauêre, quæ tenuibus ſunt F fiſtulis ac ſpiſſæ denſæve, è quibus rurſum duriores tragos nominauerunt: alias verò fœminas, quæ contrario ac antedictæ modo ſe habét. Vruntur autem ſimiliter atque alcyonium. Nouæ recentéſve ac minimè pingues, vulnerariæ ſunt & tumores reprimunt: recentia vulnera ex aqua poſcáve conglutinát: at ex melle cocto, veteres ſinus iungunt. Vetuſtæ autem, inutiles. Sed & ipſæ coëuntia præcluſáve vlcera callóſque diducunt atq; dirimunt,

ΤΩΝ δὲ Σπόγγων οἱ μὲν ἄρρενας ἐκάλεσάν τινες λεπτοτρήτους καὶ πυκνοὺς ὄντας· ὧν τοὺς σκληροτέρους τράγους ὠνόμασαν· οἱ δὲ, θήλεις, οἱ ἐναντίως τοῖς προειρημένοις διακεῖσθαι. καίουσι δ' ἔχουσι τὴν αὐτὴν δύναμιν. ὁ δὲ κενὸς καὶ ἀλιπὴς, γραμμώδης τίς ἐστι καὶ οἱ δύμαλα φίλλει καὶ τὰ νοτίσματα πολλὰ σὺν ὕδατι ἢ G ὀξυκράτῳ· σὺν μέλιτι δὲ ἐφθῷ, παλαιοὺς χάλπους συγκολλᾷ. ὁ δὲ παλαιὸς, ἄχρηστος. διαφθείρει δὲ καὶ μυκτῆρα ἕλκη, καὶ τύλους ἀποδυομένους λίπῃ καὶ αὐτοὶ

ξηρὰ παρενλθήμθοι ὡς αὖθις μόπα. τὰ δὲ ῥευματικὰ ὑπόνομα καὶ χρόνια ἕλκη ξυκμάζουσιν, ὑπτιθήμθοι αἱ κμοι νέοι καὶ κενοί· ἐπιχρίσι δὲ καὶ αἱμορραγίαν. σὺν ὄξει δὲ κεκαυμθοι, τοῖς ξηροφθαλμίας, καὶ ὅπου δεῖ σμῆξαί τι, ἢ γυῖαγ. βέλτιον δὲ ποιοῦσι πλυθέντες εἰς τὰ ὀφθαλμικά. σὺν δὲ πίσῃ καέντες, τοῖς αἱμορραγίαις ἁρμόζουσι. λευκαίνονται δὲ αὐτῶν ἀπαλωτάτοι οἱ τοῖς καύμασι, βρεχόμθοι τῇ ὅτι θᾶ πετρῶν σωισμθῇ ἁλὸς ἄχνη, καὶ ἁλιαζόμθοι· ὑπολεπέτω δὲ ὃ μθ κοῖλον αὐτῶν ἄνω, κάτω δὲ ἢ ἀποτομή. εἰ δὲ εἴη αἰθρία θερία, ἐπὶ τὸ πλὶ σπλήνιον πίπτοντα βρεχόμθοι ἁλὸς ἄχνῃ ἢ θαλάσσῃ χάονται· δὲ λθυκάπαλοι οἱ τοιοῦτοι.

A si aridæ lino alligatæ linamẽtorum modo adigantur: fluxione autem laborantia, cuniculosa seniliáque vlcera, humoris expertes, recentes ac nouæ impositæ, siccant: sanguinis etiam eruptiones cohibẽt. Crematæ ex aceto, lippitudini aridæ auxiliantur: & vbi quid abstergere aut adstringere opus est. Sed vtilius B cinerem lauare in oculorum medicamentis. Earundem cinis cum pice crematarum, profluentẽ sanguinem sistit. Candidæ porro cura fiunt quæ inter eas sunt mollissimę, si per æstiuos ardores salis spuma petris adhærescente tingantur, & insolentur inuersæ: ita vt parte caua sursum spectent, qua verò parte C resectæ fuerint, deorsum. Quod si æstiua sit serenitas, etia ad Lunam sternuntur, spuma salis marináve aqua perfusæ: ac tales candidissimæ euadunt.

Περὶ Κοραλλίου. Κεφ. ρλθ'.

ΤΟ δὲ Κοράλλιον ὅσοι μὲν λιθόδενδρον ἐκάλεσαν, δοκεῖ μθὲν εἶναι φυτὸν θαλάσσιον, γεγονέναι δὲ ἐπὶ τοῦ βυθοῦ ἐλκωθὲν, ἁλὶ γινόμθον, καὶ D βαπτόμθον ὑπὸ τοῦ περιεχομθένου ἡμᾶς ἀέρος. θεωρεῖται δὲ πλεῖστον ἐν τῷ καθ' Συρακούσας ἀκρωτηρίῳ τῷ καλουμθένῳ Παχύνῳ. ἄριστον δέ ἐστι τὸ πυῤῥὸν τῇ χρόᾳ καὶ ἐμφερὲς σανδαρακίνῳ χρώματι, ἢ σανδύκι κατακορεῖ, βύσσοειδές τι ὠσαύτως, καὶ ὁμαλὸν δ' ὅλης τῆς συγκρίσεως, ἔτι δ' ὀσμὴν βρυώδη καὶ φυκίοις ἐμφερῆ ἔχον. τοῖς δὲ ξύλοις παλόζον καὶ κινναμωμίζον τῷ τύπῳ τῷ θαμνίσκων. ὃ δὲ λιθῶδες τῇ συγκρίσει καὶ τῇ χρόᾳ ψωρᾷ, στυπάζομθόν τε καὶ ξηῖνον, φαῦλον οἰηθὲν εἶναι. σὺν ὄξει δὲ τῇ δυνάμει καὶ ψύχει ὑπτείκων. καθαίρει δὲ τὰ ὑπόχολα· καὶ οὐλὰς σμήχει τοῖς ὀφθαλμοῖς· πληροῖ δὲ καὶ χειλάμπια καὶ οὐλὰς ῥῶς τε αἵματος αἰσχρὰς ἡμῶν ἐνέρχει, καὶ δυσουροῦσιν ἁρμόζει. καὶ ἀσθμῶντα πίνει, σὺν ὕδατι πινόμενον.

De Corallio. Cap. CXXXIX.

CORALLIVM, quod aliqui lithodendron appellarũt, marinã esse plantam constat: quæ quidem alto mari exempta, duratur statim atque emergit, quasi à circumfuso nobis aëre lapidescat cõcrescátve. Plurimum inuenitur in promontorio Syracusis imminẽte, cui Pachyno nomen est. Probatissimum rubens, colore sandarachæ aut sandycis saturatæ, nec secus terenti facilè cedens, & æquabili vsquequaque concremẽto, insupérque muscí aut fuci marini odorem referens, & quàm ramosissimum, forma fruticis, cinnamomi æmulum. Quod autem in lapidis duritiam coiit, scabrosum, fistulosum seu cõcauũ, prætereà & inane seu spongiosum, vitiosum existimatur. Astringit & refrigerat mediocriter, excrescentia coërcet, oculorũ cicatrices abstergit, vlcera eorundem caua explet, ac cicatrices extenuat. Contra sanguinis reiectiones excreationésve efficax est, & vrinæ difficultate laborantibus auxiliatur. Quin & potum ex aqua, lienem absumit.

Περὶ Ἀντιπαθοῦς. Κεφ. ρμ'.

Καὶ τὸ καλούμενον δ' ἀντιπαθὲς, κοραλλίου εἶδός ὑπάρχον, εἰδικὴν ἔχον διαφοράν.

De Antipathe. Cap. CXL.

Quod antipathes vocatur, corallium quoque esse censendum est, sed specie tantummodo distãs.

V. ἀπαλώτερα

Mar. & Cor. legunt, αἱμορραγίαν σὺν ὄξει. κεκαυμένοι δὲ

V. caret.

C. ὑπὸ τῶν ἀνέμων καύμασιν.

V. addit, χαλκὸν, βρυώδη

V. addit, ὑφαιματτόμενα,

V. & Drag. capitis calci addunt, οὗτο καὶ φυλακτήριον καὶ πικρὸν κατὰ τῶν ἐπιβουλῶν ἔχει. quasi prætorium amuletũ est, quo mala omnia depellantur & auertantur.

Est autem colore nigro, arboris & ipsum figura, at magis ramosum. Vires supradicti habet.

A ἔστι δὲ τὴν μὲν χρόαν μέλαν, δενδρίζον δὲ καὶ αὐτό, καὶ ὀζώδες μᾶλλον. Δύναμιν δὲ ἔχει τὴν αὐτὴν τοῦ προφερομένου.

De Phrygio lapide. Cap. CXLI.

Περὶ Φρυγίου λίθου. Κεφ. ρμά.

PHRYGIVS lapis, quo infectores in Phrygia vtuntur, à qua etiam nomen accepit, nascitur in Cappadocia. Optimus habetur pallidus, modicè ponderosus, corporis compage minimè solida, & candidis intercurrentibus lineis, vt in cadmia. Vritur autem in hunc modum: Vino optimo perfusum, viuisque carbonibus obrutum follibus assiduè sufflato: ac vbi colore mutato magis fuluus euaserit, extractum eodem vino restinguito. Eadem iterum prunis imponens facito: sed & tertiò ipsum vrito: attamẽ attende ne comminuatur, & in fuliginẽ euanescat. Vim habet crudus vstúsque efficaciter astringendi, insupérq; expurgandi, & crustas quadantenus obducẽdi. Ambustis cum cerato medetur. Cæterùm lauatur, vti cadmia.

Λίθος Φρύγιος, ᾧ οἱ βαφεῖς ἐν Φρυγίᾳ χρῶνται (ὅθεν καὶ ὠνόμασται,) γίνεται ἐν Καππαδοκίᾳ. ἄριστος δ' ἐστὶν ὁ ὠχρὸς καὶ μίσυος βαρύς, σὺν βύτρυος τῇ συγκρίσει τοῦ σώματος, ἔχων ἐν ἀμφότερα λευκὰ, ὡς καὶ ἐν τῇ καδμείᾳ. καίεται δ' ὁ λίθος οὕτως· βρέξας αὐτὸν καλλίστῳ οἴνῳ, ἀμπύροις ἐγχρύσοις αἴθραξι, καὶ ῥίπιζε συνεχῶς. ἐὰν δὲ μεταβάλλῃ τὴν χρόαν μᾶλλον ἐρυθρότερος γιγνόμενος, ἐξελὼν αὐτὸν τοῦ αὐτοῦ οἴνου ψῦξον. καὶ πάλιν εἰς τοὺς ἀνθρακας ἐπιθεὶς ποίει τὰ αὐτά. καὶ τὸ δὲ αὐτὸν ἐκ τρίτου, προσέχων μὴ θρυβῇ καὶ ἀπόσβολωθῇ. Δύναμιν δὲ ἔχει ὁμοίαν τε καὶ καυστικὸς φυσικὴν ἐνεργῶν, ἔτι δὲ καθαρτικὴν καὶ ἐκφορητικὴν ποιῶν, ἰᾶται πρὸς τοῖς μύξαις τε ἰατικὴν οὖσαν χρωτῆς. πλύνεται δὲ, ὡς ἡ καδμεία.

Lac. legit ex ver. cod. ὡς ἐπίπαν ἐν ἀγγείου τῷ χαλκείῳ: quomodo Marcellus etiam videtur legisse.

Ald. ἐνεργῶν

V. caret. Sic v cod. quem & Ruellius videtur secutus: at vulg. exẽpl. καὶ πλυνόμενος

De Asio lapide. Cap. CXLII.

Περὶ Ἀσίου λίθου. Κεφ. ρμβ'.

ASIVS lapis assumi debet pumicis colore, fungosus & leuis, insupérque friabilis, quique fissilibus venis luteis ad imum vsque scindatur. Eius verò flos salsugo est subflaua, summo lapidi insidẽs: tenui quidem compage, attamen colore partim candido, partim pumici simili, ad luteum vergente. Admotus linguæ, aliquantum mordet. Vim habet, tum lapis, tum & ipse flos astrictoriam & leuiter exedentem, ita tamen vt ne erodat. Excepti resina terebinthina aut liquida pice, tubercula discutiunt: sed præstantior efficaciórve flos existimatur. Ex abundanti verò siccatus flos vetera & cicatrici repugnantia vlcera sanat: carnis excrescentias cohibet, fungis similia actetra ferinávе vlcera cum melle repurgat: vlcerum caua explet & expurgat, cum melle: depascẽtiáque cum cerato sistit. Fit ex eo cataplasma podagricis, misto fabæ lomento: & lienosis, ex aceto & viua calce. Prodest iridem flos ex melle phthisicis linctu:

Ἄσιον δὲ λίθον τὸν Θαλληνσιον καλοῦσι χιονώδη τὴν χρόαν, χαῦνόν τε καὶ κοῦφον, ἔτι δὲ εὐθρυβῆ, καὶ ἀμφοτέρας μιλίνας ἔχοντα ἀμφὶ βαθος. ὁ δ' αὐτὸς ἄνθος ἐστὶν ἡ ἐφιζάνουσα ἐπιξυσμὸς ἡμιυεὶς τῇ ἐπιφανείᾳ τῶν λίθων, τῇ μὲν οὐσίᾳ λεπτὴ, τῇ δὲ χρόᾳ ὃ μὲν τι λευκὸν ὅλον, τὸ δὲ ἡμιόσον κισσήρει, ὅτι τὸ μίλινον τεθαμμένον προσαγόμενόν τε τῇ γλώττῃ δάκνει πόρρω. Δύναμιν δὲ ἔχει ἐκπυητικὴν συμπλεκὴν, συμπλεκὴν ἥπιον, ἡ διαφορητικὴν καὶ φυμάτων, τερεβινθίνῃ ἀναλαμβανόμενον ῥητίνῃ ἢ ὑγρᾷ πίσσῃ. ὑπινωτέρων δὲ ὁ ἄνθος ἡγητέον. ἐκ δὲ τούτου ξηραινόμενον, τὰ παλαιὰ καὶ δυσκατούλωτα ἕλκη ἰᾶται· καθαιρεῖ δὲ τὰ ὑπερφυῆ σαρκώματα, καὶ ἀναπληροῖ σὺν μέλιτι τὰ μύκησιν ὅμοια καὶ φαγέδαινα· πληροῖ δὲ καὶ τὰ χείλη τῶν ἑλκῶν καὶ ἀναπληροῖ σὺν μέλιτι· καὶ τὰ τεμάχια δὲ ἴσχει, μιγὲν χρωτῇ· καὶ ποδαγρικοῖς ἐπικαταπλάσμασι μετὰ ἐρέβινθου καὶ καλλιτριχοῖς, μετ' ὄξους καὶ ἀσβέστου. ἐκλεχόμενόν τε τὸ ἄνθος μετὰ μέλιτος, φθισικοῖς ὠφελεῖ.

Actius συγγραφὴ scribit καὶ τὸ τῷ χίῳ ἢ τῷ ἐρύσιμον, callosum & cuiore & consistentia.

καλασκευάζονται ὑ καὶ πύελοι ἐκ τοῦ λίθου, εἰς ἃς οἱ ποδαγρικοὶ τοὺς πόδας ἐνιέντες ὠφελοῦνται. καὶ σαρκοφάγοι γίνονται. *ἰσχναίνουσι τὰ πολύσαρκα καὶ παχέα σώματα, *καὶ ἀπολεπίζουσιν αὐτὰ νίτρῳ ἐν βαλανείῳ. ἐὰν δέ τις πλυνᾶι θέλῃ τὰ προγεγραμμένα, πλυνέτω ὡς τὴν καδμείαν.

A Iuuantur etiam podagrici, pedibus in solio ex eo lapide cauato inditis. Fiunt & loculi, qui defunctorũ carnes exedunt. Extenuantur quoque valdè carnosa & obesa corpora, si eiusmodi flore in balneo nitri vice inspergantur. Quod si seu lapidem, seu florẽ ipsum lauare libet, cadmię modo lauato.

Περὶ Πυρίτου λίθου. Κεφ. ρμγ'.

ΠΥΡΙΤΗΣ εἶδός ἐστι λίθου, ἀφ' οὗ χαλκὸς μεταλλεύεται· λιπαρὸν μέν τοι τὸν χαλκοειδῆ, βυσσηρὰς ἐμφιέρια. καυστέον ὑ ὅπῳ ζειστῷ. μέλιτι δεύσας αὐτὸν, ἔνθες εἰς αἰθαλίας μαλακὰς, καὶ ῥίπιζε συνεχῶς, ὡς ἂν τέλειος χροιὰν πυρὸς λάβῃ. ἔνιοι δὲ εἰς πολλοὺς καὶ πεπυρωμένους αἰθαλίας ἐπιβάλλειν ὑ ἱκανῶς βεβρεγμένον τοῦ μέλιτος τὸν λίθον. ὅταν ὑ μέλι τρέπεσθαι, ὅτι τὸ χαλκὸν, ἀναιρεῖται. καὶ ἀποφυσήσαντες τὴν σποδὸν, πάλιν καίουσι μέχρι χρόνου, ἕως ἂν ὑπυρώτερος γένηται ὁμαλῶς· πολλάκις γὰρ μόνον ὅπτεται ὑ τὸ ὑπεραῖθον. ὅταν ὑ ἀποκαύσαντες καὶ ξηράναντες, ἀποτίθενται. ἐὰν ὑ πεπλυμένου χρεία ᾖ τοῦ ἀρχαίου, πλυτέον ὡς καδμείαν.

Fortè, ἴσον ἀὶ

V. cæret.

V. αἰθαλιὰς ἐμπιπλᾶσι.

Δύναμιν ὑ ἔχει κεκαυμένος ἐ ὡμὸς θερμαντικὴν, σμηκτικὴν, ἀποκαθαρτικὴν τῶν ὑπερεστώτων ταῖς ὄψεσι, διαφορητικήν τε τῶν περιττῶν σαρκωμάτων. ἀναληπτὸς ὑ ῥητίνῃ καταπλασθεὶς τὰ ὑπερσαρκοῦντα μετὰ ποσῆς θερμασίας καὶ σύριγγος. καλοῦσι δέ ἔνιοι ⊛ οὕτω καὶ ἔνια, διφρυγές.

B De Pyrite lapide. Cap. CXLIII.

PYRITES lapidis genus est, ex quo æs conflatur. Eligi debet æris similitudine, quique facilè scintillas edat. Vritur autẽ in hunc modum: Irrigatus melle, carbonibus lẽtis inditur, & assiduè sufflatur follibus, donec rufescat. Alij lapidem copioso melle perfusum in multos carbones igni candentes demittũt: ac vbi ad fuluum colorem vergere cœperit, ab igne amouent, diffláto-que cinere denuò perfusum cremat, donec æqualiter aflicceat' friabilior reddatur: siquidem sæpenumerò facies summa solum amburitur. Ita porrò crematum siccatúmque recondunt. Sin cloto opus sit, lauari debet vti cadmia. Tam vsti quàm crudi vis est excalfacere, abstergere, offusam oculis caliginem expurgare, duritias & discutere & maturare. Idem retina exceptus, excrescentia in carne cohibet cum aliquantula caliditate & astrictione. Neque verò desunt, qui ita vstum diphryges appellent.

C

D

E

Περὶ Αἱματίτου λίθου. Κεφ. ρμδ'.

ΑΙΜΑΤΙΤΗΣ δὲ λίθος ἄειστός ἐστιν ὁ βιῶδρυβὴς μὲν καὶ καλαχρὴς, ὅταν μέλας, ἐν ἑαυτῷ δὲ σκληρὸς καὶ ὁμαλὸς, ἀνεπίμικτος ῥιπαρείας λίθου ἢ ἀμμώδους. Δύναμιν δὲ ἔχει στυπτικὴν, θερμαντικὴν ποσῶς, ἐ λεπτυντικὴν ἐ σμηκτικὴν οὔλων τῶν ἐν ὀφθαλμοῖς καὶ τραχωμάτων, σὺν μέλιτι· σὺν δὲ γάλακτι γυναικείῳ, τοῖς ὀφθαλμίας καὶ ῥήξεσι, καὶ ὑφαίμοις ὀφθαλμοῖς. πίνεται δὲ σὺν οἴνῳ πρὸς δυσουρίαν καὶ ῥοικὰς, καὶ πρὸς αἵματος πτύσεις σὺν χυλῷ ῥοιᾶς. γίνεται δὲ καὶ κολλύρια ἐξ αὐτοῦ καὶ ἀκόνια, τοῖς τὰ ἐν ὀφθαλμοῖς πάθη ἁρμόζοντα.

F

G

De Hæmatite lapide. Cap. CXLIIII.

HÆMATITES optimus habetur friabilis & saturato sanguinis colore, seu niger, suapte natura durus & æquabilis, nulla sorde admista, nulloque zonarum discursu. Vim habet astrictoriam, aliquátum excalfacientẽ & extenuantẽ. Oculorum cicatrices & scabritias cum melle exterit. Cũ lacte vero muliebri, lippitudini & diruptis atque cruore suffusis oculis cõuenit. Bibitur autẽ cõtra difficultatẽ vrinæ & fluores muliebres in vino: & cõtra sanguinis excreationes, cum Punici mali succo. Fiunt & ex eo collyria itémque coticulæ, quæ aduersus oculorum affectus accommodantur.

Pl. prosunt

Vritur

Vritur vt Phrygius lapis, dempto saltem vino. Modus vstionis est, vt modicè leuis fiat, & bullis quibusdam intumescat. Sunt porro qui hæmatiten ita adulterant. Glebam schisti lapidis densam rotundámque, cuiusmodi sunt quæ eius radices vocantur, in vreeum figlini operis, qui feruentem cinerem contineat, condunt: deindéque breui interposita mora eximunt, atque explorant num ad cotem trita hæmatitæ colorem reddat. Quòd si ita res habet, reponunt: sin minùs, iterum nouo cinere obruunt; & subinde consp icientes periculum faciùnt: quoniam diutiùs in cinere dimissa colorem mutat, móxque diffunditur. Discernitur autem adulteratus, primùm scissilibus venis: quippe per venarum ductus in rectum diffringitur, at hæmatites non item. Deinde etiam colore: nanque hic floridum reddit, hæmatites verò saturatiorem atque cinnabarin imitantem. Inuenitur & hæmatites in rubrica Sinopica, & è magnete lapide vehementer vsto paratur: ac natiuus quidem in Ægypto effoditur.

A κρίνεται δ' ἐμφερὴς τῷ Φρυγίῳ λίθῳ τοῦ οἴνου παρεμμιγέντος. μέτρον δὲ ἔστω τῆς καύσεως, ὅ ἡμεῖς θμεν αὐτὸν μίσος κυάθου καὶ πεπομφολυγωμένον. δοκοῦσι δέ τινες καὶ παρειρημένον οὕτω· λαβόντες βῶλον χυτοῦ λίθου πηλοῦ τε καὶ τροχίλων (διαῦται δ' εἰσὶν αἱ λεγόμεναι ῥίζαι
B αὐτῆς) εἰς καμάρια χάλκεα ἐχούσης θερμασίαν θερμῶν ἐγκρύπτουσιν. εἶτα ἁλιπότητος μικρόν, ἀναιροῦσι, καὶ ἐπ' ἀκίδος πείρουσι, δοκιμάζοντες εἰ πρὸς τοῦ αἱματίτου χρόαν ἀπίλυφε· κἂν μηδ' οὕτως ἔχῃ, ἀποβάπτουσι· εἰ δὲ μή, πάλιν ἐγκρύπτουσι, συνεχῶς ἐφορῶντες καὶ δο-
C κιμάζοντες· ἀφελὴς γὰρ ὑπὸ πολὺ ὂν τῇ κατὰ διὰ μεταβάλλει τὴν χρόαν, ἔστιν ἁλιγχεῖται. ἀπελέγχεται δέ ὁ κεκαυστεγμένος, πρῶτον μὲν ταῖς ἁλιφύσεσι. ὁ μὲν γὰρ εἰς κηδόνας ἐστὶ εὐθείας ἀποκλᾶται. ὁ δὲ αἱματίτης, οὐχ οὕτως ἔχει· ἐν τῇ χρόᾳ· ὁ μὲν γὰρ διαρ-
D ῥεῖ ἁλίνοιν· ὁ δὲ αἱματίτης, βαθυτέραν καὶ τὴν κινναβάρει ἐοικυῖαν. βάπτεται δὲ καὶ ἐν τῇ Σινωπικῇ μίλτῳ, καὶ ἐν τῆς μεγάλης πίτυος κηρωθείσης ἐφ' ἱκανὸν κατασκευάζεται αἱματίτης. ὁ δὲ αὐτοφυὴς, ἐν Αἰγύπτῳ μεταλλεύεται.

De Schisto, seu Scissili lapide. Cap. CXLV.

SCISSILIS lapis in Occidentali Iberia nascitur. Probatur maximè qui croci colorem æmulatur, friabilis ac suapte natura fissilis, tú concremento, tum etiam mutua venarum cohærentia sali Ammoniaco similis. Vim exhibet hæmatitæ, sed ad omnia infirmiorem. Quin & caua oculorum vlcera explet muliebri lacte dilutus, itémque ad diruptos & procidentes oculos, insupérque crassitiem genarum & staphylomata, magnoperè efficax est.

Περὶ Σχιστοῦ λίθου. Κεφ. ρμέ.

E ΣΧΙΣΤΟΣ δὲ λίθος, θμεῖται μὲν ἐν τῇ καθ' ἑσπέραν Ἰβηρίᾳ. ἄριστος δ' εἶναι δοκεῖ ὁ παραπλήσιος τῇ χρόᾳ, εὐθρυπτός τε καὶ εὐσχιστος ὡς ἐν ἑαυτῷ. ἔοικε δὲ τῆς σκωληκίτιδος ἕνεκεν καὶ τῆς ἀλληλουχίας τῶν κηδόνων αὐτῷ Ἀμμωνιακῷ ἁλί. Δυνάμιν δὲ πρὸς αὐτὰ τοῦ αἱματίτου εἰσφέρεται, τῇ εὐπνίᾳ μόνον λειπόμενος αὐτοῦ. πληροῖ δὲ καὶ κοιλώματα γυναικείῳ διυθεὶς γάλακτι, καὶ
F ῥήξεις καὶ πρόπτωσις, ἔτι δὲ παχύτητας βλεφάρων καὶ σταφυλώματα λίαν ἐνεργεῖ.

De Gagate lapide. Cap. CXLVI.

PRÆFERENDVS Gagates q. celeriter accēditur, & odorē bituminis reddit. Est autē niger plerunque & squallidus, præterea; crustosus & perquàm leuis. Vis ei molliēdi &

Περὶ Γαγάτου λίθου. Κεφ. ρμς'.

G ΤΟΥ δὲ Γαγάτου πρόκριτον καὶ ταχέως ἐξαπτόμενον, καὶ ἀσφαλίζοντα τῇ ὀσμῇ· μέλας δὲ κανὸς ὑπὸ ἀρχὴ καὶ αὐχμηρὸς, ἔτι δὲ πλακώδης καὶ κοῦφος ἄγαν. Δυνάμει δὲ ἔχει μαλακτικὴν

καὶ διαφορητικήν. ἔστι δὲ καὶ ὀπτὶ λιπαρικῶν ἐλέγχες ἐστοθυμιαθεὶς, καὶ ὑστερικὰς ἀναπαλεῖται· διώκει δὲ καὶ ἑρπετὰ θυμιαθεὶς, & ποδαγρικαῖς καὶ ἀκόποις μίγνυται δυνάμεσι. ἁλίσκεται δ' ἐν *Κιλικίᾳ κατά τινα ποταμοῦ εἴσρυσιν εἰς θάλασσαν χειμάρρου· ἔστι δὲ πλησίον τῆς λεγομένης Γλαυκοπόλεως. καλεῖται δὲ ὁ τόπος ἡ ὁ ποταμὸς Γάγας, ἀφ' οὗ ὦ τόμαλα βδέισχυται οὗτοι ὁ λίθοι.

Περὶ Θρακίου λίθου. Κεφ. ρμζ'.

Ὁ δὲ λεγόμενος Θρακίας, ἁλίσκεται μὲν ἐν Σκυθίᾳ, ἐν ποταμῷ τῷ λεγομένῳ Πόντῳ. Δυώπεται δὲ τὰ αὐτὰ τῷ Γαγάτῃ. ἱστορεῖται δὲ ἐκπυρούμενος μὲν αὐτὸν ὕδατι, σβέννυσθαι δὲ ὑπὸ ἐλαίου· ὅθεν καὶ ὀπτὶ τῆς ἀσφάλτου γίνεται.

Περὶ Μαγνήτου. Κεφ. ρμή.

Τοῦ δὲ Μαγνήτου λίθου ἄριστός ἐστιν ὁ σίδηρον βιαίως ἕλκων, καὶ τὴν χρόαν κυανίζων, πυκνός τε καὶ οὐκ ἄγαν βαρύς. Δυώπειν δ' ἔχει πάχος ἀργυροῦν, διδόμενος μετὰ μέλιτος ἑπτὰ ὀβολοῖν βάρος. ἔνιοι δὲ τοῦτον καίοντες, αἱματίτου πιπράσκουσιν.

Περὶ Ἀραβικοῦ λίθου. Κεφ. ρμθ'.

Ὁ δὲ Ἀραβικὸς λεγόμενος λίθος ἔοικεν *ἐλέφαντος ὀστῷ. τοῦτ' ἔστιν λεῖος καὶ ἁπλοειδὴς, αἱμορροΐδας ἀποξηραίνει· ὀδόντων δὲ σημεῖα γίνεται, καυθείς.

Al additur, καὶ λίθου

Περὶ Γαλακτίτου λίθου. Κεφ. ρν'.

Ὁ δὲ Γαλακτίτης ὠνόμασται, ἀπὸ τοῦ γάλακτος ὠδῆς αὐτόν. ἔστι μέν τοι ἀμυδρῶς ἔντευκτος τῇ χρόᾳ, γλυκεῖ δὲ πρὸς τὴν γεῦσιν· ἁρμόζει δὲ πρὸς ὀφθαλμῶν ῥεύματα καὶ ἕλκη, ἐξελόμενος· δεῖ δὲ τρίψαντας αὐτὸν ὕδατι, ἀποθήκασθαι ἐν πυξίδι μολιβδίνῃ, ἀφ' ἧς αἱ αὐτὸν κολλῶδες.

Περὶ Μελιτίτου λίθου. Κεφ. ρνά.

Ὁ δὲ Μελιτίτης κατὰ πάντα ἔοικε τῷ γαλακτίτῃ· διαφέρων δὲ τοῦ γλυκύτερον ἀμύελον καὶ χυλόν. ποιεῖ δὲ πρὸς ἃ καὶ ὁ γαλακτίτης.

Περὶ Μορόχθου λίθου. Κεφ. ρνβ'.

Λίθος Μόροχθος, ὃν ἔνιοι γαλαξίαν ἢ λευκογραφίδα καλέσαν, ἐν Αἰγύπτῳ γίνεται· ᾧ χρῶνται ὁ ὀθιοποιοὶ πρὸς

Lec. in vet. cod. μόχθος
V. ἰσοποιοὶ

discutiendi. Suffitus morbum sonticum deprehēdit, recreátque vulvæ strangulationes: fugat & serpentes nidore. Podagricis medicamminibus & acopis additur. In Lycia porro nascitur, quà influens amnis in mare effunditur, proximè oppidum quod Plagiopolis dicitur. Vocatur autē Gagas & locus, & amnis ad cuius ostium id genus lapidum inuenitur.

De lapide Thracio. Cap CXLVII.

LAPIS Thracius dictus, gignitur in flumine quodam Scythiæ, cui Ponto nomen est. Vis eadem quæ Gagatæ: Traditur autem accendi aqua, oleo verò restingui: id quod etiam bitumini accidit.

De Magnete. Cap. CXLVIII.

LAPIS Magnes optimus est, qui ferrum facilè attrahit, & colore vergit ad cæruleum, densus, nec admodum grauis. Vim habet crassos humores educendi, si ex aqua mulsa detur trium obolorum pondere. Sunt verò qui crematum hunc pro hæmatite vendant.

De Arabico lapide. Cap. CXLIX.

ARABVS lapis ebori minimè maculoso similis est. Is tritus illitu hæmorrhoidas exiccat. Crematus autem, dentifricijs accommodatur.

De Galactite lapide. Cap. CL.

GALACTITES nomē inde trāxit, quòd lacteum succū remittat: alioqui tamen cinerei est coloris, & gustu dulcis. Ad oculorū fluxiones & vlcera cōuenienter inungitur. Oportet autē in aqua tritum pyxide plumbea recōdere, propter lentorem qui illi obhæret.

De Melitite lapide. Cap. CLI.

MELITITES omnino Galactitæ similis: hoc tantùm interest, quòd dulciorem succum resudat. Eiusdem vt galactites effectus.

De Morochtho lapide. Cap. CLII.

MOROCHTHVS lapis, quem aliqui galaxiā aut leucographida vocauerunt, in Ægypto nascitur: ac eo quidē, quippe cū mollis sit, fa-

cileq; diluatur, linteones dealbádis linteis vtuntur. Creditur ſpiracula corporis obducere, conuenitq; ſanguinem excreantibus, cœliacis & veſicę dolore vexatis, cum aqua potus: itémque fœminis fluxione vuluæ laborátibus, & ſimiliter potus & in peſſo appoſitus. Mollibus etiam oculorum medicamentis miſcetur: caua enim eorum vlcera explet, fluxionéſque ſiſtit. Idem cerato exceptus, quæ fiunt in teneris corporis partibus vlcera ad cicatricem perducit.

A λιθίνων πρὸς ἰμαλίων χρῶνται, μαλακῷ ν. lenim.
κὴ εὐανέτῳ ὄντι. Δοκεῖ δ' πρὸς ἐμπλάσεις,
ἁρμόζων ὅτι αἱμοπτοϊκοῖς κὴ κοιλιακοῖς,
κὴ κύστεων ἀγήμασι, σὺν ὕδατι πινόμε-
νος· κὴ ῥοϊκαῖς ὁμοίως, κὴ ἐν τοῖς ὀθόνιοις
B ἐπὶ τε τὰ μαλακὰ ὀφθαλμικὰ μίγνυ-
ται· πληροῖ γὰρ κοιλώματα, κὴ ῥήγματα
ἴσπερ. σὺν δ' κηρωτῇ ἀναληφθεὶς, τὰ ῥυ-
φερὰ πρὸς ἕλκεσι ἀπουλοῖ.

Περὶ Ἀλαβαστρίτου λίθου. Κεφ. ργ'.

ΛΙΘΟΣ Ἀλαβαστρίτης ὁ καλούμενος
ὄνυξ, ἀναληφθεὶς πεπαυμένος ῥητίνῃ ἢ
πίσσῃ, διαφορὰς σκληρίας· τομάχου δὲ
ἀγήματα μετὰ κηρωτῆς πτισθεὶς· φίλ-
C λᾳ δὲ κὴ οὖλα.

Περὶ Θυίτου λίθου. Κεφ. ρπδ'.

ΛΙΘΟΣ ὁ καλούμενος Θυίτης, γινόμε-
νος μὲν ἐν τῇ Αἰθιοπίᾳ, ἔστι δ' ὁ πόχλωρος,
ἰασπίζων δὲ καὶ δοκῶν ἀνίεσθαι χαλκοειδὴς
φαινόμενος, ἀναδάκνων σφοδρῶς.
Δυνάμει δ' ἔχει ἀποκαθαρτικὴν πρὸς ταῖς
D κόραις ὀπτικὰς ἰώσεων.

Περὶ Ἰουδαϊκοῦ λίθου. Κεφ. ρνέ.

Ο ΔΕ Ἰουδαϊκὸς λίθος γινόμενος μὲν ἐν
τῇ Ἰουδαίᾳ, πρὸς σχήματι βαλανοει-
δὴς, λευκὸς, εὔρυθμος ἱκανῶς, ἔχων καὶ
γραμμὰς πρὸς μῆκος, ὡς ἀπὸ τόρνου· ἀ-
νίεται δ' ὅταν ἄποιος ἐν τῇ γλώσσῃ. δύ-
E νασθαι δ' ἐρεθισθαῖον μέγεθος, διεθὲν ὡς κολ-
λύριον ἐπ' ἀκίνης σὺν ὕδατος ἡμιξέσι κυά-
θοις τρισὶ καὶ πολὺν, δυσουρίαις βοηθεῖν, καὶ
τὴν ἐν κύστει λίθους θρύπτειν.

Περὶ Ἀμιάντου λίθου. Κεφ. ργ'.

ΛΙΘΟΣ Ἀμίαντος γινόμενος μὲν ἐν Κύ-
πρῳ, συσσηρείᾳ μὲν ἔοικώς. οὗ ἔργα- Lacuna legit ex
ver. cod. ἐπεμ-
ζόμενοι ὑφάσματα ποιοῦσιν ἐξ αὐτοῦ ὄντος βλήμασι ἢ Αἰθι-
F ἀμιαντώδους πρὸς θέαν· ἃ βληθέντα εἰς
πῦρ, φλογωθέντα μὲν, λαμπρότερα δὲ
ἐξέρχονται, καὶ καθαρώτερα.

Περὶ Σαπφείρου λίθου. Κεφ. ργζ'.

ΛΙΘΟΣ Σάπφειρος δοκεῖ ὠφελεῖν
σκορπιοπλήκτους πινόμενος· πίνεται δ'
G καὶ πρὸς τὰς ἐξ ὄφεως ἕλκωσις· καὶ πρὸς τὰς Illud aperi-
ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς δ' ἐπιφοράς, καὶ φυ- dodore videtur.
φλώματα, καὶ φλυκταίνας σὺν ἄλλοις, καὶ τὰς
ῥήξεις τῶν ὑμένων συνάγει.

Περὶ Μεμφίτου λίθου. Κεφ. ρη'.

ΛΙΘΟΣ Μεμφίτης διείσκε) ἐν Αἰγύπτῳ κ) Μέμφι, ἔχων ψαφίδων μέγεθος, λιπαρὸς καὶ ποικίλος. τοῦτ' ἰσορρόπως κατατριθεὶς λεῖος ὅπῃ δεῖ μελλόντων τίμνεσθαι ἢ καίεσθαι τόπων, αἰσθησιν ἀνώδυνον ὑπιφέρει.

De lapide Memphite. Cap. CLVIII.

LAPIS Memphites in Ægypto iuxta Memphin inuenitur, calculorum magnitudine, pinguis & versicolor. Hoc tradunt trito & illito partes quæ vrendæ secandæve sunt citra periculũ, ita obstupescere vt non sentiant cruciatum.

Περὶ Σελωίτου λίθου. Κεφ. ριθ'.

ΛΙΘΟΣ Σελωίτης, ὃν τινες ἀφροσέληνον καλέσαι, ἀφ' ὃ διείσκεσθαι αὐτὸν νυκτὸς μεσοῦντος τῆς σελήνης πλαυξίσει. γινᾶται δὲ ἐν Ἀραβίᾳ, λιπαρὸς, διαυγὴς, κοῦφος. ζέσαντες ὑποξύσματα, δίδασι πόμα ἐπιληπτικοῖς. καὶ αὐτὴ φυλακτηρίου δίκην περιάμματι αὐτοῦ αἱ γυναῖκες χρῶνται δοκεῖ δὲ καὶ δένδρεσι παρεσδεθεὶς, καρποφόρους εἶναι.

De lapide Selenite. Cap. CLIX.

LAPIS Selenites, quem aliqui Aphroselenon appellarũt, quod noctu plenus luna crescente reperiatur: nascitur in Arabia, cãdidus, translucens & leuis. Huius ramenta comitialibus in potu exhibentur. Eum etiam mulieres sibi pro amuleto alligant. Sed & eodem adalligato, arbores frugiferæ reddi creduntur.

Περὶ Ἰάσπιδος λίθου. Κεφ. ρξ'.

ΛΙΘΟΣ Ἴασπις, ὁ μὲν τις ὅτι σμαραγδίζων· ὁ δὲ, χρυσαλλώδης, ἐοικὼς φλέγματι· ὁ δὲ, ἀερίζων· ὁ δὲ, καπνίας, ὡς περὶ καπνισμένος· ὁ δέ τις καὶ ἀσσυρίους ἔχων ἀμαλεύκοις καὶ ἀπισιλδούσαις, Ἀσσύριος καλούμενος· ὁ δέ τις τερεβινθίζων λέγει), καλλαΐνῳ χρώματι παρεσόμενος. λέγουσι δέ τινες εἶναι φυλακτήρια πάντα καὶ ὠκυτόκια, μηρῷ παρεμπόμενα.

De Iaspide. Cap. CLX.

EX Iaspidum generibus quædam smaragdum imitatur, alia crystallum, pituitæ similis: alia non dissimilis aëri, ob id aërizusa vocatur: alia veluti fumo infecta, quæ capnias ex argumẽto appellatur: quædam lineis albis & resplendentibus præcingitur, Assyrios nuncupata: alia denique terebinthizusa dicitur, colore callaida gemmam imitata. Omnes pro amuletis gestari, ac femoribus adalligatæ partum accelerare traduntur.

Lacuna legit in vet. cod. ἀσσύριος.

Περὶ Αἰέτου λίθου. Κεφ. ρξα'.

Hoc caput de Aetite in codicibus quibusdam desideratur.

ΑΕΤΙΤΗΣ λίθος, ὁ ἐν ᾧ κινοῦν ἦχον ἀποτελῶν, ὡς ἑτέρου ἐγκύμονι λίθου ὑπάρχων, καὶ πόνον ἐμβρύων ἐστὶν, ὅταν ὀλισθραὶ ὦσιν αἱ μήτραι, ὠδινοποιὸς δεξιτερῷ βραχίονι· ἐν ᾧ παρὰ χεῖρα τῆς ἀποτέξεως, ἄρας ἐκ τοῦ βραχίονος, ὠδινοποιὸς παρὰ μηρῷ, καὶ ἐκτὸς ὠδίνων τίκτει). ἔστι δὲ κλεπτέλεγχος, εἰ δοθείη τις εἰς θερμοφθέγμων ἄρτον· ὁ γὰρ κλέψας οὐκ ἂν δυνηθείη καταπιεῖν τὰ μαστηθέντα. φασὶ δὲ ὅτι ἐὰν συνεψόμενος ὁ αἰέτης τοῖς ἐδέσμασι, κλεπτέλεγχος γένηται· οὐ γὰρ δυνήσεται ὁ κλέψας καταπιεῖν τὰ συνεψόμενα αὐτῷ. λιθωθεὶς δὲ καὶ ἀναλαμβανόμενος κηρῷ πρωΐ σκευασθείσῃ μετὰ κυπρίνου ἢ γλευκίνου ἢ τινὸς ἑτέρου τῶν θερμαντικῶν, οἰνίσκοις μεγάλως ἐπιληπτικοῖς.

ΑΕΤΙΤΕS lapis, alio dum quatitur intra se ac velut in vtero sonante prægnans, grauidis, quibus lubricæ & parũ tenaces sunt vuluæ, partus continet, sinistro earum brachio adalligatæ: sed cùm parturiũt, è brachio remoueatur, ac femori alligetur, vt citra dolores pariant. Furem quoque deprehendit, si quis in pane conditum offerat: fur enim commanducata deuorare minimè poterit. Quin & si cum edulis coquatur, furem prodere & coarguere dicitur: quippe fur quæ cum eo decocta fuerint haudquaquam glutire poterit. Porrò tritus & ceraro exceptus cyprino, gleucinóve aut alio quopiam excalfaciente, comitiales magnificè iuuat.

De lapide Ophite. Cap. CLXII.

IN hoc lapidum genere quidam est ponderosus ac niger: alter cinereo colore spectatur, punctis distinctus: tertius lineis quibusdã candidis intercinctus est. Omnes alligati, morsis à serpente & caput dolentibus opitulantur. Priuatim verò qui lineas habet, lethargo & capitis doloribꝰ auxiliari perhibetur.

De Spongiarum lapidibus. Cap. CLXIII.

LAPIDES qui in Spongiis inueniuntur, in vino poti, calculos vesicæ rumpunt.

De Lithocolla. Cap. CLXIIII.

LITHOCOLLA, seu glutinum quo lapides ferruminantur, mistura est marmoris aut lapidis Parij & taurini glutinis. Potest candente specillo admota incommodos oculis pilos replicare.

De Ostracitelapide. Cap. CLXV.

OSTRACITES testæ similitudinem habet, crustosus & in laminas fissilis, quo mulieres *ad pilos amouẽdos pro pumice vtuntur. Menses drachmæ põdere potus ex vino sistit: quòd si ad dies quatuor à menstrua purgatione drachmarum duarum pondere bibatur, fœminis præstat ne concipiant. Cum melle autem impositus, mammarũ inflammationes lenit, & nomas cohibet.

*Vl. leuigandi causa

De Smyride. Cap. CLXVI.

SMYRIS lapis est, quo annularij sculptores gemmas expurgãt, ad septica & caustica medicamenta vtilis. Prodest & humore nimio flaccescentibus gingiuis, dentifricijsque commendatur.

De Arena. Cap. CLXVII.

ARENA litoralis sole feruefacta, hydropicorũ corpora resiccat, si capitetenus ea vndiq; obruãtur. Torretur & ad aridos fotus, pro milio aut sale.

De Cote. Cap. CLXVIII.

ECOTE Naxia quod exacuendo ferro deteritur, illitum alopecias ad pilũ reducit: virginúmq; mammas cohibet, nec increscere patitur: potũ verò ex aceto, lienem absumit, & comitialibus prodest.

Περὶ Ὀφίτου λίθου. Κεφ. ρξβ'.

ΛΙθος ὀφίτης· ὁ μὲν ἐς ὄγκον βαρὺς καὶ μέλας· ὁ δὲ, σποδοειδὴς τὴν χρόαν καὶ κατεσιγμένος· ὁ δὲ, πᾶς γραμμὰς ἔχων λευκάς. Πάντες δὲ βοηθοῦσι πεπλασμένοις ὑπὸ ὄφεως δηχθεῖσι καὶ κεφαλαλγοῦντων. ὁ δὲ τὰς γραμμὰς ἔχων, ἰδίως ἱστορεῖται ληθάργῳ καὶ κεφαλαλγίαις βοηθεῖν.

Vel Cordus hũc lapidem non ponderosum, sed odoré refert.

Περὶ τῶν ἐν τοῖς Σπόγγοις λίθων. Κεφ. ρξγ'.

ΛΙθοι οἱ ἐν τοῖς Σπόγγοις διεσπάρμενοι, σταν εἰς οἶνον πολύντες, τὰν ἐν τοῖς νεφροῖς λίθους ῥηγνύουσιν.

Περὶ Λιθοκόλλης. Κεφ. ρξδ'.

ΗΔΣ Λιθοκόλλα, μίγμα οὖσα μαρμάρεου ἢ λίθου Παρίου καὶ ταυροκόλλης, δύναται μελαθίδος πεπυρωμένης πείσας αἰσχύνας τὰς ἐν ὀφθαλμοῖς.

Περὶ Ὀστρακίτου λίθου. Κεφ. ρξέ.

ΛΙθος Ὀστρακίτης ὅμοιός ἐστιν ὀστράκῳ πλακώδης καὶ εὔσχιστος, ᾧ γεῶνται αἱ γυναῖκες τὰς τρίχας ἀφαιροῦσαι, πυρωθεὶς δὲ καὶ ὄξει κεκραμένος, πινόμενος σὺν οἴνῳ < ά. πλῆθος. δύσει δὲ < βάρος ἐπὶ πέντε ἐφ' ἡμέρας δ'. μετὰ τὴν ἀφεδρον, ἀσυλληψίαν παρέχει· σὺν μέλιτι δὲ ἐπιτιθέμενος, φλεγμαίνουσι μαστοὺς πῴηνῥῆξαι, καὶ νομὰς ἴσχει.

Περὶ Σμύριδος. Κεφ. ρξς'.

ΣΜΥΡΙΣ λίθος ἐστὶν, ᾗ τὰ ψήφους ἐν δακτυλιογλύφοι σμηχουσι, χρησίμη εἰς σήψεις καὶ παυστικὰ καὶ τροῦ οὔλων πλάδον καὶ ὀδόντων σμῆξιν.

Περὶ Ἄμμου. Κεφ. ρξζ'.

ΑΜΜΟΣ ἡ ἐν τοῖς αἰγιαλοῖς πυρωθεῖσα ὑπὸ τοῦ ἡλίου, ἐξικμάζει τὰ ὑδρωπικὰ σώματα ἐπιχωννύμενα δίχα κεφαλῆς. Φύεται δὲ καὶ εἰς τὰς ξηρὰς πυείας αὐτὴ κόγχης ἢ ἁλῶν.

Περὶ Ἀκόνης. Κεφ. ρξή.

ΑΚΟΝΗΣ Ναξίας ὁ ἀποτριμμα τοῦ σιδήρου ἀγωνιῶντος σιδήρῳ ἐξαιρεθὲν, ἀφροπικίας πρίζει· καὶ μαστοὺς πῴηνῥωγωλύει· αὔξας· πολὺν δὲ μετ' ὄξους λεπτὸν ἀπολεῖ τὰ πάθη, καὶ ὑπολιπώδεις ὠφελεῖ.

Lege αὐξάνων aut αὐξανόμενος

Περὶ Λίθου γεώδους. Κεφ. ρξθ'. A

Λίθος γεώδης σύφῃ, ξηραίνῃ, ἀποκαθαίρει τὰ ὑπόχυσιν τοῖς ὀφθαλμοῖς. κατατριβεῖσα δὲ μὲν ὕδατος, μαστῶν καὶ ὄρχεων παύει φλεγμονάς.

De Geode lapide. Cap. CLXIX.

GEODES lapis astringit, siccat, caligines oculorum discutit. Illitus autem ex aqua, mammarum testiúmque inflammationes sedat.

Περὶ Γῆς. Κεφ. ρο.

ΓΗ πᾶσα ἡ κτηθεῖσα εἰς ἰατρικὴν χρῆσιν, τὴν μὲν αἰσθητὸν δύναμιν ἔχει ψύχουσαν καὶ στρεμπλάττουσαν· κατ' εἶδος δὲ διαφέρει, ἄλλης εἰς ἄλλα μετά τινος σκευασίας χρησιμευούσης. B

De Terra. Cap. CLXX.

TERRA omnis quæ quidem in medicum vsum venit, primam ac summam vim habet refrigerádi, meatúsque obducéndi: sed specie distat, quum alia hoc vel illo modo præparata ad alia sit vtilis.

Περὶ Ἐρετριάδος γῆς. Κεφ. ροά.

ΤΗΣ Ἐρετριάδος γῆς, ἡ μὲν ὅτι λευκὴ ὑπόπυρος μείων, ἡ δὲ, σποδώδης. ἀρίστη δὲ ὑπόχλοή τὴν χρόαν σποδίζουσα καὶ μαλακὴ ἄγαν, πρός τε χαλκώματα ἠνωτισμένα γραμμὴν ἰώδη ἀποφερομένη. πλύνεται δὲ ὡς ψιμύθιον, ἢ ὕστερον λειόμενον αὐτῆς ὅσον αὖ θέλῃς, κατ' ἰδίαν τε καὶ σὺν ὕδατι ἐάσαι κατασκευάσαι· εἶτα τὸ μὲν ὑγρὸν ἐλαφρῶς ἀπόχυσον· τὴν δὲ γῆν ἐν ἡλίῳ ξηράνας, πάλιν τρίβε ὑπὲρ ἡμέρας ὑπόδυσιν ὕδωρ, ἐπιπάσας δὲ ἐάσας ὑποκρῖναι, τῇ ὀρθρου ἀπόχυσον, καὶ λειάνας ἐν ἡλίῳ ξηράνας ὡς ἐπλάσατο ὡς δυνατόν. ἐὰν δὲ καὶ ὠχρότητος χρεία ὑπάρχῃ, λαβὼν ἐρεβινθιαῖα μεγέθη τῆς γῆς, δὸς εἰς ἀγγεῖον κεραμεοῦν καὶ ἀτριβῆ καινὸν· πιμάσας τὸ σῶμα ὑπιμελῶς, ἔνδυς εἰς ὀστράκους αἰθαλώδεις, καὶ ῥίπτε συνεχῶς. ὅταν δὲ ἡ σποδὸς αἰθαλωθῇ, ἤτοι ἀεροῦσθαι μᾶλλον ἤρξηται τοῦ χρόας, ἀνελόμενος ἀπόθου. Διύαμιν δὲ ἔχει σηπτικὴν καὶ ψυκτικὴν, κούφως μαλακτικὴν καὶ χυλωμάτων πληρωτικὴν, καὶ ἐναίμων κολλητικήν. C D E

Μητε χρὴ ἐμπίπτειν legendum suspicatur.

Περὶ Σαμίας γῆς. Κεφ. ροβ'.

ΤΗΣ δὲ Σαμίας γῆς τὴν ἄγαν λευκὴν προκριτέον, καὶ ἐλαφρὰν. καὶ ὅταν ὦ ἁπτομένῃ γλώσσῃ, χρατιζομένην ἐκτήκηται, ἐπὶ τὸ εὔχυλον καὶ μαλακὴν καὶ εὐθρυπτον, οἵα ἐστὶν ἥν τινες κολλύριον καλοῦσιν. ἔστι γὰρ αὐτῆς διαφορὰ τοιάδε· τὸ μὲν προσφερέστερον καὶ ὁμαλὸν ἄσπρον, πλακοῦντος ὃν καὶ πυκνὸν, ὡς ἀκόνη. Δύναμιν δὲ ἔχει καὶ καυστικὴν καὶ πλυτὸν ἐμφερῆ Ἐρετριάδι. ἴασι δὲ αἵματος αἰσχροχολὼ, καὶ ῥοικαῖς δίδοται γαναξὶ F G

Al. ἐκ κόκκου. ἡ &c.

De Terra Samia. Cap. CLXXII.

SAMIA præfertur perquàm candida, leuis & tangenti linguę glutinis modo adhærescens, insupérque succosa, mollis & friabilis: cuiusmodi est quam aliqui collyrium vocant. Duo enim sunt eius genera, nempe quod modò dictum est, & quod Aster appellatur, globosúm ac densũ cotis in modũ. Vritur ac lauatur vt Eretria, vimq; cõsimilẽ habet: sanguinis excreationes sistit: & fœminis fluxione vuluæ laborantibus

cum flore ſylueſtris Punicæ datur. Teſtium quoq; & mammarum inflammationes illita ex roſaceo & aqua ſedat: compeſcit & ſudores: denique contra venenatorum morſus & exitialia medicamenta pota è vino auxiliatur.

De lapide Samio. Cap. CLXXIII.

SAMIVS lapis in Samia terra inuenitur, quo aurifices ad poliendum illuſtrandúmque aurum vtuntur. Præſtat in eo genere candidus & grauis. Vis ei aſtrictoria & refrigerans: quapropter prodeſt ſtomachicis potus: eſt & vis inſtrumenta ſenſuũ admuandi & ab iniuria vindicandi: ad oculorum fluxiones & vlcera cũ lacte efficax eſt. Creditur & adalligatus accelerare partus & conceptus fœminarum cuſtodire.

De terra Chia. Cap. CLXXIIII.

CHIA eligi debet candicans, ad cinereum vergẽs colorem & Samiæ ſimilis. Eſt autem gleboſa ac tenuis, ſed fictilibus formis differens. Effectus eius qui Samię: faciei ac totius corporis cutem erugat, illuſtrat & amabili coloris bonitate cõmendat: ac in balneis p nitro deterget.

De terra Selinuſia. Cap. CLXXV.

IDEM effectus & Selinuſiæ: maximè vero laudatur quę vehemẽter reſplẽdet, candidáq; eſt ac friabilis, quæq; facillimè in ſuccum reſoluitur, cum primùm humore diluitur.

De Cimolia terra. Cap. CLXXVI.

CIMOLIA quædam eſt candida, altera ad purpureũ inclinans, quæ innatam quandam habet pinguitudinẽ & tactu frigida ſentitur: & hęc quidem optima exiſtimatur. Vtraque aceto diluta, parotidas & alia tubercula diſcutit: ambuſtis igni confeſtim inuncta, partes affectas a puſtularum eruptione vindicat. teſtium duritias ac totius corporis inflammationes cohibet, inſuperque aduerſatur eryſipelatis. In ſumma multiplici ſunt in vſu, dummodò genuinæ ac minimè ſpuriæ aſſumantur.

De terra Pnigitide. C.CLXXVII.

QVÆ Pnigitis dicitur, colore quodãmodo Eretrię ſimilis eſt.

A σὺν βδάυσίῳ. ℞ ὄρχεων ℞ μαζῶν φλεγμονὰς καὶ ἀχειρολιθὴν σὺν ὕδατι καὶ ῥοδίνῳ παιῷ· σὺν μέλιτι δὲ ἱδρῶτας· καὶ φθειριάσεις καὶ θανασίμοις ἀρηγεῖ, σὺν ὕδατι πινόμενον. Mire, ita Sax. legi iussum ſuſpicatur.

Lacuna ex ver. cod. legit, nisi dicp.

Περὶ τῆς ἐν Σάμῳ λίθου. Κεφ. ργ'.

ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ δέ πως ἐν τῇ Σαμίᾳ γῇ λίθος, ᾧ οἱ χρυσοχόοι χρῶνται πρὸς τὸ λεαίνειν καὶ στίλβειν. διαφορὰ δὲ ὁ λευκὸς ℞ στιβαρός. Δύναμιν δ' ἔχει στυπτικὴν, ψυκτικήν· ὠφελεῖ στομαχικοὺς ἐν ποτῷ· * ἀμβλυωπικὴν βοῖς ἀθηνείοις· ποιεῖ πρὸς τὰ ἐν ὀφθαλμοῖς ῥεύματα καὶ ἕλκη, σὺν γάλακτι· δοκεῖ δὲ καὶ ἀκυτόκιος εἶναι ℞ φυλακτήριος τὴν συνέλκυσιν ποιῶν, πεπαρμένος. V. cod. ἀλθῆν. ἢ αἱμοστατικὴν [illegible] καὶ [illegible]

Περὶ Χίας γῆς. Κεφ. ρογ'.

ΚΑΙ τῆς Χίας δὲ τὴν λευκὴν καὶ ὑποτίφρον παλαιπάτειον, ℞ τὴν Σαμίᾳ ἐμφερῆ· πλακώδης δ' ἐστὶ καὶ λείαινα, βοῖς δὲ χήμασι τῆς αἱμορραγίας διαφέρουσα. Δύναμιν δ' ἔχει τὴν αὐτὴν τῇ Σαμίᾳ· πιτυώδη δ' ἐν στίλβοντι, ἐπὶ δὲ εὐχροΐᾳ τὸ πρόσωπον καὶ ὅλον τὸ σῶμα ἀποτελεῖ· σμήχει δ' αὐτὴν νίτρου ἐν βαλανείῳ. Oribasij verba

Περὶ Σελινουσίας. Κεφ. ροέ.

ΤΑ αὐτὰ δ' ποιεῖ ℞ ἡ Σελινουσία γῆ· ἀείζηι δέ ἐστιν ἡ ἄγαν στίλβουσα καὶ λευκὴ, εὐθρυβὴς δὲ καὶ ταχὺς ἄγαν χυλοῦται, ἐπιδιδοὺς ὑγρὸν λαβεῖν.

Περὶ Κιμωλίας γῆς. Κεφ. ρος'.

ΤΗΣ δὲ Κιμωλίας ἡ μὲν ἐστὶ λευκὴ ἡ δὲ ἐμπύρφυρος, καὶ λιπαρίαν τινὰ ἐμφύσει κεκτημένη, πρός τε τὴν ἀφὴν καὶ πάψυχρος, ἣν ἀείζηι ἡγητέον. ἑκάτερα δὲ διαφορᾶσιν ὀξεῖ διδόμενα, πρωϊδιάσεις καὶ τὰ δηλα φύματα· πρός τε τὰ πυρίκαυστα ποιοῦσι ὀπτιχειρόμενα τραχηλῶμα, ὡς τε ἀφλυκταίνωτα διατηρεῖν τὰ πεπονθότα μέρη· καταστελλουσι δὲ καὶ διδύμων στραγγείας καὶ φλεγμονὰς ἅς ἂν ἐν αὐτοῖς ὅλον τὸ σῶμα· ἔτι δὲ ἐρυσιπέλασιν ἐπίσχουσιν. καθόλου δὲ πολύχρηστοι εἰσὶν αἱ γῆσοι, ἐὰν μὴ τόδοι τραλαμβάνωνται.

Περὶ Πνιγίτιδος γῆς. Κεφ. ροζ'.

ΗΔΕ λεγομένη Πνιγῖτις γῆ, τῇ χρόᾳ ἔοικέ πως τῇ Ἐρετριάδι. ἔστι δὲ ἀδρό-

Orib. ἀπὸ ζωῆς, an quid simile.

ζωλος, ψυλλαὶ πρὸς τὰς τῶν χειρῶν ἐπιβολάς· τῇ τε γλώσσῃ μάλιστα πολλάπτει ὡς ἐκπεμᾶσθαι. Δυνάμιν δὲ τὴν αὐτὴν ἔχει τῇ Κιμωλίᾳ, βραχὺ τῆς βίτριος ὑστεροῦσα. Ταύτῃ αὐτὴ Ἐρετριάδες τινὲς παραφέρουσι.

A Crassiusculis autem prędita est glebis: si quis manus admoueat, refrigerans: tactúque linguæ vsqueadeò glutinosa vt pensilis hæreat. Huic effectus idem qui Cimoliæ, paulò tamen infirmior. Hanc porrò aliqui pro Eretriade vendunt.

Περὶ Ὀστράκων. Κεφ. ροέ.

B

Ὄστρακα δὲ τὰ ἐξ ἱππέων, τὰ λίαν κάτοπτα, ἐκφωλιᾶ· ὅθεν ὀφθαλμίοις σὺν ὄξει, κνησμοῖς καὶ ἐξανθήμασι θεραπεύει, καὶ παλαγγικοῖς ὠφελεῖ· αἰγιλωπώδη τὰ κηρωτῇ, χοιράδας διαφορεῖ.

Testæ fornacum. Cap. CLXXVIII.

B

Fornaceæ Testæ vehementer tostæ, crustas vlceribus obducunt: quare prurigini & papularum eruptionibus ex aceto inunctæ medétur. Podagricis etiam prosunt: & cerato exceptæ, strumas discutiunt.

Περὶ τῆς ἐκ τῶν Καμίνων γῆς. Κεφ. ροϛ'.

De terra Fornacum. CLXXIX.

Καὶ ἡ ἐκ τῶν Καμίνων δὲ κεκαυμένος γῆ πυρρά, τὴν αὐτὴν ἔχει δύναμιν τοῖς ὀστράκοις.

C

Fornacum terra, quæ quidĕ retosta rufescit, eiusdem est cum testis effectus.

Περὶ Μηλίας γῆς. Κεφ. ροζ'.

De terra Melia. Cap. CLXXX.

Ἡ δὲ Μηλία τὴν μὲν χρόαν καὶ αὐτή ἐστιν ἐμφερὴς Ἐρετριάδι τῇ κατοδυομένῃ· ἐνδακὼς δὲ καὶ παραιρουμένη τοῖς δακτύλοις, ὡς ψηφισμόν τινα ἀποτελεῖν ὅμοιον ψαιρομένῃ κιμωλίᾳ. τῇ δὲ δυνάμει σμηκτικωδὴς ἐστίν, ἀμυδρώσεως δὲ μᾶλλον· ὃ δὴ καὶ ἀπὸ τῆς γεύσεως ἐμφαίνει. αὐαντικὴ δὲ ἡ τοῦ γλώσσης πρᾶσις· δυσὶ δὲ καθαίρει καὶ εὐχρουν ἀποτελεῖ τὸ σῶμα· λεπίζει δὲ καὶ τοὺς τρίχας, καὶ ἀγρίους καὶ λέπρας σμήχει· χρησιμεύει δὲ καὶ ζωγράφοις πρὸς πλείονα διαμονὴν χρωμάτων, καὶ χλωραῖς δυνάμεσι συνεργεῖ. καὶ ταύτης δὲ χωρὶς ἁπάσης γῆς τὸ ἄγαθον ἐν λεπτότητι καὶ πρὸς ἅπτον, μαλακή τε καὶ εὐδρυβής, καὶ ὅλυτον ὅταν ὑγρῷ θίγῃ.

D

Vim habet aluminosam, sed remissiusculá: id quod & gustu deprehĕditur. Leniter quoque linguá tactu siccat. Corpus mundũ ac probè coloratũ reddit: pilos extenuat: vitiligines ac lepras exterit. Pictoribus etiam vsum præbet, vt colores diutiùs perennent. Emplastris viridibus efficaciter inseritur. Porrò tũ ex hac terra, tum & alia omni in vniuersum eligi debet minimè lapidosa, recés, mollis ac friabilis, quęq; cùm humorem attigerit, facilè resoluatur.

E

Περὶ Ἀμπελίτιδος γῆς. Κεφ. ροζ'.

De terra Ampelitide. Cap. CLXXXI.

Ἡ δὲ Ἀμπελίτιδος γῆς, ἣν τινες φαρμακῖτιν καλοῦσι, γινομένης ἐν Σελευκείᾳ τῇ ἐν Συρίᾳ, τὴν μέλαιναν προχριτέον, ἣ πυκνοῖς αἰθραξὶ μικροῖς ἐμφερὴς ἐστίν, ὑποδιδακώδης τε καὶ στίλβουσα ἴσως· ἔτι δὲ οὐδὲ βραδίως τηκομένη, ὅταν λειωθεῖσα ὕδατι χυθῇ ποσῶς ἔλαιον. Τὴν δὲ λευκὴν καὶ πρασώδη καὶ ἀπικλον, φαύλην ἡγητέον. Δύναμιν δὲ ἔχει διαχυλικὴν καὶ ψυχικήν· διαλεμβαίνει δὲ καὶ πρὸς καλλιβλέφαρα καὶ βαφὰς τριχῶν· καὶ τοὺς τῶν ἀμπέλων βλαστοὺς πρὸς τὴν τῆς ἐκβλα-

F

EX Ampelitide terra, quá Pharmacitin quidam nominãt, quęq; in Seleucia Syriæ nascitur, laudatur imprimis nigra & paruos piceę carbones referens, assulosè quodammodo scissilis & æqualiter splendens: quæque insuper trita citò liquescit, si olei aliquantulum affundatur. Vitiosa censetur candida, cinerea, quęq; minimè liquescit. Vim dissipandi & refrigerádi habet: calliblepharis additur, atq; inficiendis capillis idonea est. Est & eius vsus ad illinendas vites sub germi-

Portè, ἢ

Orib. μαγῆτ. quem secutus est Ruellius.

Al. καὶ ἀπὸ. nescio quo sensu.

V. & Orib. κεφαλὴν

Vulg. ἀλλὰ καὶ

nationis tempus: quippe quæ innascentes vermiculos enecet.

De Fuligine pictoria.

Cap. CLXXXII.

FVLIGO qua pictores vtuntur, è vitrariis officinis peti solet: siquidem huic palma tribuitur. Vis ei septica & acris. Fracta itidē cum cerato rosaceo ad cicatricem perducit.

De Atramento librario.

Cap. CLXXXIII.

ATRAMENTVM quo scribimus, è fuligine ex tædis collecta conficitur. In singulas gummi vncias, ternæ fuliginis vnciæ adiiciuntur. Fit etiā è resinæ fuligine & illa pictoria modò dicta. Sumi autē oportet fuliginis huius minam vnam, gummi sesquilibram, taurini glutinis & atramenti sutorij, singulorum sescunciam. Septicis medicamētis conueniēter additur. Ambustis etiam confert ex aqua paulò crassius inunctum, tandiúq; dimissum, dum cicatrix obducatur: sanatis siquidē vlceribus, sponte sua excidit. Cæterùm, amicissime Arce, tum pro operis modo quē destinaueramus, tum pro materiæ auxiliorúmque medicinalium copia quam colligere licuit, hucusque dicta sufficiant.

Libri quinti & vltimi de materia medica finis.

A στύσεως ὥρας, κλείνουσα δὲ ὀπτηπομφόλυγας σκώληκας.

Περὶ Ασβόλης. Κεφ. ρπϛ'.

ΑΣΒΟΛΗ ἡ ἀφ' ἧς ζωγράφοι χρῶνται, λαμβάνεται μὲν ἐκ τῆς ὑελουργῶν. Forte ὑαλουργικῆς
ἀφαιρεῖ δὲ αὕτη. Διώλυσιν ἔχει σπλικνὴν, ἁρμοῖαν. Ἀπουλοῖ δὲ καὶ κηλάγμα- V. adi. καὶ σπλικνὴν id est, vrentem.
B τα σὺν ῥοδίνῃ χειρωτῇ.

Περὶ Μέλανος. Κεφ. ρπζ'.

ΜΕΛΑΝ ᾧ χράφομεν, συναίρεται ἐκ λιγνύος συναλοιφθείσης ἐκ δαδίων. μίγνυται δὲ πρὸς τὸν ὑγρ. ἀ. τοῦ κόμμεως, οὐγγίαι τρεῖς λιγνύος. σκευάζεται δὲ καὶ ἀπὸ τῆς ῥητίνης λιγνύος καὶ τῆς τρυφρωτείνης ζωγραφικῆς ἀσβόλης. δεῖ Forte σκιαδίου vt infertis
C δὲ τῆς μὲν ἀσβόλης μναῖ μιᾶν ἑλαμ- G. alter. λ. β
βάνειν, κόμμεως δὲ λίτραν μίαν ἥμισυ, mine.
ζωγραφείλης οὐγγίαν μίαν ἥμισυ, χαλκάνθου οὐγγίαι μίαι ἥμισυ. Ἁρμοζῃ δὲ εἰς τε σπόγγους, καὶ πτερὰ αὐτα, καθαιρόμενον μὲν ὕδατος πολλοῦ, ἐξ ἐώμενον ἄχρις ἀπουλώσεως· ἀποκίπτει γὰρ αὐτόματα οἱ ὑγιαθέντων τῶν ἑλκῶν. Καὶ δὲ χρεὼν ἐφ' ὅσον ἰσχυὸν ἐδόξαμεν, ὦ φίλτατε Ἄρκε, ἅμα εἴ) καὶ μήκους συλλήξεως, καὶ πλήθους ὕλης τε καὶ βοηθημάτων ταμιεύσασθαι, ἄλις ἔχει.
D

Τέλος τῆς πέμπτου καὶ τελευταίου.

PEDACII DIOSCORIDIS ANAzarbæi liber de Venenis, eorúndémq; præcautione ac medicatione.

ΠΕΔΑΚΙΟΥ ΔΙΟΣΚΟΡΙΔΟΥ ΑΝΑΖΑΡΒΕΩΣ ΠΕΡΙ ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΤΩΝ ΠΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ.

IANO ANTONIO SARACENO LVGDVNÆO INTERPRETE.

Præfatio.

QVONIAM superioribus libris, amicissime Aree, tradidimus de aromatibus, oleis, unguentis, arboribus ac earundem fructibus & lacrymis, insuperque de animalibus, melle, lacte, seno, fruguibus, oleribus, radicibus, herbis, succis: denique de vinorum metallicorúmque generibus: in hoc operis totius vltimo, de viribus noxiorum medicamentorum, ac eorũ quæ contrà prodesse possunt, disseremus. Vsitata igitur sermonis prolixitate opus institutum prosequamur. Huiusmodi autem de venenis tractatus cùm biparritò distributus sit: in eam videlicet partem quæ docet quo pacto ipsa præcauere debeamus, ita vt planè non assumantur, aut, siquando per imprudentiam data fuerint, vt tum quoque innoxia irritáque fiant: & alteram, quæ rationem tradit iis succurrendi qui iam noxam senserè: priore loco disseram de præcauendi modo: quem quidem esse difficilem prisci existimauerunt, quòd clanculum venena exhibentes, iis vtuntur artibus, quibus etiã periti ssimum quenque fallant. Siquidem exitialia venena permistis dulcibus amaritudine sua spoliant, & graue odoris virus mistura odoramen-

Τὸ προοίμιον.

ΠΟΔΟΝΤΕΣ ἐν τοῖς προγεγραφόσι βιβλίοις, φίλτατε Ἀρεϊε, περὶ ἀρωμάτων καὶ ἐλαίων καὶ μύρων καὶ δένδρων καὶ τῶν ἐξ αὐτῶν καρπῶν καὶ δακρύων· ἔτι τε ζώων καὶ μέλιτος, καὶ γάλακτος καὶ ξέατος, καὶ τῶν λεγομένων σιτηρῶν καὶ λαχάνων, ἔτι τε συμπόμασι περὶ ῥιζῶν καὶ βοτανῶν καὶ χυλισμάτων, καὶ οἴνων καὶ μεταλλικῶν λόγων· ἐν τούτῳ τελευταίῳ τῶν ἀρχαίων τῆς ὅλης προγεγραπτείας, παραλέξομαι περὶ τῆς τῶν ὠφελεῖν ἡμᾶς δυναμένων φαρμάκων ἐπεργείας. Παραιτησάμενοι δὲ τὴν πολυλογίαν, ἐπιμιμνήσκεται ὧν προεῖπομεν. Μεριζομένου δὲ τοῦ τοιούτου διχῇ· εἴς τε τὴν προφυλακὴν τοῦ μὴ δεῖν ἀρχὴν λαμβάνειν, καὶ ἔτι καὶ ποτὲ λάθοι δεδρᾶσθαι, ἀνενέργητα γενέσθαι· καὶ εἰς τὸ βοηθητικὸν τῶν πεπωκότων. πρῶτον δίειμι περὶ τῆς προφυλακικοῦ τρόπου, δυσχερεῖς ὄντος, ὡς τῶν ἀρχαίων ἐπέλεγον, μᾶλλον δὲ τοῦ λάθρα δεδρᾶσθαι, ὡς καὶ τοὺς ἐμπειροτάτους ἐξαπατᾶν. τοὺς μὲν γὰρ πικρίας ἐξαιρεῖσθαι τῶν φαρμακικῶν φαρμάκων ταῖς μελιτώμασι γλυκύτητι· τοὺς δὲ δυσωδίας, ταῖς τῶν ἀρωμά-

Addit Lacuna ex v. codice impressa

των καταμίξεσιν, ἢ ταῖς τῶν ὑλῶν ἕνεκεν ὠ- A
φελείας δοκούσῶν προσφέρεσθαι, μάλιστα δ' ἐν ταῖς ἀσθενείαις, ὡς ἀψυθίῳ ἢ τραγορεγάνῳ ἢ ὑσσώπῳ, ἢ θύμβρᾳ, θύμῳ τε καὶ ὀρεγάνῳ ἢ ἀβροτόνῳ, ἢ ἴριδι ἢ κάστορίῳ, καὶ εἴ τι δοκεῖ καταλλήλως τοῖς καταρρυπαίνουσι φαρμάκοις ἔχειν ποιότητα. ἔστι δὲ τῶν πεπομένων, οἷς B
οἴνοις σταφυλῆς ἢ ζωμοῖς, ἢ οἷς γλυκεῖ, ἢ οἷς μελικράτῳ, ἢ οἷς γλυκεῖ, ἢ οἷς χυλοῖς, ἢ φακῇ, ἢ οἷς ἀλφίτοις, ἢ οἷς φαρμάκοις ἢ οἷς ἄλλοις ὅσα τῶν προσφερομένων συναπτόμενα. ἔνιοι δὲ ὑποπλεύσαι δεῖ παραιτεῖσθαι τὰ κατηρτυμένα τῶν ἐδεσμάτων, καὶ πᾶσαν ὅλως C
τινα μεθύειν ποιότητα γλύκους, ὄξους τε· οἱ δὲ λοιποὶ τῶν γλυκέων ἢ ἁλυκῶν ἢ ὀξέων διαφυλάττεσθαι· καὶ τὸν διψῶντας ἢ πυρέττοντας δι' ὑπερβολὴν μὲν ἀθρόως πίνειν ἢ ἐσθίειν, προσέχοντας τῇ ποιότητι τούτων, μάλιστα δὲ ψυχρὸν ὕδωρ προλαμβάνειν πίνοντας. ἀποπλη- D
ρωτέον γὰρ τῆς ὀρέξεως, ἀπιστεῖται γάρπαι δ' λοιπὸν αἱ ποιότητες· καὶ ἐπὶ μὲν τῶν ἀσθενούντων, κελεύω παραιτεῖσθαι τὰς τῶν ἐπ' ὠφελείᾳ διδασκ φαρμάκων πόσεις, ἃς εἰσφέρουσιν οἱ κακοῦργοι τὰ δηλητήρια· ὃς τι δὲ πρὸς δυσπιχρήστους γίνεσθαι τοὺς νοσοῦντας. καὶ ἢ μὲν E
προσὸν δ' μὴ βαρέως ἀλίσκεσθαι πλανωμένοις ἔφοδος, αὕτη· ἑτέρα δὲ, ἢ * ὃς ἔστιν ἀνθρακιτέρα. δεῖ τοὺς ὑποπτεύοντά τι πιεῖν προλαμβάνειν ὦ, καὶ ἀδυνάτα κατασκευάζειν τὰ φάρμακα. οἱ δὲ τὰ ἰσχάδας μαστωμένοις μετὰ F
βασιλικῶν καρύων, καὶ τὰ κελεύσματα δὲ καθρόμενα, βατιάδος τὰ σπέρματα ἁλικὼ μετ' οἴνου, ἢ καλαμίνθης
τῶν φύλλων ὁμοίως, ἢ μίλτου, τὰς καλουμένης λημνίας σφραγῖδος, ὃ αὐτὸ πλῆθος σὺν οἴνῳ· ἢ πηγάνου * φύλλα καὶ καρύων βασιλικῶν τὸ ὁστοῦν, ἢ ἀλλᾶ χόν- G
δρον ἢ ἰσχάδας δύο πρὸς προσφερόμενα μετ' οἴνου, τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν· ὧν ἔστι ἡ διὰ τοῦ σκίγκου,

torum eximunt, aut medicamentorum quæ potissimùm in minùs firma valetudine vtilitatis gratia exhiberi putantur, veluti sunt absinthiũ, tragoriganũ, hyssopus, satùreia, itémque thymus, origanum, abrotonum, iris aut castoriũ, & siquid aliud malefica vi præditis medicamentis cognatam qualitatem habere videatur: vel ea potulentis inserunt, vti vinis asperis, iusculis, passo, aquæ mulsæ, musto, aut variis succorum generibus; vel ipsi lenticulæ polentæve, aut aliis quæ edulij specie offerũtur, immiscent. Quamobrem suspicioſi curiosiùs apparata fercula vitare debent, omníque intenso sapore dulcium, salsorum aut acidorum abstinere. Quin neque sitibundi affatim bibere, aut esurientes auidiùs deuorare debent, sed ad eorum quę edunt bibúntve, saporem qualitatémque diligenter attendere, & ante omnia potu frigidam aquam præsumere: sic enim satiato appetitu, qualitates postèa facilè deprehenduntur. Quòd ad ægros verò spectat, honestè recusamus potiones auxilij prætextu dari solitas, quas offerunt improbi veneficiorum artifices: quò fit vt ægrotantes audentium iniuriis minùs pateant, Et hæc quidem, ne facilè incauti homines capiantur dolis veneficorum, ratio est & facultas. Verùm altera supereſt expeditior, vt suspicioſi aliquid præsumãt, quod venenorum vires hebetet, ac inefficaces irritásque reddat: cuiusmodi caricæ sunt cum iuglandibus nucibus manducatæ, & quæ citria mala vocantur, seminísque buniadis drachma vna cum vino: itidémque folia calaminthæ, aut rubrica quæ sigillum Lemnium appellatur, pari pondere cum vino: aut rutæ folia, nucis iuglándis nucleum, salis grumum & caricas duas ieiuni sumant, & nullo veneni genere offendentur. Quin & antidota ex vino præsumpta eundem præbent effectum: ex quorum numero sunt, quod ex scinco paratur,

quod

V caret. Deest in Ald.

vel præcautis malis medicamentis cognatam

Cum addit, ἐνδυφῶν καὶ

Corn. legit ἐστὶν οἷς

V. caret.

Viridem caret, & nos consultò præmittimus.

Mare. ὑμανίτου legisse videtur

Addendum fortasse διδόντων, aut quid simile.

V. καὶ σίλφιον

Lac. legit in vet. codice ἢ ἀλλᾶ &c.

quod è sãguinib' tẽperatur,& quod magni Mithridatij nomen obtinet. Quin & sæpenumero naturali dissidio venenis aduersantur propriè ac peculiares quædã corporum constitutiones,insuperq; antecedẽtes eorundẽ dispositiones,pro varia ciborum potuúmve qualitate aut vini copia inductæ. Siquidẽ venenorum quæ insuper ingeruntur vires frangunt & exoluunt, corúmq; in mẽbra distributionẽ impediunt,priore alimento antè infarctis præclusisq; meatibus. Verũenimuerò quandoquidẽ inter peregrinandũ incõmodi casus varij ablq; vllis hominum insidiis similia frequẽter inuehunt pericula, nonnihil etiam hac de re agere necessariũ duco. Ante omnia igitur loco subdiali, quoad eius fieri poterit, coquinari, ferecula structere, omniáq; cibo potuiq; necessaria apparare oportebit. Quod si non nisi sub tecto cõmodè ista fieri possunt,tùm quoq; laquearia diligẽter obseruanda sunt. Etenim haud rarò è superioribus contignationibus mortifera decidunt animalcula,vti phalágia,quædã alia reptilia, & qui stellio appellatur. Sed & vinaria vasa diligẽter & in luce intueri oportet: nanque reptilia vini odore illiciuntur,quæ interdũ sorbendo noxium virus eructarunt, interdũ vero illapsa immeritaque perierunt, & iis qui posteà vinum hauserunt exitij causam attulêre. Et hęc quidẽ de insidijs vitandis præcauendisq; hactenus dicta sint. At si qui seu vitro, seu ex quorundã insidijs venenum hauserint, ns nulla interposita mora auxiliari oportebit. Siquidẽ dum signa,quæ singula comitari venena solent,expectãtur,immedicabile fit malum, aut certè diutius neglectũ, ægre deinde medicamentis cedit. Quare si qui venenũ se hausisse pro cõperto habent, aut qui ns adfuere quod qualéve sit haustũ genus veneni,fateantur, protinus accedẽtes ad cõgrua particulariáve remedia, illos facilè naturali pristinæq; cõstitutioni propriæ restituemus. Neque vero ns assẽtimur,qui prius auxilia in huiusmodi casu frustra adhiberi cõtendũt. Quo enim modo morbi, quorũ causę cæcæ latentésq, corporibus insidẽt,medicaminibus curabũtur, quæ verò forinsecus incurrunt venena medicinã haudquaquam admittẽt?

A ἢ ἡ ἀπὸ τ αἱμ, ἢ ἡ καλουμένη Μεγάλη Μιθριδάτους. αἰτιῶνται δ πολλάκις ἐ ἰδιοσυγκρίσεις σωμ αἱ πρὸς διαφορ. δι᾽ ἃς ἔνιας βρωμάτων ἢ πομάτων ποιότητας, ἢ πλῆθος οἴνου· ἐκλύουσι γὰ τὰς ἐνεργείας τ ἐπεισαγομένων φαρμάκων, καὶ τ αἵματος δοσιν αὐτῶν κωλύουσι, πρόπλεω-

Leg. cũ Corn. ex ... Alexandr. vti infertum.

B μένων τ πόρων ὑπὸ τ προληφθεισῶν φθῶν. Ἐπὰν δ᾽ ἐ παχυσάσας τινὲς ἀποδημίας δι᾽ χα ἐπιβουλῆς πολλάκις ἐπιφέρουσιν ὁμοίους κινδύνους, ἀναγκαῖον ἐστὶ προλαμβάνειν καὶ περὶ τούτου δι᾽ λαβεῖν. δεήσει γὰ πρῶτον μὲ ἐν ὑπαίθροις τόποις, ὡς δυνατὸν, ἑψεῖν, καὶ ἑτοιμάζειν τὰ πρὸς βρῶσιν καὶ πόσιν. δεύτερον δ᾽ ἐν ὑποστέγῳ ἐπιμελῶς καθαρεύειν τὰ ὀροφάς. πολλάκις γὰ ἐν τῷ ὑπερκειμένων πίπτει ζωύφια φθοροποιά, ὥσπ φαλάγγια, καὶ ἄλλα ἑρπετά, ἢ ὁ καλούμενος ἀσκαλαβώτης, καὶ οἷς πρόσχεσι δὲ ᾗ οἶνον ἀλλοίοις εὐαρμόστοις καὶ ἐπιμόνως προσέχειν δεῖ. ἕλκεται γὰ ὑπὸ τ ὀσμ τ οἴνου τὰ ἑρπετά, ἅ τινα πολλάκις πίοντα μὲν τ ἰὸν ἀπημαίνουσιν, ἐμπεσόντα δ᾽ ἀπόθανον, καὶ ἀπωλείας ἐχόντως αἴτια τοῖς προσενεγκαμένοις. Πρὸς μὲν δ᾽ ἐπιβουλὰς εἶναι καὶ προφυλάττεσθαι, ταῦτα εἰρήσθω. εἰ δέ τινες ἐκ προνοίας γνώμ προσενέγκοιντο, ἢ ἐξ ἐπιβουλῆς τινων λάβοιεν, δεήσει μηδὲν ἀναβαλομένους βοηθεῖν· εἰς γὰ τ ταχεμένην καὶ παρακολουθοῦντα σημεῖα ἑκάστου τῶν φαρμάκων ἀμείωτον ἔστ, δυσβοηθήτων αὐτῶν διὰ τὸν χρόνον γινομένων. ἐὰ μὲν δ᾽ οἱ προσενεγκάμενοι νοήσαντες ὁμολογήσωσι τὸ πεπὶν φαρμακον, ἢ τινες τῶν συμπαρόντων, πρᾶγμα ἐλπίσαντες ἐπὶ τὰ καταλληλα βοηθήματα, ῥᾳδίως εἰς τ ἰδ φύσιν καὶ οἰκεῖον ἀξομεν αὐτοὺς καθέστημα. οὐ συγκαταθησόμεθα τοῖς λέγουσιν ἐπ᾽ αὐτῶν καθ᾽ ὁρμ ἀθεραπεύτως γίνεσθαι. πῶς γὰ τὰ μὲν ἐπὶ τῶν ἐν τῷ σώματι γινομένων αἰτίων πάθη θεραπείαν ἐπιδέχ, τὰ δὲ ὑπὸ τῶν ἔξωθεν συμπίπτοντα φαρμάκων ἀθεράπευτα τύχωμεν;

Ald. δίχα

Ald. πλείων

Ald. αὐτῶν

C

D

E

F

G

ὁμοίως γὰρ πάντα τὰ ἐπὶ τοῖς σώμασι γινόμενα νοσήματα, ἀναπιπτάντων ἐν ἀφεδρεύοντα, καὶ τὰ μεγέθη τῶν προσαπτόντων αἰτίων, καὶ τοῖς προσιᾶλούσης ἐκάστοις εὐπιθανότητος τοῦ σώματος. εἰ δέ τινες αὐτῶν καταλημφθείεν ἀφωνίας ἢ πνιγμονῆς, ἢ μήπως, ὅταν τὸ μὲν ὑγιὲς ἐξάγῃ αὐτὸ, ἀσυμφανεῖς ἡμῖν πυθέσθαι τὸ φάρμακον, πότε δεῖ ταχέως ἔρχεσθαι ἐπὶ τὰ κοινὰς ἀρμόττοντα τοῖς οἱονδήποτε φάρμακον πεπωκόσιν. ἀδὲν δὲ δύναται κοινότερον βοήθημα δοθῆναι, τοῦ δοθὲν φάρμακον, πρὸ τοῦ σταθῆναι, ταχὺ ἐξῆσαι τόπου κενοῦν εἰς τὸ ἐκτός. ὅθεν μηδὲν αἰσθανομένοις προσφέρειν δεῖ ἔλαιον θερμὸν, ἢ κατ' ἰδίαν ἢ μὲν ὕδατος ἐμεῖν ἀναγκάζοντας. εἰ δὲ μὴ παρείη ἔλαιον, τοῖς πόποις μὲν φερόντων, βούτυρον αὐτὶ ἐλαίου μὲν ὕδατος θερμοῦ ἢ μαλάχης, ἢ λινοσπέρμου ἢ τραγίου, ἢ τίλεως, ἢ κνίδης σπέρματος, ἢ χόνδρου ἀφεψήματος. οὐ μόνον γὰρ κενοῦσι ταῦτα ταχὺ τοῖς ἐμοῦσιν, εὐχερῶς χαλασμὸν καὶ παῦλαν ἐμποιοῦντα, ἀλλὰ καὶ ὑποτέμνει τὴν χολὴν, καὶ ἀναλωθῆναι τῆς κινούσης τοῖς σώμασιν, ἀμβλυωπικὰ τῆς ὀριμυτήτων καθιεῖται. ἔστι δὲ ἀναργῶς καταλαβέσθαι τοῦτο. εἰ γάρ τις ἑλκώσας τὸ αἰδοῖον δι' ἀσβέστου, ἢ πτυελὸς ἢ κηδαλείδος ἢ ἴριος ἄλλου δριμέος, ὁ σῶμα, ὑποχρίσειε ἐλαίῳ, οὐχὶ ἑλκωθήσεται ὑπὸ τούτου καὶ μᾶλλον οὐδ' εἰ πίνοι τις ἡλίνης ἰσχύος ἢ φόξας, δύναται τοιοῦτον. ἐπὶ μὲν ἐμέτου οὐ μόνον καθ' ὃ κινεῖ ἡ ἀποχρίνη τὸ ἐλαιῶδες ὠφελεῖ, ὅτι δὲ διέχυται τὸ ληφθὲν ἐπίδηλον, ἐκ τε ὀσμῆς ἢ θρόμβων ἢ χρώματός τινος· ἐκ μὲν γὰρ ὀσμῆς καὶ πικρίας, μηκώνιον ἢ ὑοσκύαμος, ἢ χρόας, ψιμύθιον ἢ γύψος· ἀπὸ δὲ θρόμβου, γάλακτος ἢ τοῦ ποσφαγοῦς αἵματος· ἀπὸ δὲ βρώμου καὶ ποιότητος τοῦ ἐμουμένου καὶ ὀσμῆς, λαγῴου θαλασσίου καὶ φρυνίου, ὡς ἔφη τινὲς ἢ δι' ἕτερον ἕνια δύναται βοηθεῖν, ἐρχομένους ὅτι τὰ ἑκάστῳ ἁρμόζοντα βοηθήματα. καθομοιοῦνται δὲ τῷ ἐλαίῳ μάλα-

Lege cū Comentariis

Mare. γάλα ἰσχυρὸν ἀφίει ἡ ταυρεία αἷμα ποσφαγέν.

Æquè porrò omnes corporibus aduenientes morbi pro caularū ingruentium magnitudine, próque antecedentibus affectionibus ac opportunitate habilitatéque corporum, vel medicabiles sunt, vel nullis cedunt medicamentis. Quod siqui forsan vocis interceptione aut mētis alienatione correpti, aut alioqui nolentes veneno liberari, nullam nobis eius cognitionem præbeāt: tum protinus ad ea transeundum remedia, quę in communi epotis quibuscunque venenis opitulari consueuerūt. Atqui nullum communius auxiliū dari potest, quàm quod exhibitum venenum per proximum locum foràs pellit, priusquàm ipsum inualescat. Quamobrē illis sine mora calidum oleū seu per se, seu ex aqua, vt ad vomitū cogātur, exhiberi cōuenit. Quòd si oleū natura loci negat, eius vice butyrū cū aqua calida, aut maluæ vel seminis lini vel tragi, vel fœnigræci, vel seminis vrticæ, vel alicæ decocto potest administrari. Hæc enim nō modò venenū vomitionib' exigēt, facilè laxādo subuertēdoq; vēntriculū, sed & aluum subducēt, ac simul etiā qua pollēt acrimoniā obtundēdi hebetandiq; facultate impediēt, quominus corpora vlcerētur. Verùm inter cætera illud maximè præstabit oleū: id quod euidenter huiuscemodi argumēto deprehēdere licet. Nā si quispiā viua calce, aut fæce aut cātharidibus, aut alio quouis acri corpus exulcerare cōtēdat, id si priùs oleo leniter oblitū fuerit, in eo vlc' excitare minimè poterit. Imo verò si quis corpus pręunctū vehemēter astringere aut perfrigerare velit, frustra id tentauerit. Vomitus præterea nō ob id modò, quòd vacuet ac vitus noxiū excernat, iuuamētum affert, sed & quòd haustū venenū nonnunquam odore, concretis grumis aut colore prodat: quippe cum odore & amaritudine papaueris succū, colore cerussam gypsúmve, grumis lac aut sanguiné animalis recens iugulati ostendat. Sic quoq; ex corū quę vomitu regesta fuerint qualitate virosóq; odore, leporis marini & ruberę veneficia facile est deprehēdere: vt hac potiùs ratione, q̄ alia quapiā opē quibusdā afferre nobis in prōptu sit, ad ꝓpria & singulis venenis accōmodata auxilia trāseuntibus. Oleo porrò mal-

ue decoctum admiſcetur, aut adeps anſerinus, aut pinguium carnium iuſculum, aut lixiuium lignorum cinere factum. Vbi vero vomitus diligenter citatus fuerit, nequid ptorium in ventre relinquatur, quæ inceſtinis hæſerint reliquias acriore clyſtere deuocabimus. Facit & ad hoc ipſum nitrum tritum cum hydromelite aſſumptum & vina vetera liberaliùs epota: iura itidem gallinacea, præpingues piſces, carnes vetuſtę ſimul & pingues, & quę eduliorum genera adipe aut recenti butyro conſtant. Dum nanque aluum ſubducunt, vti diximus, ac ventriculum reſoluunt, proniorem ipſum ad vomitionem reddunt: hebetat & venenorum acrimoniam, atque meatus obſtruentia, celerem venenorum penetrationem inhibent. Quietiam medicamenta dátur quæ communi dote proſunt: è quorum numero eſt rubrica Lemnia, agaricum, abrotonum, irio, radix eryngij, ſemen paſtinacæ & calamuthæ, Celtica nardus, caſtorium, teruli virentis medulla, flos nerij quod rhododendron appellatur, matrubij ſuccus, laſerpitium ipſiuſve ſuccus & radix quam etiá magudarin appellarunt, ſagapenum, opopanax, peucedani ſuccus, ariſtolochia longa, ſylueſtris rutæ ſemen, & ceſtri, quæ & betonica vocatur, folia. Singula porrò cum vino drachmæ vnius pondere exhibentur. Eundem effectum præbet polij decoctum, ſcordium, & lęuis liquidæque picis linctus. Egregiè quoque opitulantur antidota, quorum præparationes in operis calce deſcribemus. Communis itaque ratio præſtandi auxilij ſic ſe habet. Cæterùm & obuia quæ comitantur conſequuntúrve ſymptomatis communia remedia ſumptitari poſſunt. Ferè enim plurimorum venenorum facultates in conſimiles affectus corpus tandem deducunt: quam ob cauſam pleriſque communia conducunt auxilia. Varia ſiquidem ſunt venenorum genera: communes tamen nec ita multi qui ex iis oriuntur affectus. Enimuero fieri nequit, vt ad vnũ veneni genus omnia ſympto-

A χης ἀφέψημα, ἢ *γλαύκιον, ἢ σίαρ χή-
νειον, ἢ ζωμὸς ἐκ λιπαρῶν κρεῶν χυτὸς,
ἢ κρία ἢ ἀλφὶ τῶν ξύλων. κομιζομένοις
δὲ ἀλφὶ τῶν ἐμέτων ὀπτιμελῶς, ἀλφὶ τὸ μη-
δὲν ὑπολείπεσθαι ἐν τῇ χοιλίᾳ, τὸ ἐμ-
μένον ἐν τοῖς ἐντέροις κλύσμασι δριμεῖ
κομιούμεθα. ποιεῖ δὲ καὶ τὸ νίτρον λεῖον σὺν
B ὑδρομέλιτι προσλαμβανόμενον, καὶ οἶ-
νοι πολλοὶ καὶ παλαιοὶ πινόμενοι, καὶ ζω-
μοὶ ὀρνίθειοι, ἰχθύες λιπαροὶ, καὶ κρέα πα-
λαιὰ καὶ λιπαρά, καὶ τὰ ἀλφὶ σίαπος ἢ
βουτύρου παρεσκευάσμενα. ὑπαγωγὰ γὰρ
πλεῖστον κοιλίας, ὥσπερ εἶπον, καὶ ✠ στόμαχον
ἀναλύοντα, ἑτοιμότερον καθαρσιάζει ✠
C στόμαχον πρὸς τὸν ἔμετον· ἀμβλυνει τὲ
πλεῖστον δριμύτητα αὐτῶν, καὶ παρεμπλα-
στόμενα τοῖς πόροις κωλύει πλεῖστον ὀξύτη-
τα τῆς τῶν φαρμάκων δυνάμεως. δί-
δονται δὲ καὶ ἀσμαζόντως φαρμακα κοι-
νῶς· οἷον ἥ τε Λημνία μίλτος, ἀγαρι-
κὸν, ἄβροτονον, ἰρύσιον, ἠρυγγίου ῥίζα,
D σαφυλίνου σπέρμα καὶ καλαμίνθης, νάρ-
δος Κελτικὴ, κάστόριον, πάρθηνος χλω-
ροῦ σκυτείνης, μέσου τοῦ καλουμένου
ῥοδοδένδρου ἄνθος, τερμίσου χυλὸς, ὀλυ-
φίου, ἢ ὁ ὀπὸς αὐτοῦ, σταχάπλοιον, ὑπο- V. καὶ
πάνακος, πλατεδάνου ὀπὸς, καὶ ἡ ῥίζα· ἰώ-
καὶ μαγούδαιον ἐκαλέσθη, ἀριστολοχίας
E μακρᾶς, πηγανίου ἀγρίου σπέρμα, κέ-
δρου τῆς βετονίκης καλουμένης τὰ φύλ-
λα. δίδονται δ' ἕκαστον σὺν οἴνῳ ἐς ἀ. πλῆ-
θος. ποιεῖ καὶ πολίου ἀφέψημα, καὶ *σίσυ-
λι καὶ πίσσα ὑγρὰ λεῖα ἐπιλιχμώμενα.
θηριάσασι δὲ βοηθοῦσι καὶ αἱ πόλεις· ἔστι
τοῖς σπλαγχνίοις ὅτι πλεῖστα αἰσχρὰ φλοιῶν.
F κοινῶς δὲ βοηθητέον τούτοις ✠ ζωπυ-
ρῷ· δυνατὸν δὲ καὶ ἐκ τῶν παρεχόντων
συμπτωμάτων, κοινὰ ἐς τὰ βοη-
θήματα συμπαραλαμβάνεσθαι. πολλὰ
γὰρ αἱ τῶν πλείστων φαρμάκων δυνά-
μεις, εἰς ὁμοίους πάθεσι τὸ σῶ-
μα ἀγαγοῦσαι. διʼ ἣν αἰτίαν ὅτι τῶν πολ-
G λῶν τὰ κοινὰ βοηθήματα ἀμύνει· πολλὰ
μὲν γὰρ τὰ διαφθείρια φαρμακα, κοινὰ δὲ
καὶ οὐ πολλαὶ αἱ ἐξ αὐτῶν γινόμεναι ἀχρη-
στίαι. ἀδυνάτου γὰρ πάντα τὰ συμπίπτο-

μαζα ἐνὶ ποδαγκαλουθῆσαι. εἰ γὰρ ἑνὶ τινὶ τῶν, ἅτινα εἴληχεν αὐτὴ καθ' ἕκαστον φάρμακον ἀφ' ἑνὸς βοηθήματος παράδοσις. πῶς τε γὰρ ἀλγεῖν στόμαχόν τε καὶ ἔντερα, ὥσπερ τι καὶ νεφροὺς καὶ κύστιν· ἔτι δὲ λύζειν καὶ δάκνεσθαι καὶ πέμπειν, ἀφώνους τε εἶναι καὶ ῥιγοῦν καὶ ἀσφυκτιᾶν καὶ ἀσθμαίνειν, καὶ καταφέρεσθαι καὶ σκοτοῦσθαι, καὶ πίπτεσθαι καὶ διψᾶν καὶ αἱμορραγεῖν, πυρέσσειν τε καὶ δυσουρεῖν, καὶ τροφοῦσθαι, καὶ ἐμεῖν πυκνὰ ἢ ναυτιᾶν, ἐρυθριᾶσθαί τε καὶ ὠχριᾶν καὶ ὠχρᾶν, παραφρονεῖν τε καὶ ῥίγχειν καὶ παγιέσθαι, καὶ ἄλλα πολλὰ ποιεῖν καὶ ἀφάσους πάσχειν· ἑνὶ μόνῳ δύσκολον εὑρεῖν παρεπόμενον, ἕκαστον μεμαθηκέναι τῶν ἀλλοπαθῶν ἀφθόνως ὀλίγων ἀριθμῶν καὶ κοινῶν ὑποδεῖξαι συμπτωμάτων. διὸ καὶ ἐφ' ἑνὸς ἑκάστου τῶν προκειμένων οὐκ εὔκολον τὸ εἰλημμένον φάρμακον γινώσκεσθαι. ὃ γὰρ δάκνεσθαι τὰ στόμα καὶ γλῶτταν, καὶ φλεγμήνειν στόμαχον καὶ κοιλίαν τε καὶ νεφροὺς καὶ κύστιν, δυσουρεῖν τε ἰσχυρῶς, ἐνίοτε δὲ καὶ αἷμα δι' οὔρων παρεκβαίνειν, καὶ λαγνιδοῦσθαι, ἀφάπτεσθαί τε πολλὰ μέρη τοῦ σώματος, οὐ μόνον ὅτι καυθαρίδων ὑρίσκεται παρεγκεκλευσμένων, ἀλλὰ καὶ ὅτι πιτυοκάμπης καὶ βουπρήστιος καὶ σαλαμάνδρας· τό τε καταφέρεσθαι ἢ καροῦσθαι ἢ ῥιγοῦν, παλύεσθαί τε καὶ ναρκᾶν, καὶ ἀφὴν καὶ καταψύχεσθαι καὶ νάρκαν, αἰσθητεῖν τε καὶ ὀδάξεσθαι τὸ ὅλον σῶμα, οὐ μόνον τοῖς τὸ μανικὸν πιοῦσιν πρέπειν, ἀλλὰ καὶ τοῖς μανδραγόραν ἢ κώνειον προσενεγκαμένοις. τό, τε καταφέρεσθαι οὐ μόνον ὑοσκύαμος ὅτι φέρει, ἀλλὰ καὶ τὰ τοξικὰ καλούμενα τῶν φαρμάκων· καὶ ἀκόνιτον δέ, καὶ τὸ μέλι τὸ γιγνόμενον ἐν Ἡρακλείᾳ τῇ Ποντικῇ. καὶ τὸ πίπτεσθαι δὲ οὐ μόνον ὅτι μυκήτων ὀρεσταλλικὰ καὶ ὅτι αἵματος ταυρείου, καὶ γάλακτος καὶ ἀκονίτου καὶ γύψου καὶ ψιμυθίου. καὶ καθόλου δύσκολον εἰδέναι ὅλης ὕρης σημεῖον ἕνα ἀριθμόν τι τῶν ποτηρίων τὸ γινόμενον φάρμακον δηλοῦσαν

Videtur legisse Ruellius ἀνιᾶν

Ald. διψῆν

mata sequantur. Alioqui supervacanea foret quæ traditur singulis venenis propria & accommodata curatio. Neque verò facilè reperiatur quisquam, qui ex vnius veneni haustu simul & semel, vehementi stomachi, intestinorum, iocinoris, renum ac vesicæ dolore crucietur, insuperque singultiat, erodatur, cõtremiscat, obmutescat, perfrigeretur, conuellatur, pulsu deficiatur, ægrè spiret, veterno ac vertigine caligatione've corripiatur, stranguletur, sitiat, sanguinis eruptione, febri, vrinæ difficultate ac torminibus laboret, crebrò vomiter, nausea prematur, rubescat, liuescat, expallescat, desipiat, stertat, resolvatur & alia pleraque ac diuersa faciat patiaturque. Singula porrò in vniuersales affectiones distincta, paucorum eorúmque communium symptomatum numerum demonstrant. Quapropter ex vno singulari symptomate eorum quæ antè recensita sunt, non facile fuerit venenum assumptum deprehendere ac internoscere. Nam oris & linguæ erosio, stomachi, ventris, renum ac vesicæ inflammatio, vehemens vrinæ difficultas, ac interdum etiam cruenta mictio, lancinatio, & in plurimis corporis partibus quoddam velut incendium, non tantùm epotis cantharidibus superuenire comperiuntur: sed & pinorum erucis, bupresti atque salamandræ. Ad eundem modum non solùm eos qui meconium hauserunt veterno ac sopore prehendi, stertere, liuescere, elanguescere, perfrigerari ac torpescere, stupescere, ac toto corpore pruritum pati constat: sed eos etiam qui mandragoram aut cicutam assumpsêre. Sic mentis alienationem non hyoscyamus tantùm infert: verumetiam quæ toxica appellantur, itidémque aconitú & mel quod in Heraclea Ponti gignitur. Quin & strangulatio nõ modò ab assumptis fungis, sed & sanguine taurino, lacte, aconito, cerussa, gypsóque conspicitur. In summa difficile est vnum vni veneno proprium inuenire signum, quod potum gustatúmve virus certò prodere possit:

vel, supine pronum

maximè cùm eiuſmodi ſymptomata alios etiam affectus communiter conſequi comitaríque ſoleant. Attamen in iis quæ celeriter enecant, licet aliquo modo ſignis deprehendere id quod noxam intulit, vti deinceps trademus. Verùm in iis quæ diuturnas affectiones inuehũt, nulla in curando difficultas eſt, quantumuis noxium venenum ſignis internoſcere ſit perdifficile: quippe cùm venena ſtatim atque præſentaneam vim illam amiſerũt, in longos affectus tranſmutata, communia reliquorum affectuum remedia compoſitionéſque flagitent, venefica proprietate nõ ampliùs illis inhærente. Proinde longa quæ ab iis excitata eſt affectio in aliquod diuturnorum morborum genus recidit, à quibus facile fuerit medendi rationem deſumere. Atque de iis quidem quæ generaliter auxiliantur, hactenus. Conſequenter quæ priuatim ſingulis conueniunt auxilia ſcriptis mandabimus, ſi priùs tamen expoſuerimus, quænam in ſingulis rerũ ordinibus exitialem aut maleficam vim ſortita ſint: vt ſi qua eorum quæ ad ſanitatis vſum deſcripta reperiuntur, aliqua ex illis ammixta habeant, iis medicinæ ſtudioſi cautiùs vtantur. Inconſiderantia enim magna infert damna, & ſæpe continuo eorum vſu homo in perniciem agitur. Animalia itaque quæ exitioſam vim habent, hęc ferè ſunt: cantharides, bupreſtis, ſalamandra, pinorum eruca, lepus marinus, rana rubeta & paluſtris etiam muta, nec non & hirudines deuoratæ. In ſeminum verò genere, hyoſcyamus, coriandrum, cicuta, melanthium, pſyllium: è liquoribus, meconiũ, opocarpaſum, thapſiæ ſuccus, elaterium & mandragoras: è radicibus, chamæleon, aconitum, thaptia, veratrum, ixia, agaricum nigrũ, & ephemeron quod nonnulli Colchicum vocant, quia in Colchide naſcatur. E plantarum ramoſarum herbarúmque generibus, ſmilax quam aliqui thymalum ſeu thymium, Latini taxum appellãt, ſolanum manicum, quod & dorycnion dicitur, Sardonia herba quæ ranunculi genus eſt, corni-

A καὶ μάλιστ' ὅτι κοινὰ καὶ τοῖς ἄλλοις θανατηφόροις πάθεσι παρακολουθεῖ ταῦτα. πάλιν ὅτι μὲν τῷ ὀξέως ἀναιρούντων, ἔστι τοῦ καὶ σημειώσασθαι τὸ βλεπόμενον, Marc. Empiricum nondum recti.
ὡς παραδώσομεν. ὅτι δὲ τῷ χρονίας ἀλγηδόσεις παρασκευάζοντων, δυσκόλως ἔσθ' ὅπως πρὸς τὴν θεραπείαν τὰ τότε τῶν

B σημείων δυκρινεῖς βλαπτόντος. ἐκφυγόντα γὰρ τὴν ὀξύτητα τῆς ἐνεργείας τὰ φάρμακα, καὶ μεταληφθέντα εἰς χρονίους, κοινῶς λαμβάνει τοῖς λοιποῖς πάθεσι τὰς κατασκευὰς καὶ τὰς βοηθείας, τῆς ἰδιότητος τῶν πονηρῶν φαρμάκων μηκέτ' ἐούσης. ἀλγηδόνες δὲ χρονίου κατασκευασθέντες, ἀπ' αὐτῶν ἢ ἀλγηδόνος πόνων εἰς ἕν τι γένος τῶν χρονίων ἐμπίπτει παθῶν, ἐφ' οἷς θυμέρες ὄντι καὶ τὴν θεραπείαν αἰσλαμβάνειν. καὶ τὰ μὲν κοινῶς βοηθοῦντα, ταῦτ' ἔστιν. οἷς ἀκολούθως αἰσχράφομεν καὶ τὰ ἴδια ἑκάστοις ἁρμόζοντα, παρεκθήσομεν ὑφ' ἓν ὅσα V. comm.

D φθαρτικὰ ἢ κακωτικὴν ἔχει δυναμικὴν ἑκάστης τάξεως, καὶ ἵνα πεφυλαγμένως ἔχοιεν τινα τούτων μεμιγμένα φάρμακα ἢ φιλιατρευόντες οἷς χρῶνται. ὃ γὰρ ἀπειροπαθὲς μεγάλας διαφέρει βλάβας, καὶ πολλάκις ἀφ' ἑνὸς συνεχῶς

E χρῆσιν αὐτῶν ἀπωλείας αἴτια γίνεται). ζῶα μὲν οὖν ἐστὶ φθαρτικὰ τάδε· κανθαρίδες, βούπρηστις, σαλαμάνδρα, πιτυοκάμπη, λαγωὸς θαλάσσιος, φρῶνες ὁ λεῖος, βάτραχος ἕλειος ἄφωνος, βδέλλαι κατεσθιόντων. σπερμάτων δὲ, μυοσκύαμος, κώνειον, κάπνειον, μελάνθιον, ψύλλιον. ὀπῶν δὲ, μηκώνειον, ὀποκάρπασον, θαψίας χυλός, ἐλατήριον, μανδραγόρας ῥιζῶν δὲ, χαμαιλέων, ἀκόνιτον, θαψία, ἑλλέβορος, ἰξίας, ἀγαρικὸν τὸ μέλαν, ἐφήμερον ὃ ἔνιοι Κολχικὸν καλοῦσι, διὰ τὸ ἐν Κολχίδι γίνεσθαι. τῶν δὲ ἐν λαχάνοις, V. Ipsum
σμίλαξ, ἣν ἔνιοι τιθύμαλον, Ῥωμαῖοι δὲ ταξίον ἢ ἰτέαξον καλοῦσι, φρύγιον μυρικὸν, V. comm.

G ὃ καὶ δορύκνιον καλοῦσιν, ἥ τε Σαρπηδόνιος Lege, σαρδόνιος
πόα ἅπασι βατράχου εἴδος, μύκωνες μεγα-

Lege, ἀφιεῖς

πῖτις, φθασεικὸν, πάχιον, πήγανον ἄγριον, μύκητες. ἀπὸ ζώων δὲ, αἷμα ταύρειον νεαρὸν, ᾧ ὃ ἐμπεπυκασθὲν γάλα, μέλι τε ὃ ἐν Ἡρακλείᾳ τῇ Ποντικῇ γινώμενον. μεταλλικὰ δὲ, γύψος, ψιμμύθιον, ὑπόθημος, ἀφρόστεμμα, σανδαράχαι δύο, λιθάργυρος, ἄδαρκη, μόλιβδος, καὶ ἡ καλουμένη ὑδράργυρος. τῶν δὲ συμφύλων, οἶνος ἀθρόως πο-

A culatum papauer, pharicum, toxicum, ruta ſyluestris ac fungi. Ab animalibus, taurinus ſanguis recens, lac coagulatum, & mel Heracleæ in Ponto genitum. Inter metallica, gypſum, ceruſſa, calx, auripigmentum, ſandaracha vtraque, ſpuma argenti, adarce, plumbum & quod argentum viuum appellatur. Ex iis

B quæ domeſtica & in quotidiano vitæ vſu ſunt, vnico hauſtu potum à balneo vinum largius, aut paſſum: aut frigida aqua ſimiliter.

Addunt Corn & Marc ex ſequentibus ὑδρόμελι ἢ ὄξος ἢ ὕδατος χυμὸν ποτὸν ὀλίγον cum curſu & vehementioribus exercitiis. Ald. γλυκὺς

λις πόλεις ἀπὸ βαλανείου, ἢ γλυκὺ, ἢ ψυχρὸν ὕδωρ ὁμοίως.

Περὶ Κανθαρίδων. Κεφ. α'.

De Cantharidibus. Cap. I.

ΤΟΙΣ δὲν Κανθαρίδας παρασυνεσκευασμένοις παρέπεται χαλεπώτατα σημεῖα. χαλεδὼν γὰρ ἀπὸ τοῦ στόματος μέχρι κύστεως πάντα δάκνεσθαι δοκεῖ αὐτοῖς, καὶ κατὰ τὴν γεῦσιν πίσσης ἢ κεδρίας ὅμοιόν τι ἐγγίνεσθαι. φλεγμαίνουσι δὲ τὸ δεξιὸν ὑποχόνδριον, καὶ δυσουρεῖσι· πολλάκις δὲ αἷμα παροίσει δι' οὔρων· φέρεται δὲ αὐτοῖς καὶ κοιλίαι ὁμοίως τοῖς ὅτι δυσεντερικῶν· λιποθυμίαις τε καὶ ἀσαις καὶ σκοτοδινίαις παρεπίπτουσιν· ὅτι τε λοιδοροῦσι πρὸς ἀλλήλους. Διὸ δὴ πρὸ τοῦ παρασκευασθῆναί τι τοιοῦτον, ἀναγκάζειν ἐμεῖν, διδόντας αὐτοῖς ὃ ἔλαιον, ἢ ἄλλό τι τῶν προφρησέντων. καὶ μετὰ τὸ κομίσασθαι τὰ πλεῖστα δι' ἐμέτων, ἐπιέναι διὰ κλυσῆρος χυλὸν κόνδρου, ἢ ὀρύζης, ἢ τραγου, ἢ πτισάνης, ἢ μαλάχης ἀφέψημα, ἢ λινοσπέρμου, ἢ τήλεως. ἢ τῶν ῥιζῶν τῆς ἀλθαίας, ἣν ἰβίσκον ὀνομάζουσι Ῥωμαῖοι. ὅταν δὲ δόξειαν τὰ αὐτοῖς νίτρον σὺν ὑδρομέλιτι, τοὺς δὲ καταβιβάσαι καὶ ἐκνίψαι τὰ ὅπη παρεμίμνα τῷ στομάχῳ καὶ ἐντέρῳ. καὶ ἐὰν μὴ διαχωρῇ, καινοῦν δεῖ, μελίκρατον ἐπιδιδόντας μετὰ νίτρου. καὶ ὅταν δόξειαν οἶνον ἢ γλυκὺ, σὺν τετριμμένων αὐτῷ κροβύλων καὶ σικύων σπέρματος, ἢ χάλαζος ἢ μελικράτου, ἢ σέαρ χοίρειον σὺν τετηκὸς τῷ γλυκεῖ. τὰ δὲ φλεγμαίνοντα μέρη καταπλάσσειν χρὴ ἀλθέᾳ ἐψηθέᾳ μετὰ μελικράτου. καταρχὰς μὲν οὖν τὰ λαμβανόμενα καταπλάσματα βλάπτει, διὰ τὸ ἐκ τῆς θερμασίας κατέχεσθαι τὸ δηλητήριον, σπείρον ὅτε ἐπὶ τοὺς τόπους ὁρμᾷ κυρίους· χρονισθέντων δ', ὠφελεῖ καὶ χαλε-

C cam vſque iis omnia erodi videntur, pici aut cedriæ ſimile quiddam in guſtu obuerſatur: in dextro hypochondrio inflammationē ſentiunt, & vrinam ægrè reddunt, ac ſubinde cum lotio ſanguinem emittunt: ſtrigmenta qualia dyſentericis per aluum egeruntur: animi defectionibus, faſtidiis & tenebricoſa vertigine corripiuntur: tandem vero etiam mente alienantur. Ergo anteaquam tale quid accidat, propinato oleo aut ſupradictorum aliquo ad vomitum cogendi ſunt. Mox vbi vomitione pleraque reiecerint, halicæ aut oryzæ,

D tragi vel piſſanæ cremor, aut decoctum maluæ vel ſeminis lini, vel fœnigræci, vel radicum althææ quam Latini hibiſcum appellant, clyſtere infundatur. Superdandum verò iiſdem nitrum ex hydromelite, vt quæ ſtomacho adhuc & inteſtinis adhærent, eluantur ac deturbentur. Hæc nili ſic inciſa detergeantur, aluo infuſa aqua mulſa

E cum nitro vacuari debent. Detur deinde vinum aut paſſum, in quo pinei nuclei & cucumeris ſemina contrita fuerint, aut ex lacte mulſave: vel anſerinus adeps in paſſo liquatus. Inflammatis autem partibus, poſt vacuationes prædictas, hordei farina cum mulſa decocta imponatur. Ab initio quidem ad-

F mota cataplaſmata nocent, quòd excitatus ab iis calor hauſtum virus detineat, ac principibus partibus impingat: procedente verò deinde tempore adhibita, moleſtiſſi-

V. caret.

Lacuna ex ver. cod. addit, μετὰ τοῦ ὑγροῦ μέλιτος καὶ πίσσης, κριθῆς &c.

mis inflammationibus non mediocriter opitulantur: quippe quæ dolores & leniant & permulceant. Interim vbi corpus calfaciente oleo pręunctum fuerit, in solium demittendum, ibique lauandum: vt per cutem summam quæ corpori noxia inhæserint, etiam excludantur. In summa omne genus excretionis moliri oportet, vt ne perennet affectus, stabilitatémque acquirat. Exhibendæ porrò carnes gallinaceæ & agninæ, porcellorum lactétium, & hœdinæ, eæque maximè pingues ac tenerrimæ & cum lini semine coctæ: siquidé & aluum mollíut, & venenorum acrimonias hebetant. Vinum quoque dulce liberalius hauriendum. Sed prodest insuper thuris cortex, & terra Samia quæ alter appellatur, si quaternæ singulorum drachmæ cum passi hemina vna sumantur. Item pulegium ex aqua tritum, & irinum aut rosaceum cum ruta decoctum: vtiles & teneri vitis palmites cum passo detriti: omnium autem potentissimè auxiliantur antidota, cũ aqua mulsa drachmis quatuor epota.

A πολλὰς φλεγμονάς, παραμυθεῖται καὶ τὰ δήγματα τῶν ἀσπίδων· ἐν ᾧ τούτῳ τῷ καιρῷ ἁρμόζει, τὸ λιπαρὸν ἐλαίῳ θερμῷ λιπῶν τὸ σῶμα, λύειν καὶ διιέναι εἰς ἔμβασιν· ἐκάτω δὲ ἡ ἰατρεία, ἀφ' ὧν ἡ ἐπιφάνεια τὰ ὀπισθεν βαπτέον τῷ σώματι ἐκκρίνειν. καὶ καθόλου πολλοῖς δεῖ χρῆσθαι ταῖς ἐκκρισεσι, πρὸς ὃ μὴ ἔμμονον καὶ κατασκευὴν λαμβάνειν τὴν ἀρρῶστιαν. διδόναι δὲ καὶ κρέα ὀρνίθια καὶ ἄρνεια, δελφάκεια καὶ ἐρίφεια· λιπαρὰ δὲ ταῦτα καὶ ἀπαλώτατα καὶ καθεψημένα σὺν λινοσπέρμῳ· θυκεῖλια γάρ ἐστι τὰ ἀμέλγοντα τὴν δριμύτητα. καὶ οἶνον γλυκὺν τὸν πολύν. ἁρμόζει δ' ἐπ' αὐτῶν καὶ λιβανωτοῦ φλοιὸς, καὶ γῆς τῆς καλουμένης Σαμίας, ἑκάτου < δ'. μετὰ γλυκέος * < ἀ. λαμβανομένη. γλήχων τε μετ' ὕδατος β. φλὶς, καὶ ἴρινον ἢ ῥόδινον μύρον μετὰ πηγάνου ἀφεψηθὲν, καὶ ἀμπέλου ἁπαλοὶ βλαστοὶ μετὰ γλυκέος. δυνατώτατα δὲ πάντων βοηθοῦσιν αἱ ἀντίδοτοι, πινόμεναι σὺν μελικράτῳ πλῆθος < δ'.

Marc. vertit longiore cortice ea quæ scitè carnes, Paul. nescit

Raell legisse videtur μετὰ πηγάνου ἀφεψήματος

Peri Pityocampes. Cap. II.

Ils qui Pinorum erucas hauserunt illico dolor circa os & palatum oboritur, vehemens linguæ, stomachi ac vẽtris inflammatio torquet: intestina quoque ingens dolor excruciat, ac simul etiam interanea pungi & erodi videntur, corpus totũ exæstuat, & fastidium vrget. His succurrendum iisdem remediis, quæ ad Cantharidas deuoratas exhibentur. Peculiariter tamẽ, pro simplici oleo & irino melinum, quod è coroneis pomis & oleo temperatur, vsurpabimus.

Τοῖς δὲ Πιτυοκάμπην λαβοῦσιν βύθιος πόνος περὶ τὸ στόμα καὶ τὸν ὑρανίσκον ἐγγίνεται· φλεγμονὴ τε ἰσχυρὰ γλώσσης καὶ στομάχου καὶ κοιλίας· καὶ ἕτερον πόνος ἰσχυρὸς, ὡς δοκεῖν ὀδάξεσθαι τὰ ἔντερα· πύρωσις τε καθ' ὅλον τὸ σῶμα. Τούτοις βοηθητέον ὁμοίως τοῖς ταῖς κανθαρίσι πεπωκόσιν. ἰδίως δὲ ἐπ' αὐτῶν ἐγκλυστέον αὐτὴν ἐλαίῳ τῷ λιπαρῷ καὶ ἰρίνου τὸ μήλινον, καταζεόμενον ἐν μήλοις κυδωνίοις καὶ ἐλαίῳ.

B

C

D

Marc. vertit longiore cortice ea quæ scitè carnes, Paul. nescit

Raell legisse videtur μετὰ πηγάνου ἀφεψήματος

Aliunt nonnulli, ἀόν.

Peri Bouprestios. Cap. III.

QVi Bupresti n hauserunt, simile quid viroso nitro gustu percipiunt: stomachi verò vẽtrisque vehemẽs dolor insequitur, sed & stomachi ventrisque tumor qualis hydropicis accedit, totius corporis extima facies circunteditur, vrináque supprimitur. His eadem quæ potis cantharidibus auxiliantur. Priuatim autem, post vacuatum corpus, tum vomitionibus tum

Τοῖς δὲ Βουπρήστιν πεπωκόσι, δακεῖ κατὰ τὴν γεῦσιν ὅμοιόν τι βρωμῶδες νίτρῳ· ἐγκολυθεῖ δὲ ἄλγημα στομάχου καὶ κοιλίας σφοδρόν· ὄγκος τε στομάχου καὶ κοιλίας σφοδρὸς, ὁμοίως ὑδρωπικοῖς. καὶ περιτείνεται αὐτοῖς ἡ ὑπιφάνεια ὅλου τοῦ σώματος· τά τε οὖρα ἐπέχεται. Βοηθεῖ δὲ αὐτοῖς ὅσα καὶ τοῖς κανθαρίσι πεπωκόσιν. ἰδίως δὲ ὠφελήσουσι μετὰ τὸ πρῶτον ἐμέτων καὶ τοῦ κλυσμοῦ χιτ-

E

F

G

Nõ habet Paulus.

V. caret.

V. καὶ ἔνιοι τὸ σῶμα.

Addit Ad

θλῶσι, σῦκα ξηρὰ λαμβάνοντες· καὶ ὃ ἀφέψημα δὲ αὐτῶν σὺν οἴνῳ. παρεγκαθίζοντος δὲ τοῦ κατ' ὀξύτητα κινδύνου, ὠφελοῦσι θηβαϊκαὶ βαλάνοις ἐσθίοντες, ἢ λελεασμένας σὺν οἰνομέλιτι ἢ γάλακτι πίνοντες. ἢ ἐψήσαντες ἅπαν τὸ ἦθος ἐσθίοντες, καὶ γάλα γυναικεῖον πίνοντες.

A etiam clystere, sumptis ficubus aridis adiuuantur, itémque earum decocto ex vino. Iam verò aliquantum inclinato affectu decedentéq; periculo, Thebaicarum etiam palmularum cibo, aut earundem tritarum in mulso lactéve potu iuuantur. Pyrorum etiamnum omne genus esse & lac muliebre bibere cõuenit.

Περὶ Σαλαμάνδρας. Κεφ. δ'.

De Salamandra. Cap. IIII.

ΤΟΙΣ δὲ Σαλαμάνδραν λαβοῦσι, πρῶτα γλώσσης φλεγμονή, καὶ διανοίας ἐμποδισμός, καὶ ῥῖγος μετὰ καρηβαρίας ἢ φρίκης ὅλου καὶ ἐκλύσεως· περιοῦται δέ τινα μέρη κυκλοτερῶς αὐτοῖς τοῦ σώματος· ὡς πολλάκις ἐμμείναντα τῷ φαρμάκῳ σηπεδόνα ἀποδρεῖν. ἐφ' ὧν πρὸ πάντων ποιησάμενοι ὅσα ἐπὶ τοῖς καυθαρίσι, ἰδιαίτερον αὐτοῖς προσφέρομεν φάρμακον, ῥητίνην πεύκης, ἢ χαλβάνην σὺν μέλιτι αὐτὴ ἐκλειχθεῖσαν, καὶ χαμαιπίτυος ἀφέψημα σὺν ἐκλεαινομένοις αὐτῇ τραχύλοις· ἢ κνίδης φύλλα συνεψηθέντα χρίνῳ μετ' ἐλαίου. ποιεῖ δὲ ἐπ' αὐτῶν καὶ θηλασίας χελώνης ἢ χέρσαιας ὠμάς, ὁπωσοῦν αὐτῇ ἐψημένας· καὶ βατραχίων ζωμούς, συγκαθεψημένης αὐτοῖς πρυγγίου ῥίζης.

B uenit.

Aldi λειποθυμίαι

Hoc loco, tanquam opportuniore, Cornarius caput de lepore marino rana rubeta & hirudinae inserit.

ΤΟΙΣ δὲ τὸ Ἐφήμερον λαβοῦσιν, ὃ ἔνιοι καλοῦσι κολχικὸν ἢ βολβὸν ἄγριον, παρακολουθεῖ κνησμὸς καθ' ὅλου τοῦ σώματος, ὡς ὑπὸ σκίλλης ἢ κνίδης ἐρεθιζομένοις· τὰ δ' ἔσω σπαδάζονται· καὶ σήπονται δὲ τὸ σῶμα χρόνιοι μετὰ βάρους ἰχωροῦ. ὀπτιμάζονται δὲ τοῖς παροῦσι, καὶ κατὰ χιλίδα φέρεται αἱματώδη, ξύσμασι μεμιγμένα. οἷς βοηθητέον, καθάπερ καὶ τοῖς σαλαμάνδραν πεπωκόσι, διά τε ἐμέτων καὶ κλυσμάτων· πρὸ δὲ παντὸς διαχύσαι τὸ φάρμακον, μεταδοτέον αὐτοῖς δρυὸς τῆς φύλλων ἢ βαλάνων ἢ σικύων ἀφέψημα· ἢ ἑρπύλλου σὺν γάλακτι πίνειν· ἢ πολυγόνου χυλόν, ἢ ἀμπέλου ἀκρεμόνων, ἢ βάτου, ἢ ναρθήκος ἀπαλοῦ τῆς ἐντεριώνης, ἢ μύρτου μέσου οἴνῳ αὐτά· δὲ τὰ μύρτα λεῖα κοπέντα καὶ ἀποθραυσθέντα σὺν ὕδατι βοηθεῖ, τὸ δὲ ἐξ αὐτῶν ὑγρὸν λαμβανομένου. ποιεῖ δὲ ὠ-

C

D

E

F

G

De Ephemero. Cap. V.

SVMPTO Ephemero, quod aliqui Colchicum aut bulbum syluestrem appellant, pruritus in toto corpore excitatur, non secus atque iis quos scilla aut vrtica momorderit, interiora eroduntur, stomachus cũ ingenti grauitate exæstuat. Cæterum inualescente malo, cruenta ramẽtis admista per aluum egeruntur. Hos, æquè ac eos qui salamandram hauserunt, vomitione atque clysteribus adiuuare conueniet: sed anteaquam venenum inualescat, dandum iis decoctum frondium quercus, aut glandium, aut malicorij: aut serpyllum ex lacte propinandum: item succus polygoni, aut virgultorum vitis vel rubi, aut medullæ recentis ferulæ aut myrti cũ vino. Ipsę porro baccæ myrti tusę tritæque & aqua maceratę opem ferunt, siquidem earum dilutũ assumatur. Media castanearũ tunicula

similem effectum præbet, si cruda in aliquo supradictorum succo sumpta retur: origanum quoque cum lixiuio epotum. Eximiè verò iuuantur lacte asinino aut bubulo calido poto, aut in ore retento: támque efficaci remedio, vt quibus copia huiusce lactis adsit, nõ aliud genus auxilij desideretur.

De Doryenio. Cap. VI.

DORYCNION (quod aliqui solanum manicum, hoc est, furiosum appellarunt) epotum, veluti lactis saporem gustui repræsentat, crebros singultus ciet, linguæ humiditatem conciliat, & effusiorem sanguinis reiectionem concitat: ipsi vero potionati mucosa quædã perinde atque dysenterici aluo egerunt. Itaque antequam aliquod ex hisce symptomatis superueniat, auxilio sunt antedicta: vomitus, nunquã, clyster & quæcunque potum venenum expellere apta nata sunt. Priuatim verò iis opitulatur, aqua mulsa, lac asininum aut caprinum, ac dulce vinum, quod quidem tepidũ cum anisõ bibatur, amygdalæ amaræ &, elixa gallinacea, pectuscula. Quin etiam omnis generis cõchylia, cruda pariter ac tosta, esse salutare est. Conueniunt & locustæ marinæ & gammari, ac potum eorundem iusculum.

De Aconito. Cap. VII.

ACONITVM statim inter bibẽdum linguã cũ astrictione quadã dulci sapore imbuit, ac subinde, præsertim cùm assurgere cœperint, vertiginẽ inducit: oculorũ humiditates prolicit, & grauitatem pectori præripit, cum spatiũ multarum eruptione. Proinde venenũ vomitione abigi, aut clystere per aluum subduci opus fuerit. Postmodũ vtemur in propotismatis origano, rutáue aut marrubio cũ vino absinthite: vel absinthij, crucæ, abrotoni, chamelææ aut chamæpityos decocto. Prodest iis etiamnum opobalsami drachma cum melle aut lacte: itémq; castorei, piperis ac rutæ pondus ex vino: & coagulũ hœdi, leporis aut hinnuli cum aceto: vinum quoq; sumptũ, in quo ferri stercus aut ipsum etiã ferrũ, aurum, argentúmve candens restinctum fuerit.

A σαύτως δὲ ὁ τῆ Σαρδωνίων βοτάνων ὑμῶ μένος, ὠμὸς λαμβανόμενος μετὰ νίτρου τῆ ποσειρημένων χυλῶν· ὀξυγάλακτός τε σὺν κονίᾳ πολλῇ ὄσα· ἀκριβῶς δὲ βοηθοῦσι καὶ ὅσοι ἢ βόθροι γάλακτι θερμῷ πίνοντες καὶ κατέχοντες ὀλίγον ἐν τῷ στόματι· ὥς τε τοὺς ὑπερῥύσεις τούτου, ἄλλου μηδενὸς χρῄζειν

B βοηθήματος.

Περὶ Δορυκνίου. Κεφ. ε'.

ΔΟΡΥΚΝΙΟΥ δὲ πόσις, ὃ ἔνιοι τρύχνον μανικὸν ἐκάλεσαν, τὸ μὲν γεῦμα ὅμοιον παρέχεται τῷ γάλακτος ποιότητι ἐν τῷ στόματι, καὶ λυγμοὶ συνεχεῖς, γλώττης τε ὑγρότης, καὶ αἵματος ἀναγωγὴ ἀφθόνου· κατὰ Paulus Ægin.

C χιλίαν δὲ αὖθις μυξώδη φέρεται, ὡς ὅτε δυσεντερικῷ. οἷς βοηθεῖ, πρὸ τῆς τούτων ἐπιγενομένης, ἃ καὶ τοῖς ὑπεξειρημένοις· ὅ, τε ἔμετος καὶ τὸ κλυσμα, καὶ ὅσα δύναται τὸ πόσει ἐκκρίναι φάρμακα ἅπαν. ἰδίως δ' ἐπ' αὐτῶν βοηθεῖ τὸ μελίκρατον, ἢ ὄνειον ἢ αἰγεῖον γάλα, καὶ γλυ-

D κεῖ οἶνος χλιαρὸς μετ' ἀνίσου πινόμενος· καὶ ἀμυγδάλαι πικραί, σὺν τῷ ὀρνίθια καθεφθημένα· ἅπαντα τὰ κογχύλια ὠμὰ δὲ ὀπτὰ ἐσθιόμενα, καὶ καράβοι, δὲ ἀφανεῖς, δὲ ὁ ἐξ αὐτῶν ζωμὸς πινόμενος. Add. Paulus, ἐλίχνου

Περὶ Ακονίτου. Κεφ. ζ'.

ΤΟ δὲ ἀκόνιτον εὐθέως ἅμα τῷ πιεσθαι γλυκαίνει τὸ γλῶσσαν μετά

E τινος ὑφάσεως· καὶ ἔπειτα γλυκασμοῦ σκοτοδινίαν, καὶ μάλιστα ἐὰν ἐξανίσῃ, καὶ ὑγρότητας ὀφθαλμῶν ὑποφερὲς βάρος τε θώρακος καὶ ὑποχονδρίου, μετὰ τοῦ πολλὰ πνεύματα ἀποδίδοσθαι. ἐφ' οἷς δὲ ἐμέτων ἐκκομισθῆναι δεῖ τὸ φάρμακον, ἢ διὰ V. in clyster.

F κλύστηρος καθαρθῆναι τὴν κοιλίαν. χρησόμεθα δὲ παρόμοιον ὀρίγανον, ἢ πήγανον, ἢ θρασίον· ἢ ἀψινθίῳ ξέμασι μετ' ὄξους ἀψινθίου· ἢ ἄειζόῳ, ἢ ἀβροτόνῳ, ἢ χαμελαίᾳ, ἢ χαμαιπίτυος· ἁρμόζει δὲ αὐτοῖς τὸ ὀποβαλσάμου ὀλκὴ ἐ. σὺν μέλιτι ἢ καὶ καστορίῳ δὲ πεπέρεως δὲ πηγάνου ἴσος ὁλκὴς σὺν οἴνῳ. δὲ πῖαρ ἔριφου, ἢ λαγωοῦ ἢ νεβροῦ σὺν ὄξει. δὲ σιδήρου σκωρία, ἢ αὐτὸς ὁ σίδηρος, ἢ χρυσός, ἢ ἄργυρος πεφύκοτος ἐν οἴνῳ σβεσθέντα, τοῦ ὑγροῦ λαμβανομένου.

Forte δ' ὁ V. hinc caret δ καὶ ὑγρ. δ καρδίου.

Goup. Legitur in veter. b ὁ καρδίου μετ' οἴνου. δ ἀψινθίου δ' ἄειζόου, δ ἀβροτόνου, δ χαμελαίας δ' χαμαιπίτυ. vt Hermolaus legit. Idemque Paulus.

Paulus eadem recitans.

κονιάτε σὺν οἴνῳ καὶ ὄρνιθι καθαφθεῖσα, ἢ χρεῶν λιπῶν βοείων ζωμὸς λαμβανόμενος σὺν οἴνῳ. Λέγεται δὲ καὶ ἡ χαμαιπίτυς ἰδίως ἐπ' αὐτῶν ἁρμόζειν· ἔστι δὲ Ἡρακλεία τῇ Ποντικῇ, ὅθεν καὶ τὸ ἀκόντιον ἡμεῖς φαμεν, ὁλόκληρος, Ἀθηναῖοι δ' Ἰωνικὰ καλεῖται, ἐν Εὐβοίᾳ σιδηρίτης.

Cod. Matth. ἔστι

Palat. Acodes vertitur: ὃ δὲ Ἀθηναῖος Ionica

Περὶ τῆς ἐν Ἡρακλείᾳ μέλιτος. Κεφ. ρ'.

Ὅμοια δὲ πάσχουσι καὶ οἱ ἐν Ἡρακλείᾳ τῇ Ποντικῇ τὸ μέλι ἡμιόμβροι φαγόντες ἢ πίοντες. ἐφ' ὧν ἁρμόζει τὰ αὐτὰ ὡς ἀκονίτῳ εἶσι· δι' ὀλιγοήμερα, μᾶλλον ὠφελούμενοι ὑπὸ οἰνομέλιτος, συνεχῶς αὐτὸ πίνοντες, μιγνυμένων αὐτῷ πηγάνου φύλλων.

Palat. cod. mutat

Sic & Actius. at Pa. lus habet, ὀλιγοήμερα. Pal. cod. μιγνυμένων.

Περὶ Κορίου. Κεφ. β'.

Τὸ δὲ Κόριον λαθεῖν μὲν οὐ δύναται δι' ὅλου τοῦ ὀσμῆ. πολὺ δὲ τῇ φωνῇ διαστρέφει, ἐς μανίαν ὀπτιφέρει ὁμοίαν τοῖς διὰ μέθης βλαβεῖσι μετ' ἀκρασίας· καθ' ὅλου δὲ τοῦ σώματος αὐτοῦ ἡ ὀσμὴ διαφαίνεται. Βοηθεῖ δὲ αὐτοῖς μετὰ τὸ ἐξαιρεθῆναι διὰ τῆς ῥίνος ἔλαιον, ὡς προεῖπον, ἔλαιον σὺν ἀψινθίῳ πιόμενον ἢ καθ' ἑαυτό, ἢ ἔλαιον ἰσάτει κεχυθὲν ὀπτὰ αὐτό, ἢ χλιδῶντα σὺν ὄξυμελι ἢ ῥοφήματα ἢ ὄξυμελι δὲ πινόμενον, ἐς ζωμοὺς ὀξυμυρεῖς ἔκ τε ὄρνιθος ἐς χοίρους γλυκύς τι σὺν κρόκῃ παραλαμβανόμενος.

Gesn. alter lectum, quam scripserat Hermolaus retinet. Sic & Paulus.

Paulus, τῷ ἐλαίῳ ἰσχυρῷ. Deest in Ald.

Paulus & Aëtius non habent.

Paulus, aut Sextus Marcel. dixerit

Περὶ Ψυλλίου. Κεφ. γ'.

Καὶ ὁ ψύλλιον δὲ καλούμενον πολὺν ὀπτιφέρει ψύξιν ὅλου τοῦ σώματος, καὶ παρχὴν μετ' ἐκλύσεως καὶ ἀδημονίας. ᾧ βοηθεῖ πόματα ὅσα τοῖς κόριον πεπωκόσι.

Paulus, ἢ καὶ σὺν σίκυι Matth. cod. mutatus

Περὶ Κωνείου. Κεφ. δ'.

Κώνειον δὲ πολὺν ὀπτιφέρει σκοτώματα καὶ ἀχλύν, ὥς τι μηδὲ ἐπ' ὀλίγον βλέπειν λυγμόν τε καὶ ἀφωνίας παραφορὰν, καὶ ψύξιν ἄκρων· ὀπτὰ τέλει δὲ ἀσώμβροι πίπτουσι, φασὶν ἀσφυκτιῶντος δηλαδὴ κατὰ τὴν ἀρτηρίαν πνεύματος. καταρχὰς μὲν οὖν, ὡς καὶ ὀπτὶ τῶν ἄλλων, ἀφ' ὧν ἐμέσαι αὐτὸ κωλυόμεθα· ἔπειτα κενώματι χρησάμενοι, ὃ εἰς τὰ ἔντερα παραλιθηκὸς ἐκ χρυσόμυκα· τότε ὡς ὀπτὶ μέγιστον βοήθημα ὀπτὶ τὴν ἀκρατοποσίαν παραγνόμενα·

Conferunt & lixiuia cum vino; & gallinacei decocti, præpinguiúmve bubularum carnium iura cum vino sumpta. Fertur & chamæpitys priuatim iis subuenire: quæ quidem in Heraclea Ponti, vbi & aconitú nascitur, holocleros, Athenis Ionia & in EVbœa sideritis appellatur.

De melle Heraclio. Cap. VIII.

QVi mel quod in Heraclea Ponti gignitur ederint biberintve, nõ secus afficiuntur, quàm qui aconitũ hauserunt, atque adeò iis eadẽ quæ poto aconito conueniunt. Facilè verò succurritur: quippe cùm adiuuentur frequẽti vini multi potu, cui folia rutæ admixta sint.

De Coriandro. Cap. IX.

CORIANDRVM propter odorem latere non potest: epotú vocis raucitatem facit atq; insaniam, qualis ex vinolentia proficiscitur, ita vt qui sumpsêre varia dictu pudenda blaterent: toto verò corpore coriandri odor sese prodit. His post vomitionẽ oleo ſtimo concitatam, vti retulimus, merum aut per se, aut ex absinthio potum auxiliatur: itẽ oleum quàque in eo exinanita, si tepefacta cũ muria sorbeantur. Sic & epota mútia; & ius salsum gallinæ & anseris: passum quoque cum lixiuia sumptum.

De Psyllio. Cap. X.

QVOD Psyllium dicitur epotũ, corpori toti frigus & torporem infert, cũ exolutione & animi quadam ægritudine anxietatéve. Huic omnia quæ hausto coriandro auxiliantur.

De Cicuta. Cap. XI.

CICVTA pota vertigines excitat & oculis caligines offundit, ita vt ne tantillum quidem cernatur: singultus etiam ciet, ac mentis alienationem & extremorum artuum perfrictionem infert. Tandem ægri conuulsi arteriæ spiritu intercepto strangulãtur. Quare inter initia, vti in reliquis, cicutam vomitu excitiemus: postmodum deiectionem moliemur, vt quod ad intestina prolapsum fuerit excernamus. Tum demum ad meri potionẽ, ceu præsentissimũ auxiliũ, deuenietnus:

ídque interiectis interuallis, in quibus proderit lac asininum aut bubulum potui datũ, aut ablinthium cum pipere & vino: ité castorium, ruta, métaq; cum vino, aut amomi, cardamomi vel styracis drachmas aut piperis cum semine vrticæ ex vino, aut denique lauri folia. Prętereà laserpitij succus ex oleo & passo. Sed & vinum dulce per sese largiùs potum egregiè auxiliatur.

A διδόντες μέλιτος ξὺν ὄξυγλύκι, ἐν οἷς πίνειν δεδόσθω βοηθεῖ γάλα ὄνειον, ἢ ἀψίνθιον μετὰ πεπέρεως καὶ οἴνου, καὶ καστορίου καὶ πηγάνου καὶ ἡδυόσμου σὺν οἴνῳ, ἢ καρδαμώμου ἢ στύρακος, ἢ πεπέρεως μετὰ κεδρίδος σπέρματος σὺν οἴνῳ, ἢ δάφνης τὰ φύλλα. ὁμοίως τε σιλφίου ὀπὸς σὺν ἐλαίῳ καὶ γλυκεῖ. B ὁ γλυκὺς οἶνος δι' ἑαυτὸν πολὺς πινόμενος, ἰκμαίνει ἀρμόζει.

Pau'us, πεπέρεως αὐτοῦ

V. non legit.

Paulus, τὰ ἀνθηλα φύλλα

De Taxo. Cap. XII.

QVÆ Smilax dicitur, à quibusdam thymium & a Latinis taxus appellatur. Pota frigus vniuerso corpori, strangulatus & celerem interitum infert. Huic eadem quæ cicutæ conueniunt. C

Περὶ Σμίλακος. Κεφ. ιϛ'.

ΗΔΕ καλουμένη Σμίλαξ, ὑπ' ἐνίων δὲ θύμιον καὶ τοῦδε Ρωμαίοις ταξον, ποθεῖσα ὀπτιφέρει ψυξιν καθ' ὅλου τοῦ σώματος, καὶ πνιγμὸν, ὀξεώτερ θανάσιμον. οἷς δὲ δοκεῖ πάντα ἃ τοῖς τὸ κώνειον πεπωκόσι.

De Taxo in antiquo capite tantum est.

De Carpasi succo. Cap. XIII.

EPOTVS quoque Carpasi succus soporem inducit, ac repentinam strangulationem infert. Adiuuantur itidem qui hunc hauserunt epotæ cicutæ remedijs.

Περὶ Ὀποῦ καρπάσου. Κεφ. ιγ'.

ΚΑΙ ἐκ τῆς Καρπάσου ὀπὸς πολεῖς, κεῖσθαι ὀπτιφέρει καὶ πνιγμὸν ὀξύν· βοηθοῦνται δὲ καὶ οὗτοι, ὑφ' ὧν καὶ τὸ κώνειον πεπωκότες.

Paulus, καρπασίας

V. non habet.

De Sardonia herba. Cap. XIIII.

SARDONIA herba, quæ ranunculi species est, in cibo potúve sumpta, mentẽ e statu suo dimouet, & conuulsiones facit cum rictu labiorúmve contractione, quæ risus speciem præbeat: hinc de Sardonio risu adagiũ in vulgº infausto omine manauit. Post vomitũ peculiariter conuenit pota liberalius aqua mulsa, itémque lac: necnon & irrigatio vnctióq; totius corporis per calfacientia medicamenta, prætereáque soliuin ex hydreleo calente: ita tamen vt post egressum è solio illitibus ac frictionibus minimè parcatur. In summa curationem omnem quæ conuulsioni adhibetur exequi oportet. D E F

Περὶ Σαρδωνίας πόας. Κεφ. ιδ'.

ΗΔΕ Σαρδώνιος λεγομένη πόα, βατραχου εἶδος οὖσα, ποθεῖσα ἢ βρωθεῖσα, ἢ παραφορὰν ἀφροσύνης ὀπτιφέρει καὶ ἀνάσπασμα μετὰ συντολικῆς χλεύων, ὥς τε γέλωτος φαντασίαν παρέχειν· ὑφ' ἧς ἀφροσύνης καὶ ὁ Σαρδώνιος γέλως ἐκ βιαίμου ἐς τὸν βίον καταμέμληται. ἐφ' ὧν ἰδίως ἢ μετὰ ἔμετον, ἀρμόζει μελίκρατον πολὺ διδόμενον καὶ γάλα· ἐμβρεχὴ τε καὶ λιπασμὸς ὅλου τοῦ σώματος ἀφ' θερμαντικῶν φαρμάκων, καὶ ἐμβάσεις δ' ὑδρελαίου θερμοῦ. καταλείφειν μὰν τοι ἰκμαίνοντα δεῖ καὶ αἰανεῖβειν μετὰ τὴν ἔμβασιν αὐτοῖς. καθόλου δὲ, ὡς περὶς ἀπασμὸν, ὅλῳ τῷ θεραπείαν δεῖ ποιεῖσθαι.

Scribo.

V. carere.

De Hyoscyamo. Cap. XV.

HYOSCYAMVS in potu cibóve sumptus, qualem ebriorum mentis errorem seu alienationem infert: sed facilè medicamentis cedit. Auxiliatur aqua mulsa copiosè data, lácque præsertim asininum: si id desideretur, caprinum vel bubulum, aut arídarum ficuum decoctum. Faciunt ad id etiam nuclei pinei, cucumeris semen ex passo sumptum, & vinum sal- G

Περὶ Υοσκυάμου. Κεφ. ιέ.

ΥΟΣΚΥΑΜΟΣ δὲ πολεῖς ἢ βρωθείς, παραπλησίως τοῖς μεθύουσιν ὁμοίαν ὀπτιφέρει· ἔστι δὲ εὐίατος, βοηθούμενος μελικράτῳ πολλῷ πολυζωμένῳ, καὶ γάλακτι μάλιστα ὀνείῳ· εἰ δὲ μή γε, βοείῳ, ἢ σύκων ξηρῶν ἀφεψήματι· ποιοῦσι δ' ἐπ' αὐτῶν καὶ κρόκιλοι, καὶ ὁ σικύων σπέρμα σὺν γλυκεῖ λαμβανόμενον, καὶ ἄλμυ-

G. locum hic ita legendum ex vet. libris & interpretibus. si δὲ μὴ γε, ἢ βοείῳ.

V. τῷ γλυκαντῖ

ἐὰς οἶνος σὺν σίκῃ ὑείᾳ νεαρῷ, καὶ γλυκεῖ σὺν ὕδατι, καὶ κρίδης σπέρμα ὁμοίως, ἢ νίτρον σὺν ὕδατι. ἁρμίζει καὶ κιχώριον, καὶ νᾶπυ, καὶ κάρδαμος καὶ ῥαφανος ἐς χρόμμυα, καὶ σκόροδα, ἕκαστον τούτων σὺν οἴνῳ λαμβανόμενον. κοιλιάζει δ' αὐδὶς αἰαγκάζοντι δεῖ, ὥσπερ καὶ τὸν οἶνον πίνοντες.

Vicetr.

Vithon legit.

A sum cum adipe suillo recenti passóque: itidem vrticæ semen aut nitrũ ex aqua. Conueniunt & cichorium, sinapi, nasturtium, raphanus, cepa & allium, quorum singula ex vino sumi par est. Verum postea sinendi quiescere, quemadmodum qui vinum biberunt, vt excoquant.

Περὶ Μανδραγόρου. Κεφ. ις'.

De Mandragora. Cap. XVI.

B

ΜΑΝΔΡΑΓΟΡΑΣ δὲ πολύτος, διαχέως καὶ ἐς ἐπακολουθεῖ, καὶ ἔκλυσις καὶ ἀφορά τε ἰσχυρὰ καὶ μηδὲν διαφέρουσα πάθους τοῦ λεθαργικοῦ λήθαργου· φθάρο τοῦ δὲ πρώτων συμβαίνει, ἁρμόζει ὄ, τε ἔμετος καὶ μελίκρατον, καὶ μετὰ τοῦτο καὶ νίτρον καὶ ἀψίνθιον σὺν γλυκεῖ ἢ οἴνῳ γλυκαζοντι λαμβανόμενα. καὶ ἡ τῆς κεφαλῆς ἐμβροχὴ διὰ ῥοδίνου καὶ ὄξους· καὶ διέγαρσις δὲ ἐς κίνησις τοῦ σώματος. ἐς ἢ δὲ ὀσφραντικῷ καὶ βύπατος εἶα καὶ πιπέρεως καὶ νάπυος, καὶ καυτηρίᾳ καὶ πηγάνου ὄξει τετριμμένων· καὶ πίσης ὑγρᾶς, καὶ τῶν καιομένων καὶ ἐσβεσμένων ἐλλυχνίων δυσανακλήτως δ' αὐτῶν ἐχόντων, ἐς πλαρμικὰ ἐπαγῶν, καὶ τοῖς ἀγροῖς κινοῖς βοηθήμασι χρῆσθαι καὶ ὅτι τούτων.

Paulus, καὶ μετὰ τούτων μελίκρατον καὶ ἱερ.

C

MANDRAGORA si bibatur, cõfestim sopor insequitur, exolutio, ac vehemens veternus nihil distas à lethargo. Huic, anteaquam quidquam ex iis accidat, vomitus proderit & aqua mulsa: postea nitrum & absinthium ex vino dulci aut passo sumantur. Caput rosacco & aceto perfundatur. Proficit etiãnum excitatio & agitatio corporis: itémque olfactus tritorum in aceto euphorbij, piperis, sinapeos, castorij ac rutæ, prætereáque odor picis liquidæ & fumculi lucernarum, quæ vicissim accendantur & extinguantur. Quòd si ægrè ij reuocentur, etiá adhibere quæ sternutamẽta cieant, aliísque eiusmodi communibus auxiliis vti conueniet.

Περὶ Μήκωνος ὀποῦ. Κεφ. ιζ'.

De Papaueris liquore. Cap. XVII.

D

ΜΗΚΩΝΟΣ δὲ ὀποῦ πολέντος, παρακολουθεῖ καὶ καταφορὰ μετὰ καὶ καταψύξεως καὶ κνησμοῦ ὀπίτε πλείονος. ὡς πολλάκις συμβαίνοντος τοῦ φαρμάκου ὀπίσω διὰ τοσοῦτον κνησμὸν, ὡς τε διαλύεσθαι ὑπ' αὐτοῦ ὁσμή τις τοῦ φαρμάκου δι' ὅλου τοῦ σώματος ἐκδίδοσθαι. ὡς βοηθεῖ μὲν τὸ ἔλαιον ἔμετον, ἐς κλυσθῆναι δριμεῖ κλύσματι, ὀξυμέλιτι σὺν ὑσσῷ πινόμενον, ἢ μέλι σὺν ῥοδίνῳ θερμῷ. καὶ ἄκρατος πόλις σὺν ἀψινθίῳ ἢ κινναμώμῳ, ἢ ὄξος θερμὸν καθ' ἑαυτὸ πόσιν τε σὺν ὕδατι καὶ ἐλαίῳ σὺν κνίδι, πηγάνου τε ἀγρίου σπέρμα σὺν πιπέρει καὶ οἴνῳ ἐς πῶμα, πιπερί τε μετὰ καταῤῥίου καὶ ὀξυμέλιτος, ἢ μὲν δυμβρας ἢ ὀριγάνου σὺν οἴνῳ δεῖ· ἐς ταύτοις διαλείφειν τοῖς ὀσφρασιχθῆς καλυμένοις, καὶ ἐμβιβάζειν εἰς θερμὸν καὶ πυριᾶν διὰ τὸ ἐπιγινόμενον κνησμόν. οἱ πόσῳ αὐδὶς καὶ μετὰ τὸ λουτρὸν χρῆσθαι ζωμοῖς λιπαροῖς, μετὰ οἴνου ἡ γλυκέως· καὶ μυελὸς δὲ μετ' ἐλαίου πινόμενος.

Paulus, καὶ

Add alia ex editionibus. Sic Aeg.

E

F

G

EPOTO Papaueris liquore, consequitur veternus cum perfrictione & pruritu vehementi. Quin sæpenumero inualescente veneno tanta oboritur prurigo, vt hominem excitet: odor verò medicamenti toto sese prodit corpore. Post citatá oleo vomitionem, infusúmq; clysterem acriusculũ, auxiliatur acetum mulsum cum sale potum, aut mel cum rosacco calido. Item merum copiosum cum absinthio & cinnamomo, aut calidum per sese acetum: nitrum quoque ex aqua, & origanum cum lixiuio aut passo: syluestris rutæ semen cum pipere, vino & panace: ac piper etiam cum castorio & aceto mulso, aut cum saturciæ vel origani decocto, addito vino. Sed & hos odoramentis seu olfactorijs excitare, & in calidæ solium mittere, ac fouere oborţe prurigínis ratione oportet. Proderit autem à balneo iusculorum pinguiú vius ex vino aut passo, ac medulla etiam ex oleo pota.

De Cor-

De Corniculato papauere.
Cap. XVIII.

QVOD papauer Corniculatum appellat, & potu & cibo eadem ſymptomata inferre conſueuit, quæ papaueris ſuccus: ac iiſdem quoque expugnatur auxiliis.

De Pharico. Cap. XIX.

QVOD Phariсum vocant, ſapore quidem ſylueſtre nardum planè imitatur: infert verò potũ neruorũ reſolutionẽ cum delirio & conuulſione. Sed oportet poſt conciratam vomitionem vinum abſinthite potui dari, cum cinnamomo aut myrrha, aut nardo Gallico, quod ſaliuncã aliqui vocauerunt, aut ſpicæ nardi drachmas duas & myrrhę totidẽ obolos ammixto paſſo, aut irin cum croco in vino. Deraſo verò capiti adhibenda hordeacea farina cum ruta trita & aceto.

De Toxico. Cap. XX.

TOXICVM ex eo appellatum creditur, quòd Barbarorum ſagittæ eo illinerentur. Qui biberunt, haud ita multò pòſt labiorũ & linguæ inflammatione prehenduntur, iiſque furor mẽtis incoërcitus varias imagines obuerſat: quare vix medicinæ locus eſt, raróque qui hauſerunt incolumes euadere contingit. Vinculis attamen cohibendi, vt vinum dulce cũ roſaceo bibere, protinúſq; reuomere, ac rapi quoq; ſemen ex vino haurire cogãtur. Priuatim verò iis conuenit quinquefolij radix, itémq; hircinus ſanguis, aut caprillus eodem modo ſumptus: proficit & roboris, fagi aut ilicis cortex cum lacte tritus. Proſunt etiam mala cotonea in cibo ſumpta, aut trita cum pulegio & aqua bibita. Amomum denique benefacit, vt & balſami ſemen ex vino. Quòd ſi qui periculis defuncti ſunt, longo tamen tempore in ſtratis decumbunt: ac vbi ſurrexêre, ſui impotes ac velut attoniti reliquum vitæ tempus tranſigũt.

De Ixia. Cap. XXI.

IXIAS, qui & Vlophonon appellatur, inter potandum quiddam tum odore tum ſapore ocimo ſimile repræſentat: vehementem autem linguæ inflammationẽ ac mentis alienationem inducit,

A Περὶ Μήκωνος κεφαλίτιδος. Κεφ. κθ'.

Η ΔΕ λεγομένη κεφαλῖτις μήκων, ὁ δὲ τοῦ βρωθῆναι ἢ πολιῦσαι τὰ αὐτὰ φέρουσα τοῦ ὀπὸς τῆς μήκωνος συμπτώματα, τοῖς αὐτοῖς βοηθήμασιν ἰᾶται. Περὶ Φαεικοῦ. Κεφ. λ'.

ΤΟ ΔΕ καλούμενον Φαρικὸν τῇ μὲν ὀσμῇ παρὰ πᾶσαν ταῖς δυνάμεσιν ἔοικεν. ὀπιφέρει δὲ καὶ διάλυσιν πολλὴν μετὰ καταδοχῆς καὶ ἀσπασμοῦ. δεῖ δὲ μετὰ τὸ ἐξερεύσαι αὐτοὺς, ποτίζειν οἶνον ἀψινθίτην, ἢ σὺν κινναμώμῳ ἢ σμύρνῃ ἢ ναρδῷ Κελτικῇ, λίτρας ἑνὸς στείβοντα ἐπ' ἀλέσαντα· ἢ ναρδοστάχυος ὁλκὰς β'. καὶ σμύρνης β'. ὀβολοὺς μεμιγμένους σὺν γλυκεῖ, ἢ ἴριν μετὰ κρόκου σὺν οἴνῳ· δεῖ δὲ καὶ καταπλάσσειν τῇ κεφαλῇ αὐτῶν ξυρήσαντας, κριθίνῳ ἀλφίτῳ σὺν πηγανίῳ λείῳ καὶ ὄξει.

Περὶ Τοξικοῦ. Κεφ. λ'.

ΤΟ ΔΕ Τοξικὸν δοκεῖ μὴ ἀνομάσθη, ἐπὶ τῷ τὰ τόξα τῶν Βαρβάρων ἐπ' αὐτῷ χρίεσθαι. τὸ δὲ σχολυδεῖ δὲ τοῖς πεπωκόσι χλιαίνει καὶ γλώσσης φλεγμονὴ μανία τε ἀκαταγέλαστος ποικίλαις ὑπερβάλλουσα φαντασίαις· ὡς καὶ δι' αὐτὸ δυσπαθεῖς εἶναι τὸ μεγαπίαις· σωθῆναι δὲ ὀλίγους αὐτῶν τοὺς πεπωκότων. δεῖ μὲν τοὺς συνεχῆ αὐτοὺς δεσμοῖς, ἀναλημπτέον τε διαζωμένους γλυκεῖ οἴνου σὺν ῥοδίνῳ πίνειν, καὶ ἕλκειν· τό τε τῆς μαλάβης κυδώνια ἐσθιόμενα ἢ λεπαίου γλήχωνι καὶ ὕδατι πινόμενα, ἄμωμόν τε καὶ βαλσάμου κάρπιος σὺν οἴνῳ. καὶ εἴ τινες αὐτῶν φύγοιεν τὸν κίνδυνον, πολλὸν χρόνον κλινοπετεῖς διαμένουσι, καὶ αἰσθανόμενοι ἐπιπονώτεροι τὸν λοιπὸν χρόνον διάγουσιν.

Περὶ Ἰξίου. Κεφ. λα'.

ΙΞΙΑΣ δέ, ὃς καὶ ὀυλόφονον καλεῖται, ὁ τοῦ πίνεσθαι ὀσίον τι ὀχίμῳ κατὰ τὸν ὀσμὴν καὶ τὴν γεῦσιν ἐμφαίνει. ὀπιφέρει δὲ γλώσσης φλεγμονὴν ἰσχυρὰν καὶ παραφροσύνην·

καὶ ἐπιρίσεις ὑπέχει πάσας. βορβορυγμοὺς τε καὶ φόφους μετὰ λειποθυμίας ὑπιφέρει δίχα τοῦ προχωρῆσαι τι. Βοηθεῖ δὲ αὐτοῖς μετὰ τὸ ἐξεμεῖσαι ὃ πλεῖστοι, ἢ μετὰ τὴν τελεωτέραν λυσιτελοῦσαν, πινόμενον ἀψινθίου ἀπόβρεγμα σὺν οἴνῳ πολλῷ, ἢ ὀξυμέλιτι· πηγάνου τε ἀγρίου σπέρμα, ἢ σιλφίου ῥίζα· ὁμοίως τε τραγορίγανου ἀφέψημα σὺν τινι τῶν προειρημένων ἢ γάλακτι, ἢ περιβινθίνῃ ῥητίνῃ· ἢ νάρδου, ἢ καστορίου, ἢ σιλφίου, ἑκάστου ὀβολὸς σὺν οἴνῳ. Δημόζεται δὲ καὶ ὁ τῆς βασιλικῆς κεφαλῆς κεφαλὴ λεῖοι σὺν ῥητίνῃ καὶ καστορίῳ καὶ πηγανίῳ, ἑκάστου < ά. ὁμοίως χαμελαίας < β'. ἢ ἀψινθίου χυλοῦ < β'. σὺν μελικράτῳ ἢ ὄξει πολλῷ πινόμενον.

Vel πηγανου

Addit Gelenius ex lib. Δ' περὶ φαρμάκων, ἃ οἱ βάρβαροι Paul. σὺν οἴνῳ ὀβολὸς ἑκάστου

Περὶ Ψιμμυθίου. Κεφ. κβ'.

ΤΟ δὲ ψιμμύθιον λαθεῖν οὐ δύναται μόνον τὸ χρῶμα. ἐκνυούσης γὰρ λιφθέν, λευκαίνει μὲν οὐρανίσκον καὶ οὖλα, καὶ τοὺς γλωσσήματα καὶ τὸ μεταξὺ τῶν ὀδόντων. Ὑπιφέρει δὲ λιγμοὺς καὶ βῆχα καὶ γλώττης ξηρότητα, καὶ ψύξιν ἀκροτηρίων μετὰ δυσκινησίας καὶ δυσκινησίας. οἷς βοηθεῖ μελίκρατον διδόναι, ἢ σύκων ἢ μαλάχης ἀφέψημα, ἢ γάλα θερμὸν ἢ σήσαμον λεῖον μετ' οἴνου, ἢ κονίαν κληματίνην, ἢ ἁλμαρίκινον ἔλαιον ἢ ἴτεινον, ἢ Περσικῶν καὶ ὀσᾶ. προεκτρῶν δὲ ὠὰ σὺν λιβανίῳ ἢ κριθίνῳ ἀφεψήματι, ἢ κοκκυμήλοις, ἢ κόμμει πελέας, ἢ τὸ ἐν τοῖς φύλλοις τῆς πελέας ὑγρὸν μετὰ χλιαροῦ ὕδατος. ἁρμόζει δὲ ἐπ' αὐτῷ καὶ θαψίας χυλὸς, ἢ σκαμμωνίας ὀπὸς, σὺν μελικράτῳ πινόμενα. Περὶ Μυκήτων. Κεφ. κγ'.

Cornarius ἀ restituit ex Paulo.

C. hæc verba ita restituit ex antiquis codicib⁹ & interpretib. ὁ δὲ σπόνδυλος τὸ ἐπὶ σὺν ἀρκεῖον ἀφεψήματι, vti & legitur apud Paulum.

al. σὺν κρίνου ἀφεψήματι

Lac. legit. in v. c. Ι κακοχυμίαν ἐν ἕξεσιν καρκίνου

Add in quibusdã codicibus ἐμέτου τοῦτον δέ.

Addit Lac. ex v. cod. ἀφαίρεσιν quod etiam habetur apud Paulum.

ΜΥΚΗΤΩΝ δὲ ἁπλῶς, τὰ ὀλίγα βλαπτικώτατα, ἁπλῶς δὲ, τὰ πλεῖστα. ὑπιφέρουσι δὲ πάντες πνιγμοὺς ἐοικότας ἀσθμαίνουσιν. οἷς οὐδέπω βοηθεῖν δεῖ κοινῶς, ἀναλαμβάνοντας ἐμεῖν δι' ἐλαίου· θαυμαστῶς δὲ ὠφελοῦσι πίνοντες κονίαν κληματίνην, ἢ ὀξυκράτου καὶ ἁλῶν ἢ νίτρου. καὶ σὺν ἐφόμβῳ δὲ αἱ ἀγρίαδες ἢ τὰ φύλλα τοῖς μύκησιν, ἀφαιροῦσι τὸ πνιγώδες αὐτῶν· ἐσθιόμενα δὲ, ὠφελοῦσι.

C. In altero addita est hæc vox ἀποστρεπτικὸν huic luæ.

Paulus ἀσθμαίνουσι τε

& excretionũ genus omne ſupprimit: murmura inteſtinorũ ac rugitus cum animi deliquio ciet, quãuis nihil interim egeratur. Poſt eductã vomitionibus maiorẽ veneni portionem, aut poſt alui deiectionem, auxilium præſtat abſinthij dilutum ex vino largiore aut aceto mulſo bibitum, nec minùs rutę ſylueſtris ſemen aut laſerpitij radix: itẽ tragorigani decoctum cum aliquo ſupradictorum, aut lacte, aut reſina terebinthina: nardus etiam aut caſtorium aut laſer, ſingulorum inquam obolus ex vino. Quin & conueniunt nucum iugladium nuclei triti cum reſinæ, caſtorij & rutæ, ſingulorum drachma vna. Itidem chamelęę aut ſucci thapſiæ oboli duo cum aqua mulſa: & acetum calens largius epotum.

De Ceruſſa. Cap. XXII.

CERVSSA clam exhiberi nequit: ſiquidem ſuo ſeſe colore prodit. Vltrò verò ſumpta, palatum, gingiuas, linguam ac ipſas dentium commiſſuras cãdore quoda inficit: excitat autẽ ſingultus, tuſſim & linguæ ariditatem, extremorũmq; refrigerationem, cum mentis alienatione ac motus difficultate. His dare conuenit aquam mulſam, aut ficuum vel maluæ decoctum, aut lac calidum, aut ſeſamum ex vino tritum, aut lixiuiam è ſarmentorum cinere factam, aut amaracinum irinũmve oleum, aut Perſicorum nucleos cum hordei decocto, aut thus, aut gummi prunorum, aut humorem qui in folliculis vlmi continetur ex aqua tepida. Hiſce præſidiis vomitus euocetur. Conuenit etiam thapſiæ ſuccus aut ſcãmonij liquor, ternis obolis ex aqua mulſa potus.

De Fungis. Cap. XXIII.

FVNGORVM alij toto genere, alij maiore copia nocent: omnes tamen ſpiritus via quaſi laqueo intercluſa præfocant. Quare confeſtim communi auxilio ſuccurrendum, ſcilicet oleo citata vomitione. Mirificè verò iuuat lixiuia ſarmentitia, aut è pyraſtri ligno, cum poſca & ſale aut nitro epota. Sed & pyraſtri fructus aut folia cum fungis decocta, ſtrangulandi vim illam auferunt, eſiratáq; eadem auxiliantur.

Iuuat & ſtercus gallinaceum cũ poſca bibitum, itémque ariſtolochiæ, aut abſinthij drachma vna cum vino: inſupérque etiam mel ſeu in cibo ſumptum, ſeu ex aqua potum. Sic & apiaſtrum cum nitro, panacis radix & ſemen in vino: fęx quoq; vini cremata cum aqua, & atramentum ſutorium ex aceto: denique radicula, ſinapi aut naſturtiũ eſu proſunt.

De Gypſo. Cap. XXIIII.

GYPSVM ſtrãgulationem infert, dum intra ventriculum lapidęſcit: quare & eadem quæ aduerſus fungos valent auxilia, prætereáque maluæ decoctũ, quod quidem olei vice aſſumendum eſt: quoniam pingue cũ ſit & ad vomitionẽ lubricas vias præſtet, deradi corpora minimè ſinit: quod alioqui gypſum, vbi duratur in lapidem, facere ſolet. Quinetiam prodeſt oleum ex aqua mulſa aut ficuũ decocto, & lixiuia è ficulneo aut ſarmentitio cinere facta, cũ vino largiore pota: item origanum aut thymum cum lixiuia vel aceto paſſóve: ſed & maluæ decoctum clyſtere infundi oportet.

De Taurino ſanguine. Cap. XXV.

TAVRI recèns iugulati ſanguis epotus, ſpirãdi difficultatem ſtrãgulatúmq; cõcitat, dum tõſillarum fauciúmque meatus cum vehementi conuulſione obſtruit. Lingua inde rubeſcit, ac dentes inficiuntur, & inter ipſorum commiſſuras quædá concreti ſanguinis veſtigia conſpiciuntur. Vomitum in hoc malo vitabimus, ne fortè grumi eiuſmodi attractu in ſublime elati gulę magis impingãtur. Dari vero opus eſt quæ ſanguinem concretum diſſoluãt & aluum ſubducant, vti caprifici groſſos lacteo ſucco turgentes ex poſca, Nitrum quoque per ſeſe auxiliatur, nec ſecus coagulum omne cum aceto, & laſerpitij radix cum laſere ipſo: itidem & braſſicæ ſemen, & è cinere ficulneo lixiuia. Proſunt & conyzæ folia cum pipere, & rubi ſuccus ex aceto. Aluũ præterea ſoluere paſt eſt: ſiquidem iis qui euaſuri ſunt crocea per ſedem egeri conſueuerunt. Poſtremò ſtomacho aluóque hordeaceam farinam ex aqua mulſa adhibere oportet.

A βοηθεῖ δὲ αὐτοῖς ἀλεκτορείδων ὠὰ σὺν ὀξυκράτῳ πινόμενα μετὰ ἀριστολοχίας ὀλκῆς ἀ. ἢ ἀψίνθιον σὺν οἴνῳ· ἢ μέλιτι ἐσθιόμενον ἢ πινόμενον σὺν ὕδατι, μελισσόφυλλόν τε σὺν οἴνῳ, πάνακος τε ῥίζα, ἢ καρπὸς σὺν οἴνῳ, πύξ τε οὖσα κεκαυμένη μὲθ' ὕδατος, ἢ χάλκανθος σὺν ὄξει. φάφανός τε ἢ νᾶπυ ἢ καρδάμωμον ἐσθιόμενα. Περὶ Γύψου. Κεφ. κδ'.

Loc. legit. ex v. cod. ἀριστολοχία σὺν οἴνῳ ἢ μέλιτι

Loc. μέλιτι

KAI ἡ Γύψος πνιγμὸν ὑπιφέρει λιθουμένη· ὅθεν καὶ πύτισις ἁρμόζει διδόναι τὰ τοιαῦτα τῶν μύκητας βοηθοῦσαν καὶ ὑπὲρ πάντων τὸ τῆς μαλάχης ἀφέψημα, ὃ καλλιπὲς αὐτὴ τὸ ἔλαιόν· λιπαρὸν γὰρ ὂν καὶ τὸ τὰ ἔξεμεῖσθαι ὄλισθον ἐμποιῆσαι, οὐκ ἐᾷ καταξύεσθαι τὰ σώματα. λιθουμένη γὰρ ἡ γύψος ἐργάζεται τοῦτο. ἁρμόζει δὲ καὶ τὸ ἔλαιον σὺν μελικράτῳ ἢ σὺν ὄξει ἀφεψήματι· καὶ κονία συκίνη ἢ κλήματίνη σὺν οἴνῳ πολλῷ πινομένη· καὶ ὀρίγανος ἢ θύμος σὺν κονίᾳ, ἢ ὄξει, ἢ γλυκεῖ. δεῖ δὲ τούτοις ὑποκλύζειν τῷ τῆς μαλάχης ἀφεψήματι.

Loc. addit ex v. cod. πάντων

Paulus καὶ οἶνον ἀσίδανον

Περὶ Αἵματος Ταυρείου. Κεφ. κέ.

AIMA δὲ Ταύρειον προσφαγὲς πολὺ, δύσπνοιαν ὑπιφέρει καὶ πνιγμόν· ἐμφερέστατον δὲ τοῖς παιδίοις καὶ τὴν καὶ πάσων πέψις μετὰ ἀσασμοῦ ἰσχυροῦ· δ' εἰσκεται τι ἐπ' αὐτῶν ἡ γλῶττα ἐρυθρά· καὶ ὀδόντες βεβαμμένοι, ἐν δεσμοῖς μεταξὺ αὐτῶν· ἐφ' ὧν ἂν ἔμετον προσφαιρούμεθα, τῶν δεσμῶν μᾶλλον ἐπὶ τὸν στόμαχον σφίγγουσῶν ἢ τὸ μετιὸν ζεσθαι αὐτοῖς καὶ τὸ ὀλκεῖν. δίδοται δὲ ὅσα δύναται τὴν πῆξιν διαλύσαι τοῦ αἵματος, καὶ τὴν κοιλίαν ὑποτάγειν. τοῖς τε ὀλιγόβοις πλῆθος ὅσον τὸ ὀποῦ σὺν ὀξυκράτῳ, καὶ ἴριδος ἢ καὶ ἐλατὸν ὠφελεῖ· καὶ πίτυα ἅπασα σὺν ὄξει, καὶ σιλφίου ῥίζη· ἢ τοῦ ὁποῦ ὁμοίως καὶ κράμβης σπέρμα, κονία τε συκίνη καὶ κονύζης· σπέρμα σὺν πετροσελίνῳ, καὶ βάτου χυλὸς σὺν ὄξει. δεῖ δὲ τὴν κοιλίαν ὑποτάγειν. εἴωθε δὲ τοῖς σωζομένοις ἀποδιδόναι διὰ τῆς ἕδρας· καὶ ῥοιῶδη. καταπλάσεις καὶ στόμαχον καὶ τὴν κοιλίαν ἀλθαίρῳ χρίοντα μετὰ μελικράτου.

V. addit, καὶ σπλήνιον ἕλκος ἐ τοῦτο καὶ κρέας. Cætera omittit. Loc. legit in mg. ὑποτάγειν ἀπὸ τῶν V. addit καὶ ἐξει.

Περὶ Γάλακτος ἐμπεπυαδότος. Κεφ. κϛ'.

Paul. ἄγειν πρὸ

Καὶ τοῖς λαβοῦσιν ἐμπεπυαδὲς γάλα, ἀθρόως πολὺς πνιγμὸς γίνεται, ἀφ' ᾧ δεδεμβοῦσθαι. οἷς βοηθοῦντας προσφέρειν δεῖ ὥσπερ ἀντίδοτον πτύας σὺν ὄξει, πολλάκις ἀναγκάζοντας πίνειν. ἓ καὶ λαμβάνης τὰ φύλλα ξηρὰ ἢ Ⓦ χυλὸν ὁμοίως ἢ σιλφίου ῥίζαν ἢ Ⓦ ὀπὸν σὺν ὄξυκράτῳ. θύμον τε σὺν ὄξει, καὶ τὸν ἀπὸ πηλοποιικῶν κονίαν. ἁλυκὸν δὲ μηδὲν προσφερέσθω. μᾶλλον γὰρ πήγνυται καὶ τυροῦται τὸ γάλα. ἀλλ' οὐδὲ πύπους ἐμεῖν δεῖ· ἐπισταμένοις γὰρ ὅτι τὰ τῆς τομάχου τινά τε ἐδεδεμβωμένα πίνει.

Περὶ Λιθαργύρου. Κεφ. κζ'.

V. sic incipit. καὶ τοῖς λαβοῦσιν λιθάργυρον, πνιγμὸς ἀπὸ τῆς καρδίας ἀνίσχει μὴ τρόφων χύσεως.

Ἀλὶ βάσει καὶ τὸ σῶμα μαλακύνει καὶ τὴν ἀφεδρίαν ἀφίστησιν λαμβανόμενος.

Λιθάργυρος δὲ πωθεῖσα, βάρος ἐπιφέρει τομάχῳ καὶ κοιλίᾳ, καὶ ἐντέρων μὴ τροφῶν ἐπιτιθεμένων. ἐοίκοτι δὲ καὶ πηρώσει τὰ ἔντερα ἀφ' ὧν βάρος, καὶ ἐπέχει τὰ οὖρα· παρεμπίπτει δὲ αὐτὸ τὸ σῶμα, καὶ μολιβδοειδῆ ἀφεψίαν λαμβάνει. ἐφ' ὧν δεκάζει μὴ Ⓦ ἔμπυα πινόμενα σὺν οἴνῳ, ὀρεινοῦ ἀγρίου σπέρμα, σμύρνης ≤ ἢ ἀνήθου, ὕσσωπον, σελίνου σπέρμα, ἢ πέπερι, ἢ κύπερον ἄνθος σὺν οἴνῳ· ἐπειτηρῶν τε ἀγρίων ἄφοδος ξηρὰ μὴ νάρδου καὶ οἴνου.

Vul. exempl. cōchilis carens.

Περὶ Ὑδραργύρου. Κεφ. κη'.

Ὑδράργυρος δὲ πωθεῖσα, ἐπὶ αὐτὰ ὁμοίως ἐπιφέρει τῷ λιθαργύρῳ, καὶ ὅτι τούτων δεῖ τοῖς αὐτοῖς βοηθήμασι χρῆσθαι. δοκεῖ δὲ αὖλοις ὠφελεῖν γάλα πινόμενον ἐμέτου τοῦ δὲ καὶ οὔτοι.

Coel. quid addāt alia

Περὶ Τιτάνου, Σανδαράχης καὶ Ἀρσενικοῦ. Κεφ. κθ'.

Τίτανος, Σανδαράχη καὶ Ἀρσενικὸν πωθέντα, τὰ αὐτὰ ἀχήματα κοιλίας καὶ ἐντέρων ἐπιφέρει μὴ δηλητηριώδη. ὅθεν προσφορὰν δεῖ ἅπτεσθαι, ὅσα μετὰ τῆς κριθάνης, δυνάται τὴν ὑγιεινὴν κοιλίαν ὀλισθηρὰν παρέχειν· οἷός ἐστιν ὁ τῆς ἐβίσκου καὶ τῆς μαλάχης χυλός, λίαν ὀλισθηρὸς ὑπάρχων. παρέχειν δὲ δεῖ καὶ ἀφέψημα λινοσπέρμου, καὶ ὁ τῆς πάχνου καλουμένης βοτάνης καρπός, ἢ ὀρύζης, καὶ γάλακτος πολὺ σὺν μελικράτῳ, καὶ ζωμοὶ λιπαροὶ καὶ βύχυμοι.

A *De Lacte intus coagulato. Cap. XXVI.*

Eos quoque quibus lac assumptũ intus coagulatur frequens derepente strágulatio inuadit, quòd intus lac in grumos quosdá coalescat. Hos iuuamus exhibentes antidoti vice coagulum ex aceto, idipsumq; sępius bibere cogétes. Damus & calaminthæ folia arida, aut succũ etiá ipsum similiter: aut laserpitij radicé liquorémve ex posca: pariter & thymum ex vino, & coactiliariorũ lixiuiá. Cęterùm salsi nihil exhibeatur, quòniá magis lac coiret & in caseũ désaretur. At neq; hos vomitus adiuuat, siq dẽ cõcretũ lac sese in gulæ anguśtias insinuás, facilè strangulat.

B

C

De Argenti spuma. Cap. XXVII.

Spvma argenti pota, stomacho ventri & intestinis grauitatẽ cum magnis torminibus affert: interdũ & põdere suo intestina vulnerat, vrinámque supprimit: intumescit verò corpus, plumbeámque deformitatem concipit. His secundum vomitionem subueniũt pota ex vino, syluestris hormini semen, myrrhæ oboli duo, absinthium, hyssopum, apij semen, aut piper aut cypri flos ex vino: necnon & fimus palumbinus aridus cum nardo & vino.

D

De Argento viuo. Cap. XXVIII.

Argentvm viuum potum eadẽ quæ argenti spuma infert: quapropter & eadem exposcit auxilia. Lac autem largius potum auxiliari cõstat. Vomitus etiam minimè negligendus est.

E

De Calce, Sandaracha & Auripigmento. Cap. XXIX.

Calx, Sandaracha & Auripigmẽtum, eosdem ventris & intestinorum cruciatus cum vehementi rosione inferunt. Quamobrem exhibenda quæcunque simul & acrimoniam temperádi, & facilem vomitionem lubricamq; aluũ præstandi vim habent, cuiusmodi ibisci & maluę succus est: natura enim vtriq; perlubrica. Præbendum etiam decoctum seminis lini, aut tragi frumentacei vel oryzæ, lacque cum aqua mulsa copiosum: iura denique pinguia bonique succi.

F

G

De Lepore marino. Cap. XXX.

HAVSTO marino lepore, virósus quidam sapor qualis putentium piscium percipitur: procedente verò tempore, venter dolore afficitur, vrináq; sistitur: quòd si quándo ea redditur, purpureo colore cõspicitur. Accedit & omnis generis piscium auersatio atque odium, & sudor graueolẽs: bilioſus itidem vomitus, interdum sanguine mixtus, subsequitur. Hoc malo circũuentis, dãdũ lac asininũ aut pastũ assiduè, necnon & radicis malvæ foliorúmque decoctum, aut trita cyclamini radix cum vino, aut veratri nigri vel scammonij succi drachma cũ aqua mulsa & punicorum nucleis aut cedria contrita ex vino: benefacit & anserinus sanguis adhuc calens epotus. Sed cum pisces omnes respuãt & auersentur, solos fluuiatiles cancros elixos esitat & concoquãt, à quibus non mediocriter adiuuantur. Signum porrò salutis fuerit, si pisces in cibos admittere coeperint.

Περὶ Λαγωοῦ θαλασσίου.

Κεφ. λ'.

ΛΑγωοῦ θαλασσίου πολίτης, παρακελευθῆ γλίσχροις ὁμοία ἰχθύσι βρῶμόν τινα· ὃ δὲ πρὸ χρόνου ἐσῃ, κοιλίᾳ τε ὀδυνᾶι, καὶ οὖρα ἐπίσχει· εἶτα δὲ ἐκκριθείη, πορφυρίζοντα τῇ χροιᾷ ὁρᾶται. ἀποτροφή τε καὶ μῖσος πρὸς πόσιν ἰχθύων· καὶ ἱδρῶτες δυσώδεις. πρόσεισι δὲ αὐτοῖς καὶ ἕμετος χολώδης, ἔνιοτε αἵματι μεμιγμένος. οἷς δοτέον γάλα ὄνειον ἢ προβάτειον συνεχῶς, καὶ μαλάχης ῥίζης καὶ τῶν φύλλων τὸ ἀφέψημα, ἢ κυκλαμίνου ῥίζαν λείαν σὺν οἴνῳ, ἢ ἑλλεβόρου μέλανος ἢ σταφισαγρίας ὀπὸς μετὰ μαλαχῆς ῥοῶν τε πυρηνῶν ἢ κεδρίας λείας μετ' οἴνου. ποιεῖ καὶ χλιὸς αἷμα πολὺ θερμόν. μὴ δυναμένοις δὲ οὕτω ἰχθύας προσίεσθαι, μύνους τοῖς ποταμίοις καὶ πετραίοις ἐφθοῖς ἐσθίουσι, καὶ τινοῖσιν οἴνῳ μεμιγμένοις ἐπ' αὐτῶν. τεκμήριον δ' ἔστιν ἐπ' αὐτῶν σωτηρίας, ὅταν ἄξωνται ἰχθύας προσφέρεσθαι.

De Rubeta & rana palustri. Cap. XXXI.

TVM Rubeta, tum etiam Rana palustris assumpta corporis tumorem ciet, cũ intenso pallore qui buxi colorem imitatur: accedit spirandi difficultas & grauis halitus oris singultúsque, ac interdum inuita genituræ profusio consequitur. His qui sumpsêre facilè succurritur secũdùm vomitionem largiore meri potu & arundinis radicis binis drachmis, aut cyperi totidem. Cogendi quoque sunt vt vehementi ambulatione incitatóq; cursu corpus exerceant, ob torporem qui ex hoc malo nascitur. Quinetiam quotidie lauandi sunt.

Περὶ Φρυνου. Κεφ. λά.

ΦΡΥΝΟΣ ἢ βάτραχος ἕλειος προσενεχθεὶς ὄγκους φέρει οἰδήματα σώματος μετ' ὠχρότητος ὁποίαν τινὰ πυξίνου, ὡς δοκεῖν πύξῳ ἐοικέναι· δυσποιεῖν τε καὶ δυσωδίαν ὀδωδέναι τὸ στόμα· καὶ λυσσᾶν αὐτοῖς ἔπεσται, ἐνίοτε δὲ καὶ αὐτόματος ἀποφαίρεσις ἔκκρισις. βοηθεῖ δέ τι τυγχάνουσι μετὰ ὕδατος λαμβάνοντες ἄκρατον πολιοῦ, καὶ καλάμου ῥίζης < β'. ἔκκυπτέου τ' αὐτοῦ. δεῖ δὲ αὐτὸν καὶ αἱματοῦν αὖθις τινὰς ἀφέσεις καὶ τέχνῃ, ἀλλὰ ἐν αὐτοῖς ταρχεύσεσι λούειν τε καθ' ἑκάστην ἡμέραν.

Dioſc. 2 in Alex.

De Hirudine. Cap. XXXII.

DEVORATÆ cum aqua hirudines si ori ventriculi adhæserint, tractione partium nonnullam suctionis imaginem præbent: atque hoc signo hausta hirudo deprehenditur. Eas muria sorbitione excutit, & Cyrenaicus liquor, aut laserpitii folia vel betę cũ aceto pota, [aut epota niuis glebula cũ posca.]

Περὶ Βδέλλας. Κεφ. λβ'.

ΒΔΕΛΛΑΣ ἐκ καταπινομένας σὺν τῷ ὕδατι ἢ προσφυομένας ἐν τῇ καταπόσει τῷ σώματι τῆς κοιλίας, ἑλκούσας τὰ μέρη, ἐκ φαντασίαν ἐν μυζήσεως παρεχούσας (ὅπερ καὶ σημεῖόν ἐστι τῶν βδέλλας καταπεπόσθαι) ἀποβάλλει ὑμὶν καθαρ-

ροφυμένην, καὶ ὑπὸ Κυρηναϊκὸς ἢ φύλλα σιλφίου, ἢ τευτλου, σὺν ὄξει πινόμενα.]

V. non legit. Addunt alii, Β καὶ σὺν ὄξυμελι τῷ.

"ἁλαζαργαεί ξεσθαι τὸ νίτρον σὺν ὕδατι, καὶ χαλκάνθου σὺν ὄξει ἀνεθέντι. * Ταῖς δὲ ἐν τῷ βρόγχῳ πεπτωκυίαις, ἐμβιβάσας εἰς ἔμβασιν θερμὴν, δίδου ψυχρὸν ὕδωρ ἐν τῷ στόματι ἀφεκτέον, καὶ ἐξελκύσονται. A

el καὶ ἰαθωσιν, καὶ plane scitu.

Nitrum præterea ex aqua gargarizatur, itémque atramentum sutorium aceto dilutum. Si verò faucibus hæserint, demisso in aquæ calidæ solium ægro, frigidam ore continendam exhibeto, & ad eam protinus hirudines prosilient.

Περὶ Ἑλλεβόρου λευκοῦ, θαψίας, ἐλατηρίου καὶ πηγάνου ἀγρίου. Κεφ. λγ. B

De veratro albo, thapsia, elaterio & similibus. Cap. XXXIII.

ΠΡΟΝΟΗΤΕΟΝ δὲ καὶ τῷ ὅτε ὠφελείας ἕνεκεν δίδοληται, ὅτι φερόντων δὲ πολλάκις κίνδυνον οὐχ ἧττονα τῶν ἄλλων φαρμάκων· ὡς ἑλλεβόρου λευκοῦ τε θαψίας καὶ ἐλατηρίου, καὶ ἀγαρικοῦ τοῦ μέλανος· πυγμὴν γὰρ ὅτι φέρει ταῦτα ἢ ὑποκαθαρσιν. Ἡσσητέον δὲ ὡς προεῖρηται ὅτι μυκήτων καὶ τῶν ὁμοίων. Ταῖς δὲ ὑποκαθάρσεσι τοῖς δυναμένοις ἐπέχειν ταῖς ἐκκρίσεσι χρησόμεθα. Καὶ τὰ μὲν δοκοῦντα ἐπ' ὀλίγον βλάπτειν, οἷόν τε δὲ κινδυνώδη ὑποφερόντων, οὐκ ἀμελητέον. ὧν ἐστὶ τὸ ἄγριον πήγανον καὶ τὸ μελαίνιον, καὶ οἱ πεπερίδες καλούμενοι κόκκοι. ἐφ' ὧν ἔμετος μόνος τοῦ φαρμάκου ἐκβολὴν ποιήσεται. δεῖ λαμβάνειν ταῦτα. C

Corn. et Paulo ista sic restituit: δεῖ δὲ καὶ τοῦτο μὴ παρεῖναι· ἡσσητέον δὲ ὡς εἴρηται.

Vulgo ἔστι δὲ ἄγριον πήγανον καὶ τὸ μελαίνιον, καὶ οἱ πεπερίδες καλούμενοι κόκκοι. ἐφ' ὧν ἔμετος μόνος τοῦ φαρμάκου ἐκβολὴν ποιήσεται. δεῖ λαμβάνειν ταῦτα.

Paulus, λαβόντας

PROVIDENDVM etiá iis, quæ quanuis auxilij ferẽdi gratia exhibentur, haud minora tamen pericula quam venena cætera sæpius afferunt: qualia sunt veratrum albũ, thapsia, elaterium, & agaricum nigrum: siquidem hæc animam suffocant, aut immodicè purgant. Ac prætocationibus quidem ea medétur, quæ in fungorum similiúmque mentione retulimus: nimios autem deiectionum impetus medicamentis quæ egestiones supprimunt coërcebimus. Neque vero negligenda quæ paululum quidem nocere videntur, interim verò periculo non vacant: quo in numero sunt syluestris ruta, melanthium & recentes pappi, hoc est, flores spinæ quæ cactos appellatur. Eos porrò qui talia sumpsêre sola vomitio restituit. D

Περὶ ὕδατος ψυχροῦ καὶ ἄλλων ὁμοίως ἡμῖν συμφύλων. Κεφ. λδ.

De aqua frigida & cæteris quæ itidẽ nobu domestica & in quotidiano vitæ usu sunt. Cap. XXXIIII.

ΚΑΙ τὸ ψυχρὸν ὕδωρ ἀθρόον πολὺ, ἢ ἄκρατος πολὺς καὶ γλυκὺς οἶνος πολὺς, μάλιστα ἀπὸ βαλανείου ἢ δρόμου καὶ τῶν ἰδίων γυμνασίων, πυγμοὺς καὶ ἀλγήματα ἐπιφέρει. ἐφ' ὧν φλεβοτομία ταχέως βοηθήσασα, καὶ κενώσασα λύει τὸν ἐπηρτημένον κίνδυνον. Καὶ πρεῖ μὲν τῶν σημείων τοῖς λαβοῦσι τὰ θανάσιμα τῶν φαρμάκων, καὶ τὰ ἀντιδοθησόμενα τοῖς θεραπείας, ἔτι δὲ τοῖς φυλακτικῆς ἀγωγῆς, ὅτι τοσοῦτον ἡμῖν εἰρήσθω. Ὑποχρεώσομαι δὲ καὶ αὐτιδότους ἀναγκαιοτάτας καὶ χρησιμωτάτας συνθέσεις αἷς ἐχρησάμην, τῇ τε Μιθριδατείῳ, καὶ τῇ δι' αἱμάτων, καὶ τῇ ἀφὸ σπίγκων. αἷς ἀφὸ τοῦ σὺν ταῖς ἀντιδότοις ἀκριβέστατα ἀναγεγράφθαι, πρέπειν ἡγησάμην ἀναγράφειν σύγχυσιν. E

Aëtius, δημοσίᾳ

vel. meracũ ac dulce vinum.

AQVA etiam frigida vnico haustu ac sine interspiratione bibita, aut meracum vinum passúmve liberalius haustum, præsertim a balneo aut cursu & concitatiore quauis exercitatione, strágulatus ac dolores infert. In eiusmodi casu venæ sectio protinus adhibita, itéinque per enemata vacuatio imminentibus liberant periculis. Hactenus de notis veneficiorum, eorúmque cõuenientibus remedijs, necnon & præcauẽdi modo, dictum esto. Subiungeremus & vsitata antidota maximè necessaria, quæque inter cætera præclarè auxiliari constat: quale est Mithridatium & quod è sanguinis varijs generibus, & quod è scinco paratur. Verum quoniam inter antidota accuratissimè descripta F G sunt, visum est hoc loco ab eorum descriptione supersedere.

PEDACII DIOSCORIDIS ANAZARbæi Liber, de Venenatis animalibus, & ab iisdē inflictorū vulnerum signis & curatione.

ΠΕΔΑΚΙΟΥ ΔΙΟΣΚΟΡΙΔΟΥ ΑΝΑΖΑΡΒΕΩΣ ΒΙΒΛΙΟΝ, ΠΕΡΙ ΙΟΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠ' ΑΥΤΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ.

IANO ANTONIO SARACENO LVGDVNÆO INTERPRETE.

Præfatio.

Τὸ προοίμιον

DE BESTIIS venenatis & exitialibus venenis agere iccirco nobis propositum est, vt curationis remediorúmque totus expleatur modus. Siquidem pars hæc non minùs quàm cæteræ aliæ, necessaria est iis qui medicinā faciunt: quippe cùm eorum adminiculo quæ mihi traduntur, periculis, doloribus & cruciatibus, plurimisque aliis malis homines liberari contingat. Hęc autem in summa fastigia duo, sicuti ab initio pronuntiatum est, distribuitur. Ná qui tractatus est de bestiis virus eiaculantibus, Theriacus: qui verò de venenis, Alexipharmacus appellatur. Eũ porrò seruabimus ordinem, vt quæ symptomata comitari cõsueuerint, priore loco monstremus, deindéq; vnicuique propria remedia subiiciamus: quæ quidem omnia in prõptu & ad manum artificem habere oportet, propter vrgentem sæpenumerò necessitatem. Quãdoquidem è venenis virulentisque animalibus sunt perpauca, quæ tarda tẽporisque dilationem admittentia pericula cieant: pleráque verò præsentaneam perniciem afferunt. Sunt præterea qui ingenita prauitate struentes aliis insidias, maleficium ita temperant, vt subitum ac repentinũ exitiũ afferat. Alij praua scelerũ cõscientia stimulati, aut tristi quopiã rerũ euentu oppressi, hausto spõte veneno, morte sibi cõsciscere conãtur: qui postea seu deprehensi seu pœnitentia ducti vitæque cupidi, celerem & præsentaneam opem exposcunt. Neque desunt qui tela in hostes intorquenda toxicis illinentes, aut puteos ac fontes venenis inficientes,

ΤΟΝ μὲν οὖν περὶ τῶν ἰοβόλων ζώων καὶ θανασίμων φαρμάκων λόγον ποιησόμεθα διελθεῖν, εἰς συμπλήρωσιν τοῦ παντὸς θεραπευτικοῦ τρόπου. καὶ γὰρ οὐδενὸς τῶν ἄλλων ἧττον ἀναγκαῖόν ἐστι τοῖς ἰατρεύουσιν. ἐπειδὴ καὶ κινδύνων καὶ ἀλγηδόνων καὶ πλείστων ἄλλων κακῶν ἀπαλλάσσεσθαι τοὺς ἀνθρώπους συμβαίνει διὰ τῶν ὑπ' αὐτοῦ παραδιδομένων. τὸ δὲ τῶν ἀνωτάτω μερίζεται διχῆ, καθάπερ ἐν ἀρχῇ προεφωνήσαμεν. τὸ μὲν οὖν περὶ τῶν ἰοβόλων, πραγματεία ἐστὶ Θηριακός· ὁ δὲ περὶ τῶν θανασίμων, Ἀλεξιφάρμακος. ὧν πάντων δὴ τὸν προκείμενον ἡμῖν τηρεῖν εἰωθότα παρακολουθεῖν τὰ τε δυνάμενα βοηθεῖν πρὸς ἕκαστον αὐτῶν. δεῖ δὲ πάντα προχείρως ἔχειν τὸν τεχνίτην ἔχειν, διὰ τὸ κατεπείγειν πολλάκις τὴν χρείαν· ὀλίγα μὲν γὰρ καὶ τῶν ἰοβόλων καὶ τῶν θανασίμων, ὀψιπόρους καὶ ὀκναβόλους φέρει τοὺς κινδύνους τὰ πολλά· διὸ τοὺς καὶ διὰ ἔμφυτον πονηρίαν ὁπωσοῦν βουλομένους ἑτέρους, αὐτοφόνους τὸ κακὸν ἀπεργάζεσθαι βούλεται· καὶ οἷς μεθ' ὑστεροῦν στυγνόν τι καὶ λυπηρὸν ἔπεισεν ἐκγενόμενον προστυχόντες ἢ μεταγνόντες, ὀξυτάτης δέονται βοηθείας· καὶ πολέμιοι δὲ τόξοις χρώμενοι βέλη, καὶ φρέατα καὶ πηγὰς δηλητηρίοις φαρμάκοις,

Palat. recentior ἀναγκαιοτ.

forte, ἀναγκαιότατον.

Palat. recentior, ἢ διὰ παραπλησίων.

Addit Lac. ex veteri codice, post παραπλησίων, ἰσχυρῶν.

Palat codex interserit ἔχουσιν

ἀνυπόβλητον μηχανᾶται τοῖς ἑαυτῶν ἀ
θάνατον· ἐφ' ὧν οὐχ ὑβρὺς, ἀλλ'
ἐξίστησιν ἀπομαχὴν τὸ κακὸν πέφυκεν, εἰ
μὴ τοῖς ἀρχῇθεν τοῖς βοη-
θήμασιν; ἀνίκητος ἡ εἰσαῦθις ἐπικου-
ρία, τῆς φθορικοῦ δυνάμεως κα-
ταδραξαμένης τῶν σωμάτων. διόπερ οὐχ
ὅπως ἔτυχε καὶ τῷ ἐν τύχοις ποιητέον
ἐπιτέχνημα, ἵνα ὅπερ ἐν τοῖς ἄλλοις, τοῦ-
το καὶ ἐνταῦθα· ὅλη ἡ τέχνη πρόκειται
τοῖς ἀνθρώποις τῷ σωτηρίας. τοῦτό
μοι δοκεῖ τοῖς ἀρχαίοις τὸ θεραπευτι-
κὸν μέρος ὑπολαμβάνειν οὗπερ ὁ
λόγος. οἱ δὲ νεώτεροι αὐτὸν ἐφίεσθαι,
προφυλακτικὸν καὶ προφυλακτικὴν ὀνο-
μάζοντες· τὸ δὲ ὑγιεινὸν καὶ τὸ θεραπευ-
τικὸν μέσον τάξαντες, μικρᾷ γε πάντα πάν-
σιν ὅτι παλαίῳ πλανηθέντες πιθανότητι.
φασὶ γὰρ γίνεσθαι τρεῖς καταστάσεις τοῖς ἀν-
θρωπίνοις σώμασι· μίαν μὲν, καθ' ἣν ὑγιαίνουσι· ἑτέραν δὲ, καθ' ἣν νοσοῦσι· τρίτην δὲ μέσην ἑκατέρων, καθ' ἣν δοκοῦσι μὲν ὑγιαίνειν, διεστραμμένως δὲ εἰς τὰ πάθη καὶ τοὺς κινδύνους ἔχουσι· διό φασι φυλακτικὸν ἐπιτήδειον τοῖς σώμασι δύναμιν ὡς ὅτι τῶν κατὰ κενὸς λυμαντῶν διαλήψιν ὑπορρεῖν, καὶ μήπω προσπεπτωκότων ὑφορᾶσθαι· καὶ τῶν χαυλιοδόντας εἰληφότων, μήπω δὲ προσωδυνομένων ἢ δυσωδεσάντων. ἀναλέγως δὴ ταύταις τρισὶ καταστάσεσιν, εἰς τρία μέρη διῃρῆσθαι τὴν τέχνην· εἷς τὸ ὑγιεινὸν, ὃ δὴ τηρητικὸν ὄντες τῆς ὑγείας· καὶ εἰς τὸ προφυλακτικὸν, ὅπερ κωλυτικὸν ὄντες τῆς εἰς τὰς νόσους ἐμπτώσεως· καὶ εἰς θεραπευτικὸν, δι' οὗ λύεται τὰ πάθη. ῥητέον δὲ πρὸς αὐτοὺς, πρῶτον μὲν ὅτι καὶ τῷ ἐπιβολῇ ταύτῃ οὐχὶ τρεῖς καταστάσεις πρόκειται τοῦ σώματος, ἀλλὰ τέτταρες· εἰ λέγονται. ὡς γὰρ εἰσί τινες μήπω μὲν νοσοῦντες, ἐπιτηδείως δὲ πρὸς τοῦτο διακείμενοι διά τινα ἐπικειμένην αἰτίαν, οὕτως εἰσί τινες μηκέτι νοσοῦντες, μήπω δὲ τῇ ὑγείᾳ εἰληφότες· ὅπερ ἰδεῖν ἔστιν ἐπὶ τῆς ὑπογεγώς ἀπηλλαγμένων τῆς νόσου, ἀναλήψεως δὲ καὶ ῥώσεως δεομένων.

certam & inenitabilem aduersariis perniciem moliatur: in quibus maleficium nō subito quidem, sed aliquantò post vires suas exerere consueuit: attamen nisi maturè ac primo quoq; tempore salutaribus remediis occurratur, frustra tādē succurritur, occupatis iā corporibus exitiali vi venent. Proinde nō vulgarem industriā diligentiámque adhibere cōuenit, vt quemadmodum in aliis malis, ita & in his ars vniuersa mortalibus salutem afferat. Itaq; apud priscos hic modus curādi, eius partis existimabatur esse, quæ quòd ægris corporibus sanitatē restituat, Therapeutice dicitur. At recētiores posito discrimine, quia in præcauēdo versetur, Prophylacticū nomina runt, mediúmq; statuerunt inter eá medicinę partem cui sanitatis tuendę cura incumbit, & eā quę Therapeutice dicitur, parua nihilominus eaq; leui pfuasione decepti. Enimuero tres esse corporum humanorū status agnoscūt: vnum quo sana degunt, alterum quo ægrotāt, tertium qui medium inter vtrunq; locū sibi vendicat: in quo positi rectè quidē valere videntur, attamē parati sunt lapsu facili in morbos incurrere, variáq; subire pericula ob vim corruptricē quæ corporibus insidet: quēadmodum in iis videre licet, qui a rabioso cane morsi fuēre, necdū tamē aquæ metu horroréve prehensi sunt: itidémque in iis qui Cantharidas hausēre, necdum tamen cruciatibus vrinęve difficultate tenentur. Huic igitur triplici corporum constitutioni tripartitā artis distinctionem meritò respōdere cōtendunt, salubrem inquā, quę sanitatem tuetur: præcauētem, quæ morbos arcet: & sanātem, qua morbi discutiuntur. Veruntamen his respondeti potest, primùm iuxta hāc ratiocinationem nō tres corporis constitutiones, sed quatuor potiùs numerādas esse. Volunt enim sunt nonnulli qui nōdum ægrotant, attamen in morbum sunt prochiues ob impendētem causam: ita & aliqui sunt, qui licet haud amplius ægrotent, pristinæ tamen valetudini nondum planè restituti sunt: id quod in iis cernere licet, qui recens morbo liberati virium recreationem ac robur desiderant.

Sic Palat codex: at vulg. ex. προσπεπτωκότων Pal. recent. αἰτίαν Palat. κατακλεφάν.

Sort. ὅτι ἐν τοῖς ἄλλοις τοῦτο ἐστὶν ἡ ἐνταῦθα Pal recen. omittit ἄλλα

Pal. recent. omittit τοῦ. Pal. recent. ἔστι

Pal. ἀναμφίλεκτον τοῖς

Sic vterque Pal. at vulg ex. προσωδυνομένων.

Vulg. ex. carent

Pal. δὲ πάλιν.

Sic Pal. At vulg. exemp. ἐπὶ τοῦ μὲν ἑτοῖ

Pal. ἑστῶσι

Pal. ἔσθ' ὅτε μὲν ὑγιαίνουσι

Sed quemadmodũ hęc curãdi ratio ad Therapeuticę medicinæ partem pertinet, ita & præcauẽdi rationem huic eidẽ ſubiici par eſt. Quid quod ad arcẽdas valetudines etiã valẽtiſſimis vtimur auxiliis, altiore ſcarificatu, vſtionibus, circũciſura, appoſitis medicamẽtis mordacib⁹ itidẽq; propotiſmatis eiuſdẽ generis, & pleriſq; aliis? Verũenimuerò ſunt vſq; eò ſtolidi ac rudes nõnulli, vt ne remedia quidem appellent, quę in arcẽdis morbis vſurpãtur. Cuius ſententię inire rationem haud ita facile eſt: quippe cum & ipſa vox præcautionis & præcauendi ratio remediorum vſum & neceſſitatem ſatis ſupérque deſignent. Sed quomodo ſua illa partiũ Medicinæ diſtributione nõ compleduntur eos, qui in peſtilenti cœli conſtitutione agentes, nõdum quidẽ morbo correpti ſunt, peſti tamen propter ambientis aëris occaſionem opportuni & in morbum proni redduntur? Dicet forſan aliquis, ſalubrium præceptorum obſeruationem nõ aliud eſſe, quàm præcautionis partem aliquã: quippe cùm firma reddere corpora & minùs vitiis obnoxia nitamur, vt inoffenſa valetudine degãt, neq; morbis cõflictentur. Neque id ſilẽtio prætereundũ, quod maximè præcipuum & tanquã caput rei eſt: nõ ita diſtinguendas medicinę partes, vt totidem corporis cõſtitutionibus reſpõdeant, ſed naturam potiùs vniuſcuiuſq; ſuis notis ſeorſum indagandam & explorandam, vti ſuis locis oſtendemus. Cum illis igitur non eſt pluribus agendum. Illud potiùs annotandum, affectus qui à virulentis animalibus veneniſque contrahuntur vocari cæcos, id eſt, quorum ratio iniri minimè poteſt: pariter & eorum remedia nulli eſſe addicta cauſæ. * Iccirco & quæſtio hæc artis eius eſt, quæ obſeruatione ſimul & ratiocinatione nititur: ſiquidẽ rationi fides adhibetur. Neq; enim prorſus verum illud eſt. Sed ſemper id quod redundat, quódque nullum in operibus quibuſdam præbet vſum, haud facilè eſt coniectura aſſequi: etiamſi iuxta proprietates prorſus tale eſt, vt illius cauſa reddi non poſſit. Hoc autem in exitialibus venenis & virulentis animalibus euenire ſolet. Veruntamen quod ad opera eſt vtile, quód-

vel amputatione.

A ἀλλ' ὅτι μὲν ὅλου τοῦ ἰατροῦ ἡ θεραπευτικὴ μέρος ἐστὶ τέχνης ὑγιεινῆς, καὶ αὐτὴ ὑγιεινή ἐστι καὶ προφυλακτική, καὶ τοῦτο φανερόν. βοηθήμασι χρώμεθα καὶ τοῖς σφοδροτάτοις ἐπὶ τῆς προφυλακῆς, καὶ τεμνόμεθα καθαρτηρίῳ καὶ καύσει καὶ προσκοπῇ καὶ διηκτικοῖς ἐπιθέμασι καὶ προσ- Pal. ἔστιν ὁ τῶν ἰόντων ἰός.

B πάσμοις, καὶ ἄλλοις πλείοσιν· ἀλλά γε οὔτως εἰσί τινες ἀγνώμονες, ὡς μηδὲ βοηθήματα καλεῖν τὰ προφυλακτικά. οὐράδιον εἰπεῖν καθ' ὅτινα λόγον καὶ τοῦτο ποιοῦμεν· καὶ γὰρ προφυλακή, καὶ ὁ τῆς ὑγιείας ὁ αὐτὸς τρόπος, τοῦτο αὐτὸ πάντως ἐπίδηλον ἀποδείκνυσι. πῶς γὰρ οὐχὶ παύσει τὴν διαφθοράν καὶ τοὺς ἐν ταῖς λοιμικαῖς προσιζάνουσιν οὔπω μὲν ἐλαφρῶς πάθει, διακειμένους δὲ πρὸς τοῦτο ἐπιτηδείως πως ἤδη ἤδη ἐν τῷ προσιόντος ἀφορμὴν εἴπερ ἡ αἰτία, καὶ πάλιν τῶν ὑγιεινῶν ἀγαθῶν, ἃ δεῖ ἑτέρων ἢ προφυλακτικὴν ἐπ' ἀρχὴν δύναται. θᾶττον γὰρ τὰ σώματα καὶ τηρεῖ κατασκευάζειν πειρώμεθα, χαίρειν τῶν δυσάλωτα ἡμᾶς ἢ νόσους. ὃ γὰρ κωλύσαντα ῥᾴτιον ἐστί, τὰ μέρη τῆς ἰατρικῆς οὐχὶ ταῖς καταστάσεσι τῶν σώματος ἀναλόγως δεῖ· εἰρῆσθαι δὲ ἀλλὰ φιλοσοφεῖν ἐφ' ἕκαστον τῶν ἄλλων, ὡς ἐν τοῖς εἰκείοις τόποις ἐποδείκνυμεν.

D

E πρὸς τούτοις ἐκεῖνο οὐ πλείστα ῥητέον. ἐκφοβοῦσι μᾶλλον κατασκευάζοντες καλεῖται μὴ ἁμαρτολογήτως τὰ ἀπὸ τῶν ἰοβόλων ζώων, καὶ τὰ ἀπὸ τῶν θανασίμων συμβαίνοντα φαρμάκων, καὶ πρὸς ταῦτα βοηθεῖ· ἐφ' ὅτῳ γε ἐν τῇ ἰατρικῇ τυγχάνει αἰτιολογικῆς τε τέχνης

F προσπαιούσης ἀπόρημα, ἐν ᾧ ὁ λόγος πεπίστωται. οὐδὲ γὰρ ἐν τῷ καθάπαξ τοῦτο ἐν ἀληθές. ἀλλ' ἀεὶ ὃ πλεῖστον καὶ μεθ' ἡμέραν χρείαν ὅτι τινα τῶν ἔργων παρέχεται, δυσεύρετον καὶ καὶ πάλαι ἁμαρτολόγητον ὑπάρχει τῆς ἰδιότητος. τοῦτο δὲ ὅτι τῶν θανασίμων φαρμάκων καὶ τῶν ἰοβόλων ζώων εἰσὸς ἀποβαίνει· ὃ μόνοι ἄχρηστον εἰς τὰ ἔργα, τῆ

Pal. τὰ αὐτὰ πάσχουσι τοῖς ἀπὸ τῶν ἰοβόλων

Deeſt τὰ σώματος in antiquiore Pal. codice.

*

Hæc ἡ τοιαύτη ratio deeſt in antiq. Pal. codice.

*

G. ὅ ἐστιν, quã ſcripturam recte Hermolaus & interpretes reſtituerunt.

Pal cod. interserit εἰς

Pal. οὐ κατάλη-πτον ἐστί

ὃ πρέπον ἐστὶ τῷ θεραπεύειν ἀφορμὰς, A
οὔτ' ἀκατάληπτον ὄντ', οὔτ' αἰσιποληψίαν· καὶ μᾶλλόν τις ὁρμώμενος ἀπ' αὐτῶν, πίστιν καὶ παῤῥησίαν ἔχειν διεβεβαιώσατο περὶ τῆς καταλήψεως τῶν ἀδήλων. Διαφέρειν μὲν γὰρ ταῖς αἰσθήσεσιν ἀπὸ τῶν ἰδίων διαφορότητα καταλήψεως δὲ σαφηνοῦς ὀξὺ ἀλλήλων τυγχάνοντα· B

Pal. τὰς ὄψεις

In Pal. desiderantur μόνον

ποιοῦσιν. ἐνίοτε δὲ ἐφώδωσε τὸν ἔμπειρον Διοκλῆς ὁ τῷ περὶ Πλείσαρχον ὑπομνήματι, γεάφων· ταῦτα χρὴ λέγειν· γοῦν εἴ τις τοῦτο καὶ ἐπ' ἄλλων σκόλοπα, καὶ ὑπὸ λίγων, καὶ ὑπὸ τῶν ἐχιδνῶν ἢ σκορπίων καὶ ἑτέρων τοιούτων, ἀπιστήσας δὲ ὡς ἄδηλα καὶ μικρὰ τὸ μέγεθος ὄντα, μεγάλων αἰ- C

Lacuna hæc ita interpretatur vt quæ antecedunt hæc ad ea sequentia referantur ad Dioclem, sed ad Dioscoridē referat. Ald. addit τὰ & Pal. recentior etiam.

Quæ sequuntur ἀπιστήσας usque ibi ut in Pal. vsque ad τὸ σῶμα

πια κινδύνων καὶ πόνων γίνεται. ὧν τοῦτό ἐστιν ἰδεῖν ἕνια ῥᾳδίως τοῦτό τινα σμικρότητα καὶ ἰχνώδη ἀπολειπομένην αὐτοῖς ἀπὸ τῶν ἄλλων θηρίων. ὑπηλίκον γάρ τι νομίζειν τὸ μέγεθος, ὅσον ἀπὸ τῆς πληγῆς, τοῦ σκορπίου καὶ τῶν ἄλλων τῶν τοιούτων τῇ

Pal. καὶ τὰ μὴ ποιοῦντα

ἁφῇ λυμαινομένων; ὧν τὰ μὲν ὅτι ποι- D
ωῦσα πόνον ἰσχυρὸν, τὰ δὲ, σήποντα, τὰ δὲ, κτείνοντα σπουδίμως. ἢ τὸ ἀπὸ τοῦ Φαλαγγίου δήγματος ἐνιέμενον, καὶ ὅλον τὸ σῶμα διαφθορικόν; τοῦτο γὰρ

forte ἀπὸ

αἰ διαγνῶναι τὸ μέγεθος· αὐτῶν δυνατόν τις, ἀπὸ τοῦ πολυπάσιον εἶναι μικρόν. ὅτι μὲν οὖν περὶ τὰ διαφθο- E

Pal. καὶ ποιοῦν

σεις ταῦτά ἐστιν, ὡμολόγηται· τοῦτο δὲ πάντων. ὅτι δὲ καὶ ἀκριβῶς κατειλημμένην τὴν τοιαύτην δυναμιν αὐτῶν ἡμεῖσθαί τινα φθοροποιὸν, ἢ τις καταμιγνυμένη τοῖς σώμασιν· αἰτία τῶν συμβαινόντων κακῶν γίνεσθαι συγχωρήται, καὶ τοῦτο πεπίστευται. καὶ τοῦτο αἱ οὕτως δυρεθεῖσι φιλόπονος, ὡς ἄλλοθεν φῦσαι ταῖς

Pal. αἰτίαν

Hoc καὶ deest in Pal. recentiore

ὀχλήσεις· καὶ οὐχὶ δι' ὕλης φθοροποιοῦ καθαπερομένης τῶν σωμάτων μόνον ἀπὸ μέρους συμπίπτειν. τοῦτο δὲ ἐῶ τὸ περὶ τὰ ἔργα τῆς τέχνης χρησιμεύοντα, κα- F

Vterque Pal. τὸν

Pal. τὸν ἔργα πεποιημένον

τὰ τὸν ἔργον· τοῦτο ποιούμενον ὑπαλγεῖν, ὡς τε ἡμᾶς μηδὲ G
βλάπτεσθαί τι κατὰ τὸν τοῦ τὸν καθ' ἑαυτὸν ἰδιότητα ἀκαταληψίας τῆς

Pal. τὸν πα-

χυνῆς αἰτίας· καὶ τότε ὑποδείκνυσθαι δυναμιν βεβαίως κατειλημμένης. διὸ

que medēdi præbet occasionem, id neque imperceptibile est, neq; causa carere existimatur. Quin potius ab ipso quis impulsus certiorem de abditorum cōprehēsione fiduciam se cōparasse affirmabit. Nā etsi sæpe minora sint q̄ vt sensibus percipiantur, euidenter tamē ex ipsis inter se collatis deprehēduntur. Dioclesautē in eo cōmentario quē Plistarcho dicauit, modos abūde ꝓsecutus est, ad verbū ita scribēs: Nosse quis hoc potest cum in alis nō paucis, tum in viperis aut scorpionibus, & alis id genus, secū animo reputās quātorū, licet exiguo sint corpore vixq; cōspectui subiiciātur, discriminum ac dolorū causæ sint. Ex iis nihilomin⁹ nōnulla cōstat propter paruitatē ne cerni quidē facile posse, prætereaq; robore a cæteris bestiis longe superari. Quātula enim cēlebitur, si vulnus spectes, scorpionis & aliorum eiusmodi corporibus nostris perniciem afferentiū magnitudo? Et horum tamen aliqua vehemētes cruciatus excitāt, alia putrefaciunt, alia denique quāprimum perimūt. Rursus quantulum, quæso, æstimabitur quod a Phalāgij morsu ingeritur venenū, quodq; vniuersum corp⁹ grauiter afficit? Magnitudinem certè aliquā vix ac ne vix quidē deprehēdere quisquā possit, cum idipsū animal prorsus exigua mole cōstet. Ergo hæc ad affectiones referri oportere apud omnes est in confesso. Illud quoque exactè deprehēsum est, vim quandam ipsis inesse corruptricem, quæ insinuata corporibus malorum quæ exoriuntur causa sit: id quod receptum est iā pridem & omnium cōsensu persuasum. Neque quisquā inueniētur vsqueadeo contentionis studio flagrans, vt aliunde molestias ac perturbationes oriri asserat, quàm ex materia corruptrice seu mortifera, ex parte tantùm corpora contingente. Porro id erat quod inter vtilia artis opera in omni opere dicere par erat, quænam res hoc efficiat, vt nihil prorsus nos lædat incomprehensa causæ proprietas: quandoquidem communis causa tunc ostendi potest, cum firmiter comprehensa est. Ideo

Erasistratus Empiricorum peruicaciá graui cauillatione inceſſens, cæcis affectibus cauſam aſſignauit: illis minimè cõcedens cauſam morborum ſupremam & communem incomprehenſibilem eſſe, & hanc in eo quem de cauſis edidit commentario illuſtrans. Quin & illos reprehendit, quod non explicuerint in quibus diſpoſitionibus ſatisfaciat trita medẽdi ratio. Siquidem, exẽpli gratia, dicere debuerũt, ſe in venenis venenatorúmq; morſibus & cæteris id genus obſeruatione contẽtos fore, quæ quidem à cauſarum comprehenſione omnino ſeparata ſit. Primùm enim in genere cõprehendi facilè poſſunt: quãdoquidem veneni vis corruptrix corporáque ſubiecta ita imminutans vt etiam perimat, generalem quidẽ, at nõ ſpecialem ſubindicat curationem: quę ſcilicet vim habeat illud ipſũ hebetandi ac prorſus expugnandi. Dum verò ſubiunxit: (venit quis ad aquá dulcem ac poculentam, & ante obſeruationem vomitum prouocauit, vulnus dilatauit, aut partem demorſam exugendam præbuit, cucurbitulas admouit, ſcarificationem adhibuit, cauteria & eadem vi prædita medicamenta cauſtica applicuit, poſtremò partem amputauit) remedia haud dubie penſitauit, quotquot (ſeu intus aſſumpta ſeu) foris & in ſumma cute adhibita immiſſæ ad intima perniciei aduerſari poſſent. Hæc itaque quæ diſſeruit Erasiſtratus, tum veritati, tum & artis operibus ſunt conſentanea. Sed Methodicos demirari licet, qui quidem corruptricem ſeu maleficam vim corporibus immiſſam, negotiorum quæ ipſa facеſſit ſimpliciter cauſam eſſe minimè cõcedant, at certo quodam modo: vſq; adeò ineptè nomini inſiſtunt. Palam enim etiá apud ipſos vis immiſſa corporibus, φθορεπτικὸς, hoc eſt, corruptrix appellatur. Corruptricem autem vim habere, cauſæ, non item alius cuiuſpiá rei, opus eſt. Aiũt porrò voces has μάρσιππος & ἀναλύσθαι reliquis omnibus eſſe ſimiles: in quibus partes quędá dictionũ nõ pro virtute, ſed iuxta nudá enũtiationẽ, comprehenſæ ſunt. Enimuerò quemadmodum in his vocibus μάρσιππος & ἀναλύσθαι, partes neque principales neque præcipuos retinent

A καὶ ὁ Ἐρασίστρατος ὀπτικώτερον τὸ αὐθάδεις τῶν Ἐμπειρικῶν, αἰτίαν τοῖς ἀφανεστάτοις ἐνέθηκεν. οὐ συγχωρῶν αὐτοῖς, τὸ αἰτίαν τὸ ἐπιφανεστάτην καὶ καθολικὸν· ἄλλοι ὅτι τῇ ἰσότῃ ἐπάρχειν τῇ τε τοιαύτῃ αἰτιῶν γραφῇ τοὐτου διαλαθυχήσειν· τῷ τε μὴ λέγειν ὅτι πίνων ἀφικόμεθα τὴν τετειμωμένην θεραπείαν. οἷς ἐπὶ τῶν θηριοδήκτων καὶ θανασίμων· καὶ ὅτι τῶν λοιπῶν, ἀρκεθησόμενα τῇ παρατηρήσει, τῆς τ' αἰτιῶν παρασκευῆς χωριζόμενοι τελέως παρέσται μὲν γὰρ καὶ ἅπασι ἀκαταλήπτια εἶσιν. ὅτι μὲν γὰρ δυνάμις ὑπάρχει φθαρτικὴ, καὶ τὴν ὑποκειμένων ὅλοιωτικὴ ὥστε ἀναιρεῖν, καὶ τοῦτων καὶ ὅλως· καὶ ὑλικὴν κατ' εἶδος ὑπογράφειν θεραπείαν, δηλοῖ τὰ ἀμβλυωττεῖν ἐργαζόμενον. ὅτι δὲ φησὶν· ἔλθοί τις ἐφ' ὕδωρ γλυκὺ καὶ πότιμον, καὶ πρὸ τῆς παρατηρήσεως ἐπ' ἐμέσει, εἶτα πάσι τὸ πεπληγότος, ἢ διδυλωμένα μέρεσι ἀποθλασμοῖ, D σικύας προσβολῇ, ἐκτομῇ καυτηρίων, φαρμάκων τὰ αὐτὰ δυναμένων· ὅτι θέσει, τὸ τελευταῖον ἀποκοπὴν τοῦ μέρους· ἀπελογίσατο τὴν πεφυκότων φαρμάκων εἰς τὴν ὅτι φαίνεται φέρεσθαί πια, τῇ ἐνεμφύσει εἰς τὰ κατὰ βάθος ἀναπόδραστος φθορᾷ. ταῦτα μὲν οὖν ἀπ' ὧν εἴρηκε ἘρασίE στρατος, πρόσφατα εἴρηκε καλῶς καὶ τοῖς ἔργοις ἀκολούθως. θαυμάζει δ' ἔστιν ὅτι τῶν Μεθοδικῶν, οἵτινες οὐ συγχωροῦσιν αἰτίαν εἶναι τὴν φθορεπτικὴν ἐνεμφύτου δυνάμεως, ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῆς γινομένων ὀχληρῶν, ἁπλῶς τοῦτο μὲν ἀόριστος ἅτε τῷ ὀνόματι προσηκόντως. φθορεπτικὸς γὰρ καὶ πρὸς αὐτοῖς ἄλλοις F χρῆσι ἡ ἐνεμφύτη δυνάμις προσαγορεύεται). τὸ δὲ φθορεπτικὸν εἶναι λέγειν, αἰτίας, ὅτι ἄλλοι τινὲς ἔργου ὄντος. φασὶ δὲ τὸ μὲν ὄνομα τὸ μάρσιππος καὶ τὸ ἀναλαλύπτειν, τοῖς λοιποῖς πᾶσι παραπλήσιον ὑπάρχειν, ἐφ' ὧν μέρη τινὰ τῶν λέξεων ὀχ ὅπη χρὴ δυνάμει, ἀλλὰ χρὴ φύσιν περιείληπται τὴν ἐκφοράν. ἔν τε γὰρ τῷ μάρσιππος ἢ τῷ ἀναλαλύσθαι, G ὡς ταῖς χερσὶν ἢ τοῖς πηγουνιαίοις ὀκ ἔχει

Forte ἀναπίλατον

Pal. recent. pro ἀναλήψεται

Ald. ex κρατήσει Pal. in ἀναπαύσεται

Sic Pal. recent. at vulg. ex. τὸν

Ita ex μὲν κατ' ἄκρας habet. in Pancost. Sic Pal. recent. at vulg. ex. διὰ τοῦτο

Galter διὰ τοῦτο. ὁ δὲ ἐπὶ ipſa ostendit legendũ esse διὰ τοῦτο, vt recitat ex Kuchlino legit.

Pal. cod. ἐνεμφύτη at ἐνεμφύτῳ

Pal. recent. δι' ὧν εἴρηκε τὸ, πῶς τοῦτο εἴρ.

Lacuna ex v. codice. Audit, ἀπλῶς

Quidam legisse videtur ἔστι μόνον

Pal. ἔστιν

Pal. διὰ καὶ τ

Pal. recent. καὶ τὸ μάρσιππος.

Pal. τὸ ἐκ τοῦ

Sic Pal. recent. at vulg. exempl. κυσίας

a

Pal recent. omittit καὶ τὸ φθορ.

σημασίας· οὕτω καὶ ἐν τῷ φθορποιεῖν πρὸς τελικότητος καὶ οὐ κατ' δύναμιν ἐστίζακται. μεταβαίνοισι γὰρ ἐνίοτε ἀπὸ τῶν αἰτίων διαφορὰς, καὶ λέγουσιν, ὅτι τῶν αἰτίων τινὰ μὲν ὄντα τὰ πρωταίτια ξαυτῶν, ἃ ποιότητα παθῶν χωρίζεται

Pal. recent. pro ποιότ. legit αἰτίαν. Deest in Pal. καὶ

οὐ, κόπος καὶ ψύξις, ἔγκαυσις, καὶ τὰ παραπλήσια. τὰ δὲ, συνεκτικὰ, διὰ τὸ ποιεῖν ὅ παθῶν καὶ συνδεῖν, τυτέστιν ὧν μὲν παρόντων τὰ ἀποτελέσματα πάρεστιν· αὐξανομένων δὲ, αὔξεται, καὶ μειουμένων, μειοῦται, καὶ παυσαμένων, παύεται· καὶ αὐτὰ δυνάται εἶναι. καθ' ἑαυτὰ συνδεικνύμενα τῶν ἀποτελεσμάτων. καὶ ἔστιν μὲν τῶν αἰτίων αἱ δοκιμάζονται διαφοραί· τὸ δὲ φθορποιὸν ἁπλῶς πάντων ὑποπίπτειν πέφυκε. προσκαθαρκτικὸν μὲν· οὐδὲν γάρ ἐστιν, ἐπειδὴν παῦσῃ τὸ παθῶν αὐτὸ συνδεικνύει καὶ τῶν σώματος οὐ χωρίζεται. συνεκτικὸν δὲ· οὐκ ἂν λέγοιτο, πλεῖστον μὲν γὰρ τοῦτο πάρεστι· καὶ καθάπερ ὑπὸ λυσσώντος κυνὸς δεδηγμένον γίνεται. εἰ δὲ μὴ προσκαθαρκτικὸν γίνεται μηδὲ συνεκτικὸν, οὐδὲ αὐξητέλες, οὐδὲ συναίτιον αἴ εἰσι. εἰ δὲ ὑκ μεδεμιᾶς διαφορᾶς τῶν αἰτίων ἄλλο δυνησόμεθα τὸ φθορποιὸν, συγχωρῆσαι αὐτὸ μηδὲ αἴτιον ὑπάρχειν. τριούτων δὲ λεγομένων ὄντων, τὸ μὲν ἁπλῶς ὀνόματος· ὃ αὐτῆς μὲν ἔχει μέρη σημαντικὰ τῶν προσμάτων, ἀλλὰ χωρὶς φιλεῖ δὲ διαφορὰν πεποιημένα, συγχωρητέον. ὅτι δὲ μὴ πάντα ὑπολαμβάνεσθαι διαφορὰ ὑπάρχειν, δῆλα πάντελῶς ὀλίγα· τὸ δὲ τὸ ποιῆσαι ὃ ὧ φθορποιῷ προσπλησίως τῆς ὑπολαμβανόμενον ἀξιωθήσεται κινεῖσθαι ἢ ἐγγὺς τῶν σημείων. ὡς γὰρ ὃ τῆς φθορᾶς ὄνομα τῆς ἀπὸ τοῦ χεῖρον μεταβολῆς σημαντικόν ἐστιν, οὕτω καὶ τὸ ποιῆσαι προσαλλοιῶσαι, μηδὲν ὃ τῶν φθορᾶν ἔχειν δυνάμενον· τούτου δὲ οὐ πᾶν ἐξακούσεσθαι πάντες τελέως ἄσημον γίνεται τὸ ὄνομα, καὶ προσπλήσιον τῶν παιδὶ, ἔχειν δίψος. εἰ διδόασιν ἀπὸ τῆς φθορᾶς ὑγιεῖ γίνεσθαι τὸν νόσον, συγχωρῆσαι δυνατόν καὶ ὅτι τοῦ ποιεῖν, εἰ μή τι φθορᾶς ἀφῃρημένον ὄντι.

Pal. vet. μὴ δὲν ἐν τῷ φθορᾶς δυνάμενον. τοῦτο δ'

Cornarius sanatis corruptis cōiecturā duxit pro τῶν δ', δίψαν reliquit.

significat°, sic & in hoc verbo φθορποιεῖν partes superuacuò & quasi productionis tātùm gratia, nō item ad certam vim & efficacitatē, vnà coaluerūt. Hinc porro ad causarum differentias trāseunt, affirmántq; causarum quasdam esse primarias & euidentes: quæ cùm primum aduersam valetudinem crearunt, a corpore separantur, cuiusmodi sunt labor, frigus, æstus, & similia: alias verò continentes, quæ excitato morbo etiamnum permanent, hoc est, quibus præsentibus & effectus eorū adsunt, increscentibus iisdem effectus itidē augētur, decrescētib° minuuntur, desinentibus finiūtur: quæ deniq; iccircò perfectæ dici possūt, quòd si adsunt, effectus per se inducūt. Ac tales quidē receptissimæ sūt causarū differentiæ, quarū neutri τὸ φθορποιὸν subiici rectè potest. Primaria enim causa nō est, quoniá morb° ipse permanet, nec ipsa à corpore separatur. Sed neq; cōtinēs causa dici potest, quoniá magna ex parte abunde a dest qđ nocet, quēadmodū in iis videre est, q, à rabioso cane sūt demorsi. Quòd si neq; primaria neque cōtinens causa fuerit, vtiq; neq; perfecta seu finē p se cōstituēs, neq; adiuuās causa dici poterit. Quòd si τὸ φθορποιὸν in nullo causarū genere locare possum°, cōsequitur certè vt neq; omnino causam esse fateamur. Hisce hoc modo dictis cōstitutisq;, esse vocabula quædam quæ in se nō habeāt partes rerum significatrices, sed iuxta simplicē ac nudā pronūtiationē effictas, cōcedēdū est. Verum planè ppauca, nedū omnia, talē nāci sci cōditionē existimandū est. Neq; enim ποιεῖν in hoc nomine φθορποιὸν, perinde atq; in reliqs exēplis vocū partes, enūtiatur, sed lōgè principē obtinet significationē. Nā quēadmodū φθορᾶς, i. corruptionis, nomē mutationē in pei° significat, sic & hoc verbū ποιεῖν i. facere, ita accipiēdū est, vt nihil amplius ex eo qđ dictionē φθορᾶς sibi adiūctā habeat declaret, sitq; vox penitus nō significās id quod omnes palam audiūt, atq; adeo similis voci, sitire, sitim, vt ita dicā, habere significāti. Quod si dāt sano ex corruptione morbum cōtingere, cōcedūt vtiq; vim in huiusmodi verbo ποιεῖν subesse: siquidē aliquid est, quod corruptionem efficiat.

Omne

* Omne autē quod aliquid efficit, per singulas causas ostenditur quæ corporibus subiiciūtur, idq; tā in lethalibus venenis, quàm iis quæ corporibus ingeruntur. At qualencunq; causā ad causarū differētias propositas reduci oportere asserūt. Fallūtur autem & hac in parte, quoniam haud exactā diuisionē proposuēre. Qui verò se Dogmaticos profitentur, causam hanc esse dicunt partim præparantē, partim cōtinentem, vt inguinū vlcus & inguinariā febrim, & quæ tū causæ finē & effectū per se præstāti assistat, tū etiā ab eadem separetur, vt à fractis præcipitatio. In summa quoties quidpiam suapte natura causa fuerit, nec vlla causarū diuisione cōprehenditur, vitiosum est, neq; causæ ascribitur eorū quæ idem genus sortiuntur. Sed quòd φθοροποιὸν causa sit, tū ex ipso nomine deprehēditur, tū & apertius ex iis quæ cōtingunt ostenditur. Nam post impressum à venenata bestia ictum quam, quæso, aliam arbitrantur mali causam, quàm vim ipsam ab animante profectam & illapsum in corpora virus? quandoquidem neq; frigus, neq; æstum, neq; excisionem, neq; cruditatem, neq; aliud quicquā simile causari possūt. Quoniam verò etiā causarū differentiis gaudent, & aliquas continentes, alias primarias seu euidentes appellāt: ipsis dicendū, vtroq; istorū modorū causam esse. Ac euidens quidem dicetur, quòd effectū præcedat & corporis substantiā præoccupet: continens vero, quod morbis præsentibus etiā ipsa adsit, hācq; remota, itidē recedant simul & semel quæ cum ipsa euenerāt. Sed de his hactenus. Statuēdū itaq; corruptricem seu mortiferā illā vim intrinsecus manifestissimam esse causam, huncq; veluti principē scopū nobis proponendū esse. Iccirco antequā irruant morbi, variis modis certandum est, vsque dum vis tota corporibus excutiatur. Modò enim qua parte intrò subierit, eā reuocari oportet, modo retineri & quasi coërceri circa partē quampiam, præsertimq; ignobilē, priusquàm altius irrepens viscera tētet: aliās deniq; pernicies eius eluenda retundendáve est, siquidem iam ipsa membra peruaserit. Cumprimùm igitur hausto veneno vehemens succedit inflammatio, crebris vomitionibus excludēdum id est:

A πρῶ δὲ τὸ ποιεῖν ἓ ἀπεργαζόμενόν τι, καθ' ἕκαστον αἴτιον δείκνυ) τ ὑποκειμένων ἐν ζῴοις σώμασιν, ἐπί τε τ ἐνεμένων καὶ θανασίμων φαρμάκων. ἀνάγκη δ ὑποπίπτειν φαίνεσθαι τ τῶν αἰτίων διαφορᾶς. πεπλάνηνται ὃ καὶ ταύτα διαίρεσιν ἀκριβῆ οὐκ εἰληφότες. λέγω δ ἐγ πρᾶξις δολοφονικοῖς αἴτιον ὑπάρχειν ἡ αὐτὸ μόνον τὸ πληγὴν παρασκευαστικὸν, καὶ δίτι συνεκτικόν. ὡς βυβλίων ἦχος ἓ βυβλίων πυρετός, καὶ τὸ συνεφιγμένον ὃ ἀποπλεσματικῶ, χωρίζομόν τι ὡς πῶμα καὶ ἄσμαλος. ἡ καθόλου ὃ ὅπου τι καὶ τ ἑαυτῆς φύσιν αἴτιον ὑπάρχειν μὴ περιέχῃ) ὃ ἔν τινι διαιρέσῃ, μεριθηρόν μ', ἀλλ' ἡ ἐξ αἴτιον τ τ ὁμοιοτήτων περιγίγραπται φύσεως. ὅπου ὃ τὸ φθοροποιόν ἐστιν αἴτιον, ἔχειν μ' ἡ ἀπὸ τ ὁμοιοτήτος, δείκνυ) ὃ ἐναργεστέρου ἐπὶ τ συμβαινόντων. τὸ γὰρ αἴτιον ὑπολαβεῖν εἶ) μείζω τ ἐκ τ δακέτου πληγὴν, ἢ τὴν ἐπιγινομένην ὑπὸ τῆς ζῴου δυνάμεως, ἓ τ εἰς τὰ σώματα ἐκπεμπόμενον ἰόν; μή τε ψῦξιν, μή τε ἔγκαυσιν, μή τε ἐκκοπὴν, μή τε ἀπόφυσιν, μή τι ἄλλο τι παραπλήσιον ἔχοντες αἰτιᾶσθαι. ἐπεὶ ὃ ἓ τ διαφορᾶς χαίρουσι τ αἰτίων, ἀλλ' μ', κἀγὼ νῦν συνεκτικὰ, ἀλλ' ὃ, προκαταρκτικά, λεκτέον αὐτοῖς ὅτι καθ' ἕτερον δή τινα τῶν αἰτίων ἐστί. τὸ προκαταρκτικὸν ῥηθήσεται) ὃ ἀπὸ τ προσάγειν τ ἀπὸ ἐλέσμαλος, ἓ τὸ προϋπόρχειν λαμβανόμενον τ σώματος. συνεκτικὸν ὃ, ἐπιφέρειν τ παρόντων παροξυσμὸν αὐτὸ πάρεστι, τ χωρίζοντος αὐτ, χωρίζει) ἓ τὰ συμβαίνοντα, ἃ περὶ αὐτὸ. πλείονα μ' ἔστιν ἃ δ' πλείω ῥητέον. δέον ὃ ἔσεσθαι ἐναργεστάτην φθοροποιὸν δύναμιν αὐτὴν εἶ), ἓ τ προπεσόμενον σκοπὸν τ ποιητέον. ἓ προ μὲν τ κατασκευῆς τ παθῶν, ποικίλως διαγωνιστέον μέχρι τῆς παντελοῦς αὐτ ἀποσκευασθῆναι τ σωμ. ὅταν μ', ὑπεξαιρεμένην δ' ὧν εἰσιὼν μερῶν τοῦτο ὃ, κατευθύνειν περὶ ἐκεῖ, ἔνθα μάλιστα δ κυρίως τόπος, πρὶν εἰς τὸ βάθος ἀπῤῥῆξαι τ καὶ λαθραίως ἅλασθαι. ἔστι ὃ, ἀποπλυνομένην ἡ ἐπιπυρωθεῖσαν, ἐπιφθάσαι φθάσαν χωρῆσαι διὰ τ σωμ. ὅτε μὲν οὖν ἀποῤῥοίσεις αὐτοῖς, καιρὸς ὅτι τῶν θανασίμων φαρμάκων δ' ἐμέτων γένεται

* Pal. recēt omittit vocem αἴτιον

Pal. recent. aliud quid dicens.

Pal. διαφορᾶς

*

Portē. Κατασκευαστικὸν

Is Palat. recens. deest δὲ

Pal. v. διαιρέσει, πλὴν διαιρεσιν ἐν μεγίστοις αὐτ, καὶ τὰ ἐν τοῖς τ ὁμοιοτήτων συνεχόντα αὐτοῖς αἴτιον Pal recent pro οὐχὶ Ν. ἀμὲν Ν legit.

Pal. διαλλαττον Ν αὐτοῖς

Legēd m videtur ἐκφαγὼν δὲ τῶν Pal. ἐκ τοῦ ἐφαγὸν τὸν αἴτιον δὲ ἐνεν. Alter Pal. ἐκ τοῦ ἐφαγὸν δὲ τοῦν.

Pal. recent. καὶ συνεστηκὸς λαμβάνων &c.

Pal. recent. καὶ συνεστηκὸς λαμβάνων τῶ Pal. νεῦρον Pal recent Ν ἡ ἐκπυρ

ὅτι δὲ τῶ ἰοβόλων, ὅλῳ τῷ καθαρσμῷ, καὶ σικυῶν προσβολῆς, ἐκμυζήσεως καὶ τομῆς καθαρσμῷ, ὁτὲ μὲν ἀκρωτηριασμῷ. ἡ δὲ καθαρσις καὶ διαχώρησις, ὅλῳ κλύσεων δὲ ὅλῳ δριμέων ἐπιθέσεως φαρμάκων. Τούτων δὲ κρατεῖν ὁμοῦ δὲ ἀποπλύνειν δύναται τὸ ἰόν. ἡ σύστασις δὲ καὶ ἡ κράτησις δι' ἀκρατοποσίας ἀκράτου τι δὲ γλυκέως, ἢ καὶ ἐκ τῶν ἐναντίων δριμυφαγίας. ἐπὶ τελεῖ δὲ συνεργεῖ τούτοις καὶ καθαρσις κοιλίας, καὶ ἱδρωτοποσία, καὶ πινάκια κοινῶς, καθὼς καὶ μέρος ἐπιδείξομεν. δεῖ δὲ οὐ μόνον τὸ φθοροποιὸν ὕλης ποιεῖσθαι σκοπόν, ἀλλὰ καὶ τὸ μέγεθος αὐτῆς καὶ τὸ χρόνον. δὲ γὰρ πρὸ τούτων πλείονα ὅσην διαφοραὶ τὰ βοηθήματα λαμβάνει. πρὸ μὲν τὸ μέγεθος, ἐπὶ φθορᾶς τῶν δηλητηρίων δὲ τῶ ἰοβόλων, τὰ μὲν, διεφθαρκὰ κινδύνων γένοιτ' ἂν, σπανιδόνων καθυπέρων ἢ ὅτι παλαιοτέρων· τὰ δὲ, περιωδυνιῶν σφοδροτέρων, ἢ ἀμυδροτέρων· τὰ δὲ, ἄλλων δυσεργημοτέρων, ἢ ἧττον ἢ μᾶλλον ὀχλήσεων. δεῖ δὲ πρὸς τὸ κίνδυνον ἐχούσας, διὰ τῶ ἀγωνιστικωτέρων ἀγωνίζεσθαι βοηθημάτων πρὸς γὰρ τὰ ἥττονα χαλεπὰ, ὅλῳ τῶ ἐπιφερεστέρων. ἄτοπον γὰρ ἐπὶ μὲν τῶ μᾶζόνων μικροτέροις, αὖθ' ὅτῳ τύχῃ, χρώμενον τοῖς βοηθήμασι, κινδυνεύειν τῶ θεραπευόμενον ἀβεβαιότερον ἐπὶ δὲ τῶ μικροτέρων δὲ ἀπορίαν τῶ βοηθείας μᾶλλον αἰτιᾶσθαι τὸ σῶμα. πρόχρος δὲ καὶ ὁ ἀπὸ τῶ χρόνων ἐστὶν ὁρισμός· ὁ μὲν γὰρ ὀξέως τὸ πρᾶγμα, δὲ τοῖς ὀχλήσεις τὸ τοῖς κινδύνοις ἐπιφερεῖ· ὁ δὲ ἐξ αἰαβολῆς τὸ χρόνῳ πλείονος ἢ ἧττονος. προσκαίειν τοίνυν τοῖς μὲν ὀξέσι, κατεπισυσμένως βοηθεῖν δὲ ὅλῳ πολλῶν ὁμοῦ· τοῖς δὲ, σχολαιοτέροις. ἔνιοι μὲν οὖν ὡς ἐν τριχολογίᾳ μετρίως ὥρισαι. προάγωμεν δὲ ἐξῆς ὡς ὅτι κατὰ μέρος.

Σημεῖα κυνὸς λυττῶντος, καὶ τῶν ὑπ' αὐτοῦ δεδηγμένων. Κεφ. α'.

ΤΟν μὲν οὖν τῶν λυσσοδήκτων λόγον προσήκειν τάξαμεν τῶν ἄλλων, ἐπεὶ καὶ ὁ ζῶον πολύ τι τῶ σύνηθες ἐστι, καὶ συνεχῶς ὀφίσκεται τῇ λύσσῃ ὁ κύων καὶ ἀπόλλυται, τῶ δυσφύλακτον καὶ λοιπὰ· δὲ ὁ ἀπ' αὐτοῦ κίνδυνος ἀπαραίτητός ἐστιν, εἰ μὴ πολλοῖς χρήσαιτο

sin ictu morsúve impressum est, scarificatione, affixis cucurbitulis, sucu & carnis scalpello facta circinatione: interdũ etiam extremæ partis amputatione euocatur. Retinetur vero atq; cohibetur, infusis enematis & impositis medicamẽtis acribus: hęc simul vtiq; virus coercere & eluere possunt. Restinguitur porrò & cuincitur meracioris vini passive potu, aut etiã esu acriũ quæ cõtraria vi polleant. Postremo tandẽ alui purgatio, sudoris euocatio, & alia quædã in cõmune, quæ sigillatim demõstrabimus, auxiliantur. Verumenimuerò nõ corruptricem tantum materiã ceu scopum, sed & eius magnitudinẽ, ac ipsum quoq; tẽpus attẽdere oportet. Etenim ab his remedia quàm maximũ discrimẽ capessunt. A magnitudine quidẽ, quoniã nonnulla è venenis tam hausti quã ictu morsúve inflictis, præsentia pericula cõflandi vim habẽt, alia putrẽdines altiores aut magis superficiarias excitãt: alia dolores aut vehementiores aut leuiores cient, alia deniq; incõmoda magis minúsve infestãtia inuehũt. Quamobrem oportet quę grauius periculum afferunt, valentioribus auxiliis oppugnare: quæ contra minùs infesta sunt, mitioribus. Quippe absurdum fuerit in grauioribus malis, segnioribus medicamentis, si ita contingat, vti, atq; adeò hominẽ in discrimen adducere: in minoribus verò, præcipiti violentáque curatione frustrà corpꝰ excarnificare. Est & in prõptu quæ à tẽpore desumitur indicatio: sunt enim quæ præsentẽ ac subitaneã pernicieẽ inferũt, alia verò non nisi tẽporis spatio, sed modò lõgiore, modò breuiore nocẽt. Itaq; in acutis quidẽ, festinãter multa simul auxilia repræsentari oportet, reliquis, tardiùs. Hisce artis quandã ceu formulam abundè cõplexi sumus: reliquum est, vt ad particularia sigillatim exponẽda pgrediamur.

Signa rabiosi canis, eorúmque qui ab eo demorsi fuerint. Cap. 1.

DE rabidi canis morsu tractatũ aliis iocirco præposuimus, quòd id animal, vt frequens & homini familiare est, ita & rabie sæpenumerò prehenditur, indéque perit, & ab eo tibi cauere difficile est: hinc tamen periculum incuitabile hominem manet, nisi multis iísque conuenientibus vtatur

Pal. recent. ταῦτα κρατεῖν ὁμοῦ ἀποπλύνειν τὸ ἰόν

Pal. recent. ἰὸν ἡ σύστασις

Sic legendũ esse, non μεγεθ. vt habetur in vulg. exẽpl. docet ea quæ proxime sequuntur. Sed & recentior Palat. codex habet, ἀλλὰ καὶ τὸ μεγέθος αὐτῆς καὶ τὸ

Pal. ἀλλὰ καὶ ἀπορίαν

Pal. recẽs. omittit τοίνυν. Pal. κρατησαι-ἀκρατου

Pal. τριχολογίαν Pal. recẽt. ὡρισ.

auxiliis. Plerunque verò canis in rabiem agitur per flagrantissimos æstus, ac interdum etiá per sæuissima frigora. Rabie autē correptus & potum & escam auersatur, largā spumantémq; pituitam naribus & ore proiicit, toruū ac solito tristiùs intuetur, in omnes æquè bestias hominésq; irruit, ac omnes passim tam familiares quam ignotos mordet: neq; tamen protinus aliud quicquā graue, quam ex vulnere dolorē infert: at deinceps morbum ab aquæ metu, hydrophobiam Græcis appellatum, inuehit. Hunc comitātur conuulsiones ac totius corporis rubores, præsertimq; faciei, cum exudatione & languore quodam. Ex hoc mali genere correptis sunt qui lucis splendorem refugiant, alij assiduo dolorum cruciatu cōficiuntur. Neq; desunt qui canū more latratus edant, & obuios quosq; dētibus appetant, morsúque suo alios simili morbo inficiant. Ex iis porro qui in eiusmodi morbū incurrissent, nullū seruatū scimus: tantummodò ex historiis vnum aut alterū euasisse accepimus. Enimuero EVdemus superstitem quēdam euasisse narrat. Themisonē etiá aliqui demorsum in hunc affectū incidisse, ac nihilominus seruatū asserunt: alij cùm ab amici aquę metu cruciati latere, cuius cōmiserescebat, vix vnqua discederet, illiq; alacriter omne præstaret officiū, similem cōtraxisse affectum: attamen post multos tandē cruciatus euasisse. Est igitur hoc genus morbi miserrimū, & curatu per quam difficile: sed à quo tamen, prius quàm ipsō tentarētur, demorsos haud paucos ipsi vindicauimus, & complures itidem ab aliis medicis conseruatos nouimus.

Morsus rabidi canis particularia remedia. Cap. II.

RATIO medendi quædā cōmunis est, qua vtendū in iis omnibus qui a viruléta quauis bestia demorsū fuerint; altera iis peculiaris quos rabiosus canis momorderit: quæ nonnullis quidē maximè prodesse cōsueuit, aliis verò est inutilis, quibus scilicet iam ex lōgo tēpore morsus illatus fuerit. Hanc nos medendi rationem priore loco exponemus: deinde & communē illā cursim perstringemus. Cancros itaque fluuiatiles igni è vitis albæ sarmentis cremare oportet, & cinerem eorum quam minutissimè tritum habere reconditum:

A τοῖς βοηθήμασι λυσᾶ ἢ ὀχύων· ὡς ὅτι τὸ πολὺ μὲν ἐν τοῖς σφοδροῖς ἀέσι καύμασιν ἐπίσης ἢ ἐν τοῖς ἐφιγμένοις κρύεσι. λυσσᾶσας ἢ ἀποδεπτ) καὶ ῥῶσιν ἐπὶ πόσιν καὶ φλέγμα πολὺ ἀφρῶδες ἐκ τ στόματος ἐπὶ τ ῥινῶν προβάλλ. ἐπιπρὸν βλέπ, καὶ φυγόντερον τ συνήθους· ἐφορμᾶ ἢ χαρὶς ὑ-

B λακῆς πᾶσιν ὁμοίως καὶ θηρίοις καὶ ἀνθρώποις, πᾶσί τε συνήθεσι καὶ ἀγνώτοις, δάκνων. καὶ παραχρῆμα μὲν ἀλγηρὸν ἐπιφέρει, πλὴν ὅσον ὀδύνην τ ἐκ τ τραύματος ὕστερον δι' ἐμποιᾶς πάθος τὸ καλούμενον ὑδροφοβικόν. συμπίπτ) ἢ μ) ἀσαρκίαν καὶ ἐρυθήμ) ὅλου τ σώματος, μάλιστα ἢ ὅλου τ προσώ-

C που, καὶ μάλιστα ἀπὸ ἰσχάστως ἐπὶ ὀσφρήσεως καὶ ὄψεως· ἔνιοι δὲ ὑλακτοῦσιν, ὥσπερ κύνες, καὶ δακνουσιν· ὀδόντις καὶ δακνόντες, αἴσπερ αὐτῶν πάσχουσι κατίσχ), εἰ μὴ καθ' ἱστορίαν πεφλήφαμεν περιγμέα) ἕνα ἢ δεύτερον· καὶ γὰ ΕΥδημος ἐξεγγέλλ) πα)

D λινά φησι. καὶ Θεμίσωνα οἱ μὲν λέγουσιν ὅπως ἢ δηχθέντα ἐξέπεσεῖν, ἐπὶ σωθῆναι. ἐγὼ ἢ, φίλῳ ὑδροφοβιῶντι προσκαρτερήσαντα προθύμως ἐπὶ συμπαθῶς, εἰς τὴν ὁμοίαν ἐμπεσεῖν διάθεσιν, καὶ πολλὰ κακοπαθήσαντα σωθῆναι. ὃ μὲν οὖν πάσχουσιν ἐστὶν ἀρχαλέον· πρὸ δὲ τῆς πείρας αὐτὸ, πολλοὺς

E καὶ αὐτὸς ἐξεσώσαμεν, καὶ ὑπὸ ἄλλων ἰατρῶν σωθέντας ἐγνωμεν.

Θεραπεία τοπικὴ τῶν ὑπὸ λυσσώντος κυνὸς δηγμάτων. Κεφ. β'.

ΤΗΣ θεραπείας ἡ μὲν ἐστὶ κοινὴ καὶ χρήσιμον αὐτὴ ὅτι πάντων τ ὑπὸ τινος ἰοβόλου ζώου δεδηγμένων· ἡ δέ τις ἰδία τ λυσσώντων· δάκτων· τοῖς μὲν γὰ ἄκρως ὠφελῆσαι εἰθισμένη· τοῖς ἢ ἀπὸ πολλῆ δηχθεῖσιν, ἀμάρμονος.

F καὶ πρῶτόν τε αὐτὴν ἐκ τέμνωμεν, μ) τοῦτο ἐπὶ τῷ κοινῷ ἐκ ἐξαγορεύσωμεν. δεῖ τοίνυν καρκίνους ποταμίους ὅτι κλημάδος λευκῆς ἀμπέλου καῦσαι, καὶ τῷ τέφρᾳ αὐτῶν λειοτριβήσαντα ἔχειν ἀποκεκρυμμένον·

G

Alij ὅτι τὸ πολὺ

Lego ex Paulo, ὅλου τ σώματος

Malim ex Paulo, καὶ μετὰ ἀφῆνόσους καὶ ὄψεως. Alij ἀνθρώπους sed male.

Marc. & Cora. recte addi ex Paulo πλὴν ὅσον ἐπὶ ὀδύνην τ ἐκ τ τραύματος ὕστερον δι' ἐμποιᾶς πάθος τὸ καλούμενον ὑδροφοβικόν. sed malim hunc ordinem.

ὁμοίως ὴ καὶ ῥίζαν γεντιανῆς ἀποθλίβ, κε- A
χειμένην καὶ σεσομένην. ὁπότε δέ τις δη-
χθείη ὑπὸ λυσσώντος κυνὸς, εἰς οἶνου ἀκρά-
του κυάθους δ'. ἐμβάλλ ἐν δύο μὲ κοχλιά-
ρια τῆς τ καρκίνων τέφρας, ἐν ὴ κοχλιά-
ριον τῆς γεντιανῆς· καὶ ἐκπιέσαντας ὡς ἐν
ἀλφίτῳ δίδου μέρη, πίνειν ἀπὸ τ ά. ἡμέ-
Corn. legendum suspiratur τεσσα- ρας, μέχρι τεσσάρων ἡμερῶν. ἀπαρχῆς μὲ B
ράκοντα διδόμενον τὸ φάρμακον, τῶν προσ-
φερέσθω τ ζ πον. εἰ ὴ ἡμέραι παρελήλυ-
θασι δύο ἢ ῥῆς ἀπὸ τ δήξεως, ἐγχειροῦν-
τας τῇ θεραπείᾳ, πλειόνων δεῖ διδόναι
ὅσον εἰζαρχῆς εἰρήκαμεν. ὃ μὲν ἄριστον ἐπὶ
τῶν λυσσοδήκτων βοήθημα, ὁ δὴ καὶ μόνον
οἷοις ἤρκεσε, τοῦτό ἐστι, τὸ χρηστέον αὐτῷ με- C
τὰ πεποιθήσεως· ἕνεκα ὴ τοῦ καὶ δι' ἀλλων
ἡ[illegible]λίας, πρὸς ἄφυκτον δοκοῦσα κίνδυ-
νον, ὑδὲν τὸ κωλύον ἐστὶ καὶ τοῖς λοιποῖς χρῆ-
σασθαι. αἱρετώτερον ὴ ἀχρεκοπῆς, αἰ οὕτω τύ-
χοι, τ βοηθημάτ ὃ ἀποφθορωτέραν ὑπομεῖναι,
ἢ διὰ τὴν ὀλιγωρίαν κινδύνῳ περιπεσεῖν.
οὐχ οὕτω δ' βούλεσθαι τὰ μεγάλα ῥαύ- D
ματα ἐπὶ τ λυσσοδήκτων, ὡς ἔστι μικρὰ καὶ
ταῖς ἀμυχαῖς ἐμφερῆ· δύσκολον γὰρ τ μείζονα
ἄθροον καὶ πολὺ αἷμα προχέοντα, δύνα-
σθαί τι καὶ τῶν ἰοῦ συναποκλύζειν ἀλλ' ὴ τῶν
μικροτέρων, οὐδαμῶς· καὶ ἐκ μὲν τῶν μει-
ζόνων χρὴ ἀφισαμένας σάρκας αὐτόθεν ἀ-
φαιρετέον, καὶ τὰ χείλη περιγλυπτέον διὰ E
τῆς ἀκμῆς· ἀναπλήσεως δὲ τῆς σαρκὸς
ἀγκίστρῳ ἢ μύδρῳ, τὴν ἐκ τομὴν ἀποτε-
λεσέον. ὅθεν ἀμφοτέρων δὲ τὰ ἐν κύκλῳ
βαθυτέρας ἀμυχαῖς καλαφασέον, εἴπως
Par. sinus Sic Goup. alter cod. Vulg. ex. ἐκπλυσιτέρας, minus recte. ἢ τῶν αἱματος πλείων ῥυσμὸν κέιωσις,
ἐνδυλωθήσεται τὰ σώματα τῇ τ ἰοῦ δια-
δόσῃ. πολλὰ δὲ καὶ ἡ σικύα κολληθεῖσα F
μετὰ πολλῆς φλογὸς ὠφέλησε, ὥς τι λύσαι τοῦ ἰοῦ πλέον δυνάμεν. Ἡ δὲ
καῦσις, ἀνυσιμώτατον ὄπτι τῶν ἰοβόλων ἐ-
στὶ βοηθημάτων. ὃ γὰρ πῦρ πάσης δυ-
νάμεως βιπινώτερον ὑπάρχον, ὁμοῦ
μὲν κρατεῖ καὶ κωλύει φέρεσθαι τὸν ἰὸν
ἐσωτέρω, ὁμοῦ δὲ ὃ κρατήσειν αὐτὸ μέ- G
χρις τῆς ἐφεξῆς θεραπείας καταβο-
λὴν οὐ πάνυ τυχοῦσαν ἐργάζεται, τῶν σα-

pariter & gentianæ radicem tusam cribratámque reponere. Quoties autē canis rabiosus alicui morsum intulerit, in quaternos meraci vini cyathos bina cineris cancrorum cochlearia, vnúmq; gentianæ, conijciantur: ac vbi in polentæ dilutioris modum subacta remistáque fuerint, quatriduo bibantur. Cum igitur primo statim vulneris inflicti tempore hoc medicamentum exhibebitur, in hunc propinabitur modum. Quòd si ab illato morsu duo tréſve dies interceſſerint, dum curationem aggrediemur, duplum quoque triplúmve ponderis eius quod ab initio retulimus, exhibebimus. Efficaciſſimum quidem hoc eſt aduerſus rabioſorum morſus auxilium, quod etiā vnicū nonnullis ſatis ad ſalutem fuit, quóque cum fiducia vti licet: attamen quò firmius contra periculū, vt videtur, ineuitabile, munimur, nihil quicquam obſtat, quominus & aliis vtamur auxiliis. Sed & inhumanos quantumuis fruſtra remediorū tolerare cruciatus ſatius multo fuerit, quàm per inertiam negligētiámve in diſcrimen adduci. Neq. vero tantoperè metuenda in demorſis à rabioſo cane maiuſcula vulnera, quātoperè minora, iiſq; ſimilia quæ per leuē ſcarificationē fieri ſolita ſunt: quippe maiori vulnere copioſior ſanguis cōfertim emanans virulenti liquoris nonnihil ſimul & ſemel exhaurire poteſt: id quod minori vulnere fieri nequit. Quin & à maioribus abſcedentes carnes quamprimùm auferri, ac ipſa quoq; labia acie ſcalpelli circunſcribi oportet: prehenſa autem hamulo vellélave caro amputanda. In vtriſque autem partes veluti circulo vulnus ambiētes vulnuſculis altioribus circū ſcarificandæ: ſic enim copioſiore vacuato ſanguine cauebitur, ne virus intrò ſeſe inferat intrudátve. Quin & affixa cum multa flamma cucurbitula, maximo fuerit adiumento ad veneni vim exoluendam. Sed contra virulentos ictus vltio omniū expeditiſſimum eſt auxilium: vt enim ignis, qua præ cæteris omnibus pollet efficacia, virus ipſum eumcit penitúſque ferri prohibet, ita & pars ignem experta, futuræ deinceps curationi non mediocre iacit funda-

mentum, dum diutius vlcerata permanet: quam ob causam etiam exinde accuratè animaduertendum, vt ne cùm excidet crusta, celeriùs quàm par est vlceris oræ coëant coalescántve. Quin si fieri potest, magnam partè statu præfinitique temporis vlcerationes quantumuis inflammatione obsessas atque sordidas prorogari conuenit. Id commodè præstabit inditum iis salsamentum, itémque syluestre allium detritum: similiter & cepæ, ac imprimis liquor Cyrenaïcus, aut qui Medicis Parthicúsve appellatur. Tritici quoque grana tam mansa quàm minimè mansa imponantur: hæc enim dum humore concepto turgescút, vulnera dilatant. Neque desunt qui commáducata eiusmodi grana arbitrentur à mandétium ieiunio vim aliquam ascíscere, quæ veneno repugnet: verùm id certum non est. Tempestiuus tamen eorum vsus minimè contemnendus est. At si, quod sæpenumerò accidit, antè quadraginta dies coëant committantúrque cicatrices, manus ope refricandæ, seu carnem scalpello circinando & amputando: seu etiam, si libuerit, iterum inurendo. Transacto verò statu præfinitóque tempore, & permittendum vt vlcera cicatrice obducantur, & pars tota emplastro quod è sale conficitur comprehendenda; tandémque paucis post diebus & sinapismus adhibendus est.

A μᾶλλον τῆς ἁλκώσεως ἐπιπλέον. τὴν μὲν γὰρ ἔκπωσιν τῆς ἐχάρας μάλιστα ἐκ τούτου φρονλιστέον, ὅπως μὴ τάχιον τὰ μέρη συγκλῃσθείη ἄνω· εἰ δυνατὸν ἔστι πολὺ τῆς προθεσμίας ἕως ἑλκώσεις τριττέον, καὶ ἐπιφλεγμαινούσας καὶ ὑπερῤῥυπαρομένας. παρέξει δὲ αὐτὰς ὁ πιούτατος ἄρτος ὑπο-

B λιπαίνων, καὶ σκόροδον ἄγριον λελειοβριθηθὲν, κρόμμυά τε ὡσαύτως· ὅπως μὴ οἷόν μάλιστα ὁ Κυρηναϊκὸς, ἢ ὁ καλούμενος Μηδικὸς ἢ Παρθικός. κόκκοι δὲ πυροῦ ὑπτιωθέντος καὶ μεμασημένοι ἐν ἁμάσσει· ἀφ' ὑγροτέροις μὲν γὰρ ἀπὸ τῆς ἐμβροχῆς, αἰωρωμένοις τὰ τε αἵματα.

C ἰοῦσι δὲ οἴονται σὺν μεμασημένοις αὐλιπαθὲς τι ἔχειν ἀπὸ τῆς τῶν μεμασημένων νησείας· οὐμενοῦν τοῦτο βέβαιόν ἐστιν· ἀλλὰ δικαίρως αὐτοῖς χρηστέον. εἰ δὲ, ὅπερ γίνεται πολλάκις, καὶ οὐλαὶ συνερχόμεναι φθάνοιεν πρὸ τῶν ἡμερῶν, ἀφ' χειρὸς ἀναξαίνειν προσήκει, πρωτοτομίζοντας καὶ τιμωνίζοντας, ἢ καὶ ὑπτιάσαντας

D πάλιν, ἐὰν οὕπω πέπ. τοῖς δὲ τῆς προσκειμένης προθεσμίας, ἀφεστέον μὲν ἀπουλωθείσας τοῖς ἕλκεσιν ἐμπλάστρου δὲ τῇ ἀφ' ἑτέρων ἄλων ὅλων ἁλῶν τόπον καταλληπτέον μετ' ὀλίγας δὲ ἡμέρας καὶ σιναπιστέον.

De victus ratione demorsorum à cane rabioso. Cap. III.

TAVTA quidem sunt morsus rabiosi canis particularia remedia. Eam verò victus rationem institui par est, quæ potissimum veneno aduersetur, vt ipsius vires hebetet restinguátq; , ac simul etiam arceat, quo minus ad intima pnicies illabatur. Etenim assumpta maleficæ qualitatis penetrationi restiterint. Horum vtrunque commodè præstare potest vini meracioris, passi, lactisque potus: siquidem qui hæc omnia prouidè assumút, & veneno non parùm obsistunt, & illius omnẽ acrimoniá obtundunt. Simili modo prodest alliorú, porrorú ceparúmque esus: quippe cùm planè difficulter cõficiantur, vixq; aboleátur.

Περὶ Διαίτης τῶν ὑπὸ κυνὸς λυσσώντος δηχθέντων. Κεφ. γ'.

HMEN οὖν τοπικὴ θεραπία τῶν λυσσοδήκτων, ζητουμένη τυγχάνει. δεῖ δὲ καὶ τὴν διαγωγὴν αὐτῶν ἐπιτηδεῖον ποιεῖσθαι, ἵνα ἐμοῦ μὴ ἀμβλυωπῇ καὶ σκοτοδινιᾷ τὸν δυσωδίαν, ὁμοῦ δὲ κωλύῃ τὴν εἰς βάθος φορέσιν. καταλαμβάνομεν γὰρ αὐτὰ ἀντιπίπτει τῇ παρισοδύσῃ τῆς φθορποιοῦ δυνάμεως. δύναται δὲ ζύτων ἑκάτερον παρέχειν τοῦτο, οἷον ἀκρήτου ζωροτέρου πίσις καὶ γλυκέος καὶ μέλανος. ἅπερ γὰρ τούτων πάντα λαμβάνοντες πρὸς τὸν ὑπτιασμὸν, ἐνίσανται πίσῃ, καὶ πάσῃ αὐτῇ τὴν δριμύτητα ἐκκαίει. ὡσαύτως δὲ καὶ σκόροδον καὶ πρόμμυον ἐδωδὴ· καὶ ταῦτα γὰρ ὅλον δυσμεταβλητα καὶ δυσεξίτηλα.

nn. iij.

ἀμφοτέροις γὰρ αὐτῶν αἱ ποιότητες ὀλίγας πλείους ἡμέρας, ὁπότερον οὐ κατὰ τὸν τρόπον) οὔτε ὑπὸ τῆς φθοροποιοῦ δυνάμεως, οὐκ εἰς τοὐναντίον κρατεῖν αὐτῆς πέφυκεν. εἰς τοῦτο δὲ καὶ τῶν ἀντιδότων ὀφείλει χρεία, καὶ τῆς θηριακῆς, καὶ τῆς Εὐπατορείου λεγομένης, καὶ τῆς Μιθριδατείου, καὶ πάσης ἄλλης ἥτις οὐκ πλειόνων ἀρωμάτων εἴληφε τὴν σύγκρασιν. δυσμεταβλήτως γὰρ τῇ συγκράσει πάντα τὰ ἀρώματα ταῖς δυνάμεσι καὶ ταῖς οὐσίαις· διὸ καὶ ἰσχυρότερα τοῖς σώμασι. τοιοῦτος μὲν οὖν καὶ ὁ τῆς διαίτης τρόπος· δεῖ δὲ γινώσκειν ὅτι ἡ τῶν ὑδροφοβικῶν πάθους ἐγκατάσκηψις, σπάνιος ἀφισμένων ἔχει παρατήρησιν. ὡς ὀψιπλάνητον γὰρ ἕως τεσσαρακοστῆς ἡμέρας εἰώθασι, τοῖς ἀμεληθεῖσι καὶ δι' ἑξαμήνου ἐνίοις ἀπήντησε. καὶ δι' ἐνιαυτοῦ καὶ τριῶν ἡμῖν ἐώραται. ἰσχυσάν δέ τινες μετὰ ἐπιμέλειαν ἐνίοις ἐνδιδοῦναι τὴν πάθη. καὶ κατὰ μὲν τὰς ἀρχὰς τῶν λυσσοδήκτων ἡ θεραπεία τοιαύτη ἐστίν. ἐὰν δὲ ὁπωσδηποτοῦν ἐν ταῖς τεσσαράσι ἡμέραις μὴ παρελήφθῃ τὰ παρειρημένα βοηθήματα, ὃ μὴ παρισαρκίζειν τὸ καιόν, παραλαμπτέον. καὶ γὰρ ἰσχυρῶς εἰς τὸ παρελθὸν μετάγειν δύνανται. ὑδρομία γὰρ ὄντος τοῦ ὑποχόλου, ἀλλὰ διακενῆ τὰ σώματα ταῖς ὀδύναις βλαβῆναι ἔστιν τρόπος ἡ τῆς θεραπείας ἕτερος ἀγέσθω, καθαρσις, ἡ τὸ μέγα ὄφελος ἐμπαρέχει δυναμένη, συμμέλαινα μὲν γὰρ τὴν ἕξιν κινοῦσα· ἡ τε διὰ τῆς κολοκυνθίδος ἱερὰ δόσις· τὸ δὲ γάλα τὸ ὀξὺ, ὁμοῦ καθαρσιν τὸ ἐπικράσεως παρέχειν δυνάμενον· αἵ τε δριμυφαγίαι τὸ ἡ τοῦ ἀκράτου πόσις, παραλαμβανέσθωσαν καθ' ἡμέραν, ἀμβλυῶπες δυνάμεναι ἰόν· ἐπὶ τροῖς δὲ τούτοις ἱδρωτοποιία, καὶ πρὸ τροφῆς καὶ μετὰ προφύ. ἀρωματισμός τε ἐπὶ σιναπισμὸς κατὰ μέρος ἐφ' ὅλου τοῦ σώματος. πάντων δὲ ἀνισωμάτων ἀπὸ τούτων ὁ ἑλλεβορισμὸς ἐγνώσθη, ἐπὶ χρηστὸν τεθαρρηκότως ἐπὶ βοηθήματι, οὐχ ἅπαξ, οὐδὶς δὶς, ἀλλὰ καὶ πλείσακις πρὸ τῆς τεσσαρακοστῆς ἢ καὶ μετὰ ταῦτα. τοσαύτην γὰρ τὴν ἰσχὺν

A Nam dies cõpluſculos eorum qualitates remanẽt, tandiúq; à vi mortifera neque euincuntur illa neque immutantur, ſed contra hanc ipſam ſuapte natura ſuperant. Ad hoc ipſum valet antidotorũ vſus, ac theriacæ, præſertim tum eius quæ EVpatoria, tum etiã eius quæ Mithridatia dicitur, necnon & alius cuiuſ-
B uis, quę quidem è cõpluribus cõſtet aromatis: quippe aromata omnia ęgrè ſuas tum qualitates tum ſubſtantias permutãt, atq; adeò integris viribus diutiùs in corporibus retinẽtur. Victus igitur ratio hoc modo ſe habet. Illud porrò noſſe oportet, pauorem aquæ non ſtato præfinitoq; tempore ſolitum inuadere. Cum e-
C nim vtplurimum ad quadrageſimũ vſque diem differri cõſueuerit, neglectis tamen quibuſdã poſt ſemeſtre imò etiam poſt annum ſuperueniſſe obſeruauimus. Sunt & qui narrent, nõnullos poſt ſeptennium eo affectu correptos fuiſſe. Ac inter initia quidem ea demorſorum à cane rabioſo debet eſſe curatio, quam
D antè retulimus. Verumenimuerò ſi illa antè memorata auxilia primis diebus quacunque ex cauſa prætermiſſa fuerint, alienũ deinceps erit, & carnẽ ſcalpro circinare, & vſtionẽ experiri. Nec enim amplius quod iam intro illapſum fuerit iſtis auxiliis ſatis euocare poſſis. Nulla vtiq; tum eſſet illorũ occaſio aut vtilitas,
E ſed fruſtra corpora doloribus ᵉcruciarentur. Proinde alia curationis ineunda ratio: nimirum imperanda purgatio, quæ dum corpus agitãdo ipſius habitum tranſmutat, magnũ affert adiumentum. Cõmode verò vſurpari poterit hiera quę colocynthidem recipit: itémq; lac ſchiſton, quippe quod ſimul & deiectionem moliri poteſt, & cõtemperandi vim
F habet. Cibi itidem acres & meraculi potus, quibus vis veneni egregiè retundi poteſt, quotidie aſſumi debent. Præter hæc ſudores & ante cibum, & a cibo eliciendi: quin & dropaces ac ſinapiſmi vniuerſo corpori alternatim adhibendi. Attamen helleboriſmus longe omnium efficaciſſimum deprehenditur auxilium, quo quidẽ cum fiducia non
G ſemel aut iterũ, ſed etiã frequentius ante diem quadrageſimũ, vel poſt hoc etiã tẽpus, vti licet. Tantã enim vim

ᵉ vel, ſuigerunt

habet id genus auxilij, vt nonnulli qui iam aquæ metu prehendebantur, ſumpto in ipſo morbi inſultu elleboro incolumes euaſerint. Nã eo malo iam detẽtos ne ipſum quidem elleborum ſeruare poſſit.

Hactenus velut eramus polliciti, curam cõtra rabioſi canis morſum breui ſermone expoſuimus. Iam ad reliquos virulentorum animantium morſus ictúſve tranſeuntes, eorum ſigna primùm vno contextu trademus, deinde verò communem medendi rationẽ, quæ omnibus ex æquo conueniat, explicabimus. Tandem curſim ea ſubiiciemus quæ nonnullos ſua proprietate iuuare poſſunt. Similiter & quæ venena nullis prorſum cedant remediis, annotabimus.

A παρεμφέρεται δ βοήθημα, ὡς τι τῶν ἤδη συνεπιθημένων τῷ ὑδροφόβου, παρεισπιθαμὰς λαβόντας ἑλλέβορον βλάβας ὐκ ἐν τῷ παρόντι καταπειρασμῷ τὸ συμπτώματος. οὐ γὰρ ἤδη καταγνόντες, οὐδὲ αὐτός τι παρεκπονῆσαι δύναται. Τῶν μὲν οὖν τῶν λυσοδήκτων ὑπομέλλομεν παρεῖναι

B τὴν ἀξιόλογον, δι' ἣν ἐμπαρεσθαι εἰρηκαμὲν ὑπολογισμόν. μεταβαίνοντες δ' ὅτι τὰ λοιπὰ τῶν ἰοβόλων, παρέξομεν μὲν τὰς σημειώσεις αὐτῶν κοινὰ μίαν ἐκθησόμεθα πρόφασιν μετὰ τοῦτο, κοινὴν τὴν θεραπείαν πᾶσιν ἁρμόσαν διαλαβόντες. κοινοδραμόντες δ' ἐξῆς κοινὰ διέξιμεν εἴ τινα

C κατ' ἰδιότητα εἴδους παρεμφαίη πέφυκεν. ὁμοίως καὶ τὰ τελείως ἀκόπτα παρασημανόμεθα.

Περὶ Φαλαγγίων. Κεφ. δ'.

In Ald. cod. hoc caput de Phalangijs principium eſt Dioſc. octaui libri. Sic & in antiquiore Palat. codice.

ΤΟΙΣ μὲν κοινὰ Φαλαγγίων δεδηγμένοις, αὐτὸς μὲν ὁ τόπος ὑπερυθὴς ἔστι καὶ ὅμοιος καιτόμασιν, οὔτι διοδυκνώς,

D οὔτι παρέλκρμος, ἀλλὰ μετρίως μὲν ὑπόφυθρος· ἐν δὲ τῷ ἐπιμήκει κατεψυγμένος παρέχεται ἢ ἔσμος δ' ὅλῳ τῷ σώματος, καὶ ἐπάσης παρὰ βουβῶνας καὶ τὰς ἰγνύας, παρεστοιχῆσαι αἰσθησιν· παρὰ δ' ὀσφὺν σύληψιμα καὶ συνεχὴς πρὸς ὄρθρον ἐρεθισμός· δυσκολία πολλὴ παρὰ τὴν

Sic habet Paulus: ſed cod. Ald. ὑπόφυγρος, quem ſecutus eſt Ruellius.

E ἔκκρισιν τῆς παρεσταλμένης. ὁμοίως δὲ τούτοις καὶ ἱδρὼς ψυχρὸς καθ' ὅλην τὴν ἐπιφάνειαν ἐκκρίνεται· τά τε ὄμματα δακρύῃ καὶ ποσῶς ἀμαυροῦται.

Περὶ Σκολοπένδρας. Κεφ. ε.

ΤΟΙΣ δὲ κοινὰ τὴν καλουμένης Σκολοπένδρας ἢ Ὀφιοκέντης, δεδηγμένοις,

F ὁ μὲν ἐν κύκλῳ τόπος τῆς δήγματος περιλύεται, ἐξίσχναται· καὶ ποτὲ τρυγώδης, ἢ τὸ ἀσθένιον καὶ ὑπερυθὴς φαίνεται. ἑλκοῦται δὲ ἀπ' αὐτῆς ἢ δήγματος λαμβάνων τὴν ἀρχήν, ἕλκωσίν τινα ὀδυνηρὸν καὶ δυσαλγῆ· πρὸς δὲ τούτοις παρέλκει ὅλον τὸ σῶμα συναίσθησις γίνεται κατασμώδης.

Paul. ἐπιμήκει

Ald. δύσφορον.

Περὶ Σκορπίου. Κεφ. ς'.

G ΤΟΙΣ δὲ κοινὰ σκορπίου δηχθεῖσιν, ὁ μὲν τόπος ὠδίνως ἄρχεται φλεγμαίνειν, σκληρὸς καὶ ὑπερυθὴς καὶ παρεσπασθὴς σὺν ὀδυνῃ γινόμενος· ἀλλάξ.

Paulus redditis, σκληρός,

De Phalangijs. Cap. IIII.

IIS qui à Phalangiis demorſi fuerint, pars affecta rubens, ac velut aculeis compuncta, conſpicitur: cæterùm neque intumeſcit, neqi adeò calet, ſed contrà quamuis mediocriter rubeat, frigida tamen deprehenditur. Conſequuntur verò totius corporis tremor, ac diſtentiones circa inguina & poplites, cõuulſionibus haud abſimiles, lumborum dolor & perpetua ad reddendam vrinam ſtimulatio necnon & eiuſdem excernendę difficultas. Similiter & vniuerſa cute frigidus ſudor emanat: collacrymant oculi & quodammodo caligant.

De Scolopendra. Cap. V.

SI CVI Scolopendra ſeu Ophioctena morſum intulit, pars per ambitum liuet atque computreſcit, interdúmque fæci ſimilis, at rariùs rubra, conſpicitur. A morſu ipſo exulcerari pars incipit, vlcúſque id & graue eſt & curatu difficile: præterea verò pruritus toto corpore perſentiſcitur.

De Scorpione. Cap. VI.

ICTA pars à Scorpione, quam primùm inflammatione tentatur, indureſcit, rubet, & cum dolore circumquaque diſtenditur:

ὁτὲ μὲν γὰρ πύρωσις, αὖθις δὲ ψῦξις ἐπιλαμβάνεται· καὶ πόνος ἐξαπίνης, καὶ ποτὲ μὲν ῥαΐζει, ποτὲ δ' ἐπιτείνεται. προέπεται δ' αὐτοῖς ἱδρὼς καὶ φρικώδης αἴσθησις, καὶ ζῆλος, εἶτα ψῦξις ἀκρωτήριον, καὶ βοβώνων ἔπαρσις, φύματα διὰ τῆς ἕδρας, ὀρθοπειχία τε καὶ δύσκρισις ἐπαλγὴς εἶτα τοῦ ὑποφαίνειν τῆς αἰσθήσεως, καθάπερ ἀπὸ βελόνης κεντημάτων. ἰδιωμάτων.

Paul. redit, ἀλυσμῶν

Περὶ Τρυγόνος θαλασσίας. Κεφ. ζ'.

Περὶ τῶν τριῶν

ΤΟΙΣ δ' ὑπὸ Τρυγόνος θαλασσίας δηχθεῖσι, πρόσαυξις μὲν ἀδιαθεσίας συμβαίνοισι δυσκατεργάστοις, ἀσυμοί τε συνεχεῖς καὶ πόνος, καὶ ἀπορία, καὶ διανοίας παραφορά. μετὰ δ' ἕτερα ἀφωνία, καὶ σπασμὸς ὀφθαλμῶν. αὐτὸς δ' ὁ πληγεὶς τόπος, πέλιος γίνεται καὶ μέλας τὰ κύκλῳ. καὶ τὰ πλησίον αὐτοῦ μέρη, καὶ ὧρος τοῦ ἀφοῦ αἰσθητοῦ. ἐπιπολὺ δέ τις αὐτὸν ἀποψήσῃ, ἰχὼρ ἐξ αὐτοῦ μύξας, παχὺς, δυσωδὴς ἐκρίνεται.

See alter Gr. paraphr. et vulg. exempl. (τὰ πλησίον αὐτοῦ μέρη, καὶ ὧρος τοῦ ἀφοῦ αἰσθητοῦ) Deest in Ald. contextu.

Περὶ Μυγαλῆς. Κεφ. η'.

ΤΟΙΣ δ' ὑπὸ Μυγαλῆς δηχθεῖσι, κύκλῳ μὲν τοῦ τὸν τόπον δήγματος γίνεται φλεγμονὴ, φλυκτὶς δ' ἐπανίσταται μέλαινα, μεθ' ἰχῶρος ὑδατώδους· καὶ τὰ πλησίον πάντα πελιδνοῦται. ῥαγείσης τε τῆς φλυκτίδος, νομὴ πολλαμβάνει τοῦ παπλήσια τῷ ἀπὸ τῶν ἑρπυστικῶν. σὺν δὲ τούτοις δ' παρέπεται καὶ τρόφος τοῦ τὰ ἔντερα, καὶ δυσουρία, καὶ ψυχρᾶς ἰδρῶτος ἔκχυσις.

Quidam addunt μερῶν

Περὶ Ἐχίδνης. Κεφ. θ'.

ΤΟΙΣ δ' ὑπὸ Ἐχίδνης δηχθεῖσι, οἰδεῖ καὶ ἐφ' ἑκάτερον τὸ σῶμα ξηραίνεται, τὸ χρῶμα δ' ὑπόλευκον ἔχει. ἰχὼρ δ' ἀπὸ τῶν τραυμάτων προχεῖται, τὸ μὲν πρῶτον ὑπόλιπαρος, μετὰ ταῦτα δὲ αἱματώδης· φλυκταινῶν τε ἐπανάστασις, καθάπερ ὅτε τοῖς πυρικαύστοις ἔπεται· καὶ νομὴ προκαταλαμβάνει προχωροῦσα ἐπὶ τὰ πρόσχειρα πολὺ πλησίον, ὑμένι ὑπολαβοῦσα, ἀλλὰ καὶ διὰ βάθους αἱμαίνεται δ' αὐτοῖς καὶ τὰ ὦτα· καὶ ὅλον ἡνίκα συνίσταται φλεγμονὴ τρόφοι τε καὶ χολώδης ὑπεισυμβαίνουσιν ἔμετοι. προσγίνεται δ' αὐτοῖς ἔμετος καὶ κάρος, καὶ δυσουρία, καὶ ψυχρὰ ἔκκρισις.

Paul. ἀλεξιφαρμ. Cain.

vicissimque modò exæstuat, modò frigore prehenditur: dolor itidem qui derepentè accessit, modo remittit, modò intenditur. Comitantur verò sudor, horroris sensus atque tremor. Quin & extremæ corporis partes refrigescunt, tument inguina, flatus per sedem erumpunt, surriguntur capilli, accedit decoloratio, dolorq; velut ex pungente acu per vniuersam cutem sentitur.

De Pastinaca marina. Cap. VII.

A PASTINACA marina percussis protinus accidunt pertinaces dolores, assiduę cõuulsiones, lassitudo, languor, & mentis alienatio: posthæc etiam vocis intercepto & oculorum caligo. Ipsa verò pars affecta liuet ac nigrescit per ambitũ: quin & vicinæ ita obstupescunt, vt tangentem non sentiant. Illam porrò si quis defricuerit, atra, crassa & graueolens sanies exprimitur.

De Mure Araneo. Cap. VIII.

A MVRE Araneo demorsis circa morsum in orbem inflammatio excitatur, nigráque pustula diluta sanie turgens exurgit: proximæ verò partes omnes liuent. Rupta pustula depascẽs succedit vlcus, ei non absimile, quod a serpentium ictibus imprimi solet. His accedunt intestinorum tormina & vrinę difficultas, corpúsque madore frigido diffluit.

De Vipera. Cap. IX.

SI quem momordit Vipera, corpus illius intumescit ac vehemẽter marescit, subalbidumque colorem concipit. Sanies è vulnere promanat, primùm subpinguis, mox verò cruenta: tandémque pustulæ, quales in ambustis, erumpunt. Accedit his vlcus depascens, quod in proximas partes omnes serpit: nec modo summá cutẽ occupat, sed & altiùs intro subit. Gingiuæ quoque cruẽtantur, & hepar inflammatione prehenditur. His insuper tormina biliosiq; vomitus accedunt, præterea tremor, sopor, vrinæ difficultas & frigida exudatio.

De Scytale & Amphisbæna. Cap. X.

CONSIMILIA cueniút iis qui a Scytale aut Amphisbæna demorsi sunt, eadémque ferè auxiliátur: quamobrem genus hoc veneni propriam descriptionem sortitum non est, neque etiam illam exigere visum est.

De Dryina. Cap. XI.

A DRYINA morsis graues vehemẽtésque incidunt dolores, párspque ipsa affecta in pustulas attollitur, è quibus sanies aquosa profunditur. Quinetiam stomachi rosiónes torminaque consequuntur.

De Hæmorrhoo. Cap. XII.

AB HÆMORRHOO demorsis vehementes cruciatus accidunt, quorum continuatio, contracta penitúsque strigosa corpora reddit. Ex plaga copiosus cruor effluit, & quacunque alia corporis parte cicatrix vlla fuerit, ea quoque sanguis emanat. Quin & excremẽta cruenta reiiciuntur, cõcretúmque in grumos sanguinem repræsentant: sic denique affecti sanguinem tum ex pulmone cum tussi, tum etiam vomitione reiiciunt, neque iis vlla reperiri medicina potest.

De Dipsade. Cap. XIII.

A DIPSADE percussos ardor habet intolerabilis, vrgétque sitis vsque eò pertinax, vt neque restingui possit, neque vllo tempore intermittat. Quin & quantumuis potum ægri ore pleno affatim hauserint, perinde tamen sitiunt, quasi anteà potus nihil assumpsisset, proindéque tandem propter assiduam potationem toto corporis habitu similes hydropicis euadunt: hac de causa dipsas etiam præsteris & causi cognomina meruit.

De Natrice. Cap. XIIII.

A NATRICE demorsis vulnus dilatatur ampliatúrque, simul etiam liuescens. Quin & sanies ex eo copiosa, eáq; atra & putida, qualis ab vlcere depascente, manat.

De Cenchro. Cap. XV.

CENCHRI morsum, qui quidem viperino similis est, putri-

A Περὶ Σκυτάλης καὶ Ἀμφισβαίνης.

Κεφ. ι.

ΠΑΡΑΠΛΗΣΙΑ δὲ συμβαίνει καὶ τοῖς ὑπὸ τῆς προσαγορευομένης Σκυτάλης ἢ Ἀμφισβαίνης δηχθεῖσι. βοηθεῖ δὲ μάλιστα τὰ αὐτά· διόπερ ἰδίας αἰαγραφῆς οὔτε τετύχηκεν, οὔτε ἠξιώθη

B τὸ εἶδος τοῦτο.

Περὶ Δρύινου. Κεφ. ια.

ΤΟΙΣ δὲ ὑπὸ Δρύινου δηχθεῖσιν, ἰχῶρες πρόσωδυνοι ἐμπίπτουσι, καὶ φλυκταινώδεις ἐπὶ τοῦ οἰκείου μέρεσι· ὅπου δὲ καὶ ὑδατώδεις ἰχῶρες ἔκχυσις, ἐπακολουθεῖ δὲ καὶ δημὸς καὶ τρόφος. Paul. idem. Paul. Ægin. idem.

C Περὶ Αἱμόῤῥου. Κεφ. ιβ.

ΤΟΙΣ δὲ ὑπὸ Αἱμόῤῥου δηχθεῖσιν, ἰχῶρες πρόσωδυνοι ἐμπίπτουσι, βραχία δὲ καὶ σκληρὰ πάντελῶς παρέχοντι τὰ σώματα ὑπὸ * συστυχίας τῶν ἑλκημάτων. ἐκ δὲ τοῦ δήγματος * ἔκχρισις γίνεται πολλὴ, καὶ οὐλὴ κατ' D ἔτερον μέρος τοῦ σώματος ὑπάρχῃ, * παρέχει αἱμορῤῥοεῖν τὰ δι' ὅλης χαρήματα αἱματώδη ἐκκρίνεται, καὶ τὸ ἀποῤῥέομενον * ἀπ' αὐτῆς αἷμα, πεθρομβωμένον ὀφθ. βιαστικῶς τε ἀπὸ πνεύμονος αἷμα ἀναγεῖσι, καὶ ἐξεμοῦσιν ἀδοκήτως. Paul. βραχία ἡ σκληρὰ δὲ καὶ σκιρρὰ παρέχει τὰ σώματα ἐπὶ τοῦ ἑλκώματος τὰ μάλιστα ἐπὶ ὁ μαγὶς Cornario placet Paul. συστροφὴ, rectius Paulus addit, αἱμορραγίαι, & rectè. Paul. ἐξέρευσις τῆς αἱμορροΐδος. P. vl. rectius, ἀποῤῥηγνύμενον αὐτῆς Lege Λ. Paul. ἢ πνευμονικὸν ἐξεμοῦσιν.

Περὶ Διψάδος. Κεφ. ιγ'.

E ΤΟΙΣ ὑπὸ δηχθεῖσιν ὑπὸ Διψάδος, * ἄσχετος ὄγκος ἔγκειται, καὶ δίψος ὀπτιτεταμένον ἰσχυρὸν, ὡς τε ἀπλήρωτον καὶ ἀδιάλειπτον εἶναι· καὶ τὸ ποτὸν χυδὸν ἔλκειν, καὶ τοῦ αὐτοῦ κορέσασθαι. ᾧ * ὑπὸ μὲν ὀλίγου εἰληφότι τὸ ποτὸν, * πλησίον ἢ ὅλου τοῦ συγκρίματος ἀχλυοῦται, ὑπὸ δὲ συνεχοῦς τοῦ πόματος εἰσφορᾶς ἴδιον σφυγμὸν τὸν καῦσον προσαγορεύεται ἡ δίψας. F

Περὶ Ὕδρου. Κεφ. ιδ'.

ΤΟΙΣ δὲ ὑπὸ Ὕδρου δηχθεῖσι, τὸ ἕλκος πλατύνεται καὶ μέγα γίνεται, * πολλάκις. ἰχὼρ τε ἐξ αὐτοῦ μέλας καὶ πολὺς ἢ δυσώδης, οἷος ἀπὸ νεκροῦ, ἐκκρίνεται. G Aldus. add. ἀεὶ μέγα

Περὶ Κέγχρου. Κεφ. ιε.

ΤΟΙΣ δὲ ὑπὸ Κέγχρου δηχθεῖσι, τὸ μὲν δῆγμα ὅμοιον ἐοικὸς ἀπὸ τ' ἐχίδνης,

σπειδὴν δὲ καὶ διακλυθῆ. καὶ διείρ-
ρέουσι σάρκες ἐξοιδήσασαι περίεργοι, ὡς
ἐπὶ ὕδρωπος. ληθαργώδεις τε γίνονται
Paul. καταφορικοί. atque sic etiam legit Corn. καὶ * καταφορᾶς αἴτιοι. Ἐρασίστρατος δέ
φησιν αὐτοὺς πεπονθέναι ὑπὸ ἥπατος εἰς τὴν * νῆ-
σιν καὶ τὸ κῶλον. αἱ γὰρ μηδέντων αὐτῶν,
διεφθαρμένα πως θεωρεῖσθαι * πάντα τὰ
μέρη.

Περὶ Κεράστου. Κεφ. ις'.

ΤΟΙΣ δὲ ὑπὸ Κεράστου δηχθεῖσιν, ὁ
μὲν τόπος ἐπαίρεται μετὰ σκληρίας
Aldi γίνεται καὶ φλυκταινώσεως. ῥεῖ δὲ ἀπὸ τοῦ ἕλ-
κους ἰχὼρ, ποτὲ μὲν μέλας, ποτὲ δὲ ὠ-
Paul. addit καὶ περιτείνεται &c. Sic etiam legunt Corn. & Marc. χρός. * * κιρρόειδὴς δὲ γίνεται καὶ ὅ
σύγκριμα ὅλον. καὶ τὸ μὲν αἰδοῖον τείνε-
ται. ἡ δὲ ψαφώδεις ἔξισται, ὀφθαλμῶν τε ἀ-
μαύρωσις ἔπεισι γίνεται. τέλος δὲ * ἀπόλλυ-
Paul. τετανικῶς. atque ita etiam Cornarius. ται ἀσώματος * τετανικῶς.

Περὶ Ἀσπίδος. Κεφ. ιζ'.

ΤΟΙΣ δὲ ὑπὸ Ἀσπίδος δηχθεῖσι, τὸ
μὲν δῆγμα ὅμοιον τοῖς ὑπὸ βελόνης
κεντήμασι μικρὸν πάντελῶς φαίνε) χω-
ρεῖς τῆς ἐπιβάσεως. καὶ αἱματίον δὲ οὐ πολὺ,
ἀλλὰ βραχὺ καὶ μέλαν ἀποσάζει. ταχεῖα δὲ ἀμαύρωσις ὀμμάτων κα-
ταλαμβάνει. πόνος τε ὅλου τοῦ σώμα-
τος γίνεται, πάλιν ἅπασιν ἐλαφρὸς
καὶ οὐκ ἄτερ ἡδονῆς διακολυθῆ. διὸ
καλῶς ὁ Νίκανδρος πεφώνηκε.

Paul. καὶ διαπνοαί --καματόν σ' ἄτερ ὀλοῦ ἆμαρ, ἑρόδου
ἀτρόπιος καὶ χλοάοντος καρδιωγμὸς ὀ-
λίγος. μέτωπον δὲ συνεχῶς αἰάσσεται·
βλέφαρα κινοῦνται μετὰ αἰσθησίας ὁ-
μοίως ὕπνῳ· καὶ τούτοις θάνατος σιωπῇ μηδὲ τέλειον ἡμέρης ἔλιπτεν.

Περὶ Βασιλίσκου. Κεφ. ιη'.

ΕΡΑΣΙΣΤΡΑΤΟΣ, ἐν τῷ καλου-
μένῳ περὶ δυνάμεων καὶ θανασίμων,
περὶ τοῦ καλουμένου Βασιλίσκου ῥητῶς
οὕτω φησίν· ὅταν δὲ ὁ Βασιλίσκος δάκῃ,
πληγὴ ἐπόχρυσος γίνεται· Τὰ μὲν
οὖν ἐν τοῖς πλείστοις τῶν ἰοβόλων πα-
ρακολουθοῦντα σημεῖα, διαῤῥήδην ἔστι μα-
θεῖν ἐπὶ τοῦ θεραπεύοντας, ὡς ἐπὶ τοῦ θεραπείου, ὡς δυνατὸν
παραδώσομεν.

dum vlcus consequitur, ac vndique diffluunt carnes, quæ priùs velut in aqua inter cutē intumuerant. Quin & icti veterno altóq; sopore corripiuntur. Iisdem iecur, vesicam & colon intestinum malè affici Erasistratus asserit: liquidē dissectis corporibus isthæc viscera quodammodo corrupta deprehenduntur.

De Ceraste. Cap. XVI.

A CERASTE demorsis pars in tumorem attollitur, cum duritia & pustularum eruptione. Profluit è plaga sanies, modò atra, modò quadantenus pallida: totus verò corporis habitus fulvescit: ipsum quoque genitale arrigitur, mens labat, & oculis caligo superuenit: tandémque neruorum distētione prehensi commoriuntur.

De Aspide. Cap. XVII.

AB Aspide cōmorsis vulnus perquàm exiguum, quasi ab adacta acu, citra tumorem cōspicitur. Sanguis non ita copiosus, imo perpaucus, idémque ater, extillat: ac derepentè acies oculorum hebetatur: totóque corpore dolor multiplex, sed omnino leuis & non sine voluptate cōsequitur. Quapropter rectè Nicander cecinit: --at vir perit absque dolore. Color minimè constat, at potiùs malignè virescit: accedit exigua stomachi rosio: frōs assiduè reuellitur: palpebræ sine sensu connluent, veluti vrgente somno: atque inter hæc vix interposito die triente mors ipsa prehendit.

De Basilisco seu Regulo. Cap. XVIII.

ERASISTRATVS, in libro qui de medicaminibus ac venenis inscribitur: de vocato Basilisco ad verbum ita scribit: Cùm momorderit Basiliscus, vulnus ad auri colorem efflauescit, &c. Cæterum hæc ferè sunt notæ, quæ plerorumque virulentorum animalium ictus morsúsve comitantur. Proinde superest vt ad medendi rationē tranſeamus: ac primum cōmunia, quoad eius fieri poterit, curationis præcepta tradamus.

Communis vulnerum à venenatis animantibus inflictorum curatio.

Cap. XIX.

ORIS quidem fuctio aduerſus quemuis virulenti animalis ictum conuenit. Sugentem verò oportet minimè ieiunum eſſe, ſed & priùs cibũ ſumpſiſſe & os vino colluiſſe, prætereáq; dum vulnus exugit, olei pauxillũ ore cõtinere. Ipſe autem locus ſpũgia fouendus, demdéq; ſcarificádus: ſed vulnuſcula altiùs imprimere expedit, quò fœliciùs virosa materies è profundo reuocetur. Verumenimuerò carnis circinatio ſectióque, ſcarificatione ipſa lõgè potentiùs opitulãtur: priuatim ſiquidem hæc duo ſecum afferunt cõmoda: Vnum, quòd virus è loco tollitur: alterũ, quòd eius veneni pars, quę iam ad interiora peruaſerat, cum multo copioſóq; ſanguine excernitur. At ſi locus circinationem haudquaquã admittat, cucurbitulæ cum largiore flamma affigendæ ſunt. Quod ad vſtionem ſpectat, de ea iã antè inter rabioſorum remedia diſſeruimus. Si verò icta pars; vtpote extrema, ſectionẽ cõmodè admittat, præſertim in omnium ſerpentium morſibus, vti aſpidis, ceraſtæ ſimiliúmque, ea proculdubiò amputanda eſt. Porrò ceu antè memoratis remediis leniora blandioráq; meritò cenſentur, quæ epithemata vocãt. Imponatur ergo ſarmentitius cinis aut ficulnus, cum lixiuio percolato ſubactus, addito garo & acri ſalſamento. Porri quoq; cepæ & allia modò quàm minutiſſimè trita illinantur, modò cremata vulneribus adhibeantur. Iuuant & pulli gallinacei *bipartitò ſecti, & protinus dum maximè calent percuſſo loco appliciti. Neque deſunt qui iis ceu diſcordia quadã naturali cum veneno pugnantibus vſi fuerint: verùm in prõptu eſt eiuſce remedij ratio. Gallinæ ſiquidem calida natura prædita ſunt, argumento, quòd deuoratum *certiſſimum virus conficiunt, & aridiſſima quæque ſemina conſumunt: interdum & arenas calculóſq; deuoratos molliunt atque diſſoluunt. Itaque animantis admoti natiuo calore adiutus ſpiritus, ab icta parte impetum capeſ-

vel, pro mediũ diuiſi & protinus calidi ſuper vulnus impoſiti.

*vel inſignem

Τις χρὴ τῶν ἰοβόλων θεραπία.

Κεφ. ιθ'.

ΠΡΟΣ πᾶσιν πλὴν ἰοβόλου ἁρμόζει ἡ δι' ὧν τὸ σώματος ἐκμύζησις δεῖ· ὃ μὴ ἔστιν εἰ τὸ ἐκμυζῶντα, ἀηδὲ καὶ αἱλιφένα ἔφην, καὶ διακλύζεσθαι, οἶνῳ ὑπόφαυ δὲ καὶ βραχύ τι ἐν τῷ στόματι ἐλαίῳ κατέχοντα τὸν ἐκμύζοντα ὅτι τελείτω. καὶ αὐτὸς δὲ ὁ τόπος ἀπόλουε πυελάοντα, ἔπειτα δὲ ἐγκαταχάζεσθαι βαθυλέρας δὲ ἐμβεβλῆσθαι ἐς ἀμυχὰς προσόφελ, ὅπως πλεῖον ὑγρὸν ἐν βάθει ἀναλαμβάῃ. καὶ τὰς ἐγκεντρισμὸς δὲ ἐκτομὴ, πλοισιώτερον κεῖται χασμᾶ βοηθοῦσιν· ἰδίᾳ γὰρ ἐπ' αὐτῶν τὰ ἐχεπομένα γίνεται. ἓν μόνῳ, ὅτι αἵρεται ὁ ἰὸς ἐν τῷ τόπου· δεύτερον δὲ, ὅτι τῷ αἵματι συνεκκρίνεται πολλῷ καὶ ἀθρόῳ ὃ φθάσαν ἔσω προελθεῖν. εἰ δὲ ὁ τόπος μὴ ἐκτεμνεσθαι οὐ πάσης δίκαιος, σικύας χρὴ προσβάλλειν μετὰ φλογὸς πλείονος. ἐκεῖ γὰρ καίσιμος ὅτι τῷ λυσσοδάκτων προσερήκαμεν. εἰ δ' ὑφυὴς ἔχοι πρὸς ἀποκοπὴν τὸ μέρος τὸ διδηγμένον, μᾶλιστα ὅτι πρώτων ἡδείων αἰσθησιάσεως ἀκρωτηριασμὸν ποιητέον, ὡς ἀσπίδος, καὶ κεράστου καὶ τῶν ὁμοίων. ὡς ὅτι πλεῖστα πρὸς ἀποκοπὴν τὰ μέρη τῶν προφρηθέντων βοηθημάτων, ἄξια ὅτι λήματα ἐστίν. ὅτι δὲ λιθάδων ἢ τίφρα κλημάτων ἢ συκῆν, μετὰ κριθῆς φακῆς πεφυραμένη, χαλεπῶς, δριμέος παρέχου. φράσαι τε καὶ πρίμνα, καὶ σκόροδα, ποτὲ μὲν ὡς ἐκλοτερισθέντα καταπλασσόμενα, ποτὲ δὲ καὶ ἕψαντα προσβεβλῆσθαι τοῖς δήγμασι. καὶ οἱ τὰ ὀρνίθων νεοσσοὶ διαμελισθέντες καὶ θερμόπατοι ἐπιπυοσύμενοι ἐπὶ πεπληγότι τόπῳ. ἰυνὲς μὲν ὡς αἰτιπαθῆσαν αὐτοῖς ἐγκείσανται· παρόχθρον δὲ ἔχει λίαν. φύσει γὰρ αἱ ὄρνιθες εἰσὶ θερμαί, διὸ καὶ ὀπτίσιμον ἐὸν καταπιοῦσαι, ῥύχεσι, καὶ τὰ ξηρόταλα δαπανῶσι τῶν σπερμάτων. εἰσὶ τινὲς καὶ ψάμμους καὶ λίθους ἀναλύσαι ἐμφαρυγξάμεναι. ἴσχασι δὲ ἐν τῷ ζώου θερμασίαι, τὸ πνεῦμα ὃ ἐν τῷ διδηγμένου μέρεσι ὁρμὴν λαμ-

ζαίοι, σωτεξάγει ♃ ἰόν. ἔγωγε δὲ ἐ- A
πὶ τῆς Αἰγύπτου ζυστὸν ἡμῖν ἡρμόσθαι. ὁπότε
τὴν ⓐ Αἰγύπτιοι θερίσωσι ♃ σάχυα,
χύτραν ἔχοισι κατασκευασμένην πίσσης,
καὶ σφήκωμα προσαρτημένον τῇ χύτρᾳ.
ὅτι γὰρ μάλιστα δείδασι τὰ θηρία, καὶ δεῖ
τὴν ὥραν, καὶ τὴν λαμβάνην αὐτὰ κείμενα
ὑπὸ τῶν ὀπῶν τῶν ἐν ταῖς ἀγρώσαις, ὑποσκο-
τούμενα ὁμοῦ καὶ ὑπὸ τῆς δασύτητος τῶν
χωρῶν. πολλὰ δὲ καὶ τὰ πεδία χαλεπώ-
τερα τῶν ἰοβόλων ζώων ἡ Αἴγυπτος φέρει.
ἐπειδὰν οὖν δηχθῇ τις πόδα ἢ ἄλλο τι μέ-
ρος, ταχέως οἱ παραυτίκα τὸ σφήκωμα
βάλλουσιν εἰς τὴν χύτραν τῆς πίσσης, καὶ πε-
ριελίξιον ἅπαξ ἢ δὶς κάτω ♃ πῆχυν ἢ
τὸ κῶλον, μικρὸν ὑπάνω τῆς δήγμασος,
καὶ κατισφίγξιοσι δύο πρίσεσιν ἰσχυρῶς,
καὶ ὑποτέμνοντες τὸ πόσον ἀφ' ἧς τὴν κάτω-
σιν τοῦ βρόχου, ὅπη χέοισι καὶ πίσσην. ὅταν
δὲ αὐτάρκως ἔχῃ δοκῇ, τὸν βρόχον ἀφαιροῦσι,
καὶ κατάπλασσοισι κρομμύοις, καὶ δι' ἡμέρων
τῶν προφρημένων. καὶ τούτων δὲ χωρὶς ὑγρὰ D
πίσσα μετὰ ἡμέρων λείων θερμοτέρων καὶ κα-
τάπλασσομένη σὺν ὄξει βοηθεῖ, αὐτὴ καὶ
νοσοποιηθεῖσα συνεχέστερον. ὡσαύτως ἁρμό-
ζει καὶ *κέδρος, τά τε σανδαράκια τῶν αἰγῶν σὺ
οἴνῳ καὶ ἀλφίτοις. ἀρίστη δὲ αὐτῶν καὶ κα-
θάπτησις δι' ὄξους θερμοῦ, καὶ καταμίσγη
ἐφεξῆς δι' ὕδρου καὶ θαλασσίου ἢ ἐξόμφης. E
εἰσὶ δὲ καὶ ἔμπλαστροι θερμότατοι καὶ δριμύ-
τατοι, δυνάμεναι τὸν ἰὸν ἐπισπᾶσθαι, καὶ δια-
κρατεῖν καὶ διαφορεῖν. ὡς δὲ ἡμῖν ἡ νίτρου καὶ
σινάπεως καὶ κάδμου τρόπος φερόμενος ὥσ-
περ ἐξῆς ῥητέον. οὐκ ἀδόξως δὲ ὁ Ἐρασίστρατος
ἐπιμέμφεται τοῖς ἀγνώστοις δυνάμεσι τρόπος
τὸν χρεῖαν αἰσχρᾶς φόσεως, ὡς χολὴν ἐλέ- F
φαντος καὶ κροκοδείλου, καὶ αἷμα χελώνης καὶ
ὠά, καὶ τὰ πρόσπλησια. δοκοῦσι μὲν γὰρ ἔνια
τοιαῦτα προαγορεύειν ὠφελεῖν. ἐκπατή-
σασι δὲ αὐτὰ μόνα τοῖς ἐντυγχάνουσιν. ὅλως
τὰ μὲν τοιαῦτα προαγορευτέον, μή τι ῥᾳδίως
εὑρεθῆναι δυνάμενα, εἰ μὴ ὑπ' ἐξουσίας βα
σιλικῆς μή τε διὰ τὸ πλείστης ἱστορίας οἷον
εἰς τὸ πιστωθῆναι τὸ πεῖραν προενεχθέν.
ταῦτ' ἂν καιρὸς ἦν καὶ εὐπόριστα ὑποδηλοῦν,
ταῦτα καὶ εἰς πόσιν καὶ τὸ πᾶσι τοῖς θηριο-
δήκτοις δυνάμενα τοῦ χρῆσιν παρέχειν. G

sens simul & semel venenũ exigit. Neque nos fugit, quid apud Ægyptios in eiusmodi casu fieri soleat. Dum spicas metunt, ollam picis paratam habent, & appensam ollæ fasciam. Tunc enim à serpentibus sibi maximè timent, tum propter æstuosam anni tempestatem, tum quòd opacis abditi cauernis densóque aruorum cespite delitescunt: plurima verò & infestissima è venenatis animalibus Ægyptus in cápestribus alere consuenit. Cum primùm ergo quispiam in pede aliáve parte demorsus fuerit, illico qui adsunt fasciam in ollam picis immittunt, ac semel aut iterum brachium aut crus paulum supra vulnus obligant, & arctissimè duo è præsentibus vndique constringunt, locúmq; incidentes quà circumactus est laqueus, picem instillant: vbi verò sat picis infudisse sibi videntur, laqueũ resoluunt, & cepas aliáque memorata adhibẽt. Quin & citra hæc pix liquida cum sale trito ac feruente illita præsentaneo est auxilio, si modò frequẽtiùs deinceps innouetur. Similiter & conuenit Cedria, itémque fimum caprinũ ex vino decoctum. Sed & locum aceto calente & calamintha in lotio & aqua marina seu acida muria decocta foueri salutare est. Sunt præter hæc etiam emplastra calidissima simul & acerrima, quæ venenũ elicere, euincere, ac etiamnũ discutere possunt: cuiusmodi sũt quæ ex sale aut nitro, sinapi & cáchry cõponuntur, de quibus deinceps erit agendum. Erasistratus autẽ non immeritò eos reprehẽdit, qui incognita remedia in hunc vsum conscripsêre: qualia sunt fel elephanti aut crocodili, sanguis ouáque testudinis, aliáq; consimilia. Videntur enim literis nonnulla tradidisse quæ iuuare possint: ista verò sola lectoribus imposuêre. Quamobrem talia repudiáda sunt: quippe quæ nõ nisi facultatibus regiis facilè redimi possint, neq; pluribus experimentis fidei faciendæ idoneis cõprobari potuerint. Quæ autem ad communem omnium vsum pertinent, quæque paratu facilia sunt, & passim quibuscunque à serpente percussis auxilium ferre queunt, subiungenda videntur.

Add. ex aethio Ald. codi.

Add. ex cod. Ald. aethio.

Intubus

Intubus itaque, erica & aſtragalus ex aceto pota, cõtra omnes ſerpentium morſus auxiliantur. Itidem & aſphaltium, ac virentes platani pilullæ in vino diluto coctæ, paliuri decoctum, radix ariſtolochiæ & eryngij: decoctæ etiam lauri baccæ in cibo ſumptæ, piper largiùs eſitatum, ruta, anethum & cyclaminus: coma porrorum priuatim ex pane, aut allia vel cepæ & ſalſamentum quàm acerrimum: itémque origani decoctũ è vino potũ: quinetiam fœniculi, pulegij, calaminthæ porrorúmque ſuccus cum melle exſorptus. Et hæc quidem è plantarum genere deſumuntur. Quædam verò ab animalibus etiam vtiliter peti ſolent, veluti cerebella gallinaceorum eſitata, & leporinum coagulum ex vino potum: itidem & caſtorij ſextans. Marinæ quoque teſtudinis teſtes aſſumpti opitulari feruntur. Celebratur & muſtela aſſiccata. Hæc priùs exenterata vndiquaque diſcinditur, ac deinde exiccatur, ex eáque binæ drachmæ cum vino bibuntur. Sed de ſimplicibus quę exhiberi ſolent, hactenus. Porro conuenit etiam à ſerpẽte percuſſis purgatio per aluum, vti & ſudoris euocatio, & copioſa vrinæ excretio. Extant & compoſitæ quædam potiones, quæ mira remedia polliceri traduntur: vti quæ conſtat ex opij ac myrrhæ ſingulis obolis, & piperis drachmis duabus. Ea melle excipiuntur, & inſtar Ægyptiæ fabæ dantur cum vino. Similiter rutæ ſyluaticæ ſeminis, melanthij, cũmini Æthiopici, galbani, ariſtolochiæ, pares ſingulorum portiones tritæ & cum erucæ ſucco ſubactæ digeruntur in paſtillos, quorũ ſinguli drachmam pendeant: dantur verò ex vini heminæ ſemiſſe. Hęc aduerſus omnes ictus communia ſunt. De peculiaribus contra beſtiam vnamquanque venenatã auxilijs deinceps agẽdũ.

A σίες δίνιν ἢ ἐρείκη ἢ ἀστράγαλος πινόμενα μετ' ὄξους, πᾶσι τοῖς θηριοδήκτοις βοηθεῖ· ὡσαύτως δὲ ἄσφαλτος, ἢ πλατάνου χλωρὰ σφαιρία καταπλάττοντα ὀφθαλμῶν κόμματι· καὶ παλιούρου ἀφέψημα· καὶ ῥίζα ἀριστολοχίας ἢ ἠρύγκης· δὲ δαφνίδες ἐφθαὶ κατεσθιόμεναι, ἢ πίτυρα δαψιλέστερον πεφυρόμενοι, ἢ πήγανον δὲ ἄνηθον καὶ κυκλάμινος· πράσων τὸ ἄκρον ἰδίᾳ σὺν ἄρτῳ ἢ σκόροδα, ἢ κρόμμυα, δὲ ῥίζης δριμύτατος· δὲ ὀρίγανον ἀφέψημα σὺν οἴνῳ πινόμενον· καὶ μαράθου καὶ γλήχωνος καὶ καλαμίνθης, καὶ πορράσων χυλὸς σὺν μέλιτι καταρροφούμενος· ταῦτα μὲν ἐκ τῶν φυομένων. ἀπὸ ζώων δ' λαμβάνεται τινα ὠφελίμως, ἐγκέφαλοι μὲν ἀλεκτρυόνων ἐσθιόμενοι, πτερὰ δ' λαγωοῦ σὺν οἴνῳ πινόμενα, ἢ κάστορίου *ὑγιᾶ β'. αὐτὸν δ' πον. λέγεται δὲ ἢ ὅτι χελώνης θαλασσίας ὑγρὰς λαμβανόμενοι βοηθοῦσιν. ἔστι δ' ἢ ἡ θαλασσία σκελετυθεῖσα τ' βοηθημάτων, θύρσκει δ' δὲ πρότερον ἢ πεφρύγη φαθεῖσα τ' ὠμὰς ἐκριζόντων· σκελετεύεται δὲ ξηραινόμενον, καὶ ἀπ' αὐτῆς δίδραχμον σὺν οἴνῳ πινόμενον. τοσαῦτα δὲ ἢ τὰ ἁπλᾶ τῶν προσφερομένων ἁρμόζει δὲ τοῖς θηριοδήκτοις καὶ κάθαρσις δι' κοιλίας, ἢ ἱδρωτοποσία, καὶ οὖρον πολλῶν ἔκκρισις. σκευασὶ δὲ ποτήματα δίδοται κρυπτότερον ὑποχρούμενα βοηθεῖν, ὡς ὀπίου καὶ σμύρνης ἀνὰ ὀβολούς, δὲ πεπέρεως < β'. ταῦτα δ' δεῖ μίγνυσθαι ἀναλαμβάνειν, δὲ δίδεται κυάμου μέγεθος. Αἰγυπτίᾳ μὲν οἴνου ὁμοίως πηγανίου ἀγρίου σπέρματος, μελάνθιον, κυμίνῳ Αἰθιοπικῷ, χαλβάνης, ἀριστολοχίας, ταῦτα πάντα λεαινόμενα ἢ φυραθέντα χυλῷ θύζωμον, αἷς ἁπλοῦν τα ἔχουσι δραχμιαῖον δίδοναι δὲ ἐξ αὐτῶν μετὰ οἴνου ἡμικοτυλίῳ. ταῦτα μὲν δὴ τῶν κοινῶν βοηθούντων. τὰ δ' ἴδια τοῖς ἕκαστον τῶν ἰοβόλων ἐξῆς εἰπεῖν.

B

C

D

E

F

Curatio à Veſpis & apibus morſorum. Cap. XX.

Περὶ Θεραπείας τῶν ὑπὸ σφηκῶν καὶ μελιττῶν δεδηγμένων. Κεφ. κ'.

INTER venenatorũ ictuum morſuúmve notas minimè de veſpis & apibus ſpeciatim diſſeruimus: φ conſpicuæ omnibus foret, neq; exi-

G

Ἐν τῇ σημειώσει περὶ σφηκῶν καὶ μελιττῶν τοῦτον διηρθρώσαμεν· δῆλα γὰρ πᾶσιν ἦν, ἢ περὶ σφηκῶν ἔχει ἐξαί-

In Ald cod. hæc eſt Dioſc. lib. 11 præfatio, vti & in antiquiore Palatino codice.

ρετον οὐδὲν ὁτιοῦν φυλαττόμενον· ἐν δὲ τῇ θεραπείᾳ, καὶ ταύτην οὐκ ἄπορον μνημονεῦσαι. πρὸς οὖν τὰς πληγὰς τὴν σφηκῶν καὶ μελιατῶν, ἁρμόζει μαλάχη καταπλασσομένη, καὶ κρίθινον ἄλευρον σὺν ὄξει, καὶ συκῆς ὀπὸς ἐπιζαλόμενος τοῖς δήγμασι, καὶ πυέλη δι' ἅλμης ἢ θαλάσσης.

In Ald. cod. deest ἐν. & hic est capitis primi finis.

Περὶ τῶν ὑπὸ Φαλαγγίων δεδηγμένων. Κεφ. κά.

ΤΟΙΣ δὲ ὑπὸ Φαλαγγίων δεδηγμένοις, ταῦτα ὀφείλει δεῖ τίφραν συκίνῳ σὺν ἁλὶ λεπτῷ μετ' οἴνου πεφυραμένῳ, ἢ ῥίζαν ἀγρίας ῥοᾶς λελεπτυσμένῃ, ἢ ἀριστολοχίαν σὺν κριθίνῳ ἀλεύρῳ καὶ ὄξει δεδεδυμένῳ. καταπλάσσειν δὲ θαλάσσῃ τὰ ἕλκη, ἢ μελισσοφύλλου ἀφεψήματι, ταύτης δὲ τὰ φύλλα ἐπιπλάσσειν. λουτρῷ δὲ λίαν συνεχέσιν, καὶ ποτηρίοις χρηστέον ἀφ' ὧν τὰ φαρμακῶν, ἀβροτόνῳ ὃ σπέρμα, ἄνισον, ἀριστολοχίᾳ, ἐρεβίνθου ἄγριος, κύμινον Αἰθιοπικὸν, κεδρίδες λεῖαι, πλατάνου φλοιὸς, ἐκ δὲ σπέρμα τῆς τριφύλλου πόας. τούτων δὲ ἑκάστου ὀβολοὺς τὰς κατ' ἰδίαν < Β' μετ' οἴνου κοτύλης α'. δίδοται δὲ ἐκ μυρίκης ὁ καρπὸς ὡσαύτως καὶ χαμαιπίτυος, ἢ τὸ χλωρὸν τῆς κυπαρίσσου σφαιρίων τὸ ἀφέψημα κιρνάμενον μετ' οἴνου. φασὶ δέ τινες καὶ καρπὸν ποταμίου χυλαθέντα μετὰ γάλακτος, καὶ τὸ ἀφεψηθὲν σελίνου σπέρμα, τὴν ὀχλήρων ἀπαλλάσσειν.

Addit Paul. σὺν μέλιτι.

Porrò ἀνίων. Paulus καὶ παραλαμβάνων συμπλέκει.

Paul. ἀνίσου.

Addunt nonnulli, ἢ ὕδατος. Paul. ὡς εἶδον.

Sunt qui legant, φύλλων ἢ σφαιρίων.

Περὶ τῶν ὑπὸ Σκολοπένδρας δεδηγμένων. Κεφ. κβ'.

ΤΟΙΣ δὲ ὑπὸ Σκολοπένδρας δεδηγμένοις, τὸ μὲν πρῶτον ἐπιθέσθαι δεῖ λεπτομένου μετ' ὄξους ἄλας, ἢ πήγανον ἄγριον. κατάπλασσε δὲ ὀξύμελι ⊗ πίνειν, πότιμα δὲ παρασκευάζειν ἀριστολοχίᾳ μετ' οἴνου, ἢ ἔρπυλλον ἢ καλαμίνθην, ἢ ἄγριον πήγανον.

Nonnulli codices addunt παραπλήσια.

Et hoc in loco legitur in Ald. cod. καὶ συντρίβομεν.

Rectius forte, πιπλήσκομεν.

Περὶ τῶν ὑπὸ Σκορπίου δεδηγμένων. Κεφ. κγ'.

ΤΟΙΣ δὲ ὑπὸ Σκορπίου πληγεῖσι, πρόχρημα μὲν ἀκριβῶς ἐκθλῆ συκῆς ὀπὸς εἰς τὰ τραύματα ἐνσταζθείς. αὐτὸς τε ὁ πλήξας σκορπίος δεινοτερόνησις καὶ

mium aut notatu dignum quicquam in iis obseruaretur. Inter remedia tamen & eorum meminisse, non abs re fuerit. Igitur aduersus apum vesparúmq; ictus prodest impolita malua & hordeacea farina cum aceto, itémque lac ficulneum ictibus instillatum, denique fotus ex muria aquáve marina.

Curatio à Phalangijs morsorum. Cap. XXI.

PHALANGIORVM verò morsibus isthæc imponere oportet: ficulneum cinerem adiecto sale trito cum vino subactum, aut radicem syluestris Punicæ quam minutissimè cõtritam, aut aristolochiam cum hordei farina & aceto subactam. Vlcera autẽ aqua maris perfundenda, aut melissophylli decocto, ac eiusdem folia illinenda. Porro balneis perquàm frequenter vtendum, itémq; potionibus è pharmacis proximè sequentibus: abroton inquam semine, aniso, aristolochia, cicere syluestri, cumino Æthiopico, baccis cedri tritis, platani cortice, & trifolij herbæ semine: seorsum autem singulorum binas drachmas dare conuenit cum vini hemina. Exhibetur & myricæ fructus: similiter & chamæpityos ac viridium cupressi pilularum decoctum vino temperatum. Sunt & qui asserãt fluuiatilis cancri expressum cum lacte succum adiecto apij semine, omnibus quamprimum liberare molestijs.

De Scolopendra morsu. Cap. XXII.

SI SCOLOPENDRA morsu vulnus impressit, sal quã tenuissime tritus ex aceto vulneri inspergendus, aut ruta syluestris superponẽda. Locus acida muria fouendus, & danda in potu aristolochia cum vino, aut serpyllum, aut calamintha, aut ruta syluestris.

De Scorpionis ictu. Cap. XXIII.

ICTVS à Scorpione præsentissimo est auxilio lac ficulneum in vulnera instillatum. Scorpius etiam ipse qui ictum vibrauit, tritus &

percusso loco impositus, sui ipsius ictus remedium est, idque, vti videtur, naturalis cuiusdam repugnantiæ ac dissidentiæ ratione, quam antipathiam vocant. Præterea conuenit & scorpius tritus, & cum sale, limi semine & althæa herba impositus. Auxiliatur & sulphur ignem minimè expertum, resina terebinthina exceptum, & emplastri modo adhibitum. Similiter & galbanum ad ipleni formam diductum, itémque calamintha trita & illita, necnon & cruda hordei farina cú vino subacta addito rutæ decocto. Iuuat etiamnum semen trifolij herbæ tritum ac vulneri iniectum. Et de his quidem quæ foris admouentur, hactenus. Neque verò interim negligendus potionum quàm efficacissimarum vsus, quales parantur ex aristolochiæ, præsertim corticis, binis drachmis cum vino, è gentiana tusa & pulegio plurimùm decocto, tritis itidem lauri baccis numero decem, & calamintha in posca diu multúmque discocta. Valet & cyperis cum vino, & ruta eodem modo: sic & lac ficulneum & laser, si affuerit: sin minùs, Parthico vtendum succo. Efficax quoque est & potum trifolij semen, necnon & ocimi. Sed his omnibus æquipollent frequens balnei vsus cum multa sudatione, dilutáque potio.

A ὀπὶ τῇ τοῦ πληχθέντος τόπῳ, τῆς ἰδίας πληγῆς γίνεταί βοηθὸς καθά τινα ἀντιπάθειαν ὡς ἔοικε. μετὰ δὲ τοῦτο ἁρμόζει λεῖος ὀπτὸς σκορπίος σὺν ἅλατι καὶ λινοσπέρμῳ καὶ τῇ ἀλθαίᾳ βοτάνῃ. βοηθεῖ δὲ καὶ θεῖον ἄπυρον αἰθαλώδη ῥητίνῃ τερμινθίνῃ κεκραμένον καὶ ὡς ἔμπλαστρον ὑπερτιθέμενον. ἁμοίως δὲ καὶ χαλβάνη πλατυνθεῖσα καλυπτέου τόπῳ, καὶ καλαμίνθη λεία καταπλασσομένη, καὶ ὠμαλίσεις ἐν οἴνῳ σπερμασθεῖσα, ἐπ' ἀφεψήματι πηγάνου. βοηθεῖ δὲ ὁ σπέρμα τῆς τριφύλλου τοῖς δεσμάσμενον καὶ ὑπερριπτούμενον. τὰ μὲν οὖν τοιαῦτα· μετὰ δὲ τούτων καὶ ποτήμασι χρηστέον ὡς ἀκεσιμωτάτοις. ἔστι δὲ ἀριστολοχίας δίδραχμοι, μάλιστα τοῦ φλοιοῦ, σὺν οἴνῳ, γλυκαίνει κεκραμένοι, καὶ γλήχωνι ὑπὲρ θυμῷ, καὶ δαφνίδες ἀριθμῷ δέκα βεβρεγμέναι τριβούμεναι, καὶ καλαμίνθη μετὰ ὀξυκράτου· δεῖ δὲ αὐτὰ ὑπερπολὺ ἑφθῆναι ὡς τὸ ὀξυκράτῳ· καὶ κυπαρίσσου μετ' οἴνου ἢ πηγάνου, ὡσαύτως· καὶ συκῆς ὀπός, καὶ σίλφιον εἰ παρείη μάλα ἐφθὸς δέ, τοῦ πολυκλάδου χρηστέον ὁπῷ. ποιεῖ δὲ καὶ ὁ τοῦ τριφύλλου καρπὸς πινόμενος, καὶ ὁ τοῦ ὠκίμου σπέρμα. ζωύποις δὲ πᾶσιν αἰτιπαθεστάτη λουτρὸν συνεχῶς χρῆσις μετὰ πολλῆς ἱδρώσεως, καὶ οἰνοποσία μετὰ κεφάλης.

Paul. lib. 1. cap. 60. Pallanius.

Fortè sui

Sic locum hunc ex antiquis restituit Goupylus. At codex Ald. perperam, ut πλατύνεσθαι καὶ τριβῆναι. Malim, συνεχῶς

De Pastinaca marina ictu.

Cap. XXIIII.

QVÆ deinceps à vipera demorsis conferre dicemus, eadem planè omnia & eodem modo percussis a pastinaca marina conueniunt.

Περὶ τῆς ὑπὸ Τρυγόνος θαλασσίας δεδηγμένων. Κεφ. κδ'.

Rectius πεπλησμένων

De marinorum Scorpij Draconísque ictibus. Cap. XXV.

ΤΟΙΣ δὲ ὑπὸ Τρυγόνος θαλασσίας πληγεῖσιν, ἁρμόζει πολύπα ἐπὶ αὐτὴν ξηρὸν ὅσον μικρὸν ἕτερον ὀπὶ τῶν ἐχυδνῆλων ἐρεθισμῷ.

Fortè, ἐπὶ

SVNT & virulenti ictus qui à Dracone Scorpióque marinis inferuntur: quippe qui acerbissimos dolores, interdum etiam, quanuis raro, nomas, hoc est, depascentia vlcera, excitent. Hisce abstinthij aut saluiæ, vel sulphuris ex aceto triti potio subuenit.

Περὶ Δράκοντος καὶ Σκορπίου τῶν ἐν θαλάσσῃ. Κεφ. κέ.

Cóclata in vulg. exempl. delidetitur: vt & apud Actuarium. at Goupylo teste in antiquis cod. legumur Ipse etiã Hermolaus, Marcellus & Ruellius expressérũt. Ald. in notis legit bene.

ΓΙΝΟΝΤΑΙ δὲ ἰσόδυναι πληγαὶ καὶ ὑπὸ Δράκοντος καὶ Σκορπίου τῶν ἐν θαλάσσῃ, καὶ παραπλησίως ὀδυνίας χαλεπὰς φέρουσι, σπανίως δέ ποτε καὶ νομάς. ἁρμόζει δὲ πρὸς τὰς πληγὰς αὐτῶν ποτισμὸς ἀψινθίου, ἢ ἐλελισφάκου, ἢ θύμου σὺν ὄξει τετριμμένου.

καὶ αὐτὴ δὲ αἰαπληχθεῖσα καὶ ὀπτοπλιν-
θεῖσα τοῖς δήγμασι, τῆς ἰδίας ἴαμα πληγῆς.

Περὶ τῶν ὑπὸ Μυγαλῆς δεδηγμένων.

Κεφ. κς'.

ΤΟΙΣ δὲ ὑπὸ Μυγαλῆς δηχθεῖσι βοηθεῖ χαλβάνη σπληνίον ὀπτοπλινθὲν κατὰ τὸ δήγματος ὡς φάρμακον μετ' ὄξους λελειοτερεβινθινόν, ἢ κρίθινον ἄλευρον μεῖ' ὀξυμέλιτος ὀπτοπλασθέν. ἢ ἡ αὐτὴ ὑὴ ἡ δακοῦσα μυγαλὴ αἰαπυασμένη καὶ ὀπτηθεῖσα, τῆς ἰδίας πληγῆς αὐτοφάρμακόν ἐστι· καὶ γλυκείας ῥοᾶς ἐφθὰ καὶ καταπλασθέντα κηκεία· ἢ τοῦ σίτου ἐφθὰ καὶ καταπλασθέντα, καὶ σκόροδα σεσυπτεμμένα, ἢ ἡ ὑὸ τὴ ἅλμης κατάπλυσις τοπικὰ μὲν ταῦτα. πολυζήμιον δὲ ἀρχὴ ἀβρότονον καθεφθὲν, εἶτα δι' οἴνου προσφερόμενον. ἕρπυλλος δὲ καὶ χαλβάνη καὶ εὔζωμον διεφθέντα οἴνῳ, ἢ κυπαρίσσου τὰ ἁπαλὰ σφαιρία μετ' ὄξους, καὶ κυκλάμινον μεῖ' ὀξυμέλιτος, καὶ πύρεθρον σὺν οἴνῳ, καὶ χαμαιλέοντος τῆς βοτάνης ἡ ῥίζα. τινὲς δὲ ἀναγράφουσιν, ὅτι καὶ αὐτὴ λιθοτερεβινθῆσα ἡ μυγαλὴ, πρὸς τὸ ἴδιον πλῆγμα πολύζηται. τινὲς δὲ ἱστορίαν ταύτην ἐν ἄλλοις καὶ ὠφέλιμον διηγήσαντο, οὐδαμοῦ μέντοι σεσημειώσεως μόνον ἀξιώσαντος. ἔνιοι δὲ φασὶ μὴ ἄλλως ἐλκοῦσθαι τὰ δηχθέντα, εἰ μὴ αὐτὸς ἡ μυγαλὴ τυγχάνοι· τότε δὲν φασὶ βοηθεῖν.

Περὶ τῆς ὑπὸ Ἐχίδνης δεδηγμένων. Κεφ. κζ.

ΤΟΙΣ δὲ ὑπὸ Ἐχίδνης δηχθεῖσι βοηθοῦσι τῶν αἰγῶν αἱ σπυραγοὶ μεῖ' οἴνου αἰατιθεῖσαι σπυδαίως. καὶ δάφνη ὡσαύτως, ἢ ἀβρότονον, ἢ χαμαίπιτυς ἀνὰ σπληνίου ὀπτὰ ῥιπτόμενα, καὶ ὀρίγανος χλωρὰ αὐτὴ ἐσθιομένη· ἢ τῶν ὀρίθων αἱ νεοσσοὶ αἰαπυχθέντες ἢ πραχεῖμα προσιδόμενοι ὀφθινόν τε ἄλευρον μεῖ' οἴνου πεφυραμένον καὶ ῥαφάνου φλοιὸς ἰσχυρῶς κοπεὶς, ὡς τε λεπτὸν γλυφῆναι, ἢ σκίλλα ὀπτὴ ἢ χαμαίμηλον λελειωμένα, ἢ ὠμηλύσας δὲ ὀξυμέλιτος ἐσκευασμένη, ὡσαύτως ἐπιπλημένου θερμοῦ. ταῦτα μὲν τοπικῶς ὀπτοπλινθεύματα. ὠφελεῖ δὲ καὶ ἐχιοβάλους καὶ βάπτας μεῖ' οἴνου. ἔνιοι δὲ ἄγχουσαν πλὴν λεπτὸ-

A 'Quin & mullus in longitudinē diffissus & impositus, eorū ictibus remedio est.

De Muris araneī morsu.

Cap. XXVI.

DE MORSIS à mure Araneo splenium è galbano vulneri impositum per se: aut ex aceto tritum auxiliatur: itémque hordeacea farina ex aceto mulso illita. Quin & mus ipse araneus qui morsum intulerit, si diuulsus imponatur, contra ictum suum remedio est. Idem præstat dulcis mali Punici corium decoctum & illitum. Similiter porri cocti & adhibiti, itémque allia contrita, necnon & calidæ muriæ fotus. Atque hæc quidem affecto loco imponuntur. Prodest verò potum abrotoni decoctum in vino exhibitū: præterea serpyllum, galbanum & eruca, si in vino diluantur, itémque tenellæ cupressi pilulæ cum aceto, cyclaminus ex aceto mulso, & pyrethrum cum vino: denique & chamæleontis herbæ radix. Nec desunt qui literarum monumentis tradiderunt, trium murem araneū contra suos ictus commodè bibi. Quam historiā apud alios inuentam dignam tantummodò censuimus, quę annotaretur. Asseuerant etiam nonnulli vix vlcerari demorsum, nisi mus araneus prægnās fuerit, ac tùm demum auxiliari ferunt.

De Vipera morsu. Cap XXVII.

DE MORSIS à vipera fimum caprinum vino solutum præsentaneo est auxilio: similiter & laurus, abrotonum & galbanum splenij loco superiecta, necnon & origanum viride contritum: itidem pulli gallinacei discerpti, ac protinus vt calent appliciti: erui farina vino subacta, radiculæ cortex vsqueco tusus vt in puluerem solutus abeat: scilla tosta, itémque chamæmelum, siquidem terantur, & cruda hordeacea farina ex aceto mulso subacta: sed locus antè calida foueatur. Et hæc quidē affectæ parti admouentur. Rubus verò intro sumptus, cōtra viperinos ictus in vino prodest. Sūt & qui anchusam tenui constantem

Legitur apud Paulum, ἢ κυπαρίσσου καὶ ἀπαλὰ σφαιρία μετ' ὀξυμέλιτος, nulla cyclamini facta mentione.

Paul. καταπλασθῆναι

Paul. καθῆναι.

Addit Paulus ἢ σκίλλα ὀπτὴ ἢ χαμαίμηλον λελειωμένα, quo loco Gorpyl. legit καὶ λελειωμένη Paulus, ἢ ὠμηλύσας

folio auxiliari prodiderunt. Bibuntur & leporini coaguli oboli terni, & porracei succi dimidiata cotyla in mero: itémque foliorum melissophylli succus & sylvestris ruta: hæc ipsa quoque in vino propinari debent. Quin & ipsa frequens vini potio iuuat, alliorúmque, cæparum ac porrorum tenellorum cius, salsamentáque acerrima & *exquisitissima. Simplicia hæc sunt. Compositum verò medicamentum contra viperarum morsus celebratur, quod è myrrhæ, castorij, piperis, sandaracha anethique seminis singulorum dimidio constat acetabulo. Hæc omnia in passo Cretico alióve quopiam generoso teruntur. Erasistratus eo in libro quem de facultatibus inscripsit, complura etiam alia tradidit, quæ ictis a vipera auxilium ferre possunt: [quo in genere sunt gallinarú cerebella in vinó pota, & brassicæ satiuæ séminis triti acetabulum cum vino bibitú. Vtile præterea censetur digitum in picem liquidam intingere, ac deinde in vinum demergere, atque hoc tandē potui dare. Et de iis quidem hactenus, quę contra viperarú morsus auxiliantur.]

De Amphisbæna morsu.

Cap. XXVIII.

DE Amphisbæna priùs agentes, simul & semel admonuimus, localia remedia eadem ab ipsa percussis adhiberi, quæ contra viperarum morsus descripta fuere.

De morsu Dryini.

Cap. XXIX.

A DRYINO ictis conuenit aristolochia cum vino pota, & trifolium herba: similiter & assumpta radix asphodeli, & cuiuscunque generis quercus glandes epotæ. Parti verò ictæ ilicis radices tusæ & impositæ auxiliantur.

De morsu tum Hæmorrhoi, tum etiam Dipsadis. Cap. XXX.

HÆMORRHOI Dipsadisq; morsus, ceu immedicabiles, à pleriſque priscorū pro deploratis habiti

A φυλλον βοηθεῖν· ἀφηρεῶνται πίνεται δὲ καὶ λαγωοῦ τῆς πτύας ὅσον τεωβόλοι, καὶ πορράσου χύλισμα ὅσον κοτύλιον ἐν ἀκρήτῳ, καὶ μελισσοφύλλου τῶν φύλλων ὁ χυλός, καὶ πήγανον ἄγριον. Ταῦτα δὲ ἐν οἴνῳ δεῖ πολυζειν. καὶ αὐτὴ ἡ οἰνοποσία συνεχῶς προσλαμβανομένη, σκόροδά

B τε ἐσθιόμενα καὶ κρόμμυα, καὶ πορράσου ἅπαλὰ καὶ τρίχες δρυμύτατοι καὶ πολυτελέστατοι. καὶ τὰ μὲν ἁπλᾶ ταῦτα. Ἐν αὐτῷ δὲ τῷ φαρμάκῳ βδελυρωτέρῳ ὄντι τῶν ὀφιοδήκτων, ὅσῳ δεῖ σμύρνης, κασσίου, πεπέρεως, *αἰθράχνης *ἄνησον καὶ σπέρματος ὀξυδάφου τὸ ἥμισυ. Ταῦτα πάντα

C λειαίνει ἐν γλυκεῖ Κρητικῷ, ἢ ἑτέρῳ λευκῷ τῶν εὐουδαίων. Ἐφ' οἷς τινες δὲ τῶν τοῦτο δυναμένων ἀνέχρισαν τὴν ἄλλα τινὰ πλείονα βοηθεῖν δυνάμενα ζώων ἐχιοδήκτοις. [οἷον τῶν ἐρινάων ἐγκεφάλους σὺν οἴνῳ πινομένους, καὶ κρίμνων ἡμέρου τοῦ σπέρματος ὀξυδάφου λέγουσι πινομένου μετ' οἴνου. ἀγαθὸν δὲ καὶ τὸν δακτύλου καταβάπτειν εἰς πίσσης ὑγρᾶς· ἔπειτα εἰς οἶνον ἀποκλύζοντα πίνειν. τοιαῦτα μὲν καὶ περὶ τοὺς ἐχιοδήκτους.]

Περὶ τῶν ὑπ' Ἀμφισβαίνης δεδηγμένων.

Κεφ. κή.

ΠΕΡΙ Ἀμφισβαίνης τοιούτους ἐπεμνήσθημεν, ὅτι πως ταῖς τρώσαις ἐχιόδαις αἱ ἀκανθογραμμέναις βοηθείαις πέφυκε βοηθεῖσθαι ὁ ἰὸς αὐτῆς πληγείς.

Περὶ τῶν ὑπὸ Δρυίνου δεδηγμένων.

Κεφ. κθ'.

ΤΟΙΣΙ δὲ ὑπὸ Δρυίνου πληγεῖσιν, ἁρμόζει ἀριστολοχία σὺν οἴνῳ πινομένη, καὶ ἡ τρίφυλλος πόα· ῥίζα δὲ ἀσφοδέλου προσλαμβανομένη, καὶ δρυὸς πάσης ὁ καρπὸς πινόμενος. καὶ τῆς ἐρίνου αἱ ῥίζαι πεπτόμεναι καὶ κατὰ πλασσόμεναι, τοπικῶς παρηγοροῦσιν.

Περὶ τῶν ὑφ' Αἱμόρρου καὶ Διψάδος δεδηγμένων. Κεφ. λ'.

Α ΙΜΟΡΡΟΣ δὲ καὶ Διψὰς τῶν πλείστων τῶν προειρημένων ἀπηνορρυήστερ, ὡς ἀβοήθητοι, αἱ δήξεις.

Ald. perperam ἰσχυρώτατα. Aliqui nonnulli codices, ὡς ἔδει

Corn. ne vertisse ne leg. adiutæ censet.

Goup. alter & χρόνιαι quæ scriptura recepta est.

Conclusa addūt nonnulli codices; quæ etiā in Ald. exemplaris notatis reperiūtur.

Coraarius videtur legisse ἐν ὑποδήμασι

Paulus, παρηγορεῖ

Addit Paulus

Addit Paul. ἐκ τούτων καὶ Interpres Aldinus legisse videtur ἐν ὑποδήμασι. Paulus, ἀφέρεται.

Ald. perperam πλειόνων Paul. παρὰ πλείστας ἢ πολλούς.

Paulus, διὸ καὶ τὴν κατ' ἰδιότητα πρὸς τὸ ἕλκος τὴν διὰλαδὸς ὠφελειῶντων ἀποστῆναι &c.

ἀδὲ καὶ τὴν κατ' ἰδιότητα πρὸς τὸ ἕλκος τὴν διὰλαδὸς ὠφελειῶντων ἀποστῆναι. δεῖ μὴν οὖν ἀποπειρᾶσθαι τῶν χρησίμων βοηθημάτων· πρῶτον μὲν δὴ τὸν καταχασμοὺς προσλαμβάνειν, τήν τε καῦσιν ποιῆν, καὶ εἰ ὁ τόπος ἐγχωροίη, καὶ ἀκρωτηριασμόν· ἐφεξῆς δὲ τὰς τῶν δριμέων καταπλασμάτων ἐπιθήσεις, ὧν ἐγὼ εἰ- B ρήκαμεν πολλάκις. χρησιμεύειν οἶδα καὶ δριμυφαγίας, μάλιστα τοῖς ἀπὸ τῶν περιχρῶν. ἀκρωτηρίασις τε καὶ λυσῖν ὠφελεῖ· τοῦτο συνεχῶς ἐκ μικρῶν διαστημάτων πλεονάκις καταλαμβάνον, πρὶν καταστῆναι τὸ τῶν νοσημάτων εἶδος. ἐκείνων δὲ ἅπαξ ἐπιφανέντων, οὐδὲ C ὁμοίως τοῖς τῆς ἰατρῶν ἐπιτυχείας ὄφελος γίνεται. ἐπὶ δὲ τῶν αἱμόῤῥου τὰ αὐτά. καὶ πρὸς πύησιν τὰ ἐν τῷ κεφῷ τῶν βοηθημάτων· οἷον τοῖς καταχασμοῖς καὶ τοῖς καύσεσι καὶ δριμυφαγίαις καὶ ἀκρωτηρίασις. καὶ ὅσα ὠφείσαμεν ἐπὶ δὲ διὰλαδός. ἔτι δὲ καὶ ἀμπέλου φύλλα ἐφθὰ σὺν μέ- D λιτι λελειωμένα.

Περὶ τῶν ὑφ' ὕδρου δηχθέντων.

Κεφ. λά.

ΤΟΙΣ ὑφ' ὕδρου δηχθεῖσιν ἁρμόζει ὀείγανος λεῖα φυραθεῖσα ὕδατι, κυῖλα τὶ σὺν ἐλαίῳ, ἢ ἀριστολοχίας ὁ φλοιὸς, ἢ ῥίζα δρυὸς λφοτριβηθεῖσα, E καὶ κρίθινον ἄλευρον σὺν ὕδατι μετὰ μέλιτος συντεθειμένον. πολίζεται δὲ καὶ ἀριστολοχίας δίδραχμον ἐν κεράμιῳ ὀξυκράτου κυάθων ἕξ. ἢ σεσοίου χυλὸς, ἢ ἀφέψημα ὀπωτέρου σὺν οἴνῳ· πρόσφατόν τε χρεῖον προσφερόμενον μετ' ὄξους.

Περὶ τῶν ὑπὸ Κεγχρειδίου δηχθέντων. F

Κεφ. λβ'.

ΤΟΙΣ δὲ ὑπὸ Κεγχρειδίου δηχθεῖσι, δριδραχίτης ὁ καρπὸς μετὰ λινοσπέρμου καταπλασσόμενος βοηθεῖ. καὶ θύμβρα, καὶ ἄγρειον πήγανον, καὶ ἕρπυλλος σὺν ἀσφοδίλου < β'. καὶ σὺν οἴνου κυάθοις γ'. ἢ ἀριστολοχίας ῥίζα. ὡσαύτως καὶ καρδάμωμον, καὶ γλυκανὴ παρεμπλοκῆς. G

vel, quamobrem si propriatione ictus dipsadē eruendi defectum sarcimenta &c.

quamobrem & proprietate quadā iuuantibus contra dipsadem auxilijs deficiuntur fuere. Attamen cōmunia experiri operæpretiū fuerit. Protinus ergo scarificationes vſtionéſq; adhibendæ: ac ſiquidē id permittat locus, ad extremorū amputationem deueniendū eſt. Deinde verò acria imponenda cataplaſmata, quorum ſæpenumerò meminimus. Deprehēdi etiamnum acres cibos, potiſſimum verò ſalſamenta, vſui eſſe. Quin & meri potio balneáque iuuant: ſed hæc continuo poſt ictum, ac ſubinde breuibus ex interuallis vſurpanda ſunt, priuſquam ſeſe morbus patefecerit: quo ſemel oborto ne tantillum quidem opis vlla Medici opera cōferre potis eſt. In ictu Hæmorrhoi eadem illa cōmunia proſunt. At localia deſcripta cōperimus, in dipſadis quidem morſu, portulacæ folia trita cū aceto, & polentam, ac rubi folia trita cum melle, plantaginem, hyſſopum, allium candidum, porrum, rutam & vrticam. In hæmorrhoi verò morſu, tum eadē hæc, tum inſuper vitis folia cocta cum melle trita. Ipſius quoque hæmorrhoi crematum caput potui datur, aut allium cum vino. Eſitantur & vuæ paſſæ.

De morſu Natricis. Cap. XXXI.

MORSIS à Natrice confert origanum tritum aqua ſubactum, itémque cinis è quercu oleo exceptus, aut ariſtolochiæ cortex radixve minutim contrita, & hordeacea farina cum aqua & melle coacta & quaſi colliquefacta. Bibuntur & ariſtolochiæ drachmæ binæ in dilutæ potionis aut poſcę cyathis binis: aut marrubij ſuccus, aut alterutrius decoctum cum vino. Fauus item recens cum aceto exhibetur.

De Cenchridij morſu. Cap. XXXII.

MORSIS à Cenchridio auxiliatur lactucæ ſemen cum lini ſemine cataplaſmatis in modum applicitū, itémq; thymbra, ſyluestris ruta, & ſerpyllū cum aſphodelo tritum. Dantur verò protinus in potu centaurij radicis drachmæ binæ cū ternis vini cyathis, aut ariſtolochiæ radix eodem modo. Simulter & naſturtium ac gentiana.

Paulus, ὀλίγα κατασπήψη τὰ νοσήματα.

Paul. μετὰ μέλιτος συντεθειμένον.

Paul. ἰδίμηνον.

Paul. κεγχρίου

Quidam legisse videtur ἐνος

Paul. addit, λάπ

De morsu Ceraſtæ.

Cap. XXXIII.

ACERASTE & aſpide ictis cita ſuccurrit extremæ partis amputatio. Quare ſine mora totam partem ictam reſecare oportet, aut certè tum partes affectas, tum & iis vicinas ſcalpello confeſtim circuncidere. Tandem verò reliquiæ cauteriis exiccandæ: ſiquidem horum animalium virus baſiliſci veneno ſimile eſt.

De morsu Aſpidis.

Cap. XXXIIII.

ICTIS ab Aſpide eadem quæ aduerſum ceraſtæ morſus (vti modò ſcriptum eſt) accommodãda remedia. Horum enim, vti & baſiliſci, virus, haud ſecus atque taurinus ſanguis, ſpiritum ſanguinémque arteriis contentum celerrimè cogit atque coagulat.

De Baſiliſci morſu. Cap. XXXV.

MORSIS à Baſiliſco Eraſiſtratus auxiliari aſſerit caſtorij drachmam vnam in vino potam, itidémque papaueris ſuccum. Et ictuum quidem morſuúmq; venenatorum remedia ita ſe habent.

FINIS.

A Περὶ τῆς ὑπὸ Κεράστου δηχθέντων.

Κεφ. λγ'.

ΤΟΙΣ δὲ ὑπὸ Κεράστου δηχθεῖσι καὶ Ἀσπίδος, συνίσημος ὁ ἀκρωτηριασμὸς ἐπαμύνει· διόπερ αὐτοφώτους ἀποκόπτειν δεῖ· ὅσον δ' δηχθὲν μέρος, ἢ παρεγχεῖν τὰ δηχθέντα μέρη τὸ δηχθὲν καὶ τὰ πύ-
B κλῳ τὰ πλησία. εἶτα δὲ τὰ ὑπολείμματα τοῖς καυστηρίοις αἰκιστέον· ἰὸς γὰρ καὶ τούτοις ὁ ἰὸς εἶος ὁ τοῦ βασιλίσκου.

Περὶ τῆς ὑπ' Ἀσπίδος δηχθέντων.

Κεφ. λδ'.

ΤΟΙΣ δὲ ὑπὸ Ἀσπίδος δηχθεῖσιν, ὅσα καὶ τοῖς ὑπὸ Κεράστου (ὡς προεγράφη) προσενεκτέον βοηθήματα. οἶνον γὰρ βοὸς αἷμα ὀξύτατα πήγνισι τὸ ἐν ταῖς ἀρτηρίαις αἷμα καὶ πνεῦμα πρὸς τούτων ὁ ἰὸς, ὡσαύτως καὶ ὁ τοῦ βασιλίσκου.

Περὶ τῆς ὑπὸ Βασιλίσκου δηχθέντων.

Κεφ. λε'.

ΤΟΙΣ δὲ ὑπὸ βασιλίσκου δηχθεῖσιν, ὡς Ἐρασίστρατος φησὶ, βοηθεῖ κάστορος
< ά. πτισάνη σὺν οἴνῳ ὡσαύτως δὲ καὶ ὁ τῆς μήκωνος ὀπός· τοιοῦτος μὲν καὶ ὁ θηριακὸς τρόπος.

Paulus rectius; si sic etiã Cornarius. Parisi. caret.

Paul. πλησίον

Paulus perperã, μάλα.

Paulus ἀ. ϛ

TELOS.

I. A. SARACENVS LECTORI. S.

NON ſum neſcius, Lector beneuole, varia extare tum manu ſcripta, tum etiam typis excuſa Dioſcoridis exemplaria, tã Graeca quàm Latina, in quibus multiplices ſimplicium appellationes, etiam Barbara, ſingulorum penè capitum principiis annexa reperiuntur: nec deeſſe, in quibus præterea remedia multa ſanè perquàm vana aut nimiùm ſuperſtitioſa, adeóque ipſo etiam Dioſcoride, tanta apud Galenum commendationis Autore, penitus indigna, ex variis Scriptoribus temerè ac citra delectum deprompta, in contextum ipſum perperam irrepſerint. Sed & alia non pauca diuerſis in bibliothecis ſtudiosè aſſeruari mihi compertum eſt aliquantò & accuratiùs & religioſiùs exarata eiuſdem Autoris exemplaria, in quibus tum peregrina illa vocabula, tum quæcunque alia vel eſſe ſuperſtua, vel ſtylo diſſimili ſcripta cõſtabat, omiſſa fuere: aut ſi qua fortè leguntur, ea non quidem inſerta contextui, ſed margini tantummodò inſcripta reperiuntur. Quamobrem in iſta codicum varietate diu multúmque fuit animus in dubio, an illa omnia, quæ vt aliis nonnullis Interpretibus, ita & mihi meritò ſuſpectiora videbantur, quòd eſſent Autoris ſtylo planè diſſentanea, omnino prætermitterem. Tandem verò quoniam inter illas varias variarum linguarũ appellationes, ac medicinas etiam, quanuis non ſatis certas, aut etiam à Dioſcoridis mente prorſus alienas, nonnulla interdum occurrere viſa ſunt, è quibus pollens iudicio Lector, fructum qualencunque carpere poterat: iccirco etiam iis te penitus defraudare nolui, ſed doctiſſimorum virorum, Hieronymi Roſcij, Io. Cornarij & Iac. Goupyli exemplo, talia, ſi non omnia, ſaltem pleraque, tanquam ſuppoſititia & falsò aſcripta Dioſcoridi, à contextu remouenda cenſui, ſátque habui hunc iis locum ad operis calcem aſſignaſſe, additis tamen interdum præter interpretationem meam nonnullis coniectaneis & animaduerſionibus. Hiſce paucis te, ſtudioſe Lector, admonitum volui, quò noſtri conſilij ratio etiam apud te conſtaret. Vale.

INTER DIOSCORIDIS VERBA, hæc in quibuſdam codicibus falsò adſcripta reperiebantur.

Cap. de Iride.

A

ABALIQVIBVS Iris Illyrica, ab aliis thelpide, ab aliis vrania *quaſi cæleſtis*, à nónullis cathęrō *quaſi purgatrix*, ab aliis thaumaſtos *quaſi admirabilis*, à Romanis marica radix, à quibuſdam gladiolus, ab aliis opertritis, ab aliis conſecratrix, ab Ægyptiis nar appellatur.

Pertè, Maronica, à Maronea ciuitate Illyriæ, quoniã apud eam ſpecies optimæ reperiuntur.

Sic C. ἀφεσ quaſi facers de cui apud Athenæum & Theophraſtum pro vrtde legitur.

Vtrè, quid, teſte Apuleio, in alnorubus ſaſſafras aſſar aut cõtineat nõ vtique affirmat Cor. Celſus Ionicum quadratum. Primum cognomen ſumpſit à Ioue, ſecundum inde appellat.

Latinus etiã vulgo ignotam diſtam ſcribit Matth.

De Acoro.

aliqui choron aut aphrodiſian, Romani veneream, alij nauticam radicem, Galli piper apum vocant.

De Cypero.

Romani iunci radicé, alij iuncũ.

De Aſaro.

C

Magi ſanguinem Martis, Oſthanes theſan, Ægyptij cerceram, Romani perpenſam, alij baccharin, Hetruſci ſuccinum, alij nardum ruſticum, Galli bacchar.

Ibid. Radices ſubiacent

odore cinnamomi. Solum amat aſperum miniméq; humidum. Huius radix ruptis, conuulſis, tuſſi veteri, ſpirandi difficultati, ac vrinæ difficili auxiliatur. Menſes quoque pellit, & contra ſerpentium morſus vtiliter ex vino propinatur. Folia, vtpote quæ aſtringũt, capitis doloribus adhibita proſunt, itémq; oculorum inflammationibus, ægilopis incipiẽtibus & mammis à partu in- E flammatis, atque etiam eryſipelati. Cæterum & ipſe odor ſomnificus eſt. Et certè quidem Crateuas herbarius de eo ita ſcriptum reliquit.

De Aſpalatho.

Alij ſphagnon, alij Phaſganon, Syri diaxylon vocant.

De Croco.

F

Ab aliquibus Caſtor, ab aliis cynomorphos, à Magis ſanguis Herculis appellatur.

Pag. 4. g. μετὰ δ', lege.

ΟΙ δὲ, ἶρις Ἰλλυρικὴ, οἱ δ', θελπίδη, οἱ δ', οὐρανία, ⓐ δ', κεφαίρων, οἱ δὲ, θαυμαστὸς, Ρωμαῖοι ῥάδιξ μάκενα, ⓐ δὲ γλαδιόλος, οἱ δὲ ὀπερτεῖτος, οἱ δὲ ἱερατεῖτις, Αἰγύπτιοι ναρ. Al. θελπίδη. Al. μάκενα. Al. ἱερατεῖτις.

6. a. Ακορον,

ⓐ δὲ, χόρος Αφεσδισίας, Ρωμαῖοι βενέρεα, οἱ δὲ, ναυτικὴ ῥάδιξ, Γάλλοι πιπερόκομον. Al. πεπέρακομον.

6. g. καλοῦσι,

Ρωμαῖοι ἰουνικὴ ῥαδίκεμ, ⓐ δὲ, ἰουνίκουμ.

10. b. καλοῦσι,

τροφῆς αἷμα Αρεως, Οἱ δὲ Σκύθαι φασὶν, Αἰγύπτιοι κερέεα, Ρωμαῖοι σφενδόναμ, ⓐ δὲ, βάκχαρ, Οὗτοι συγκινοῦμ, οἱ δὲ, νάρδον ῥούστικουμ, Γάλλοι βάκκαρ.

Ibid. c. ῥίζαι.

ἐοικυῖαι τῇ ὀσμῇ κινναμώμῳ. φιλοῦσι τραχεῖα χωρία καὶ ἄνικμα. Ταύτης ἡ ῥίζα βοηθεῖ ῥήγμασι, σπάσμασι, βηχὶ χρονίῳ, δυσπνοίᾳ, δυσουρίᾳ· ἄγει καὶ ἐμμηνα· καὶ θηριοδηξίοις χρήσιμος σὺν οἴνῳ πινομένη. Τὰ δὲ φύλλα, τυπτικὰ ὄντα, καταπλασσόμενα ὠφελοῦσι κεφαλαλγίας, ὀφθαλμῶν φλεγμονάς, καὶ αἰγίλωπας ἀρχομένους, καὶ μαστοὺς ἐκ τόκου φλεγμαίνοντας, καὶ ἐρυσιπέλατα. ἔστι δὲ καὶ ὑπνοποιὸς ἡ ὀσμή. καὶ Κρατεύας ὁ ῥιζοτόμος εἰς τὸ αὐτό. Hæc eadem habet vet. cod. & Flor. Sed ex capite 31. lib 3. de Baccharı tranſlata ſunt. Par. πίμ

18. c. ἀσπάλαθος,

ⓐ δὲ, σφάγνον, οἱ δὲ, φάσγανον, Σύροι δὲ διάξυλον καλοῦσι.

20. c. Κρόκος,

ⓐ δὲ, Κάστωρ, οἱ δὲ, κυνόμορφος, τροφῆς αἷμα Ηρακλέους.

21.b. τυγχάνει.

Θεσσαλὸς μὲν οὖν φησὶ μόνον εὐώδη αὐτὸν, οἱ δὲ, καὶ θανάσιμον, εἰ πιεῖν τις δῷ αὐτοῦ < γ' μεθ' ὕδατος. ἔχει δὲ ἀληθῶς ἰσχὺν δυνάμεων.

22.a. Ελένιον.

οἱ δὲ, σύμφυτον, οἱ δὲ, Περσικὴν, οἱ δὲ, Μηδικὴν, οἱ δὲ, ὀρέσθιον, οἱ δὲ, νεκτάριον, ἢ δὲ, κλεωνίαν, οἱ δὲ, βάτον Ἰδαίαν, οἱ δὲ, Φλόμον Ἰδαῖον καλοῦσι, Ῥωμαῖοι τερμινθίνην, ἢ δὲ, ἰδίου λαμπάνιον, Αἰγύπτιοι λεῖον.

Additur hoc ex Ald. codice. Paret.

99.c. καὶ θυλακίσμων.

ἔστι δὲ ἔλαιόν τι ἐκ πέτρας αὐτοφυὲς δὲ αὐτομάτως ῥέον, ὠδὲς μετὰ ῥύπος βαρύτητος ἐν Ἀραβίᾳ καὶ Ἰταλίᾳ, εὖ μάλα πολύχρηστον. Δύναμιν ἔχον ξηραντικὴν δὲ ἀποφρακτικὴν, νεύρων τε κολλητικήν. ποιεῖ πρὸς ψώρας δὲ ἕλκωδη. ἔστι δὲ καὶ ῥευματικὸν δὲ κατευπτικὸν τῶν πνευμάτων.

41.f. πλὴν δυνάμεων.

Περὶ Ἰασμελαίου.

Hoc caput totidem verbis ex Aetii lib. 1 transscriptum est.

Ἡ δὲ καλουμένη Ἰασμὶ παρὰ Πέρσαις, σκευάζεται ἐκ τῶν αὐτῶν τῶν λευκῶν Περσικῶν ἰοῦ, ζυτῶν ἴσα ϛ' ἐμβαλλομένων Ἰταλικῷ ξέσει σησαμίνῳ ἐλαίου, καὶ ἀμφοτέρων ἠρέμα μαλασσομένων, ὡς ὅπερ τὸ κρίνινον εἴρηται· ἡ δὲ ζύτου χρῆσις παρὰ ταῖς ἐσταφὶς ὠδαῖς ἕνεκα παρὰ Πέρσαις προσλαμβάνεται. ἁρμόζει δὲ ὅλῳ τῷ σώματι μετὰ τὰ λουτρὰ ὅπερ τῷ θερμασίας καὶ χαλάσεως δεομένῳ. βαρυτέραν δὲ ἔχει τὴν ὠδαῖαν, ὡς πολλοῖς αὐτῆς μὴ ἡδέως ἀναλαμβάνεσθαι.

Ald. ἀλλασσομένων. Ald. προσλαμβάνεται. Ald. καὶ Ald. addit σωμάτων.

55.d. μελάνη.

Ἀρκευθὶς μικρὰ, οἱ δὲ, Ἀρκευθίδα, οἱ δὲ, μυσίτιδος, οἱ δὲ, ἀκαταλίδα, Αφροὶ ζυοεινοίπετ, Αἰγύπτιοι λιβικὸν, Ῥωμαῖοι ἰουνίπερον, Γάλλοι ἰουπικέλλουσον.

Al. ἀκαταλίδα, al. κατατίδα

16.e. ἁρμόζει.

Φύλλα δὲ ἔχει δριμέα. διὸ καὶ καταπλασσόμενα καὶ πινόμενα καὶ αὐτὰ καὶ ὁ χυλὸς αὐτῶν μετ' οἴνου, ποιεῖ πρὸς ὄφεων δήξεις. ὁ δὲ φλοιὸς καυθεὶς καὶ μετὰ ὕδατος καταχεισθεὶς, λέπρας ἀφίησι. τὸ δὲ ῥίμμα τοῦ ξύλου καταποθὲν, ἀναιρεῖ.

In edit. Colon. hunc in ipsum contextum perperam ex capite de Frasino translata sunt.

Ibidem.

Thessalus quidem ipsum duntaxat vehementis esse odoris asserit, alij etiá lethalẽ, si quis illius drach. iij ex aqua propinet. At reuera vim habet, &c.

De Helenio.

Symphyton aliqui vocãt, alij Persicam, alij Medicam, alij orestion, alij nectarion, alij cleonian, alij rubum Idæum aut verbascũ Idæum, Latini terminalũ aut inulam campanam, Ægyptij, lenen.

Est & oleum quod sponte naturæ è petra extillat, odoratum cum quadam grauitate. In Arabia & Italia nascitur, ad multa perquam vtile. Vim habet siccãdi & obstructiones aperiendi, ac neruos glutinandi. Facit ad scabiem & vlcera. Flatus itidem lenit & euincit.

De Iasmino oleo.

Quod verò Iasme dicitur, apud Persas ex albis violæ floribus conficitur: quorum vnciæ ij in olei sesamini sextarium Italicũ iniciuntur, ac vicissim permutantur seu remolliuntur, velut in liliaceo dictum est. Huius vsus apud Persas inter communia odoris gratia receptus est. Toti verò corpori post balnea adhibitum iis conuenit, qui calfactionem relaxationémque desiderant. Cæterùm odore grauiore præditum est: quò fit vt à plerisque minus libenter admittatur.

De Iunipero.

Iuniperũ paruam Græci Arceuthida, alij Mnesitheum, alij acatalidem, Aphri zuorinsipet, Ægyptij Libium, Romani Iunipernm, Galli Iupicellusum vocant.

forte, Iuniperellum

Ibidem ad cap. calcem.

folia habet acria: ideóque eorũ succus, & ea ipsa tum in vino potum etiam impolita, viperarũ morsibus opitulantur. At cortex vstus, & ex aqua illitus, lepras remouet. Ligni verò ramentum deuoratum, lethale est.

De Iunipero magna. Cap.

Est & Iuniperus magna (quá aliqui cupressũ syluestrẽ appellant, alij Mncsitheũ, alij acaterá, Romani Iuniperum) vulgo cognita, cupressó assimilis, asperis maritimisque locis plerunque nascens. Easdem porrò, quas supradicta, vires obtinet.

De Sabina.

Aliis barython, aliis baron, Romanis herba sabina appellatur.

De Lauro.

Sunt qui danaben, qui stephanon (*quasi coronam*) qui daphnon nominent. Alij mythracicen, alij mithrion, alij hypogloſſion.

De Rhamno.

Sunt qui Persephonion, qui leucacantham, Latini spinam albam, alij spinã cerualem, Aphri atadin.

De Alimo.

Aliqui damassonium vocant, alij erymon, alij brittanicam, alij rabdion, *quasi virgulam*. Sunt qui basilion, *quasi regiam*. Magi Mercurij basin, similiter Sapsis, alij Osiridis diadema, alij helioſtephanon, *quasi solis coronam*, alij denique sacrum caulem, Pythagoras anthenoron, Ægyptij asontiri, alij asphe, alij ascaluri, alij asariphen, Latini albucum aut ampeluciam.

Hinc forte illud Vlpiani, qui quod lib. 33. cap. 22. asphodelon Hesiodi (qui quidem Latinis albucus seu albucũ dicitur) hanc herbã quibusdam falsò appellatum arbitratus.

De Hypociſtide.

Aphri phyllesade.

De Roſa.

Latinis Rosa.

De Vitice.

Aliqui agonon vocant, *quasi insecundum*, alij lygon, *quia* "vimen, alij "amictomænon, alij tridactylon, Magi "semnon, *quasi veneerandum*, alij Ibis sanguinẽ, Ægyptij sum, Romani salicem amerinam, alij piper agreste, alij ligusticum.

Quid vitis cæterorũ vsum præstet.

Ratio nominis quæ & agnus castus dicitur, ex Plinio, quanquã Plinius lib. 24. cap. 9. matrem Theophrastus Athenæusq; refutatã confutantes hic, forsan rabiem fibi fanabant.

De Moro.

Esse quoque videntur mora quędam syluestria, humilis rubi fructibus similia, sed astringendi maiore vi prædita. Eorum succus minùs teredinẽ sentit, vtilis fouẽdis inflammationib. (vlceratis) faucibus cicatrice obducẽdis, & ipsis vulneribus carne implendis. Nascuntur locis vmbrosis atque frigidis.

Ista quæ in cæterum capi-

De Purpura.

Purpuræ opercula cũ oleo deco-

A Περὶ Ἀρκευθίδος μεγάλης. Κεφ.

Ἀρκευθὶς μεγάλη, οἱ δὲ, κυπάρισσος ἀγρία, οἱ δὲ, Μνησίθεος, οἱ δὲ, ἀκατέα, Ρωμαῖοι ἰουνίπερον. ἔστι καὶ αὕτη γνώριμος τοῖς πλείστοις, ἐμφερὴς κυπαρίσσῳ, γινομένη δὲ παχέσι καὶ τραχέσι λιθώδεσι τόποις ὡς ἐπὶ τὸ πολύ. Δύναμιν δὲ ἔχει

B τὴν αὐτὴν τῇ τερεβινθίνῃ.

55.f. βάκχα, θέρ.

οἱ δὲ, βάρυον, οἱ δὲ, βάκχον, Ρωμαῖοι ἕρβα σαβίνα. 57.d. δάφνη

Ⓓ δὲ, δενδάλιον, οἱ δὲ, στέφανον, οἱ δὲ, δάφνος, οἱ δὲ, μυθρακικὴ, οἱ δὲ, μίθριος, οἱ δὲ, ὑπογλώσσιον.

C 61.g. Ράμνος,

οἱ δὲ, Περσεφόνιον, οἱ δὲ, λευκάκανθα, Ρωμαῖοι ἄσπινα ἄλβα, οἱ δὲ, ἀσπὶνα κυανῆ, Ἀφροὶ ἀτάδιν.

62.c. Ἄλιμος.

Ⓓ δὲ, δαμασώνιον, οἱ δὲ, ἔρυμον, οἱ δὲ, βρεττανικὴν, οἱ δὲ, ῥαβδίον, οἱ δὲ, βασιλέα,

D τερεφῆ) Ἑρμοῦ βάσις, ὁμοίως σπλῆς, οἱ δὲ, Ὀσίριδος διάδημα, οἱ δὲ, ἡλιοστέφανος, οἱ δὲ, ἱερὸς καυλὸς, Πυθαγόρας ἀνθέμορος, Αἰγύπτιοι ἀσοντῆρι, οἱ δὲ, ἄσφη, οἱ δὲ, ἀσκαλωνεί, οἱ δὲ, ἀσαρίφη, Ρωμαῖοι ἄλβουκον, οἱ δὲ, ἀμπελοῦσιαν.

V. ἀσοντῆ. Scaliger. ἀσκαλωνεί.

64.d. ῥοιᾶς

Ⅱ Ἀφροὶ φυλλέσαδι.

66.c. Ῥόδον,

Ρωμαῖοι ῥόσα.

70.a. λύγος,

Ⓓ δὲ, "ἄγνον, οἱ δὲ, λύγον, οἱ δὲ, ἀμυκλωμίαγον, οἱ δὲ, τριδάκτυλον, Προφῆται στρμνὸν, οἱ δὲ, αἷμα Ἴδιος, Αἰγύπτιοι σοὺμ,

F Ρωμαῖοι σαλὶξ μαεῖνα, οἱ δὲ, πίπερ ἀγρέστε, οἱ δὲ, λεχρίσικουμ.

Forte, ἄγνιν, quod exoletum.

85.d. κοιλίαν καθαίρει.

δοκεῖ δὲ εἶ) καί τινα μέρη ἄγρια παραπλήσια τῷ χαμαιδάφνῃ, συμπικνότερα δὲ ὧν ὁ ὁπὸς ἧττον περιδονίζεται, καὶ τὸ πλῆμμα φλεγμονὰς, καὶ ἑπτυαλωδικὸν τῆς φάρυγγος, πληγὰς ἑρπιδικόν. φύεται δὲ πολυσκίοις καὶ ψυχροῖς τόποις.

90.d. Ἑπτυαλωδικά.

πορφύρας πώματα σὺν ἐλαίῳ ἑψηθέντα

καὶ ἐπαλφόμενα, ῥίζας ῥεύσας τηρῆ. πο-
θέντα δὲ σὺν ὄξει, σκληῶσι οἷδ᾽ ὄντα σκλη-
ὑποζυμιαθῆσαι ὀξίζει, ἐγείρει ζωὴ ὑστερικὰς πνι-
γμονὰς, καὶ τὰ δεύτερα ἐκβάλλει.

100.c. σκυμάχοις.

ἡ δὲ χιλία βύτων ταριχευθῆσα καὶ
ξηρανθῆσα ἐν σκιᾷ, ὅτι πρὸς τὰς ὑπερκα-
θάρσεσι τὰς ἀπὸ φαρμάκων κενωθικῶν, B
ὅσον < γ'. λαμβανομένη, βοηθημά ἐστιν
ἄριστον. ἴσχει γὰρ παραχρῆμα τὴν κένωσιν·
δεῖ δὲ τείμμα πιεῖν καὶ ἔνοινον μετὰ ὕδα-
τος καὶ διδόναι.

Inter notha codicis Aldini habentur hic capita duo, de ptisana & chondri praeparatione; quae quidē paucis immutatis ex Geopon Constantini depromta videntur.

127.c. Κέγχρος,

Ρωμαῖοι μίλιουμ.

Ib.d. ἔλυμος

Ρωμαῖοι πάνικουμ.

Ib.g. Αἶρα,

Ρωμαῖοι λόλιουμ.

128.f. Τῆλις.

Al. κέρως nempe ab ipsius siliquæ figura in cornu speciem falcata.

ⓓ ὃ, τήλεως καρπὸς, οἱ δὲ, βύκερως, οἱ δὲ, αἰγόκερως, οἱ δὲ, κεραΐτης, οἱ δὲ, λωτὸν, Ρωμαῖοι φαίνουμ γραικουμ, Αἰγύπτιοι D ἴπαον.

129.b Λίνον.

Μακάρμον οἱ δὲ, λινοκαλαμὶς, οἱ δὲ, ἄϊνον, οἱ δὲ, λίνον ἄγριον, Ρωμαῖοι λινομυρσύμ, οἱ δὲ, λίνουμ ἀγρέστεμ, Αφροὶ ζεραφεῖς.

131.d. Φακὸς,

Ρωμαῖοι λέντεμ, οἱ δὲ, λεντικουλαμ. E

132.d. Ὄρβος,

Ρωμαῖοι ὄρβουμ.

133.a. Ἔρεβος,

Ρωμαῖοι λουπίνουμ, Αἰγύπτιοι βρεχύ.

Ib.c. ἄγριος,

ὃν Ρωμαῖοι λούπινουμ ἀγρέστεμ καλοῦσιν.

Ib.f. Γογγύλης.

ⓓ δὲ, γογγυλίδα, οἱ δὲ, γογγύσιον, Ρωμαῖοι ῥάπα.

134.d. Ραφανὶς,

οἱ δὲ, πολύφθος ἡρυγγίου, Ρωμαῖοι ῥάδικες, Αφροὶ θύρπαθ.

Inter notha verbis hisce perperam a nonnullis quædam subiungūtur quæ quoniam recēsentur lib. quarto c. CLXXVII. hinc expungēda censuimus.

Ib.b. Λαμψάνη,

Ρωμαῖοι νάπιουμ, Αἰγύπτιοι εὔθμοι.

Ib.c. βλῆτον,

Αἰγύπτιοι ἐχλωροειδῆ, οἱ δὲ, ῥίπλαθμ, Ρωμαῖοι βλίτουμ, Δακοὶ βλής.

cta & illita fluentes capillos retinēt. Pota verò cum aceto, lienem tumentem reprimunt. Suffita, ex vtero suffocatas excitant, & secundas pellunt.

Sic 4. subiectū fuit, Cimodinas fortè post nonam caput lo carentur.

De Gallinaceis.

Horum ventriculus sale conditus & in vmbra siccatus, contra immodicas purgationes a medicamētis vacuātibus factas drach. iij pondere sumptus præsenti est auxilio: quandoquidem protinus deiectionem cohibet. Teri autem debet, & aqua subactus exhiberi.

De Milio.

Latinis Milium.

De Panico.

C Latinis Panicum.

De Lolio.

Latinis Lolium.

De fœnogræco.

Alij carpon, alij buceras, alij ægoceras, alij ceraïtin, alij loton, Latini fœnumgræcum, Ægyptij italin.

Romani, ut libet Varro & Plinius, Silicium & Siliquam. Columella, Siliquam appellat.

De Lino.

Aliquibus linocalamis, aliis annon, aliis linon agrion, Romanis linomyrum, aliis linum agreste, Aphris zeraphis.

De Lente.

Latini lentem aut lenticulam vocant.

De Eruo.

Latinis eruum, seu itidem orobum.

De Lupino satiuo.

Latinis lupinus, Ægyptiis brechu.

De Lupino syluestri.

Quem Latini lupinum agrestem vocant.

De Rapo.

Alij gongylida, alij golgosium, F Romani rapum vocant.

De Radicula, seu Raphano.

Quidam polyides eryngium, Latini radicē nostratem, Aphri thorpath appellant.

De Lampsana.

Latini naplum, Ægyptij cuthmæ nominant.

De Bluto.

G Ægyptij echlotoripam appellāt, alij riplam, Latini blitū, Daci bles.

De Malua.

De Malua.

Satiuá maluá Latini hortẽſem appellãt, Pythagoras anthema, Zoroaſtres diadeſma, Ægyptii chocorten, Magi caprę lienẽ, alii muris caudá.

De Atriplice.

Latini atriplicem, Ægyptij ochi vocant.

De Braßica ſatiua.

Aliis crambe cepæa (*quaſi hortẽſis*) Latinis braſſica.

De Braßica ſylueſtri.

Quá Latini braſſicá ruſticá vocãt.

De Beta.

Nigrá Latini betá ſyluaticá vocãt.

De Portulaca ſylueſtri.

Portulaca ſylueſtris, quæ nonnullis aïzoon agrion (*quaſi ſempreuiuum ſylueſtre*) dicitur, aliis telephiũ, Latinis illecebra aut portulaca, Aphris mœmoem, Dacis lax, Ægyptiis mochmutim.

De Aſparago.

Nonnulli μνον vocant.

De Plantagine.

Nonnulli arnion (*quaſi agninam*) alii probation (*quaſi ouillam*) alii cynogloſſon, (*quaſi canis linguam,*) alij hecpapleuron, alii polyneuron, *quaſi multineruiam,* Magi caudá ichneumonis, Ægyptij aſchat, Romani plantaginem minorem, Galli tarbidolopion, Hiſpani theſaricam, Pœni atiircon.

Ib. ad capitis calcem.

Syri huius & calaminthæ iuſculũ cum melle produnt mederi paralyticis, ſi ſecũda, & quarta paraſceues, *id eſt, Veneris,* die exhibeatur. Hoc autẽ velut arcanum accipito: eſt enim veriſſimũ & experiẽtia cõprobatũ.

De Sio.

Sũt q̃ anagallidẽ aquaticá vocẽt, alii ſchœnó aromaticá, *quaſi iuncum odoratum,* alii daren ion, alij lauer.

De Siſymbrio.

Alij Veneris coronam, Latini ſuſteralem aut herbam Veneream.

De Coronopode.

Nonnullis ammonos, aliis aſtriõ, Aphris atirſipte, Romanis caciatrix, aliis ſtilago, aliis ſanguinaria.

De Soncho.

Sonchum aſperum aliqui cichorium vocant, Romani cicerbitam aſ-

A Ib.d. Μαλάχη,

κηπευτή, Ρωμαῖοι μάλβα ὀρτένσις, Πυθαγόρας ἄνθεμα, Ζωροάστρης διάδεσμα, Αἰγύπτιοι χωκορτέν, Γεσφῆται αἰγὸς σκέλη, οἱ δέ, οὐρὰ μυός.

137.a. χρυσολάχανον,

Ρωμαῖοι ἀτριπλικεν, Αἰγύπτιοι ὠχεῖ.

B Ib.b. ἥμερος,

ὁ δέ, κράμβη κηπαία, Ρωμαῖοι βρασσικα. 138.a. ἀγρία,

ἣν Ρωμαῖοι βρασσικα ρούστικα.

Ib.d. Τεῦτλον,

μάγα, Ρωμαῖοι βέτα σιλβατική. Mar. μίλαν τὴν ἄγριον.

139.d. ἀγρία,

C λευκὴν ἀείζωον ἄγριον, οἱ δέ, τηλέφιον, Ρωμαῖοι ἐλλεκεβερμ, οἱ δέ, πορτουλάκαμ, Αφρὶ μεμοεμ, Δακοὶ λάξ, Αἰγύπτιοι μοχμούτμ.

Ib.f. μυακάνθαν,

ὁ δέ, μῦον καλοῦσι. Mar. ἡμίτιν.

140.c. Ἀρνόγλωσσον,

D ὁ δέ, ἄρνιον, οἱ δέ, προβάτιον, οἱ δέ, κυνόγλωσσον, οἱ δέ, ἐπάπλευρον, οἱ δέ, πολύνευρον, Γεσφῆται βιρεχδόμιος, Αἰγύπτιοι ἀσὶφ, Ρωμαῖοι πλαστάγω μείωρ, ταρβηλοδάλιον, Ἰσπανοὶ θησαυκὰμ, Αφρὶ ἀπειρκέν. Forte ἀφ' οἷς ἰχνεύμονος.

141.d. Ἀλφοειδίου.

E ὁ δὲ Σύρος ἅμα τοῦ ζωμοῦ καὶ τῆς καλαμίνθης, σὺν μέλιτι, φασὶ δοῦναι πρὸς τοὺς παραλυτικούς· διδύμου δευτέρα, τετάρτη καὶ ἀφροδισιακοῦ. τοῦτο ὡς μυστήριόν τι δέχου. ἔστι γὰρ ἀληθέστατον καὶ ἀλφοειδέστερον. Paraſcueues.

Ib.c. ὕδατος,

ὁ δέ, ἀναγαλλὶς ἔνυδρος, οἱ δέ, χῶνος ἀρωματική, οἱ δέ, δάρλιον ἴον, οἱ δέ, λαουβέρδι. Ib.g. ἄγριον.

F ὁ δέ, Ἀφροδίτης στέφανον, Ρωμαῖοι βιτεσέλις, οἱ δέ, ἕρβα Βενέρεα.

142.f. Κορωνόποδες,

ὁ δέ, ἄμμωνες, οἱ δέ, ἄστριον, Αφρὶ ἀπροίπη, Ρωμαῖοι κακιατρίκη, οἱ δέ, στάγω, οἱ δέ, ἁιμοβρεγία. Alii ἀνθρώπου.

G

Coc. ſolsticium.

Quid ſeptem fibrarum ceſtus ad dextra diſſimilis.

Vide cum ſit herba gallicum & alias dicta.

κούρβιτα ἄκανθα, Αφρὶ γαθουόνη. τοῦτο δὲ

lib.c. Σέρις,

Ⓐ δὲ, πικρίδα, Αἰγύπτιοι ἄγριον, Ρωμαῖοι ἄγριβουμ ἀγρέστεμ.

145.c. ἤμερος,

Ρωμαῖοι λακτοῦκα, Αἰγύπτιοι ἐμβεσί.

lib.c. Ἰδρίδαξ,

ὧν Πέρσαι αἷμα Τιτῆνος, Ζωροάστρης φέρουμβρες, Ρωμαῖοι λακτοῦκα συλβέστρις καλοῦσιν,

146.b. λεπίδιον,

Ρωμαῖοι βισακούτουμ, Αἰγύπτιοι δορυσαστρόν, Σύροι ἀδδεσί, Αφρὶ πεικτά.

lib.c. Σκανδυξ,

Ρωμαῖοι ἕρβα σκαναρία, οἱ δὲ, ἀκουκλαμ. lib.d. ἄγελον,

Ⓐ ὃ, καῦκον, οἱ δὲ, μυῖτις, Δημόκριτος βρύον, Ρωμαῖοι πέδεμ γαλλιναίκουμ, οἱ ὃ, πέδεμ πούλλι, Αἰγύπτιοι σέσελις.

lib.c. Ἐρύσιμον,

Ρωμαῖοι ὃ ἐρῦκαμ, Αἰγύπτιοι ἐθρεκικίν, Αφρὶ ἀσουρίκ.

147.d. Οφβάγχη,

Ⓐ δὲ, κυνομόριον, οἱ δὲ, λέοντα, Κύπριοι δὲ θυρσίνην καλοῦσιν, ὃ κοινῶς Λύκος ὀνομάζεται.

149.a. κεφαλωτὸν,

Ρωμαῖοι πόρρουμ.

lib.f. Κεφάμμυον,

Ⓐ δὲ, πολύειδος, Πέρσαι καλαβωτὶς, Ρωμαῖοι κέπαμ.

150 d. Σκόροδον,

Ⓐ δὲ, γήβοσκον, οἱ δὲ, ἐλαφόβοσκον, Ρωμαῖοι ἄλλιουμ.

151. c. νᾶπυ,

Ρωμαῖοι σίναπι.

142.d. Καρδαμον.

Ⓐ δὲ, κυνοκάρδαμον, οἱ δὲ, Ἴβηρις, οἱ ὃ, καρδαμαντικὸν, Αἰγύπτιοι σεμθ, Ρωμαῖοι νασούρκιουμ.

lib.g. Θλάσπι,

Ⓐ δὲ, θλασπίδιον, οἱ δὲ, σίναπι Περσικὸν, οἱ δὲ, σίναπι ἄγριον, οἱ δὲ, μυῖτλω, οἱ δὲ, μυόπτερον, οἱ δὲ, δασμοφῶν, οἱ ὃ, βίτρυν, Αἰγύπτιοι σουιτέμψον, Ρωμαῖοι σκαναperam, Aphri gathuonem. Eius autem &c.

De Seride.

Alij picrida appellant, Ægyptij agon, Romani intibum agrestem.

De Lactuca satiua.

Latini lactucam, Ægyptij embrosi vocant. Apul. lactucã leporinam.

De Lactuca syluestri.

Magi Titani sanguinem, Zoroastres pherumbrum, Romani lactucam syluestrem appellant.

De Gingidio.

Romani bisacutum, Ægyptii doryfastrum, Syri adorion, Aphri tiricta nominant.

De Scandyce.

Romanis herba scanaria, seu acicula nominatur.

De Caucalide.

Alij caucum, alij myitin, Democritus bryon, Romani pedem gallinaceum seu pulli pedẽ, Ægyptij seselin vocant.

De Eruca.

Romani erucam vocant, Ægyptij ethrecicen, Aphri asuric.

De Orobanche.

Alij cynomorion appellant, alij leonẽ, Cyprij thyrsinem: communiter autem lycos, *quasi lupus*, vocitatur. A canini generis similitudine. Latini lycoctonum, alij leontopodium.

De Porro.

Latinis porrum.

De Cepa.

Aliqui polyidos, Magi calabotin, Latini cepam nominant.

De Allio.

Alij geboscum, alij elaphoboscũ, *quasi pabulum cerui*, Romani allium vocant. Nam elaphoscorodon alliũ genus.

De Sinapi.

Latinis sinapi.

De Nasturtio.

Aliis cynocardamũ, aliis iberis, aliis cardamina seu cardamantica, Ægyptiis semeth, Latinis nasturtium dicitur.

De Thlaspi.

Alij thlaspidiũ, alij sinapi Persicũ, alij sinapi syluestre, alij myiten, alij myopterõ, alij dasmophõ, alij bitrũ, Ægyptij suitempsum, Romani scan-

dulaceum, alij capſellam aut pedem gallinaceum vocant.

A δουλάκιουμ, οἱ δέ, κάπελλα, οἱ δέ, πόδιον γαλλιναίκειον.

De Eryſimo.

Aliqui chamæplion, Magi Herculis alphita, *hoc eſt, polentam*, Ægyptij erethmu, Romani irionem vocant.

153. c. Ερύσιμον,

οἱ δέ, χαμαίπλιον, Περσῶται Ἡρακλέους ἄλφιτα, Αἰγύπτιοι ἐρυθμόν, Ρωμαῖοι ἐριόνεμ. al. ἐρυθμόν

De Struthio.

Ab aliquibus cerdon, ab aliis cathartis, ab aliis ſtruthiocamelus, à quibuſdam chamærrhytos, *quaſi humi ſparſa*, à Magis chaliryton, à Latinis lanaria radix ſeu herba, ab Ægyptiis œno, ab Aphris ſyris appellatur.

A *pergendis lanis.*

B

156. b. Στρούθιον,

Ⓦ ὃ, κίρδον, οἱ δέ, καθάρσιος, οἱ δέ, στρουθοκάμηλος, οἱ δέ, χαμαίῤῥυτον, Περσῶται χαλίρυτον, Ρωμαῖοι ῥάδιξ λαναρία, οἱ δέ, ἐρβαλάρεια, Αἰγύπτιοι οἰνώ, Αφροὶ συείς. al. καθαρσις

De cyclamino.

Aliqui cissanthemon, alij cissophyllon vocant, alij chelonion, alij ichthyotheran, Zoroastres chelonam ſeu triumphaliten, Oſthanes aſpho, Magi miaſpho, Ægyptij theske, Romani rapum terræ aut vmbilicum terræ, aut orbicularem.

ab hederaceis flore & folio.

Quid ſit vermendis & inſectandis pellibus idoneus.

C

οἱ δέ, χελώνειον, οἱ δέ, ἰχθυόθηρον, οἱ δέ, χελίνη, οἱ δ', Ζωροάστρις, ἢ τριμφαλίτης, Οσθάνης ἀσφώ, Γερφῆ μιασφώ, Αἰγύπτιοι θέσκε, Ρωμαῖοι ῥάπουμ τέρρας, οἱ δέ, ὀμβιλίκουμ τέρρας, οἱ δ', ὀρκύλ. al. ἰχθυόθηρον al. μιασφώ al. ὀρκύλ

Poſt caput de cyclamino altera.

Dracontium maius, alij aron, alij ariſarum, alij iarrum, alij hieracicum, alij biarum, alij aron agreſte, alij cyperida vocant. Romani colubrinam, alij ſauriariam, alij ſigingialiõ. Naſcitur in vmbroſis circa ſepes. Caulem habet læuem, rectum, propè bicubitalem & baculi craſſitudine, draconis inſtar verſicolorem & purpureis maculis abundè reſperſum: folia lapathi figura, mutuò implicita. Fructum ſummo caule producit racemoſum, colore primùm quidem cineraceo, ſed cùm ematuruit, ad croceum & puniceum vergente: radicem prægrandem, rotundam, candidam, tenui veſtitam cortice. Colligitur autem & ſuccus ex ea exprimitur dum fructus matureſcit, ſiccatúrque in vmbra. Radix quoque meſſibus effoditur, lotáque fruſtatim conciditur, & loro traiecta in vmbra ſiccatur. Vim autem habet excalfaciendi cum dilura vini potione. Succurrit ſeu toſta ſeu etiam elixa, ſi cum melle delingatur; orthopnoicis, ruptis, conuulſis, tuſſi atque deſtillationi.

ſimilis à lacertarum colore vario.

D

157. c. πολῖον.

Γερὶ δρακοντίας μεγάλης.

Δρακοντία μεγάλη, οἱ δέ, ἄρον, οἱ δέ, ἴσαρον, οἱ δέ, ἴαρον, οἱ δέ, ἱεράκιον, οἱ δέ, βίαρον, οἱ δέ, ἄρμα ἄγριον, οἱ δέ, κισσάριν, Ρωμαῖοι λουσουμίμ, οἱ δέ, μαυριαρίαμ, οἱ δέ, σιγιλιάλιον. φύεται εἰς συκαῖους καὶ φραγμοῖς. καυλὸν δὲ ἔχει λεῖον, ὀρθὸν, ὡς

E

διπηχυαῖον, καὶ παχὺ ὡς βακτηρίαν, ποικίλον κατὰ χρόαν ὡς ὄφεως δέρμα. lect. χρῶ

καὶ πλεονάζει μᾶλλον εἰς τοῖς ἀφ' ὑπερφύσεις ἀσίλους· φύλλα δὲ ὡς λαπαθοειδῆ, ἀλλὰ πεπλεγμένα· καρπὸν δὲ πολὺν ἐπ' ἄκρου τοῦ καυλοῦ ἔχοντα ὁμοῖον, σταφυλῆς πρὸς χρόαμα τὸ ὠχρόν. ἐν δὲ τῷ πεπανθῆναι χροΐζοντα καὶ φοινικοῦν· ῥίζαν μεγάλην, στρογγύλην, λευκὴν, φλοιὸν ἔχουσαν λεπτὸν, συλλέγεται δὲ καὶ χυλὸς ὅταν ὁ καρπὸς ὠχριᾷ, ἢ ξηραίνεται ἐν σκιᾷ.

F

ἡ δὲ ῥίζα ὀρύσσεται πυραμοῦσα, ἢ πλυθεῖσα κατατέμνεται, καὶ εἰς ἴρεσι μᾶλλον ἢ μάκη· ξηραίνεται δὲ ἐν σκιᾷ. ἁρμόττει δὲ ὄξει μὲν συγκράματος πινόμενον δὲ ὕδατι τι καὶ ἐφθὴ μᾶλλον μέλιτος ἐκλειχμένη, τοῖς ὀρθοπνοϊκοῖς, ῥήγμασι, σπασμοῖς, βῆχας, καταῤῥοαῖς.

V. cetera hanc periodo uſque ad σκιᾷ caret.

G

ποδῆσα δὲ μὴ εἶναι, ἵνα ὅτι σπερμοῦσαι ὁρμὰς κινεῖ καὶ χαίρει ὑπὸ σὺν μέλιτι λεανθῆσα ἢ ὅτι πλατεῖα ἵνα καὶ κηκεὶ ἢ τὰ ἕλκη, καὶ φαγεδαινικὰς μὴ λευκῆς ἀμπέλου μάλιστα. καὶ κολλύρια δὲ ἐξ αὐτῆς σὺν μέλιτι, καὶ ἐκ συείσας ἀναπλάττεται καὶ ἐμβρύων χωρίων. ποιεῖ δὲ καὶ πρὸς ἀλφοὺς σὺν μέλιτι καταχριόμενα. πολύποδας δὲ καὶ καρκινώματα δαπανᾷ. ποιεῖ δὲ ὁ χυλὸς αὐτῆς καὶ εἰς ὀφθαλμικὰ, καὶ πρὸς νεφέλια, λευκώματα, ἀχλύας. ἡ δὲ ὀσμὴ τῆς ῥίζης καὶ τῆς πόας, τὸν ἄρτι σπερμηλιθμένον φθείρειν ὅτι· καὶ τὸν καρπὸν λέγουσι πολῖται μετ' ὄξους πίνειν. ἔνιοι δὲ τῷ χυλῷ τοῦ πόου καὶ τοῦ ὠῴου λιπαρώτερα ἐπιχρίσαντες μὴ ἐλαίου. τὰ φύλλα δὲ ὡς σύφορα τοῖς νεοτρώτοις ὑπέθεσαν· ἐψηθέντα δὲ ἐν οἴνῳ καὶ τοῖς χίμετλα ἔχουσι. φασὶ δὲ καὶ τὸν ὄφιν φεύγειν αὐτὰ τὴν χροιὰν, ἢ τὴν ῥίζαν αἰσθανόμενον, ὑπὸ ἔχεως μὴ δάκνεσθαι. 159.b. Λούφα,

A pota verò ex vino, impetus ad Venerem concitat: vlcera maligna & & phagedænica cum melle trita & impolita expurgat, maximéque cũ vite alba. Ex ea quoque cum melle collyria efformantur ad fiſtulas extrahendósque partus: facit & ad vitiligines cũ melle illita: polypos verò & carcinomata abſumit. Vtilis & ipſius ſuccus oculorum medicamẽtis, contra nubeculas, albugines & caliginem. Porrò tum radicis tum & herbæ odor, recens conceptos fœtus in vtero enecat & abigit, æquè ac tricenã ſeminis grana, ſi in poſca bibantur. Sunt & qui ex eodem ſemine expreſſum ſuccum eum oleo dolore aurium infeſtatis infuderint: quin & folia, quippe quæ aſtringant, recentibus vulneribus impoſuerint; eadémque cocta in vino pernionibus adhibuerint. Sed & aiunt, qui folia manibus confricuerint, aut radicem ipſam effoſſam geſtent, neutiquam à vipera morderi.

De aro.

Ἄλλοι ἄλιμον, οἱ δὲ θύμον, οἱ δὲ δρακοντίαν, ὃ οἱ Κύπριοι καὶ κολοκάσιον λέγουσι. 159.b. Ἀσφόδελος,

Aliqui alimon, alii thymon vocant. Sunt & qui dracontium, quod Cyprii etiam colocaſium dicunt.

De aſphodelo.

ἄλλοι δὲ ἀνθήριον, Ῥωμαῖοι ἀβούκιμον. 160.d. κοιλίαν.

Alii anthericum, Romani albucum vocant.

Ad calcem eiuſdem capitis.

Ἀνθεῖ δὲ ὁ πυρομηνῷ. χρῶνται δὲ τῇ λευκῇ ἀσφοδέλῳ τιμιωτέρᾳ τῆς ἰσημερίαν ὀφθείσης, πρὸ τοῦ καρποῦ αὐξηθῆναι. τὴν δὲ ῥίζαν πινομένην, αἱροῦσι φασὶ ποιεῖν πρὸς ἀφροδισίαν. καὶ Κρατεύας ὁ ῥιζοτόμος τὰ αὐτὰ εἶπε. καὶ ὅτι θερμαίνει ἡ ῥίζα πινομένη μετ' οἴνου δραχμῆς βάρος πεδάγρας ἀγρίμασα. 161.b. Ὑδρόδες.

Floret autẽ meſſis tempore. Sed Aſphodelus albus circa æquinoctiũ vernum demetẽdus, antequàm ſemẽ augeſcat. Radicem verò potam Veneris appetentiã inhibere aiunt. Idipſum Crateuas herbarius aſſeuerat, prætereáque ſanare podagræ dolores, ſi drachmæ pondere cum vino bibatur.

Ad calcem capitis de bulbo eſculento.

Ἑφθὸς δὲ σὺν ἠφίοις καὶ σταφιδοχειρίῳ παρεσκευάσθεις, οἰδήματα καὶ φύματα σκληρύνει καὶ πέπτει καὶ διαῤῥήγνυσι.

Coctus cum polenta bulbus & adipe ſuſillo addito impoſitus, tumores ac tubercula ocyſſimè ad ſuppurationem perducit ac rumpit.

De Cappari.

162.c. Κάπαρις,

οἱ δὲ, κυνόσβατος, οἱ δὲ, καπαρία, οἱ δὲ, χήραγος μᾶλλον, οἱ δὲ, ὀφιόσκορδον, οἱ δὲ, φυλλοσάφυλλον, οἱ δὲ, θαλλίαν, οἱ δὲ, πετραίαν, οἱ δὲ, ὁλόφυτον, οἱ δὲ, ἰωνίτην, οἱ δὲ, ὀλιγόχλωρον, οἱ δὲ, αἰπίνην, οἱ δὲ, ἱπποφαεῖς, οἱ δὲ, τριχομανές, Περσῖνα πότιον, οἱ δὲ,

Aliqui cynoſbatũ, *quaſi canis ſentẽ*, alii captiã appellãt, alii corui malũ, alii ophioſcorodõ, alii ophioſtaphylen, *quaſi vuam ſerpentariam* alii thallian, alii petræam, alii holophyton, alii ionitem, nonnulli oligochlorõ. Sũt qui acontũ, qui hippomanes, q trichomanes. Magi potera ſeu peuterõ,

al. ὁ καὶ φασιανὸν ἢ παρὰ τοῖς Κυπρίοις καὶ κολοκάσιον λέγουσι.

V. legit Gaſſer.

Forte ἰωνιτὴν ὀλίγον ex Pl.

Ald. αἰπίνην.

alij cor lupi, alij haloſcorodó, alii lilium, alii thlaſpin: Romani ſinapi Perſicum ſeu inturin, Afri herbiæthuin.

De Anemone.

Anemonem alii ſylueſtrem, alii nigram, alii punicea cognominant. Sunt qui anemion vocent, alii meconium, alii tragocerota, alii geſparinem, alii barbylem. Oſthanes berylium, ſimiliter & ornioſceranion, Pythagoras atractylida, Magi enicum agreſté, Romani orci tunicam, Afri chuffis.

De Argemone.

Aliquibus œnone vocatur, aliis anthemis, aliis homonoia, *quaſi concordia* aliis flos campeſtris, Romanis liburnia ſeu concordialis aut pergalia, Gallis corona.

Ad calcem eiuſdem capitis:

Eiuſdem, vti Crateuas herbarius autor eſt, herba contuſa cum axungia, ſtrumas diſcutit. Facit & ad vitiligines, cum nitro & ſulphure ignis experte ſicca tuſa & cribrata. Sed ius qui ea vtũtur, prius in balneo ſiccam frictionem adhibitã oportet. Eſt & contra ſcabiem efficax.

De altera Argemone.

Alteram Argemonem quidá artemonem, alii arſelam ſeu ſarcocollam, Romani argemoniam vocant. Et ea quidem foliis ſylueſtri papaueri ſimilis eſt. Vim habet hæc viridis ad læuorem trita & impoſita, inciſuras ſanãdi & oculorum inflammationes mitigandi: dyſentericis quoque pota cum aqua auxiliatur: Sed & vulnera conglutinat, & inflammationibus eſt vtilis. Similiter impoſita, conuulſionibus & vellicationibus medetur. Vtiliter denique contra virulẽtarum beſtiarum morſus ex vino bibitur.

De anagallide.

Anagallidem puniceam, alii aëritim vocant, alii augitin, alii ſauritin, Magi oculi ſanguinem, alii chelidonion, Romani maciam, Het ruſci maſitipos, Galli ſapana, Daci cerceraphrõ. Anagallidem verò communem alii corchoron nominant, alii halicacabũ, alii zehauroni, Magi nyſteritin, Ægyptii micii, Romani meciaton, Aphri aſirthizi.

A πύτιεσι, οἱ δ', καρδιαλίκυ, οἱ δ', ἡσυχὴρ δον, οἱ δ', χρίνοι, οἱ δ', θλάσπιν, Ῥωμαῖοι οἰ- V. non legunt
ραπὶ Γέρακλμ, οἱ δ', ἴτυρος, Αφεσὶ ἐρ- Ald. ἰτυρός
ειμάδουμ. 164. c. Ανεμώνη,

Ⓤ δὲ, ἀγελαῖα, οἱ δ', μέλαιναν καλοῦσι. τὴν δ' αἱεμόνη, ἡ φοινικῆ, οἱ δ', πτέμιον, οἱ δ', μη- Marcellus omissa legit
κώνειον, οἱ δὲ, τραγόκερως, οἱ δ', γῆ παεῖτη,
B οἱ δ', βαρβύλη. Οσθάνης βηρυλλιος. ὁμοίως ὄρνιος κεράνιος, Πυθαγόρας ἀτρακτυλὶς, Γεσφῆται κρίκος ἀγρία. Ῥωμαῖοι ὄρκι τωνίκαμ, Αφεσὶ χοφφοις.

165. c. Αργεμώνη,

Ⓤ δὲ, οἰνώνη, οἱ δ', αἰθεμὶς, οἱ δ', ὁμόνοια, οἱ δὲ, αὖλος πεδινὸς, Ῥωμαῖοι λιβορνία, οἱ Ald. μόνοια
C δὲ, κεγχορδχάλις, οἱ δὲ, περγαλία, Γάλλοι κόρνα.

Ib. c. καταπλασμάτων.

Κραταιὰς ῥιζοτομικὸς εἰς τὸ αἰτ. ἀργεμώνη. αὕτη ἡ βοτάνη κοπεῖσα μετ ὄξυγγίου, χοιράδας διαλύει. ποιεῖ δὲ καὶ εἰς ὑγροὺς, μετ ὑείου δὲ καὶ ἀσπάλθου ξηρὰ κο- quid. addit μόνιας.
D πεῖσα, καὶ σηθεῖσα. ὁ δὲ βαλανεὶφ δὲ τὸν χρωμένους θεραπεύει. καὶ ἐξηρασμένη δὲ καὶ ἐπιτεθεῖσα. ποιεῖ καὶ εἰς ψώραν. al. ἐπιτεθεῖσα

Περὶ ἑτέρας Αργεμώνης.

Αργεμώνη ἑτέρα, οἱ δὲ, ἀρτεμώνη, οἱ δὲ, ἄρσελαν, οἱ δ', σαρκοκόλλα. Ῥωμαῖοι ἀρτεμώνιαν, ἣν αὕτη πρόσφατος μὲν αἰρίᾳ μίκω-
E σι τοῖς φύλλοις. Δύναμιν δ' ἔχει αὕτη χλωρὰ τετριμμένη λεία καὶ ὅπου τι δεῖται ἀργεμώνης θεραπεύειν, καὶ ὀφθαλμῶν φλεγμονὰς παύειν, ἁρμόζει καὶ δυσεντερικοῖς Marc. vt ego de siderata punctis, & præfectionem nervorum cõuertit.
σὺν ὕδατι πινόμενη. κολλητικὴ δὲ τραυμάτων καὶ φλεγμονῶν ὅστις οὖν τοσοῦτον ὅσον τρεῖς κόκκους ἀσπάλαθου ξηροῦ καὶ πλυμάτων ὅστις θεραπευτικὴ. ἁρμόζει δὲ καὶ θηλυδρύτοις σὺν οἴνῳ πινομένη.

Ib. c. Αναγαλλίδος.

Ἀνάγαλλις ἡ φοινικῆ, οἱ δὲ, αἰεξῖτις, οἱ δὲ, αἰγῖτις, οἱ δὲ, ἀσυξῖτις, Περσῶται αἷμα Ald. συξῖτις
ὀφθαλμοῦ, οἱ δ', χελιδόνιον, Ῥωμαῖοι μαχία, Θρῆικες μασιπίπως, Γάλλοι σαπάνια, Δακοὶ χρυσεοφρύη. ἀναγαλλὶς ἡ καινὴ, οἱ δ', χάρτεσι, οἱ δ', ἡμικάκαβον, οἱ δ', ζηλίανες, Γεσφῆται κυκτεῖτις, Αἰγύπτιοι μικιεὶ, Ῥωμαῖοι μεκιάτον, Αφεσὶ ἀσίρριζι.

166.a. κίσσος,

forte κίσσαρος

Ⓐ δὲ, κίσσαρος, οἱ δὲ, κίσσαρος, οἱ δὲ, χρυσόκαρπος, οἱ δὲ, ποιητική, οἱ δὲ, κορυμβήθρα, οἱ δὲ, κίσσιον, οἱ δὲ, Διονύσιον, οἱ δὲ, ἰθυφάλλιον, οἱ δὲ, Πέρσις, οἱ δὲ, κῆμος, οἱ δὲ, ἄσπληνος, Ῥωμαῖοι σίλβα μάτηρ, οἱ δὲ, ἕδερα, Γάλλοι σουβίτης.

Theoph. κορυμβώδης dicitur.

forte, ἰφύδρειον ex Plinio

De Hedera.

Quibusdam cissaros, seu cittaros, aliis chrysocarpos, aliis poëtica, aliis corymbias, aliis cission *quasi hederula*, aliis Dionysia, quasi bacchica, aliis erythranon, aliis Persis, aliis cemos, aliis asplenos, Romanis sylvæ mater, seu hedera, Gallis subites.

ab aurea aliarum colore. Quod reperta alium coronarentur.

167.a. μέγα.

Ⓐ δὲ, παιονία, οἱ δὲ, κραταιά, οἱ δὲ, ἀσύβιος, οἱ δὲ, γλαύκιος, οἱ δὲ, Παίδιος ῥίζα, οἱ δὲ, φιλομήδειον, οἱ δὲ, ὀθόνιον, Ῥωμαῖοι Φάβιουμ, Γάλλοι θώνα, Αἰγύπτιοι μοθθ, Δακοὶ κρουστάν.

De Chelidonia maiore.

Quidam pæoniam vocat, alij crateam; *quasi egregiæ pollentem viribus*, alij aubion, alij glaucion, alij Pandionis radicem, alij philomedion, alij othoniõ, Romani fabium, Galli thona, Ægyptij mothoth, Daci crustane.

168.a. κεφαλῆς.

ὁμοίως καὶ τὸ τούτης ἀφέψημα σὺν μέλιτι ἀναγαργαριζόμενον, κεφαλὴν καθαίρει ῥηϊδίως καὶ πόνους τοὺς ἐν τῷ στόματος.

Ad calcem cap. de Chelidonia minore.

Similiter & huius decoctum cum melle gargarizatum, strenuè caput cunctáque pectoris vitia purgat.

Ib.c. Μυὸς ὠτὸς.

Ⓐ δὲ, μύωτον, οἱ δὲ, ἀνθύλλιον, οἱ δὲ, ἀλσίνην, οἱ δὲ, μυόρτοχον, οἱ δὲ, μυρτόσπληνον, Ῥωμαῖοι μυόδεις ἀξίνουλαν, Ἀφροὶ λαβαθολαβάτ.

De Myosotide.

Aliqui myoton, alij anthyllion, alij alsinen, alij myortochõ, alij myrtosplenõ, Romani muris auriculam vocant, Aphri labatholabat.

Reliqua quæ deinde legebantur in vulg. exempl. hinc expunximus, quia totidē verbis habētur lib. 4. cap. 87.

169.a. ἥμερος.

Ⓐ δὲ, αὔγιον, οἱ δὲ, ἔγνη, Γερμανοὶ ἀγρύσιον, Ῥωμαῖοι ῥοῦβιαμ.

De Isatide satiua.

Satiuam Isatin quidam augion, alij egnen vocat, Magi arusium, Romani luteam.

Ib.c. ἀγρία.

Ⓐ δὲ, ἔγνη μικρά, Ῥωμαῖοι ῥοῦβια μικρόν.

De Isatide sylvestri.

Sylvestrem Isatin quidam egnen paruam vocant, Romani luteam minorem.

Ib.d. καταπλασμὸν.

Ἐπιστατέον τὰ περὶ Ἰσάτεων, ὅτι αἱ ἐκδόσεις αὐτῶν τὸ ἐσφαλμένον ἔχουσι. τὸ, τε γὰρ μέλινον αὖθος καὶ τὸν λεπτοτέρους καὶ πολυσχιδεῖς κλάδους καὶ τὰ ἐξ ἄκρου γλωσσειδῆ φυλάκια, ἐν οἷς τὸ σπέρμα, ἡ ἥμερος φέρει. ἐμπεδεύεται δὲ τοῖς σπέρμα μέλαν ἐοικὸς μελαντίῳ, καὶ Ⓐ καυλὸν δὲ οὐχ ὑπὲρ δίπηχυν, ἀλλ' οὐχ ὑπὲρ πῆχυ μόνον φέρει· ἡ δὲ ἀγρία, μελαντέρα τούτης τὰ φύλλα φέρει, καὶ καυλὸν ἐλάττω καὶ παχύτερον. αὖθος τὲ ἐμπόρφυρον ἢ κυανοειδῆ, καὶ καρπὸν σαυρειδῆ, πεπαχυ, ἐν οἷς τὸ σπέρμα φυλλαρίοις μικροῖς αἰεὶ πέντε ἴσοις, οἱονεὶ διειλημμένον.

Ad capitis eiusdem calcem:

Sciendum Isatidis vtriusque descriptiones erroneas esse. Siquidem satiua Isatis luteum fert florem, & tenuiores ac multifidos ramulos: folliculos verò in cacumine linguarum figura, in quibus semina. In his porrò semen continetur nigrum, melanthio simile. Sed & caulis non vnicum cubitum, imò vero duos altitudine superat. Sylvestris autem nigriora quam hæc folia profert, & caulem minorem atque crassiorem: florem purpureum, aut cæruleum, fructum cruciformem, asperum, in quo semen foliolis exiguis quinis, iisque æqualibus, quasi discretum distinctúmve.

forte ὡς.

De Telephio.

Quibusdam semperuiuum syluestre: sunt & qui hanc ipsam portulacam syluestrem appellant, Romani illecebram, Ægyptij anoth, Aphri atirtopurin.

De Rha.

Aliqui rhiam, Romani Rha Ponticum vocant.

De Gentiana.

Ab insigni amaritudine, quæ alioës insignis præsidia est.

Aliqui radicem centauream, alij aloën Gallicam, alij narcen, alij chironium, Dardani aloëtin, Romani Gentianam seu cicendiam, alij cyminalem vocant.

De aristolochia longa.

A fructu mali figuram referente.

Quidam melocarpum, alij texinũ, Romani herbam aristolochiam vocant.

Ad calcem cap. de aristol. clematitide:

Vocatur & hæchadrariza, *quasi crassiusculi radix*, & melocarpum & Ephesia, & tocites, & pyxionyx, Dardanis iontitis. Galli eãdem vocant theximon, Ægyptij sophoeph, Siculi chamæmelum, Itali terramalum, Daci absinthium rusticum: Nascitur locis montosis & calidis, iisque planis, aut etiam asperis & petrosis. Ad grauem febrim ita efficax est, vt si ipsius iniectæ carbonibus nidore febricitans suffiatur, febris desinat. Vulnera impositione sanat. Cum cypero, dracunculi semine ac melle, narium carcinomatis auxiliatur: rigoribus medetur cocta in oleo aut adipe suillo, illitáque. Eadem tum Crateuas herbarius tum Gallus de ipsa prodiderunt, insupérque eam podagricis opitulari.

De Glycyrrhiza.

A dulcedine amabili. A planta dulcedine. Quid sibi mel erat. A monte Thessaliæ Chironi habitato. Ab amaritudine Chironis Centauro. Sic ferũ centaurum dixit Lucretius. Vide Turneb. in adversar. Propter amœnitudinem fontium.

Aliqui Ponticam cognominant, alij glycerató vocant, alij symphyton, alij leonticam, alij glycyphytõ, alij Scythicã radicem: alij adipson. Sũt & qui sylithrá, qui libyestason, qui homœnomœá, q̃ pœthaomœon: Latini dulcẽ radicẽ appellauêre.

De Centaurio maiore.

Aliqui limnesion seu limnitin *quasi palustrem*, alij maroniam, alij Pelethroniá, alij Chironiá, vocãt. Magi Herculis sanguinem, Romani ferum, seu vuam feram, seu fel terræ.

Ib. d. Τηλέφιον.

Ⓓ δέ, ἀείζωον ἄγριον, οἱ δέ, καὶ ταύτην αἰσθράχλιν ἀγρίαν καλοῦσι, Ρωμαῖοι ἰλλεκίβραν, Αἰγύπτιοι ἀνώθ, Ἀφροὶ ἀτιρτοπυρίν.

171. d. Ρᾶ.

Ⓓ δέ, ῥίζαν Ρωμαῖοι Ρᾶ Πόντικουμ.

172. b. Γεντιανή.

Ⓓ δέ, κενταύρειος ῥίζα, οἱ δέ, ἀλόη Γαλλική, οἱ δέ, νάρκη, οἱ δέ, Χειρώνειον, Δαρδάνιοι ἀλόητις, Ρωμαῖοι ἔμουλοι, οἱ δέ, κικένδια, οἱ δέ, κυμινάλις.

Pro. κύμινον.

173. b. Δακτυλίτης.

Ⓓ δέ, μηλόκαρπον, οἱ δέ, τεύξινον, Ρωμαῖοι ἕρβα ἀριστολόχια.

174. a. Καρδιρριδῶν.

Καλεῖται δὲ αὕτη καὶ ἀραιέζα καὶ μελεκάσσουμ, καὶ Ἐφέσιος, καὶ λεξῖτις, ἢ πυξιόνυξ, καὶ Δάρδανον, ἢ ἰοντῖτις. Γάλλοι δὲ κελοῦσιν αὐτὸν θεξίμον, Αἰγύπτιοι δὲ σοφοίφ, Σικελοὶ δὲ χαμαίμηλον, Ἰταλοὶ τερρὰ μάλα. Δακοὶ ἀψίνθιον χωρικόν. γίνεται εἰς τόποις ὀρεινοῖς, καὶ θερμοῖς. καὶ ὁμαλοῖς, ἢ τραχέσι καὶ πετρώδεσι. πίνει δὲ πρὸς πυρετὸν βαρὺν οὕτως. ἀριστολοχίαν ἑτοῦ αἰθράκων καὶ πίσσου Ⓓ πυρέσσοντα, καὶ παυθήσεται ὁ πυρετὸς· τραύματα ὀπὶ πλασσόμενα ἰᾶται. μετὰ δὲ κυπείρου ἢ δραχοντίου σπέρματος ἢ μέλιτος, τοῖς ἐρυσιπελατώδεσι βοηθεῖ μετ' ἐλαίου ἢ πιθήκου λίπους ἐψηθεῖσα, ῥίζη συγχριομένη ἐξανθήμασι. ἢ Κρατεύας ὁ ῥιζοτόμος ἢ Γάλλος ἢ αὐτὰ περὶ αὐτῆς εἰρήκασι, καὶ ὅτι τοῖς ποδαγρικοῖς ὠφελεῖ.

Malum punicum à partu nuncupato.

174. a. Γλυκύῤῥιζα.

Ⓓ δέ, Ποντική, οἱ δέ, γλυκύσφαιτον, οἱ δέ, σύμφυτον, οἱ δέ, λεόντικα, οἱ δέ, Γλυκύφυτον, οἱ δέ, Σκύθιον, οἱ δέ, ἄδιψον, οἱ δέ, συλίθρα, οἱ δέ, λιβυέστασον, οἱ δέ, ὁμοιόμοιος, οἱ δέ, πενθαόμοιος, Ρωμαῖοι δούλκις ῥάδιξ.

Ib. c. πάρκλα.

Ⓓ δέ, λιμνήσιον, οἱ δέ, μαρώνιον, οἱ δέ, Πληθρονιάς, οἱ δέ, Χειρωνιάς, οἱ δέ, λίμνησις, Ἡρακλέους αἷμα, Ρωμαῖοι φιέρρι, οἱ δέ, σύνφεραν, οἱ δέ, φελτέραν.

175.d. μικρόν,

Ⓐ δέ, λιμνήσιον, οἱ δέ, ἑλλεβορίτης, οἱ δέ, ἀμαράντινον, Ἡρακλέους αἷμα, Ῥωμαῖοι φυγιφυγάμι, οἱ δέ, αὐξημοῦλτι ράδιξ, Δακοὶ τουλβηλά.

176.d. λευκός,

Ⓐ δέ, χρυσόσκηπτρον, οἱ δέ, ἰξίαν, Ῥωμαῖοι κάρδουον ἄγριον, Αἰγύπτιοι ἔφηρ, οἱ δέ, ἐφθόσεχον.

177.a. μέλας.

Ⓐ δέ, πάγκαρπον, οἱ δέ, οὐλόφωνα, οἱ δέ, ἰξίαν, οἱ δέ, κυνόμαζον, οἱ δέ, ὠκιμοειδές, οἱ δέ, Κνίδιον κόκκον, οἱ δέ, κυνόζυλον, Ῥωμαῖοι κάρδους νίγρα, οἱ δέ, οὐερνιλαγώ, Αἰγύπτιοι σοβέλ.

Ib.g. Δίψακος,

Ⓐ δέ, χροκοδίλιον, οἱ δέ, χαμαιλέοντα, οἱ δέ, ὀνοκάρδιον, οἱ δέ, Ἀφροδίτης λουτρόν, Ῥωμαῖοι λάβρουμ Βένερις, οἱ δέ, κάρδουμ Βένερις, Αἰγύπτιοι στοιτιόρ, οἱ δέ, χείρ, οἱ δέ, μελήτα, Δακοὶ σκιαρή.

178.d. λευκή,

Ⓐ δέ, ἀγγειοκαμψίαν, οἱ δέ, δονακῖτις, οἱ δέ, ἐρυσίσκηπτρον, Ῥωμαῖοι σπῖνα ἄλβα, οἱ δέ, ῥήγια, οἱ δέ, κάρδους βαμπτάριον.

Ib.f. Ἀραβική,

Ⓐ δέ, ἀκάνθιον, Ῥωμαῖοι σπῖνα.

179.a. Σκόλυμος,

Ⓐ δέ, φέρουσα, οἱ δέ, πυρακάνθη, Ῥωμαῖοι στρόβουλον, Αἰγύπτιοι χοῦν.

Ib.b. Ποτήριον,

Ald. κρωδον. Ⓐ δέ, φρύνιον, οἱ δέ, ἀκίδωτον.

Ib.f. ἐρπάκανθα,

Ⓐ δέ, μελάμφυλλον, οἱ δέ, παιδέρωτα, οἱ δέ, ἀκανθοπόπια, οἱ δέ, μαμμαλάρια, οἱ δέ, κραίπουλα. 180.b. Ἀκάνθης

Ἀκάνθα ἀγρία, λεῖ Ῥωμαῖοι σπῖνα ἀγρέστις.

Ib.c. Λευκάκανθα,

Ⓐ δέ, πολυγόναιον, οἱ δέ, φύλλον, οἱ δέ, ἰσχιάδα καλοῦσι, Ῥωμαῖοι γνιακάρδους, Θοῦσκοι σπῖνα ἄλβα.

181.c. Ηρύγγιον.

Ⓐ δέ, ἠρύγγιαν, οἱ δέ, ἐρυσῆες, οἱ δέ, κάρφον, οἱ δέ, γοργόνιον, οἱ δέ, ἕρμιον, οἱ δέ, ὀρίγανον χλωρόν, οἱ δέ, μυρακάνθου, οἱ δέ,

De Centaurio minore.

A Quidam limneſion, alij helleboriten, alij amarantō, Magi Herculis ſanguinem, Romani febrifugá, alij herbam multiradicē, Daci tulbela. *Pl. libadinum, quòd propter fauces auferat.*

De Chamæleone albo.

Quibuſdam chryſiſceptron, aliis ixias, Romanis carduus varius, Æ- *Apul. scyphopetrum.*
B gyptiis epher ſeu ephthoſechin.

De Chamæleone nigro.

Pancarpon aliqui, alij ˚vlophonō, alij ixiam, alij cynomazon, alij ocimoides, alij granum Gnidium, alij cynozolon, Latini carduum nigrum, ſeu vernilaginem, Ægyptij ſobel vocant. *Quòd victimos tantū necet, tumentes quoque angina modo pectunt. Sic Vlpianus, ab odoris grauitate.*

De Dipſaco.

C Aliqui crocodilium appellāt, alij chamæleonem, alij onocardiū, *quaſi carduum aſininum*, alij Veneris lauacrum, Romani labrum Veneris ſeu carduū Veneris, Ægyptij ſeſeneor, alij chir, alij meleta, Daci ſciare. *Aut cor aſininum.*

De ſpina alba.

Aliqui ſylueſtrē cinarā, alij donaD citin, *quaſi arundinaceam*, alij eryſiſceptrō, Romani ſpinam albam ſeu regiam, alij carduum ramptarium.

De ſpina Arabica.

Quibuſdam acanthis, Latinis ſpina dicitur.

De Scolymo.

Aliis ferula, quibuſdam pyxacanE tha, Romanis ſtrobilus, Ægyptiis chinus.

De Poterio.

Aliqui phrynion, alij acidotum, *quaſi cuſpidatum ſeu aculeatum.*

De Acantho.

Aliqui ˚ melamphyllon, alij pęde- *A nigro folio.*
rota vocant, alij acanthum topiariā, alij marmorariam, alij craepulam.
F

De Acantha ſylueſtri.

Acantha ſylueſtris, quam Latini ſpinam agreſtem vocant.

De Leucacantha.

Quidam polygonatum, alij phyllō, alij iſchiada vocāt, Romani gniacardum, Hetruſci ſpinam albam.

De Eryngio.

G Aliqui eryngen, alij eryngerin, alij carvon, alij ˚ gorgonium, alij *A capitis malo titudine.*
˚ hermium, alij origanum ˚ clu- *Quidam Mar. cellum Mar. origanū*
nium, alij myracanthum, alij mo-

lij, Ægyptij crobyſon, Magi ſiſerbō, Romani capitulum cardui, alij carterę, Daci ſicupnoex, Hiſpani centū capita, Aphri cherdam, alii orian chloen, *quaſi montanam herbam*, alii chida appellant.

De aloë.

Quid ſit mandrago in terra, ſed & extra eā virtutē habens.

Aliquibus amphibiō, aliis eryngium, aliis herminium, aliis tragoceros, Romanis aloë, Barbaris itidē aloë dicitur.

Quod ſolis hominum cornua reſumant.

De abſinthio.

Ægyptij ſomi, Latini abſinthium ruſticum vocant.

De abſinthio marino.

Sunt qui Sādonicē, ſunt qui ſeriphum; Romani Santonicum vocāt.

De Abrotono.

Aliqui abutonō, alii abſinthium, alii heraclion, alii cholopœon, *quaſi bilem gignens*, alii thelyphthorion, alii abſinthiomenon, alii procampylon; Magi palmæ nervos, alii cynanchiten, Romani abſinthium Ponticum, nonnulli thelythamnon, *quaſi ſemineum fruticem*, alii glycyn ancona, *quaſi dulcem cubitum*, vocant.

De hyſſopo.

Latini hyſſopum, alii later, alii caſſialam, Ægyptii peſalem.

De Stœchade.

Aliqui ſyncliopa, alii Alcibiadē, alii panerarion, alii ſtyphoniam, Ægyptii ſuphlo, Magi Pythonis oculum, Romani ſciolebinam vocant.

De pulegio.

Quibuſdam blechon, aliis arſenicanthum, Romanis polium, Aphris apuleium, Gallis albolon, aliis galleſopſis.

De Dictamno.

Quid à Dictamno ſatisfacere obſtetrices in iis mandēdo partubus vitium oſſe diſcutiant.

Aliqui embactrō, alii beloacum, *quaſi telorum remedium*, alii artemideion, alii Creticā, alii ephemeron, alii heldian, alii belotocō, alii dorcadiū, alii helbunium, Romani vſtilaginem ruſticam appellant.

Quod hirundinis nidi quo pertecti ſunt eius herba poſſint excitari.

De ſalaria.

Aliqui cioſmin, alii phagnon, alii bechion, Ægyptij anuſi, Romani tuſſilaginē, cor ſaluium ſeu ſalaiam vocant.

De mentha ſatiua.

A μῶλυ, Αἰγύπτιοι κρόμμυον, Πέρσαι σίσυμβρος, Ρωμαῖοι καπίτουλουμ μάρδους, οἱ δέ, καρτεραί, Δάκοι σικουπροεξ, Ἰβηρες κεντοῦ κεφαλή, Ἀφροὶ χερδάν, οἱ δέ, ὀρίγανον χλόην, οἱ δὲ χιδά.

Ib.f. Ἀλόη.

B Ⓐ δέ, ἀμφίβιον, οἱ δέ, ἠρύγγιον, οἱ δέ, ἔρμινον, οἱ δέ, τραγόκερως, Ρωμαῖοι ἀλόαμ, παρὰ δὲ Βαρβάροις ἀλοέ.

183.b. Ἀψίνθιον,

Αἰγύπτιοι σόμι, Ρωμαῖοι ἀψίνθιουμ ῥούστικουμ.

184.c. Θαλάσσιον,

Ⓐ δέ, Σαντονίκιν καλοῦσιν, οἱ δέ, σήριφον, Ρωμαῖοι Σαντόνικουμ.

Ib.f. Ἀβρότονον,

C Ⓐ δέ, ἀβουτόνιον, οἱ δέ, ἀψίνθιον, οἱ δέ, ἡράκλειον, οἱ δέ, χολοποιόν, οἱ δέ, θηλυφθόριον, οἱ δέ, ἀψινθόμενον, οἱ δέ, προκάμπυλον, Μάγοι φοίνικος νεῦρα φοίνικος, οἱ δέ, κυναγχίτην, Ρωμαῖοι ἀψίνθιον Πόντικουμ. τινὲς δὲ αὐτὸ θηλύθαμνον, οἱ δέ, γλυκὺ ἀγκῶνα καλοῦσιν.

185.d. Ὑσσωπος,

Ρωμαῖοι ἰσσώπουμ, οἱ δέ, λάτερ, οἱ δέ, καταίαλα, Αἰγύπτιοι πεσάλεμ.

186.a. Στοιχάς,

D Ⓐ δέ, συγκλίοπα, οἱ δέ, Ἀλκιβιάδης, οἱ δέ, παγκράτιον, οἱ δέ, συφωνίαν, Αἰγύπτιοι σουφλῶ, Πέρσαι ὀφθαλμὸς Πύθωνος, Ρωμαῖοι σκιολιβίνα.

187.c. Γλήχων,

E Ⓐ δέ, βλῆχον, οἱ δέ, ἀροτήκανθον, Ρωμαῖοι πολείουμ, Ἀφροὶ ἀπολείουμ, Γάλλοι ἀλβόλον, οἱ δέ, χαλίσφις.

188.b. ἀγεία,

Ⓐ δέ ἐλβάκην, οἱ δέ, βελούακος, οἱ δέ, ἀρτεμεδίον, οἱ δέ, Κρητική, οἱ δέ, ἐφήμερον, οἱ δέ, ἑλδίαν, οἱ δέ, βελοτόκος, οἱ δέ, δορκίδιον, οἱ δέ, ἑλβούνιον, Ρωμαῖοι οὐστιλάγω ῥούστικα.

Ald. Ἰμβακῆν.

forte. τὰ ἀπὸ Ida monte.

forte ἐλβίνιον, ſeu ἰαβίνιον.

V. addas οἱ δέ.

189.b. σφάγνον,

Ⓐ δέ, κόσμιν, οἱ δέ, φάγνον, Αἰγύπτιοι βήχιον, Ρωμαῖοι ἀπουσί, οἱ δέ, κόσμαλον, οἱ δέ, σάλβια. Ib.d. μάνθον,

Ρωμαῖοι μέντα, οἱ δὲ, πέπλαμ, Αἰγύπτιοι τις, οἱ δὲ, φερθουμερθρουμονθύ, οἱ δὲ, περξώ, οἱ δὲ, μακηθώ.

190.a. Ηδύοσμον.

ὃ Ρωμαῖοι μεντάστρουμ καλοῦσι.

Ib.f. Θύμος,

ὁ δὲ, θύμος λευκὸς, οἱ δὲ, κεφαλωτὸς, οἱ δὲ, ἐπιθυμὶς, οἱ δὲ, θύρσιον, Ρωμαῖοι θοῦμουμ, Αἰγύπτιοι στεφάνη, Δακικὰ μόζυλα.

191. d. Ερπυλλος,

ὁ δὲ, ζυγὶς ἀγρία, οἱ δὲ, πόλιον, Αἰγύπτιοι μερυόπους, Ρωμαῖοι σερπύλλουμ, οἱ δὲ, χερηλαπικούμ.

192.a. Σάμψυχον,

ὁ δὲ, τρίφυλλον, οἱ δὲ, ἀμάρακον, οἱ δὲ, ἀγαθίδες, οἱ δὲ, κνίκιον, οἱ δὲ, ἄκαπνον, Πυθαγόρας θραμβὴς, Αἰγύπτιοι σοφὸ, Ἀρμένιοι μύουρον, Περσῶται ὄνος ἱερέως, οἱ δὲ, ἡλίου γένος Ἰστως, Ρωμαῖοι μαζούρανα.

Marcell. de melloto addit. Sūt qui zoodeté, sic qui orthinon vocēt. Romani melilotum & serratam campanam appellant.

193.a. ὑσσωπον,

ὁ δὲ, ὀριγανίδα καλοῦσιν.

Ib.b. ἄκανος,

ὁ δὲ, ἄγριος βασιλικὸς, Ρωμαῖοι ὠκιμάστρουμ.

Ib.g. ἐρπὸν,

ὁ δὲ, ῥυτὴν ὀρεινὴν, Ρωμαῖοι ῥοῦτα μοντάνα. πήγανον κηπευτὸν, Ρωμαῖοι ῥοῦτα ὀρτένσις. Αἰγύπτιοι ἐπνουβοῦ, Σύροι ἁρμαλᾶ, οἱ δὲ, βησασὰ, Αφροὶ χουρμᾶ.

195.d. ὑπερβλαβὴς ὄξυ.

Περὶ πηγάνου ἀγρίου.

Hæc fortassis, vt & quæ sequūtur in Aldino & Parisiēsi codice, ad caput de hyperico 199. lib. 2. relegāda sunt.

Πήγανον ἄγριον, οἱ δὲ, ὑοσκύαμον, οἱ δὲ, ἀνδρόσαιμον, οἱ δὲ, κύφι, οἱ δὲ, χαμαιπίτυν, Ρωμαῖοι ἑδεράλις, οἱ δὲ, σεντιναλις, Αφροὶ χοὺρμα σιμμακίδ.

196.a. Μῶλυ,

οἱ δὲ, λευκὸν ἄγριον καλοῦσι.

198.a. Λιγυστικὸν,

οἱ δὲ, πθμάκειαν καλοῦσιν, οἱ δὲ, παστινάκας.

Ib.g. ἄγριος,

οἱ δὲ, κερασοειδὴς, Ρωμαῖοι καρότα, οἱ δὲ, παστινάκα ῥούστικα, Αἰγύπτιοι βαβιβουσοῦ, Αφροὶ σιλφὶ.

al. add οἱ δὲ, πλατυκύμινον. Sic Marc. & Corn.

199.c. Μασσαλιωτικὸν,

οἱ δὲ, σφάγνον.

Romani mentham, alij nepetam vocāt, Ægyptij tis, alij pherthumerthrumonthu, alij perxo, alij macetho.

De mentha syluestri.

quam Latini menthastrum nominant.

De Thymo.

Quidam thymum candidum seu capitatum cognomināt, alij epithymida vocant, alij thyrsion, Latini thymum, Ægyptij stephane, Daci mozula.

De Serpyllo.

Aliqui zygin syluestrem, alij polion vocant, Ægyptij meruopyos, Romani serpyllū aut cicer erraticū.

De Sampsucho.

Nōnulli trifolium, alij amaracum vocant, alij agathides, alij cnecion, alij acapnō, Pythagoras thrambes, Ægyptij sopho, Armenij myurum, Magi sacerdotis asinum, alij Isidis genituram, Latini maioranam.

De maro.

Sunt qui origanida appellant.

De acino.

aliis syluestre basilicum, Latinis ocimastrum.

De Ruta.

Sunt qui rhyté montaná vocent, Latini rutam montanam, vel quam Græci peganon cepeuton, rutā hortēsem, Ægyptij epnubu, Syri harmala seu besasa, Aphri churma.

Post id caput.

De Ruta syluestri.

Rutam agrestem, alij hypericon, alij androsæmon, alij corió, alij chamæpityn vocant, Romani hederalē seu sentinalem. Afri churma semmaked. Marc. Ingnimalem.

De Moly.

Aliqui syluestre leucoiō appellāt.

De ligustico.

Alij panaceá, alij panaces vocant.

De pastinaca.

Quidam cerasconé, Romani carotam aut pastinacam rusticam vocant, Ægyptij barbibyru, Aphri ficham.

De Seseli Massiliensi.

Sunt qui sphagnō, alij platycyminum, *quasi latum cuminum*, vocant.

De Seſeli AEthiopico.

Ægyptij cyonophricen appellãt.

De Tordylio.

nonnullis Tordylon.

De Aniſo.

aliqui ſion, Latini aniſum dicũt.

De anetho.

Anethum quod eſtur, aliis polgidos, aliis anicetum, Magis cynocephali genitura aut pili, alus genitura Mercurii, Ægyptiis arachu, Romanis anethum, Aphris ſicciria, Dacis poltum.

De Cumino ſyluestri.

Latini cuminũ agreſte aut cuminum ſyluaticum vocant.

De Ammi.

Latini ammium Alexandrinum.

De Coriandro.

Ægyptij ochiõ, Aphri goïd vocãt.

De Hieracio magno.

aliis ſonchites, Romanis lactuca *erratica ſeu ſylueſtris*, Aphris ſithileas.

De Hieracio paruo.

ſunt qui etiam hoc ſonchiten vocent, alij intybum ſylueſtrem, Latini intubum agreſtem, Aphri ſithileſade.

Pirris etiam & Apul.

De Heleoſelino.

quidam pedinon, *quaſi campeſtre*, cognominant, alij hydroſelinon agrion, *quaſi aquaticum apium agreſte*, vocant, Romani apium ruſticum.

De Oreoſelino.

petroſelinum ſylueſtre nonnulli, Romani apium montanum, Ægyptij anonim vocant.

De Hippoſelino.

Romani verò olus atrum.

De Elaphoboſco.

quidam elaphicon, alij nebrium, alij ophigenium ſeu ophioctonon, alij herpyxe, alij lyme, Romani cerui ocellum vocant, Ægyptij chemis, Aphri aſcaucau.

De Hippomarathro.

aliqui marathin, alij marathron agrió, *quaſi fœniculũ ſylueſtrem*, vocãt, Ægyptij ſampſos, Magi thymarnoliũ, Latini fœniculũ erraticũ ſeu equinũ, aliqui meũ, Galli ſiſtrameor.

De Delphinio.

aliis diachyſis, aliis diachytos, aliis paralyſis, aliis camaros, aliis hya-

A Ib. c. σίστλι,

Ⓐ Αἰγύπτιοι κυόνιον φείκιλον καλοῦ- Ald. σίκιον
σι. 200. b. Τορδύλιον,

Ⓐ δέ, τόρδυλον.

200. c. Ανισον,

Ⓐ δέ, σῖον, Ρωμαῖοι ἄνισουμ.

201. a. Ανηθον.

B Ανηθον τὸ ἁθιόμενον, οἱ δέ, πόλγιδος, οἱ δ', αἰτίκηδον, Προφῆ) γένος κυνοκεφάλου, ἡμίσως πείχας κυνοκεφάλου, οἱ δέ, γένος Ἑρμοῦ, Αἰγύπτιοι ἀσχχοῦ, Ρωμαῖοι ἀνήθουμ, Αφρὶ σικίρια, Δακοὶ πόλτουμ. Ald. σικίρουμ.

Ib. c. ἄγριον,

Ρωμαῖοι κύμινουμ ἀγρέστεμ, οἱ δέ, κύμινουμ σιλβάτικουμ.

C 202. b. Αμμι,

Ρωμαῖοι ἄμμιουμ Αλεξανδρίνουμ.

Ib. c. Κοριάνδριον,

Αἰγύπτιοι ὄχιον, Αφρὶ χοίδ.

Ib. g. μέγα,

Ⓐ δέ, σονχίτλιν, Ρωμαῖοι λαμπῦκα, Αφρὶ σιθιλέας. 203 b. μικρὸν,

D Ⓐ δὲ καὶ τοῦτο σονχίτλιν καλοῦσιν, οἱ δ', ἔντιμον ἄγριον, Ρωμαῖοι ἴντιβουμ ἀγρέστεμ, Αφρὶ σιθιλέσαδι.

Ib. f. Ελειοσέλινον,

Ⓐ δ', πεδινὸν, οἱ δ', ὑδροσέλινον ἄγριον, Ρωμαῖοι ἄπιουμ ῥούστικουμ.

Ib. Ορεοσέλινον,

E Ⓐ δέ, πέτροσέλινον ἄγριον, Ρωμαῖοι ἄπιουμ, Αἰγύπτιοι ἀνώνιμ.

204. c. καλοῦσι.

Ρωμαῖοι δ' ὅλους ἄτρον.

205. c. Ελαφόβοσκον,

Ⓐ δέ, ἐλαφικὸν, οἱ δ', νέβριον, οἱ δ', ὀφιογένιον, οἱ δὲ, ὀφιοκτόνον, οἱ δ', ἕρπυξ, οἱ δέ, λύμη, Ρωμαῖοι κερβοχέλλουμ, Αἰγύπτιοι χημὶς, Αφρὶ ἀσκαυσκαύ.

206. d. Ιππομάραθρον,

Ⓐ δέ, μάραθρον ἄγριον, Αἰγύπτιοι σαμψῶς, Προφῆται θυμῶνιον, Ρωμαῖοι φαινίκουλουμ ἀγρέστεμ, οἱ δέ, φαινίκουλους, οἱ δ', κουίνους, οἱ δ', μεύμ, Γάλλοι στραμεόρ. 207. c. Δελφίνιον, Ald. ἱππομάρ-θρον

Ⓐ δέ, δελφάχυσις, οἱ δέ, δελφάχυτος, οἱ δέ, παραλύσεις, οἱ δ', κάμαρος, οἱ δ', ὑάκιν-

ῆος, οἱ δὲ, δελφινίας, οἱ δὲ, νήριον, οἱ δὲ, A
νηριάδιον, οἱ δὲ, σώσυμδρον, οἱ δὲ, κρόνιον,
Ρωμαῖοι βούκινος μίνορ.

Ib.f. Πύρεθρον.

Ⓐ δὲ, δορύκνιον, οἱ δὲ, πύρινον, οἱ δὲ,
πύρωτον, οἱ δὲ, πύρωθρον, οἱ δὲ, ἀρνὸς πυ-
είτης, Περσῶται πυρίτης, Ρωμαῖοι σαλί-
βαειν. 209.d. Σφονδύλιον,

Ⓐ δὲ, ἀράγχιον, οἱ δὲ, φαλάγγιον, οἱ δὲ,
ἀστέριον, οἱ δὲ, νίσυρον, οἱ δὲ, σφονδυλὶς, οἱ
δὲ, χορδάνιον, οἱ δὲ, οἰναν θὲ, Ρωμαῖοι ῥόβα
ρουτινάλις, Αἰγύπτιοι ἀψαφὲρ, Περσῶν
ὄσιρις. 210.a. Νάρθηξ.

Ρωμαῖοι φερύλαμ. C

Ib.d. Γευκέδανος.

Ⓐ δὲ, ἄγριον, οἱ δὲ, ἀγριόφυλλον, Περ-
σῶται ἀγαθὸς δαίμων, οἱ δὲ, πινασγιλεύμ,
Ald. σανίριον. Ρωμαῖοι *σατάριον.

211.d. Μελάνθιον,

Ⓐ δὲ, καὶ τὸν μήκωνα ἄγριον καλοῦ-
σι μέλαιναν, Ρωμαῖοι παπάβερ νίγρουμ.

216. c. Ἀμμωνιακὸν,

ὅπερ ἐστὶν, οἱ καὶ τὸ ἀμμωνιακὸν θυμίαμα, οἱ δὲ, ἀγάσυλλον, οἱ δὲ, κριόθριον, οἱ δὲ, D
ἠλαίουτρον, Ρωμαῖοι γουττα.

218.f. Ἄλυσσον,

Ⓐ δὲ, ἀσπίδιον, οἱ δὲ, ἁπλόφυλλον, οἱ
ἀκκόντιον, οἱ δὲ, ἀδίοτον,

219.b. Ἀσκληπιάς,

οἱ δὲ, κισσὸν, οἱ δὲ, κισσόφυλλον καλοῦσι.

Ib.c. Ἀτρακτυλὶς,

Ⓐ δὲ, ἄμμεως, οἱ δὲ, κρίκος ἀγρία, οἱ
δὲ, ἀσπίδιον, Περσῶται ἄφεδρος, Αἰγύ-
πτιοι χνὼ, Ρωμαῖοι ἀρεστίκουμ, οἱ δὲ, φου-
σοὺγρεστις, οἱ δὲ, κλόνουκα ῥούστικα. F

Ib.e. Πολύκνημον,

Ⓐ δὲ, κλινοπόδιον, οἱ δὲ, πολυγόνατον,
οἱ δὲ, Διὸς ἠλακάτη, οἱ δὲ, ἐχεώνυμον, Ρω-
μαῖοι πουτιαλογονθρία.

Ib.f. οἶνῳ.

Hæc inter notas in Aldino codice desiderantur, sed ipsa contextui addantur. fortè πῖι ἐχομένους. Ἐδίδαξεν ἡ πεῖρα, ὡς ἀνταιρομέ-
νων τῶν χλωραείων αὐτοῦ οἴνῳ λευκῷ, δὸν
ἐχομένοις τοῖς λεγομένοις βιασμοῖς μέγα
βοήθημα.

219.f. Κλινοπόδιον,

Ⓐ δὲ, χλεώνικον, Ⓐ δὲ, ὠκιμαστ-

cinthus, aliis delphinias, aliis neriõ, alius nercadium, aliis soſadros, aliis cronios, Romanis buccinus minor vocitatur.

De Pyrethro.

Aliqui doryenion, alij pyrinõ, alij pyrotõ, alij pyrothrõ, alij arnopyritẽ, Magi pyritẽ, Romani ſaliuarẽ vocãt.

De Spondylio.

Aliqui arangem nominant, alii phalangium, alij aſterium, alij niſyrin, alij ſphondylin, alij chorodanõ, alij œnanthẽ, Romani herbã "rotularẽ, Ægyptij apſapher, Magi oſirin. "σφονδύλιον Græci vocãt, & rotulam ſignificant.

De Ferula.

Latini ferulam vocant.

De Peucedano.

Aliqui "*ſiſona* agrion vocant, alij agriophyllõ, Magi bonũ dæmonẽ, alij pinaſtellum, Romani "ſatanariã. "sic Apul. fortè ægrifolia ferula. Alij, ſatanariam herbam.

De Melanthio.

Alij "mecona agrion melana, Romani papauer nigrum appellant.

De Hammoniaco.

herba eſt, ex qua ammoniacum thymiama colligitur, aliqui agaſyllon, alij criotheon, alij heliuſtrum, Romani guttam nominant.

De Alyſſo.

Aliqui aſpidion *q. aſi* "*clypeolum*, alii "haplophyllon, alius accyſeton, alii adeſeton nuncupant. "ſcutiformi figura. "à foliorum ſimilitudine.

De Aſclepiade.

aliis ciſſion, *quaſi hederula*, aliis cyſſophyllon, *hoc eſt hederæ foliis prædita.*

De Atractilide.

Sunt qui "amyrõ, qui cnicum ſylueſtrem, qui aſpidium vocent. Magi aphedrõ, *hoc eſt*, "*menſtruam purgationẽ*. Ægyptij cheno, Romani præſepium, aliqui fuſum agreſtem, alij colum ruſticam. "Mart. afyron. fortè à ſanguinis ſuccurſu, quẽ folia confricata reddũt. Eadem ratione Theophraſto φύτ. l. 1. cnicus, Actio κάθαρσιν appellatur.

De Polycnemo.

Quidam clinopodium, *quaſi lectipedem*, alij polygonatum, alij Iouis colũ, alij echeonymon, Romani puteologonthriam vocant.

Ad calcem eiuſdem capitis:

Edocuit experiẽtia, ipſius ramulos in vino albo contritos lymphatico furore correptis magno eſſe præſidio.

De Clinopodio.

Aliqui "cleonicum, alij ocimaſtrum "fortè à clinicis. Plin. clinopodium.

strum, alij zopyron vocant.

De Leontopetalo.

Marc. Iunior. Aliqui leontopodion, alij leuceoron, alij leontium, alij dorin, seu doricterin, alij pardalen, alij lychnidem syluestrē, alij thorybethron, alij rapeiū, alij corniculatū papauer, alij anemonē, Romani papauerculū aut semen leoninum appellant.

Apul. theribethron & orobethron. Apul. propedion & propedion. ferrē, pedum fit Apul.

De Teucrio.

Aliquibus teucris.

De Trissagine.

Latinis trissago minor dicitur.

De Lychnide coronaria.

Quidam athanaton, *quasi immortalem*, vocant, alij aquiloniū, alij ballarion, alij geranopodiū, *quasi gruis pedem*, alij corymbion, alij taurion, alij sceptron, alij maloïon, Ægyptij semeon, Magi sanguinē menstrua patientis mulieris, Romani geniculatem seu vallariam.

De Lychnide syluestri.

Aliis tragonaton, aliis atocion, aliis hieracopodion, *quasi pes accipitrinus*: aliis lampas, *hoc est lucerna*, vocatur, Ægyptiis semura, Magis mēstrua patientis mulieris genitale, Romanis intybus agrestis, aliis lapathū seu caphaguina, aliis seris appellatur.

De Lilio.

Alij crinanthemon vocant, alij callirium, *quasi pulchrum lilium*, Magi Martis sanguinem, Osthanes auram crocodili, Ægyptij symphæphon, quidam tialon, Latini lilium, seu rosam Iunonis, Syri susan, Aphri abiblabon.

De Ballote.

Aliqui nophthan appellant, alij notianoscemin, alij cynospraſion, *quasi caninum marrubium*, alij notheran, alij nochelin, alij nostelin, alij nophryn, alij gnothurin, alij gnoteran, Romani apniū aut medatá, alij vlcerariam, alij marrubiū: sunt qui cātherinū adiiciát, Ægyptij asphos seu esce, Prophetæ sanguinē Ixionis.

De Apiastro.

Aliqui melittēō, alij meliphyllō, alij erythran, alij temele, Romani apiastrū seu citraginē, Gallimerisimorion vocant.

De Marrubio.

Aliqui eupatoriū, alij phyllopha-

A δὲ, οἱ δὲ, ζώπυρον καλοῦσι.

220.b. Λεοντοπέταλον,

οἱ δὲ, λεοντοπόδιον, οἱ ἢ, λευκόιον, οἱ δὲ, λεόντιον, οἱ δὲ, δωρίν, ἢ δωρικτερίν, οἱ δὲ, λυχνὶς ἀγρία, οἱ δὲ, πάρδαλος, ⓓ δὲ, θορύβηθρον, οἱ δὲ, ῥαπίνιον, οἱ ἢ, μήκωνα κεράτιτιν, οἱ δὲ, ἀνεμώνην, Ῥωμαῖοι παι-
B παβελλκλυμ, οἱ ἢ, σπέρμα λεόντων.

Ib.d. χαμαίδρυος,

ⓓ ἢ, πυκρίδιον.

Ib.f. Χαμαίδρυς,

Ῥωμαῖοι τειχάγο μίνορ.

221.d. πτεφανωμαλίκη,

οἱ δὲ, ἀθάνατος, οἱ ἢ, ἀκωλώνιον, οἱ δὲ, C βαλλάειον, οἱ ἢ, γερανοπόδιον, οἱ δὲ, κορύμβιον, οἱ δὲ, ταύριον, οἱ δὲ, σκῆπτρον, ⓓ δὲ, μαλόϊον, Αἰγύπτιοι σήμιδι, Προφῆται αἷμα ἀπὸ τῆς φιμώσης, Ῥωμαῖοι ἡμικυλέ-ρις, οἱ δὲ, βαλλάεια.

Ibid. ἀγρία,

οἱ ἢ, πανάκιτιν, οἱ ἢ, ἀτόκιον, οἱ ἢ, ἱε-D ρακοπόδιον, οἱ δὲ, λαμπάς, Αἰγύπτιοι σεῦ μοῦρα, Προφῆται ἀπὸ τῆς φιμώσης ταῦρος, Ῥωμαῖοι ἵππιον ἀγρέϊνον, οἱ ἢ, λάπαθον, κεφαγοῦνα, οἱ δὲ, σέριδος.

Ib.c. βασιλικὸν,

οἱ ἢ, χρυσάνθεμον, οἱ ἢ, κεφαίριον, Προφῆται αἷμα Ἄρεως, Ὀσθάνης αὖρα κροκοδεί-E λου, Αἰγύπτιοι σύμφαφον, οἱ δὲ, τιάλιν, Ῥωμαῖοι λίνουμ, οἱ δὲ, ῥόσα ἰκάνης, Σύροι σουσᾶ, Ἀφροὶ ἀβίβλαβον.

222.c. ἀνεμώνιον.

οἱ δὲ, νοφθάν, οἱ δὲ, νοτιανοσκέμιν, οἱ δὲ, νόσπρασον, οἱ δὲ, νωθρᾶς, οἱ ἢ, νοχελὶς, οἱ δὲ, νωτελὶς, οἱ ἢ, νῶφρις, οἱ δὲ, γνῶθυρις, F ⓓ δὲ, γνωτῆρα, Ῥωμαῖοι ἀπνιμ, οἱ δὲ, μέδαπαμ, οἱ ἢ, ἑλκοπάρια, οἱ δὲ, μαρρόβιμ, οἱ ἢ, κυνοθουρίνμ, Αἰγύπτιοι ἄσφος, ⓓ ἢ, ἔσκε, Προφῆται αἷμα Ἰξίωνος.

Ib.e. καλῦσι.

οἱ δὲ, μελίττιον, οἱ ἢ, μελίφυλλον, οἱ ἢ, G ἐρυθρὰν, οἱ ἢ, τημελῆ, Ῥωμαῖοι ὠπιαστροῦ, οἱ ἢ, κιτράγω, Γάλλοι μεριστμόριον.

223.b. Γεράσιον,

ⓓ δὲ, ἱππιτάριον, ⓓ ἢ, φυλλόφαρτος

ἡ δὲ, πεπιδίλαι, οἱ δ', καμηλοπόδιον, οἱ δὲ, φιλόφαρες, Αἰγύπτιοι ἀστερόπτα, Προφῆται αἷμα ταύρου, ἡ δὲ, ἀφεδρος, γένος ὠγου, Ρωμαῖοι μαρρούβιον, οἱ δ', λαβεώνια, Αφροὶ ἀπερβέρζια.

res, alij tripedilō, alij camelopodiū, *quasi cameli pedē*, alij philochares, Ægyptij asterion asteropémve, Prophetæ tauri sanguinem, alij aphedron, genitura, Hori, Romani marrubiū, seu labeoniam, Aphri atierberzia nominant. *Mart. ex Plin. philopada*

124.a. Φυλλίτης,

οἱ δὲ, φύλλις, οἱ δ', ἄκαυλον, οἱ δ', λάπαθον ἄγριον καλοῦσι.

De Phyllitide.

Aliqui phyllun, alij acaulon, *quasi caule carentē*, alij lapathum agrion, *hoc est, rumicem syluestrem*, vocitant.

224.c. τρίφυλλον,

Ρωμαῖοι τριφόλιουμ, οἱ δὲ, τετράφυλλουμ ἀκούτουμ ὀδοράτουμ.

De Trifolio.

Latinis trifolium seu trifolium acutum seu odoratum. *propter figuram ita Colum. Veget.*

225.c. Πόλιον,

Τὸ ὀρεινὸν, οἱ δὲ, τευθρίον, οἱ δὲ, φευξαπάδιον, οἱ δὲ, ἀχαμοδρὶς, ἡ δὲ, ἑβενίτις, οἱ δὲ, μήλασμον, ἡ δὲ, βήλιον, οἱ δ', λεοντοκέφαλον.

De Polio.

Montanum aliqui teuthrion, alij pheuxaspidion, *quasi aspidis fugās*, alij achemenin, alij libanitin, alij melosmon, alij belion, alij leontocaron, *quasi leoninum caput*, appellant. *à grani odore & humanum simulo* *à pomi forma odore*

Ib.f. Σκόρδιον,

οἱ δὲ, σκόρβιον, οἱ δ', πλευρῖτις, οἱ δὲ, δύσοσμον, οἱ δ', καλαμίνθη ἄγρια, οἱ δὲ, χαμαίδρυς, οἱ δὲ, μιθριδάτιος, Προφῆται αἷμα ποδάγρας, Αἰγύπτιοι ἀφώ, Ρωμαῖοι φριξάγω, παλύστρις.

De Scordio.

Quidam scorbium nominat, alij pleuritin, alij dysosmon, *quasi grauiter olens*, alij calamintham syluestrem, alij chamædryn, alij Mithridation, Prophetę sanguinem Podagrę, Ægyptij apho, Romani trixaginem paluſtrem.

226.c. Βήχιον,

Bertalis Lesbiis, vel apud Ægyptios.

οἱ δὲ, ῥίχιον, ἡ δὲ, πέρσιν, οἱ δὲ, πήγανον, οἱ δὲ, πίθιον, οἱ δὲ, παγώναλον, οἱ δὲ, χαμαιλεύκη, οἱ δὲ, πρόχετον, οἱ δὲ, ἀκρόφυλλον, οἱ δ', χαμαιγήρων, Αἰγύπτιοι σααρθά, Ρωμαῖοι θεσιλλάγω, οἱ δὲ, φαρφάριαμ, οἱ δὲ, πουστυλάγω, Βέσσι ἀσᾶ.

De Tussilagine.

Nonnulli richion, alij petrinam vocant, alij peganon, alij pithion, alij pagonaton, alij chamæleucen, *quasi humilem populum albam*, alij procheton, alij acrophyllon, alij chamægiron, *quasi humilem populū senē*, Ægyptij saartha, Romani tussilaginem, seu farfaram aut pustulaginē, Bessi asa. *Sic Marcellus* *fortè, populaginem*

Fortè, πωώτης seu πωίτης a tussiendo parta.

Ib.f. Ἀρτεμισία

οἱ δὲ, πολύκλωνος, οἱ δὲ, μονόκλωνος, οἱ δὲ, τοξωτικία, οἱ δὲ, Ἐφεσία, οἱ δ', ἀσαλήριος, οἱ δ', σώζουσα, οἱ δὲ, λεία, οἱ δ', λευκόφρυς, Προφῆται αἷμα ἀνθρώπου, οἱ δὲ, χρυσάνθεμον, Ρωμαῖοι βαλέντια, οἱ δὲ, σερπύλλουμ, ἡ δὲ, ἄρταρέγια, οἱ δὲ, ῥαπίσμ, οἱ δὲ, τραγόμαγλα, οἱ δὲ, ἀρτεμισίαμ, Γάλλοι πονέμ, Δακοὶ ζουόστ.

De Artemisia.

Artemisiā seu polyclonon, *à multiplicibus ramulis sic dictam*, seu monoclonon, *à singulari ramulo*, quidā toxotin, alij Ephesian, alij anactorion, alij sozusam, *quasi salutarem*, alij leuē, alij leucopin, Prophetæ hominis sanguinem, alij chrysanthemon vocant, Romani valentinam, alij serpyllū maius, vel herbā regiā, alij rapium, alij traganthen, alij artemisiā, Galli ponem, Daci zuoſten. *à floris in auro hirto colore vel hyacinthyno quasi lapis superciliorum. ab efficacia*

227.c. Ἀρτεμισία,

Ρωμαῖοι κάστρουμ σιλβάτικουμ, οἱ δὲ, ἄπιουμ ῥούστικουμ, Αἰγύπτιοι μαροτώ.

De Ambrosia.

Romani caprū syluaticum, seu apium rusticum, Ægyptij merseo.

228.b. Γεράνιον,

Fortè, ἀπὸ ἀγρίου, à rostro ciconiæ.

ἡ δὲ, πελωνίτις, ἡ δ', τέτρα, οἱ δὲ, χηναιανόμορον, Ρωμαῖοι σύχνα στρουμ, Αφροὶ ἰέσκε.

De Geranio.

Quibusdam pelonitis, aliis trica, aliis geránogeron, Romanis echinastrum, Aphris iesce dicitur.

Ibidem, de Geranio altero.

Aliqui oxyphyllon, alij merrtyga, alij myrrhin, alij cardamomum, alij origanum vocãt, Prophetæ hierobryncas, Latini pulmoniã, cicutariam aut herbam grumam, Aphri iesce.

De Gnaphalio.

Quidam hires, alij ampetocon, alij anaxeton, alij ᵛ gnaphalin vocãt, Ægyptij semeon, Galli gelatinem, Romani centunculum seu centuncularem herbam, alij albinum.

ᵛ quasi tomentosam herbã.

De OEnanthe.

Alij ceraſcomion.

De Conyza magna.

Conyza magna, quibusdã ᵛ cynozematitis, aliis danais, aliis tanachiũ, aliis phycos, aliis ischys, aliis dinosmos, *quasi graueolẽs*. Magis brephoctonos, *quasi infantes enecans*, aliis anubias, aliis hedemias, Ægyptijs ceti, Romanis intybũ aut militaris herba, quibusdam dellhariũ, aliis febrituga nuncupatur. Sunt & qui phragmosam, qui musteri, qui pissan nominent.

ᵛ Conyzã istã non fallor ex hac voce corrupta esse iudico. Cl. Iter imãnis, qui hanc herbã causa nomen ipsa dicta habuit, quasi ἀγνωτὸν ἀπὸ τοῦ κάνω odorem praferentem.

Eodem capite.

Aliqui conyzam paruam, alij panion, alij libanotin, Prophetæ Cronon, *Caesij, Saturnum*, appellant.

De Hemerocalle.

Aliqui hemerocatallacton, alij crinon agrion, *quasi lilium syluestre*, alij crinanthemon, alij ᵛ porphyranthes, alij bulbum ᵛ vomitorium, alij anticantharon, Ægyptij iocri, Romani bulbum aut liliũ syluestre, seu marinum, Aphri abiblabon vocant.

ᵛ flore lilij. ᵛ flore purpureo seu sanguineo.

De Leucoio.

Alij basilion, *quasi regium*. Romani opulam albam, seu violam albã, aliqui augustiam, nonnulli violam matronalem, aut passoriná, alij ᵛ polyphoram vocant.

ᵛ forte quod flores multos gerat.

De Satyrio erythronio.

Alij melium aquaticum, alij entaticon, *quasi arrectorium*, nonnulli priapiscum seu satyriscum, alij Satyri testiculum, Romani testiculum ᵛ leporinum nominant.

ᵛ Sic Apul.

De Hormino.

Latinis geminalis, Dacis hormia dicitur.

De Nymphæa altera.

Nymphęam alterã sunt qui nymphona vocent.

A Ib. paulò pòst. μεάνιον,

οἱ δὲ, ὀξύφυλλον, οἱ δὲ μέμερτρυξ, οἱ δὲ, μυρρῖς, οἱ δὲ, καρδάμωμον, οἱ δ', ὀρίγανον, Προφῆται ἱεροβρυγκες, Ρωμαῖοι πουλμενία, οἱ δ', κικηβία, οἱ δ', χρεῖνα, Αφροὶ ἰέσκε. Cõclusa addunt. ex Ald. cod.

Ib. c. Γναφάλιον,

οἱ δὲ, ἱρὲς, οἱ δὲ, ἀμπέτοκος, οἱ δὲ, ἀναB ξηνον, οἱ δ', αἰαφαλὶς, Αἰγύπτιοι σεμεών, Γάλλοι γελασονὲν, Ρωμαῖοι κέντπυλουμ, οἱ δ', ζουκουλαρις, οἱ δὲ, ἀλβίνους.

229. a. λεύκιμον,

ⓓ δὲ, περασκόμιον.

Ibid. b.

Περὶ κονύζης μεγάλης. Κεφ.

C Κόνυζα μεγάλη, οἱ δ', κυνοζεματῖτις, οἱ δ', δθωαὶς, οἱ δ', ταναχιον, οἱ δ', φύκος, ⓓ δὲ, ἰσχύς, οἱ δὲ, δεινόσμος, Προφῆται βρεφοκτόνος, οἱ δὲ, αἰουβίας, οἱ δὲ, ἡδεμίας, Αἰγύπτιοι κὲπ, Ρωμαῖοι ἵνπουμ, ⓓ δὲ, μιλιτάρις μίνα, οἱ δ', δελλιάριον, οἱ δὲ, φεβροφύγα, οἱ δὲ, τραγμοσα, οἱ δὲ, μυD γροὶ, οἱ δὲ, πισσὴν.

Ib. f. ἰᾶται,

οἱ δὲ, κόνυζα μικρὰ, οἱ δὲ, πάνιος, ⓓ δ', λιβανωτὶς, Προφῆται Κρόνος.

Ib. g. Ημεροκάλλις,

οἱ δ', ἡμεροκαπάλαχθον, οἱ δὲ, κρῖνον ἄγριον, οἱ δ', κρεμαίθμον, οἱ δὲ, πορφυρανθὲς, οἱ δὲ, βολβὸς ὁ ἐμετικὸς, οἱ δὲ, ἀντικάνθαρον, Αἰγύπτιοι ἰοχροὶ, Ρωμαῖοι βόλβεμ, οἱ δὲ, ἔλπμ ἀγρέστεμ, οἱ δ', ἔλιουμ μαείνουμ, Αφροὶ ἀβίβλαβον.

230. b. Λευκόϊον,

οἱ δ', βασίλειον, Ρωμαῖοι ὄπουλα ἄλβα, οἱ δὲ, βίολα ἄλβα, οἱ δὲ, αὐγουστία, οἱ δὲ, βίολα ματρονάλεμ, ⓓ δὲ, παπαφείνα, οἱ δὲ, πολύφουρα.

232. c. ἐρυθραικὸν,

οἱ δὲ μᾶλλον ὃ ὑδάσιν, οἱ δὲ, σάτυριπικὸν, οἱ δὲ, σατυρίσκος, οἱ δὲ, ὄρχις Σατύρου, Ρωμαῖοι μελορίκουλουμ βέστεις.

Ib. e. ἥμερον,

Ρωμαῖοι γεμινάλις, Δαχοὶ ὅρμια.

234. a. ἄλλης.

Νυμφαία ἑτέρα, οἱ δ', νυμφόνα καλοῦσι.

lb.c. Ανδρόσακες,

ⓐ ὑ, πικρίδα, οἱ ὑ, λεύκιον, οἱ δέ, θαλασσίδιν καλοῦσι.

lb.c. θλίψις,

οἱ ὑ, λογχῖτις, οἱ ὑ, ἀπούριος, οἱ ὑ, φρυγία, οἱ ὑ, φρυγῖτις, οἱ ὑ, φιλτροδότης, Προφῆται αἷμα γαλῆς.

234.b. Ανθυλλὶς,

ⓐ ὑ, ἄνθυλλον, οἱ δέ, ἀνθεμίδα, οἱ ὑ, ἐρανθέμις, ⓐ δὲ, λευκάνθεμον, οἱ ὑ, σωρανθὶς, οἱ ὑ, ἄνθος πεδινὸν, Ρωμαῖοι σωλαστρὸν καλοῦσι.

235.c. καμαία,

Cóctula expungi par eſt, quia legantur in contextu.

Ρωμαῖοι μάλιτον, Αφροὶ ἀσπρυφὴ, ἕτεροι δὲ χρυσοκόμιλον.

236.d. λευκάνθεμον,

οἱ δέ, ἀνθεμὶς, οἱ δέ, χαμαίμηλον, οἱ ὑ, χρυσόκαλις, οἱ ὑ, μελάβαθρον, οἱ δέ, ἄνθος πεδινὸν, Ρωμαῖοι σώλις σίκουλαμ, ⓐ δὲ, μιλλεφόλιουμ, Θοῦσκοι καυτὰν, Αφροὶ θαμακθ'.

lb.f. κάχλαμι,

οἱ δὲ, βαλσαμίνη, Προφῆται αἱμορρὰ, οἱ δὲ, γένος Ερμοῦ, οἱ ὑ, γένος ἄφθιτος, οἱ δὲ, Μνησίθεος, Ρωμαῖοι καππαδοκία, Αφροὶ ναφάτ.

237.a. πεντόβορον,

Malim cum Gal. πανιέβιν.

παιονία ἄρρεν, οἱ δὲ, ὀροβέλιον, οἱ ὑ, ὀροβάξ, οἱ δέ, αἱμαγωγὸν, οἱ ὑ, παιδαίδιν, οἱ δὲ, μηνοειδὲς, οἱ δέ, μιλίσιον, οἱ ὑ, παιώνιον, οἱ δέ, πανδηπέρατος.

lbid. δακτύλους,

οἱ ὑ, ἀγλαοφωτίδα, οἱ ὑ, θεοδόσιον, οἱ ὑ, σελινίσιον, Προφῆται σελινόγονον, οἱ δέ, φλόσι, Ρωμαῖοι κάσα.

lb.f. ἐξώνυχον,

οἱ δὲ, λεόντιον, οἱ δέ, λίθος λεοντικὴ, οἱ ὑ, γοργάνιον, οἱ ὑ, τριαλίτης, οἱ ὑ, διόσπορον, Ρωμαῖοι κολύμβαμ, Δακοὶ γονολήτα.

Theophraſtus & Plin. Aſcnyeg. quaſi ſonus tritici.

238.d. ἐρυθρόδανον,

οἱ ὑ, ἐρυθρόδανος ῥίζα, οἱ δὲ, δράκαινος, οἱ δὲ, κιννάβαεις, Ρωμαῖοι ῥουβία παλαία, Θούσκοι λάμπα μάϊωρ, Αἰγύπτιοι σωφεί.

239.a. Λογχῖτις,

οἱ ὑ, κίστρον, ἣ Μηδοῦσα, Ρωμαῖοι βενέρια, οἱ δὲ, λαγχέολα.

De Androſace.

Sunt qui ᵃpierida appellent, alij ᵇleucem, alij thalaſſiam, *quaſi* ᶜmarinam.

ª ſequens auctor. ᵇ a ſolo colore candido. ᶜ à loco circa quē naſcitur.

De Aſpleno.

Alij lonchitin, alij ᵃaurium, alij phrygiam, alij phrygitin, alij philtrodoten, Prophetæ ᵇ muſtelæ ſanguinem.

Apul. ruſcum. ᵇ aut ſolis.

De Anthyllide.

Quidam anthyllon, alij anthemida vocant, alij eranthemin, alij leucanthemon, alij ſoranthis, alij florem campeſtrem, Romani ᵃſolaſtrum.

ª alij Solis aſtrum.

De Anthemide.

Romani malium, Aphri aſtertiphe appellant.

De Parthenio.

Alij anthemida: ſunt qui chamęmelum, alij chryſocalin, alij malobathron, alij florem campeſtrem, Romani ſolis oculũ, aut millefolium, Hetruſci cautan, Aphri thamacth.

De Buphthalmo.

Alij balſaminam, Prophetæ hæmorrham, alij Mercurij genituram, aut ſemen incorruptibile, alij Mneſitheum, Romani cappacoraniam, Aphri Narat.

De Paonia.

Pæoniam marem, alij ᵃorobelium nominant, alij orobacem, alij ᵇhęmagogum, alij pæſæden, alij menogenion, *quaſi lunæ ſobolem*, alij menion .i. ᶜlunarem, alij pæonium, alij ᵈpanacos ceras.

ª à gemit ervæ ſimilibus. quid menſtruum ſanguinem educat. quid cornicula Lunæ ſpecies referant feminam inuolucra. ſic Apul.

Ibidem.

Alij aglaophotida, quidam theodonium, *quaſi diuinum donum*, alij ſelenion, *hoc eſt, lunarem*, Prophetę ſelenogonon, *quaſi Lunæ genituram*, alij phthiſin, Romani caſtam.

De Lithoſpermo.

Alij leontion, alij leoninum ᵃlapidem, alij gorgonium, alij tauralitin, alij dioſporon, *quaſi a Ioue ſitum*, Romani columbá, Daci gonoletá.

ª Mar. leontiocam herbam.

De Rubia.

Alijs dracanos, alijs cinnabaris, Romanis rubia ſatiua, Hetruſcis lappa minor, Ægyptijs ſophobi.

De Lonchitide.

Alijs ceſtron ſeu Meduſa dicitur, Romanis venerea ſeu lanceola.

De Lonchitide altera.

Latini ᵛlõginam aut calabrinam.

De Althea.

Alij althiocon.

De Cannabi ſatiua.

Aliqui cannabium, alij ſchœnoſtrophon, *quaſi intorquendis funibus apium*, alij ᵛaſterion, Latini cannabin appellarunt.

De Cannabi ſylueſtri.

Aliqui hydraſtinam, Romani terminalem ſeu cannabin vocant.

De Anagyri.

Alij agnacopum.

De Onobrychide.

Aliqui onobrochilon, alij eſchaſmenen, alij hypericum, alij corion, alij chamæpityn, Romani opacam, alij brychilatam, alij loptam, alij iocinalem, Daci aniaſſexe appellant.

De Chamæpity.

Alij pityorizon, alij orizelon, alij bryoniam ſylueſtrẽ, Prophetæ Mineruæ ſanguinem, Romani ᵛcupreſſum nigram, Daci dochela.

In alio codice & hoc de Vettonica caput inſeritur: cuius magna pars ex Ant. Muſa deſumpta videtur.

Vettonica naſcitur in pratis & montoſis locis, itémque mundis & opacis circa frutices. Animas hominum & corpora cuſtodit. Contra nocturnas ambulationes ac loca à maleficiis & periculis non ſatis tuta, necnon & ſomnos difficiles efficax eſt: deniq; ad omne genus medelæ celebratur. Totam radicem rubram habet & odoratam, folia porracea, medium foliorum puniceum, cauliculos in rectũ calamum deſinentes, triágulos, & in ipſis flores purpuraſcentes. Vis ipſius hæc eſt: Contuſa recens & ſupra fracti capitis ictum impoſita, doloré eximit, & vulnera glutinat: quin & oſſa fracta vi ſua extrahit. Illud verò eò efficaciùs præſtat, ſi quotidie permutetur, donec vulnus ſaneſcat. Sanat & dolorem capitis ſeu decocta cum aqua & capiti affuſa, ſeu etiam cum ᵛbitumine oblita temporibus. Ad idem valet & ipſius radicis ſuffitus.

Ib.c. παχεῖαι,

Ρωμαῖοι λογχίνα, ⓓ δὲ, κυλαβεῖνα.

Ib.d. καλοῦσι,

ⓓ δὲ, ἀλθίοκον,

240.d. Καινάβις,

οἱ μὲν, κανναβίσιον, οἱ δὲ, ᵛκοινόστροφον, οἱ δὲ, ἀστέριον, Ρωμαῖοι κάνναβιν. Quòd ex ea funes extorqueantur.

Ib.f. ἀγρία,

οἱ δὲ, ὑδράστινα, Ρωμαῖοι τερμινάλις, ⓓ δὲ, κάνναβις.

241.a. ἄγκπον,

οἱ δὲ, ἀγναάκοπον.

242.a. Ονοβρυχὶς,

οἱ δὲ, ὀνοβρύχιλος, οἱ δὲ, ἐσχασμήν, οἱ μὲν, ὑπερικόν, οἱ δὲ, κόριον, οἱ δὲ, χαμαιπίτυν, Ρωμαῖοι ὀπάκαν, οἱ δὲ, βριχιλάταν, οἱ δὲ, λόπταν, οἱ δὲ, ἰοκινάλιν, Δακοὶ αἰνιασπξέ.

243.c. Χαμαιπίτυς,

οἱ δὲ, πιτυόριζαν, οἱ δὲ, ὀρίζηλον, ⓓ δὲ, βρυωνίαν ἀγρίαν, Προφῆτιν αἷμα Ἀθηνᾶς, Ρωμαῖοι κυπρησσὸν μέλαν, Δακοὶ δοχελᾶ.

246.c. ἐν ἄλλῳ τῷ τοῦτο.

Περὶ Βετονικῆς.

Βετονικὴ φύεται ἐν λειμῶσι καὶ ὀρεινοῖς τόποις, καὶ καθαροῖς τοῖς ἡμέροις περὶ τὰ φυτά· καὶ ψυχὰς ἀνθρώπων καὶ σώματα φυλάττει γυναικείας τε ὀδυνηρίας καὶ τόπους ἐπιβλαβοῦς τοῖς ὕπνοις χαλεπούς αὐτιέργει. καὶ εἰς πᾶσαν ἴασιν ἐστὶ εὐλογημένη. ἔχει δὲ πολὺ μὲν ῥίζαν ὅλην ἐρυθρὰν καὶ εὐώδη· τὰ δὲ φύλλα πράσινα, καὶ ὃ μέσον τῶν φύλλων φοινικοῦν· τοῖς εἰς ⓦ ὀρθοκάλαμον τελευτῶντα, καὶ ἐπ' αὐτῶν αὖθι πορφυρίζοντα. ἡ δὲ δύναμις αὐτῆς ἐστὶν αὕτη· λειωθεῖσα τὸ παρὸν καὶ ἐπιτεθεῖσα εἰς τὸ θραυσμένον κεφαλῆς καὶ τὰς πληγὰς, ἀνώδυνον ποιεῖ. καὶ τὰ τραύματα κολλᾷ· καὶ τὰ τιθλασμένα ἐκ τῶν ἐγκαλεῖ. καὶ τοῦτο ποιεῖ καθ' ἡμέραν ἀλλασσομένη, ἕως ἂν πύον. ἀφεψηθεῖσα δὲ μετὰ ὕδατος, κεφαλαλγίαις καταπλουμένη καὶ μετὰ ᵛἀσφάλτου ἐπιχριομένη τοῖς προσφόροις ἰᾶται, ὑποθυμιωμένης αὐτῆς καὶ τῆς ῥίζης. Al. κατ' ἰσχύν. Al. εἰ σπυ.

247.a. ἄρρεν,

Ⓐ δὲ, πολυγόναλον, οἱ δὲ, κυνοχάλιν, οἱ δὲ, ἡρακλέαν, οἱ δὲ, ἄσφαλτον, Ⓐ δὲ, χιλιόφυλλον, οἱ δὲ, κλῆμα, Ⓐ δὲ, πολύκαρπον, οἱ δὲ, καρκίνθρον, οἱ δὲ, πευθαλίδα, οἱ δὲ, μυρτοπέταλον, οἱ δὲ, κλινόποδιον, Ⓐ δὲ, ζαειθα, οἱ δὲ, πηδάλιον, Αἰγύπτιοι θαφὶν, Ⓐ δὲ, στεμφὶν, Προφῆται γένος ἥρωος, οἱ δὲ, ὄνυξ μυός, Ρωμαῖοι στεμινάλις, οἱ δὲ, σκορπίνακα, Αφρὶ χουλσιώ.

Ib.c. θῆλυ,

Ρωμαῖοι στεμινάλις,

248.a. πολυγονοειδὲς,

οἱ δὲ, φιλεταίριον,

Ib.c. χέρσος.

Περὶ κληματίδος ἑτέρας. Κεφ.

Ετέρα κληματὶς, Ⓐ δὲ, ἐπιγῆτις, Αἰγύπτιοι φυλάκιον, Ρωμαῖοι ἀμβουξοῦ, κλῆμα ἀνίσου ὑποῤῥοδον, λυγώδες, φύλλον δριμὺ λίαν γλυκαῖνον, καὶ ἑλκωτικόν. παρελήφεται δὲ τοῖς δένδρεσιν ὡς σμίλαξ. τοῦτος ὁ καρπὸς λεῖος μεθ' ὕδατος ἢ ὑδρομέλιτος πολὺς, ἄγει κάτω φλέγμα καὶ χολήν. τὰ δὲ φύλλα καταπλασθέντα λέπρας ἀφίστησι. παρίχουσι δὲ μετὰ τοῦ λεπιδίου εἰς βρῶσιν.

249.b. πικτὸν,

Ρωμαῖοι σολδάγινεμ.

Ib.g. Σβιδὴ,

Ⓐ δὲ, πόδιον, Ρωμαῖοι στύπαμ,

250.a. Κλύμενον,

Ⓐ δὲ, καλυκανθεμὸν, οἱ δὲ, περικλύμενον, οἱ δὲ, ἡλιοφυὲς, οἱ δὲ, ἡπατῖτις, Ⓐ δὲ, σμίλαξ, οἱ δὲ, ἀναπολικὸν, οἱ δὲ, δυτικὸν, οἱ δὲ, μεργίνη, Ρωμαῖοι οὐόλευκρουμ, οἱ δὲ, οὐόλευκρουμ μάϊορες, Αἰγύπτιοι ὀξιώθ. κλύμενον, Ⓐ δὲ, κλυμένιον, ὃ καὶ ἄγωνον καλοῦσι.

Ib.d. Περικλύμενον,

Ⓐ δὲ, αἰγίνη, οἱ δὲ, κλύμενον, Ⓐ δὲ, κάρπαθον, Ⓐ δὲ, σπλήνιον, οἱ δὲ, ἑπατῖτις, οἱ δὲ, ἑλξίνη μείζων, οἱ δὲ, κλιματῖτις, οἱ δὲ, μυρσίνη, οἱ δὲ, καλυκανθεμον, Προφῆται πάλιον Αφροδίτης, Αἰγύπτιοι τοῦρκον, Ρωμαῖοι οὐόλευκρουμ μάϊορες, Αφρὶ λαναθ.

De Polygono mare.

Aliqui [a]polygonaton appellãt, alij cynochalen, alij herculeam, alij asphaltion, alij chiliophyllon, *quasi millefolium*, alij clema, *hoc est, viticulã*, alij [b]polycarpon, alij carcinethron, alij teuthalida, alij [c]myrtopetalon, alij clinopodion, alij zaritheam, alij pedalion, Ægyptij thephin seu stemphin, Prophetæ genituræ herois, seu vnguem muris, Latini sanguinalem, aut [d]scorpinacam seu proserpinacam, Aphri chulum.

[a] frequentibus genuculis seu internodijs.
[b] copia fructus.
[c] folio myrti.
Quid scorpionibus opportunè adamussim.

De Polygono fœmina.

Latinis sanguinalis seu sanguinaria dicitur.

[d] splendo sanguinis.

De Clematide.

Aliqui philetærium vocant.

De Clematide altera. Cap.

Clematidem alteram sunt qui epigetida vocent: Ægyptij phylacuũ, Romani ambuxum. Viticulam ex sese mittit rubentem, vitilium modo lentam, folium gustãti perquàm acre, vt etiam exulceret: arboribus in modum similacis sese aduoluit. Huius semen tritũ ex aqua aut hydromelite potum, per inferna pituitam & bilem educit. Pellunt verò lepras folia emplastri modo imposita. Cæterùm cum lepidio condiuntur, seruantúrque ad cibos.

Primam hanc clematidem ponit Byzantinus codex.

De Symphyto altero.

Latini solidaginẽ seu cõsolidam.

De Staebe.

Quidam stœbium, Latini stupam appellant.

De Clymeno.

Alij calycanthemon, alij periclymenon, alij heliophyes, *quasi solis plantam*, nonnulli hepatitin, alij smilacem, alij anatolicon, alij dyticon, alij merginem, Latini volucrũ, seu volucrum maius, Ægyptij oxiui: clymenon, alij clymenium, quod & [e]agonon nuncupant.

Alid μικρὸν

[e] sterilitatẽ inducat quãquam alij periclymeno magis conueniat.

De Periclymeno.

Aliqui æginen, alij clymenon, alij carpathum, alij splenium, alij hepatitin, alij helxinen maiorem, alij clematitin, alij myrsinen, alij calycanthemon, Prophetæ pileum Veneris, Ægyptij turcum, Romani volucrum maius, Aphri lanath appellant.

De Tribulo.

Aliquibus bucephalus, aliis tauroceros, Latinis tribulus aquaticus dicitur.

De Sarxiphago. Cap.

Sarxiphagon, aliqui ſaxifragum, alij empetron, Romani ſaxifragiam vocant. Frutex eſt ſurculoſus in petroſis & aſperis locis naſcens, epithymo ſimilis. Coctus in vino, mox potus, febricitantibus opitulatur, itémque vrinæ ſtillicidio ac ſingultui prodeſt: calculum quoque in veſica frangit, vrinásque ciet.

De Limonio.

Aliquibus potamogeton appellatur, aliis lõchitis, aliis rapionium, Myſis mendruta, Syris Meüda, aliis lycoſemphyllon, aliis helleboroſemata, alijs ſcyllion: Magis cor lupi, Romanis veratrum nigrũ, ſeu tintinabulum terræ, Gallis iumbartũ, Dacis dacina.

De Lagopode.

Aliqui leporis cuminum vocant.

De Medio.

Aliqui Medicam appellant, alij trifoliũ, alij clematon, alij oſmon, quidam trigonon, alij cybellium, alij polyphyllon, *quaſi multifolium*, Romani trifolium odoratum, Ægyptij epaphon.

De Epimedio.

Ab aliis erineos, *hoc eſt*, caprificus, ab aliis thrias, à nonnullis polyrhizon, à Romanis vindicta nominatur.

De Xiphio.

Aliqui anactorion, alij arion vocant, Romani gladiolũ ſegetalem.

De Sparganio.

Aliqui xiphidion, alij bolon appellant.

De Xyride.

Ab aliquibus iris agria, ab aliis cactos, à Romanis gladiolus ſeu iris agreſtis, à Dacis aprus dicitur.

De Anchuſa.

Aliqui catanchuſan vocant, alij Libycam, alij archibellion, alij alcibiadion, alij onophyllon, alij porphyrida, alij myduſam, alij ſalycem, alij nonean, Aphri buineſath.

A Ib.g. τείβολος,

ⓐ δέ, βουκέφαλος, ⓐ δέ, ταυρόκερως, Ρωμαῖοι τρίβολον ἀκουάτικον.

251.d. ἄρπυ.

Περὶ Σαρξιφάγου. Κεφ.

Σαρξίφαγον, οἱ δέ, σαρξίφραγμον, οἱ δέ, ἔμπετρον, Ρωμαῖοι σαξιφράγια. Θάμνος ὅστι φρυγανώδης, ὁμοίως πίτυος καὶ πρασχίοις τόποις φυόμενος ἐμφερής. Δύναμιν δὲ ἔχει ἐφθεῖσα ἐν οἴνῳ καὶ πινομένη πυρέσσουσι βοηθεῖν, στραγγουρίᾳ τε καὶ λυγμῷ λίθους τε τοὺς ἐν κύστει θρύπτειν, καὶ οὖρα ἄγειν.

B

V. addit τὸν δίψαν. & sic quoque legũt Marc. Com. & Rellius. Cord. & Dodon. δίψαν. Paulus γλάγος, hoc eſt, pulegio, affimilat.

Ib.c. νυμφαίας,

C ⓐ δέ, πολυμοιρίτων, οἱ δέ, λογχῖτις, οἱ δέ, ῥαπιονοῖον, Μυσοὶ μυοῦρον, Σύροι μεύδα, οἱ δέ, λυκοσέμφυλλον, οἱ δέ, ἑλλεβοροσήματα, οἱ δέ, σκύλλιον, Προφῆται λύκου καρδία, Ρωμαῖοι βάρτυμ νίγρυμ, οἱ δέ, τιντιναβοῦμ τέρρας, Γάλλοι ἰαμβαροῦμ, Δακοὶ δάκινα.

D Ib.f. Λαγώπους,

οἱ δέ, λαγωὸν κύμινον καλοῦσι.

Ib.g. Μήδιον,

οἱ δέ, Μηδικήν, οἱ δέ, τρίφυλλον, οἱ δέ, κλημάτιον, οἱ δέ, ὄσμιν, οἱ δέ, τρίγωνος, οἱ δέ, κυβέλλιον, οἱ δέ, πολύφυλλον. Ρωμαῖοι τριφόλιουμ ὀδοράτουμ, Αἰγύπτιοι ἔπαφον.

E

252.b. Ἐπιμήδιον,

οἱ δέ, ἐρινεός, οἱ δέ, θρίας, οἱ δέ, πολύριζον, Ρωμαῖοι οὐινδίκτα.

Ib.d. μαχαιρώνιον,

οἱ δέ, ἀνακτόριον, οἱ δέ, ἄριον, Ρωμαῖοι γλαδιολαμ, οἱ δέ, γλιτζάλεμ.

F Ib.g. Σπαργάνιον,

οἱ δέ, ξιφίδιον, οἱ δέ, βολὸν καλοῦσι.

253 a. Ξυρίς,

ⓐ δέ, ἶρις ἀγρία, οἱ δέ, κακτός, Ρωμαῖοι γλαδιόλους, οἱ δέ, ἶρις ἀγρέστις, Δακοὶ ἄπρεγις.

Ib.d. ἀνόχλειαν.

οἱ μὲν καταγχόνην, οἱ δέ, Λιβυκήν, οἱ δέ, ἀρχιβέλλιον, οἱ δέ, ἀγκιβιάδιον, οἱ δέ, ὀνόφυλλον, οἱ δέ, πορφυρίς, οἱ δέ, μύδουσαν, οἱ δέ, σάλυξ, οἱ δέ, νωνέαν, Ἀφροὶ βυινεσάθ.

254.f. χιβιάδιον, A

Ρωμαῖοι ἀλκιβίαδεμ.

255.b. φιλεταίειον,

Οἱ δὲ, καὶ ταύτῃ ἔχειν καλοῦσιν, οἱ δὲ, σκορπίουρον, οἱ δὲ, σπάργανον, οἱ δὲ, ἀλθαίαν, οἱ δ', ἀμάραντιδα, οἱ δὲ, προβατεῖαν, οἱ δὲ, ἐλαφίον, οἱ δὲ, ἀντίμιμον, οἱ δὲ, πορφυρίδα, οἱ δὲ, αὔγιον, οἱ δὲ, νεμέσιον, οἱ δὲ, B ὑαινόφολον, οἱ δὲ, θυρσίτιν, οἱ δὲ, θερμουτίν, οἱ δ', μισόπαθος, Ρωμαῖοι ὠκιμαστρυμ.

1b.c. Εεινος,

οἱ δὲ, ὠκιμοειδὴς, οἱ δὲ, ὑδρηρόν, Ρωμαῖοι ὤκιμουμ.

1b.e. Αγρωστις,

οἱ δὲ, αἰγικόν, οἱ δὲ, ἀμαξίτις, Αἰγύπτιοι ἀνουφὶ, Ρωμαῖοι γραμμὴν, οἱ δὲ, ἀσυφύλιουμ, οἱ δὲ, σαγγουινάλεμ, οἱ δὲ, ὐνίολαμ, Ἰσπανοὶ ἀπαρία, Δακοὶ κθιαζα, Αφροὶ ιεβάλ. C

256.c. ἡρακλέα,

Προφῆται γένον, οἱ δὲ, αἷμα Τιτάνου, οἱ δὲ, ὄρχιν σκορπίου. Πυθαγόρας πάρμιον, Ανδρέας ξανθοφανέα, Οσθάνης βουφθαλμον, Αἰγύπτιοι σενδιονὼρ, Ρωμαῖοι οὐερβούμουμ, οἱ δὲ, σολεάστρουμ, Αφροὶ σὺδηδων. D

Oribas. cap. de hydrophob. etiã dixerat vocari testatur, quod cõtra rabiosi canis morsum etiam nunc sola iuuet.

257.a. σιδηρῖτις,

Ⓐ δ', μυριόμορφον, οἱ δ', χιλιόφυλλον, οἱ δ', στρατιωτικὸν, οἱ δ', ἡρακλέον, Ρωμαῖοι E συνοφρύλιαμ Βένερις, Ⓐ δ', ἄκορμ στλατίκουμ, οἱ δ', μιλιτάρεμ, Ⓐ δ', μιλεφόλιουμ, Αφροὶ ἀστὴρ χλλός.

Apul. μυριόφυλλον

1b.d. Βάτος,

Ⓐ δ', κυνόσβατον, οἱ δὲ, σελινοείτιον, οἱ δ', ἀσυντρόφον, Προφῆται αἷμα Τιτάνου, οἱ δ', αἷμα ἴβεως, Ρωμαῖοι σέντις, οἱ δὲ, F ρούβουμ, Ⓐ δὲ, μόρα βαλικανέα, Δακοὶ μαντῖα, Αἰγύπτιοι αἵμοος, Ⓐ δὲ, ἄμετος.

Apul. syntrophum.

258.a. Ελξίνη,

Ⓐ δ', ἑλκτὴν, οἱ δὲ, καμοχερσαίαν, οἱ δ', ἀμελξίνην, οἱ δ', θυσίνην, οἱ δ', ἀμοργίνην, Ⓐ δ', σουκόταχος, οἱ δὲ, ψυχεύαχος, οἱ δὲ, G μελάμπελον, οἱ δ', κισσάμπελον, Ⓐ δὲ, κισσάμηδοι, οἱ δ', ἀνατομαλθίον, Ρωμαῖοι βουλυτουλαπάθου, Αἰγύπτιοι ἅπαπ.

De Echio.

Latinis alcibiacum dicitur.

De Ocimoide.

Sunt & qui hanc echion appellent, alij scorpiuron, alij sparganon, alij althæam, alij amaranthida, alij probatæam, alij elaphion, alij antimimon, alij porphyridem, alij augion, alij nemesion, alij hyænopsolon, *quasi hyænæ nudatam glandem*, alij thyrsiten, alij thermutin, alij misopathos, Romani ocimastrum.

Quid fortasse sit verbum sacratum sit.

De Erino.

Aliqui ocimoides, alij hydreron, *quasi aquaticam herbam*, Romani ocimum appellant.

De Gramine.

Aliqui ægicon, alij amaxitin, Ægyptij anuphi vocant, Romani gramen seu asfetolium, seu sanguinalé, aut vniolam, Hispani aparian, Daci cotiata, Aphri iebal.

De Sideritide.

Prophetæ genituram aut sanguinẽ Titani, alij scorpionis caudam, Pythagoras parmiron, Andreas xãthophanea, Osthanes buphthalmum, *hoc est, bouis oculum*. Ægyptij sendionor, Romani vertumnũ seu solastrum, Aphri vdedonin.

De Achillea.

Aliqui myriomorphon nominãt, alij chiliophyllon, alij stratioticon, alij heracleon, Romani superciliũ Veneris seu acorum syluaticum, alij militarẽ, alij millefolium, Aphri asterchillos.

De Rubo.

Alij cynosbaton, *quasi canis rubum*, nominãt, alij selinoition, alij asyntrophon, Prophetæ Titani seu ibis sanguinem, Romani sentem seu rubum, alij mora vaticana, Daci mantiam, Ægyptij hæmoos seu ametros.

De Helxine.

Sunt qui helitin, *quasi palustrẽ* vocant, qui canocherſæam, qui amelxinen, qui cusinen, qui amorginen, qui sucotachon, qui psychuacon, qui melampelon, qui cissampelon, qui cissanthemon, qui anatetamenon, Romani volutumlaparon, Ægyptij hapap.

Hic hyatus de helxine altera capitis integrum, quod quæ lib. 4. cap. 86 habetur, huic expungendum censemus.

De EVpatorio.

Aliis hepatorium seu hepatitis, Romanis volucrum manus.

De Quinquefolio.

à quinis foliis diuersum.

Aliqui pentapetes, alij pentatomon, alij pentadactylon, alij pseudoselinō, alij callipetalon, alij xyloloron, alij xyloperalon, alij asphaltion, alij pentacœnō, alij thymiatin, Ægyptij orphitebeocen seu enothron, Prophetæ ibis vnguē aut alam, alij hermodactylon, Romani quinquefoliū, Galli pempedulam, Daci propedulam appellant.

De Phœnice.

Alij phœnicopteron, alij rhun stachyos, *quasi fluxam spicę*, alij osthalen, Romani loliū seu hordeum murinum; Ægyptij athnon nominant.

De Rhodia radice.

Alij rhodida nuncupant.

De Equiseto.

Vere ipse cacumina, à fructus in quibus nascuntur.

Aliqui trimachion, alij anabasin seu anabasion, alij charadranon, alij phædran, alij iteandendron, *quasi juligenam arborem*, alij gis, alij schœnioſtrophon, alij ephydron, *quasi aquatum*, vocāt, Ægyptij pherphra, Prophetæ, Saturni cibum, Romani equinalem, seu salicem equinalem.

quod ex ea velut funiculi intorqueri possint.

à loco natali.

De equiseto altero.

Aliqui equitium, alij chedran, alij gynon, Romani salicem equinalem appellant.

De Tragio altero.

Aliqui tragon, alij tragocerota vocant, alij scorpion, alij garganon, Latini cornulacam, seu bituensam, Daci saliam, Ægyptii sopher, Aphri achiosim.

De Iunco.

Aliquibus schœnos leia *Iuncus levis*, aliis oxypternos, aliis Solis supercilium, Romanis iuncus marinus seu manualis, Aphris chudua.

De Paronychia.

Aliquibus adocetos, aliis neuras, aliis phrynion, Romanis vnguinalis dicitur.

De Chrysocome.

Quibusdam chrysitis dicitur, aliis chrysanthemon, alius amarantus, aliis Dios pogon, Latinis Iouis

A lb.d. Ηυπατώειον,

ⓓ δὲ, ἡπατώριον, οἱ δὲ, ἡπατῖτις, Ρωμαῖοι ὑόλευκρεμμύοις.

lb.g. Πενταφύλλον,

οἱ ϑ', πενταπετὲς, οἱ ϑ', πεντάτομον, οἱ δὲ, πενταδάκτυλον, οἱ δὲ, ψευδοσέλινον, ⓓ ϑ', καλλιπέταλον, ⓓ ϑ', ξυλόλωζον, οἱ ϑ', ξυ- Forte ξυλόλοπον

B λοπίταλον, οἱ ϑ', ἄσφοδλοι, ⓓ ϑ', πενταέχινον, οἱ δὲ, θυμιατῖτις, Αἰγύπτιοι ὀρφιτεβεώκη, οἱ δὲ, ἔνωθρον, Προφῆται ἴβεως ὄνυξ, οἱ δὲ, πτερὸν ἴβεως, οἱ δὲ, Ἑρμοδάκτυλον, Ρωμαῖοι κυπρεφόλιον, Γάλλοι πεμπέδυλα, Δακοὶ τὰς πεδυλέ. Κυρὶ δακτύλου, Λέσιος.

259.f. ἀγχόπα,

C οἱ δὲ, φοινικόπτερον, ⓓ ϑ', ῥοιῶ σάχυς, οἱ ϑ', ὀαθάλιον, Ρωμαῖοι παλλοκυκυπίνουμ, Αἰγύπτιοι ἄθνον.

260.b. Ροδία,

οἱ δὲ, ῥοδίδα.

lb.c. Ἱππουρις,

οἱ ϑ', τριμάχιον, οἱ δὲ, ἀναβασις, οἱ δὲ,

D χερέδρανον, οἱ δὲ, Φαίδρα, ⓓ δὲ, ἱπποσίδηρον, οἱ δὲ, γής, οἱ ϑ', χρησίστροφον, Αἰγύπτιοι φερφερὰ, Προφῆται Κρόνου ζοφὴ, Ρωμαῖοι ἐκινάλις, οἱ δὲ, σάλιξ ἐκινάλις, ⓓ δὲ, ἀναβάσιον, οἱ δὲ, ἔφυδρον καλοῦσι.

lb.f. ἔτιος,

E αἱ δὲ, ἐκύπτιον, οἱ δὲ, χέδρας, οἱ δὲ, γύνον, Ρωμαῖοι σάλιξ ἐκινάλις. Forte γυναῖκα-νον, vt antè.

261.d. ἀγών,

οἱ δὲ, τράγος, οἱ ϑ', τραγόκερως, ⓓ δὲ, σκορπίον, οἱ δὲ, γάργαμον, Ρωμαῖοι κορνιλάκα, οἱ ϑ' βιτυένσα, Δακοὶ σαλία, Αἰγύπτιοι σοφὲρ, Αφρὶ ἀχιοσίμ.

F 262.a Σχοῖνος,

οἱ δὲ, σχοῖνος λεία, οἱ δὲ, ὀξύπτερνος, οἱ ϑ', ὀφρὺς ἡλίου, Ρωμαῖοι ἰουγκουμ μυρίνεμ, ⓓ δὲ, ἰουγκουμ μανουάλεμ, Αφρὶ χουδουα.

lb.c. Παρωνυχία,

οἱ δὲ, ἀδάκτυος, οἱ δὲ, νευρὰς, ⓓ δὲ, φρυνίον, Ρωμαῖοι βυινάλις.

G lb.f. χρυσοκόμη,

οἱ δὲ, χρυσῖτις, οἱ ϑ', χρυσάνθεμον, οἱ δὲ, ἀμάραντον, οἱ ϑ', Διὸς πώγων, Ρωμαῖοι Ιόβις Paul. χρύσανθος

βάρβα, Αφροὶ δυβάθ, ⓐ δέ, βουρχουμάθ. A barba, Aphris dubath, aliis burchumath.

lb. Χρυσόκομα,

οἱ δέ, χρυσόσπερμον, οἱ δέ, δάσπιν, οἱ δέ, ὀρίγανον, οἱ δέ, ἀρκόφθαλμον, Ρωμαῖοι ἀουρέλιαν.

Ibidem.

Sunt qui chrysospermon vocẽt, *quasi aureo semine præditã*, alij daspin, alij origanon, alij arcophthalmon, *quasi vrsi oculum*. Romani aureliam.

263.c. βόφθαλμον,

οἱ δέ, χαλκῖτιν, οἱ δέ, χάλκανθον, οἱ δ' B χαλκάνθεμον, Ρωμαῖοι ἄλθαν, Θοῦσκοι γαρύλεουμ, Αφροὶ χυρζῆτα.

De Chrysanthemo.

Aliqui chalcitin vocant, alij chalcanthum, alij chalcanthemon, Romani caltham, Hetrusci garuleum, Aphri churzetan.

264.b. Περιστερεών,

Ald. cod. addit. ὑγιὲς - οἱ δ' ἀστερεμὸν, οἱ δ' ὑγιὲς.

οἱ δέ, πτυγόνιον, ⓐ δέ, βύνιον, οἱ δ', ἱερὰ βοτάνη, οἱ δέ, φιλτροδότης, Αἰγύπτιοι πεμψεμπτέ, Προφῆτις Ηρας δάκρυον, οἱ δέ, αἷμα γαλῆς, οἱ δ' αἷμα Ερμοῦ, Ρωμαῖοι C κρίσα γαλλιάκεα, ⓐ δέ, φάσια, οἱ δέ, ξυξαλὶς, οἱ δέ, ἐξούπερα, οἱ δέ, ἕρβα σαγγουινάλις.

De Peristereone.

Aliqui peristerion, *hoc est, columbinam* alij trygonium, alij bunion, alij hieran botanen, *hoc est, herbam sacra*, alij philtrodoten nominãt: Ægyptij pemptempte, Prophetæ lunonis lacrymam, alij mustelæ sanguinem, alij Mercurij sanguinẽ, Romani cristam gallinaceam, alij ferream, alij trixalin, alij exuperam, alij denique herbam sanguinalem.

quasi sit columbinum pabulo.

lb.d. ἐκάλεσαν.

Ald. cod. ἀκτιγρικὸν ὑπῆρον, οἱ δ', ἱερὰν Ζοτανὴν οἱ δέ, περιστερεῶνα.

"ⓐ δ', πεπλῆον, οἱ δ', χαμαίλυκον, οἱ δ', σιδηρεῖτιν, ⓐ δ', κουρεῖτιν, ⓐ δ', Φεροτεφόνιον, οἱ δέ, Διὸς πλακάτιν, οἱ δ', δίχρωμον, οἱ δ', κόλλητον, οἱ δέ, ἱππάριστον, ⓐ δέ, Δημητριάδα, Αἰγύπτιοι πεμφθεφθάμ, Πυθαγόρας ἐρυσίσκηπτρον, Ρωμαῖοι κιγκινάλις. D

De Hierabotane.

Alij erigenion, alij chamælygon, *quasi humile vimen*, alij sideritin, alij curitin, alij Pherſephonion *i. Proserpinacam*, alij Iouis colũ, alij dichromon, alij collerin, alij cyparisson, alij Demetriada, Ægyptij pemphthemphtham, Pythagoras erysiceptron, Romani cincinnalem vocant.

Apul. χαμαιλυκον. Apul. σιδ' χρωμον. Apul. κολλητον.

265.a. Ἀστράγαλος,

ⓐ δέ, χαμαισύκη, οἱ δ', ὄνυξ, οἱ δέ, γατάλης, Ρωμαῖοι πίνουμ τρίβιαμ, ὁμοίως φίκουμ τέρρας, οἱ δέ, γλανδουλαμ, οἱ δέ, ἰοῦμ, οἱ δέ, νεναρίαν. E

De Astragalo.

Aliqui chamæsycen, alij onycha, alij gatalen vocant, Romani pinum triuium, similiter & ficum terræ, alij glãdulam, alij ralũ, alij nonariam.

lb.c. Υάκινθος,

οἱ δέ, ἑλωνιάν, οἱ δέ, πορφυρανθές, Ρωμαῖοι βάκκινουμ, οἱ δέ, οὐλκίνουμ.

De Hyacintho.

Nonnulli heloniam, alij porphyranthes, Romani vaccinium, alij vlcinum vocant.

lb.c. Ῥοιάς,

Marc. ἐξύτονον. Sic etiam Corn.

οἱ δέ, ὀξύτονον, Ρωμαῖοι παπαβερσέλις, Αἰγύπτιοι ναθί. F

De Papauere erratico.

Aliqui oxytonon, Romani papaueralem, Ægyptij nanti nominant.

266.b. Ἥμερος,

οἱ δ', χαμαισύκλιν, οἱ δέ, μήκωνα ῥοιάς, οἱ δέ, ὀξύτονον, Ρωμαῖοι παπάβερ, Αἰγύπτιοι νάνθι.

De Papauere satiuo.

Sunt qui chamæsycen vocent, *quasi ficum humilẽ*, alij mecona rhœada, *hoc est, papauer erraticum*, alij oxytonon, Romani papauer, Ægyptij nanti.

268.b. Ἁλιάστου,

Ρωμαῖοι φάβουλουμ μαρίνουμ, Αφροὶ σιμαίκα. G

De Cornuto papauere.

Latini fabulum marinũ, Aphri sisimaca vocant.

lb.c. ἐμφέρεται.

ἐσ δὲ τὰ βρωθλιῶν ἢ πόδας τούτων

Ibidem ad calcem:

Ab huius corniculati papaueris

esu potúve eadem planè inferũtur symptomata, quæ ab hausto opio. Sed & isdẽ succurritur auxiliis. Semen æstate dum siccum est colligitur. Radicis verò decoctum ex vino bibitum, sanat dysenteriam.

De Apollinari.

Quidam dioscyamum, *quasi louis fabam* alij pythonion, alij adamantẽ, alij adamenon, alij hypnoticon, *hoc est somnificum*, alij emmanes *i. furialem*, alij auginon, alij dithyrambion vocant. Pythagoras & Osthanes xyleona, Zoroastres ryphonion, Latini insanam aut dentariam, alij apollinarem, Prophetæ rhaponticũ, Ægyptii saphtho, Hetrusci fabuloniam, Galli belinuntiã, Daci dieliã.

A πλὼ κεραπῖνι μίκωνα, ὅπι φέρονται δοκὰ καὶ τῷ ὀπῷ τῆς μήκωνος συμπίνοντες. καὶ τοῖς αὐτοῖς ἰσχυρῶς βοηθήμασι. σπυάλεται δὲ ὁ καρπὸς ὡς ἥλιος ξηρός. Τὸ δὲ ἀφέψημα τῆς ῥίζης πίνεται μετὰ οἴνου, καὶ ἡραπτὰ δυσεντερίας.

269.b. Υοσκύαμος,

B οἱ δέ, διοσκύαμος, ⓐ δέ, πυθώνιος, οἱ δέ, ἀδαμαντία, οἱ δέ, ἀδάμενον, οἱ δέ, ὑπνωτικόν, οἱ δέ, ἐμμανές, οἱ δέ, ἄτομον, οἱ δέ, διθύραμβον. Πυθαγόρας, Προφῆται, Ὀσθάνης ξυλέων, Ζωροάστρης τυφώνιον, Ρωμαῖοι insanam herbam, ⓐ δέ, ἀπολλινάρις, Προφῆται ῥαπόντικὴν, Αἰγύπτιοι σαφθώ, Θοῦσκοι φασουλώνιαν, Γάλλοι βιλινουντίαν, Δακοὶ δίελφαν.

Forte, ἀσπιστὸν apud Apul.

C

270.d. Ψύλλιον,

οἱ δέ, καταφόρεως, οἱ δέ, κυνοκεφάλιον, οἱ δέ, χρυσάλιον, οἱ ὃ, κυνόμυια, οἱ ὃ, ψύλλερις, οἱ δέ, Σικελιωτικὸν, οἱ δὲ Σικελὴ χενιδίς, Ρωμαῖοι σιλβάτικον, οἱ δέ, ἕρπυλλον πουλικάρια, Αφροὶ σαργαγεβούμ.

D

271.a. κηπαῖος,

οἱ δέ, ἄμερον, Ρωμαῖοι τρόμυμ, ⓐ δέ, κεκυβαλὸν, Αἰγύπτιοι ἀμηλώ, Γάλλοι σκύβουλουμ, Αφροὶ ἀτριμουνίμ.

Forte κυκαλὸν vt Apul.

Ib.c. ἀλικάκαβον,

οἱ δὲ, ὄρμινον, οἱ δὲ, τρύχνον μανικὸν, ⓐ δὲ, δορύκνιον, οἱ δὲ, καλλιάδα, Ρωμαῖοι ἀπολλινάρις μίνορ, οἱ ὃ, ἕρπυλλον αὐλιακὸν, ⓐ δὲ, ὀψάλιον, Δακοὶ κυκωλίδα, Αφροὶ κακαβοῦμ.

E

Al. ὄρμινον. οἱ ὃ, τρυχνὸν, οἱ ὃ, κυκαλὸν.

Al. κυκωλίδα.

272.d. Ὑρύον,

ⓐ δὲ, ἀνύδρον, οἱ δὲ, πενταδρύον, οἱ δὲ, ἔνορον, οἱ δὲ, ὀρθόγυον.

F

273.c. κυκλάμινος,

οἱ δὲ, χάρακον, οἱ δὲ, ξηρόφθη, οἱ δὲ, ἀνθρώπιον, οἱ ὃ, ἀντίμιον, οἱ ὃ, βομβοχύλιον, οἱ ὃ, μῆνον, Αἰγύπτιοι ἀπεμὼμ, Πυθαγόρας ἀνθρωπόμορφον, οἱ ὃ, ἀλοίτην, οἱ ὃ, θριδακίαν, οἱ δὲ, κάμμαρον, Ζωροάστρης ἀφέμενον ἢ ἀχχίλιον, Προφῆται ἡμιόνους, οἱ ὃ, γονογεώνας, Ρωμαῖοι μάλα κανίνα, οἱ δὲ, μάλα τερρέστρια.

G

quid aquosa dicta minimè intelligi

quid radix hominis figuram repræsentes à folio latuca

De Solano hortensi.

Alij satiũ seu domesticũ cognominant, Latini strumam, alij cacubalum, Ægyptii allelo, Galli scubulum, Aphri astrismunim.

De Solano halicacabo.

Nonnulli dircæon appellant, alij strychnon manicon, *hoc est, solanum furiale*, alij dorycnion, alij callaïda, Romani apollinarem minorẽ, seu herbam vaticam, alij opsaginẽ, Daci cocalida, Aphri cacabum.

De Solano manico.

Alij anydron, alij pentadryon, alij enoron, alij orthogyion vocant.

De Mandragora.

Alij circæon, alij xeranthen, aliqui antimnion seu antimion, alij bombochylon, nonnulli minon, Ægyptii apemũ, Pythagoras anthropomorphõ, alij aloëten, alij thridacian, alij cammoron, Zoroastres diamonon seu archinen, Prophetæ hemionous aut gonogeonas, Romani mala canina seu mala terrestria.

De Aconito altero.

Alij cyamon leucon, *hoc est, fabam candidam*, Romani colomestrum.

275.f. λευκοκύαμος,

οἱ ὃ, κύαμος λευκὸς, Ρωμαῖοι κολομέστρουμ.

176.a. κώνειον,

Ⓐ δὲ, αἴγινος, οἱ δὲ, ἤθουσα, οἱ δὲ, ἀπολήθουσα, Ⓐ δὲ, δολία, οἱ δὲ, ἀμαύρωσις, οἱ δὲ, παράλυσις, Ⓐ δὲ, ἄφρων, Ⓐ δὲ, χρήσιμον, Ⓐ δὲ, κρίτιλον, Ⓐ ἢ, κατηχούμενον, οἱ ἢ, ἀβίωτον, οἱ ἢ, ἀψευδὴς οἱ ἢ, ἀγεώμορον; οἱ δὲ, ἴμωρον, Ⓐ ἢ, πολυανώδυνος, οἱ δὲ, δαρδάνις, οἱ ἢ, καταψυξις, Οσθάνης βαβαθυ, Αἰγύπτιοι ἀπεμφὶν, Ρωμαῖοι κικούταμ.

Cer. κρήσιμον

1b.f. κωνοκράμβη,

οἱ δὲ, κωνοκτόνον, οἱ δὲ, φάλεως, οἱ δὲ, κυνάγχη, οἱ ἢ, ὀλίγωρος, οἱ δὲ, ἱππομανὲς, οἱ δὲ, ὄνιτις, οἱ ἢ, ὀσφιοσκόροδον, οἱ δὲ, κυναρικὴ, οἱ ἢ, ἐλαφοσκόροδον, Προφῆται παράλυσις, Ρωμαῖοι βρασικὰ ῥύστικα, οἱ δὲ, χαμίνα.

277.b. ῥοδόδενδρον,

οἱ δὲ, σπόγγος, οἱ δὲ, αἱμοστατεὶς, Ρωμαῖοι ῥοδενδρον, Λευκαῖοι ἰκμανὴ, Αἰγύπτιοι σπιγφὶ, Αφροὶ ῥοδοδάφνη.

278.a. ἄγχειον,

Ρωμαῖοι βοὸς λοβοὶς ἀγρέστις.

279.b. σῦκα,

Ⓐ δὲ, αἰθύλλιον, οἱ ἢ, μυόρτοχον, οἱ ἢ, μυορτόσπλινον, Ρωμαῖοι μοῦρες ἀνειχουλα, Αφροὶ χαβοδολαβάτ.

Hic demum ordo legebantur synonyma quæ ante hebetatæ cicutæ exemplo attributa sunt: ideóque ea expungere visum est.

1b.d. πελμάτιον,

οἱ δὲ, φακὸς ἄγχειος, οἱ δὲ, ὀπτασίεον, Ρωμαῖοι βιπτερόλις, οἱ ἢ, ἰκμοσμύγδινος.

1b.e. μύγα,

οἱ δὲ, ἀειθαλὲς, οἱ ἢ, ἀμβρόσιον, οἱ ἢ, χρυσόσπερμον, οἱ ἢ, ζωόφθαλμον, Ⓐ δὲ, βουόφθαλμον, οἱ δὲ, στρογγύλον, οἱ δὲ, αἰώνιον, οἱ ἢ, ἀείζωον, οἱ ἢ, ὁλόχρυσον, οἱ ἢ, χρυσάνθεμον, οἱ ἢ, πρωτόγονον, οἱ ἢ, βόειος, οἱ ἢ, ἰώνιος, Προφῆται πρώνυχία, Ⓐ δὲ, χρυσῖτις, Ρωμαῖοι κεκακαύασπα, οἱ ἢ, ἰόβις καύλις, οἱ ἢ, λεαπετὶς, οἱ δὲ, συδαμμούρ, Αἰγύπτιοι παμφάνης.

280.b. πικρὸν,

Ⓐ δὲ, πτερόφυες, Ⓐ ἢ, βρέτιον, οἱ δὲ, ῥοδοβρίον, οἱ δὲ, χρόβυσον, Ⓐ δὲ, χιμεριανὸν, Ⓐ δὲ, καραυία, Ρωμαῖοι βιτάλις, οἱ ἢ, ἕρπα σεμπερβίβα, Αἰγύπτιοι πικελλία.

De Cicuta.

Aliquibus cynos, aliis ethusa, aliis apolegousa, aliis dolia, aliis amaurosis, aliis paralysis, alius aphrō, quibusdam creidion, alius cœte, aliis catechomenion, alius abiotō, alius apseudes, alius ageomoron, alius timoron, aliis polyanodynos, alius dardanis, aliis catapsyxis, Osthani babathy, Ægyptius apemphin, Latinis cicuta dicitur.

Plerag. hanc denominationem ... ipsius qui venenum ... sequitur, desumuntur.

De Apocyno.

Alij cynoctonon aut cynanchen, alij phalcon, alij oligoron, alij hippomanes, alij onitin, alij ophioscorodon, alij cynarican, alij elaphoscorodon, Prophetę paralysin, Latini brassicam rusticam seu caninam appellant.

quid causæ ... venit.

De Nerio.

Aliis spongos, aliis hæmostaris, Romanis rhododendron, Lucanus icmane, Ægyptiis scinphe, Aphris, &c.

De Colchico.

Latinis bulbus agrestis.

De Alsine.

Alij anthyllion, alij myortochon, alii myortosplenon, Latini muris auriculam, Aphri labotholabat.

De Lenticula palustri.

Aliis phacos agrios, *hoc est, lens palustris*, aliis epipteron, Latinis viperalis, aliis iceosmigdonos.

De Semperuiuo magno.

Aliqui aithales, *quasi semper uiréś*, alij ambrosion, *quasi immortale*, alij chrysospermō, alij zoophthalmō, seu bouophthalmū, *quasi animantis aut bouis oculū*, alij stergethrō, *quasi amorificū*, alij çonion, *quasi semiternū*, alij aïchrysoń, seu holochrysson aut chrysanthemō, alij protogonō, *quasi primogenitū*, alij borion, alij notion, Prophetæ paronychian, aut chrysitin, Romani ceracusiam, seu louis caulem, alij leapetes, alij sedū manus, Ægyptij pamphanes nominant.

ab auro formosum.

à præcunitate fru ductum ... ab auro flore.

alij caulem.

De Semperuiuo paruo.

Alij petrophyes, *quasi in petris nascí solitum* appellant, alij brotion, alij theobrotion, *quasi à dys dictum nominibus*, alij crobyssion, alij chimerinen, *quasi hyemalem*, alij ceraunian, Latini vitalem seu semperuiuam, Ægyptij etiicelta.

quid imaginem petræ innuat.

Ad cal-

Ad calcem eiusdem capitis.

Semperuiuum quod tenui constat folio, aliqui aïzoon paruum, alij petrophyes, *quasi in petris nascens*, alij aïzoõ syluestre, Latini semperuiuum minus appellant.

De vmbilico Veneris.

Quid sint ysse ad conciliandos amores. Aliis hortus Veneris, aliis terræ vmbilicus, aliis stichis, aliis stergethron, Latinis vmbilicus Veneris dicitur.

De Vmbilico Veneris altero.

quod quidam cymbalium seu cymbalariam appellant.

De Vrtica.

ab vrendo, vel Græci ab excitando prurigine. Alij adicen, Latini vrticam, Ægyptij selepsion, Daci dyn appellant. Alteram etiam acalyphē aliqui cniphen, Latini vrticā mollem vocant.

De Galiopsi.

quasi mastiola ocalem. Alij galephos, Ægyptij Æthopi, Latini vrticam labeonem.

De Senecione.

Aliis erechthites, Latinis herbulum aut senecio.

De Musco marino.

Aliqui ballarin, alij iranen, Romani gnomenfilum vocant.

De Potamogetone.

Nisi mauis ita scribere corrupto a Græco vocabulo. Aliis stachvites, quasi spicat Latinis fontalis seu fontinalis, Ægyptijs ethenchis.

Ad calcem cap. de Potamogetone.

Est & alter Potamogeton, cui folia similia, at longiora tenuioráque: caulículi itidem similes ac tenues, semine rubente referti. Hoc efficatũ astringit. Tritum verò cum vino potúmque acetabuli mensura, dysentericos ac cœliacos iuuat: sistit & rubentem fluxum muliebrem. Nascitur in aquosis & palustribus.

De Stratiote.

Ægyptij tibus, Prophetæ felis sanguinem.

De Verbasco.

Alij phlonon, Latini verbascum, seu fœminalem vocant.

A

Ib.c. περιστερεών,

Αείζωον τὸ λεπτόφυλλον, οἱ δὲ, ἀείζωον τὸ μακρόν, οἱ δὲ, πετροφυές, οἱ δὲ, ἀείζωον ἄγριον, Ρωμαῖοι σεμπερβίβουμ μίνους.

Ib.c. κυμβάλιον,

Ⓓ δὲ, κύπρος Αφροδίτης, οἱ δὲ, γῆς ὀμφαλός, οἱ δὲ, στιχίς, οἱ δὲ, στέργηθρον, Ρωμαῖοι ὀμβίλικουμ Βένερις.

B

Ib.g. Κοτυληδόνος,

ὅ τινες κυμβάλιον καλοῦσι,

281.b. κνίδη,

Ⓓ δὲ, ἀδίκη, Ρωμαῖοι οὐρτίκα, Αἰγύπτιοι στελέφιον, Δακοὶ δεκὼ. Ἀκαλύφη ἑτέρα, οἱ δὲ, κνίδην καλοῦσι, Ρωμαῖοι οὐρτίκα μόλλις.

C

Ald. κνίφιον.

Ib.f. Γαλεόβδελλον,

Ⓓ δὲ, γαλεφος, Αἰγύπτιοι ἄμβοτι, Ρωμαῖοι οὐρτίκα λαβεώνιμ.

D

282.d. Ἡσιγήρων,

Ita dicitur, quòd verno tempore comedicat eius flos.

Ⓓ δὲ, ἐρυσίθιτης, Ρωμαῖοι ἔρβουλουμ, οἱ δὲ, σενέκιουμ.

283. a. Ἁλόφιτον,

Ⓓ δὲ, βάλλαεις, οἱ δὲ, ἰέρην, Ρωμαῖοι γναμβυσίλου.

E

Ib.d. Ποταμογείτων,

Ⓓ δὲ, σαχύτλιν, Ρωμαῖοι φατάλις, Αἰγύπτιοι ἐθένχις.

283.c. τόποις φύεσθαι.

Ἔστι καὶ Ποταμογείτων ἕτερος. Τὰ φύλλα ὅμοια, μακρότερα δὲ καὶ λεπτότερα. καυλία ὅμοια, λεπτὰ καὶ γόνιμα καρπὸν ἐρυθρόν. ὃς βρωθεὶς σύφορ λεῖος δὲ σὺν οἴνῳ καὶ πολὺς ὀξυβάφου πλῆθος, δυσεντερικοὺς καὶ κοιλιακοὺς ὠφελεῖ. Φ ἐρυθρὸν ῥοῦν γυναικεῖον ἵστησι. Φύεται δὲ ἐν ἐύδροις καὶ ἑλώδεσι τόποις.

Hoc caput reperitur in Sambucis in vetustiss. codice. Aelius codex addit αὐτῷ. Idem addit αὐτῷ

F

G

Ib.e. κελοδόν.

Αἰγύπτιοι πιβοὺς, Γερφῆται αἷμα αἰλούρου.

284.b. Φλόμος,

Ⓓ δὲ, φλόνιν, Ρωμαῖοι βερβάσκλουμ, οἱ δὲ, φημιλαλή.

Gal. φλόμον

285. f. σεσαύσιον, A

Ⓐ δὲ, ἀπήνιλλω, Ρωμαῖοι περσοναάχαμα, οἱ δὲ, λάππαμ.

286. b. ἑλκεσοείνιλλω,

Ald. βόειον. Ⓐ δὲ, βόειον,

Ib. c. Καπνός,

Ⓐ δὲ, χαρυδάλιον ἢ χάειον, οἱ δὲ, χαρυδάλιον ἄγειον, οἱ δὲ, καπνὸς ὁ ἐν ταῖς χριθαῖς, οἱ δὲ, καπνίτης, οἱ δὲ, μυρμυρίτης, οἱ δὲ, καπνογόργιον, οἱ δὲ, χελιδόνιον μικρόν, οἱ δὲ, σφέτιειον, οἱ ὃ, χαυθαεὶς, οἱ ὃ, καλχηρὶ, Ρωμαῖοι ἄπιουμ, οἱ δὲ, φουμάεια, Αἰγύπτιοι κνύξ, οἱ δὲ, τύκιν. B

al. add. οἱ δὲ, καπνίτης. Ald. πασπυρίτης.

Ib. d. τείφυλλον, C

al. τριφύλλιον. Ⓐ δὲ, τειποδίον, οἱ δὲ, τειφόλιον καλοῦσι.

Ib. e. Λίβυον.

ita dictum à loco in quo crescit. Ⓐ δὲ, τείφυλλον, Ρωμαῖοι τειφόλιον μίνους.

Ib. g. Κύπαιρος.

Ⓐ δὲ, τηλίνιλλω, οἱ δὲ, λωτὸν μέγαν, οἱ ὃ, τείφυλλον, Ρωμαῖοι τειφόλιουμ μάϊους. D

287. d. Μυελόφυλλον,

Ⓐ δὲ, μυλλόφυλλον, οἱ δὲ, γραπωπικὴ, οἱ δὲ, Ἀχίλλειος, Ρωμαῖοι μιλεφόλιουμ, οἱ δὲ, σουπερχίλιουμ Βένεις, Γάλλοι Ϛελιουκάδας.

Ib. f. Μύρρις, E

Ⓐ δὲ, κονίλλω,

288. d. Κίρσιον.

Ⓐ δὲ, βούγλωσσον μέγα καλοῦσι, Ρωμαῖοι ἄσπα μόλλις.

Ib. f. Ἀστικός,

Ⓐ ὃ, ἀστεισκος, οἱ ὃ, ἀστεῖον οἱ δὲ, ὀφθαλμὸν, Ρωμαῖοι ἐγκινάλις, Δακοὶ ῥαθίβιδα. F

289. a. ὀδοντίτης,

Γίνεται δὲ μέσον πετρῶν, καὶ τόπων τραχέων. ταύτας οἱ ἀστέρες ὅταν νυκτὶ λάμπωσι, οἱ γὰρ μὴ εἰδότες ὅταν αὐτὰς ἴδωσι, νομίζουσι φάσμα εἶναι. βοσκεται δὲ ὑπὸ ὀφεων. καὶ Κρατεύας ὁ ῥιζοτόμος ἱστορεῖ· αὕτη χλωρὰ κοπεῖσα μετ' ὀξυγλίου παλαιοῦ, πρὸς τοὺς λυσσώδεις τοὺς ὑπὸ βοσκημάτων. καθυμιωμένη δὲ, φυγαδεῖ θῆλα. G

al. i Κρατεύας ἄλλος ἀνήρ.

Quid addunt recentiores.

De Personata.

Alij aparinè, Latini personatiam seu lappam appellant.

De Epipactide.

Alij borion vocant.

De Fumaria.

Aliqui corydalion aut corion vocant, alij syluestre corydalium, alij capnon in segetibus hordaceis nascentem, alij capniten seu capnion, alij marmariten, alij capnogorgion, alij chelidonion paruum, alij peristerion, alij cantharida, alij chalcochrun, Romani apium seu fumariã, Ægyptij cnyx, alij tucin. A folijs nihil differt.

De Loto satiua.

Alij tripodion, alij trifolium.

De Loto syluestri.

Alij triphyllon, Latini trifolium minus vocant.

De Cytiso.

Alij telinen, alij grandem lotum, alij triphyllon, Romani trifolium maius appellant.

De mille folio.

Alij melophyllon, alij stratioticen, *quasi mil tarem*, alij Achilleam, Romani millefolium aut supercilij Veneris appellant, Galli bellicocandium. Sic Apul.

De myrrhide.

Alij cunilam vocant.

De Cirsio.

Alij buglossum magnum vocant, Latini spinam mollem.

De astere Attico.

Aliqui asteriscon seu asterion, *quasi stellulam*, alij buboniũ, alij hyophthalmum, *quasi suis oculum*. Latini inguinalem, Daci rathibida vocant.

Ad calcem eiusdem capitis:

Nascitur inter petras, locisque asperis: stellares huius radij noctu splendent. Quapropter qui hoc ignorant vbi ipsum viderint, spectrum quoddam esse arbitrantur. Inuenitur autem ab opilionibus. Cæterùm Crateuas herbarius hanc herbam refert, si viridis cum axungia vetere tundatur, contra rabiosorũ morsus gutturisque ramices prodesse, ac sutitu quoque serpentes fugare.

De Viola nigra.

Purpuream violam alij dasypodion, alij priapeion, alij violam syluestrem, alij Cybelion, Romani setialim aut murariam, aut violam purpuream vocant.

De Bunio.

Aliqui aton, alij arction, alij anemosphoron vocant, Prophetæ paradacry, Ægyptij erxoen, Romani scopam regiam, Aphri zigar, nonnulli thempso.

De Chamaciſſo.

Aliquibus chamæleuce, aliis ciſſos acarpos, *quaſi hedera ſterilis aut infructuoſa*, aliis terræ corona, aliis ſelinitis, Romanis hedera pluuiatica dicitur.

A folijs circa radicem apij ſimilibus. quid forte per planicies ſtirpeſue ma aime luxuri et Mercur. Solanũ legi.

De Bugloſſo.

Prophetę felis genituram, Oſthanes tzauuchi, Ægyptij antuérin beſor, Romani linguam bouis aut libanium, Aphri auſanaph nuncupát. Naſcitur ſabuloſis & exæquatis in planitiem locis. Colligitur verò Iulio menſe: ferúntque contra febrilium acceſſionum rigores herbam vtilem: & ad tertianos quidem, eam quæ tres thyrſos emiſerit: ad quartanos verò, quæ quatuor, totam cum radicibus & ſemine ad tertias in vino decoctam propinant: quin & ad curandos abſceſſus valere aiunt.

De Cynogloſſo.

Aliqui phyton, alij caballion, alij ſplenion, alij ſcolymon, Romani linguam canis aut caninam appellant.

De Leontopodio.

Aliqui zoonychon vocant, *quaſi animalis vngulam*, alij aëtonychon, *quaſi aquilæ vnguem*, alii camum, *hoc eſt capiſtrum*, alij damnamenen, *quaſi domitricem*, alii idiophyton, *hoc eſt, peculiarem plantam*, alii phytobaſilan, *quaſi plantam regiam*, alij crotlion, alij croſſophthoon, Magi ſanguinem crocodili, alij crocomerion, Ægyptij daphnoenen, Romani Minerſuium ſeu Palladium, alij neumatum, alij flammulam.

De Hippogloſſo.

Aliqui & id antirrhinon, alij anarrhinon, nonnulli lychnida ſyluestrem vocant.

lb.c. Ιὸν,

Ex Aldi add. τοῦ ευρυῶ.

ⓐ δὲ, δασυπόδιον, οἱ δὲ, φριαπήιον, ἄγελον, οἱ δὲ, Κυβέλιον, Ρωμαῖοι σεπιάλις, οἱ δὲ, μουρσιέα, οἱ δὲ, βιόλα πορφυρία.

Ruellius videtur legisse, εἰ δὲ, loco ἀχ.

lb.f. Βούνιον,

V. Aetius. Paulus, ἀγκτικὸν Galenus.

ⓐ δὲ, ἄτον, οἱ δὲ, ἀκτίνιον, οἱ δὲ, ἀνεμόσφορον, Προφῆτ) παραδάκρυ Αἰγύπτιοι ἐρξόην, Ρωμαῖοι σκόπα ῥήγια, Ἀφροὶ ζιζάρ, οἱ δὲ, θέμψω.

Ald. Σκοπὸν.

290.c. Χαμαίκισσος,

ⓐ δὲ, χαμαιλεύκη, οἱ δὲ, κισσὸς ἄκαρπος, οἱ δὲ, γῆς στέφανος, οἱ δὲ, σελινῖτις, Ρωμαῖοι ἕδερα πλευβιάτικα.

lb.f. Βουγλῶσσον,

Προφῆται χύνος αἰλούρου, Ὀσθάνης τζαυουχὶ, Αἰγύπτιοι αὐζυέριν βέσορ, Ρωμαῖοι λοζγαβρμ, οἱ δὲ, λιβάνιν, Ἀφροὶ ἀυσανάφ. φύεται εἰς τόπους ἰμαλοὺς καὶ ἀτμώδεις. σπείρεται δὲ ἐν ἰουλίῳ μηνί.

forte ἀνωμάλους.

φασὶ δὲ τοὺς ῥίζῃ λειοτριλεῖν τοὺς αὐτεταμένους, τὸ ἔχοντος βουγλώσσου γ'. καυλοὺς, ὅλον ἀποτεπώσας μὲν τὴν ῥίζαν καὶ τοῦ σπέρματος τὸ βοτρύδιον, δίδου πιεῖν. τῇ δὲ τεταρταίῃ ἔχοντος, τῷ πεμπταίζοντι. τῇ δὲ ἕκτῃ τοὺς τέτταρας. καὶ τοὺς ἀποτεμάχους φασὶν αὐτὸ χρησιμεύειν.

Iſta quæ hic bugloſſo & alibi plantagini tribuuntur a Dioſc. Plinius ad cynogloſſon tranſtulit lib. 25. cap. 8.

lb. g. Κυνόγλωσσον,

Apul. caballinum.

ⓐ δὲ, Φυτὸν, οἱ δὲ, καβαλλάπιον, οἱ δὲ, σπληνίον, οἱ δὲ, σκόλυμος, Ρωμαῖοι λίγγουα κάνις, οἱ δὲ, λίγγουα κάνινα.

291.b. Λεοντοπόδιον.

ⓐ δὲ, ζωώνυχον, οἱ δὲ, ἀετώνυχον, οἱ δὲ, κάμος, οἱ δὲ, δαμναμενὴν, οἱ δὲ, ἰδιόφυτον, οἱ δὲ, φυτοβασίλεα, οἱ δὲ, χρύσιον, οἱ δὲ, χροσσόφθοον, Γέροφῆται αἷμα χρυσοδείλου, οἱ δὲ, χροκομήριον, Αἰγύπτιοι δαφνοινὴν, Ρωμαῖοι Μινέρσιουμ, οἱ δὲ, νευρωμάτιον, οἱ δὲ, Παλλάδιουμ, οἱ δὲ, φλάμμουλα.

lb.d. Ἱππόγλωσσον,

ⓐ δὲ, καὶ τοῦτο ἀμπρίνον, οἱ δὲ, ἀναρρίνον, οἱ δὲ, καὶ τοῦτον λυχνίδα ἀγρίαν καλοῦσι.

lb.g. Καταμάγκη, A

δαμναμένη Ald. ④ δί, δαμναμένη, οἱ δ', Διονυσιὰς, οἱ δέ, θύρσιον, οἱ δέ, δῆμος, οἱ δέ, κῶμος, οἱ δέ, κρόκιον, Περσῶται ἀρχαεάς, οἱ δέ, ἀρκέπους, Ρωμαῖοι ἕρβα φιλικλᾶ, οἱ δ', δατίσκα, οἱ δέ, Ἰοβισμαδίους, Δακοὶ καρωπίθλα.

292.b. Τεπόλιον, B

④ δί, ψυχὴ, οἱ δέ, μηλὶς, οἱ δ', ποταμογείτων, οἱ δέ, σταχύτης, Ρωμαῖοι καλαμάριν.

292.d. πολύτριχον,

④ δί, καλλίτριχον, οἱ δ', τριχομανὲς, οἱ δέ, ἑβενότριχον, οἱ δέ, ἄργιον, οἱ δ', κόριον ἔνυδρον, Αἰγύπτιοι ἔπιερ, Ρωμαῖοι κιρκινάλις, οἱ δέ, τρίχας κεφάλους, οἱ δέ, συπερκίλιουμ τέρρας, Δακοὶ φιλοφθεθλά. C

243.a. ἄδιαντον.

④ δί, πτέριον, οἱ δί, ὀπτέριν, Ρωμαῖοι κεφαλάριμ, οἱ δέ, πίνυλαμ, οἱ δί, φιλικλάμ.

lb.c. καλαδία, D

Λάπ. φακίσκον. Ῥωμαῖοι λάππα.

lb.f. Αἰγίλωψ,

④ δί, σιτάσπελος, οἱ δί, σίφων, οἱ δί, βρῶμος, Ρωμαῖοι ἄβένα.

294.a. Βρῶμος,

④ δί, σιφώνιον, οἱ δέ, ἀκρόασπελος, Ρωμαῖοι ἀβέναμ. E

lb.f. Σμίλαξ,

④ δί, ἑπάπιπς, οἱ δί, λυχνόθημον, οἱ δ', κυνόσβατον, οἱ δί, αἰείκηπον, οἱ δέ, ἡλιόφυτον, οἱ δέ, ἀμπελικὴν, οἱ δί, δυπικὴν, οἱ δί, ἐλίδη, Αἰγύπτιοι λυισθῆ, Ρωμαῖοι μεργίνα, Θοῦσκοι ῥαδία. F

295.d. ἀγρία,

Ald. οἱ δί μυρτίκανθα δί μυρτίκανθον. Theoph. κανθμύρσινον vocat. ④ δί, ἱερόμυρβον, οἱ δί, ὀξυμυρσίνη, οἱ δί, μυάκανθα, οἱ δί, ἄγγιον, οἱ δί, σκίγκος, οἱ δί, μύρθη, οἱ δί, καταγέλως, οἱ δί, ἀμάγαλος, οἱ δί, ἄγκων, οἱ δί, ὀκπεὴν, οἱ δί, κίνλω, οἱ δί, λευκλὴν, οἱ δί, χαμαιπίτυς, οἱ δί, χαμαιμύρτη, Βοιωτοὶ δί γυρωίδα, Περσῶται γένος Ηρακλέους, Ρωμαῖοι ῥούσκυμ. G

V. γραμμίνεν.

De Catanance.

Aliquibus dânamene, aliis Dionysias, aliis thyrsion, alius demos, aliis camus, aliis crorion, Prophetis archaras, aliis arcopus, *quasi pessulus*, Romanis herba filicula, seu datisca, seu Iouis radius, Dacis caropithla dicitur.

De Tripolio.

Aliqui psychē, alii merida, alij potamogetona seu stachyiten, Romani calamarem nominant.

De Adianto.

Alij callitrichō, alij trichomanes, alij ebenotrichon, alii argiō, alii coriādrum aquaticum, Ægyptij epier, Romani cincinnalem, seu terræ capillum, seu supercilium terræ, Dacī philophthethela vocant.

De Trichomane.

Aliqui pterion, *quasi filiculam*, alii eupteron, Romani capillarem, seu pinnulam, seu filiculam, appellant.

De Xanthio.

Latini lappam.

De AEgilope.

Aliquibus sitospelos, aliis siphon, *quasi tubus*, aliis bromos, Romanis auena dicitur.

De bromo.

Aliqui siphonion, alij acrospelon vocant, Latini auenam.

De smilace aspera.

Aliqui hepatitin, *quasi iecorariam* appellant, alij lycanthemon, *quasi florem lupinum*, alii cynosbaton, *quasi sentem canis*, alii aniceton, *quasi inuictam*, alii heliophyton, *quasi plantam Solis*, alii anatolicō, *hoc est orientalem*, alii dyticon, *occiduam*, alii helidem, Ægyptij lyisthe, Romani merginā, Hetrusci rhadiam.

De ruscō.

Aliqui myrtacanthen vocāt, *quasi myrtum spinosam*, alii hieromyrton, *hoc est, myrtum sacram*, alii oxymyrsinem, *quasi myrtū aculeatam*, alii myacanthan, *hoc est, spinam muriuam*, alii agonon, alii scincō, alii minthen, alii catangelon, alii anangelon, alii acaron, alii ocneron, alij einen, alii lychenen, alii chamæpityn, alii chamæmyrsinen, *quasi humilem myrtum*, Bœoti gyreniam, Prophetæ genituram Herculis, Latini ruscum.

De Lauro Alexandrina.

Alij daphnon, alij Samothracicã laurũ, alij mithrion, alij hypogloſſió.

De Daphnoide.

Alypo ſimile, flos ceu nymphęæ, cuius medium cono non diſſimile, in quo ſemen.

De Chamadaphne.

quid aquoſus humores trahat.

Alij daphnitin, alij hydragogon, Latini laureolam ſeu lauraginem, Galli vſubium.

De Elleboro albo.

fortaſſis nihil ſit quod ſignificet, quid per ea promitti promiſit.

Aliqui aſcidem nominant, alij ' ctomon', quidã pignatoxarin, Prophetæ genituram Herculeam, alij polyides, alij anaphyſton, Ægyptij ſomphian, alij vnre, Galli laginum, aliqui anepſa.

De Elleboro nigro.

à Veteri filiabus ea perſtrictis à Marcellinide.

à loco in quo præbet ſpumã naſcitur.

Alij Prœtiũ, alij melanorrhizon, *quaſi nigra radice præditum*, alij 'Anticyraicon, Prophetæ zomarition, Ægyptij Iſæam, ſeu elaphinen, ſeu cemeleg, Latini veratrum nigrum, alij ſaraca, Daci prodiorna.

De Seſamoide magno.

Aliqui ſeſamiten, alij ſeſamin, alij lycoſcytalium, *quaſi lapſanam ſcuticam*, alii elleboron album, alii Anticyricon appellant.

De Seſamoide paruo.

Aliqui coronion, alii ſeſamon ſylueſtre nuncupant.

De Cucumere ſylueſtri.

Aliqui elaterion vocant, alii grynon, alii balin, alii ſyncriſin, alii bubalion, alii ſcorpion, alii pherombron, *quaſi imbriferum*, alii peucedanõ, alii notion, Romani anguinum, ſeu agreſtem *cucumerem*, Aphri cuzimezar.

De Staphide agria.

Aliqui trifolium, alii ſteſium, alii aſtaphida, alii phthiroctonon, *quaſi pediculos enecantem*, alii phthirion, alii apanthropon, alii polyides, alii pſeudopathes, alii arſenoten, Ægyptii ibeſaoeden, Romani herbam pedicularem appellant.

De Thapſia.

quid ſagittas medicatas

Aliqui ' hypopion vocant, alij pancranon, alij ſcammonion, alij thelypterin, *quaſi filicem fœminam*,

A 1b.g. σταφὶς ἀγρία,

οἱ δέ, δάφνος, οἱ δ', Σαμοθρακικὴ, οἱ δέ, μίθριον, οἱ δέ, ὑπογλώσσιον.

296.b. Δαφνοειδές,

ὅμοιον ἀλύπῳ, αὐξος ὡς νυμφαίας, καὶ μέσον τούτου κώνῳ ἐμφερές, ἐν ᾧ τὸ σπέρμα.

B 1b.d. ἐκβάλεσαι,

ⓓ δέ, δαφνίτιν, οἱ δέ, ὑδραγωγὸν, Ρωμαῖοι λαυρέολα, ⓓ δέ, λαχανάγω, Γάλλοι ουσουβίμ.

1b.f. λευκὸς,

ⓓ δέ, ἀσκίδα, οἱ δέ, ἄπεμον, οἱ δὲ, πνιγαπάξεις, Προφήτου γένος Ηρακλέους,

C οἱ δὲ, πολύειδες, οἱ δέ, ἀναφυτὸν, Αἰγύπτιοι σομφία, οἱ δέ, σῶμφι, Ρωμαῖοι βεράτρον ἄλβουμ, Γάλλοι λαγῖνον, οἱ δὲ, ἀνεψᾶ. Alii ἀνεψίαν.

297.g. πολύῤῥιζον,

οἱ δ', Πρᾶτιον, οἱ δ', μελανορρίζον, οἱ δ', κυπαρίσσιον, Προφήτου ζωμαείτιον, Αἰγύ-

D πτιοι ἰσαὰμ, οἱ δέ, ἐλαφινὴ, οἱ δὲ, κεμελὲκ, Ρωμαῖοι βεράτρον νίγρουμ, ⓓ δὲ, σκεύκα, Δακοὶ προδιόρνα.

299.b. μέγα,

οἱ δέ, σησαμίτης, ⓓ δέ, σησαμὶς, οἱ δ', λυκοσκυτάλιον, ⓓ δὲ, ἐλλέβορος λευκὸς, οἱ δέ, Ἀντικύρινον.

E 1b.d. μικρὸν,

ⓓ δέ, κορώνιον, οἱ δέ, σήσαμον ἄγριον καλοῦσι.

1b.f. ἄγριος,

οἱ δέ, ἐλατήριον, οἱ δ', γρυλλὸν, οἱ δέ, βαλὶς, οἱ δ', σύγκρισις, οἱ δ', βουβάλιον, οἱ δ', σκόπιον, οἱ δέ, φέρομβρον, οἱ δέ, πεπονίδιον,

F οἱ δέ, νότιον, Ρωμαῖοι ἀγρέστην, ⓓ δέ, ἄγριον μέλαν, Αφροὶ, κουσμεζάρ. Alii ἀγρέστεμ.

301.g. ἀγρία,

οἱ δέ, πεῖφυλλον, οἱ δέ, στάσιν, οἱ δέ, ἀσταφὶς, οἱ δέ, φθειροκτόνον, ⓓ δέ, φθίριον, οἱ δέ, ἀπεθύμονον, ⓓ δέ, πολυφόης, ⓓ δ', ψευδοπαθὲς, οἱ δ', ἀρσενοτὴ, Αἰγύπτιοι ἰβησαοεὶν, Ρωμαῖοι ἕρβα πεδικουλάρις.

G 302.d. Θαψία,

ⓓ δέ, ὑποώπιον, ⓓ δέ, πάγκρανον, ⓓ δέ, σκαμμώνιον, ⓓ δέ, θηλυπτε-

εἰς, Ρωμαῖοι φερουλάγω, οἱ δέ, φέρουλα σιλβέστρις, Αφροὶ βοίδλω.

305.f. Σπάρτιον,

οἱ δέ, λοβόν, οἱ δέ, λύγον καλοῦσι.

Hic alii caput interferunt de myrobalanis: sed hodie o parum valet quicunque Dioscoridis esse inuenerit.

304.f. Ναρκισσος,

οἱ δέ, νάρκισσος αὔνδρος, οἱ δέ, αὐτοφυές, οἱ δέ, βολβὸς ὁ ἐμετικός, οἱ δέ, λείριον, Ρωμαῖοι βούλβους μορβιπάριους.

305.c. Ιππόφαες,

οἱ δέ, ἱππόφυες, ἄλλοι δέ, ἱππόφαεις, οἱ δέ, ἱππίον, οἱ δέ, ἐχῖνον, οἱ δέ, πελεκῖνος, Ρωμαῖοι λαππάγω, οἱ δέ, λαππολέμεσ καλοῦσι.

306.c. κρότωνα.

Αἰγύπτιοι σύαθαμνα, ἄλλοι δέ, τρέξη, Προφῆται αἷμα πυρετῦ, Ρωμαῖοι ρίκινον, ἄλλοι δέ, λοῦπα.

309.c. ῥίζαν,

ἣν καλοῦσι τοῦρπιτ.

311.b. σικυὸν,

οἱ δέ, μήκωνα ἀφρώδη.

Ib.c. Σκαμμωνία,

οἱ δὲ σκαμβωνίας ῥίζα, οἱ δὲ, Κολοφωνία, οἱ δέ, δακτύλιον, Ρωμαῖοι Σολοφώνιουμ, Προφῆται ἀπὸ πλεύμονος, Αἰγύπτιοι σάπλουμ.

312.f. κισθός,

οἱ δὲ, χαμελαία μέλαινα, οἱ δέ, ἡρακλία, οἱ δέ, βδελυρόν, Ρωμαῖοι κιτρακάκιουμ, ἄλλοι δέ, ἐλεάγω, ἄλλοι δέ, ἐλεαστέλλουμ.

313.g. Ακτὴ,

οἱ δέ, δένδρον ἄρκευ, οἱ δέ, ἥμερον, Ρωμαῖοι σαμβούκουμ, Γάλλοι σκοβιλὼ, Δακοὶ σίβα.

314.b. καλφη.

οἱ δέ, ἐλιοσακτὴ, οἱ δέ, ἀγρία ἀκτὴ, οἱ δέ, Εὐβοϊκὴ, Ρωμαῖοι ἔβολουμ, Γάλλοι δουκωνὶ, Δακοὶ ὄλμα.

315.b. λιπόζωστις,

Ρωμαῖοι ῥάδιξ σιλβέστρις, Αφροὶ θορφαθσαδδί.

Ib.c. Αλεξανδρίνη,

Ζωροάστρης θύμβρη, Οσθάνης αὐτογενὴς, Ρωμαῖοι κευκούρβιτα σιλβάτικα, Δακοὶ τούτρα.

A Romani ferulaginem ſeu ferulam ſylueſtrem, Pœni bœden.

De Spartio.

Aliqui lobon *.i. ſiliquam*, alij lygon, *hoc eſt, vimen*, appellant.

De Narciſſo.

Aliis narciſſus anydros, aliis autogenes, aliis bulbus emeticus, aliis li- *quid ſacitate gaudeat, negotium aquoſum emet.*

B rium, Romanis bulbus vomitorius. *quod ex radicibus flore & ſemine ſpiritus ſuos naſcatur & germinet. vt ait Theophraſtus.*

De Hippophaë.

Aliqui hippophyes vocant, alij hippophanes, alij hippion, alij equinum, alij pelecinon, Romani lappaginem ſeu lappulam minorem.

De Ricino.

Ægyptij ſyſthamna, alij trixin, C Prophetę ſanguinem febris Romani ricinum, ſeu lupam. *à canino vermes ſimilitudine.*

De Pityuſa.

quam turpeth appellant.

De Chamaſyce.

Alij meconа aphroden, *hoc eſt papaver ſpumeum.*

D *De Scammonia.*

Aliquibus ſcambonia radix, aliis Colophonia, aliis dactylũ, Romanis Colophonium, Prophetis apopleumonos, Ægyptiis ſanilum dicitur. *à natali ſolo nempe Colophone Aſiæ vrbe petitum.*

De Chamelaea.

Alij chamelæam nigram, alij heE raclion, alij bdelyran, *quaſi execrabilem*, Romani citocacium, nonnulli oleaginem ſeu oleaſtellum vocant. *Hunc Dioſc. libro ſecundo ex Columella.*

De Sambuco.

Aliqui dendron arctu. *hoc eſt arborem vrſi*, alij hemeron, *quaſi ſatiuum.* Romani ſambucum, Galli ſcobien, Daci ſeba nominant.

F *De Chamaacte.*

Aliis helioſacte, *quaſi ſambucus paluſtris*, aliis acte agria, *hoc eſt, ſambucus ſylueſtris*, aliis EVboica, Romanis ebulus, Gallis ducone, Dacis olma.

De Apio.

Latini radicem ſylueſtrem, Pœni thorphathſadoe appellant.

G *De Colocynthide.*

Zoroaſtri thymbra, Oſthani autogenes, Romanis cucurbita ſyluatica, Dacis tutraſtra.

De Epithymo.

Aliqui cedoes, Romani inuolucrum vocant.

De Vite nigra.

Alij bucranium, Romani vuam caminiam, alij batanutam, alij betisalcam, Daci priadela, alij peregrinam, Aphri lauothen.

De Filice.

Alij prerion, alij prerineon, alij dasyclonon, alij anasphoron, Prophetæ Mercurij furculum, Romani filicem fœnariam, alij laculam, alij filicem *simpliciter*, Ægyptij asini sanguinem,

ab hirsutie frondis ramalis.

fortè, vnctuosum.

De Thelypteri.

Latini linguam ceruinam vocãt.

De Polypodio.

Aliqui scolopendrion, alij pterin, alij polyrrhizon, Romani filiculam seu filicularem herbam vocant.

à multifidis radicum capillis.

De Dryopteride.

Aliquibus prerion, aliis nymphæa pteris.

De Linozostide.

Alij argyron, alij aritrillin, alij chrysitin, Ægyptij aphlopho, Latini herbam mercurialé masculam, alij testiculatam, Aphri asumes.

fortè, à semine quod argenteum offert aspectui.

fortè ob colore similem.

à semine, quod exiguum & bonum instar testiculorum deprehendi profert.

De Cynocrambe.

Aphris harmas, aliis asumeslabon dicitur.

De Heliotropio magno.

Alij heliotropon, alij dialion, alij heliopun, alij scorpioctonon, *quasi scorpios enecãtem*, alij sesamon agrion, *hoc est, silvestre*, alij scorpij caudam.

quòd Solis instar ita figuretur, vt scorpio cum ipsis.

à floris & seminis figura.

Ad calcem cap. de Omphacio.

Vi pollens astrictoria, tardè concoquentibus dissolutisque stomachis conuenit, itémque fœminis malacia laborãtibus, & ileosis. Creditur etiam salutare, si in pestilenti constitutione sorbeatur.

De Stibio.

Alij gynæcion, alij chalcedoniũ.

fortè, quòd eo fœminæ facilè edolitorum.

Ad calcem capitis de Gagate.

Aiunt & sacro, hoc est, *comitiali morbo*, laborantes prodere ac deprehẽdere: quoniam dum eum ferunt, olfacto ipso protinus ac momento in terram procidunt. Quin & morbos fœminarum occultos sanare, si suffumigati vaporem exceperint.

316.b. Ἐπίθυμον,

οἱ δὲ, κιδδὶς, Ῥωμαῖοι ἰμβόλυκρουμ.

318.d. ἄμπελος,

οἱ δὲ, βουκράνιον, Ῥωμαῖοι ὀβλαμιλία, οἱ δὲ, βατόμυτα, οἱ δὲ, βελισάλκα, Δακοὶ πριαδίλα, ⓐ δὲ, πελεῖνα, Ἀφροὶ λαυοθήν.

Ib.g. πολύῤῥιζον,

οἱ δὲ, πτέριον, οἱ δὲ, πτερίνεον, οἱ δὲ, δασύκλωνον, οἱ δὲ, ἀναίσφορον, Προφῆται Ἑρμοῦ βάϊν, Ῥωμαῖοι φιλισφαιρεία· ⓐ δὲ, λαχνῦλλα, οἱ δὲ, φιλικίμ, Αἰγύπτιοι αἷμα ὄνου.

319.c. πτέριν

Ῥωμαῖοι λίγυα κερβίνα.

Ib.c. Πολυπόδιον,

οἱ δὲ, σκολόπενδρον, οἱ δὲ, πτερὶς, οἱ δὲ, πολύῤῥιζον, Ῥωμαῖοι φολίκυλα λίγυ πάλις.

320.a. Δρυοπτερὶς,

οἱ δὲ, πτέριον, οἱ δὲ, νυμφαία πτερὶς.

Ib.f. Λινόζωστις,

οἱ δὲ, ἄργυρος, οἱ δὲ, ἀριτρελλὶς, οἱ δὲ, χρυσῖτις, Αἰγύπτιοι ἀφλοφο, Ῥωμαῖοι ἔρβα μερκυριάλις μασκυλα, ⓐ δὲ, πασκυλάτα, Ἀφροὶ ἀσυμές.

321.b. ἄῤῥιν,

Ἀφροὶ ἀρμαί, οἱ δὲ, ἀσυμέσλαβον.

Ib.d. σκορπίουρον,

οἱ δὲ, ἡλιότροπος, οἱ δὲ, Δίαλον, οἱ δὲ, ἡλιόπουν, οἱ δὲ, σκορπιοκτόνον, οἱ δὲ, σήσαμον ἄγριον, οἱ δὲ, σκορπίου οὐρά.

325.f. ὑδρωπᾶς.

δυνάμει δὲ ἁπλικὸν, ἁρμόζον τοῖς βραδίως πέπτουσι καὶ λελυμένοις στομάχοις, καὶ ταῖς κλασώσαις γυναιξὶ καὶ εἰλεώδεσι. δοκεῖ δὲ βοηθεῖν καὶ ταῖς λοιμικαῖς κατα-, στάσεσι ῥοφούμενον.

Hæc quamvis in veteribus codicibus finis capitis de omphacio adscripta sunt, tamẽ ex cap. de vino omphacino illata videntur.

361.b. Λάβασον,

οἱ δὲ, γυναικεῖον, οἱ δὲ, χαλκηδόνιον.

386.b. ὅτι οἱ λίθοι.

φασὶ δὲ καὶ Δημοκριτικὸν εἶ τῆς ἱερᾶς νόσου. τούτου γὰρ ὀσφραινομένου εὐθὺς ἀπὸ μὴ φερομένης εἰς γῆς πίπτειν. καὶ γυναικῶν δὲ νόσους κρυφίους ἰᾶσθαι θυμιώμενον, δεχομένων αὐτὰ τὴν πνοήν.

Ista ad finem capitis de gagate in codice nõ contemnendo reperit Sambucus.

Perperàm ac nec ipsius particulã in eo codice adnotabatur.

lb.d. περιβόλου βάρος,

A vetusto cod. hæc & mendosa & superstitiosa inseruntur. Samb.

Vel, καθαιρέσεως

Τούτῳ φασὶ καὶ τὴν διαφερούσης γυναικὸς καὶ τῆς ἑτέρας ἀλλοτρίου αἰδοῦς μαχομένης. εἰ γάρ τις αὐτὴν ὅτι τάχιστα λάθρα θείη, ἢ μᾶλλον καθαρὰ καὶ φίλανδρος εἰς ὕπνον καταπεσοῦσα φυσικῇ τινι δυνάμει τοῦ λίθου τοῦ τε χεῖρας ἁπλοῖ περὶ αὐδρα καὶ περιφυσηται· ἡ δὲ πόνοις ῥυπῴοις ἀφυπνώσασα, τῆς κλίνης καταπίπτει. ἀλλὰ καὶ δύο τοῦτον αἴδρας φερόντων, πάσης ἔριδος ἀπαλλάττει καὶ ὁμόνοιαν ἐμποιεῖ· καὶ βασαζόμενος εἰς ὕπνον ἥλιγα λαθών.

lb.f. Ὁ δὲ Μελίτης,

Pro iis quæ legitur in contextu, vetustiores quidam codices Magica hæc habent. Samb.

Ὁ δὲ Μελίτης ὠνόμασται καὶ γαλακτίτης καὶ ληθαῖος, ὅτι φέροντες αὐτὸν καὶ παρασιόντες τοὺς οἰκείους δεσπότας, δύμενος αὐτοὺς θεραπεύειν, καὶ λήθην λαμβάνουσας τῶν αὐτῶν πολλάκις κακῶν. αἰγῶν τε καὶ προβάτων ἀποδεινυμένων τὸ γάλακτος, εἴ τις αὐτὸν λεαίνη μὲθ' ὕδατος μίξας, βοηθεῖ τὸ ποιμνίον. λέγουσι δὲ καὶ ὅτι γυναιξὶ τὸ αὐτὸ δοὺς πρὸς γαλακτοποσίαν τεκούσης ἢ ποιούσης. ἀλλὰ καὶ παιδὶ αὐχένος ἐν τοῖς ὑπτίοις κειμένῳ περιδεδεμένος, ἀπείργει φθόνον, καὶ αἰσσοντα σώζει, καὶ αἰφνιδίως ἐλθόντι φυλάττει καὶ ὑπτίον, καὶ ὅτι τὸν τοῦτον φορεσάντα καὶ βασιλεῖς αἰδεσθῆναι καὶ δικαστὰς, καὶ ἡδεῖς πᾶσι δοκοῦντα.

Περὶ Χαμαιμήλου.

Τοὺς πυρέσσοντας ὁ Χαμαίμηλος θεραπεύει σὺν ῥοδίνῳ λίπει τετριμμένος. ὠφέλιμος δὲ τοῖς μετειάζουσι τὸ φυτόν.

Forte Σπεῖρε ex Ald. cod.

φύεται δὲ ὅτι ἥνιστα ὁ βέλτιστος καὶ κάλλιστος, ὁ βασάζουσιν ἀεὶ τοῖς ἀπὸ χρόνου ἥρως.

Περὶ Ῥάμνου.

Τὴν Ῥάμνον ἐάν τις ἀρῃ ἐν λεπτοσελήνῳ καὶ βασάζῃ, ὠφελεῖ πρὸς φάρμακα καὶ πρὸς ἀνθρώπους φαύλους· ἁρμόζει δὲ φορεῖν αὐτὴν ἐρίμματα, καὶ πλοίοις περιτίθεσθαι· ὠφελεῖ δὲ καὶ πρὸς πόνον κεφαλῆς καὶ δαίμονας, καὶ ὅτι πομπάς.

Περὶ Ἀρτεμισίας.

Ἀρτεμισίᾳ τὴν βοτάνην εἴ τις ἔχει

De Magnete.

Hunc aiunt naturali quadam vi pollere, qua mulierem castam ab adultera discernat. Si quis enim ipsum strato clanculum imposuerit, quæ pudica est viriq; sui amore tenetur, somno consopita vinis maritum ita arctè amplexabitur, vt in illius complexu quasi hæreat: altera verò spurcis & indignis per somnũ exercita laboribus, è lecto procidet. Sed & magnetem si duo viri secum tulerint, lites & cõtrouersias, si quæ inter illos fuerint, dirimet, atq; cõcordiá fouebit. Idem gestatus supra pectus, populum lenit ac demulcet.

De Melitite lapide.

Melitites lapis etiam galactites nominatur, itémque lethæus, quasi obliuiosus, quia ipsum gestantes, si ad dominos suos accesserint, beneuolos illos & clementes comperient, ac etiamnũ immemores scelerum & maleficiorum quæ sæpius antè perpetrarint. Quin & capras ouésque deficiente lacte, si quis ipsum admixta muria tritum exhibuerit, eas non parũ adiuuerit. Fertur & mulieribus itidem tritus potúsque ad lactis generationem vbertatémque cõferre. Sed & infantis collo adalligatus, arcet inuidiá, eúmque à morbis insidiisq; tuetur ac vindicat. Insuper qui lapidem eiusmodi gestauerit, & apud Reges & apud Iudices venerabilis erit, ac omnium denique gratiam fauorémque demerebitur.

De Chamamelo.

Febricitantes sanat chamęmelũ, cum rosaceo ad læuorem tritum. Vtilis inquam planta mediocriter affectis. Nascitur porrò in editioribus arenosisque locis quæ breuis est & optima, eámque auferunt Medici æstatis initio.

De Rhamno.

Rhamnum siquis eruat silẽte Luna, & secum ferat, cõtra venena & improbos homines prodesse sentiet. Vtiliter etiá & à pecoribus gestatur, & nauigiis circumponitur. Valet & contra capitis dolores, dæmoniorúmque insultus.

De Artemisia.

Artemisiá herbá siquis iter faciẽs

secum habeat, itineris laborem nõ sentiet: sin feratim pedibus, venenatas bestias & dæmonia fugabit. Quòd si sanguis circum articulos coaluerit, induratúsq; fuerit, ramulos maiores cum rosaceo in olla feruefacito, expressóque inde oleo locum affectum totũ oblinito, discubitum eunte ægro. Quin & vuluæ strangulatu laborantibus fœminis mirum in modũ auxiliatur, ac substillũ quoque lotium & opisthotonum leuat.

De Pentadactylo seu quinquefolio.

Pentadactylõ si quis circa corpus gestet, nullo dolore afficietur: oculos, strumas, induratas tõsillas, vuã, & partium sub lingua, articulorum & neruorũ dolores, dentes & psorã perniciali fame contractã iuuat: remoratos à partu menses eiicit. Affusa verò manibus cum aqua tepida, contra terrores, fascinum ac dæmonia mirum in modum commendatur. Cæterùm herbam legito dum augescit luna, oriente Sole.

De Verbenaca.

Verbenaca recta pudendum arrigit: supina vero, exiccandi vim habet. Recta amuleti instar adalligata, oculorum doloribus auxiliatur, cõtra eorundem hebetudinem & capitis dolorem efficax est: sed & contrita ex aceto, lassitudinem eximit: strumas & induratas tonsillas confectum discutit. Cæterum febriles horrores statim sanantur, si quis solùm stans ex aduerso ramulos eius tenuerit.

De Dictamno.

Dictamnum siccatã manibus terito, & in farinam redigito, adiectáque vini gutta corpus tagito. Cõtra omnes serpentium iniurias auxiliatur: vlcera putrésque nomas purgat prius, dein etiam explet: adactis corpori aculeis, præsenti adhibetur auxilio: ad lienem quoque & abditorum locorum inflammationes infarinã redacta imponitur. Herbã mense, magnis æstibus, autũnóq; eruito.

De Saluia.

Saluia perfrictionẽ tussimq; discutit: prauis etiã vlceribus omnib⁹, cera & rosaceo ammixtis, auxiliatur.

A τὸ ὁδῦ, λύει ⟨Ϟ⟩ κάμαθον. καὶ ἐν τοῖς ποσὶν ὁ φορῶν, θρεῖα διώκει καὶ δαίμονας· αἷμα δὲ ἐπὶ τοῦ τὰ ἄνθρα σιρρώξῃ, κλωσία λαβὼν μείζω μετ' ῥοδίνου, καὶ ποιήσας ζέσαι εἰς χύτραν, σύγχριε τὸν πονοῦντα ὅλον ὡς ἂν ἀχθῇ κοιμᾶσθαι· καὶ ὑστερικὰς γυναιξὶ πολὺ βοηθεῖ. σπαγγουρίαν παύει, καὶ

B ὀπισθοτόνου ῥῆγμα.

Περὶ Πεντα δακτύλου.

Τὸν Πενταδάκτυλον εἴτις φορῇ περὶ τὸ σῶμα, ἄπονος μένει, καὶ ὀφθαλμοὺς ὠφελεῖ, χοιράδας, ἀμυγδάλας, σταφυλήν, & τὰ ὑπὸ τὴν γλῶτταν. ἄρθρα τε καὶ νεῦρα, ὀδυνίας, καὶ ὀδόντας, λύει· σὺν λιμο

C κτονίας· λοχίαν ἐμμένοντα καθαίρει· ὁ ὕδατι δὲ χλιαρῷ τρεφόμενον εἰς τὰ χεῖρας, τρὸς φόβους καὶ βασκανίας καὶ δαίμονας ὄντι πολὺ καλόν. δεῖ λαμβάνειν τὸν βοτάνην, ὅτι αὔξει ὁ σεληναίη, ἡλίου ἀνατέλλοντος.

Περὶ Περιστερεῶνος.

D Περιστερεὼν ὁ μὲν ὀρθὸς πίνει τὸ αἰδοῖον, ὁ δὲ ὕπτιος, ξηραντικός ἐστιν. ὠφελεῖ δ' ὁ ὀρθὸς τρὸς ἀμαυρώσεις τρὸς πόνους ὀφθαλμῶν. ποιεῖ τρὸς ἀμβλυωπίαν καὶ κεφαλῆς πόνον, καὶ κάμνοντα παύει, πεισθεῖσα μετ' ὄξους. χοιράδας, ἀμυγδάλας τρόσχρισμα παύει· ὅτο δὲ τῆς φαιᾶς, ἀπὸ

E τούτης κλωσία λαβὼν, καὶ πίνων ἡτοῦ τῶ φαιῶντος μόνου, καὶ ὕδρωπας μεγαπόνους.

Περὶ Διπτάμνου.

Τὸν Δίπτάμνον ξηραίνει, τρίψας τὸ τῆς χαρᾶς σου, καὶ ὡς ἄλφιτα ποίησας, καὶ βαλὼν σταλαγμὸν οἴνου, ἅψαι τῶ σώματος, τρὸς πάντα δὲ τὰ ἑρπετὰ ἀμύνει· ἐλκὶ δ' ἐν τοῖ σαπρὰς νομὰς πλύνει τρόσκαθαίρει· καὶ σκολοπίδη τις τρόσκατάπλαστ, καὶ ὀδύνας ὠφελήσεις· τρὸς

F σπλῆνα δὲ καὶ τοῖ ἐν χρυφίοις τόποις πάση φλεγμήνασι, καταπλαστ, ὡς ἀμφίβολον ποιήσας· ἄρμε δὲ τὸν βοτάνην ἔαρι & τὸ τῆς καύμασι καὶ ἐν τῶ φθινοπώρῳ.

Περὶ Ἐλελισφάκου.

Ελελίσφακον λύει· φυμάτων, ζῶνας· Ruellius χηρῶν legisse videtur, hoc est ἀλφῶν.

τρὸς πάντα δὲ τὰ κακὰ ἕλκη σὺν ῥοδίνῳ· καὶ κηρῷ λιπαρῷ ἀφέλει.

σπλανὸς πόνοι ἡ δυσεντερίαν μετὰ πώματος μετ' οἴνου λευκοῦ. ὄξους δὲ αἱμοπτοϊκοῖς προσπεζόμενον μετὰ μέλιτος· ἡ τοῖς πόνοις τὰ γυναικεῖα. αἱ καὶ κύουσαι ἢ γυναῖκες ποιοῦσι ἐξ αὐτῆς ποιοῦσαι, τοσοῦτόν ἐστι καὶ ἐκβάλλουσιν ἔμβρυα. A Lienis dolorẽ dyſenteriámque potacum vino albo ſanat. Pari quoq; modo ſanguinem excreátibus potu medetur: & ad extrahendas quaſlibet mulierebres à partu purgationes efficax eſt. Cæterum ſceleſtiſſimæ mulieres ſubdito ex ea peſſo partus excutere non verentur.

Περὶ Κυπαρίσσου.

De Cupreſſo.

Κυπάρισσος βοτάνη ὠφελεῖ τοὺς βράγχους καὶ ὠτία· καὶ ἀνθράκας, καὶ ὕδρωπα καὶ ἰσχιάδας θεραπεύει. B Cupreſſus herba contra rauedines prodeſt: auriculas, induratos tũſillarum tumores, aquam inter cutem & coxendicum cruciatus perſanat.

Περὶ Κενταυρείου.

De Centaurio.

Κενταύριον ὠφελεῖ τοὺς φλεγμαίνοντα πάθη, καὶ κρούσματα πληγῶν· ὑστερικαῖς γυναιξὶ βοηθεῖ, γραγγυραινώσας τε παύει καὶ λιθιῶντας. αἴρε δὲ τὸ βοτάνιον ἐν ἔαρι ἡλίου ἀνατέλλοντος. C Centaurium cõtra inflammationes & ictuum alliſiones valet: fœminis vuluæ ſtrangulatione laborantibus auxiliatur: quin & ſubſtilli lorij calculorumque torméta leuat. Herbam porro Vere, oriente Sole legito.

Περὶ Βουφθάλμου.

De Buphthalmo.

Τὸν Βούφθαλμον σελήνης αὐξανούσης λαμβάνειν δεῖ. ποιεῖ δὲ τοὺς φόβους καὶ δαίμονας καὶ βασκοσύνας, καὶ φάρμακα· ἔχει δὲ ζῴων ἀποτρέφουσα. καὶ ὀδόντας εἴ τις ποτὲ τὸν ῥίζαν μασησάμενος ἀποθλίσει, ἀθῇ τὸ ῥεῦμα σίλλουσα ὠφελεῖ· λύει δὲ καὶ γαστέρα. D Buphthalmũ creſcente Luna decerpere oportet. Facit verò contra pauores, dæmonas, faſcinationes & venena: ea ſiquidem omnia auertit. Quòd ſi quis radicem commanducando identidem expuat, dentium dolori, ſedata ſimul & ſemel fluxione, auxiliabitur. Quin & aluum ſoluit.

Περὶ Παιωνίας.

De Pæonia.

Παιωνία βοτάνη αἴρεται ἐν τοῖς κυνοκαύμασι πρὸ τοῦ πρὸ ἡλίου ἀνατείλαι, καὶ τρέμαται· καὶ ὠφελεῖ πρὸς φάρμακα καὶ βασκοσύνας καὶ φόβους καὶ δαίμονας, καὶ ὀλετρομανίας· καὶ εἰς πυρετοὺς ἐν φελικάσεως γινομένου τε καὶ ἡμερινόν, καὶ τεταρταῖον. λέγεται δὲ ὅτι ποτὲ ἐν τῷ ὄρει εἴθη ἔσθ' ὅτε δαίμονες φεύγουσι, πύπτους ἀποδίδωσιν. E Pæonia herba per æſtus Caniculę ante Solis ortum vellitur, appenſáque contra venena, faſcinum, pauores ac dæmonum inſultus prodeſt: item contra febres cum horrore adorientes tá nocturnas, quam diurnas, necnõ & aduerſus quartanam. Cęterùm dęmones à monte in quo naſcebatur quondam fugaſſe proditur.

Addunt in Mſſ. cod caput ἀσὶ σελίνου.

Περὶ Πολίου.

De Polio.

Πόλιον, ἡ βοτάνη φορουμένη περὶ τὸ σῶμα ὠφελεῖ τοὺς σεληνιασμοὺς καὶ χρόνιον. δύναται δὲ τριφθεῖσα μετ' ὄξους ἡ βοτάνη καὶ καταχριομένη, πόδας ἀχροκορύμβους ὠφελεῖν. F Polium herba circa corpus geſtata, contra lunaticum morbum laſſitudinémque auxiliatur. Siquidem trita ex aceto herba & ſummis pedibus affuſa prodeſt.

Περὶ Μώλεως.

De Moly.

Μῶλυ βοτάνη ῥιζοτομηθεῖσα καὶ τοῖς περὶ σῶμα φορουμένη, ὠφελεῖ πρὸς φάρμακα καὶ βασκανίαν. G Moly herba radicitus exciſa & circa corpus geſtata, venenorum & faſcinationis amuletum eſt.

Περὶ Ἐναλίας δρυός.

De Marina quercu.

Τὴν ἐναλίαν δρυὸν ὕπτιον ἡ σελήνη Marinam quercũ extrema Luna

cum rosaceo misceto, & faciem illinito, cùm ad negotia te conferes. Sub ventriculo gestata, fœtus vegetiores reddit: ad arcendos verò pauores nocturnos, manu tenetur. Sed & contra fascinum & maleficia omnia prodest, corpúsq; tuetur. Cùm enim fascinantes recedunt, arescentem furculum illa occludit, & eundé, si propiùs accesserint, aperit.

A λήγη, μίξον μετ' ῥοδίνου ἐλαίου, καὶ χρίου σου τὸ πρόσωπον, ὅταν μέλλῃς πρᾶγμα ἀπίλφης. ζωογονεῖ δὲ καὶ παιδία ὑπὸ τὴν χειλίαν φορεμένη· ἔτι πρὸς τὸν φόβους τὸν νυκτερινοὺς ἔχε ἐν χειρὶ ὑφλα. καὶ πρὸς βασκανίαν τὸ ἔτι πάντα τὰ κακὰ ὠφελεῖ· καὶ τὸ σῶμα φυλάσσει· ὅστις γὰρ οἱ βάσκανοι ἀφεστήκασι, μίμυκεν ἐρχομένων ἢ αὐτὴν ἐγλες, ἀνοίγει τὸ κάρφος.

B

De Chrysanthemo.

Chrysanthemon si terra ante Solis ortum eruatur, corporique adalligetur, aut ex collo suspendatur, veneficas mulieres omnésque fascinationes amolitur.

Περὶ χρυσανθέμου.

Τὸ Χρυσάνθεμον εἴτε ἄρρεν ἐκ τῆς γῆς πρὸ τοῦ τὸν ἥλιον ἀνατέλλειν, καὶ περιαίρεις τῷ σώματι, καὶ ἐκ τοῦ παχύλου ἀποκρεμασῇς, ὠφελεῖ ἀποτρέφον τοὺς φαρμακίδας γυναῖκας, καὶ πάντα τὸν βασκανίας.

De Erysimo.

Erysimum cum vino tritum, aduersus ventris dolorem bibitur. Quòd si quis grana septem in domum proiecerit, rixæ & iurgia concitabuntur.

C

Περὶ ἐρυσίμου.

Ερύσιμον λεῖον μετ' οἴνου πρὸς χολίας πόνοι πινέσθω· ἐὰν δὲ κόκκους ζ' εἰς οἰκίαν βάλῃς, ἀψιμαχίαι ἔσαι.

Caper de Elleborine, quod postremo loco habebatur, iccirco deleui, quia verbis totidem legebatur cap. de Epipactide lib. 4. cap. 109.

FINIS. ΤΕΛΟΣ.

IANI ANTONII SARACENI LVGDVNÆI SCHOLIA IN DIOSCORIDIS DE MATERIA MEDICA LIBROS V. & eiusdem de Venenis Lib. II.

IN QVIBVS VARIAE CODICVM variorum lectiones examinantur, diuersæ de Medica materia seu priscorum seu etiam recentiorum sententiæ proponuntur, ac interdum conciliantur: ipsius denique Autoris corruptiora, obscuriora difficiliorâque loca restituuntur, illustrantur & explicantur.

* * *

IANI ANTONII SARACENI LVGDVnæi Scholia in Dioſcoridis de materia Medica libros V.

IN LIBRVM PRIMVM.

IN PRAEF. Βάκχος ὁ Ἰουλιεύς.] Vetus exemplar & Aldinum habẽt Τυλλιεύς: quę quidẽ ſecutus eſt Marcellus Virgilius. Quidã Τυμνιεύς legunt. Ac certè quidem Cælius AVrelianus alicubi Tullij Baſſi meminit. At Epiphanius Conſtãtienſis Epiſcopus circa principiũ lib.1.contra hæreſes 80. poſtpoſito tridẽ prænomine Βάκχος ὁ Τυλλιεύς nominat (quo loco & alios qui de materia medica ſcripſere commemorat)& id quidem facili, vt opinor, errore, ἀπὸ τοῦ ἰύλλου vel ἴυλλου. Id enim eſt huic ipſi nomen apud Plinium, tum alibi, tum in elencho lib. XX. XXI. XXIIII. XXV. XXVI. XXVII. vbi obiter annotatur, Baſſum æquè ac Sextium Nigrum, etſi Latinus eſſet, Græcè tamẽ de Medicina ſcripſiſſe. quare nõ immeritò Ruellius Iulium Baſſum conuertiſſe videtur.

Πετρώνιος, Νίγερ καὶ Διόδοτος] Dioſc. Petronium & Diodorum tãquam diuerſos rei herbariæ Scriptores hic commemorat. At Plinius tum lib.20.cap.8.tum etiã lib.25.cap.9.vnum & eundẽ Petronij Diodoti nomine deſignare videtur.

ἐν τῇ βιβλίῳ] Malui ἐν τῇ βιβλίοις legere, quàm vti habebatur in vulg.exempl ἐν ᾗ βιβ. Sũt enim quinq; tantummodo libri, qui πῶλοι (ſic enim vocat Erotianus Hipp. ἐξηγητὴς) hoc eſt, materiã omnem medicam, complectũtur reliqui, quibus de venenis, venenatorũmque animalium ictibus morſibúſve agitur, neq; huc pertinẽt, neque fortaſſe huic ipſi Dioſcoridi aſcribi debent. Hucadde quòd & Gal.in præfat.6.de ſimpl.Dioſcoridis Anazarbæi quinque dũtaxat libros agnoſcit. Ac ipſe quoq; Dioſcorides quintũ librũ totius operis vltimũ in eiuſdem libri præfatione nominat.

ἄχνας] Quidam ἄχνην legunt: ſed vulgata lectio mihi magis arriſit. Vtcunque tamen recipias, locus hic planè mutilus ac decurtatus videtur. Quæ enim hic habentur de medicamentorum ætatibus, aut certè virium diuturnitate, ea vt experientiæ, ita etiam clariſs. Scriptorum autoritati refragãtur. Siquidem Theophraſtus, lib. 9.de hiſt.plant.cap.14 præter vtrunque Veratrũ aliquot alia recenſet medicamenta, quæ quàm triennij longiore durent tempore, viribus etiam num integris. Ac eum ipſum Theophraſti locum Plinius, lib.27.cap.vlt.totidẽ ferè verbis Latinè reddidit. Quid verò hac in parte ſentiendum ſit, vel ipſa experientia cuiuis ſatis indicabit. Cæterùm doctiſs.vir D.Ioh.Bauhinus, quò dubitationis huiuſce cauſam adimat, pro eo quod habetur in hac ipſa periodo, μᾶλλον τῶν βοτανῶν, reſtituit, ἢ τῶν βοτανῶν, nec ineptè.

ἐν τοῖς πυκνοῖς] Fortè, ἐν τοῖς, ſi, legendum, ὅταν aut etiam relicto ἐν, addendum ὅταν: nec enim ita facilè ſubintelligi poſſe videtur.

CAP. 2. ἡ μὲν λευκὴ, &c.] His locis haud dubiè particula ἡ accipitur pro Partim, ſeu Aliqua ex parte, vel quadantenus. Vult enim Autor, in eodem flore, ſed tamen diuerſis eius partibus, hos omnes colores conſpici. Id vel ex eo patet, quòd ſtatim ſubiungit: propter colorum quæ in flore eſt varietatem, plantam ipſam non immeritò Iridi cœleſti aſſimilatam fuiſſe. Et hoc ipſum ſatis innuit Plinius, apud quem Dioſcoridis toto opere nullam fieri mentionem, mirari ſatis non poſſum. Is enim lib.21.nat.hiſt.cap.7. *Floret*, (inquit) *Iris diuerſi coloris ſpecie, ſicut arcus cœleſtis: unde & nomen.*]Cæterùm Iridis flores, ſcribit Philinus, Athenæo teſte, λύκους, hoc eſt, lupos, ex eo nominari, quòd lupi rictui labriſque ſimiles ſint.

ἡ μέλαινα] Malui μέλαινα ex codice Aldino legere, quàm ex Pariſienſi μέλανα: maximè quum eam quoque lectionem ſecutus videatur Oribaſius, Collect. lib. 11. Huc accedit quòd in Iridis flore color ſubniger cernitur, qualis in viola nigra, quę ideò etiam μελανία nomẽ accepit. Omnino verò luteus color in eo ipſo vix vlla ex parte, quod videam, conſpicitur, ſed tantùm ex luteo albicans aut palleſcens: qui Græcis ὠχρὸς dicitur. Hic enim, Platone in Timæo teſte, conflatur λευκοῦ ξανθοῦ μεμιγμένου, ſcilicet cùm flauo ſeu luteo commiſceatur album.

διαφορᾶς λίνου] Oribaſius χρώματος vel χροιᾶς legiſſe videtur: ſed paruo diſcrimine.

Τὰ δὲ βελτίω ἐν Ἰλλυρικῷ] Gal.etiam 1.de Antidot.in Illyricam cæteris præſtare tradit. Sed & ante ipſum Theophr.9 hiſt. cap.7. laudatiſſimã ſcribit in Illyrico natam, & ibi quoque non quidem maritimis in locis, ſed mediterraneis, magiſque ad Septentrionem ſitis. Plinius ex ſententia Theophr. lib.21.c.7. *Iris laudatiſſima*, inquit, *in Illyrico, & ibi quoque non in maritimis, ſed in ſyluestribus Drilone & Narone.* Sic Iridis meminit Nicander in Theriacis, ἐν ὄρεσι Δρείλωνος καὶ Νάρωνος ὄχθαις. Sunt verò, Ptolemæo teſte, Drilo & Naro fluuij in Dalmatia Illyrico vicina.

τῶν χωρὶς πυρίων] Ita legimus ex vetuſto codice. Vulgata tamen exemplaria habent πυρίων, fortè ἀπὸ τῶν πυρίων vel πυρώδων, hoc eſt, guſtu feruẽtiore. Et hæc lectio tolerari quoque poteſt: maximè cùm Oribaſius, loco ſuprà citato, eã ſecutus eſſe videatur.

τὰ δὲ παίρουσι πλέον ἢ πάχος ἔχει.] In veteri Sambuci codice legitur, τὰ δὲ παίρουσι πλέον ἢ πάχη καὶ χολαί. Goupylus verò in aliquot exẽplaribus legit, πάχος: quæ quidẽ lectio vt Interpretibus aliis, ita mihi ipſi magis arriſit: ſiue πάχος pro craſſioribus excrementis, ſiue pro craſſioribus humoribus accipiamus. Nec enim me mouet quod exiſtimat Goupylus, expungendam eam dictionem, ne qua in Autoris verbis videatur ταυτολογία: cùm iam antè (inquit ille) nihil aliud voluiſſe viſus ſit Dioſcor. quo loco ait, radices Iridis τὰ δυνατώτερα ἰσχὺν ἀπ-

ἀποπνεῖν, hoc est, ἀναπνεῖν πιεῖν, vti loquitur Paulus, cum de his ipsis radicibus mentionem facit. Sed (quod pace tanti viri dictum velim) quis non videt aliud esse τὰ δριμέα ἄγειν ἀπὸ, aliud τὰ δριμέα ἀγειν ὑγρὰ ἀπέπτως? quum illud sit, humores crassos purgare: hoc vero, eos ipsos attenuando ad purgationem præparare. Adde quòd vbi de attenuatione sermo est, de thorace cõtentis humoribus agitur: vbi verò de purgatione, de crassis iisdem quauis etiam alia corporis parte contentis.

CAP. II. ὑπαλιούντα] Contrà Plinius lib. 25. cap. 13. Acoro tribuit radices nigras, minúsque venosas, cæterò similes itidis.

ἢ ὡς Καλῶν, Oribasiũ ac Dioscoridis interpretes secutus, Καλῶν legere malui, q. Χαλκῶν cũ Par. codice. Huc accedebat quòd et Acoro primas tribuat etiam Plinius, lib. hist. nat. 25. cap. 13. quod in Colchide nascitur iuxta Phasim amnem, & vbique in aquosis. Est verò Colchis, Asiæ prouincia, vti & Galatia: cuius itidem hoc ipso loco meminit Dioscorides. Ea Corace mõte, à Septentrione: ab Ortu, Iberia: à Meridie, Phasidis amne: ab Occasu Ponto EVxino clauditur.

CAP. III. ἡ χρῶνται ἐπ' ἀρθροις πονοις. διὰ ταῦτα, &c.] Ita legere & distinguere visum est, contra quàm in cæteris exẽplaribus habeatur: nempe vt quod de eclegmate ex Mei radicis puluere & melle cõcinnato dicitur, ad vnius thoracis affectus referatur, non item ad aliarum partium vitia: quibus eclegmata vt minùs conueniunt, ita neque accommodari consueuerunt.

CAP. IIII. σκορπιοδηκτοις] Aut σκορπιοδήκτοις legendum, quæ vox huic Authori satis est vsitata: aut potiùs σκορπιοπλήκτοις, hoc est, à scorpione ictis, qua quidẽ voce vtitur sequenti capite Dioscorides. *Non memendus enim morsu, sed acumine caudæ scorpius*, vti loquitur Ouid. 4. fast. quanquã & eiusmodi aculeum Plinius dentis nomine appellare non veretur, lib. 11. cap. 37. Cæterùm vt prior illa lectio codicum quorundam & veteris Interpretis testimonio, ita hæc posterior Pauli de cyperide agentis, itémque Plinij autoritate nititur.

CAP. VI. ἔχουσι δὲ στάχυν] στάχυς nomine plerunque accipitur spica vulgo dicta, qualis ea est qua frumẽtacea semina coniinẽtur: quæq; Varrone teste lib. 1. de re rust. cap. 48. rusticis olim à spe spica nominabatur: *ea enim* inquit ille) *quòd sperant fore, serunt.* Ab hirũ etiam spicarũ similitudine Græci ὁλόστους thymo, ὀτοεchadi & similibus στάχυν tribuũt. Sed στάχυν seu spicam hoc loco ita non esse accipiendam, vel ex eo patet, quòd, quicquid dicant nonnulli Plinij autoritate decepti, nardus Indica spicas huiusmodi nullas habere comperiatur. Intelligit verò Dioscorides nardi radicis nucleum, quæ quidem pars est ipsius nardi nobilissima, præstantissima, ac etiamnum in vsu Medico frequentissima. Vt enim Columella Latinique alij spicas interdũ accipiunt pro nucleis, quibus numerosis ac sibi inuicem cohærentibus quarundã radicũ bulbosa capita compinguntur, velut allij, vlpici, liliorũ, quiq; in allio, Dioscorides teste, Græcis peculiariter ἄγκιστρα nuncupãtur: ita & Græci στάχυας pro isdẽ radicum nucleis accepêre, ac tùm certè potissimùm cùm Indicæ nardi fecêre mentionẽ. Idipsum satis apertè inquit Gal. 1. de Antid. quo loco radicẽ nardi spicam nominari dicit, non quia verè spica sit, sed quia spicæ figurã æmuletur. Itémq; lib. 9. de comp. medic. secundum locos, quam Philo in describẽda sua antidoto ὀίζην ψευδοστάχυν nominarat, nil aliud esse asserit, quàm ipsissimã nardi radicẽ: ibidémque annotat Philoni ψευδοστάχυν ita dictam, quod vulgò nõ radix, sed spica vocaretur. Quinetiã 8. de simpl. medic. facult. vbi de nardi radice tãquam potiore nardi parte agit, ῥιζίον στάχυν appellat, quasi ex eo vocabulo vnicuique satis cognitam. Quinetiam AEgineta & Actuarius cõposito nomine ῥιζοστάχυν nominauerunt. Græcorũ fortassis exemplo dixit Ouid. 15. Metamorph. *Nardi lenis aristas.* Easdẽ Statius Syl. v. aristarum odoratarum nomine intellexisse videtur, quo loco

odoratas (ait) *nec Arabs decerpsit aristas.*

Quanquam horum poetarum vterque potiùs de nardi Italicæ spicis, lauandulæ vulgo dictæ, congeneris fortè locutus est, quemadmodum & Plinium fecisse mihi fit verisimile, quando nardum fruticem describere conatur, lib. 12. cap 12. Cæterùm nõ ignoro à quibusdam merito in dubiũ vocari, sintne spicæ illæ antedictæ nardi radicum particulæ, an verò potius ab vna prodeuntes radice supra terram extẽt. Verùm equidem, dum à peritioribus herbariis certius aliquid cognouero, vnà cũ Galeno radicibus eas annumeratas esse duxerim. Nec illud absre: quandoquidẽ vt aiunt, intra terram latere comperiantur, ac, vel ipso teste Theophrasto, quæcunque terra conduntur stirpium partes, earundem radicibus accenseri oporteat.

σφόδρα καλοῦσι] Vt non habentur hæc duo vocabula in veteri exemplari, ita neque apud Oribasium, & fortasse redundãt. Nec enim fit verisimile quam paulò post μεγαλόσταχυν fuit esse, simul & σ. mei σφόδρα καλοῦσι, hoc est, valde curtam, pusillam ac muti am conspici.

σπάνια διήνεκα] ἐλεοχαρὲς διήνεκες nomen conuenire videtur, memor eius dictionis quæ habetur apud Oribasium libro 1. coll. cap. 31. τὸ ἐλεοχαρὲς, κατασταλτικὸν καὶ διήνεκες: quamuis plerunque dictiones has apud Medicos tum Veteres, tum etiam recentiores, confundi tam certum est, quàm quod certissimum. At reuera periphrasis, qua sum hic vsus, mihi ad exprimendam Autoris mentem omnium aptissimè quadrare vita est. Siquidem καθ' ἕξιν vocabulum, quod hoc ipso habetur loco, etiam alibi Dioscorides ad corporis partem accommodat, quam non tantum humere humoréve perfundi intelligendum, sed etiam ex humoris quasi resudantis redundantia odorem de se tetrum expirare: veluti cùm ait loco alio: κατὰ ἕξιν μαλακὰς ἀμίζει, quod quidem non ineptè quidam interpretantur: *alarum vitia mitigat.*

CAP. VII. ἁλιούντα] In duobus manuscriptis codicibus legit Goupylus ἁλιούσσα: attamen cum Ruellio legendum opinatur, σαλιοῦντα: quasi verò citra σ. aspiratum ἁλιοῦντα Latinum saliunca non satis exprimeret. Ac vterque fortassis cum Leoniceno nardum Celticam seu Gallicam, plantam eam existi ; auit esse, quam Saliuncæ nomine describit Plinius: cuius itidem mentionem facit Poëta in Bu-

colicis, dum humilis cognomen illi attribuit. Sed quàm parum firmis nitantur rationibus, ij iudicent qui Plinium diuersis capitibus de nardo Gallico & saliunca egisse, isque notas virésque dispares assignasse animaduerterint. Malui equidem non ineptam Marcelli Virgilij coniecturam sequi: qui quidem facili librariorum errore deprehéso, κάλαμον legēdum putat. Eam verò coniecturam cōfirmare videtur & ipse Oribasius, aut certè Rasarius Oribasij interpres, capite de nardo Celtica.

CAP. VIII. οἱ δὲ κλῶνας] Sunt qui capitis huius initio ἀπὸ τῶ καυλοῦ, κλῶνας seu κλάδους reposuerint: quo è numero fuere Ruellius & Marcellus Virgilius: nec id alia (opinor) ratione, quàm vt Dioscoridem à contradictione vindicarent. Verum quia κλῶνες seu κλάδοι, hoc est, rami surculive, arboribus magis quàm herbis conueniunt (quanquam non ignoro sæpenumero etiam ad herbas, maximéque frutices transferri) nobis ea lectionis immutatio nondum satis apta videtur. Itaque cum Sambuco maluimus ex Hispano codice ἀπὸ τῶ φύλλου, ὑποφύλλου legere: quasi velit Autor nardi montanæ tum caulem tum fructum, tum denique florem, ætatem minimè ferre. Quòd si vulgata lectio retineretur, qui nardo montano prius caules & folia eryngij tribuerat Dioscorides, à seipso iam manifesto dissentiret. Cæterùm multò minùs aptè (nostro quidem iudicio) aliis quibusdam, ac inter cæteros, Mathiolo viro alioqui grauissimo, casibus immutatis legendum videtur: οἱ δὲ καυλὸς, οἱ καρπὸς, οἱ αὐτὸς ἀνθέρικος, quasi voluerit Dioscorides has plantæ partes nullius esse in medicina vsus.

CAP. IX. κηλοῦσι] Paris. codex habet πίνει δυσέντερα τραχυσμῶδεα, quidā βοηθεῖ δυσέντερα, &c. Sed codicem Aldinum secutus ista consultò prætermisi: maximè cùm in vetustis quibusdam exemplaribus non extare compertum haberem. Huc adde quòd Asarum tantùm abest herba vt sit coronaria, vt ex eo ita vocitatū dicat Plinius, quòd in coronis non addatur: quanquam ea etymi ratio mihi non satis probatur, ac potiùs Asarum ita appellatū videtur, ἀπὸ τῶ α privativi καὶ σαροῦν, verrere σαρώσεως, quòd scopis non adderetur, scopis inquam seu manualibus, quas serta floscululosve dicunt, seu lustralibus, quæ essent olim euerrendis Deorum aris dicatæ, quales ex verbena, verbasco similibúsque plantis comosis simul ac firmioribus colligebantur. Translata verò illa videntur ex cap. 51. lib. 3. de Bacchari: idque ab iis qui ex Gallici nominis bacchar (pro quo nunc per syllabarum metathesin *abaret* dicunt) affinitate, Asarum Dioscoridis cum bacchari vnum & idem esse coniecerunt. Quasi verò duobus diuersis capitibus Dioscorides eadémq; planta fuisset acturus, ac dissimiles tum notas, tum vires locis diuersis eidem plantæ ascripturus. Equidem bacharin Asarum Crateuæ esse facilè adducor vt credam. Sed quantum inter bacharin seu βάχαριν & Dioscoridis asaron sit discrimen, præter Plinij testimonium minimè contemnendum, lib. 21. cap. 6. diuersa quoque apud Dioscoridem, Paulum & Oribasium vtriusque descriptio per se satis indicat. Etsi fateor Galenum & huius exemplo Aëtium pro bacchari Asarum visos accepisse: vt qui nulla baccharis facta mentione, asaro vires acori tribuerint, quæ quidem Bacchari potiùs quàm Asaro, si quis diligentiùs aduertat, conuenire videbuntur. Verùm vt ad rem redeam, illo ipso errore factum etiam est vt quæ de Asari viribus circa capitis finem in Florentinis codicibus habentur, quæque in editione Parisiensi inter Dioscoridis spuria reposita fuere, in hunc locum perperam ex capite de Bacchari antè citato translata fuerint.

μανίνην δὲ μᾶλλον] Paris. codex μηρίνην. Sed ex Aldino & vetustis exemplaribus legi, μανίνην, haud ineptè. Siquidem huic lectioni veritas ipsa suffragatur. Fuchsius ex Plinio μελανίνην legendum putat: sed siue μελανίνην, siue μανίνην legatur, vtrunque de Asari foliis meritò ac iure optimo dici potest. Hederaceis enim ea densiora simul & molliora esse iudice sensu nemo non animaduertat.

ὑοσκυάμου μᾶλλον] hoc est, κατὰ τὸν ὑοσκυαμον. Vetus quidam ὑοσκύαμον μᾶλλον. Oribasius ipse, aut certè (vt verùs dicam) ipsius Interpres, ὑοσκυάμῳ ἢ μανίνῃ legisse videtur, quasi flores Asari conferre voluerit Autor non hyoscyami modò flori seu calyculo, sed etiam mali Punicæ domesticæ flori. Κύτινος enim ex ipsius Dioscoridis sententia mali Punicæ domesticæ primum partum florémve, ampullagium (si Cælio Aureliano credimus) Latinè dictum, propriè significat: vti balaustium, syluestris. At nihilominus similitudinis ratione transfertur & hoc vocabulum ad hyoscyami flores, hypocistidem & cætera id genus, quæ figura cytinum referre videtur. Patet illud ex Dioscoridis contextu satis euidenter. Siquidem capite de hyoscyamo, cùm de floribus ipsius agit, cytinos eos indubitāter appellat. Capite verò de hypocistide, cytinum itidem eam à nonnullis nominari affirmat. Quare parum interfuerit hoc loco, seu vulgatam, seu Oribasij lectionem sequamur.

CAP. X. οἱ δὲ κισσὸς τὸ καὶ κιττόκαρπον] Sunt qui ἀπὸ τῶ κιττόκαρπου, κισσοῦ, id est, hederæ, legant: alij verò καρπὸς, quasi Valerianę vmbella ferulę flores proferat. Andreas Cæsalpinus τῆς καρδίου legendum existimat, non alia, vt videtur, ratione, quàm quòd inter nardi genera cēseatur. Porrò si Valerianæ flores narcissi floribus conferantur, quemadmodum figuram narcissi quadantenus æmulari non negamus, attamen in nostra certè quidem Valeriana, quæ non obscurè notis cæteris Dioscor. Phu respondere videtur, sunt non paulò minores quàm narcissi: contrà quàm in Græco Dioscor. contextu habetur. Hinc adeò factum est, vt nonnulli ἀπὸ τῶ μικρὸν, ἄνθους vel ἄνθα legerint, vti Ruellius libro de natura stirpium secundo, itémque Matthæus Syluaticus, dum in Pandect. citat & Serapionis & Dioscoridis ipsius contextum. Quòd si cui est religio quicquam in Græcis codicibus citra fidem exemplaris alicuius immutare, at certè credat oportet, Phu Ponticum forte assis & fauentis cœli beneficio & vbertate soli maiusculis comari floribus, atque adeò longè maioribus, quàm quæ apud nos vel in hortis coluntur, vel sponte nascuntur.

CAP. XI. ἴδιον τὸ τῆς ῥίζης] Si quid ego in re

tam ancipiti rectè iudicare possum. Malabathrũ neque Indicæ nardi folium est, vt rectè monet Dioscorides, neque id folij genus quod Arabibus Betre, Persis Tambul seu Tembul appellatur: multò verò minus canellæ aut caryophylli folium: sed est profectò sui generis folium, non quidem in Syria aut AEgypto, vti voluit Plinius, sed in India ex arbore procera decerptum, quod Græcis interdum folium simpliciter & κατ' ἐξοχὴν dictum est, interdum cum adiuncto, malabathri: aliàs etiam folium Indicum à loco natali cognominatur. Id mali Medicæ folium quadantenus repræsentare dicitur, attamen tribus neruis fibrisve dorsi longitudinem intercursantibus distinctum est, hodiéque apud Indos etiamnum teste Garcia ab Horto paucis immutatis folium Tamalapatra nuncupatur. Hoc verò cum Malabathri folio vnum & idem esse vel ex eo constat, quòd Malabathri viribus adamussim respondere comperiatur. Verumenimuerò nisi (quod facilè crediderim) fabulosa est hoc loco Dioscoridis, itémque Plinij & Auicennæ historia, fuit & aliud ab isto diuersissimum malabathrũ, palustris herbæ folium, sed tamẽ iisdem quoque viribus præditum. Quòd verò Indicum folium à Malabathro differre nonnulli existimant, Actuarij ni fallor, auctoritate ducti, qui in describendo Hedychroi magnate vtrunque nominat, parum ij firmo argumento niti mihi videntur. Illud enim opinor errore librariorum accidisse, & alterutrum è margine in contextum perperam trãslatum fuisse: maximè cùm ab Autoribus aliis, qui eãdem compositionem describêre, planè omittatur. Aliis aliorum argumentis doctiss. vir Mathiolus abundè videtur satisfeciss.

Φύλλον ἀρωματικὸν] Garcias ab Horto folia Malabathri non quidem in hunc modum lineo filo transfigi, sed collecta in fasciculos colligari & ita vænire scribit. Atque ex eo fortasse Plinius Malabathrũ folio esse conuoluto inferebat, lib. 12. cap. 26. Illud idem folij Indi historia, quæ ab Arriano circa finẽ peripl. maris Erythræi describitur, perbellè respõdet, Is enim eiusmodi folia tradit à Sesatis populis, qui finitimi sunt Cirrhadibus (apud quos etiam præstantissimũ nascitur Malabathrum, teste Ptolemæo) circa ciuitatem Thinam asseri, ac dum in vicinia populabundi vagantur, stramentorũ loco substerni, tandémq; postquam remigrarunt, ab ipsis Thinæ incolis auidè cõquiri, & in globulos cõuolui atq; complicati: ita tamen vt tria Malabathri pro foliorũ magnitudine agnoscantur discrimina, *ἀδρόφυλλον*, inquam, *μικρόφυλλον* & *μικρόφυλλον*.

Ὑπόλευκον ἐστὶ] Contrà Plin. lib. 12. cap. 26. minùs probat candidũ: rursũmq; cõtrà ac Dioscorides, laudatius cẽset, quod est quodã salis gustu.

παρέζει δὲ τῇ χνόῃ] Idé de sapore Plinius affirmat: esse verò croco odoratius. At cõtrà Garcias neque nardi saporem agnoscit, neque tam validum odorem atque in spica reperitur, sed longè suauiorẽ: quin neque vti reliqua odorata ipsum caput ferire testatur.

ὑπερέχουσι δὲ ὀσμῇ] Legitur in Aldino exempl. ὀσμὴν, quam quidem lectionem Serapio, Ruellius & Syluius secuti videntur. At ipsa contextus series ὀσμῇ potiùs legendum esse satis indicat. Cùm enim in cæteris omnibus nardũ præferat Autor, attamẽ in eiendis vrinis iuuandoque stomacho Malabathrum illi præstare statim subiungit. Porrò Galenus & qui eũ secuti sunt omnes, citra comparationem nardo viribus simillimum esse dixerunt.

CAP. XII. *ἔχει δὲ μέσον*] Addunt hìc nonnulli codices, ὕστερον ἴσως, pro quo restituendum esset ex Theophr. lib. 9. de hist. plant. cap. 5. ὕστερον ἄχνη. Ait enim hoc ipso loco, vt cinnamomũ ita & casiam, aut certe plantas e quibus illa decerpuntur, δάφνας δὲ μεγάλας, ἀλλ' οὐκ ἐλαίας ἀγρίας, μανδραγόρας δὲ καὶ ξυλώδεις, hoc est, *fruticas esse non ita grandes, sed minus magnitudine, attamen ramosos lignososque.* At Galenus parum sibi constans, modo fruticum, modò arborum genere comprehendit. Nos quantum ex historia recentiorum colligere possumus arbusta potius esse credimus oleæ, lauri aut arbuti magnitudine, foliis verò citreæ mali, aut etiam piperis, quemadmodum in vulgatis habetur exemplaribus: non item origani, vti habetur apud Plinium, aut indis, velut in Aldino Dioscor. exemplari. Legitur enim, non ὡς ὀρίγανος, sed ὕστερον ἴσως, errore facili. Et certè quidem licet huic Aldinæ lectioni præter Serapionem duo etiam Dioscor. manuscripti codices astipulentur: attamen illa prior huic loco ita congruere visa est, vt nihil immutandũ duxerim, maximè cùm & ipsa piperis folia malis citreæ seu Assyriæ foliis ab omnibus ferè historiæ plantarum Autoribus assimilentur.

παχύφλοιον] Contrà Plinius, lib. 12. cap. 19. tenui cute veriùs quàm cortice.

ζίγερ] Hanc casiæ speciem seu potiùs pro bonitatis ratione differẽ etiam ab incolis itidem appellatione barbara ζίγερ vocari Gal. asserit, lib. 3. de comp. medic. κατὰ τόπους: quanquam pro eo ibidem habent codices nonnulli ζιγηρίου. libro verò de ther. ad Pis. ait ζίγηρ nominari. Sed mẽdum vtrobique subesse mihi facilè fit verisimile: quoniam lib. de antid. 1. cap. 13. quo loco ex professo de casiæ generibus agere videtur, eandem illam vocat ζίζι nomine disyllabo & παλαμαίαν. Arrianus in peripl. maris Erythræi ζέρυ nominat, Aëtius ζίζω, Plinius ballamoden. Porrò & alia sunt casiæ differentiarũ barbara nomina tum apud Gal. tũ & apud Plinium, ab his quæ a Dioscor. memorantur omnino discrepantia, de quibus liberum esto suum cuique iudicium.

CAP. XIII. *πρεσζὸν ὑπὸ οἰνάνθου*] Dixit. itidem Gal. lib. de ther. ad Pis. μίσυος πρασίδος τῇ χρόᾳ. Sed colorem hunc Cinnamomi paulò apertiùs exprimit idem lib. 1. de Antid. quo loco ait: τὴν χρόαν ὑπόπυρον, οἵα ὅταν μίξωσι τῷ χαλκῷ τὸν καλούμενον ὑπὸ τινων καλλαΐνην ὕστερον βραχὺς τῆς κυανοῦ καλουμένου, hoc est *colorem talem habere qualem si quis fusco vocato colori lactis colorem admisceat, atque cæruleí quem vocant aliquantulum addat.* Quare, tanquam & veritati ipsi & huic Galeni sententiæ magis conseruanea, vulgata lectio retinenda videtur: non item illa, quam potiorem autumat Marcellus Virgilius, πρεσζὸν ὑπὸ οἴνου: quasi Dioscor. Mosylicum Cinnamomum simpliciter & ex natura sua nigrum statuisset: vino verò dilutum cinereum reddi voluerit.

πρασίζουσι καρδαμώμῳ] Rutæ odori cum cardamomo nihil quicquam cognationis aut affi-

nitatis esse videtur. Quamobrem non immeritò tum Vetus Interpres, tum & ipse Marcellus Virgilius, ἀπὸ τῆ καρδαμωμου, dempta penultima syllaba καρδαμω, hoc est. nasturtio, legerunt. Ita verò & alibi καρδαμωμου ἀπὸ τῆ καρδαμου perperam interdum legi satis testatur etiam locus ille Gal. qui est lib. x. de compos. medic. κατὰ γένος, inter cõpositiones ab Andromacho conscriptas ad Ischiadicos. Ibi enim dubio procul cardamomũ pro cardamo, hoc est, nasturtio, legi nemo dubitauerit, qui certè quidem nasturtij vires diligenter & ad amussim exploauerit. Porrò seu rutæ seu cardami odorem Cinnamomo tribuas, à Galeni sententia longè latéque discesseris, qui lib. de Antid. 1. ait esse ἡδύτατον, ἄριστον ἁπάντων ἡδύτατον ὑπὸ ἀνωτάτω τι ἄκρα, hoc est, odoratissimum, meßalulo quadam præ cæteris omnibus odoru suauitate prædituin; itémque lib. de Theriaca ad Pis. σφόδρα ἡδύτατον, καὶ τῆ ὀσμῆ κρατιστον τ καὶ ἡδιστον, hoc est, maxime odoratum, odoréque simul & præstantissimo & iucundissimo prædituin. Quin & pugnantia locutus videbitur Dioscorides qui antea itidem ipse σφόδρα ἡδὺ esse dixerit: quanquã apud Dioscoridem & apud Theophr. ἡδὺ nõ perpetuò suauẽ odorem, sed & interdũ eximiũ ac potẽtem, quantumuis grauẽ, qualis est rutæ, denotet. Quare vocabulũ πυγανίζουσα non abs re hoc loco mihi suspectum videtur: quanuis & ipse Gal. lib. de ther. idem Cinnamomi genus ἡμιπυγανίζον πυγανίζον asserit.

ὡ τῆ θριδακίνου χυμὸς] Fortè χυλὸς, ἀπὸ τῆ χυλῶδες, quod succulentum significat. Vult enim, nisi fallor, quod præstantissimum est Cinnamomum inter frangẽdum puluerari, seu in puluerem facilè resolui: aut potiùs, quemadmodum intellexisse videtur Autor lib. de simpl. medic. ad Paternianum, puluisculum ex se remittere. Et ea quidem lectio, vt Serapioni & Marc. Virgilio placuit, ita & huic loco satis aptè quadrare mihi videtur.

καὶ μεγάλην ἔχον ῥίζαν] De quarto hoc genere Galenus contrarium asserit. Cùm enim dicat Dioscor. μεγάλην ἔχον ῥίζαν, ille contrà lib. de ther. ad Pis. μικρὰν ἔχον τὴν ῥίζαν, nisi fortè μικρὰν, ἀπὸ τῆ μικρῶν mendosè legitur. Sed obseruabis & eodem loco apud Gal. discriminis nõ parum, cùm Cinnamomi genera omnia à Dioscor. cõmemorata persequitur.

ἀναλγητου δὲ τῆ λειοῦ] Marcellus quò Dioscor. à contradictione vindicet, alio planéque contrario significato verbum ἀναλγητου vsurpauit, ἀπὸ τῆ ἀπαλὸν, τυπτὸν, παραπλῆσιον: qua quidem significatione interdum accipi minimè diffiteor. Sed seruata etiamnum τῆ ἀναλγητου vulgata significatione, planè nulla (quod ipsius pace dixerim) deprehenditur hoc loco contradictio. Quandoquidem anteà prætulit Autor in Mosylici genere quod læue est: in hoc verò quinto genere, quod scabrum visitur præpollere asserit. Nimirum (quod quidem sani iudicij nemo absurdum iudicauerit) in diuersis cinnamomi generibus læuorem & scabritiem modò laudari, modò improbari voluit. Nihilo verò magis & huic nostræ sententiæ Plinij, Autoris alioqui grauissimi, autoritas repugnare videtur.

καὶ τὰ διαφυλλα] Quia redundabant hæc verbal, minimè vertenda putaui. Redundare verò frustráque hic repeti satis patet, ex antedictis: vbi & illud habetur, καὶ κατάφυλλα διαφυλλα ἔχον εὐρυκλεῖ. Sic & ea quæ ad capitis calcem adduntur in Ald. codicibus, tanquam eò perperam translata, meritò prætermittenda duxi. Quanuis enim ea totidem penè verbis apud Serapionem legantur, attamen Crateuæ potiùs aut alterius cuiuspiam Scriptoris esse dixerim, quàm ipsius Dioscoridis. Siquidem vix aliud ea significant, quàm quæ paulò antè habentur in ipso Dioscoridis contextu, dum pseudocinnamomi mentionem faceret: etsi non inficior præter ipsas voces vtcunq; immutatas nõnulla præterea adiici, ad maiorem certioremve distinctionẽ τῆ ψευδοκινναμωμου à legitimo cinnamo seu cinnamomo.

Cap. xiiii. οἰνάνθη βότρυς] Varia quæ huic loco, meo quidẽ iudicio, accommodari potest interpretatio effecit haudquaquam dubie, vt hactenus de Amomo vix quisquam recentiorum certi quicquam prodiderit. Alij enim Ribes speciẽ quandam, alij rosam Hierichuntis dictam, nonnulli geranij speciem moschum redolentem, alij denique syluestris piperis genus esse voluerunt. Equidem in re tam dubia & ancipiti non ausus Plinij Autoris grauissimi autoritati quicquam derogare, ita conuerti, vt tamen hoc loco βότρυς, qui propriè racemus est, & Latinorum vuam, pro ipsa vite accipiam, quemadmodum etiam vsurpauit Virg. 2. Georg. *Et turpes assibus præda fert uua racemos*: quasi voluerit Dioscorides, quemadmodum vitis sarmento suo, ita & Amomum suis virgultis ligneis in seipsum conuoluit: aut etiam, Amomum vitis instar ligno seu arbori cui adnascitur fese circumplicare atque (vt ne à Plinij dictione discedam) conuoluere. Quod si quem sententiæ nostræ fautorem nactus fuissem, maluissem ipse aliter conuertere, vt dicerem Amomum pusiliũ esse fruticem, veluti botrym lignosum, in seipsum conuolutum: atque ita de botry herba seu frutice intelligi vellem. Sed seruatis reliquis posset etiamnum βότρυς in proprio significato pro ipso botro seu racemo vsurpari, quasi magnitudine fruticẽ hũc racemo adæquare Autori in animo fuisset. Varias ac planè dissimiles hasce versiones omnes ita proponere mihi visum est, quò facilius vnusquisque quam cæteris præferendam esse iudicauerit, ad arbitrium deligat.

ἐκμαγίζει τῆ ὀσμῆ] Paris. codex πυγανίζει. Serapio, vti ferè solet in ancipiti lectione, vtriusque nempe tum rutæ tum & origani mentionem facit: vt odore quidem rutæ, sapore verò origani Amomum esse velit. Nos cum cæteris Interpretibus vetusti codicis lectionem ἐκμαγίζει retinere maluimus.

ὅμοιον βοτρυδίοις] Fortè ὁμοῖον ex Aëtio, vt ad illud, ἀπήμασι, referatur. Nimirũ innuere vult, semen amomi (qui ipse fructus est) acinis esse simile. Alioqui βοτρυδίου non pro acino, sed ἀπὸ τῆ βότρυος, hoc est, pro racemulo ipso, accipiendum hoc loco foret.

Cap. xvi. χῖον] Hic χῖον simpliciter & κατ' ἐξοχὴν vocat Dioscor. quam Hipp. libris de morb. mul. modò ἐλίσσιον, modò ἕλειον, aliàs ἑλίδια cognominat. Gal. in vocum Hipp. Lexico, ἀφρομαλακὸν χῖον interpretatur: alibi vocat & ipse μυροψικὸν. Latini ratò iuncum simpliciter & sine adiectione nominãt: frequentiùs autẽ

cum epitheto, nempe odoratum, veluti Plinius & Scribonius Largus. Celsus verò rotundũ appellat: nimirum ad distinctionem Cyperi, qui & ipsi Celso iuncus quadratus, Plinio triangularis, dicitur. Porrò lib. etiam 4. τῆς χοίνου mentionem facit Dioſc. sed tùm de paluſtri vulgarique iunco atque adeò multùm diſſimili loquitur, qui quidem rarò ſimplici χοίνου nomine deſignatur: alius enim ὀλόχοινος dicitur, pro quo perperam interdum apud Gal. legitur ὁλοκόχινος, alius ἑξάχοινος, alius denique χοῖνος λεῖος nuncupatur. At χῖνος dempto ο, lentiſcum interdum, aliàs etiam ſcillæ ſpeciem quandam ſignificat: quamuis tùm ad maiorem diſtinctionem, χίνος, πυρξάινον ſcribi quidam volunt.

οἱ δὲ πυρίτου] Plinio lib. 21. cap. 18. non quidem Babylonius iuncus, ſed qui in Nabatęa naſcitur, Teuchitis cognominatur. Eidẽ iuncus hic odoratus vinoſæ mordacitatis eſſe traditur, quum tamen Dioſcorides linguam mordere cum multo feruore ſimpliciter ſcripſerit. Quod verò de odore roſæ referunt tum Dioſcorides tum etiã Plinius, id pernegat Garcias ab Orta. Nam tritum quidem fatetur iucundum odorem ſpirare, at nõ roſę: obitérque annotat, Dioſcoridem in deſcribendis aromatis ita plerunque incertis comparationibus vti ſolitum.

διώρυχι δὲ ἴχει] Aldinus codex addit hoc loco ὑπομαλακτικὸν, αἱματουρικόν. Sed hoc poſterius fruſtrà repetitur: illud alterũ fortè mendoſum eſt, αἱμὰ τῶ μαλακτικὸν. Sic enim videtur legiſſe Serapio. Sed malim tamen hoc ipſum μαλακτικὸν ante vocem ἀντιλιθικὸν legere, quemadmodum & ille ipſe videtur legiſſe.

Cap. XVII. κάλαμος ὁ πυρίτης] Aëtius, πυρίτης, haud ita magno diſcrimine: at Plinio lib. 12. cap. 22. melior qui niger eſt: quanuis ſunt qui eum locum Plinij aliter legant.

χίνων ἀραχνίων τὴν σύριγγα] Innuit Autor araneoſam eſſe calami fiſtulam, hoc eſt, plenã materiæ cuiuſdam ſeu potiùs medullæ, quæ telæ aranearum ſit ſimilis. Aranei genus id florem ait vocari Plinius, lib. 12. cap. 22. *Ineſt*, inquit, *fiſtulæ aranearum, quod nomine florem.* Garcias ab Orta, non contemnendus huius ætatis Medicus, calami huiuſce cum aliquantula interdum radicis parte fragmenta ſæpius obſeruaſſe & vſurpaſſe videtur: quantum ex eius hiſtoria licet colligere. Attamen negat is vlla ex parte aranearum telis eſſe ſimile, quod intra fiſtulam ſpongioſum & flaueſcente colore conſpicitur. Porrò hunc Indicum ſeu aromaticum calamum Hipp. & Galenus ipſe interdum, μυρεψικὸν. i. vnguẽtarium, appellat, Plutarchus Arabicum, Corn. Celſus Alexãdrinum. Plinius non aromaticum, ſed odoratum conuertit, quanuis ἀρωματικὸν vox manifeſtò quiddam aliud innuere videtur.

ἐν τῷ ἰξμαλοπίνῳ γαλίχῳ] Plinio, loco citato, *melior quò breuior & craſſior, lentúſque in frangendo*: ſed legi malim in mandendo, maximè cum iam eodem loco paulò antè meliorem ſcripſerit, qui minùs eſt fragilis, & qui aſſulosè potiùs quàm raphani modo frangitur, atque adeò hoc idem deinde fruſtra repetiſſe videatur.

Cap. XVIII. περὶ δένδρου τῆς μάγδιδος καλουμένης.] Arboris huius magnitudinẽ & formam alij aliter exprimere conati ſunt, vt in tanta varietate certi vix quicquã pronuntiare poſſimus. Ac Pauſanias quidem in Bœoticis naſci prodidit in Arabia magnitudine fruticis myrti, foliis ſampſuchi herbæ. Solinus in Polyhiſt. ſimiles viribus ſtirpes eſſe tradidit. At Plinius lib. 12. cap. 25. balſami arbuſculam viti quàm myrto ſimiliorem eſſe voluit: huic folium eſſe rutæ proximum, proceritatem intra bina cubita ſubliſtere, &c. Theophraſtus verò 9. de plant. c. 6. magnæ Punicæ malo ſimilem eſſe dixit, folio rutæ proximo, fructu terebinthi. Monardis itidẽ Hiſpalẽſis huius ætatis Medicus lib. de ſimpl. med. ex Occidentali India delatis, arborem eſſe aſſerit malo Punica maiorem, ſed folio viticæ. Strabo lib. 16. Geograph. autor eſt, cytiſo & terebintho perſimilem eſſe. Iuſtinus hiſtoricus lib. 36. pineis arboribus formam ſimilem habere, niſi quòd ſit humilis magis & in vinearum morem excolatur. Porrò Dioſcorides hoc loco magnitudine lycio ſeu pyxacanthę ſimilem eſſe tradit. Nam ἀπὸ τῆς λυκίου, Λυκίου legendum videtur, itémque ἀπὸ τῆς πυξακάνθης, πυξακάνθης. Eſt autẽ Lycium vnum & idem cum ſpina buxea, quemadmodum vel ipſe teſtatur Dioſc. cap. de Lycio. Sed λυκίου vocabulum perperam ex dictionum affinitate in hunc Dioſc. contextum irrepſiſſe nemo non videt.

ἀδηροῖς ὄνυξι.] Sic Theophraſtus, ferreis vnguibus ſcalpi ſeu incidi ſolitam hãc arborem, teſtatur. Plinius contrà incidi vitro, lapide, oſſeíſve cultellis. *Ferro enim*, inquit ille, *læsi mulsa odit. Emoritur protinus, eadem amputari ſuperuacua patiens. Incidentis manus libratur artificis temperamento, nequid ultra corticem noceat.* Hactenus Plinius: cuius exemplo Solinus, *Lignum*, ait, *audicis attrectatum ferro ſine mora moritur: eapropter aut vitro aut calculis oſſeis, ſed in ſolo corticis artificis plaga vulneratur.* Sic etiam Cornel. Tacitus memoriæ prodidit, ſi ferri vim adhibeas, pauere hanc arborem, ideóque venas fragmine lapidis aut teſta aperiri. Porrò iſta cum Dioſc. ac Theophrasti verbis facilè conciliabũtur, ſi dixerimus, id vnum omnes voluiſſe, in vulneranda balſami arbuſcula cauendum vnicè, ne quid vltra corticem violetur, adeóque à cultellorum ferreorũ acie abſtinendum. At ferreis vnguibus, hoc eſt, inſtrumentorum ferreorum eo genere, quod ad vnguis humani figuram conuexum ſit, quidni corticem inuiolato intactóve caudicis ligno ſcalpere liceat, haud ſecus atque vitro, teſta, fragmine lapidis, oſſeíſve cultellis? Eiuſmodi verò ferreorum vnguium mentionem etiam facit Columella lib. 12. cap. 18. quibus vindemiatores vnguium vice ad colligendas vuas vti voluit, vt ne manibus vuas diſtringerent, ſicque non minima fructus portio diſperſis acinis in terram dilaberetur.

χῶν δὲ ἑκάστου, εἰς καὶ ἑξήκοντα] Plin. lib. 12. cap. 25. *Alexandro Magno res ibi gerenti uno die reſtuo unum cancham implerí iuſſum erat. Omne uerò fœcunditate è maiore horto congios ſenos, è minore ſingulos, cùm duplo rependebatur argento.* Sed ex hoc Dioſc. loco Plinij verba ita reſtituit doctiſſimus Budæus lib. 5. de aſſe. Anni verò fœcunditate è maiore horto congios ſenos ſingulis annis, cùm & duplo, &c.

ἀδίαντος, λεῖος.] Vox ἀδίαντος, quæ in vulgatis habetur codicibus, ſignificationem nullam habet, quæ loco huic recte accommodari poſſit. Quare iudicaui reſtituendum, ἄδιπος, hoc eſt, dilui ſa-

cilis, quemadmodũ cõuertit Ruellius: aut etiam qui facile penetret seu permeet, veluti Marcellus. Nam vtrunque hauddubiè balsami liquori aptè conuenire potest: siue inquam dilui facilem eum dicas, siue ob eximiam qua, teste Galeno, lib.6.de simpl. præditus est, partium tenuitatem, facile penetrabilem. Etsi verò dictionis huius apud Græcos Autores exemplum, quod sciam, nullum sese offert, tamen eiusdem formæ verbale nomen esse, meo iudicio, potest, qualia sunt, & illa αἰτὸς, ἀφὸς, ἐρὸς, καθὸς, παρὸς, σωτὸς, ἀναίτιος, ἀσπάρτος, ἀπαύστος. Vt enim ista deducuntur à verbis αἴνυμι, ἀφύω, ἐρύω, καθίημι, παρίημι, σώζω, ita etiam pari prorsus analogia διτὸς & compositum ἀδιτος, ἀπὸ τῦ δίημι seu δίεμι, quod quidem interdum significat τὸ διαχέαι, madefacere, diluere, perfundere: interdum etiam penetrare, trãsmittere, permeare. Pro eodem πηχὺς διάβροχος aliàs legas apud Dioscor. veluti lib.3.cap.55. itémque ἀπίτου lib.5.cap.de Morochtho. Cæterùm qui meam hanc lectionem ἀδιτος minimè probauerit, viderit is, quæso, vtrum aptiùs rectiúsve legi possit διάβροχος, aut ἀδιάβροχος. Serapio certè quidem ἀδιαύδης legisse videtur.

κηρωτὸν μυρίνεον ἢ κυπρίνεον] Ita conuertere visum est: cerato myrtino, aut cyprino valde liquido. Nil enim aliud verba Dioscoridis Græca sonare videbãtur. Vnum immutauimus, λιπὸς, ἀπὸ τῦ λίπος: nam illud & aptius & accommodatius huic loco visum est. Alij κηρωτὸν, Plinij exẽplo ceram cõuerterũt: quãuis κηρωτὸν nil est aliud, quàm κηρίλαιον, quod cerotum vel ceratũ dicimus. Sed quorsum (quæso) mentio ceræ è myrto aut cypro arbore paratæ, aut etiã ceræ Cypriæ, quemadmodum videtur intellexisse Ruellius, Plinio hac in parte nimium addictus? Equidem nunquam de cera ex myrto aut cypro parata, neque item vsquam alibi quàm apud Plinium de cera Cypria quicquam legere memini. Quin neque Cyprus ceræ laudem vllam habet. Solus Creticam, Ponticam, Corsicam, Chiam, Tyrrhenicam, tum apud Galenum & apud Dioscor. Plinium & alios, quibus locis ceræ mentionem ex professo faciunt, celebrari sat scio. His accedit, quòd adiectiuum κυπρῖνος non videtur deductum ἀπὸ τῆ Κύπρος. quod Cyprũ insulam significet, sed potiùs ἀπὸ τῦ Κύπρος, quo arbor, ligustrum Plinio dicta, significatur: tùm enim vsitatiora solent esse illa, Κύπριος, Κυπρίνος, Κυπριακὸς, &c. Neque verò negauerim, non hic modò, sed & aliàs sæpenumerò κηρωτὸν à Plinio ceram Latinè reddi, cùm ceratum potiùs vertere debuerit. Sic lib. 27. cap. 7. de absinthio: *peculiarior*, inquit ille, *ibibus imponitur cum Cypria cera*: vbi Dioscor. habet, καταπλάσσεται δὲ καὶ σὺν κηρωτίῳ σμυρνινῷ ἢ κυπρίνῳ κηρωτῷ. Item lib.22.cap.17.de helxines succo: *imponitur*, ait ille, *ex pedagra cum cyprino sene oraque Cypria*: quo loco habetur apud Dioscor. ἐπιτίθεται καταπλασσόμενος καὶ πεδάγραις ξὺν κηρωτῷ κυπρίνῳ σὺν ἀναλαβῆσι ἢ πρασίῳ σίαι. Locis verò iis omnibus ceratum cyprinum seu ligustrinum reddi debuisse palàm est. Nam & huius etiam præter Dioscor. Galenus aliquoties mentionem facit: vti lib.de paratu facilibus ad Solonem, siquidem is Galeni liber est: itémque lib 3.de comp.medic.κατ' ἴλη. Porrò vt ex olei rosacei & ceræ certa quadam proportione paratur ceratum rosaceum, ita & ex cera & oleis myrtino, ligustrino, chamæmelino, cydoniorum, œnanthino, cerata olim parabantur, quæ prisci coguominauêre myrtina, cyprina, chamæmelina, melina, œnanthina, & sic de reliquis. Cæterùm priusquàm hæc ego diligentiùs perpendissem, sola fretus coniectura legebam, κηρωτὸν σμυρνίνεον, ἢ μυρτίνεον ἢ καὶ λίπος. Et hanc meam coniecturam non aliud mouerat, quàm quòd de Balsami adulteriis agens Plinius, ceræ ac resinæ mentionem facit: quæ quidem hoc loco à Dioscor. omnino prætermittuntur.

CAP. XIX. ἄκανθος δὲ ἡ ξυλώδης] Plinius lib. 12.cap.24. aspalathi nomine spinam candidam describit, magnitudine arboris modicę, flore rosæ: & non quidẽ lignum, vti Dioscor. sed radicem vsquêtis expeti scribit. Idem à Dioscor. discrepat, dum subdit: probationem eius in colore rufo vel igneo, tactu spisso & odore castorei. Cùm tamen ipse deinde lib.24. cap.13. optimam Aspalathum asserat rubentem, & in purpuram vergentem detracto cortice, nasciique tradat pluribus locis, sed non vbique odoratam. Dissentit & à Dioscor. Auicennas, dum Aspalathum describit, arborem crassam, quæ spinas grandes habeat.

CAP. XX. τὸ κάρφος.] Hîc addit Oribasius, χλωρὸν, ἐρυθρὸν. Sed Galenus, itémq; Paulus, cedrini musci nusquam meminerunt: illius verò loco μύκητος, hoc est, eius qui in piceis arboribus reperitur. Cæterùm ἀπὸ τῦ λευκοῦ, Serapio κηρωτὸν videtur legisse.

CAP. XXI. βρυτὸν] Aldinus codex, ἐπιβρυτὸν pro quo fortè legendum βυσσῖτον, hoc est, συναλλὲς, compactum, ἀπὸ τῦ βύσσος. aut potiùs ex Oribasio, βεβρυμένον. Nam neque Serapio neque Paulus punctorum maculárúmve mentionem vllam fecerunt. Attamen in optimo Agallocho cinereas discurrentes venas recentiores nonnulli agnoscere videntur.

CAP. XXIII. βραμῶδες ὀσμὴν] Paulus Aegineta, qui hæc eadẽ exscripsisse videtur, pro eo quod habetur apud Dioscor. βραμῶδες ὀσμὴν, habet, ἀλῶδες, hoc est, odoratum: quale quidem esse Cancamum iam satis ex hoc ipso Dioscor. contextu cuiuis licebat colligere, dum ad suffimenta vsurpari commemorat. Neque verò quicquã impedit, quominùs quod odoratum est, sapore viroso simul & semel percipiatur.

CAP. XXV. ἀλιπὲς] Par. codex ἀλιπαὲς. Ald. habet ἀλιπάνες, alij ἀλιπάνες. situm minimè tedolẽtem, ex Plinio (nescio quàm rectè) vertũt nonnulli. Equidẽ ex vetusto codice legi ἀλιπὲς, hoc est, minimè pinguis. Nam cum ἀλιπὴς & ἀλιφαὴς idem propè significent, alterutrum hoc loco temerè additum fuisset. Non ignoro equidem crocum pinguissimum Plinio laudari: sed tùm pingue, ni fallor, accipitur pro læto & crasso, ἀπὸ τῦ ἐλαίου, quæ quidem vox etiam apud Aëtium Tetr.1.serm.2.post ἀλιφαὴς statim occurrit.

τῆς θεὸς Λυκίας Κορυκίου] Ruellius: secundus locus datur Corycio è tractu Lyciæ contermino: quasi legerit, ὁ ἐν τῇ θεὸς Λυκίας Κορυκίου. Neque verò eiusce nominis & littus & oppidulum in Lycia esse negauerim ex sententia Strab. Geogr. lib.14. Attamen mihi τῆς θεὸς Λυκίας supplenti χώρας, aliter vertere visum est, quasi (quod est vero similius) voluerit Autor, secundum à Corycio priùs commemorato locũ obtinere qui è tractu

Lyciæ contermino deuehitur. Illius autem præstantissimi Croci Corycij meminit & Strabo, eodem lib. dum supra Corycum promontorium Corycium antrum esse scribit, ὃν ἐν ἀρίστῳ κρόκος φύεται, *in quo præstantissimus Crocus nascitur*. Sic enim eo loco contra quàm cæteri κρόκου effert fœminino genere. Plinius itidem de croco lib. 21. cap. 6. scribit in hæc verba: *Prima nobilitas Cilicio, & ibi in Corycio monte: deinde Lycio, monte Olympo, max Ceteritripino Siculæ*, &c.

ἔστι δὲ Λιγύη, &c.] Ista, si quid rectè iudico, legenda hunc in modum: ἔστι δὲ Αἰγὺς τῆς Αἰολίας. ὁ δὲ Κυρταῖος καὶ ὁ ἀπὸ Κυτωρίου τῆς κατὰ τὴν Σικελίαν, ἀδώνιδος καὶ δυόμενος, &c. Aut etiam, si mauis, vt pro vocabulo vocabulum aliud restituatur, ὁ ἀπὸ Κυτωρίου περιτίνου δὲ καὶ τῆς Σικελίας: quasi voluerit Dioscorides, Cēturipinum crocum inter reliqua Sicilica, Sicula seu Sicania primum locū obtinere, quanuis alioqui æquè ac Cyrenaicum viribus ignauum esse fateatur. At Io. Lonicerus legit, ὁ ἀπὸ Κυτωρίου μετὰ πάντων δὲ καὶ τῆς Σικελίας, &c. Quòd ad prius illud Αἰολίας spectat, cùm apud Cosmographos nihil quicquam occurreret de AEgis AEtoliæ oppido, nisi fortè apud Stephanum: apud Plinium verò cap. 30. lib. 5. mentio fieret oppidi, itémque apud Stabonē lib. 13. promontorij eiusce nominis, in AEolide siti, nō temerè αὐτὴν τῆς Αἰτωλίας, Αἰολίας vel Αἰολίδος reponendum iudicaui: & certè quidem vitium id facili librariorum errore irrepere potuit.

ὁ δὲ Κυρταῖος] Huc spectant illa Theophrasti lib. hist. 6. cap. 6 ἀναφέρεται δὲ καὶ ἐν Κυρλίᾳ. διὸ καὶ τὸ μύρον ἥδιον, καὶ ἐν ἴσῳ δὲ καὶ ἐν ὀλίγῳ αἰσθάνεσθαι μᾶλλον καὶ ἥδιον αἰσθάνεται. ἀφαιρούντος δ' ἐν τῷ κρίνειν. πάντων γὰρ ἔστι δυσωδέστατον. Ita enim hunc locū restituo ex Athenæo, apud quem is citatur lib. XV. *Præstantissimus odor Cyrenaici, scilicet rosis: quāobrem etiam quod ex ijs illic paratur unguentum, est perquam suaue. Sed & cum violarum, tum reliquorū florum odor ibidem eximius ac diuinus, præterquàm croci, diuersa eius à reliqua natura. Constat enim cæterū plurimū bonitate cedere.* Sed & hoc ipsum Plinius alia ratione vituperat, lib 21. cap. 6. *Croco*, inquit, *Cyrenaico nihil, quod omni crocо nigrius est, & celerrimè marcescit.*

οἱ δὲ τῇ Ἰταλίᾳ καὶ τῇ Ἥρᾳ βάλλοντες] In quem vsum olim mortaria croco inficerentur, non satis coniicere possum. Atque iccirco isthæc ex sententia Ruellij de nat. stirp. lib. 2. cap. 11. itémque Cornarij in Dioscoridis expositionibus, malui de thyinis lignis intelligi, ex qua quidem materia tanquam incorrupta memoratas veterum templorum contignationes, aliáque pretiosiora opera refert Theophrastus lib hist. 5. cap. 5. Ea verò ligna ornatus gratia croceo colore infici solita mihi fit verisimile: quemadmodum & hodie variis coloribus inficiendorum etiam multò viliorum lignorū varia passim visuntur artificia. Porrò tritum crocum repiendis theatris olim vsurpatum cùm legerem apud Plinium, lib. 21. cap. 6. itémque apud Spartianum, Hadrianum in honorem Traiani balsama & crocum per gradus theatri, fluere iussisse, non semel addubitaui vtrū hoc loco ἀπὸ τῆς Ἥρας, restituendum esset Ἥρας: sed neque tùm sensus vllus satis constare mihi visus est.

CAP. XXVI. ὑπόπικρον] ὑπόπικρον habetur in vulgatis exemplaribus. At ὑπόπικρον legī, quemadmodum tum Interpretes omnes, tum Serapio & Oribasius etiam legisse mihi videntur. Esse verò subamarum crocomagma, quibus constat aromata per se satis indicant. Porrò cùm paulò antè probari nigrū dixerit Dioscorides, vix fit verisimile ὑπόπικρον, hoc est, subfuluū iam ab eodem ipso prædicari.

CAP. XXVII. ὑπόξυμον] ὑπόξυμον legisse videtur Oribasius: & rectiùs. Nec enim est verisimile prætermissum à Dioscoride non leuem amarorem, qui & ab Autoribus omnibus aliis huic radici rectè tribuitur, & vel ipso iudice gustu facilè à quouis deprehenditur.

ὅτι δὲ λείριον ἢ ἄμωρον, &c.] Aldinus codex habet κυρίνιον, fortè ἀπὸ τῶ κυρίου: nam & hoc modo cinarę potiùs quàm lilia seri videntur. Siquidem excisis ab ipsa radice gemmantibus oculis seu stolonibus propagantur: lilia verò radicibus ipsis seruntur. Cæterùm Plinius καλάμου legisse videtur. Sic enim scribit lib. 19. cap. 5. *Superuacuum inule semen, quoniam oculo ex radice exciso, ut arundo, seritur.* Nisi fortè eo loco arum, potiùs quàm arundo, legendum est.

ὑπόξυμος ὑπόνις] Vulg. exempl. ὑπόξυλος, at illud rectiùs. Ac Serapio certè quidem humidis quoque locis helenium nasci scribit ex Dioscoride. Præterea verò locis non omnino aridis aut siticulosis reperiri, sed contrà loca vliginosa amare omnibus compertum est.

γλυκυτάτου ὀ γάνου] Non ignoro dulce apud Plinium plerunque accipi pro passo, aut vino alioqui dulci. Attamen hoc loco dulce non tantùm pro passō accipi velim, sed pro quouis liquido dulci: quemadmodum etiam intellexit Plinius, lib. 19. cap. 5. quo loco de hac ipsa helenij radice sermonem faciens: *Per se*, inquit ille, *stomacho inuentissima: eadem dulcibus mistis salubertima. Pluribus modis austeritate multa gratiam inuenit. Nanque & in pollinem mundatur arida, liquidoque dulci temperatur*, &c.

CAP. XXVIII. μαρίνης] Anguillara Crateuæ contextum citans, ἀπὸ τῆς μαρίνης, μαρίνης legit, itémque ἀπὸ τῆς μυρίνης, *myrtinum*. Deuiq; quod de radicis cortice scribitur hic à Dioscoride apud Crateuam planè desiderari non obscurè asserit. Porrò (quod obiter dictum velim) ab hoc AEgyptio seu Babylonio Helenio lōgè alia esse videtur, quæ Apuleio inula Campana dicitur. Is enim cap. 95. non aliud quàm Dioscoridis panaces Chironium describere videtur.

CAP. XXX. μαλακτικὸν τῆς σαρκὸς] Carnem emollit, corporis cutem lenit: nam σὰρξ Græcis etiam interdū pro eo accipitur, quod nos Gallicè *charnure* dicimus, hoc est, pro ipsa cute extima, quam quidem constat olei affrictu maximè leniri & emolliri. Porrò ex vetustorum exemplarium fide legendum potiùs existimaui, τῆς σαρκὸς, quàm cum vulgatis codicibus, γαστρὸς, ne quod paulò pòst sequitur ἀκαίλιον, quódque idem planè significat, frustrà repeti videretur. Huc adde quod & Serapio ipse ita legisse visus est. Plinius lib. 23. cap. 4. *omne oleo* (inquit) *mollitur corpus, nigrorem & robur accipit.*

CAP. XXXII. στραγγίνων ἀλίκων] Vox hæc posterior hîc manifestò redundat. Neque verò significationem habet, quę loco huic vllo modo

quadrare possit. Ideò ideò equidem facili librarij errore vocem eam irrepsisse opinor, qui quidem postremas τῆ, συριακῆ, syllabas per imprudentiam repetierit. Potrò ἀπὸ μυλάνθου, aptiùs meo iudicio legas, μυλαθρίνου. Cæterùm lauandi simul & candefaciendi olei longe simpliciorem modum videre licet apud Gal. lib. 2. de simpl. med. facultatibus.

CAP. XXXIII. Σικυώνιον καλούμενον] Olei Sicyonij tum simplicis tum etiam compositi confectiones alias non parum inter se discrepantes, videre licet apud Paulum, lib. 7. cap. 20. Aetium, Tetrab. 1. serm. 1. Myrepsum, sect. 16. cap. 24. & Actuarium, meth. med. lib. 6. quæ quidē omnes σικυάγριον, hoc est, cucumeris sylvestris, succum aut certè radices in se recipiunt: atque inde nomen quoq; duxisse videtur oleum sicyonium, quemadmodum non obscurè innuit Paulus, lib. 3. cap. 77. At Dioscorides hoc ipso loco, ab oliuifera Sicyone Achaiæ seu Peloponnesi vrbe denominatum potiùs existimat: neque etiam cucumeris agrestis succi radicúmve mentionem vllam facit: quæ fortassis hoc σικυώνιον per ω, illud σικύινον scribi debet.

CAP. XXXVII. παῖς Παλμυρᾶς] Nisi mendum hoc loco subesset, ita vt αἱπὸ τῆς Παλμυρᾶς, legi oporteat ἐκ τῶν ἐλαιῶν, veluti Plinius ipse legisse videtur, lib. 15. cap. 7. Palmyræ nomine certum est significasse Dioscoridem, vrbem Syriæ eiusce nominis, aut certè regionem ipsam Palmyrenam Ptolemæo lib. 5. Geog. cap. 15. dictā, cuius Palmyra metropolis fuit, quæ quidem à restauratore Adriano Imperatore Adrianopolis deinde dicta est. Turpiter autē Amatus Lusitanus palmyras hic accipi putat, pro arboribus ipsis, quas linguæ Græcæ ignoratione palmyras fortè dictas existimauit, quasi pumilas palmas. At ea quidem ex Plinij sententia lib 23. cap 4. ἐλαίσιμας non ex aliis arboribus quàm ex oleis ipsis Palmyrenis manare, itaque dictū, quasi ἐλαίας μίλι, crediderim. Neque verò reclamat huic nostræ sententiæ Dioscorides. Nam dum manare dicit ἐκ ξύλου σταλάσσει, id vnum meo iudicio voluit, nō è quouis oleæ caudice, sed è quibusdam tantummodo, puta vetustioribus, id liquoris seu resinę genus sponte promanare. Idipsum sermonis continuitas per se satis indicat: nec enim verisimile fuerit, ab oleis ad palmas aliáve arborum genera earúmve liquores tā subitò & quasi ex abrupto, sola nominis affinitate transiturū fuisse. Huc adde quòd non tantùm in Palmyrena regione, sed & locis in quibusdam Narbonensis Galliæ id genus mellei liquoris oleas non quidem sponte, sed caudice vulnerato fundere tam certum est, quàm quod certissimum. Potrò videritl. ctor, vtrum fortè rectiùs hic legi possit, ἀπὸ ἐκ σταλάσσει ἐλαίου, quàm ἐκ ξύλου σταλάσσει ἐλαίου.

ἀπὸ τῆς ἐλάας τοῦ ἐρνοῦ] Etsi fere ἔρνος cuiusuis arboris virentem ramum teneriorémve surculum, imò germen ipsum significet: tamen peculiariter apud Atticos pro germine oleagino accipi consuevit: quo quidem olim coronabantur victores, quique dies festos celebrabant. Et hoc quidem loco ἔρνῳ vocem ita quoque accipiendam puto. Nam & eiusce modi olei è germinibus oleaginis, quale hic describitur, mentionem facit Gal. 6. de simpl. med. fac. quanquā non videtur è germinibus solis oleum id fieri voluisse sed tantum in oleo conficiēdo addi solita oleatum germina. Sunt autem hęc ipsissima Gal. verba, cap. de oleo: καὶ μὴν δὴ καὶ ἐκ τῶν ἐνθουσῶν ἐμβαλλόντων ἔνιοι. καὶ οὗτοι θερμαίνοντες ὑμφακίνῳ τὸ ἔλαιον ἀπεργάζονται). h. e. *Quinetiā quicunque in præparando oleo ramos oleagnos miscent, ij & ipsi omphacino simile oleum efficiunt.* Rursum Meth. lib. 11. ἐστι καὶ τὸ ἔλαιον τοῦτο, οἷον ὅταν τις τὰ ἄκρα τῶν ἐλαίων τρώγοντα ἐνθύζοντα μετὰ ἁλῶν ἐλαίας, id est, *Sit tibi oleum astringens, quale est quod Hispanū nominatur, & quæcunque alia è germinibus parant oleagina.* Quin & Cōstantinus Cæsar, aut quisquis est alius Geoponicōn autor, lib. 9. cū docet ex Damogerōte oleum Hispano simile conficere, sub finem præparationis admiscet χλόην φύλλων τῆς ἐλαίας εἰσαλῶν τριακοντίων, ὅπερ (inquit ille) ἔριφοντα ἔνιοί καὶ πικρόντα αὐτὸ λέγουσι: *succum inquā foliorū oleæ centellorum contusorum, quo ab ijs acrimoniam quandam & asperitatem assequat.* Et eo quidem loco, quod hic Dioscoridi τὰ ἄκρα τῶν ἐρνῶν dicitur, ille significantius atque ἀφελεστέρως, χλόην φύλλων τῆς ἐλαίας εἰσαλῶν, appellat.

CAP. XXVIII. ἐξ ἀνθρώπων χρείαν] Legitur in vulgatis, ἀνθρώπους. Hoc verò existimo voluisse Dioscoridem, AEgyptios, quòd ricino abundarent; non quòd ipso indigerent, aut potiùs, quia oleum copiosum ad varios vsus desiderarent, citra maius artificium hoc ex ricino trito solitos torcularibus exprimere. Abundare verò ricinorum arboribus, atque adeò apud ipsos præcipuè oleum cicinum seu è ricini semine, parari solitū, cùm ex variis Galeni locis facile est colligere, tum vel maximè ex Plinij verbis quæ habentur lib. xv. cap. 7. de cicino oleo: *At in AEgypto*, inquit ille, *vbi abundat, sine igne & aqua sale aspersum exprimitur, cibus fœdum, lucernis vtile, &c.*

CAP. XXXIX. πικρὸν χυμὸν.] Paris. & Ald. χυλόν. sed characteres hos planè depraua tos equidem non sine ratione sic ex v. codice restituendos existimaui χυμὸν δ', πονηρὸν, χειρίστας ποιοῦσας, velut expressit Actuarij Interpres: nec male. Dum enim paulo post expressi olei amygdalini quantitatem dennit Dioscorides, amygdalarum simul & semel quæ ad præparandū ipsum oleum recipiuntur quantitatem repetere fit verisimile. Tùm verò: ἀποδίδωσι δὲ (inquit ille) κατὰ λόγον τὸ παραχεῖσθαι.

CAP. XL. βαλάνινον σκυθίζοντα] Hoc oleum non existimandum e quercuum glandibus, sed ex his quæ βαλανοι μυρέψικαι, seu μυροβαλανοι Græcis dicuntur, confici solitum, vti disertè monet Paul. lib. 8. cap. de oleorum præparatione.

CAP. XLVII. ὕδωρ ἕλκων] Vulg. cod. ἑλκῶν. At ex Actuarij libro 6. meth. med. legi ἕλκων, sicuti etiā legerūt ex v. quodam codice Ruellius & Goupylus: itémq; in extremo cap. pro eo quod in vulgatis codicibus habebatur, μᾶλλον ἀναγκάζει. μᾶλλον ἀναγείρει, hoc est, humores ex alto euocans, aut, vt Plinij verbis lib. 20. cap. 22. vtar, vitia ex alto extrahens. Est porro verbum μᾶλλον ἀναγείρει à Methodicis quidem profectū, sed à Dogmaticis quoque Medicis haud rarò vsurpatū, quoties ea designare voluerunt, quæ humores ex alto euocant transferúntve, atque adeo meatuum corporis statum immutant. Id enim est, τὰ ἐκ βάθους ἑλκειν καὶ μεθιστάναι, quibus verbis totam

metasyncriticorum medicamentorum vim capite de thapsia declarat Dioscorides, lib. 4. cap. 157. Qualia verò illa sint, vide tú aliàs apud Gal. tum etiam cap. 1 lib 3. de comp. med. κατὰ τόπους: quo loco monet in inueteratis affectibus vbi remedia reliqua minimè profuerint, ad metasyncriticam curandi rationem Medicos solitos esse confugere. Esse verò præter medicamenta, & alia remediorum varia genera, per quæ non tantùm ἀνάληψις seu recorporatio, sed etiam μεθόδευσις ipsa rectè fiat, apertè docet Paulus, lib. 3. cap. 72.

CAP. XLVIII. τὰ φύλλα τῆς μύρτου εἰς ἔλαιον, ὡς ἐλαίῳ ἀποβρέχειν] hoc est, si expolita Soli folia oleo maceres. Equidem vulgatam lectionem ita secutus sum: at verò Plinius ac Interpretes omnes legisse videntur, τὰ φύλλα εἰς ἔλαιον ὑπὸ ἡλίῳ ἀποβρέχειν. Sic enim Plin. lib. 15. cap. 7. de myrteo verba faciens: *Aly detecta ea in oleum prius sole maturare*: quo loco hauddubie *maturare* legendum, non *maturare*, nimirum vt respondeat ea vox τῷ ἀποβρέχειν Dioscoridis. Plinium secuti sunt quotquot occurrerunt Interpretes, quasi voluerit Dioscorides iecta in oleum folia sub sole priùs aliquantisper macerari, quàm decoquantur: aut etiam (quod quidem Ruellius volutile mihi videtur) myrti foliorum in oleo ad solem maceratione sola myrtinum oleum à nonnullis confici. Vtra verò potior sit lectio, vnusquisque viderit.

ἔστι δὲ ἀσυνθέτων] Ita vnguentum myrtinum describit Plinius lib. 13. cap. 1. *Et è nobilissimis quidem hodie est ob id creditum, ex id in vetustissimũ esse, quod constat oleo myrteo, calamo, cupresso, cypro, lentisco, malogranati cortice.* Scilicet hic calamum adnicit & αἰνὶ τῷ κυπείρου καὶ χείου, τίνεσσι καὶ χίου legisse videtur.

ἀποπλυτικῆς] Supple, φαρμάκου, aut lege ἀποπλυτικοῖς, vt subintelligatur, φαρμάκοις. Nam quod nonnulli, dum ἀποπλυτικῆς legunt, subaudiendum censent ἐμπλάστρου, minus rectè iudicant: quippe cùm myrtinum oleum non ad emplastra modò, sed etiam vngueta, illitus, aliáve id genus medicamentorũ genera cicatricem obducentia transferri possit.

λύσιν τῶν ἀγκυλωμάτων] Ex hoc loco colligo, apud Plinium de hoc eodem oleo agẽtem, cap. 4. lib. 23. pro, *articulos luxatos*, legendum esse, *articulos laxatos*.

CAP. XLIX. τὸν ἐξαμύσσοντα χυλὸν, &c.] quæ manibus priùs expresso è tritis baccis succo conchis excipitur. Cùm animaduerterem depraua tum ita hoc loco Dioscoridis contextum, vt necessariò quidpiam desideraretur, aut certè immutatũ esset, vtrque alium è Dioscoridis mente sensum elicere possem, sic interpretari visum est. Non ignoro equidem ἐξαμύσσειν interdum accipi, pro disiungere, separare, secernere. Quòd si quis hìc ea significatione vsurpandum putet, intelligat oportet, manibus diuidi ac separari supernatantẽ humori pinguitudinem è lauri baccis expressam. At certè manus ad id opus minimè aptas esse, nemo non videt. Aptius fortasse Palladius lib. 2. de re rust. tit. 20. quo loco de hoc ipso laurino oleo sermonem facit, vbi diu ferbuerint baccæ, olei quod ex se dimiserint supernatantis vndam pennis leuiter cogentibus in vasa transfundi voluit.

CAP. L. ψύχει δὲ καὶ σκυφοῖ] ψύχειν refrigerare vertêrunt hoc loco Interpretes: cùm tamẽ manifestò calfaciat oleum terebinthinum, nedum refrigeret. Nos iuxtà alterum τοῦ ψύχειν significatũ, siccare vertimus: quandoquidem & fructus terebinthi è quo illud exprimitur euidenter exiccare proditum est à Gal. 8. simpl. cap. de terebintho. Quod si quis ἐμπνεύματος vitandæ gratia ψύχειν legere maluerit, non equidem repugnauero.

CAP. LIII. ῥοδίνῳ χαλκῷ] Forte χαλκίῳ legendum, lapsu notæ facili, nimirum vt ad rosas ipsas referatur, non item ad earum folia. Neque enim sufficerent vnguento rosaceo parando mille rosarum folia in olei libris XX & quincunce maceratæ.

ἀμασσόντι] Interpretes nonnulli ἀσσοντι legisse videntur. Ego verò vulgatam secutus lectionẽ verti, permutãtes: ac certe quidem de vasis ipsis intelligendum puto, quæ Dioscorides vt eò facilius à fæcibus omnibus expurgaretur oleum, per dies octo permutari voluerit. Et reuera dum vas in dies permutatur, & quæ subsederint fæces in priore vase relinquuntur, oleum ipsum transfusum purius ac sincerius tandem euadere nemini dubium est. Sic circa capitis huius initium: ἀσσοῖ (inquit ille) τὸ πρωῒ δὶς ἀσσοῖ, ἀμάξει τὸ ὑπεδιχόμενον ἀγγεῖον, &c.

καὶ ἄλας] Plinius videtur τὸ ἄλας legisse. Salis enim florem aut anchusam desiderat, lib. 13. cap. 1. quo quidem capite quibus anchusa adiecta est, sal non addi testatur. Cæterùm Veteres in vnguentorum, quibus partim ad luxum, partim ad medicinam vtebantur, compositione ac mistura, succum, qui quidem olei vario genere constabat, primum inspissabant, quò ad vnguenti corpus & crassitudinem redigerent, sicque partim facilius ingredientiũ vis retineretur & quasi coerceretur, partim etiá illa non tantùm perfundi, sed & illini apta essent. Hæc spissamẽta, Græcis σύμμικτα dicta, fere constabant xyloba lsamo, iuncо & calamo odoratis, ac cæteris id genus. Mox & illis adiiciebant quæ odorem ipsum acuerent, aut certe illi suauitatem conciliarent, & hæc ἀδίσματα nominabant: in quibus fere numerantur amomum, nardus, myrrha, carpobalsamum, costus, &c. Interdum & ad coloris gratiã crocus, anchusa, cinnabaris, addebantur. Sed & ipsam resinam coctam εἰς χρωματισμὸν τῆς μύρου, vti & ad crassamentũ eorundem, Dioscorides vnicè laudat: quanquam hanc Plinius æquè ac gummi adiici potiùs ad continendum odorem in corpore testatur. Cæterùm sal ad conseruationem vnguentorũ, ac eorum potissimùm quæ vetustate meliora essent, solitus addi videtur, ne fortè illa corrumperentur, aut alioqui rancescerent.

CAP. LV. ἐπιθεῖς τι λίνου ἢ τῶν καλάμου] In vulg. exempl. *λίνου* per υ legitur: arundinis retrimenta vertit Cornarius: at nos *λίνου* per ι legendum potiùs existimamus, quo modo & Interpretes plerique legisse videntur. *λίνος* autem Dioscoridi aliis verò *λίνη*, *λίνις*, nonnunquã Itoream, tegetem siue mattam, seu ex vimine, seu ex scirpo aut arundine, seu denique ex alia quauis materia conciunetur, interdum etiam cratem significat.

CAP. LVI. ἐκτὸς τῶν τοῦ κεδρίνου λύπει, &c.] Contrà Nicolaus Myrepsus, sect. 16. foris adhibitum oleum œnanthinum vẽtrem mollire asserit. Ve-

rùm equidem Interpretis vitio illud aſcribẽdum puto. Nam & alioqui Aëtius de hoc ipſo oleo verba faciens, Tetrab. 1. ſer. 1. ἔστι δὲ κατὰ ἄμφω τὸν τρόπον (quo ille) τό τε μηλίνου καὶ τὸ ῥοδίνου ὁποῖς τὸ τοῦ κρινείου μυροθήσεται. Ante verò pro eo quod habet Dioſc. μυρεψικὸν, apud eundem Aëtium ἐλαίου μύρου ξηροῦ, legitur.

Cap. lvii. ἑκαίου λίτρας ἓξ ἡμίσεως ἡ legit Aëtius, apud quem alioqui telini ſeu olei ſeu vnguenti cõfectio totidem ferè verbis deſcribitur. At Nicolai Myrepſi Interpres olei ſextarios quatuor recipit, calamique planè nullam mentionem facit. Plinij verò deſcriptio, vt alibi, ita & hîc multum euariat.

Cap. lix. τὸ δὲ ἤδη κατεψυγμένον] Prima quidem facie de ocimo, quod in oleo maceratũ eſſet, hoc intelligendum foret: at tum ſermonis ipſius continuitas, tum etiam præſcripta roſacei conficiendi ratio de oleo ipſo in quo maceratũ infuſumve fuerit ocimum, hoc intelligi debere per ſe ſatis admonent: ita vt hoc loco per τὸ ἤδη κατεψυγμένον aliud nihil velit Dioſc. quàm τὸ ἤδη ἐγκατεψυγμένον.

Cap. lxi. διὰ μιᾶς ἡμέρας ἐχέτω] Ego non ἡμέρας ἐχέτω, ſed δίεχέτω legendum exiſtimo. Nam ſi quidpiam vel ſemel duntaxat maceretur, tùm ἡμέρας ἐχέτω rectè dicitur: quippe quod τῷ ἀκρίτῳ ſeu ἀκριτῷ opponatur. At ſecundò maceratum rectiùs, opinor, διέχεσθαι dixeris. Sic & τρίβεσθαι interdum, quaſi τρὶς βεβρεγμένον, non malè vſurpatur à Dioſcor. vti cap. de cyprino vnguento.

Cap. lxii. κατέχε μαστίχης] Si vocem μαστίχης, aut etiã κατέχε, vt in altero veruſto codice legitur, retineas, fatearis oportet omnino prætermiſſam fuiſſe Cardamomi doſim: aſcripta verò pondera, ad oleum ipſum aromatibus imbutum eſſe referenda. Aut certè (quod mihi vero ſimilius videtur) ἀντὶ τῆς λίτρας γ' ἡμίσεως ς' legi oportere λίτρων γ', ἡμιγλίων ς'. Facilis verò potuit eſſe librariorum eiuſmodi lapſus, cùm fortaſſis in manuſcriptis exẽplaribus ſolæ ponderum notæ aſcriptæ fuerint. Sin minùs, ἀντὶ τῆς μαστίχης ex neceſſitate legendum τῶν, vti Ruellio & Marcello legi placuit. Atque tùm hæc erit verborum ſeries: κατέχε τὸ καρδάμωμον κεκοπανισμένον, &c. At mihi prior illa lectio magis arriſit, quoniam κατέχειν liquidis aptius, quale eſt oleum, quàm pulueribus ſolidiſve aliis accommodatur.

τὸ ἐγκατεψυγμένον ἄρωμα] ἄρωμα hîc nonnulli de aromatibus priore loco recenſitis interpretari videntur: quo in numero ſunt Ruellius & Marcellus Virgilius, atque adeò coguntur, pro eo quod poſteriùs habetur ἀρωματοποιοῦ, legere ἀρωματοποιοῦ, vel ἀρωματοπωλείου. Sunt & qui illud ipſum ἄρωμα de ſolo cardamomo, non item de illis aliis exponendum putent. Cornarius de liliorum foliis intelligi voluit: cuius quidẽ ego ſum ſententiæ. Verùm quò omnis tollatur dubitationi locus, non quidem ἐγκατεψυγμένον ἄρωμα, ſed potiùs ἐγκατεψυγμένον μάζωμα hîc legendum puto. ita vt id duntaxat quod expreſſis liliis quaſi recrementum ſupereſt, hoc loco ſignificetur. Poſterius autem hoc ἀρωματοποιοῦ, de oleo aromatis illis omnibus imbuto (cuius ideò largior quoq; copia ab Autore initio præſcripta fuit) accipi velim: tùmq; hoc loco, excepta illa vnica voce, nihil ampliùs quod videã immutari neceſſe fuerit. Paulus lib. 8. de re med. Suſini oleĩ vtriuſque tum ſimplicis, tum etiam compoſiti conficiendi rationem docet. Compoſiti verò huius præparationem paulò aliter, at minùs certe clarius apertiúſve, recenſere videtur, quàm hoc loco fecerit Dioſcorides. Quare ſi cui fuerit in animo Græcorum ſuſinum vnguentum, κρίνινον, ſi Gal. credimus, Hipp. dictũ, conficere, id equidem ex Pauli mente componendum ſuaſerim. Qui quidem loco citato Suſinum dictum putat, quia fortaſſe Suſis inuẽtum ſit. At nihilominus probabilius quoque Lonicerj coniectura videtur, qui Suſinum ab Hebræo שושן quod lilium ſignificat, dictũ exiſtimauit. Hoc idem vnguẽtum Gal. in Exeg. vocũ Hipp. etiã κρινόμυρον & μυρόκρινον, ab ipſo verò Hipp. Αἰγύπτιον μύρον λευκὸν ſcribit appellari: vti quod eſſet ſimplicius, adeóque olei nomine dignius, Αἰγύπτιον ἔλαιον λευκόν.

καρδαμώμου] Legendum fortaſſe κατακεκομμένου: & certè quidem Paulus cardamomum initio maceraſſe contentus, ſub finem cardamomum nullum adiicit, ſed cinnamomum, aut eius loco amomum, aut caſſiæ duplũ, aut corticem. Quin neque myrrham is poſtremò adiicit.

κατακεκομμένου τοῦ ἴσου] Subaudiendum, μέρους, aut etiam ἡμιλίτρου: quam vocem nonnulli codices pro ſequentibus κοχλιαρίου ἡμίσεως reponunt. Deinceps verò ſtatim legendum videtur, ἔπειτα δὲ κοχλιαρίου ἡμίσεως &c.

Cap. lxiii. τὸ πεῖον τῷ ἐλαίῳ μίξας] Dioſcorides noluit hoc loco, veluti Marcello & Lacunæ viſum eſt, aſpalathum aqua macerari, quę tertia ſit pars ad oleum præſcriptũ, ſed aſpalathum ipſum aqua ſufficienti maceratũ tertiæ olei parti immiſceri. Totum verò oleum nequaquam aſſumit, certa tantùm portione contentus, quoniam reliquum fortaſſis vel ad parandum aliũ narciſſinum vnguentum, vel ad aliquod aliud vnguẽtum, in quo eadem ſpiſſamenta deſiderarentur, conficiendum poni vellet. Obiter autem id annotaſſe non fuerit inutile, quod Aëtius & Nicolaus Myrepſus non in liliaceo tantùm, ſed & in hoc ipſo oleo obſeruandum admonẽt: nimirum vt ne conueniens florum doſis tota ſimul & ſemel, ſed partibus, & paulatim oleo iniiciatur, ſic vt florum parte quæ iam abundè macerata fuerit exempta, alia atque alia ſubinde iniiciatur, dum florum quantum ſat eſt oleo exactè permiſtum fuerit. Sin minùs flores vniuerſi quantumuis exiccati ſimul & ſemel iniecti, facilè putreſcentes oleo fœtorem aetterferent.

Cap. lxiiii. κατέχε τὸ ἔλαιον] Ald. κατέχε: ſed forte legere ſatiùs fuerit ἀνάστ. κατέχε τὸ ἀνασῆσαι, quod eſt colo traiicere, ſeu cribro ſuccernere: & hac ipſa quidem voce iam antehac aliquoties Dioſcorides vſus eſt.

ἡμίσους γ'.] Legendum γ' ſimpliciter: quemadmodum etiam quotquot occurrerunt Interpretes legiſſe videntur.

ἐνίοτε δὲ τὸ ἴσον εἰς κηρωτὸν] Ald. & vt codex τὸ ἴσον κηρωτὸν, &c. ſubaudita fortaſſis præpoſitione κατὰ, vti voluit Lonicerus. Sed nos cum Marcello legimus, τὸ δὲ εἰς τὸ κηρωτὸν ἀρωματικὸν ἔλαιον. Alioqui verò vix vllum ſenſum elicias.

βουτύρινον καὶ ὑπόχυτον] Butyrinum dictum fuiſſe videtur vnguẽtum, quod olei loco butyrum reciperet, in cæteris verò omnibus huic compoſitioni ad amuſſim reſponderet. Sic & Styracinũ,

quod myrrhæ loco ſtyracem. At de onychino non leuis eſt dubitatio. Siquidem plerique hoc vnguentum ab onyche, quod tegumentũ ſit Indici cuiuſdam conchylij. Βδελλίου Βοζαίικου, ſeu Βοζαϊκὸν recentioribus Græcis dictum, denominatum putant. Cornarius verò vir doctiſſimus ab onyche, quod ſuit bdellij præſtantiſſimi epitheton, nomen accepiſſe ratus eſt. Vtriuſque porrò tum bdellij, tum & vnguis odorati certum eſt ad vteri affectus vires eſſe minimè contemnendas. At ſi ab onyche conchylij Indici tegumẽto dictum fuit eiuſcemodi vnguentum, croci loco qui in hac compoſitione recipitur, vnguẽ illum odoratum: ſin à bdellio onyche dicto, bdellium myrrhæ loco indi ſolitum ſit mihi veriſimile. Vtra verò ſententia potior ſit, vnuſquiſque iudicet.

CAP. LXV. Ἐλαίου λίτρας ϟ'.] Cyprini vnguenti tũ apud Paulũ, tũ & apud Aëtiũ duplex habetur cõpoſitio: ſed vtraque ab hac ipſa non parũ diſcrepat, & aromatum numero & præparandi modo. Attamen cùm in vtraſque illas Cyprini deſcriptiones recipiatur helenium, & olei libras IX cum quincunce ad coquendas aromatum libras XVII non ſufficere compertum ſit, pro eo quod eſt in vulgatis exemplaribus: ἐλαίου λίτρας ϟ' &c. ἐλαίου λίτρας ϟ'. κύπρου ϛ'. τὸ ἐλάτιον καὶ νάρδου κόμης λακτὸς, &c. cum Cornario legendum arbitramur. Aliis quoque eiuſdem viri doctiſſimi in hoc ipſum caput animaduerſionibus facilè lubentérque ſubſcribimus. Cæterùm apud Plinium lib. 13. cap. 1. pro helenio, abrotanum legitur.

CAP. LXVI. τῆς Ἀχαΐας ῥοδινόμενον] Vel eſt legendum ῥοδινὸν, vt inferiùs: αἰσυμνήτου δὲ ἐν Κυζίκῳ κάλλιστον γίνεται. Vel figuratè dictum oportuit ῥοδινόμενον, κἀνὶ τῷ, σκιαζόμενον, ducta ſcilicet metaphora ab iis quæ ſponte gignuntur. Cæterùm vt Irinum, quod in Perga & Elide conficiebatur, commendat hoc loco Dioſc. ita & Plinius Corinthiacum ac Cyzicenum.

CAP. LXVII. Ἀμυγδαλινὸν] Contrà aſtringere Gleucinum & refrigerare eadem ratione, qua & œnanthinum, reperitur apud Plinium, quo loco & aliorum oleorum vires recenſet: ſed errore manifeſto. Melinum enim, non Gleucinum, eo loco legi debuit, vti rectè annotauit doctiſs. Cornarius. Quin neque Gleucini ſimplicioris genera alia à Galeno lib. περὶ ἁπλῶν 7. tradita, neque illud ipſum compoſitum, quod ibidem à Gal. deinde etiam à Paulo lib. 7. cap. 18. Aëtio, Tetrab. 3 ſer. 4. cap. 44. Actuario, Meth. med. 6. cap. 10. & Myrepſo, ſect. 16. cap. 42. copioſè deſcribitur, multò minùs quod à Columella lib. 12 cap. 51. commemoratur, vllo pacto refrigerare conſtat ſatis ex aromatibus, è quibus illa componuntur.

CAP. LXVIII. Ἀμυγδάλινον δὲ] Sampſuchũ ex Dioſc. libro 3. cum amaraco vnũ & idem eſt, at nomine tantùm diſcrepãt: quippe quod Sampſuchum AEgyptij, Syri, ac plerique Græci nominabant, Cyziceni ac Siculi amaracum appellare conſueuerant. Sic & apud Theophraſtum ac Plinium, nec non & Iul. Pollucem, Sampſuchum & Amaracus eiuſdem plantę, nimirũ maioranæ noſtrę, diuerſa ſunt nomina. At Galenus, Paulus & Aëtius de iiſdem, tanquam diuerſis plantis, diuerſa fecere capita, iiſdémque diuerſas vires aſſignauerunt. Nec tamen apud hos (quod voluére nonnulli) amaracus marum eſt: veluti patet abundè ex Galeno, qui quidem lib. de antid. 1. in parando amaracino ab vnguentariis ſui temporis amaraci loco marum falso ſuppoſitum fuiſſe commemorat, quòd amaracum odore longe ſuperaret. Eſt vero potiùs parthenium, quod amaracum quoque quibuſdam dici ſolitum proprio capite teſtatur Dioſcorides, quódque alioqui ſilentio prætermiſſurum fuiſſe Galenum vix mihi fit veriſimile. Iam ſi ſampſuchum & amaracum pro eodem vſurpauit Dioſc. qui fit (inquiet aliquis) vt is ipſe ſeorſim ac diuerſis capitibus de ſampſuchino & amaracino egerit? Nimirum ob diuerſam planéque diſcrepantem quam habent vnguenta hæc duo præparandi rationem, diuerſa quoque nomina clarioris diſtinctionis gratia ſortita ſunt: etſi vtrunque Plinius lib. 21. cap. 22. confudiſſe videatur. Ac de his quidem ſatis ſupérque dictum ſit. Cæterùm pro eo quod in impreſſis cod. habetur in hoc capite, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον χρῶνται, χρῶνται per ι, itémque pro ἀκτινίου, ἀκτινάλιος: ac denique ſub finem capitis pro ἀρίστης, ἀρίστῃ optima ratione legendum cenſui.

CAP. LXIX. Τὸ δὲ μεγαλεῖον καλούμενον] Hoc idem vnguẽtum paucis immutatis deſcribit Plinius, lib. 13. cap. 1. ac megalium etiam vocat, propter gloriam, vti ſcribit, ita appellatũ, quaſi κατ' ἐξοχὴν μεγάλιον. At Clemens Alexandrinus Pædag. lib. 2. itémque Soſibius apud Athenæum & EVſtathius in Homerũ μεγάλειον nominare maluerunt, ducto cognomine à Megallo quodam ſeu Megallio Siculo illius, vt aiunt, inuẽtore. Athenienſem nonnulli fuiſſe volũt, vti teſtatur Athenæus Deipn. lib. XV.

CAP. LXX. καλούμενον δὲ ἡδύχροου] Hedychroi in paſtillos efformari, quod inditur Theriacæ, compoſitionem ex Andromacho tradidit Galenus, tum primo de Antidotis, tum etiam lib. de Theriaca ad Piſonem. Eam inde repetere cuiuis in promptu fuerit. Ab eo porrò magmate vnguentum hoc cognominis eiuſdem non alia re fortaſſe diſcrepat, quàm quòd in illo parando aromata ex vino ſubiguntur: in vnguento verò conficiendo, eadem oleo quopiam odorato excipiuntur. Huic etenim eandem eſſe cum amaracino miſturam, ſolóque nomine differre, quod voluere nonnulli, mihi non fit veriſimile. Nam vnde, quæſo, odor huic quàm amaracino ſuauior, niſi ex aromatum aliorum permiſtione?

CAP. LXXI. καλούμενον Μετώπιον] Totidem verbis Metopium vnguentũ ab Aëtio 1. Tetrab. ſerm. 1. deſcribitur, itémque à Nicolao Myrepſo ſect 16. At AEgineta lib. 8. de re med. ſingulorũ ingredientium pondera & menſuras adiicit. Dubium autem eſt, vtrum ad huius confectionem aſſumantur ipſæ amygdalæ amaræ, an verò oleũ ex iis expreſſum. Hoc enim poſterius mihi magis veriſimile videtur, ac Nicolai quoque Myrepſi Interpres hoc modo intelligendum exiſtimauit. Quòd ſi ita eſt, legendum hic, velut habetur apud Aëtiũ, δι' ἐλαίου ἀμυγδάλων καὶ ἀκοδάμου πτερῶν, &c. Cæterùm non poſſum nõ illis aſſentiri, qui hoc vnguentum illud ipſum eſſe aſſerunt, quod ab Hipp. tũ lib. de morbis mulierbribus, tũ etiã ſexcẽtis locis aliis ἀγαθὸν ſeu ἀγαθὸν nomine

tantoperè celebratur: quippe quod in vteri affectibus ad induratas vulvæ cotyledonas emolliendas, & obstructas aperiendas, itémque ad secundas pelliculas plurimùm ab illo commendetur. Hesychius in suo Lexico sic quoque habet: Νίτωτον, τετύπτον, μύρον σκληρὸν ἀνθρώπου ὁ καὶ μαλθακὸν μυρεψικόν. οἱ δὲ, μαστόν. Erotianus, autè in vocibus Hipp. νίτωτον (sic enim lego, non νίτρωτον) exponit, τὸ ἐκ καρύων πιεσθὲν ἔλαιον. Galenus in vocibus Hipp. quod è spinæ Aegyptiæ flore parabatur oleum μαστόν dictū exilliuasse, idémq; Ἀγχίθυον μύρον Hipp. dictum. Sed præter Hesychij autoritatè, vires quas μαστὸν tribuit Dioscorides ac ex quas νίτωτον suo itidè ascripsit Hipp cùm eòdè planè spectare videantur, μαστὸν seu μαστόν Dioscoridis, ac νίτωτον seu νίτρωτον Hipp. vnum & idem fuisse vnguentum euidentissimè testantur.

τὸ ξύλον ἔστι ῥητίνη] Libro tertio nō ipsam arborem lignosámve plantā è qua galbanū emanat, sed galbanum ipsum, hoc est, liquorē ferulæ cuiusdā in Syria nascentis, Metopiū nonnullis dici refert Dioscorides. Hoc verò loco lignū ipsum è quo manat galbanū, ab Aegyptiis μαστὸν appellari admonet. Cæterùm ξύλον nomine significare videtur lignosum corticē, qui in ferulaceis cernitur, ipsorū teneritudine processu téporis in lignū abeunte. Quanuis & pro arbore hoc loco, vt aliàs plerunq; ξύλον vocabulū accipi potuit: nā propter lignosum illiū corticem arborū etiā generi ascribitur ferula: ac propterea Clearchus inter ænigmata alia ferulam dixit esse, ξύλον ἐν ξύλοις.

Cap. LXXII. ὀπὸν βαλσαμίνου] Apud Aëtium ὀπὸν βαλσαμίνου, legitur, μυροβαλσαμίνου: itémque pro σμυρνης, ζιγγιβέρεως: sed hoc posterius, errore librariorum etiā alibi apud eundē Autorem frequentissimo. Cùm enim nota ζζ apud Medicos σμύρνιον, hoc est, myrrham significet, illi zingiberis notam esse arbitrati sunt, atque adeò quoties ea occurrit, falsò ζιγγίβερις transcriptêre. Cæterùm annotat Paulus ita vocatum Mēdesium, quòd in Aegypto sit inuentū, vbi Mendes colitur: Mendes autem vrbs est Aegypti: cuius ciues Panem effigie hirci colebant, qui quidē Aegyptiorum lingua Mendes appellatur.

συνθλασθέντα] Vulgatam secutus lectionē vertit contrita seu comminuta. Perperam verò Interpretes alij συνψηθέντα legerunt, quasi simul decocta. Nam in hoc vnguento componendo, veluti nominatim innuit Paulus, aromata sicca citra coctionē in oleo dies sexaginta mouētur ac macerārur, tandémque ūs liquata resina permiscetur.

Cap. LXXIII. κονδυλωμένου] Quò vitetur solœcismus, legendū κονδυλωμένης, quemadmodum etiā legitur apud Aëtium: referetur enim ad prius illud, σμύρνης. Alioqui κονδυλωμένου legi oportebit, quo modo Oribasius etiam legisse videtur, tùmq; ad λιπαροῦ referri cōsentaneū fuerit. Cæterùm quo loco habetur, κατ' ἔμπνοὴν ὕσσω. &c. aptiùs fortè legas, κατ' ἔμπνοὴν πιεῖσαν, aut etiā σῦσα. Aëtius verò sic habet, Ἔμβαλε πάλαι δὲ μαλθακὸν σῦσαν, ἢ κατ' ἔμπνοὴν μᾶλλον δόσιμος ἀλύπου, &c.

Cap. LXXIIII. σηπεδόνας & σήπας] Legendū opinor σῆπας, vt superiùs cap. de amaracino, ἀχρειοῖ δὲ τὰ σήπη καὶ σύγχυσις, &c. σῆπος porrò vox vsitata est Dioscoridi, pro putredinibus (putrilagines quidam dicunt) seu putrescentibus vlceribus: quanquā Hippocrates in Epid. eadem voce pustularum genus quoddam ex putredine ortum significare videtur. Fateor equidē σηπίον nomine, supple φάρμακον, medicamenta à Dioscor. significari, quæ Plinius sepia vocarè non dubitat. Celsus verò quæ sic exedunt ne erodant. Sed hoc loco satis cōstat medicamentorū mentionē minimè fieri, at potiùs morborū seu affectuū, ad quos Cinnamominū valere creditur. Antea verò quo loco habetur, μετακιρνᾶ γοῦν ἄρμυρίνου, lego, ἀρμυρίνῃ. Nec enim ad resinam, sed ad vnguētum ipsum cinnamominū referri oportet.

Cap. LXXV. Τὸ δὲ ἀχρεῖον ἀλύπου] Est hoc loco generis Enallage. Siquidem fœminino genere ista extulit Dioscorides, quanuis de nardino vnguento dicantur, quod priùs ῥαδινὸν μύρον neutro genere nominauerat. Referri verò debent ad ῥαδινὸν, quæ vox vnum & idem significat. Etenim ῥαδινὸν nomine, non tantùm herba iam antè descripta, sed & vnguentū ipsum ex ea paratum designatur, vt à recentioribus Græcis, ita & ab ipso Dioscoride cap. de Malabathrino. Sic & Tibullus: *tamdudū Syrio madefactus tempora nardo.* Itémque loco alio: *illius puro distillent tempora nardo.* Horatius vtroq; genere vsurpauit. Nam Ode 12. 2. carm. *Dum licet*, inquit, *Assyriáque nardo Potamus multa.* Epodon verò 9. *Nardo perunctum, quale non perfectius Mea laborantes manus.*

Cap. LXXVII. ὅμοιον ἡ &c.] Lego ὅμοιν, nimirum δάκρυον. Non enim lacrymam, sed arborē ipsam lacrymę feracem, Aegyptiacæ spinæ similem Dioscorides fecisse videtur. Verùm hinc ipsam myrrhæ arborem Plin. lib. 12. cap. 15. fusius & apertiùs multò descriptisse repetitur.

καὶ ἡ Ἀμιναία δὲ καλ.] Myrrhæ Aminææ meminit etiam Crito apud Gal. lib. 5. κα. ν. itémque Asclepiades. Sed Minæam eandē à loco in quo optima nascitur, nominat Gal. lib. 1. de Anti. ot. fol. à pago Minæorū, qui sunt Arabiæ populi, non ab Aminæa Campaniæ regione Plinius quoq; lib. 12. c. 16. Minęā myrrhā post Troglodytica probat, cōtrà quàm faciat hoc loco Dioscorides.

ἄπτα ἄρτημι Cū doctiss. Cornario & Serapione citra negādi particulā lego, ἄπτα ἄρτα τὸ τροχίσκοις ἔλαιον εἰς ἢ ἀλείφασιν. Cùm enim trochisci seu pastilli ex arida eiusmodi myrrha expressi propter aridităte nimiā citra oleū haudquaquā rectè conformari possint, olei certè adiectione tetūdi eorū vim Dioscorides asserit, ita vt prorsus inualidi fiant & inefficaces: ad ea certè quidē omnia, ad quæ laudata myrrha conferre creditur.

Cap. LXXVIII. ῥίζα τερμινθίνου] ῥίζης τερμινθίνου legendū duxi, maximè cū Serapio quoq; Dioscoridis Interpres ita legisse videatur. Neq; verò fit mihi verisimile, voluisse Dioscor. myrrhā Bœoticā, radicis genus esse: sed lacrymā potiùs, quæ incisa Bœoticæ cuiusdam arboris radice extillet.

Cap. LXXIX. ὁ ξυλοβάλσαμος] Gal. lib. 1. de Ant. ὠχρότατον, hoc est, pallidissimū laudat, haud ita magno discrimine, velut aliàs annotauimus. Idem iccirco lib. 7. de comp. med. κατὰ τόπους, pallidum ceu efficacissimum in Principum tantùm ac prædiitum antidotis commendat propter caritatē & raritatem: at qui magis fuscus est, ceu inefficaciorē, haud ita probat: quanquam & ætatis progressu aureum colorem sibi ascisceret fatetur.

ὁ Καπβαλίνης] Apud Oribasium (siquidem Interpreti credimus) Γαβαλίνης legitur, & rectè

quippe cùm lectionem hanc & Plinius ipſe probaſſe videatur, lib.12. cap. 25. quo loco: *Proximè*, inquit, *Iudæa Syria ſupra Phœnicem Styracem gignit, arua Gabala & Marathunta*, &c. Eſt autem Gabara Ptolemæo, lib. 5. cap. 15. & Straboni, lib.16. Geogr. Syriæ vrbs. Cæterùm ab hac lectione non eſt alienum, quod in capitis huiuſce fine ſubditur: in Syria Styracinum vnguentum parari ſolitum. Eorum verò coniectura minùs eſt probabilis, qui καλαμίτην legendum potiùs exiſtimant, quia Styracis calamitę apud Gal. 1. de Antid. fiat mentio, ita dicti, ſiue quod ceu cætera olim aromatica, ne fortè expiraret ac vires amitteret, intra calamos ſeu arundines è Pamphylia deueheretur, ſicuti voluit Galenus, ſiue quia, teſte Plinio, arbori quæ Styracem gignat, ſit intus harundinis ſimilitudo: quod minus placet.

CAP. LXXX. ὀσμὴν ὄνυξ] Serapio ſuffumigati Bdellij odorem hoc loco à Dioſcoride aſſimilari exiſtimauit odori vnguis odorati itidem incenſi, quem blattam Byzantiam nonnulli appellãt. At pleriq; alij vngui humano ſimile quiddã in Bdellio deſiderari putãt, partim vocis ὁμωνυμίᾳ decepti, partim ex eo perſuaſi, quòd dixerit Plin. lib. 12. cap. 9. in Bdello Bactriano nidorem eſſe ſiccũ, multóſq; candidos vngues. At prior illa ſententia, vt Cornario viro doctiſs. ita nobis quoq; probabilior viſa eſt: maximè cũ in Bdellio, quãtumuis legitimo, nil vngui ſimile comperiatur. Fortaſſis etiã ex ea vnguis odorati ſimilitudine Bdellium optimum βδέλλιον ὄνυξ per appoſitionẽ dicitur in Damocratis compoſitionibus, quæ extant apud Gal. tum in lib. de antid. tum in comp med. κατὰ τόπους.

μαλακώδη] Legit hoc loco Serapio, σίαμα μαλακῶδες, hoc eſt, *odorem aſpalathi referens*, quem quidẽ lingua ſua *darſiſaban* nominat. Plin. verò lib. 12. cap. 9. μαλακώδη legiſſe videtur, dũ *in offas emolutum* conuertit. μάλαγμα enim *maſſam* Græcis ſignificat, & Gaza apud Theophraſtum vbique *offam* interpretatus eſt. Vtrunque porrò legiſſe videtur Ruellius & Oribaſij Interpres, μαλακώδη, inquam, & ἀμμαλακώδη.

CAP. LXXXI. διαφέρουσι δὲ ἡ Ἀραβίαι] Oribaſius legit, ἡ Ἀραβία: ac Plin. quoq; lib. 12. cap. 4. de Thure verba faciens, *Græca* (inquit, *ſtagoniã & atomon tali modo appellant: mannæ orobum*. Atque ita etiã hoc loco legendũ videtur, nimirũ voce deducta ἀπὸ τῶ ὀρόβου. Sic verò vocatũ fuiſſe] hus, fit veriſimile, cuius fruſta magnitudine vix orobi modũ excederẽt Ad eundẽ modũ ὀροβίτας ὀροβίτους nominat Gal. 6. ſimpl. med. ciceris genus cruo magnitudine ſimile. Ἀραβίας autẽ ἀπὸ τῆ, Ἀραβίας vel Ἀραβίτας, nuſquam, quod equidem ſciam, reperitur.

θερμαίνει γάρ] Sic fatetur etiam Gal. 7. ſimpl. Thus aſtrictionẽ habere puſillã, ſed minimùm manifeſtam aſtrictionẽ eſſe candido: corticẽ verò euidenter aſtringere, proindéque etiã ſummè deſiccare: quod ipſum Paulus totidẽ verbis repetit. Contrà idem Gal. 13. meth. Thus aſſerit puris tantùm mouendi facultatẽ obtinere, vtpote nulla vi aſtringendi præditum, magiſque illud præſtare quod pinguius eſt & albicans, ſicuti quod flauum eſt, valentiùs ſiccare: mannæ verò Thuris (quo nomine λιβανωτοῦ ἀποσπάσματα, hoc eſt, *thuris fragmenta excuſſu elisa*, intelliguntur) aſtringendi vim aliquam eſſe, quoniam corticis thuris paululum admiſtũ ſit. Soluetur hæc cõtradictio, ſi Thus purum ac per ſeſe nullatenus aſtringere dixerimus: at cui corticis nonnihil admixtũ eſt, id corticis ipſius ratione aſtringere. Vel dicamus potiùs, Thus eſſe duplex: vnum candidum, idémque puriſſimum ac pinguiſſimũ, quod maſculũ à Dioſcoride appelletur, quódque, Plinio teſte, autumno colligatur: alterum ruſum ſeu fuluum, quod priori minimè comparãdum ſit, & veré legatur, poſt inciſum ſcil. hyeme præcedenti corticem. Illud nullam planè aſtrictionem obtinet: hoc verò aliquantulam ſortitum eſt, quam quidem æquè ac colorem ab ipſo cortice videtur contraxiſſe.

αἱρεῖται πολλάκις] Addit Serapio ex Dioſc. Thus triſtitiã depellere & memoriam augere: atq; idipſum Auicẽna capite de Thure innuiſſe videtur.

εἰς ὑπόπυκνον χρῆται] Crudam ollam dixit, pro noua & recente, ὑπόπυκνον, *quæ ignem experta non ſit*, quemadmodũ etiam Serapio interpretatus eſt. Sic metaphoricè quoq; Ouidius ac Plinius luniori *crudæ materiæ* dixẽre, recentia ſeu recens inflicta.

πρόσφατος] Vulg. exempl. habent, μὴ πρόσφατος. Serapio καινότερος legiſſe videtur citra negationem. Ego verò vulgatam lectionẽ retineo, expuncta tantummodò negatione: quam eo audaciùs prætermiſi, quòd in vetere quodã Dioſc. codice non legeretur. Eſt porrò rationi conſentaneum, vſtum Thus quàm non vſtum longè facilius friari atque comminui: nimirum humore igni abſumpto, qui quidem lentore ac viſciditate ſua, quominùs thus ante vſtionem in minutiſſimas partes comminueretur, impedire poterat.

CAP. LXXXII. ῥοϊκοῖς] De fluxu muliebri dictionem hãc interpretatur Serapio, quẽ ſecuti videntur Ruellius atq; Marcellus Virgilius. Sed nos, cum generalior ſit vox, non magis de vteri quàm de alui ipſius fluxionibus accipiendã cenſuimus: maximè cũ eſſet compertũ, thuris corticem cœliacis ac dyſentericis tum intus aſſumptum, tum etiã foris adhibitũ, gregiè opitulari, vel ipſo teſte Gal. lib. 7. de ſimpl. medic. facult. quo quidẽ loco efficaciæ nullam omnino fecit mẽtionẽ, qua ad muliebrẽ fluxũ pollere creditur.

CAP. LXXXIII. ὑπολιθώδης ὁ μάννος] Cõtrà nõ remiſſiorem, ſed aliquanto magis intentam eſſe thuris Mannę, quàm ipſi thuri vim aperte prodidit Gal. 5. & 13. Meth. quantum certè quidem ad aſtrictionem exiccationémque attinet.

CAP. LXXXIIII. ὅταν πέσῃ] Rectiùs fortaſſis ὑπεκθλίβῃ, quemadmodum habet Aëtius, apud quẽ lib. 1. hoc ipſũ caput & quod proximè ſequitur, totidem fere verbis tranſcripta reperiuntur. Legitur verò apud illum hoc in loco: ὑπεκθλίβει δὲ καὶ τὰ ἀμφοτερόχολα τῶ πυρετῶ, &c.

πολλὰ ῥυπτικός] Gal. 7 de ſimpl. med. facult. Ad oculorũ affectus iſta reſtringit, quæ tamẽ Dioſc. latiùs ac in vniuerſum extuliſſe videtur. Serapio quoque & Marcellus Virgilius Galenum hac in parte ſecuti ſunt.

CAP. LXXXVI. ὑγρὰ δυσεντερικὰ καὶ ῥοϊκά] Legebatur in vulg. exẽpl. ὑγρὰ δυσεντερικὰ, ſed, cùm ὑγρὰ & ὑγρὸς pro eodẽ vſurpentur, vocũ harũ alterutrã hoc loco redũdare, & è margine fortaſſis in contextũ incuria librariorum irrepſiſſe facile coniicio. Sin minùs, aut legendum ὑγρὸς, ita vt ea vox ad verbum ἐκθλίβει referatur: quaſi velit Dioſc. tam Pini

quàm

quàm piceæ corticem ſuffitu tam partum, tam etiam ſecundas ex vtero pellere: aut etiam, ἐκβάλλει in dãdi caſu, quaſi voluerit exprimere, corticẽ hunc ipſi vuluæ ſuffiri, aut eiuſdem ſuffitum vulua excipi oportere.

CAP. LXXXVII. τρόβιλοι δὲ καὶ κάρυοι] Vt πιτύϊδων nomine deſignantur à Dioſc. pini piceæq; nuclei conorum nucibus incluſi, quanuis Gal. 8. ſimpl. impropriè nominis id piceæ fructui tribui aſſeruerit: ita τρόβιλων nomine, ſtrobili arboris, cuius & ipſe meminit Plutarchus, nõ tantùm coni, ſed ipſi etiam nuclei, etſi Gal. temporibus, vti refert ipſe, comm. 4. in lib. de ratione victus in acut. pini piceæq; fructus τρόβιλοι etiamnum dicerẽtur: quemadmodũ & olim aliis ὀρεινὰ κάρυα, aliis πιτύϊνα κάρυα, aliis denique πιτύϊδες dicti ſunt, teſte Athen. lib. 2. Δειπνοσοφ. Porrò vt pini, piceæ, laricis, ſtrobili ſeu pinaſtri (eiuſdem enim arboris ſunt hęc duo nomina, ſi Plinio credimus) & id genus cognatarum arborũ, ita & ipſorum fructuũ nomina apud Autores varios paſſim inter ſe ita cõfunduntur, vix vt certũ quicquam de iis ſigillatim ſtatuere poſſis. Ac certè quidem in eiuſmodi nominum diſtinctione minùs iccirco Medico laborandum videtur, quòd iis omnibus arborum generibus foliorum, ligni, corticis, reſinæ, coni ac nuclei eadem propè facultas eſſe cenſetur. Cæterùm hic κάρυα τρόβιλος intelligimus, eſculẽtos ſtrobili nucleos, qui non modò à lacunatis toris quibus includebantur liberati, ſed & à putamine ac ſua etiam cute ſeu ferruginea tunica, qua quidẽ immediatè veſtiebantur, nudati ſunt. Hos autem opponit Dioſc. ἅλοις τοῖς τροβίλοις, integris ſcilicet congenetum eiuſmodi arborũ nucamentis ſeu conis (τὰς τρόβιλας vocauit Hipp.) è quorum etiam præpinguiũ decocto eclegma cõcinnat, Gal. 4. comm. in lib. de rat. vict. in acutis. Cæterùm hic recentium ſtrobilorum nomine χλωροὶ, id eſt, virides ſeu adhuc virentes intelliguntur, vti patet ex Gal. verbis 7. ſimpl.

CAP. LXXXVIII. πεύκη δὲ κύφων] Quanuis κύφων, & quod paulò pòſt ſequitur πτόρθος, maſculini ſint generis: referri tamen debent ad præcedens illud χύλισμα, aut certè ad aliud quidpiam quod ei voci æquipolleat, puta χυλισμὸν aut χυλόν. Nec enim de Lẽtiſco iſta dicũtur, vt voluiſſe videtur Ruellius: ſiquidẽ κῶνος pro lentiſco, nõ niſi fœminino genere vſpiã legitur. Atq; de ipſo lentiſci ſucco artificioſe, vti monuit, expreſſo intelligi potiùs debere vel illud ſatis indicat quod deinde ſubdit, ad eadem valere ad quæ acacia & hypociſthis valere perhibentur, atque adeò pro his ipſis ſuccis non malè vſurpari.

τοὶ δὲ ξυλώδεα χλωρὰ] Virides Lentiſci ſurculos ὀδοντογλύφους potiùs quàm ὀδοντοτριμμάτους, hoc eſt, dentiſcalpiorũ potiùs quàm dẽtifricioru expleri vicem ex eo fit veriſimile, quòd iis non niſi in puluiſculũ tritis gingiuæ afficari, dentéſve poliri cõmodè poſſunt: at iiſdem vel tantillũ exacutis fodiendo ſcalpendóve vtiliter eximuntur quæcunq; dẽtibus inhæſerũt. Atq; in hunc vſum lentiſcus etiam à Martiali cõmendatur. Sed & olim molles ac delicatuli, ceu quibus eſſet frequenter in ore dentiſcalpiũ, contumeliæ loco χλωροῦχος ſeu χλοῦς, quaſi lẽtiſci arroſores, appellabãtur.

CAP. XCI. μάλ' αἱ ὀδμηρότητες] Dioſcorides hoc loco reſinam terebinthinam omnium optimam: ſtrobilinam verò infimã, ſtatuere videtur. Gal. tamen 3. de comp. medic. κατὰ γένη, principem ſtrobilinam calore, proximam huic abiegnã, poſtremam terebinthinam eſſe aſſeruit. Scilicet de bonitate reſinarũ abſolutè locutus hîc eſt Dioſcorides illic verò Gal. de earũ qualitate, nimirũ caliditate, agit: in qua primas haudduhiè obtinet ſtrobilina, veluti & eo ipſo loco diſertè admonuit Gal. ne à Dioſc. diſſentire videretur. In eandẽ porrò ſententiam 8. de ſimpl. medic. facultatibus terebinthinã & huic viribus proximam lentiſcinã, ob eam quã præ cæteris maiorẽ habẽt partiũ tenuitatẽ, magis digerere, magiſq; attrahere prodidit: eam verò quæ ex picea deſtillat & ſtrobilinã, calidiores acriorésque eſſe, ac proinde magis exiccare, attamen minùs & digerere & attrahere: pineam denique & abiegnam, inter veraſq; illas medias meritò cenſeri. Sed de his fortaſſe nimis multa. Nam & ipſa terebinthina apud Dioſcoridẽ & Paulum primas obtinet: cùm tamen apud Galenum ratione diuerſa lentiſcina & ipſi terebinthinæ & cæteris reſinis omnibus præferatur.

CAP. XCIII. περὶ λιγνίτου ῥητίνης] Vt præcedens capitis inſcriptio vitiata olim fuerat, περὶ ῥητίνης ὑγρᾶς πιτύϊνης καὶ πευκίνης, cùm non de reſina tantùm liquida quam fundunt piceæ atque pinus eo capite mentio fieret, ſed & de lanigna & cupreſſina, necnon etiam de ſiccis reſinis omnibus in vniuerſum: ita & huiuſce capitis inſcriptio deprauata videtur, cùm potiùs, περὶ τῶν πάλαι τὰς ῥητίνας ταύτας ξηρὰς, hoc eſt, de reſinarum vtendarum modo inſcribi debuerit, velut legitur etiam apud Aëtium. Nec enim de reſinæ fuligine quicquam habetur, præter vnum aut alterum verbũ ad capitis calcem. Sed hæc eſt eorum culpa, qui caput hoc, quod cum ſuperiore coniunctum eſſe debuit, diſiungendum exiſtimarunt.

καὶ οἷς ταῖς ἀκτυάλοις ἄνευ] Præſtiterit fortaſſis addita negatione legere, οἷς μὴ ταῖς ἀκτυάλοις ἄνευ. Friabilem enim atque ita aridam reſinam vult effici, vt digitis minimè cedat, ſed vel ſolo contactu in micas frangatur frietúrve: quod lucuſenter expreſſit Aëtius, dum pro eo quod legimus hoc loco, οἷς μὴ ταῖς ἀκτυάλοις ἄνευ, ἀλλὰ καὶ ταῖς ἀκτυάλοις ἁπτομένοις, inquit ille, 1. Tetrab. ſer. 1. Friabile porrò & aridum retorridúmve quid eſſe, ac ſimul & ſemel digitis facilè cedere non eſt veriſimile. Mollium ſiquidem atque adeò humidorum potiùs, quàm aridorum proprium id eſt, vt digitis cedant.

ἔχειν αὐτὴν τὸ οἰκεῖον ἰδίωμα καὶ ὀσμήν] Budęus, *dum odorẽ ſuum proprium quæ virus antè memoratum depoſuerint*: quaſi verò anteà vſpiam reſinas virus olere dixerit Dioſcorides. Ruellius: *dum antè dictus naturæ ſuæ notas exuerint*. At equidem ἰδίωμα hoc loco non verterim, quemadmodum ille, *virus proprium*, ſed potiùs *proprietatẽ* cũ Cornario, aut etiam notam peculiarem, quam Gallicè vnico etiam vocabulo dicimus *particularité*: præterea, αὐτὴν τὸ ἰδιάζον, ἰδιάζουσαν lubentiùs legerim, vti Cornarius quoq; legiſſe videtur. Voluit ſiquidem, iudicio meo, Dioſcorides, eo vſq; coquẽdas reſinas, dum antè memoratas notas ſibi aſciuerint, h. e. dum, vt antè dixit, inodoræ, friabiles & aridæ retorridæve redditæ fuerint.

Planiùs & apertiùs profectò Aëtius, quo loco caput hoc immutatis per quàm paucis ex Dioscoride transcribit, ὅτι πισσαλίφου, inquit, αἰτιολόγησε Διοσκουρίδης, &c.

CAP. XCIIII. ἀπὸ δὲ τούτου πίσσου] Ab hac voce πίσσος, quæ quidem in hoc significato, nempe pro pice liquida, vix vsquam alibi vsurpatur, deduci videtur τὸ πισσοῦν: vnde illud πισσοῦται, quod Hesychius interpretatur, τὸ πισσοῦσθαι, quod est, pice oblinere. Hinc quoque deductum facilè crediderim τὸ πισσόρυτον, huicque oppositum τὸ ἀπισσόρυτον, quod ἀπὸ τῆ ἀπισσοκόμη superiore capite vsurpauit Dioscorides: atque adeo non ἀπίσσυτον, sed analogia seruata, ἀπισσόρυτον, potiùs scribi oportere.

CAP. XCV. γίνεται δὲ καὶ πισσάλιφος] Gal. 8. de simpl. medic. facult. Itémque Paulus, Oribasius ac Plinius, πισσάλιφος, seu Picinum oleum, itidem nominant id aquosum serosúmve, quod liquidæ pici superstat. Attamen Gal. locis aliis, nimirum 2. de simpl. med. fac. cap. 21. & lib. 1. de cõp. med. κατὰ γένος, huiusmodi liquorem non πισσάλιφος, sed πισσέλαιον nominari scribit: πισσάλιφος verò voce non aliud significari, quàm picem oleo permixtam. Porrò Picinum illud oleum, quoniam, vt serum lacti, ita pici supernatet, Paulo etiam lib. 3. cap. 74. ὑπόπισσον compositò nomine dicitur. Aëtius verò lib. 6. cap. 69. ὑπόπισσον πίσσης nominat. Interdũ & ipse Gal. πίσσης ὑγρᾶς ὑπόπισσον appellauit. Columella verò lib. 8. cap. 5. *picis liquaminis*: Scribonius & Marcellus *picis florem* nuncupauerunt.

CAP. XCVII. καὶ Βρεττία] Huiusce picis Bruttiæ ceu optimæ meminêre passim Galenus, Plinius, Celsus & Scribonius. Sed eadem apud Lucianum in Pseudomante πίσσα Βρεττία falsò dicitur, cùm eo loco Βρεττία seu Βρεττία potiùs legendum sit, vti rectè monet doctiss. Paul. Leopardus. Sic verò Strabo lib. Geogr. 6. *Est*, inquit, *apud Brettios sylua, quæ præstantissimam fert picem, quam Brettianã syluam vocant*. Sic enim illius Græca restituuntur: δρυμὸς ὁ φέρων τὴν ἀρίστην πίτταν, ὃν Βρεττιανὸν δρυμὸν καλοῦσι.

CAP. C. ἐν Ἀπολλωνίᾳ τῇ πρὸς Ἐπιδάμνῳ] Duæ fuerunt in Macedonia vrbes, Apolloniæ nomine insignitæ: quarum vna, quæ Plinio quondam fuit Corinthiorum colonia, est ad Epidamnum, altera in Mygdonia Macedoniæ regione. Sed de priore illa mentionem hoc loco fieri vnicuique constat: quò fit vt cum veteri codice legendum existimarim, τῇ πρὸς Ἐπιδάμνῳ, non vt habetur in vulgatis exemplaribus, itémque apud Oribasiũ, τῇ πρὸς Ἐπιδαύρῳ. Siquidẽ Epidaurus vrbs est Peloponnesi, ab Apollonia vtraque longo distans interuallo: Epidamnus verò seu Epidamnum, oppidum est in ea ipsa Macedoniæ parte situm, quæ Adriatico mari incumbit, posteà propter inauspicatum nomen, vti refert Plinius, Dyrrachium Romanis appellatum. Porrò legi quoque posset, ἐν Ἀπολλωνίᾳ τῇ καὶ Ἠπείρου, vt habetur apud Gal. xi. de simpl. med. fac. capite de bitumine. Nam & Epirus Macedoniæ est finitima, neque ita longè dissita ab Apollonia, priore loco commemorata. Quin & Ceraunij montes, quorum hîc ibidem fit mentio, versus occasum in finibus Epiri visuntur in mare vsque extensi, vbi Ionium mare ab Adriatico separatur.

ὅλουν πίσσης] Pissalphalton non tantùm mistã bitumini picem redolere, sed & bitumine simul & pice constare voluit Plinius, lib. 24. cap. 7. his verbis: *Est & Pissalphaltos mistu bitumen pice naturaliter ex Apolloniatarum agro: quidam ipsi misere*, &c.

CAP. CI. ἀνάψαι ἔχει πρόπαλαι] Ardentem hanc Naphthæ seu petrolei (sic enim nominat Nicolaus Alexandrinus) vim ignium naturæ cognatam, ita exprimit Plutarchus in vita Alexandri: οὗτοι δὲ λίθοι φασὶν οἱ τῶν Ἰνδῶν, ὅταν πρὸς τὴν θρύαν, δι' αὐτῆς τῆς αὐγῆς τοῦ ἡλίου καταλαμφθείσης αὐτοὺς τὸν μεσημβρινὸν καιρὸν ἀνάπτεσθαι, hoc est, *Cognationem habet cum igne tantam, vt prius quàm flammam contingat, interfusum aëra sæpenumero solo splendore eam flammam elicere accendat*. Sic Strabo Geograph. lib. 15. ὁ δὲ λιθανθρὰξ, inquit, ἄσφαλτος, ἢ καὶ ἄσφαλτον, εὐθυβόλους ἔχει τὰς φύσεις. προσπελάζει γὰρ ὁ ἄσφαλτος πρὸς πάσαν, σπαράττει τὸν πῦρ, καὶ ἀπαγόμενον αὖθις πάλιν ἀφαρπάζει, φλέγων, &c. Id est, *Liquidũ bitumẽ quod & Aphtha dicitur, vim habet admirabilem. Si enim igni admoueatur, ignem illico arripit. Quam si corpori Naphtham admoueris, confestim illud inflammatur*, &c. quo loco, velut & apud Oribasiũ Naphtha & Aphtha, fortè ἄφθα τὸ ἀνάπτειν, quod accendi significat, sic dictum, pro eodem accipiuntur. Cæterùm Plinius in eandem illam sententiam lib 2 cap. 105. *Naphtha*, inquit, *magna cognatio ignium, trãsiluncq; protinus in eam undecunque usum*.

πρὸς ὑπόπτωσιν καὶ προπτώσεις] Etsi vti vuluæ ita etiam sedi πρόπτωσις seu procidentiæ contingere possint, ac vtrisque eadem ferè conferant remedia: hoc tamen loco de solius vuluæ procidentiis sum interpretatus. Marcellus autem sedis procidentias addit, Plinij fortassis autoritate motus: qui quidem de Naphtha sermonem faciens, lib. 25. cap. 14. *Vuluarum*, inquit, *strangulationes olfactu discutit, cum uino & castorio: procidentia sedis suffitu reprimit*: quo loco lege, *procidentias*.

CAP. CII. πρὸς ἐπιμηκύνσεις] ῥευματίζοντα μὲν εἰώθαμεν ἰατρῶν τὰ μόρια non ignoramus Medicis partes eas plerunq; dici, quæ fluxione tentantur infestantúrve. Attamen hoc loco dubium haud abs re fuerit, vtrum per πόνον ἐπιμηκύνσεως, vesicam Dioscoridis intelligat fluxione tentatã, an verò vesicam ex qua lotium paulatim guttatímve destillat. Nam & de Cupressi foliorum viribus agens Plinius, lib. 24. cap. 5. stranguriæ pota mederi prodidit. Ac reuera Cupressus partibus sui omnibus & humorum ad vesicam fluentium impetum vi sua astrictoria inhibere, & ipsum quoque vrinæ stillicidium ex retentricis facultatis imbecillitate ortum, tum illa eadem astringendi, tum etiam resiccandi vi compescere posse creditur. Fortassè verò quæret aliquis: Si destillationibus in vesicam illo modo conuenit Cupressus, quomodo simul etiam dysuriæ, hoc est, vrinæ difficultati auxiliabitur, quã certum est alio quàm astringente remedij genere curari oportere? Sed vt eam dysuriam non est verisimile vsu Cupressi foliorum iuuari quæ ab obstructione ducit originem, ita ei quæ ab inflammatione aut vlcere aut etiam acrium humorum influxu ortum habet, non video cur aliqua ex parte mederi non possit. Nam quod ait Manardus, Cupressi folia, dum aluum astringũt, vrinam cõcitare: id Cupressum, haud secus ac astringentia reliqua, non per se, sed ex accidentã

duntaxat, repercusso nempe liquore, præstare, etiam vitio nullo laborantibus vrinarijs meatibus, vnicuique constat.

CAP. CIII. ὁ δὲ μικρὸς ἴυπος] Quoniam vix erat credibile veræ Iuniperi, quàtumuis vastę ac procerę, grana vspiam reperiri, quæ nucis iuglandis magnitudinem æquarẽt: non male fortassis, tum vetusti codicis, tum etiam Serapionis autoritati fidem hoc loco habẽdam, & καὶ τὸ, καρυὸν μικρὸς, μικρὸν ὄντα, legendum esse iudicaui. Cæterùm quę ab Interpretibus aliis ad capitis huiusce calcem adiiciuntur, æque ac de maiore Iunipero caput integrum, quoniam in Dioscoridis nothis reperiuntur, vnde ea repetere cuiusvis in promptu fuerit, hoc loco prætermittere visum est.

CAP. CV. καρὸν δὲ ἔχει ὅμοιον] Fecit Serapionis, Interpretis minime spernendi, autoritas, vt Catacuzeni exemplari maiorem fidem habuerim: quod quidem ideò hac in parte secutus omnino sum. Attamen αἰτὸ τὸ μακρόπυρον, μακρόπυρον Serapio legisse videtur: neque de toto fructu seu cono (quem constat hauddubie in magna Cedro, quam Cedrelaten à quibusdam vocari ait Plinius, lib. 13 cap. 5. cupressino non paulò maiorem longioremve esse) sed vnà cum ipso Plinio, dum scribit Cedri maioris frugiferæ semen cupressi simile, καρπὸν vocem hoc loco de solo semine accepisse: quo quidem modo & alibi plerisque in locis vsurpari à Dioscoride, facile est obseruare. Porrò cum illa nostra lectione non male quoque quadrant, quæ apud Theophrastum, Gal. & Plinium de duplici Cedri arboris genere habentur. Sed & ipse Dioscor. lib. 5. de vino cedrino agẽs, palàm Cedri maioris fructuũ meminit, ad minoris Cedri fructuum differentiam. Cæterum quod de Cedriæ fuligine nonnulli ad capitis calcem reiecerunt, sunt qui in plerisque exemplaribus planè desiderari asserant.

ὡς ἐπ' αὐτῶν] Vulg. cod. ἐπ' αὐτοῦ. sed necessariò legẽdum videtur, ἐπ' αὐτὸν κρόκινας φλόγας, vel, ἐπ' αὐτῶν, vti legitur in vetusto quodam codice Bibliothecæ Palatinæ: sic & ex eodem codice αὐτὸ τὸ, καὶ ὡς ὅτι τὸ καρὰ χαλκίας, legere visum fuit, καὶ τοῦτο, &c. Sic numerus numero, genus generi aptiùs respondet. Ad eundem modum sub finem capitis, quoniam οὐδὲ τὸ ὑδρίδιον agitur, αὐτὸ τὸ μύγωμα, μύγωμα restituendum videtur.

CAP. CVII. αἰσθάνεται καὶ ὄψει] Addit Galenus lib. 8. simpl. eiusmodi Platani lanugine spiritu attracta inspiratáve, arteriam quoque offendi: quippe cùm ea vehementiùs exiceet & exasperet: quo fit vt vox non obscurè vitietur.

CAP. CIX. ἔνιοι δὲ ἱστοροῦσιν] Citatur Tarentinus in Geoponicis, qui particulatim docet, si caudici Populi nigræ conciso, & per terram strato, fermentum aqua resolutum infundatur, fore vt illico prosiliant ægiritæ fungi.

CAP. CX. ἐν τῇ Βαρβαρίᾳ] Barbariam Gangetis Indiæ fluuij insulam innuere videtur. Gal. etiam, Paulus & Aëtius de hoc ipso Macere, ab Arabum maci proculdubiò discrepante, verba facientes, ὃν τινὲς Ἰνδικὸν seu τινὲς solitum asportari commemorant.

CAP. CXI. ἡ τῶν φλοιῶν ἢ ἐκ τῶν ῥιζῶν] Fortè legendũ ἡ ἐκ τῶν ῥιζῶν. Quod enim hìc de radicũ corticis decocto dici videtur, id simpliciter de radicum decocto Gal. Paulus, Aetius & Oribasius videntur intellexisse. In vetusto etiam codice Bibliothecæ Palatinæ sic legitur: τὸ δὲ ἀφέψημα τῶν φλοιῶν, ἢ τῶν ῥιζῶν, ἢ τῶν φύλλων, vbi legendum, ἢ τῶν φυλλων.

CAP. CXII. οἱ σκωληκοπεπονημένοι ξύλοι] Quæ hìc de lignorum Carie à Dioscoride dicuntur, de vlmi potissimùm Carię intelligi debere satis ex eo patet, quòd capiti de vlmo statim subiiciũtur. Huc adde quòd Galenus idipsum satis innuit, lib. 8. de simplicium medicamẽtorum facultatibus: quo loco, σκωληκοπεπονημένοι, inquit, ξύλων, καὶ μάλιστα ὅσα μικτὴν συμφυῶς τὴν ἁφὴν καὶ ῥύψιν, ὥσπερ καὶ ἡ πτελέα, κατέχειν τε ἀναπλεῖν τὰ ὑγρὰ τῶν ἑλκῶν. hoc est, *Caries lignorum, maximeque eorum quæ astrictionem simul & abstersionem participant, veluti vlmus, vlcera humida expurgare & implere.*

ὡς ἐδόκει τισὶ καθῶν] V. codex καθὼν legit, quem secutus est Serapio: quasi voluerit Dioscor. lignorum Cariẽ linteis inditam cum iis simul & semel cremari, deindéque tritam vlceribus serpentibus aspergi, vel potiùs, eandem vstam tritámque indi rariori linteo, quò tenuissimus saltem puluisculus serpentibus vlceribus inspergi possit. Malim enim itidem κατακαυθὲν legere, quàm cum vulgatis exemplaribus κατακαυθὲν: siquidẽ pulueres rectiùs aspergũntur, quàm inducantur illinantúrve. Ego eandem lignorum Cariem etiam non vstam rariori linteo inditam, & vlceribus inspersam, in eũdem vsum accommodari posse minimè negauerim. Seu tamen iuxta veteris exẽplaris fidem καθὼν, seu etiam cum vulgatis codicibus καθῶν, legere placuerit, equidem non nimiùm repugnauero.

τὸ δὲ αὐτῇ δάκρυον] Vt Poëtæ tum Græci tũ Latini, ita & Historici nonnulli fabulæ huius mẽtionem faciũt: Ouidius verò 2. Metam. eam perbelle explicat, dum Heliadas Nymphas commemorat, Phaethontem fratrem à Ioue fulmine ictum, & in Padum fluuium delapsum, apud eius fluminis ripam menses aliquot insolabiliter defleuisse, tandémque Iouis commiseratione mutatas in Populos arbores, quæ lacrymis suis iuxta cum ipsum fluuium Electrum fundant:

Inde fluunt lacrymæ, stillat quas Sole rigente
De ramis electra nouis, quæ lucidus amnis
Excipit, & nuribus mittit gestanda Latinis.

Ea fabula multis imposuit, vt Electrum Populi lacrymam esse crediderint: sed eam sententiam & Plinius & ipse Lucianus iam satis exploserũt. Porrò cùm variæ adhuc sint ac discrepantes de Electro sententiæ, eorum opinio qui bituminis genus quoddam esse censent, probabilior esse videtur, quàm eorum qui arboris alni, cedri aut pinei generis, lacrymam esse arbitrantur.

CAP. CXIIII. σκωλήκων πολύπορος] Sunt qui ex Theoph. & Plinio non πολύθρυπτος aut πολύθρυπος, sed potius πολυπόρωτος legendum existiment. Nã ille de variis Arundinum generibus agẽs, lib. 4. hist. cap. 12. καὶ ἡ μὲν κοίλη, inquit, ἣν καλοῦσί τινες σύριγγα· οὐδὲν γὰρ ὡς εἰπεῖν ἔχει ξύλου καὶ σαρκός· ex quibus verbis, facile est colligere. Syringiam perparum ligni carnisque obtinere. Hic verò lib. 16. cap. 36. *Calamus alius totus cauatus, quem Syringam uocant, utilissimus fistulis, quoniam nihil est cartilaginis atque carnis.* Ac reuera quidem, si eiusce Calami ex sententia Dioscoridis vsus etiam fuit ad librorum scriptionem, vel, vt Plinij verbis vtar, si chartis seruire solitus erat, non est veriſi-

mile fuisse vsque adeò κάλαμον, sed vacuum potiùs & inanem fistularum modo. Hinc enim probabiliùs σύριγξ seu συριγγίας dictus est, quàm quòd vti voluit Plinius, fistulis vtilis aptúsve esset: quêadmodum è prioribus vnus tibus tibiarúmve ligulis, alter sagittis conficiendis. Qua quidem ratione hic etiam Democritò a. Geopon. vbi de inuestigandis aquis agitur *Δελφίνα*, Theophrasto ἔλξινος, Plinio sagittarius appellatur. Ille vt κάλαμος Theophrasto, ita Plinio tibialis, ac deinceps in ζυγίνου & βομβυκίου subdiuiditur. Et hûc quidê rursum ita dictum verisimile est, vel quòd vermiculis bombycibus dictis corporis exilitate & strigoso habitu similis esset, vel quòd ob strigosam maciem sonum non ederet tibia dignum, sed bombum duntaxat. Ille Plinio aucupatorius cognominatur, quòd eo fortassis aucupes viscato ad capiendas aues vterentur, vel quòd ex eo laquei ad easdem captandas, ζᾶγο etiam seu ζυγοὶ Veteribus dicti, destinarentur. Alio nomine armamentarius eidem Autori dicitur, vti certè iudico, quòd ad vinearum armamêta, hoc est, iuga seruiret. Iugalem vertere maluit doctissimus Dalechampius, ex eóque ζυγίνου cognominatum autumat, vel quòd ex eius internodiis coniugatis compingerentur fistulę, vel quòd eiusmodi arundine transuersa sublimes iungerentur vineæ, quæ ab eo iugatæ dicebãtur Varroni, lib. 1. de re rust. cap. 8. vti fortassis eadê arundine characia dicta alligabantur, vt subrectæ adeóque pedatæ starent: siquidem χᾶραξ fœminino genere, quibus vineæ fulciuntur ridicas seu pedamenta significat. Sed & ille idem aliud affert ζυγίνου cognominis etymon, quòd scilicet ad nuptiales siue coniugales tibias esset accommodata. Sic enim Apul. 4 Asin. nuptiales etiam tibias vocat zygias, quasi iugales, sicuti Iunonem zygiam, *cui vincla iugalia curæ*, vt inquit Poëta. Sed hæc nimis multa. Quòd si quis longè plura quàm hoc capite recensentur à Dioscor. arundinum genera desideret, Theophrastum & Plinium legat, locis antè citatis.

CAP. CXV. ἔχει δὲ ῥίζαν] Quæ hic à Dioscoride radice effe runtur, verùs Theophrastus, lib. hist. pl. 4 cap. 9. papyri caulibus seu thyrsis tribuere videtur, quanquam Herodotus in EVterpe non caules totos, sed eorum inferiorem tantùm partem radici proximã mandi solitam prodidit, eximia quadam suauitate, cùm in luculêto furno torreretur. Sed esto fides penes Guillandinum virũ doctissimum, qui fuit bibli seu papyri AEgyptiæ *σύνθεσις* fide dignissimus.

CAP. CXVI. καρπὸν ὅμοιον αὐτῇ ῥίᾳ] Contrà, & falsò quidem, Plinius lib. 16. cap. 26. myricam (siquidem myrica eadem est cum tamarice) nullum fructum, hoc est, ne semen quidem ferre, propterea que à vulgo infœlicem arborem appellari, scribit. Nihilominus idem sui velut immemor, lib. 24 cap. 9. satiuæ tamaricis (duplicem enim cõstituit, syluestrem, inquã, sterilem: satiuam, mitiorem) fructum lignosum maiorem galla tribuit: rursúmq; dum tamaricis vires persequitur, seminis peculiarem vsum minimè prætermittit.

CAP. CXX. ὁ δὲ θρυαλλώδης] Non tantùm quia in maritimis nascatur hic frutex, vt voluêre quidã, nempe ἀπὸ τῆς ἁλὸς, ἅλμης seu ἄλμου aspiratè dicitur, sed etiam quia, testibus Gal. Paulo & Aetio, gustu sit ἁλυκὸς, hoc est, sapore salso: qua quidem ratione alio etiam nomine ab Aetio ipso ἁλμυρὶς dicitur. *Halimon aly alus maritimum esse dixêre falsum, & male nomen*, inquit Plinius, lib. 22. cap. 22. Quare manifestò fallũtur qui alimon citra aspirationem scribendum putant, itáque dictum hunc fruticem credunt, quòd famem depellat, aut gustantes eluire non patiatur: huius tamen sententiæ fuit Solinus, qui quidem in Polyhistore, cap. 16. herbam in Creta esse commemorat ἄλιμον dictam, quæ admorsa diurnam famem prohibeat. Sed vide num Solini ἄλιμος, à Dioscoridis halimo planta diuersa fuerit.

CAP. CXXI. Ἀπαρὶν καὶ ἀγριοβάτις] Vt ἀγριοβάτις aut ἀγριοβάτις potiùs, quàm ἀγριοβάτις, hoc est, fulcũ seu fuiginosum, legendum credam, facit locus ille Theoph. 3. hist. plant. cap 17. de paluri fructu, quo ipsum à Medicis ad tusses vsurpari tradit. ἔχει δὲ πίτυν, inquit ille, γλαγώδη καὶ ἄνισον, ὅμοιον τῇ ἄπιι σπέρμα, hoc est, *lenitorem ac pinguidinem quandam habet, quemadmodum linu semen.*

CAP. CXXIII. παρὰ Ματίωνι μυρσίνης] De Cynosbato, quod cum Cynorrhodo, aut certè huius specie quadã, vnum & idem esse videtur, sic Theophr. lib. 3. cap. 18. ἡ δὲ κυνόσβατος τὸ καρπὸν ἔχει ὅμοιον ἔχει, καὶ τὰ φύλλα παραπλήσια τοῖς ῥόδοις. (Fortè. ῥόδου) τὰ δὲ ἄνθη & ἡμέρου μικρῷ, καὶ παράπλησιν τοῖς ῥόδοις. τὸ δὲ φύλλον ἀγριόβατος ἔχει. Sensũ *arbutum fructum gerit rubentem & rosæ fructui similem. Est verò mitis arbori & frutuosa, Punicæ arbori non absimilis: folium, quale mucus.* Illum eundê locũ ex Theophr. citatus Athenæus, paulò aliter legit, scil. illic, ὁμοίαν ἔχειν τὸν καρπὸν τῷ ῥοδῷ, hîc verò ἀγριόβατις. quam quidem vocem retinet Dodonæus, quasi cynosbati folium splendens esse voluerit Theophrastus. At Plinius ἰχνοβάτις vel ἰχνοβάτις legisse videtur, dum Cynosbati folium hominis vestigio comparat. At ego censeo apud Theophr. potiùs legendum, τὸ δὲ φύλλον ἀκανθῶδες. Est enim cuiusdã rosæ caninæ folium non asperum modò, sed & aculeatum. Hanc meam confirmat vtcunque sententiam Varinus in suo Lexico, dum de Cynosbato habet in hunc modum: Κυνόσβατος φυτόν τινα, ὅμοιον ῥόδῳ ἔχον τὸν καρπὸν τῷ μικρῷ τῷ ἡμέρου & ἄνθος, παρόμοιον τοῖς ῥόδοις ἀλλὰ τοῖς φύλλοις, ἀκανθῶδες. i. *Cynosbatus planta est, similem rosæ fructum gerens, mitis arbori & frutuosæ medius, Punicæ arori subsimilis, aculeatus.*

κατὰ τὸν ὄνυχα] Andream Lacunam (qui κατὰ τὸν ὄνυχα & πτερὸν legit, non item κατὰ τὸν ὄνυχα & πτέρυγα, vti in impressis codicibus habebatur) ideò secutus sum, quòd verisimile sit lanuginem Canirubi tum per se, tũ quouis modo paratam, arteriæ grauiter infestam esse: neque facilè crediderim modum vtendi fructu Canirubi diligẽter repurgato, à Dioscoride prætermissum fuisse, vt interim modũ vtendi toto genere malefica quæ intus latebat lanugine ascriberet. Huc adde quòd & ipse Serapio, nõ spernẽdus Dioscoridis Interpres, ad fructum ipsum ea manifestò refert, quæ Ruellius vulgata lectione deceptus, huic lanugini tribuere visus est.

CAP. CXXIIII. σῦκα ἔχει ἐλαίᾳ] Cyprum AEgyptiam, longè aliter ac Dioscoride zizyphi foliis, & semine comandri describit Plinius, lib.

12.cap.24.Ibidē tamē,vt & lib.23.cap.4 videtur ambigere,vtrum ea Cypros sit,quæ in Italia Liguſtrū vocabatur: dum id ita esse,non ex ſua,ſed aliorum potiùs ſententia, pronuntiat. Sunt & hodie è recentioribus non parum multi, qui palàm affiument, Cypron Orientis ab Italiæ Liguſtro differre,inſuperque Liguſtrum,Italorū,ac ipſius etiam fortaſſe Virgilij,cum Dioſcoridis Phillyrea,proximo capite deſcribenda,vnum & idem eſſe ſuſpicentur.

σμυρίνη χυλός] Plinius de Cypri (quam liguſtrū eſſe autumat,foliis,lib.23.cap.4. *ipſa*, inquit, *rufum capillum tuſa,adiecto ſtruthij mali ſuccu*,&c. Sed fallitur ille nominis *ὁμωνυμίᾳ*, dum ſtruthij mali ſuccum adiicit, quoniam Dioſc.conſtat de ſtruthij,ſeu herbæ lanariæ,ſucco potiùs egiſſe.

Cap. cxxv. *φιλυρέα*] Phillyreæ vocē.contra quàm fecerint plerique Interpretes,retinere placuit:quoniam manifeſtum diſcrimen deprehenditur inter hanc *φιλυρίαν*, & Latinorum Tiliam, quæ Theophr.eſt *φιλύκα*,in marem & fœminam diſtincta. Neque tamen ignoro à Plinio tiliæ dotes eas aſſignari, quæ hîc à Dioſc.Phillyreæ tribuuntur. Sed eum conſtat Phillyream Dioſc.cum Theophraſti Philyra perperam confudiſſe.

Cap. cxxvi. *αὐτὴ ἄρρην, ἄνθος ῥοδῆ*]Ita lego ex v.cod.Catacuz.exēplar, quemadmodū annotat Matthiolus,habet *ἄνθος ῥοδέα*,nec malè.Nā reuera Ciſti flos,quoad figurā,cynorrhodi aut roſę ſylueſtris florem æmulatur, vnde & Arabes nonnulli Ciſtum roſam ſylueſtrem vel caninam, nimirum à floris ſimilitudine nuncuparūt. Veruntamen ſi colorem ſpectes,mas à fœmina diſcrepat: ſiquidem maſculo flos eſt rubens &, vt ait Theophraſtus, *ὑπορροδίζων*, hoc eſt, *ad purpuram accedens*, qualis propemodum eſt mali Punicæ flos: fœminæ autem, albus eſt, decolor & obſoletior. Plin.lib.24. cap.10. de Ciſtho (nam & aſpiratè hoc modo, vt à Gal.ita etiam à Plinio ſcribitur) verba faciens: Duo, inquit, *eius generis: flos maſculo, roſaceus: fœminæ, albus*. Nos ideò in Dioſcoride verba aliquot deſiderare mus,quę ex Theoph.lib.6 facilè reſtitui ſic poſſent: *δύο δέ ἐστι τοῦτο γένη· καὶ μὲν ἄρρην, τὸ δὲ, θῆλυ· ἀμφοτέρων αὐτῶν ὅμοια ῥόδοις τοῖς ἀγρίοις· ἄρρεσι μὲν, ὑπορροδίζοντα, ἄνθος ῥοδαῖον τὸ δὲ θῆλυ, λευκά*. Ciſti duo ſunt genera: mas & fœmina. utriuſque flores roſis ſylueſtribus ſimiles: maris quidē ad purpurā inclinātes,veluti Punicæ: fœminæ verò, candidi,&c. Attamen vt hactenus religio mihi fuit quicquam citra vetuſtiorum aliquot exemplariū fidem immutare, ita neque hoc loco quicquam immutādum cēſuerim:iſthæc tantùm quæ paucis à Dioſc.comprehenſa fuēre,clarioris deſcriptionis gratia paulò fuſiùs explicare viſum eſt.

Cap. cxxviii. *ἔστι φύσιμα γὰρ αὐτοῦ τοιάδε*] Plinius,vti lib.16.cap.24. nominum *κισσὸς* & *μανὸς* vicinitate deceptus, nonnulla hederæ tribuit, quæ ad Ciſtum potiùs pertinent: ita & eodem ductus errore,lib.12.cap 17. ladanum *ἀσφόδελον* eſſe ſcribit *hircorum caprarumque barbis genibuſque mollioſis inhærente*, *ſed hederæ flore decoſo, paſtibus maturo, cùm eſt rorulenta Cypros*,&c. Neque verò ex hedera, vti neque ex herba alia Cypria, lada dicta, quod ipſe voluit,ſed ex Ciſto ledo,qui non herbarum, ſed fruticum generi accenſetur, legitur Ladanum, quemadmodum præter Dioſcoridem, Galenus cæteriquę omnes haud obſcurè teſtantur.

Cap. cxxix. *σκάμμα ἢ ἀκανθίνα*] Vetuſtiſſimus codex,ſi Lacunæ credimus, habet pro *σκάμμα,σκάμμα*: & ita meritò legendum cenſuēre Marcellus & Cornarius, quibus facilè aſſentiori quanuis itidē non ignoro in Artiani perip.mare Erythræi, mentionem fieri phalangium ſaſaminarum atque ebeninarum. Porrò *ἀκανθίνα ξύλα* interpretor, acanthi arboris ligna. Eſt verò acanthus arbor, non quidem ea cuius lignum Braſilium appellatur, vti docti quidam voluere, ſed alia,cuius materiam ceu robuſtam & incorruptā,ad nauium fabricam magnopere commendauit Theophraſtus, lib.4.cap 3. Eius ipſius meminit Virg.2.Georg.*Balſamaque & bacca, ſemper frondentis acanthi*. Ea autem ipſa arbor quibuſdam eſſe non malè videtur,quæ & AEgyptia ſpina Dioſc.dicitur: cuius quidem ſuccus acaciæ nomen obtinuit.

κολλύριος δὲ κοπὶς ἐκείνου] Siue intelligas ebenum ſuper coticula tritam collyriis indi, quod paulò poſt clariùs innuere videtur Dioſc. ſiue ex ebeno parari coticulam,ad quam collyria ipſa affricētur & atterantur,eodem ferè res redit. Plinius quidem ebeni ligno ad cotem tritō caligines diſcuti dixit,lib.24.cap.11. At Serapio ex ebeno parari coticulam (fricatorium vertunt) cui collyria affricentur. Conſtat certè quidem ex Galeno,6.ſimpl. ebenum ex iis eſſe lignis,quæ tuta cum liquore facile ſoluuntur, æquè ac lapidum nonnulli. Ideóque vtrouis modo locum hunc interpreteris, certum eſt terendo reſolui ebeni materiam, quæ collyriis commodè & vtiliter excipiatur. *Κολλύριον* porrò nomine non tantùm coticulam Græcis ſignificari, ſed etiam medicamentum ipſum ad cotem tritum,ſiue metallicū, ſiue alius generis fuerit,ex alio Dioſc.loco,lib.5. cap.144.cap.de hæmatite,palàm fit:vbi,*γίνεται δὲ* (inquit) *καὶ κολλύριον ἐξ αὐτοῦ καὶ ἀκάνθινα σκεύη πρὸς τὰ ὀφθαλμικὰς παθήσεις ἐπιτήδεια*, hoc eſt, *fiunt & ex eo collyria, ſtémque, eodē ad eum affricto cum liquore quopiā ſuccus velut exprimatur, qui ceu & illa,ad affectus oculorum accommodantur*. Quanquam & coticulas, vti ex ebeno, ita & ex hæmatite fieri nihil vetat.

καὶ τοῦτον τὸν τρόπον] Aliquot verba deſiderari, aliquot etiam tranſponi hoc loco videbantur, quæ tamen facile ſuit ex Serapione reſtituere.Iccirco in loci huius interpretatione,non tā Dioſcoridis verba, quàm ipſius mentem,reddere viſum eſt. Neque enim ipſum roſarum magma in vmbra teri,dum cogeretur:ſed ipſum potiùs ſuccum expreſſum in vmbra reponi,dum ſpiſſeſceret, Dioſcoridem voluiſſe tam certum eſt,quàm quod certiſſimum.

Cap. cxxxi. *καὶ μετὰ τὸ ξυρασθῆναι*] Pliniū ſecutus ita cōuerti: & poſtquam inaruerint corpori,frigida abluuntur.Ilius enim hæc ſunt verba,lib.21.cap.19. *Diapaſmata inde fiunt ad ſudores cocrendos, tum ut a balineu mareſcunt corpori, dein frigida abluantur*. Et hoc ipſum Græca Dioſcoridis manifeſto ſonare videtur:quaſi velit, roſeos paſtillos, ſiue corpori aſpergantur, ſiue illinantur à balneo,vbi exaruerint,frigida elui. Ruellius aliter: poſt roſcorum paſtillorum vſum,vbi inarue-

rint à balneis corpora, frigida voluit ablui. Autoris méte vter fœlicius assecutus sit, vnusquisq; iudicet. Cæterùm cùm in Græcis quotquot hactenus occurrêre codicibus ἀμφοτέρων legeretur manifesto errore, ἀμφοτέρων reponendum iudicauimus.

CAP. CXXXII. πυκνή, πυκνήν] Sic legit Serapio: attamen Oribasius πυκνήν, hoc est, latas, legisse videtur: atque sic etiam in codice Palatino habetur. Plinius quoque lib.12 cap.7. de hac ipsa spina verba faciens, radicē eius latam lignosamque & buxei coloris esse prodidit. Sic rursum paulò pòst κατὰ τὸ, ἐπὶ φύσιν καὶ ὧς &c. ἐπὶ ῥίζων, seu potiùs ῥιζῶν καὶ τῶς, &c. legit Oribasius, itémque Ruellius: & hanc quidem lectionem magis probasse videtur Plinius, lib.24. cap.14. Coquuntur, inquit, in aqua tusi rami radicesque, &c.

ἄκανθα φύτου] Arbor hæc ἄκανθα dicta, simpliciter ἄκανθη seu ἄκανθος Theophr. lib. hist. 4. cap. 3. ex eo dicitur, quòd tota arbos aculeis horreat, excepto caudice. Eidē verò lib. 9. c. 2. cū adiūcto ἀκάνθη Αἰγυπτία, hoc est, spina AEgyptia cognominatur. Plin. itidē lib. 13. c. 9. spinam AEgyptiā vocat: at lib. 24. cap. 12. Acaciæ spinam, eámque duplicem facit, albam inquam & nigrā: id quod de arboris eiusce materia varia scripserat Theophrastus non satis, opinor, assecutus. Eiusdem enim arboris materia quæ priùs candida fuerat, vetustate nigrescere potuit atque indurari, adeóque putredini magis obsistere, quod & plerisque aliis lignorū generibus accidit. Gal. 6. simpl. eiusdē arboris meminit, Acaciæ nomine. Enimuerò quam non ita multò pòst spinam AEgyptiā appellat, eadem est cum Dioscoridis Arabica, herba scil. è carduorum genere, de qua lib. 3. Atque illud Aëtio erroris causam præbuit, vt quo loco eiusdem spinæ AEgyptiæ vires ex mente Galeni tradit, ex eadem præparari solitam Acaciam minùs rectè adiecerit.

ὁ λοβὸς] Folliculos Acaciæ, κεράτια ἀκακίας appellat Gal. lib. 1. de comp. med. κατὰ γένη. vti & ipse Dioscor. lib. 1. cap. ad differentiam τῶν κερατίων simpliciter dictorum, hoc est, siliquarū arboris Ceratoniæ.

ξηραινόμενον ὑπὸ σκιᾶ] Orib. ὑπὸ ἡλίῳ, ad Solem. Sic etiam Plin. lib. 24. cap. 12. *Spissatur succus ex folliculis aqua cælesti perfusis: mox in pila tusis exprimitur organo: tunc densatur in sole mortariis in pastillos. Fit & ex folio per se minùs efficax.* Sed quem succum Dioscorides è solo semine videtur exprimere, ille apertiùs è folliculis simul & semine exprimit: quanquam & vox κάρπιον, qua vtitur Dioscorides semen cum suo pericarpio complectitur.

τὸ ἐπίπαν ἐρυθρόν] .i. qui modicè fuluus rufúsve est. Nam qui valdè rufus est, vti & qui nigerrimus, Plinio improbatur.

κόμμι δὲ ἐκ τῆς ἀκάνθης] Theophr. lib. 4. hist. cap. 3. gummi tradit è spina AEgyptia vulnerata manare, nec non etiam sponte ac citra scarificationem gigni. Id genus gummi Marcellus Empiricus acanthinum cognominat. Gal. 7. de comp. med. κατὰ τόπους, Thebaicum: fortè quia eius arboris ingens esset sylua in Thebæo agro, vti testis est Theoph. loco citato. Serapio Arabicum nuncupat: quanquam à vulgari nostro Arabico, quod veriùs est variarum arborum miscellaneum gummi, omnino discrepat.

κωλύεται δὲ καὶ ὑπὸ τῶν ὑφ'.] Lauatur succus, vt acrimoniam seu potiùs vehementiorem astringendi vim deponat. Sic enim imbecillior ac minùs mordax redditur, vti docet Gal. 6. simpl.

τερεβινθίνου μὲν ὕδατος] Forte τερεβίνθου: sic enim aptiùs ad χαλὸν referetur: aut etiā τερεβίνθῳ, quemadmodum quod posterius est, ἀμυγδάλῳ, siquidem ad Acaciam referre malueris.

ὁ αὐτῷ χύσει μετὰ κηρίνου] ἀφεψήσεως mentem Autoris reddere conatus sum. Viderint alij, an rectius eum succū fictili nouo inditum vri debere intelligendum sit in fornacibus, in quibus & ipsæ tegulæ, aliáque id genus opera fictilia percoquuntur: an verò etiam vri eundem in noua olla, quę tegula obducta operculatáve fuerit.

ὁ Καππαδοκικὸς] Hoc ipsum est Acaciæ genus in Galatia genitum, cui Galatico cognomen apud Plinium. Et certè quidem Galatiæ regio ab Oriente Cappadociæ, à Septētrione Ponto EVxino vicina est.

ἔκκειται φακοῦ] *Semen omnium* scribit esse Plin. lib. 24. cap. 12. *lenticulæ simile, minore tantùm grano & folliculo:* quasi vtrunque Acaciæ genus simile haberet semen lenticulæ: sed fortassis eo loco pro *omnium*, *huius* legere satius fuerit, vt de Galatico intelligatur, cuius postremò meminit.

CAP. CXXXIIII. Τὸ χρῖσμα] χρῖσμα malim, vt aptiùs τῷ ὑγιάσματι respondeat. Cæterùm κατὰ τὸ, καὶ ἐμφατίκῳ, ex fide vetusti exemplaris καὶ ἐμφατίκῳ, cum Cornario legendum censui. Sic quoque Plinius & Serapio legisse reperiuntur.

CAP. CXXXV. διύουσι δὲ ἐχὶ θερμαντικὸν] Sic Gal. lib. 6 de simpl. medic. facult. Viticem calidum & siccum esse prodidit etiam in tertio excessu. Cōtrà verò lib. 1. de alim. facult. Viticis semē corpori siccans & refrigerans alimentū præbere cōceptis verbis asserit: quo certè quidē loco mēdum subest, vt ex Aëtio 1. Tetrab. ser. 1. eadem Galeni verba repetente & emendante licet colligeretur saltem refrigerare viticis semen eatenus dicendum est, quatenus veneris impetus inhibet. Sed rursum 2. περὶ τίνων cap. 1. Viticem moderatè refrigerare, atq; adeò, ex Archigene, nonnullis aliis permistum dolori capitis à causa calida oborto conuenire innuit. Rectiùs igitur de virentibus Viticis foliis hæc accipiēda dixerim, quippe cùm prædominantis humiditatis ratione non vsqueadeò calfaciant: maximè verò si cum lauri foliis suapte natura calidissimis conferantur. Adde quòd quoniam longe tenuissimarū sunt partium, æquè ac alia quotquot sunt ἀνθεμωδῶν, facilè eorum quibuscum permiscētur, siue calfaciant siue refrigerent, vim exacuunt & adaugent.

ἀκόπτεται δὲ καὶ ὑφαλῶς] Sic ἄγου καρπὸν ὑφαλῶς ὑπαρχὸν, asserit Gal. 6. simpl. At contrà 1. de facultat. nat. de eodem semine agens, ὑφαλῶς δ' ἐχ ἀκόπτεται, καθάπερ ὁ ναρκίσσος. Pugnantia hæc loca facile fuerit cōciliare, si fateamur tentare quidem caput Viticis semen, vti reipsa facit, at nō quantum cannabis. Illic enim simpliciter agitur de Viticis semine, hîc verò cum cannabis semine comparatione facta.

CAP. CXXXVI. αἰσυμνήτου τὰ πρὸς ἕλκη] Idem de Salicis foliis tradere videtur Plin. lib. 24 cap. 9. his verbis: *Folia austera & potu intemperantiam*

libidinis excernat: atque in totum auferunt usum seminis sumpti. At lib.16.cap.26.idipsum semini tribuit, cùm scribit, *Salicis semen mulieri sterilitatem inducit, testiculis mentum esse*: quibus verbis aliud nihil innuere voluit, quàm sterilitatem inducere. Fieri verò etiã potuit, vt Salicem ἀκαλήφην, hoc est, frugiperdam, dixerit Homerus, non tantùm quòd ocyssimè semen amittat, antequam omnino maturitatem sentiat, vti voluit Theophrastus: sed & quòd viri semen ita infœcundum reddat, vt à fœmina non cõcipiatur. Nã & μιλτοφεγγὲς semẽ humanum καρπὸς dici potest, haud secus ac mulierem grauidam ἔγκαρπον & Venerem fœcundã ὄκαρπον dixere. Cæterum Galenus & ipsum secuti Paulus & Aëtius, hoc Salicis semen, καρπὸν Theophrasto & Dioscoridi dictum, florem solùm appellare videntur, quasi seminis nomen minimè mereatur, eò quod vix vnquam ad maturitatem perueniat, & antè ipsam in araneam abeat, vti scribit idem Plinius, loco priùs citato.

ὀπαμφιδίου] Eiusmodi succi salicis, è plaga manantis excisо cortice, mentionem quoque facit Plinius, lib.24.cap.9. sed ibidem duûm aliorum succi generum prætereà meminit, nempe eius quem arbor ipsa exudat gummi modo, & eius qui detruncatione ramorum à salice destillat.

CAP. CXXXVII. δὶ καὶ μυρσίνη] Ista tum de succo, tum etiam de ipso decocto intelligenda sunt: alioqui non μυρσίνη, sed μυρίκη legendum foret.

CAP. CXXXIX. διπτοίλιος, διτόμαχος] Oliuam καλλιστάφυλον, quam alij ἀλμάδα nominant, διπτοίλιον, hoc est, aluo incommodam, esse, nimirum aluum astringere, ait hoc loco Dioscorides. Diphilus quoque Siphnius apud Athen.lib.2. eandem καλλίστην σταφυλὴν asserit. Contrà Gal.2. de alim.facult. eúmque secuti Paulus, lib.1.cap.82. & Aëtius Tetr.1.ser.2. cap.266. oliuas eiusmodi aluum subducere conceptis verbis asseruerunt. Ergo vt hos Dioscoridi concilies, dicas oportet διπτοίλιος à Dioscoride dici, non quia aluum astringant, sed quia fortassis aluo aduersentur, ventrisque dolores pariant: Vel, si (quod magis placet) priorem interpretationẽ retinueris, quæ à Galeno aliisque de oliuis eiusmodi prodita sunt, conditionaliter vera esse fatebere, si modò inquam cibis aliis etiam sine pane præsumantur, quod clarissima eorum verba manifestò testantur.

CAP. CXLI. ἐστὶ πως σκαμμωνία] Paulus AEgineta lib.7.rei Medicæ, non scammonio, sed Ammoniaco tenui, hoc est, guttæ quam vocant Ammoniacæ, assimilauit. Tu itaque videris, num ἀντὶ τῆς σκαμμωνίας, ἀμμωνιακοῦ λείπει, legendum hoc loco fuerit. Neque verò obstat quod paulò pòst subiungit Autor, lacrymam Ammoniaco similem inutilem & ineficacem esse. Nam de ea lacryma, quæ ammoniacum vulgare, nimirũ crassius, sordidius impuriúsve réferat, hoc accipiendum existimauerim.

CAP. CXLVI. ἡ μὲν ἑτέρα ὀμφακ.] Has duas Gallarum species agnoscit Gal.7.simpl. omphacitidem inquam minorem, & grandiorem alteram flauam atque fungosam, quam à rusticis non ὀπυρηνίδα, vt voluêre nonnulli, sed ὀπυρηνίδα, quasi asininam gallam, vocitari prodidit. Plinius gallæ genera, lib.24.cap.4. in solidam, perforatã: item albam nigram, maiorem ac minorem distinguit. Obiter autem annotare visum est, ne quis fortassè nominum affinitate decipiatur, à galla illa omphacitide aliud esse, quod ὀμφακὶς Paulo dicitur. Is enim lib.3.cap.de dysenteria, ὀμφακίδα ait esse, cauum illud ex quo querna glans erumpit, quóque coriarij vtuntur: βαλάνου κύπελλον, paulò antè vocauit Dioscorides, cupulam glandium Medicoum vulgus nominat. Plinio vero glandium calyx appellatur.

CAP. CXLVII. δὶ ἔτους ἐρυθρὸς] ῥοῦς ἐρυθρὸς siue μαγνησιὸς & ῥοῦς βορεοδύκιος diuersi non sunt frutices, quemadmodum voluêre nonnulli, sed eiusdem fruticis partes diuersæ, diuersis dicatæ vsibus. Nam fructum rubentem coqui olim pro sale obsoniis aspergebant, & is quidem inde ῥοῦς μαγνησιὸς nomen inuenit: foliis verò ac reliquis arbusculæ partibus coriarij ad concinnanda perficiendáve coria vtebantur: vnde & frutex ipse ῥοῦς βορεοδύκιος Græcis dictus est.

CAP. CXLVIII. ὁ τῆς Ἀραβικῆς μυροβαλάνου] Mirari satis non possum, Arabicæ myrobalani descriptionem à Dioscoride prætermissam: cùm tamen ex ea, tanquam suis nota & vsitata temporibus, hoc loco similitudinem desumat. Meminit & myrobalanorum Autor lib. de plantis, qui Aristoteli inscriptus est, circa finem lib.2. dum earũ acerbitatis causam reddere nititur.

πῶμα δὶ αἴγυπτ.] Fortè πῶμα legendum, seruata analogia, ἀπὸ τῆς πώματος: quanuis etiam πῶμα pro poculo aut potione interdum, sed rarius vsurpari non ignoro. Sic verò dicebatur decerptus paulò antè quàm matureſcere inciperet Palmæ fructus, seu βάλανος, quòd potionis vicem præstaret: siquidem gustatus sitim arcere comperiebatur. Qua quidem ratione idem ipse Plinio & Solino ἄδιψος etiã vocatus est: quãuis id nominis AEgyptiæ Palmæ propriè tribui solitum agnoscant. Nam & AEgyptiæ seu Thebaicæ Palmæ ad sitim sedandam præferebantur, autore Plinio, lib.23 cap 4. Quòd si πῶμα, quasi pomum Latinorum, dictum velis qualencunque φοίνικα seu Palmæ fructum, quòd ei sit natura non minùs pomi quàm vuæ, nihil equidem repugnauero. Nam & eiusmodi fructum pomum racemosum nominat Plinius, lib.13. cap.4.

αἱ δὶ φοινικάλαστοι] Tum ex Interpretum consensu, tum & ipsa rei necessitate vocem ἀπαλαὶ adiicere placet, vt recentes siccis opponantur. Sic etiam Plinius, lib.24. cap.4. *Palmæ*, inquit, *inebriant recentes, capitis dolorem afferunt: maiùs siccæ*, &c.

CAP. CXLIX. αἱ δὶ Θηβαΐδες] Palmulas Thebaicas, ita dictas quòd in Thebaide nascerentur, sunt qui existimarint Officinarũ esse Tamarindos, quos ab acido sapore nonnulli ὀξυφοίνικας vocant. Sed reuera à reliquis Palmarum generibus haudquaquam differunt, nisi quòd, ipso etiã Strabone teste, lib.Geogr.17. omnium censentur optimæ ac suauissimæ, & inter eas maximè quæ Caryotæ dicuntur. Quin neque hoc caput à proximè præcedenti distingui debuit.

μετὰ ὑδρομέλιτος παλαιοῦ] Ex hoc loco coniicio fortè legendum apud Plin.lib 23. cap.4. *suetum decoctarum antiquo cum hydromelite dabant ægris ad*

aures recreandas, &c. etsi in nostris exemplaribus legamus, *pro hydromelite*.

CAP. CL. περικάλυμμα δὲ] Huiusmodi τηλία, seu ἀπὸ θλάω, nominat Paulus ἀφ' οὗ ἐστὶ ἐσθίειν, ἀμφίσπασμα τῦ καρποῦ ἐν φοινικίῳ, hoc est, *fructum emascentem ambiens operimentum* Galenus verò, 8. simpl. τὸ ἐξ ἀμφίσπασμα φοίνικος, quo loco ἀφίσπασμα deprauatè legitur. Archigenes apud Gal. 2. ἀφ' οὗ πίνεις, eandem σάρκινον appellat, quam quidem vocem obscuriùs exponit Hesychius, τὸ ἐπ' ἄκρῳ τῦ φοίνικος φλοιώδες ὑμένιδιον, hoc est, *quod in summa palma corticosum nascatur* Porrò etiam apud Dioscor. τηλία nomine, non tantùm eiusmodi tegumentum, palmæ corticem Plinio & Columellæ dictum, significari, sed fructum quoque ipsum eo cortice inclusum, quæ sub finem capitis habentur ipsius verba manifestò testantur. Sed & alia ab his diuersa significatione τηλία vocem vsurpauit Galenus, loco citato, dum τὸ ἁπαλὸν ἐν τηλίᾳ τῦ φοίνικος, hoc est, *palmæ tenellum germen* esse voluit. Cum eo sensit idem Hesychius, τηλία τῶν, explicans, φοίνικος τὸν περὶτὸν ἄκρον. Hęc obiter, Lector, annotata volui, vt Galeni τηλία à Dioscoridis elate aliud esse intelligeres.

καὶ τὸ ἐγκάρδιον δὲ] ἐγκάρδιον σπέρμον vocat hoc loco Dioscor. trunci quasi corculum seu medullam, quam συνωνύμως Theophrastus καρδίαν, μύελον seu μυελὸν appellare consueuit. Neque verò sunt audiendi, qui in palma ἐγκάρδιον τὸ σπέρμον, cum ἐγκεφάλῳ idem esse voluerint: quamuis ipsi ἐγκεφάλῳ suum etiam ἐγκάρδιον esse non negauerim. Galenus siquidem, 2. de alim. facult. φοίνικος ἐγκέφαλον vulgo appellari ait, τὸν περιφυῆ φοίνικος, palmæ videlicet turionem seu summitatẽ, quam etiam cibi fame à nonnullis esitari ibidem commemorat. Idem 4. simpl. ἐγκέφαλον interpretatur, τὸ ἀνώτατον μέσον τῦ φοίνικος. i. *summam partem palmæ*. Libro verò de atten. vict. rat. tenerum germen, quod è summa ipsa planta producitur. Sic Plin. lib. 13. cap. 4 *humilium palmarum* (quas ipse *chamæropas*, Dioscorides χαμαίζηλους, Theophrastus χαμαιρριφεῖς cognominat) *dulcem* ait esse *medullam in cacumine, quod cerebrum appellant*.

CAP. CLI. ἄκνημος, ἄτροφος] Non videtur id esse boni succi, in quo alimenti nihil est, aut certè quàm minimũ, veluti ἄτροφον voce hic designare videtur Dioscorides. Quare, dicat aliquis, Punica ὄχνημα & ἄτροφα simul & semel esse vix possunt. Ideò verò ὄχνημα, pro eo quod sapidum saporéve iucundo est, accipiendum hoc loco putauimus. Attamen etiamsi vulgatam ἀχύμου significationem retinere quis malit, nihil impedit, quominus Punica, quanuis suapte natura ἄτροφα, ὄχνημα quoque esse possint. Est enim, teste Gal. ἀχύμου duplex differentia. Ex his siquidem alia sunt quæ portionẽ quandam boni succi ad alimentum apti continent, sed recrementi plurimum: alia sat multum habent quod nutrire possit, minimum autem quod sit inutile. Priore igitur illo modo ὄχνημα dici Punica, quantumuis ἄτροφα, nihil vetat.

γλυκέα. ἀκνημοτέρα] Doctissimus Cornarius legisse videtur, γλυκὺ ἀκήμους, aut γλυκήμοτέρα. Plinius certè quidem, lib. 23. cap. 6. Punica eadem dulcia stomacho inutilia dixit: Ex *his*, inquit, *dulcia, quæ apyrena alio nomine appellauimus, stomacho inutilia habentur, inflationes pariunt, dentes gingiuásque lædunt*.

λεπτὰ μὲν ἐμπίπτων] Sic Hipp. lib. 2. περὶ διαίτης, quo loco περὶ τῦ ὕπνου agit, quas quidem ἀσάρκους aliàs appellat: ῥοιαὶ, inquit, γλυκεῖαι ὀχλοποιέουσι. ταχυπόρους δὲ ἢ ἧσσον. αἱ δὲ οἰνώδεες τῶν ῥοιῶν, ἧσσον ταχυπόρους. αἱ δὲ ὀξεῖαι, ἀκυμοτέραι, αἱ δὲ πλείους πάντων εἰσίν, hoc est, *Dulces Punica suæ alui onerat: sed quiddam æstuosum habet. Quæ verò Punicæ minoso sunt succo minus æstuosa sunt. At acida, magis refrigerant. Omnium autem nuclei alui sistunt*.

τῶν πυρίων ὑφ.] πυρίων χυλὸν ἀλείμμα vertimus hoc loco, succum ex granis seu acinis expressum. Nec enim erat verisimile, ex solis acinorum nucleis quantumuis recentibus succi vel tantillũ elici posse. Πυρῖνα fateor proprièe, quẽadmodum paulò antè vsurpauit Dioscor. lignosum esse ipsius acini nucleum, quem Gal. 8. simpl. de Punicis agens γηράσαι nomine designauit, his verbis: τὸ γήρασμα τῦ χυλοῦ εὐπεπέστερον, quo loco acinos perperã vertunt Interpretes, cùm semina nucleósve potiùs reddere debuissent: quanuis Plinius quoq; minùs propriè de mespilorum nucleis verba faciens, lib. 15. cap. 20. quorundam mespilorum acinos molliore ligno esse dixit. Attamen orationis series πυρίνων nomine hoc loco ipsos acinos vnà cum nucleis significari satis indicat. Sic Plinius quoque, lib. 23 cap. 6. quo loco hæc eadem Dioscor. verba reddere nititur. *Acinus detracto cortice tusis, succóque decocto ad tertias*, &c. Aliàs lignosus acini nucleus πυρῖνος nomine debet intelligi: vti cùm apud Theophrastum & Plinium duo Punicorum genera statuuntur, ἀπύρηνον & nucleos habentium. Etsi verò Apyrena cum dulcibus cõfundere videtur Plinius loco modò citato: attamẽ in vtroq; illo genere & dulcia & acida atque etiam dulcacida reperiri, nõ est quòd quisquam dubitet.

CAP. CLII. ἀχύμου καλουμένη] Itidẽ Galenus 6. simpl. satiuæ Punicæ florem ὄχνον appellat his verbis: βαλαύστιον αὐτὸς ἀγρίας οὐ λέγει, εἶτα τὸν τῆς ἡμέρου ὄχνον, hoc est, *balaustia syluestris Punicæ flos, non satiuæ cytinus*. Sed lib. 6. de comp. med. κα. τ. primum fructus quasi rudimentum, quod primũ etiã mali Punici partũ nominat Plinius, ea voce designari apertissimè docet, hisce verbis: ὀνομάζονται δὲ κύτινοι αἱ πρωτόγονοι ῥοιαί. καὶ ὁ ὀρχὸς αὐτοῦ πάντως τὸ διάφορον, καρπὸς αὐτῆ φαίνεται χοιραδώδης εἰς ἰδέαν ῥοᾶς, hoc est, *Nominantur autem Cytini, primogenus Punicæ: nam quo tempore arbor florere desinit, eius fructus figuratus apparet in speciem Punici mali*, &c. Cor. Celsus cytinos eiusmodi, tollendæ οἰνωνύμιας gratia, inali Punici capitula nominare solitus est. Cælius AVrel. lib. 4. tard. cap. 3. & l. 5. c. 2. Punici caducum, quod Græci κύτινον ῥοᾶς appellant, cum Latinis Ampullagium vocat. Sed fallitur, cùm id genus capituli caducum dixit, nisi fortè idem voluerit quod Theoph. lib. 2. de ca. plant. facilè decidere ante maturitatem, tũ ob debilem adhæsionem, tum quia, quòd calycis sit figura, cœlesti humore facilè occupetur. Alioqui enim flosculi soli ab eo erumpentes decidunt decutiuntúrve: manet verò ipsum capitulum, quo semen concipitur, ceu futurum ipsius pomi tegumentũ & inuolucrum.

CAP. CLIIII. βαλαύστιον δὲ αὐτὸς] Tum cytini, tũ balaustij nomina, aliter ac Dioscorides, accepit Plinius, lib. 23. cap. 6. Siquidẽ tam satiuæ

quàm ſylueſtris Punicæ florere incipientis *deſinentem*, legendum ſuſpicatur Cornarius) primum partum, Cytinum vocare videtur: balauſtiũ verò, floſculum vtriuſque, antequam malum prodeat in ipſo erumpentem cytino.

CAP. CLV. *αἱρεῖ πλείω &c.*] Sed & coronam myrteam, meri vapores inhibere ex ſententia Philonidis teſtatur Athenæus, lib. 15. ibiúmque cur ea *στεφανῖτις* dicta ſit, longiore ſermone proſequitur.

ἐγκαθήκουσι τῷ μύρῳ.] Aptiùs fortaſſe, vti paulò pòſt: *εἰς ἐγκαθήκουσι τῷ μυρῷ περιλαμβάνει καὶ διατηρεῖ, καὶ ῥώννυσι δραστικῶς, &c.* Cæterùm inferiùs, pro *τὰ πυρηνώδεα*, rectiùs videtur Interpretes legiſſe, *τὰ λοιπὰ πάντα.*

CAP. CLVI. *αἱ δὲ χῖραι αἱ τῶν μυρσίνης σφόδρα*] Galenus 8. ſimpl. quæ non tantùm in myrti trunco ſtipitéve, ſed & in eiuſdem ramis eminens appendix eſt, *μυρτίδα* vocat, quo loco hæc ſunt ipſius verba: *ἡ δὲ στυπτικὴ καὶ ταῖς κλάδοις μυρσίνης ἐπίφυσιν ἔχουσιν, ἣν ἔνιοι μυρτίδα ὀνομάζουσιν.* Paulus AEgineta, lib. 7. hanc eandem appendicem *μυρτίδα* nominat, mendosè fortaſſis *αἱ τὰ, μυρσίδα* vel *μυρτίδωνα. Μυρτίδες* enim ipſæ myrti baccæ dicebantur, quæ nominibus aliis *μύρτα* & *μυρσία* nuncupantur. Porrò myrtidanon aliud fuiſſe videtur Hippocrati, 2. de morb. mul. vti etiam monuit Galenus in Gloſſ. nimirum in Indici piperis à Perſis vocati genere quod rotundum eſt ſiue à myrti forma nomen id ſortitum fuerit, ſiue quia, teſte Plinio, myrti baccæ piperis vicem obtinebant apud antiquos, antequam piperi reperiretur. Cæterùm & alia quoque ab his omnibus diuerſa ſignificatione Plin. lib. 14. cap. 16. myrtidanum appellat, vinum è ſylueſtris myrti baccis confectũ: de cuius vſu eadem tradit, quæ Dioſc. de ſuo myrtidano, trunci myrti appendice.

CAP. CLVII. *Κεράσια δὲ αἱ μὲν χλωρὰ*] *χλωρὰ* vertimus recentia: *ξηροῖς* enim ſiue *ξηραινόμενα* opponi hoc loco videntur, vti paulò poſt, *τὰ ὀπτὰ τῶν πυρίων*, ſiue *πυρηνῶν.* Sic Plinius cùm de ſiliquis agit, *τὰ χλωρὰ* Dioſc. *recentia* interpretatus videtur. Porrò Latini viridia quoque ligna & plantas virides dicunt, quæ nondum aruerunt. Ac Plin. etiam lib. 23. cap. 6. *cydoniorum flos*, inquit, *& viridis & ficus*: quo loco viridem pro recenti vſurpavit. Cæterùm Gal. AEgineta cæteríque Græci Medicinæ Principes, rectiùs aliter Ceraſiorũ facultates à ſapore diſtinxêre. Quoniam enim triplex eorum cernitur differentia, dulcia ſtatuunt magis aluum ſoluere, ſed ſtomacho minùs grata eſſe: acerba, aluũ ſiſtere ſtomachóque vtiliora eſſe: acida denique ob eam quam habent incidendi vim, pituitoſo excrementíſque redundanti ſtomacho apprimè conuenire.

ὠφελοῦσι δὲ καὶ ἀλύσσοντας] Gal. 7. ſimpl. gummi quidem Ceraſorũ arteriæ fauciúmve aſperitati conuenire aſſerit: at calculoſis proſit necne, addubitare videtur.

CAP. CLVIII. *τὰ δὲ τῆς συρφύλου συκάμινα*] Locus hic hauddubiè depravatus eſt: necdum tamen mihi ſatis compertum eſt, quomodo reſtitui rectè poſſit. Pleriq; Græcas haſce Siliquas, non minùs quàm vuas ollares, & oliuas quoque ipſas, in vinaceis condi componíve, quò diutiùs tutiúſque conſeruentur, atque de Siliquis eiuſmodi conditiuis hîc agere Dioſcoridem exiſtimarunt. Sed non ſatis video, quamobrem ex inſtratis eo modo vinaceis Siliquæ ciendæ vrinæ vim ſibi aſciſcerent. Andreas Lacuna legendum cenſet, *εἰ ἀπὸ τῆς συρφύλου τὰ σύκαμινα*, quaſi tum demum vrinã ciere Siliquas voluerit Dioſcorides, cùm earum pulpa ſeu medulla præduicis ſola manditur, reiectis nimirum internis granis ſeu ſeminibus, ac etiamnũ cortice: quo modo congeneris plantæ, caſſiæ nigræ ſeu *ἀκακίας*, quæ & AEgyptia Siliqua dicitur, ſolam medullã ſeu pulpam vſurpamus. Plinius certè quidem, lib. 15. cap. 28. cùm in pluribus ſemina placeant, in Siliqua damnari prodidit. Fortaſſis etiam ad differentiam cuiuſdam Siliquarum generis, quod ſeminis granorúmve expers fuerit, tale quid pronuntiare potuit Dioſcorides. Serapio interpretatus videtur, *Siliquas quæ muſto aut ſapa condiuntur*: quod minùs certè placet. Enimuerò *συμφύλων* quidem nomine non tantùm muſti reliquias, hoc eſt, vinacea oleatúmve nucleos, ſed & *τὰ αὐτῶν ἐκπιεσθέντα*, ſeu *τὰ περὶ λάνδανα*, hoc eſt, ſolida retrimenta quæ vuis oleíve torculari expreſſis reliqua ſunt, ſignificari teſtantur Galenus & Athenæus: vnde & analogia quadam ipſa quoque Siliquarum ſemina & earundem tuſarum expreſſarúmque reliquiæ ſeu retrimenta intelligi poſſe videntur. At verò *σύμφυλα* Græcis pro multo ſapáve accipi nuſquam, quòd ſciam, obſeruatum eſt.

CAP. CLX. *δυσεντερικοῖς καὶ ἐμπνευσικοῖς*] Marcellus non *ἐμπνευσικοῖς*, ſed *αἱματιδιακοῖς* in antiquioribus codicibus legi refert. Et ſic quoque ex Serapione & Plinio, lib. 23. cap. 7. legendum videtur. Hic enim de cotoneis verba faciens: *Cruda*, inquit, *dumtaxat matura, proſunt ſanguinum excreantibus ac dyſentericis, cholericis, cœliacis*, &c.

τραχεῖα καὶ μικρά] Plin. lib. 5. cap. 11. *Minora*, inquit, *ex Cotoneorum genere ſtruthea odoratius ebriãt, ſerotino prouentu*: quo loco niſi fortaſſe mendum ſubeſt, quæ minora ſunt Cotonea perperã ſtruthia nominat: nam & Gal. 2. alim. quæ *στρουθόμηλα* vocat, Cydoniis eſſe maiora fatetur.

ὑδαρὲς δὲ ἰσχνὸν] Eodem ſpectare videtur Gal. 2. de alim. dum qui è Cydoniis elicitur ſuccum minus quidẽ quàm qui è ſtruthiomelis ſuauem, ſed maximè aſtringentem eſſe prodidit.

CAP. CLXV. *Βερικόκκια δὲ καὶ μηλάκουα*] Armeniaca tamen & præcoqua diuerſa fuiſſe videntur ex Gal. ſententia: qui quidem 2. de alim. fac. præcoqua facit Armeniacis præſtantiora.

CAP. CLXVI. *Μηλέαι δὲ Περσικαὶ*] Hæc mala Medica, quæ à vicinis etiã locis Perſica, & Plinio Aſyria dicuntur, Athenæo quoque *χρυσόμηλα* & *ἐσπερικὰ* nuncupantur. Eiuſmodi malum *μῆδον* ſimpliciter Nicander appellauit, cuius Scholiaſtes interpretatur, *τὸ περσικὸν, Μηδικὸν μῆλον.*

καρποφορεῖ δὲ ὅλον τὸν ἐνιαυτόν] Sic Theop. lib. hiſt. 4. cap. 4. de malo Medica ſeu Perſica: *φύεται δὲ τὸ μῆλον πάντα χρόνον. Τὰ μὲν γὰρ ἀνθεῖ, τὰ δὲ ἄνθη ἐστί, τὰ δὲ ὠμά ἐστιν.* Huius Interpres Plin. lib. 12. cap. 3. *Arbor ipſa*, inquit, *omnibus horis pomifera eſt, aliis ardentibus, aliis maturescentibus, aliis uerò ſubnaſcentibus.* Palladius quoque in Martio menſe, *per gradus quoſdam in hac arbore ſibi ſemper poma ſuccedere dixit, cum matura ſe acerba ſubſtituant, acerbarum*

nerò etiam florentia consequantur, orbem quendam continua fœcunditatis sibi ministrante natura. Cæterùm sub finem capitis, pro ὀπτιδίφυλλα, legendum iudico ὀπτιδίφυλλοι, nempe οἱ μῆλοι.

CAP. CLXVIII. ἐπὶ δὲ αὐτοῦ συνῆψεν] Vel delendum hoc, ἐπὶ, vel reponendum deinde, ἀντὶ γίνεται, ne quid in constructione Grammatici desiderent.

CAP. CLXIX. πεχαιάδη] Parisi codex habet, πεξαιάδη. Andreas Lacuna in vetusto quodam codice, ἐξαιάδη, legi testatur, & sic quoq; plerique alij legendum censuêre. Vtraque porro lectio tolerari recte potest: siquidem, quod voluêre nonnulli, πεχαιάδη & ἐξαιάδη eiusdem plantæ sunt nomina. Nos ambiguitatis tollendæ gratia, foliis oxyacanthæ esse diximus. Theophrastus lib. 3. cap. 12. folium habere scripsit μαλοειδὲς (sic enim legendum videtur) καὶ ἐν ἄκρῳ πεπλατυσμένης. Et certè quidê tum Mespilum Aroniam, tum & oxyacantham, foliis esse constat apij in modum incisis.

αὐτὸ ἀναμένειν] Fortè αὐτὸν. Nam ad præcedens illud καρπὸν referri debet. Alioqui generis est enallage, referrique debet αὐτὸ ad subintelligendum τὸ μόσπιλον, qua quidem voce & arbor ipsa, & arboris fructus significatur.

κατὰ τὴν τηγανίτιν] Contra censuit Theophrastus, lib. & cap. 4. hunc fructum bonam aluum facere, nisi forte aliud est τὸ ὑπαλὲς & ὑγρὸν τῆς κατὰ τὴν τηγανίτιν ἀχλαδίου. Διόσκορος (inquit) ἐν τοῖς λωτοφάγοις γλυκὺν, ὑδαρῆ καὶ ἄσηπτον, καὶ ἐν ὑγρῷ τῆς κατὰ τὴν τηγανίτιν ἀχλαδίας. *fructus apud Lotophagos dulcis, suavis & insuscus, insuperque alvo utilis. De eodem Plin. lib. 13. cap. 7. ferunt ventres non sentire morbos, qui eum mandant.*

CAP. CLXX. καὶ ἔτερόν τινα] Theophr. lib. 3. hist. plant. cap. 12. tria Mespili genera recensens Anthedonem (quæ eadê cum Aronia esse videtur) Setanion & Anthedonoidem, quam Gallicam vocari scribit Plinius lib. 15. cap. 20. quo loco & ipse, Theophrastũ secutus, tria Mespili genera commemorat.

CAP. CLXXI. ὃ ἐπὶ τῆς τριχὸς ἐκπεσούσης] Rufandi capilli vim habere decocta Loti rameta, quæ hîc Dioscoridi λωτὸς, Galeno ῥαμνὸς dicũtur, vix alibi, quod sciam, quàm apud Dioscoridem & Serapionẽ scribitur. Roborare quidem capillos prodidit AEgineta: at eosdem eiusmodi decocto cohiberi, & Galenus & ipse Plinius (quanquam hic priuatim de Loto, Theophrasti diospyro, quam fabam Græcam appellat, agere videtur) & quotquot ferè alij de simplicium medicamentorum facultatibus conscripsêre, palàm commemorãt: ex quo & idem ipse Gal. Loti lignum colligit, astringentis & mediocriter deiccantis esse facultatis. Quare cum Cornario legendum existimauimus, ἀπὸ τῆς τριχὸς ἐκ τοῦ ὕδατος, καὶ ἐπὶ τῆς ῥαμνοῦ, nempe, τοῦτο. Quid quòd & eodem planè modo legisse videtur Serapio, dum hæc ipsa Dioscoridis verba interpretatur?

CAP. CLXXII. χλωρὸν φύλλον ἰχῶρ] Cornarius pro φύλλον, ξύλον, legendũ suspicatur. Sanè vero hanc, *sudorem* nominat Plinius, lib. 23. cap. 8. quo loco & huiusce remedij vsum variat. Etenim *Sudor*, inquit ille, *virgæ cornu arboris lamina ferrea candente excæptus, non cõtingente ligno, illitaq; modo ferrugo, maiorem lichenas sanat.*

CAP. CLXXIIII. κιτρίας σταλὶς] Rectiùs Gal. 7. simpl. Prunã Damascenã siccatã nõ aluum quidem illico sistere, sed minùs quam cætera, quæ ex Iberia importabantur, eanè subducere voluit: quoniam videlicet plurimum astrictionis habeant, vti 2. de alim. facultatibus Gal. conceptis verbis asseruit.

CAP. CLXXV. ἀνθόμηλον] Matthiolus apud Orib. legit ἀνθόμηλον, & rectè quidê: nam & Arbutum tenui præditam esse cortice satis innuit Theophrastus, hist. stirp. lib. 3. c. 16. hisce verbis: ἔστι μὲν ἐν ἄκρᾳ μίκρᾳ, κ' δὲ φλοιὸν ἔχει λεπτὸν ὡς, περαίνει δ' μικρόν. hoc est, *Est quidem arbor haud malde prærra, sed arctam habet tenuem, tamarici similem.* Ac reuera tãtùm abest tenuia vt sint Arbuti folia, vt etiã laurinis & iligneis crassiora conspiciantur. Cæterùm sub finem capitis, αὐτῶν, αὐτῆς & ἀφαλλῆς, αὐτοῦ & ἀφαλλῆ reponimus. Nam ad μήλου καρπὸν, hoc est, Arbuti fructum, ea verba referri nemo non videt.

μομμύλλα] Sic & Theoph. & Gal. Arbuti fructũ μομμύλλον appellant, vel, vti Athenæus ex variorum Scriptorũ autoritate, μομμύλιον. At Plinius lib. 15. cap. 24. alio etiam nomine, cóque *mbonoro*, vti scribit, *vnedonem* vocat. In quo faliturus: siquidem, vel teste Galeno, tum 6. sit. pi. tum 2. de alim. Italorum vnedo, epimelidis seu hamamelidis fructus est, quę quidê à Comaro seu Arbuto diuersa arbor est.

CAP. CLXXVI. αἱ σφαῖραι, μετὰ αἱμάτου λαμβανόμεναι] Goupylus ex Plinio locum hunc sic restituit: καὶ σφαῖρα ἀπαρχαὶ μετὰ αἵματος καὶ νόσημα. Caracuz. exemplar habet, μετὰ αἵματος ἀναστατικὸν. Equidem nihil immuto: duntaxat vbi alterius in Parisi codice deesse aliquid indicabat, Plinũ & Serapionem secutus addidi, καὶ νόσημα. Cæterùm in hoc ipso capite (quod quiuis vel mediocriter eruditus satis animaduertere poterat) pro ἐμπυαιματικὰ, quod legitur in vulg. excpl. legi, ἐμπυαιματικὰ: itémq; pro σφαιραμβλοειδῆ, σφαιραμβλοειδῆ: denique pro καὶ ἔχει δὲ ὀπτιδίφυλλα, καὶ ὀπτιδίφυλλοι γάρ εἰσι ἔχει, quoniã eo loco non amplius de nucibus ipsis, sed de arboris gumi fit mentio.

αἱμάτων σφαιρικὰς.] Eiusce effectus causa est, amaritudinis vis exiccans & humorẽ discutiens, vti docet Plutarch. in Sympos. quæst. 6. lib. 1. quo quidem loco refert apud Drusum Tiberij Cæsaris filium Medicum quendam, qui alios omnes subinde bibendo vincere solitus erat, antequam potaret, quinque sæpe amaras amygdalas edentem fuisse deprehensum: ac deinceps id facere prohibitum, à vino facillimè superatum fuisse, imò ne tantillum quidem ad compotationem perferendam valuisse. Idem ex Plutarcho repetit Athen. lib. 2.

CAP. CLXXX. ἡ συκαμινέα] Disiunctiuã particulã ἡ vel ἢ reponẽdam hoc loco censuimus, pro articulo fœminino ἡ, qui habetur in vulg. codicibus. Sunt enim συκαμῖνος & συκάμινος vocabula synonyma: & Athenæo teste lib. 2. quę reliqui ferè omnes συκάμινα appellant, soli Alexandrini μόρα nominãt. Sub finem etiam capitis, vbi perperam legebatur manifesto errore, μετὰ τὸν τραματισμὸν, restituimus, μετὰ τὸ τραματίσαι.

καταπλάττει] Attamen, Athenæo teste, lib. 2. Diphilus Siphnius Medicus Mora seu Sycamina asserit succum mediocriter laudabilem gignere,

parum alere, celeriter egeri & ventriculo grata esse: peculiari verò dote, ante maturitatem lumbricos expellere. Sed hoc postremum Dioscorides non de fructu immaturo, sed de radicis cortice prodidit.

ὁ ἐξ ἀυτῆ] Ita legitur in altero Goupyli codice, longè rectiùs quàm ἐξ αὐτῆς, vti habetur in vulgatis exemplaribus. Certum enim est non ex arbore, sed ex ipso pomo succú elici: è quo tandem tantopere decantata arteriace seu stomatice compositio, ἀπὸ συκάμινου dicta, conficitur. Sic & ipse Serapio de fructus ipsius, non item arboris, succo ista interpretatur.

μελαίνης σύκου] Plinius pro σύκου, φαλιᾶς legisse videtur. Is enim lib. 23. cap. 7. quo loco de Moro arbore verbà facit: *Folia*, inquit, *tinguntur capillum cum fici nigræ & uuæ ostreatis simul coctis in aqua cælesti.*

Cap. CLXXXI. ἡδὺ ἀπύρηνον] Hoc loco συκάμινον seu συκάμινον dictũ existimasse videtur Dioscoridem, quasi μῶρον σῦκον, hoc est, fatuam ficum, quòd sapore sit fatuo, ignauo, ac planè insulso, adeóque verè sit insipida. Attamen Gal. 2. de aliment. facult. nominis eam notationem palàm deridet, ac potiùs συκάμινον nomen sortitum asserit, à similitudine quam ad vtrunque mori scilicet ac fici fructum habet, ita vt in medio mororum ac ficuum meritò locari posse videatur. γελοῖον, inquit Gal. ὅταν ἡδὺ τῶν φαύλων ἀνομάζωσι τὸν καρπὸν τοῦτον συκάμινον. διὸν σύκοις ἐοίκασι μωροῖς. Sic enim nobis legendum videtur: non item μωροῖς, vt habetur in vulgatis exemplaribus, aut μωροῖς, quo modo Interpres legisse creditur.

μαλύχνου] μαύκου legunt vulgata exemplaria. Sed vetustorũ codicũ, qui μαλύχνου habebãt, lectionem magis probaui. Nam sic quoque Serapio & Ruellius legisse videtur: & idipsum etiamnum innuit Plinius: quando aliàs multo lacte, aliàs largo succo abundare ficum AEgyptiam dixit. Equidem, quod eodem spectat, μαύκου legi malim. Nam & ea ipsa dictione Theophrastus vtitur. lib. 4. cap. 2. quo loco de fico AEgyptia, quæ Dioscoridis Sycomorus est, verba faciens: μαύκου δέ, inquit, ἐν ἀνάρσοις ὀρύξαι δεῖ, &c. hoc est, *arbor ad modum largo abundat succo lacteo.*

ὄνυχι ἀνθρωπείῳ ὀνυχα pro instrumento ferreo, ab vnguis humani similitudine vngue dicto, interdum accipi iam anteà cap. de balsamo admonuimus. Et hoc quoque loco nõ pro vngue humano, sed pro ferreo eiusmodi vncino accipi debere indicant & Serapionis interpretatio, & ipsius Theophrasti verba, quæ eódem spectant. Hic enim loco mouò citato, πάθος, inquit, εἰ δυνατὸν, ἀπὸ δένδρου δένδρον, ἀλλ' ἔχοντος ὄνυχας σιδηροῦς, δένδρου ἁψασθαι. hoc est, *matures are nequit, quin sculptus fuerit: id quod ferreus præstare ungulus.* Athenæus idem lib. 2. συκάμινα, inquit, οἱ δὲ ἐπιχώριοι δένδρεσιν ἀγρίοις ἐμφυτεύουσι πάνυ, τῶν δὲ ἡμέρων τὸν φοίνικα καὶ τὸ ἀπὸ τῆς ἀκάνθου κυνόμενα· ὥστε ἀμφοῖν τοῖν καρποῖν τὸ αὐτὸ γίνεσθαι. μάλιστα δὲ ζιφύρου πνεύσαντος, καὶ ἐδώδιμα, &c. hoc est, *Sycomori seu ficus AEgyptiæ fructum indigenæ, ubi ferro leuiter sculpserint, in ipsa planta relinquunt: eundem verò mento lactarum, eá cura inter eruditum matures are, odorúsque sit ac esu iucundus, præsertimque si Fauonij spirauerint.* In eandem quoque sententiam Plinius, lib. 13. cap. 7. *Ficus AEgyptiæ pomum*, inquit, *perquam fœcundo est prouentu, sculpendo tantùm ferreis unguibus: aliter non maturescit.* Attamen cùm non sit tantopere durus pomi cortex, nihil vetat, quominùs etiam ipso humano vngue rectè scalpi possit. Siue ergo, vngue ferróve hunc locum interpreteris, siue vngue, ferreóve alio instrumenti genere, mihi susque déque fuerit. Cur verò citra scalpturam fructus eiusmodi maturescere vix possit, rationem repetas licet ex ipso Theophrasto, lib. 3. de caus. plant. cap. 2.

καρποφορῶν ἔαρος ὀψίνου] Vulg. exempl. καρποφορεῖ πυρίν. Sunt qui facilem lapsum animaduertentes, αἱ νῦν, πυρίν, ἔαρος simpliciter reposuerint. Sed vetusti codicis lectio plausibilior, quã ego secutus sum. Est porrò vero simillimus ex adulta, quàm ex nouella adhuc tenellâque arbore tantum succi emanare, vt facilè spongia aut vellere excipi possit: quippe cùm nouellæ necdum adultæ arbores vix amplius succi habeant, quàm quod ad ipsarum incrementum satis esse possit. Plinius pro πυρίν, aut ἔαρος, ὀψίνου seu ὀψινοῦ, aut quid simile videtur legisse, de matutino siue hora dici secunda mentionem faciens, lib. 16. cap. 38. quo loco id quod de Sycomoro à Dioscoride traditur, ipsi moro tribuere videtur. Sic enim ille: *Mirum, hic in moro Medici fructum quærentibus ferè hora diei secunda lapide incussus manat: aliàs fructus, fœtus videtur.*

Cap. CLXXXII. φιλύρα δὲ οὖσα] Theophr. lib. hist. 4. cap. 2. hanc Cypriam ficum aliter describit. Caudicem enim arboris cui fructus adhæreſcit, populo albæ similem facit: folium, vlmo. Quòd ad fructum, æquè ac Dioscoride scribit esse pruni magnitudine. At Plinius in hoc tantùm à Theophrasto discrepat, quòd sorbi magnitudinem illi tribuit, quasi legerit, μήλου ἐλάττου ὄντος μείζου, non, ἐλάττου μείζου.

Cap. CLXXXIII. σύκαμα, συκάμινα] Sic Diphilus Siphnius, teste Athenæo, recentes Ficus scribit paucum & prauum præbere alimentum, & innatare ventriculo. At cõtrà sensisse videtur Philotimus, apud eundem Athenæum: qui quidem Ficus humidas & maturas quouis alio fructu celeriùs coqui, faciliúsque ab ipso ventriculo superari eo probat argumento, quòd non solùm citra noxam copiosiùs quàm cæteri fugaces fructus ingerantur, sed & iis præsumptis nihil noceat consuetum & parem cibi modum adiicere. Quin & eôdem spectare videtur illud Gal. lib. 2. de alim. fac. Ficus æquè ac uuas inter fugaces & autumnales fructus principatum obtinere, minimúmque habere praui sudi.

ἴχως καὶ κνησμούς] κνησμὸς seu κνησμὸς pruritum pruriginémve significat: ac pruritus quidẽ mentionem quoque hoc loco facit Serapio. Attamen cum Marcello, ὀνειασμὸς seu ὀνειασμοὶ, lubentius lego, hoc est, *aurium tinnitus.* Nam & anteà cap. 105. & alibi sæpenumerò, cùm de aurium affectibus agitur, ἴχως & ὀνειασμὸς simul iunguntur, nec malè: quippe cùm affectus congeneres, ac propè iidem, aurium sonitus atque tinnitus vocibus hisce designentur.

μετὰ ἀμυγδάλου] Catac. codex habet, μετὰ ἀμύλου: & ita quoque Plinius ipse legisse videtur, lib. 23. cap. 7. quo quidem loco bis vnum & idem repetit. *Excipitur*, inquit, *ante maturitatem pomi, & in umbra siccatur, ad aperiẽda ulcera, sicuda menstrua,*

appoſitu cum luteo oui, aut potu cum amylo. Rurſúmque paulò pòſt de eodem ficulneo lacte verba faciens: *mulsum*, inquit, *cum amylo aperit.* Eſt autē probabilior vulgata lectio, quoniam amylum obſtruendi potiùs, quàm obſtructiones aperiendi, vim habet.

μυρμηκίαν ἕλκη, σίαν] Interpretes nonnulli, è quibus eſt Serapio, σικὸν σίαν legiſſe videntur: quaſi velit Dioſc. ſici liquorem lacteum myrmecia (hoc eſt, formicoſas verrucas, quas Plinius vno nomine *formationes* interdum appellat) cum adipe tollere. Sed ſi vulgatam lectionem retineamus, vti retinendam puto, aliud verba Græca ſonare videntur: nimirum eam quæ verrucæ circumiacet carnem priùs adipe muniendam, quàm liquor ille verrucæ adhibeatur: ne videlicet qua pollet exulcerandi vi partes vicinas exedat, latiúſque quàm par eſt vires ſuas exerat. Cornarius σίαν hoc loco, vt & alibi ſæpiùs, pro farina ſubacta accipiendum putat, quæ ſit pro tectorio.

CAP. CLXXXV. ἐρινοὶ κελαινῶν] Sic & Amerias apud Athen. lib. 3. teſtatur, ἐρίνους κελαινοὺς ταῖς ἀλιάσιν. Eſt autē ἄλιαδες apud Heſychium, τὰ μὴ πεπαιθέντα σῦκα, hoc eſt, immatura ficus, ſiue inquam eius ſit naturæ vt nunquam matureſcat, veluti caprifici fructus, ſiue perfectam maturitatem nondum aſſecuta ſit. Etſi enim ἀλιάδων vox de ficus domeſticæ immaturo fructu, qui poſt ipſa folia, parte ſcilicet ipſorū auerſa, ferè prouenit, quémque Plinius *aborsum* vocaſſe videtur, propriè effertur, vti patet ex Gal. lib. 8. ſimpl. qui τὰ ἀπὸ ἐρινεῶν σῦκα τῶν ἀπὸ ἀλιάδων manifeſtò diſtinguit: attamen ab Autoribus aliis etiam indifferenter pro caprifico ſeu ſylueſtris ficus pomo nunquam matureſcēte, haud ſecus atque Groſſi vox apud Latinos, vſurpatur. Ita & ἐρινὸς ſiue ἐρινεός, Theophr. hiſt. ſtirp. lib. 2. fici vtriuſque immaturi fructus dici videtur. Eoſdem genere maſculino Sophocles ἐρινοὺς, Dioſcorides hoc ipſo loco ἐρινοὺς appellarunt.

μικτὸν δὲ καὶ ἁλὶ κεκραδάσθω] Vulg. quidem codices omnes legunt, κεκραδάσθω, ſcil. ὀλυρίτῃ. At Interpretes omnes Latini & ipſe quoque Serapio, ficorū foliis iſta aſcribunt, non, ipſis groſſis, hoc eſt, ficis quæ nondū maturuere, ſiue domeſticis, ſiue ſylueſtribus. Ac ipſe quoq; id quaſi ſuadēte ipſa orationis ſerie, pro κεκραδάσθω, κεκραδάσθω, legendum exiſtimaui.

CAP. CLXXXVI. κινεῖν δὲ χρὴ τὸν ἐκ πυρίτου] Ita quò fœliciùs Autoris ſenſa exprimerem, ſic interpretari viſum eſt: *Cinerem plurimùm diu-liſſimeque macerari oportet.* Quoniam enim non videtur cinis acrimoniam vetuſtate aſciſcere, imò potiùs quam ab empyreumate adeptus eſt vetuſtate deponere, non placuit vertere, quemadmodum prima fronte Græca verba ſonare videbantur: ſcilicet cinerem inueterandum eſſe, quaſi quò vetuſtior is fuerit, eò præſtantior eſſet futurus.

κονίαν δὲ εἶναι πάντα] Meritò Gal. lib. ſimpl. 8. cap. de Cinere, Dioſcoridem reprehendit, quòd lixiuia omnia aſtringendi vim habere prodiderit. Nam cùm lixiuium, vt Gal. verbis vtar, ſit tantummodò ἀλκαλίωδες ὕδωρ, hoc eſt, *aquæ lotiuæ*: id certè cineris, è quo fit, naturam reſipere conſentaneum fuerit. Porrò cùm cinerum natura non vna ſit & eadem, ſed pro materiæ combuſtæ diuerſitate diuerſa, aliorum quidem aſtrictoria, aliorum verò acris & abſterſoria: & ipſa quoque lixiuia pro cineris, è quo facta fuerint, varietate varia eſſe neceſſe fuerit. Ego vero, vt ne Galeni reprehenſioni locus ſit vllus, hoc loco fortaſſe mendum ſubeſſe conijcio, & κινεῖν τὸν κονίαν, *macerari* legendum eſſe iudico.

ὀστεοκόλλῃ] Sic habent vulgatæ omnes editiones: ſed aptiùs, ni fallor, legas, ὀστοκόλλῃ: ſiquidem pulueres ſoli verius inſperguntur, quàm illinuntur. Porrò Perſeam hāc, à Perſeo Memphi ſatam, indéq; nomen ſortitā, à Perſica arbore in totum aliam eſſe, luculenter oſtendūt Theophr. Gal. atque Plinius: quanuis Nicander in alexiphar. ipſiúſque Interpretes, arborē vtrāque confuſitie, ac pro eadem accepiſſe videantur.

CAP. CLXXXVIII. ἀφὶ ἰβηρίδος] Hoc caput de Iberide, vt non legitur in pleriſque manuſcriptis exemplaribus, ita & Dioſcoridi perperàm aſcribitur: quod ipſa per ſe ſermonis diuerſitas, nec non & locus in quem irrepſit incongruēs ac planè alienus, ſatis indicāt. Adde quod hæc ipſa Iberis alio iam loco, nimirū lib. 2. c. p. 205. à Dioſcoride lepidij nomine deſcribitur. Iccirco etiam à Cornario caput hoc ad notha meritò relegatur.

καρδαμαστικὴ] Cornarius καρδαμίνη potiùs, quàm καρδαμωτικὴν, legendū exiſtimat, nō alia, opinor, coniectura ductus, quàm quod ita Aetio, tetrab. 3. ſer. m. 4. cap. 2. nominatur, ab odoris, ſaporis & figuræ quam cum naſturtio habet, ſimilitudi. c. Galenus hanc ipſam plantam aliàs ἀσπιδίον, aliàs etiam ἀγριοκαρδάμωμον, quaſi ſylueſtre naſturtium, appellari retulit, lib. 10. κατὰ τόπους. Ac idipſum quoq; teſtatur Paulus, lib. 3. cap. 77.

μῦθος ἔστιν] Ex Democratis verſibus Iambicis à Galeno citatis, lib. 10. κατὰ τόπους, itémque ex Archigenis ad Ariſtonem epiſtola, quæ extat apud Aëtium, tetrab. 1. ſer. 3. capite penult. rurſúmque, tetrab. 3. ſer. 4. c. 2. locum hūc cum Cornario ſic reſtituimus: μῦθος δὲ πικρὸν ἔστι πρὸς αὐτὸν πάντ' ἐλαφρόν. Inferiùs verò, pro eo quod habetur, ἔλαιον μετ' ἔριου, legimus, ἔλαιον μετ' οἴνου, aut etiam, οἰνέλαιον μετ' ἔριου. Ita porrò legēdum, præter antè citata teſtimonia, commonefaciunt & ipſa Plinij verba, quæ habentur lib. 25. cap. 8. *Et poſtea oleo & vino corpus perungunter*, &c. Ibidem addit Plinius ex Damocrate, quantum ad plantæ deſcriptionem ſpectat, *ſemine tam paruo eſſe, vix vt aſpici poſſit*: quòd ad vtendi modum, *radium extendentibus & articulis omnibus, mox quidem plurimùm quaternis horis, fœminas minùs dimidio adalligari oportere, rurſúmque diebus XX interpoſitis idem fieri, ſi qua admonitio doloris ſuperſit.*

IN LIBRVM SECVNDVM.

In Praef. ἴσα ἡμισεία] Fortè, ἡμισείᾳ: sensus enim alioqui vix constaret.

Cap. vi. Ἰόνια δὲ καλοῦσι] Quoniam nondum alibi, quod equidem meminerim, occurrit hæc ἰωνίων seu ἰονίων vox, adhuc incertũ est, vtrum ex sententia Hermol. Barbari κιόνια, an verò iuxta fidem omnium exemplariũ ἰόνια, legi hoc loco oporteat. Κιόνια certè quidem medias hasce partes, quasi columellas, dictas putat Hermolaus, quia iis velut columnis ac fulcris tam purpurarum, quàm buccinorũ caro & reliquæ partes innitantur. Sunt autem hæ valde torosæ, firmæ ac fibrosę, circa quas testę volumina capreolorum ritu aduoluuntur intorquentúrque. Easdem alij ἰόνια à flore purpurarum buccinorúmq; violaceo, seu ἰοῦ, hoc est, violæ colorem æmulante, ita dictas existimant: quoniam illis hæreat candida membrana venæ instar in longum protensa, florem eum continens, inter μύωνα seu papauerculum sita, quod inferiore est loco, & πρόχηλον seu ceruiculam, quæ superiore: vti palàm fecit Aristoteles, lib. 5. de hist. anim. cap. 15.

Cap. vii. ἀκτίνωτος πυχίνωτος] Sunt qui cum Paulo πραχύνωτος legãt. Nos vulgarem lectionem retinere maluimus. Nam & Plinius de Mytulis verba faciens, lib. 32 cap. 9. *Lauantur quoque*, inquit, *plumbi modo ad genarum crassitudines.*

Cap. viii. Τελλίνας δὲ καὶ κτεν.] Fallitur Athen. lib. 3. Δίων. qui Tellinas cum Romanorũ mytulis, quos μύας seu μύακας Græci vocant, easdem esse crediderit. Sic & Plinius, qui pectunculis eas tribuit cap. 7. lib. 32. quę hic a Dioscoride Tellinis ascribũtur, quasi hæ cum pectunculis eædem essent. Quandoquidem & ab ipso Hipp. 2. de diæta, hæc tria testaceorũ genera, ceu specie discrepantia manifestò distinguuntur: dum in testaceorum genere aluum maximè deiicere mytulos, tellinas & pectunculos nominatim asserit.

Cap. x. ὅμοιον τοῦ τῆς πορφύρας] Cùm purpuræ operculum à conchylij tegumento seu ostracio figura discrepare nemo non animaduertat, verisimile est similitudinem hoc loco ad tegumenti substantiam, aut vsum potiùs referri debere: aut etiam ad vires ipsas. Nam & Gal. 11. simpl. de purpurarum operculis nonnulla tradit, quæ hìc à Dioscoride Onychi seu vngui ascribuntur.

Νὶ μαγχαλίου τινὸς γεγόντος] Quanuis malabathrum quod in Indiæ paludibus gignitur anteà nonnullis odoris cognatione deceptis Indicam nardũ falsò appellari prodiderit, hoc tamen loco ex eorum ipsorum sententia nardum nominat, quod veriùs malabathrum appellare potuit. Obiter verò hoc annotandum duximus, ne quis fortassè de nardo Gangitico ista intelligenda suspicaretur. Nardũ enim illud non in ipsis paludibus, vti malabathrũ, sed apud fluminis Indici ripam tantummodò nascitur.

ἀμφότεροι δὲ δυσῶδες] Quoniam Vngues hi castorium aliquatenus redolent, ac etiamnum suffitu vuluæ strangulatu laborantes excitant, satis apparet δυσῶδη hoc loco non pro bene aut suauiter olente, sed, quemadmodum cap. de pice, & aliàs sæpenumerò, pro grauiter aut alioqui vehementer olente, accipi oportere. Cæterùm pro καλοῦσι μαλάκιον, Paulus etiam habet, καλοῦσι τὸ ἐσχάτιον. Vera verò lectio veritati magis consentanea sit, iudicium ij ferre possunt, qui conchylia esitauerint.

Cap. xii. ὅθεν ἡμέρας ξ'] Contendit Comarius legendum, ὅθεν ἡμέρας μ'. quia Ga. 11. simpl. Itémque Actius, tum lib. 6. cap. 24. tum & lib. 2. cap. 175. Cancros pauore potus periclitantibus ex rabidi canis morsu ad dies quadraginta, tanquam certum statutúmque terminum, potãdos exhibeant. Ego verò tum exemplariũ omnium communi consensu, tum & Serapionis interpretis autoritate fretus, nihil immutandum hoc loco censui. Nam & Dioscor. in Theriacis, quo loco idem hoc remedium repetit, ad rabidi canis morsum Cancros, non ad dies xl. sed ad dies quatuor, potãdos præscribit: quod ipsum totidẽ verbis refertur à Paulo, lib. 5. cap. 3. His accedit, quòd Dioscor. hoc ipso loco καυστικῶν eiusmodi cineris cancrorũ triduano potu nõ quidẽ perfectè curari, (quemadmodũ illi fortasse voluerunt) sed tantummodò manifestò iuuari asseruit: ita vt intra triduũ aliqua sentiatur vtilitas.

Cap. xiii. διείσπασον δὲ καὶ] Seruata vulgari hac lectione sic vertendum fuerat: *in eundem quoque usum testas ustas uelere reperiunt.* Attamen ex Marcelli sententia *estur* seu *esitatur*, interpretatus sum, & pro διείσπασον, διεψήσασθαι reponendum duxi, aut etiam ἐδίσθη. Et certè quidem præterquàm quòd Serapio Dioscoridis interpres ita legisse videtur, Gal. etiam lib 11. simpl. med. καὶ σκευῶν, inquit, τινὰ ἐκ τοῦ πυκνοῦ ὀστράκου ὑπὸ τῶν ἐσθιόντων λῦσαι, οἱονεί τινες δὲ καὶ ἐπὶ τοῖς ὀστρείοις ἐδιορίσαντο. Paulus quoque lib. 7. sic habet: σκέπτεσθαι χρεὼν οἷσις ὄστρακα, ἢ ἐπὶ τοῖς βρωθεῖσι. Βοηθήσει τῆς ἰδίας πλησμονῆς γαστρί.

Cap. xvi. κνησμοὺς ἐρεθίζοντας] Pruritus hos, quos solo contactu inducit Scolopendra (*centipedam* vertit Gaza) luculenter exprimit Aristot. de Scolopẽdris agẽs, 9 de hist. animal. hisce verbis: περὶ δὲ σκολοπένδρας ὅτι μὲ ἅψασθαι ἔλαττον τὸ σῶμα, ἀκέντρου καὶ καλούμενα κνίδαι. hoc est, *ore quidem minimè mordent, sed tactu totius corporis, uelut quæ urticæ dicuntur.*

Cap. xviii. μυθώδης γὰρ] Fabulosum esse vult Dioscor. quod præcipiebatur superstitiosè nimiùm, vt certa mensura, nimirum quaternis vtrinque digitis, amputarentur Viperæ, quia fortasse non tantùm de paruis Viperis, quãtum de magnis præcidi necesse sit. Et tamen illud studiosè perpetuò à veteribus olim obseruatum fuisse constat. Sed neque Dioscor. penitus damnare videtur quaternũm vtrinque digitorum resectionem, imò potiùs rationem, qua mouebantur prisci vt id facerent. Cùm enim & caput & caudam in totum præcidi oporteat, quia partes exacrnes sint: illi tamen quaternũm vtrinque digitorum mensura ideò potiùs præcidebãt, quòd existimarent vtrobique subesse veneni vim maleficam: licet in cauda nihil tale delitescat. Etsi enim Galenus lib. de Antid. 1. caudã ob frequentem motum sordidum humorem magis quàm reliquum corpus attrahere prodiderit: & is ipse tamen 11. simp. citra rationem amputari caudam liberè pronuntiauit.

τὸ δὲ λοιπὸν] Paulus addit, ἀφαιρήσεται δὲ ὀπὸς. pro quo habetur apud Plinium, lib.29.cap 4. *exempto interanea*: quæ quidem verba Dioscoridis Interpretes omnes non malè de suo adiiciunt.

σῆπας ἥκιστα] Ait Marcellus in quibusd am codicibus legi, μὴ ἥκιστα quę lectio probabilior est. Et reuera quidem Gal.11.simpl. Vipernarũ carnium esu recrementa corporis ad cutim protrudi asserit: quod si ita est, quin ex earum esu procreentur pediculi, nemini dubium esse debet: præsertim vero in iis qui prauorum succorum copia redundant. Sic quoque Plinius lib.29.cap. 6. *Viperæ*, inquit, *pediculos è toto corpore expellit, pruritúsque etiam summæ cutis*, &c.

σῶν ἀσπαλάκων] Siue ἀσπαλάκων legas, siue ἀσπερμίων, parum certè interest. Nam & malabathrum & spica nardi, inter ea quæ stomachũ iuuant medicamenta sunt antè recensita. Galenus itidem 11. simpl. viperinas carnes ait. ἀσπαλακώδεσι δὲ ἐοικυῖαι μᾶλλον εἰς ἡδονὴν ἄγουσι, hoc est, *salibus permisceri ad suauitatẽ apparatus*. Addito verò malabathro aut etiam spica nardi, quin tum saporis tum & odoris ratione maiorem cum palato ineant gratiam, nemo profectò dubitauerit. Equidem hac ductus ratione cum plerisque Interpretibus, ἀσπερμίων, legendum existimaui.

Cap. xix. πῶς ἔχουσι] Non ἔχουσι, sed ἀσπίδος legisse videtur Paulus, lib. 7. quoniam aspidis exuuiis hoc ipsum tribuit, quod Dioscorides hoc loco, Viperæ senectæ.

Cap. xx. μετὰ ἀκαλύφης] Addit Oribasius ἀκαλαφίας: quæ vox etiam hoc loco subaudienda est: nec abs re, quandoquidem & ipse Plinius, lib.32.cap 10. vrticam marinam vitam ex aceto scillite inter psilothra commemorat.

Cap. xxi. ζωσι δὲ ἐκ τρόμου] Marcellus itémque Ruellius per τρόμος intelligunt, malam valetudinem: tremorésque hìc ex aduersa valetudine ortos à tremoribus ab ætate, labore aut pauore, aliáve quapiam id genus externa causa contractis distingui volunt. Alioqui suspicatur Marcellus legendũ, καὶ πάχος, quasi velit Dioscorides tremoribus iis tãtùm prodesse cerebrum Leporinum, qui ex humorum crassitie ortum habent. AEgineta verò lib.3.cap.21. quoniam ἀδιοσείστως loquitur, ex quacũque causa tremulis cerebrum Leporinum administrare videtur. Nobis autem vnà cum Cornario viro doctissimo visum est, ἕξεις ἐκ πάθους hoc loco Dioscoridem dictos, qui vnica voce φόβοι à Galeno de eodẽ cerebro Leporino sermonem faciente dicũtur. Est enim φόβος, hoc est, *mens*, ex animi perturbationum genere, quę Græcis πάθη dicuntur. Sunt porrò hæc Galeni verba 11.simpl. ἔνιοί φασιν ἐπὶ τρόμοις τὸν ἐγκέφαλον ἔχειν ἄριστον. hoc est, *Quidam esitatum cerebrũ pauoribus opitulari tradiderunt*. Quamobrem ex Galeni sententia tremores ex pauore ortos intelligendos hoc loco existimauimus.

Cap. xxii. ὀδόντων πονούντων] Huius radij seu aculei vsum in sedandis dentium doloribus non satis exprimit Dioscorides. Denti quidem dolenti illidi tantummodo voluit Paulus, lib.7. hisce verbis: πρὸς ὀδόντας ἀλγοῦντας κέντρον ἐπιτρίβεται τὸν ἐγκεφαλον ἐχόντα, ἐπιτίθεται αὐτῷ, καὶ ἐκβάλλει τὸν πόνον. hoc est, *Pastinacæ marinæ aculeus denti infirmo illisus, ipsum euuerit exutisque*. At Plinius, lib.32.cap.7. & eo gingiuas in dolore scarificari, & contritũ ipsum illini prodidit. *Pastinacæ quoque radio*, inquit ille, *scarificare gingiuas, & in dolore utilissimum. Conteritur u, & cum helleboro albo illinus, dentes sine uexatione extrahit*. Quare tu facto periculo videris, num fortè rectiùs apud AEgineta legas, ὀδόντων πόνοις, ἀντὶ τοῦ, ὀδόντων πόνους. *illinus*, inquam, *non illisus*.

Cap. xxiii. κατὰ δὲ τὸ ὠὸν ἰδίως] Quomodo sepium seu testa Sepiæ in propria testa vri debeat, veluti sonant Autoris verba, non video. Rectiùs fortasse dixerimus, testam Sepię ἐν ἰδίῳ ὀστράκῳ, hoc est, *in fictili peculiari*, videlicet in eum vsum peculiariter accommodato, vri oportere: aut (quod mihi quidem vero similius est) pumicosum sepij corpus in ipsa testa, hoc est, in ambiente extrinsecus cortice seu crustoso corpore, quod deinde κατάδεσιν Autor nominasse videtur, vrendum esse. Sic ὄστρακον priore loco κατάδεσιν vsurpabitur, vt à toto pars intelligatur, nimirum pro fungoso seu pumicoso corpore intus concluso: posteriore verò loco, pro cortice ipso duriore. Nil ergo aliud voluit Dioscorides quàm sepium, os Sepiæ Plinio dictum, quod in dorso sepiæ reperitur, & ὄστρακον τὸ ἐντὸς τοῦτο Athenæo dicitur, lib.7. Deipn. totum ac integrum cum suo cortice cremari oportere.

σὺν ἁλὶ πάσῃ] Sal fossile desiderat Galenus, quod non expressit hoc loco Dioscorides. Sunt verò illa de sepio Gal. verba, 12. lib. de med. fac. τῶν ἑψομένων καὶ μᾶλλον, ὅσοις τὰ κατὰ τοὺς ὀφθαλμοὺς χειρίδια πωρώσει. hoc est, *quum ex sale mistum iussit, oculorum pterygia seu ungues eliquat*. Ac illius quidem exemplo Paulus eundem quoque salem nominatim designat, de re med. lib.7. Plinius sali simpliciter dicto cadmiam addit, lib 32.cap.7. *Sanat*, inquit, *pterygia cum sale & cadmia singula drachmæ*.

Cap. xxv. μετ' οἴνου] Plinius, μὴ ὕδατος, legisse videtur. Agẽs enim de Hippopotamo. lib. 28.cap.8. *Testiculi*, inquit, *drachma ex aqua cotidie serpentes bibitur*. Paulus simpliciter morsibus serpentium bibitum mederi prodidit, addituræ facta nulla mentione.

Cap xxvi. κάπρος ἔχει] Initium huiusce capitis aliter legi oportere, quæ in vetusto codice cernitur diuersitas, per se satis indicat. Ac equidem quò clarius illud sit, ita legi malim: καίτοι ζῶον ὂν ἀμφίβιον, τὸ πλεῖστον ἐν ὕδατι καὶ ἰχθύσι καὶ καρκίνοις τραφόμενον τοιοῦτο μὲν ἀπὸ ἕξεως καὶ φθορᾶς ἐστι. &c.

καὶ ἰχθύσι καὶ καρκίνοις] Serapio ex Dioscoride Castorem seu Fibrum ex piscibus & cancris victũ quæritare voluit: quem secuti etiã videtur Marcellus & Cornarius. At diuersum quid sonare videntur ipsa Dioscoridis verba, nimirũ vnà cum piscibus & cancris vitam in aquis degere, ibidémque victum capessere. Siquidè aliud est, καὶ ἰχθύσι τρέφεσθαι aliud ἰχθύσι τρέφεσθαι. Quin & ij ipsi qui domi Fibros aliquantisper aluerũt, illos piscibus, quantumuis curiosè appositis, minimè vesci, sed arborum tantùm corticibus, ramis, foliis ac fructibus victitare obseruarunt.

κατὰ τὸ ὑπὸ τὴν κοιλίαν ἔχον κατακλὶς] ἔχουσι legendum videtur, vt ad præcedentem vocem, ἔχεις, commodè referatur: aut certè ἔχον per syllepsin referri dicamus ad rem significatam, nempe ad κάστορα. quod quidem cum Fibrorum testibus vnum &

idem erat, vel ipso teste Galeno: qui lib. x i. de medic. fac. ὄρχεις τέτταρες, inquit, ὑμαίζουν τοιοῦτον. hoc est, *Fibri testes castorium nominant.* Sic & quod deinde sequitur, ἐς τὸ φαρμακῶδες, ad Castorium, nõ ad contentum dũtaxat liquorem, referri debere nemo non iudicet. Nec enim liquor ipse tunicis tanquam interiecto septo distinguitur, sed iis ipsis circundatur: distinguntur autem ipsi folliculi seu testes tunicis, liquor distinctis hisce continetur. Quòd ad vocem ὑγρότητα attinet, eam certum est non de liquore, saltem adhuc recenti, sed de exiccato teste cum suo liquore intelligendam esse: friabile enim de liquore humido prædicari rectè nequit. Cæterùm etsi Antiquitas vniuersa Castorium crediderit aliud nihil esse, quàm fibri testiculos: attamen nos ipsi cùm Monspelij Michaeli Heroardo peritiss. Chirurgo Fibrum dissecanti astaremus, testiculos à folliculis iis qui in inguinibus vtrinque membrana sua concluſi testium specie fallunt, quique veriùs Castorij nomine donantur, planè diuersos obseruauimus: id quod & à piæ memoriæ Præceptore Rondeletio, rerum naturalium indagatore sagaciſſimo, anteà edocti fueramus. Folliculos autem eos potiùs, quàm testiculos paruos spinæ adhærentes, à Veteribus vsurpari solitos, vel ex eo patet, quòd sub finem capitis scribit Dioscorides, diuisa pelle excipi liquorem illum melleum tantopere celebratum: testes verò, nõ nisi aperto abdomine remotisque cæteris visceribus, spinæ adhærétes reperiantur. Adde quòd quæ priùs à Dioscoride legitimum Castorium describente liquori tributa sunt, folliculorum quàm testium liquori magis conueniunt. Sed & ex aliorum potiùs, quàm sua ipsius, sententia testes appellasse mihi videtur Dioscorides: quoniam hoc ipso capite eos interdũ non ὄρχεις, sed φύσεις, hoc est, *follículos*, nominat.

CAP. XXVIII. πρὸς τοὺς ἀπ'.] Falsum se facto periculo comperisse, quod hoc loco refertur à Dioscoride, asserit Gal. 10. de medic. facult. quo quidẽ loco, ranas eiusmodi virides cáſque paruas, βατραχίδας à nonnullis vocari prodidit: *diopetes* & *calamitas* eaſdem quibusdam vocatas tradidit Plinius, lib. 32. cap. 7. Cæterùm quas hoc capite πράσινον χάσμασιν dixit Dioſc. *ὑδατίας* nominauit Aëtius, capite de ranis lib. secundo.

CAP. XXIX. Αἴλουρος πυρός] Piscis idem, vt ἄλλουρος, ἀπὸ τοῦ πάντα τὰ ὑγρὰ αἰρεῖν, ita & αἴλουρος, seruata eadẽ analogia, ἀπὸ τοῦ τὰ ὑγρὰ αἰρεῖν, ὑγρία αὐτῶν, dici potuit. Ideóque siue ἄλλουρος legas, vt habetur in vetusto codice, siue αἴλουρος, vt in vulgatis exemplaribus, itémque apud AEginetam, parum interest.

CAP. XXXI. καὶ ἐπὶ τὰς παρωτίδας] Has ipsas παρωτίδας, de mænularum itidem capitibus agens Aëtius, παρωτίδια δὲ ὀνομάζουσι τινὲς nominat, Tetrab. 2. ser. 2. cap 155. Cæterùm in hoc ipso capite pro δακτύλων, δακτυλίου potiùs, ad maiorem differentiam, legendum videtur: itémque pro κονιατέον, κονιατέον. Cinerem enim per se rectiùs inspergi, quàm illini dixerimus.

CAP. XXXIII. ὅσα πρὸς φαρμακείας] Varij variè locũ hunc exponũt: at equidem ad eadem *alimenta* conuenire Interpretor, ad quæ & cætera quæ in alimentorum genere sunt acria, nimirum ad excalfaciendum, aperiendum, incidendum, attenuandum, digerendum, aliúdve quiduis eorum præstandũ, quæ per cibos acres quæri consueuerunt. Enimuerò qui φαρμακείας vertũt, vomitionem ciborum acredine seu acrimonia quæsitam, ipsius verbi vim non satis videntur assecuti: quippe qui latè patentem φαρμακείας significationem nimiùm coangustant atque restringunt, dum ad particulare effectum eumque minimè necessarium, transferunt. Fateor equidem acrium quorundam alimentorum, nominatímque salsamentorum, esu vomitiones interdum concitari, apparatis scilicet fluxionibúsque redditis eorum vlu frigidis, crassis & viscidis humoribus, si qui fortè ventriculo inhæserunt, vti etiam scripto prodidit Orib. lib. 2. *Comp.* itémque Gal. lib. de att. vict. cap. 2. Sed sunt etiã alij acrium ciborum effectus, quos eo ipso loco Galenus studioſè persequitur. Ac, vt verè dicam, acres cibi calfacere quidem, incidere & attenuare per se ac suapte natura possunt: at vomitiones concitare, non item: nisi ex accidenti, dum & humores crassos ad vomitionem apparant, & ventriculum ipsum acrimonia sua mordicant. Adde quòd etsi concedam, radiculam, erucam, salsamentum vetus, origanum viride, cæpam, porrum & alia quædam acria, vomitiones prouocare: non tamen quicquid in alimentorum genere acrimoniam habet, protinus φαρμακεῖον censeri oportet. Quin ne ipsa quidem acria illa, quæ inter φαρμακεῖα modò recensui, perpetuò & omnibus ex æquo vomitiones concitant: sed iis tantùm, quibus impurus & frigidorum humorum colluuie refertus est ventriculus, siquidem ea largiùs esitauerint. Cæterùm salsorum actiorúmque id genus ciborũ esum Græcis olim φαρμακεῖον dictum satis patet, tum ex ipsius vocabuli etymo, tum ex AVreliani testimonio: qui quidem lib. 3. tard. paſſ. cap. 2. de stomachicis: *Adhibenda*, inquit, *remporabo, quã Græci μαλαττικὰ nomunt, ex acriori cibo, quẽ Græci φαρμακεῖον appellant*: itémq; lib. 1. cap. 1. *quibus diebus salsum damus, Græci* φαρμακεῖον *appellant*, &c. Aliam verò fuisse à vomitione φαρμακείας, vel ille vnus Pauli locus, lib. 4. rei medicæ, de elephanticorũ curatione, abundè testatur: φαρμακείαις δὲ ἐχρήσαντο, οἷον τεμαχίδι καὶ σκίλλῃ καὶ τοῖς ὁμοίοις &c. hoc est, *acribus assumptis vtuntur vomitus, scilicet radicula & aliis eiusmodi.*

CAP. XXXIIII. Τὰ ἀλιτηρίδια ἕλκεα] Vulg. ἀνιατικὰ. Et certè quidem non ignoro in præhumidis, putridis serpentibúsque intestinorum vlceribus cogi nos interdum, ex priscorum Medicorum sententia, ad σηπτικὰ & ἰχωρώδη medicamenta transire: qualia longè plurima apud Gal. reperias, lib. 9. de comp. med. κατὰ τόπους, capite de dysenteriæ curatione. Attamen hoc loco ἀνιατικὰ cum Marcello lubentiùs lego, quàm ἀνιατικὰ. Neque enim garum muriámue adurendi tanta vi pollere, fit mihi verisimile. Fateor equidem depascentia illa vlcera remediis hisce, tanquam calfaciendi siccandique summa vi præditis, serpere prohiberi, dum ab his illa egregiè repurgantur, detergentur & exiccãtur: quæ quidem causa est vt & ante escharoticorum vsum meritò ista vsurpentur: at iis protinus crustam (quod ab ipsis escharoticis fieri solet) induci, nõ item. Sed & ipsa verborũ series, lectionem hanc

cæteris omnibus anteferri debere, per se satis indicat. Siquidem ei quod paulò post sequitur, ὑπιζον, ut ὑπνιον perquàm aptissimè opponitur.

Ὁ δὲ ἀσελλος ὑπνιος] Locum hûc, alioqui subobscurum, illustrant non mediocriter quæ de Muria seu salsugine traduntur à Gal. lib. de simpl. med. fac. x i. capite vltimo. Λεκτα (sunt hæc ipsius verba) βαπτιζουσι ἰχθύων ὠμῶν τὰ μὲν ὅλα τὰ δὲ τμήματα ἐπιβάλλοντες ἁλμῃ, καὶ ὅταν ἰχθὺς ἐμπεσὼν καὶ διαπνεύσας ἀποθάνῃ τῇ δὲ ἁλμυρίδι δοὺς μὴ τὸ ἰχθὺν ἀποχλαύνῃς χρηστὸν ὄντα πάντως, καὶ ἀφ' ὧν ἕτερον ἐσθίουσι. τὸ δὲ ἀποθνήσκειν δεῖ ἐν ἁλμῃ ἐν τῇ δυνατῇ πρικλύζοντα καὶ ξηραίνειν, &c. quę quidem totidem verbis repetuntur ab Aëtio Tetrab. 1. serm. 2. cap. 151. *Muria*, inquiunt, *salsorum piscium, aquè ac garum, tum ad putrida ulcera accommodatur, tum & ad ischiadas & dysenteriam infunditur. Sua siquidem acrimonia acrem infestumque humorem attrahit, & per imæstina mittit: putrescentia verò ulcera in dysenteria prodit & exigit.* Hanc ipsam sententiam, quæ haud dubiè verbis Dioscor. est maximè consentanea, quò fœlicius exprimeremus, placuit in hoc loco vertendo liberiore paraphrasi uti, ac nonnulla ex Autoris ipsius mente supplere, idque nequis impostorum scrupulus lectori superesset.

Cap. xxxv. Ἀπὸ δὲ φωκῶν] Mendosè in omnibus quæ in manum venerunt exemplaribus legitur, φωκίων, ἀπὸ δὲ, φωκίδων. Porrò quæ hoc habentur capite, iisdem verbis ab Ægineta repetuntur, nisi quòd pro πρώδων, habet, πρωΐων· itémque in iusculi confectione salem addit, καὶ ἁλὸς: quæ quidem verba nos quoque minimè omittenda existimauimus: maximè cùm, Marcello teste, in vetusto quodam Dioscor. exemplari legerentur. Cæterùm subdit idem Æginet a, in eundem vsum ex ostracodermis, id est, ijs quæ testacea cute integuntur, parari iuscula: maximè verò ex tellinis, hiatulis, conchulis, &c. quæ quidem fuit etiam Dioscor. sententia, capitib. viii & ix.

Cap. xxxvi. ὑπὸ δὲ ἀσκάρδοις βρώμασι] Nos quêadmodum sonabant Dioscor. verba interpretati sumus. Alij *asini fabarum incluſos* vertunt. Hócne an illo modo vertendum sit, non magnoperè laboro. Attamen si vulgata hæc versio magis placet, expungenda necessariò propositio *asili*. Nam quod ad βρώματος dictionem attinet, non dubito quin veluti ὀδόντων βρώματα seu ὀδοβρώματα huic eidem Autori dicuntur, *cruenta* seu *cruda dentium*, à quacunque causa ij atrosi fuerint vita & βρώματα ταῦτα dici potuerint *fabarum cruda*, quæ quidem oculis patent, quoties illæ à curculionibus erosæ fuerunt. Cæterùm Plinius, lib. 29. cap. 4. hæc è deuoratis Cimicibus, quâuis ouo aut cera aut faba incluſis, quartanarum remedia, falsa nec referenda esse arbitratur.

βδέλλας ἐξάγειν] Gal. 11 simpl. med. se alliorum esu solo hirudines eiicere solitum testatur, neq; propterea vnquam ad Cimices confugere coactum. Porrò subit mentem locus ille Hipp. 2. Prorrhet. vbi sauces variis ex causis sanguine impleri tradidit, ac inter alias etiam hirudinem seu sanguisugam commemorat: quo loco tamè nonnulli βδέλλαν, non hirudinem, sed venâ quandam in faucibus varicosam eo, qui sibi fingunt, nomine appellatâ interpretari malucrunt: quasi verò rationi consentaneum non sit, vt hirudo interdum inter potandam aquam in os faucésve recipiatur, ibidémque adhæresçat: maximè cùm & historiis duabus luculenter id cõprobet Gal. 4. de locis aff. cap. 6. & Dioscor. in Alexiph. faucibus adhærescentis hirudinis remedia tradat. Ac equidé ante annos aliquot sat longum iter cum amico non vulgari D. Ant. V Vysi, Sedunensi Medico, confeci, cuius equus hirudinẽ eo modo hauserat, quam tandem satis grandem veterinarius Medicus faucibus inhærentem auellit, cùm non aliam magna copia dudum emanantis ab ore sanguinis causam diuinare posset. Quidni vero & homini exiguis ac vilum propè effugientibus sanguisugis plenam aquam bibenti per imprudentiam idem accidere possit?

Cap. xxxvii. ὄνοι οἱ ἀπὸ τῆς ὑδρίας] Bestiolę hæ varias tum apud Græcos, tum apud Latinos appellationes sortiuntur. Quas enim κάβαρδας seu ὄνους hoc loco nominat Dioscor. alij ὀνίσκους seu ὄνους πολύπους dicunt: Galenus etiam apud suos κυάμους dictas fuisse cõmemorat, scilicet à simili fabæ potius colore, quàm figura. Plinio multipedæ, centipedæ atque etiam millepedæ dicuntur. Marcellus Empiricus *Cutones*, à cute dura & solida, Cæl. Aurelianus *porcelliones* nominat. Porrò horum ipsorum animalculorũ elegantem Galeni descriptionem Dioscor. verbis consentaneam placet hoc loco ascribere. Ille enim tertio κατὰ τόπους. ὀνίσκος τετράποδος, inquit, ζῷον ἐστὶ πολύπουν ὑπὸ τῆς ὑδρηΐδος ἀγχόμενος καὶ ὑπὸ τῆς κοπρίας ἠμυάνθρωπον δὲ καὶ τοῦτ' ἔλαττον ὑπάρχον τοῦ κανθάρου σκληρόν. hoc est, *asellus domesticus animal est multipes ne aquarys nasis & sterquilinys nascens: quod si digitu apprimatur, sese in orbem contrahit.* Itémque 11. simpl. med. ὄνος δὲ ζῷον σκληρὸν τὸ ὑπὸ τοῦ ὑδρηΐδος καὶ τῆς κοπρίας φυόμενον, ἀφ' οὗ καὶ ἐπιπολάζοντος ἐν τῷ ὑγρῷ ὑπὸ πολλῶν, ὑπὸ δὲ ἄλλων ὑπὸ τῶν ὑδαπίνων καλουμένων ὑπὸ τινων ἐν τοῖς ὑγροῖς ἀναφερόμενον, φασὶ τοὺς ἀγχόντας ὄνους. ὅτι δὲ τῆς ἀγχούσης ἐστὶν ἰδίως καλουμένης πόας ἠμυάνθρωπος ὑπὸ τοῖς ὑδρίαις, ἃς ὑπὸ τῶν κρίνων καὶ τοῦ ἁλὸς ἐκπορίζουσιν ὕδωρ οἱ ἄγχουσαι, &c. Quæ ita vertimus: *Sunt verò animalia quæ dum sese contrahunt, pilæ in modum conglobãtur: hæc nonnulli è nostratibus cyamos, id est, fabas, nominant, quandoquidem esculentis fabis sunt persimilia, cùm sese in orbem compluerint, quippe quæ colore sint fusco. Porrò eiusmodi plurima videre est in rusticorum habitationibus sub situlis, quibus è fontibus aquam suam comportant*, &c. At non tantùm sub vasis aquariis reperiuntur, sed & aliâs in locis humectis, aquosis & sordidis. Cæterùm pro eo quod tum Galenus, tum Dioscorides συμπόδια dixêre, Theophrastus συμπέδας, Hesychius συμπόδας. Plinius de iisdẽ animalculis, *tactu sese contrahũt.* Scribonius Largus, *conduplicãs sese in orbem pilulæ rotundissimæ similem.* Marcellus Emp. *tacta complicant sese in orbem pilulæ rotundissimæ*: alio loco, *contacta in globulos complicantur*, aliâs *pilulam de se faciunt*: alias denique *cõtacta contrahuntur & rotundantur*: quæ quidem omnia cõdem planè redeunt.

Cap. xliiii. Ἀπαλάγης δὲ] And. Lacuna in vetustiss. quodam codice legit, Ἀπαγχάλης δὲ μετ' ἔξου. Cornarius Ἀπαλάγης δὲ, quam lectionem nos secuti sumus. Sic enim de asini Vngularũ cinere Galenus, fidus Dioscor. Interpres, 11. lib. simpl. med. Ἀπαλλάττειν δὲ τινὰ αὐτῶν φησιν

ξηρὰ ἐσθίειν τὰ χόνδρια. hoc est, *eosdem imperso cinere ianari permones.*

CAP. XLVIII. ἰχνηῶν καὶ κεφαλῶν] Serapio vertit in genere, *ueneatos si morsibus auxilio est.* Aldinus codex pro κεφαλῶν, habet, πλευρῶν. Hinc vocē omisit AEgineta, qui tamen cætera quæ de animantium lecinoribus hic habentur, totidem verbis videtur transcripsisse. Equidem etsi non negauerim in mo. sibus etiam equorum, cæterorúmque id genus iumentorum, plerunque veneni quiddam subesse, κεφαλὴν tamen cum Cornario, potiùs quàm πλευρὰν legendum censuerim.

CAP. XLIX. ἀπεχθείας ὑδροφοβίας] Remediū hoc ex aliorum potiùs quàm sua sententia meritò proponit Dioscorides. Galenus quoque videtur huic ipsi remedio diffidere, aut certè non satis fidere, dum lib. simpl. xi. omnes mortuos testatur, qui solo rabidi canis hepate ad arcendam ὑδροφοβίαν vsi fuerant.

CAP. L. ἀνὰ ξέστου ἑνὸς] Paulus de hoc eodē mergi iecore, pro ἀνὰ ξέστου ἑνὸς, habet, αἴρειν ἀνὰ ξέστου. hoc est, *aliudes ejus.*

CAP. LI. πρὸς τὰ τῶν ὑποδημάτων] Soleas veteres ad calceamentorum attritus seu iniurias ex calceatu etiam conuenire docet Galenus, qua pollent resiccādi vi: sed duntaxat, sedata inflammatione.

CAP. LIII. ἀμύλῳ σμυρνίῃ] Interioris tunicæ ventriculi gallinaceorum vsum hunc deridet Galenus, II. simpl. quippe qui ipsius vanum se experimentum fecisse asserat. Attamen Plinius eam diuersis locis ad varios commendat vsus. A nostris quoque Practicis non rarò vsurpari consueuit.

ὑπερόπτους χέσει] Non dubium est, quin velit Dioscorides lus pulli gallinacei valere ad temperandam corporum κακοχυμίαν. Id genus curationis ὑπερόπτου Medici vocāt, dum scilicet, tetie Gal. lib. 9. Meth. sensim ac paulatim praui vitiosique humores euacuantur, & boni laudabilésque succi, quales hauddubiè gignit eiusmodi iusculum, in eorum locum sufficiuntur. At videntur lōgè aliud voluisse Galenus, & ipse quoque Paulus: nempe hoc iusculi genus alui cohibendæ vi pollere. Quanquam hi de gallinarū iure conceptis verbis agunt: Dioscorides verò de pulli iusculo, quem ὑπόπτην nominat. Sic porrò Gal. habet II. simpl. ὁ γὰρ ἀλεκτρυόνειος ζωμὸς ὑπερόπτους ἔχει δυνάμεις, ὅσαπερ οἱ τῶν πτηνῶν ἁπαντῶν ἀλεκτρυόνων ὑπερόπται. hoc est, *gallinarum ius simplex cohibendæ alui facultate pollet, sū ueterum gallinaceorum, subduendi.* Hoc tamen loco ex Dioscoridis contextu ἀπὸ τῶ, ὑπερόπτους, lubenter cum Cornario reponerem, ὑπογόπτους, aut ὑπογομφίους, nisi quæ à Paulo de iusculo eodem repetuntur lib. 7. apertiùs innuerent, πολὺ ὑπογομφίων δυνάμεων opposuisse Galenum τῷ τῶν ἀλεκτρυόνων. Sic enim ille: ὁ δὲ πεπαυὸς ἢ ἀλεκτρυόνειος ζωμὸς οὐ δηλός ἐστι πάσης ὑπερόπτου, τῶν ἀλεκτρυόνων γένεται ὁ δὶς πεπαυόμενος, τ' ἔτι πολὺ ὑπογομφίους hoc est, *ueteru gallū sale diutissimè cocti iusculum alui subduat: eandem uniuersus gallinæ comprimat.* At verò Plinius longè aliud sentit, dū lib 29. cap. 4. *In gallinæ*, inquit, *alui solut, validius è uetere gallinaceo.*

ὑπερόπτους χέσειεν] Addit Lacuna ex veteri codice, ὑπερόπτους ἔχειν: ac sic quoque Plinius & Serapio videntur legisse.

CAP. LIIII. οἱ δὲ ἁπαλοὶ] οἱ δὲ πεπαυόμενοι καὶ ὑπερόπτους οἱ δὲ hauddubiè agit hoc loco Dioscorides, nimirū de gallinarum Ouis: ac triplicis quidem differētiæ meminit, quæ in iis penes cōcturam variam obseruari consueuit. Siquidem ἑψητὰ, hoc est, *sorbilia*, nominat, quæ breuissimā cocturam experiuntur, quæq; planè liquida vix dum incaluerunt. σκληρὰ verò seu *dura*, quę igni dureta sunt, quæ scilicet ita coquuntur vt indurescant: hæc Galeno ἐφθὰ καὶ ὀπτὰ dicuntur. Inter hæc autem media sunt quasi ex dimidio cocta; quæ Dioscoridi ἁπαλὰ, Galeno ἑψητὰ, hoc est, *tremula*, nominantur: *mollia* dixēre Latini ad durorum differentiam. Cæterùm prout hunc in modū magis minúsve cocta sunt Oua, ita quoque magis minúsve nutriunt.

CAP. LV. αἱματίτιδα] Quantum ex Galeni verbis in vndecimo simpl. med. colligere licet, αἱματίτιδος nomine non tantùm hîc videtur intellexisse frōtale, quod ad cohibendas intercipiendásve fluxiones in oculos potissimùm decumbentes fronti imponatur, sed & remedium ad pilos palpebrarum reclinandos seu agglutinandos aptum: veruntque enim præstare candidum ex Ouo demōstrare nititur. Sed neque posterius hoc omisit Plinius, in Ouorum viribus recensendis: veruntamen ad reclinandos pilos ammoniacum tritum admisceat; quemadmodum ad cohibendas fluxiones, thuris pollinem.

CAP. LIX. πολιοῦ ὑφαλῶ] Lacuna veteris exemplaris fidem secutus, αἰπὺ τῶ πετραίου, quod habebatur in vulg. exemplaribus, legit πολιοῦ: & nos quoque ita legendum censuimus. Quotquot enim Galeritæ seu alaudæ vires tradidēre, ad coli ferè vitia ipsam commendarunt: & Galenus quidem in eum vsum non assam, sed elixam cum suo iure ad multos dies sumi voluit. Plinius, lib. 30. cap. 3. non assam tantùm Galeritam, sed & ipsius tinerem in aqua bibi tradidit.

CAP. LXI. ἐλέφαντος ὀδόντας] Paulus AEgineta Elephantis non dentibus modò, sed & vnguibus atque ossibus eandem hanc vim tribuit.

CAP. LXIII. πασσητῶ γομφιάσεις] γόμφιοι tum Galeno, tum Arist. verè dicuntur interiores dentes omnes, præter eos qui σκόδοντες, hoc est, *anteriores*, iisdem dicti sunt, dum & incisorios & caninos dentes complecti voluerunt. Inde deducta vox est γομφίασις, huic Autori, nisi fallor, peculiaris. Interpretantur nonnulli, *maxillarum aut gingiuarum ex dentitione dolorem.* Equidem ea voce μυελαλγίαν potiùs Galeno dictam significari existimo, hoc est, *medullarium seu intimorum dentium dolorem.* Eum verò intelligo, qui ex defluxione oriundus est, non item ex dentitione sola. Quin neque Cornu ceruinum nato ex dentitione dolori recte conueniret, quum χαλασταὶ seu relaxantia remedia, qualia sunt mel, butyrū, ouillum leporinúmve cerebrum, tùm magis sint ex vsu. Alij quemadmodum γόμφιοι Medicis dicitur dentium σκαφοειδεῖς, quoniam γόμφοι, hoc est, clauorum seu cuneorum modo suis alueolis infiguntur, ita fortasse γομφίασις huius vitium, γομφίασιν dici existimarunt, dum videlicet dentes vacillant mobiléque sunt, neque firmiter suis hærent alueolis: id quod citra ictū aut dentium

ipsorum ex senio siccitatem plerunque accidit, vitio nerui qui dentem firmat præ humore nimio molliti atque relaxati, vel certè ipsarũ gingiuarum, dum humore nimio turgent, atque adeò præ mollitie & laxitate quasi diffluũt. Vtrique verò huic malo Cornu ceruinum videtur, quia tum siccat tum astringit, per quàm accommodatissimum. Idcóque Gal. de Cornu ceruino agens, 11. simpl. valere dixit, εἰς τὰ σφρίγματα αὖλα τῶν ὀδόντων, ad contrahendas mollitie laxitatéue diffluentes gingiuas. Itémque lib. de theriaca ad Pis. τὰ δὲ τῶν ἐλάφου κέρατος ῥίνημα τριῶβόλου καὶ μετ' ὄξους λειωθέντα, ἅμα σκληρύνει τε, καὶ στομάτων ὀδύνας παύει: hoc est, *Cornu cerui ramenti̇ ustum & cũ aceto tritum, dentésque circumlitum, mobiles dentes firmat & stabilit.* Et hæc quidè à Paulo lib. 6. cap. de Cornu ceruino, totidem verbis repetuntur. Ac ipse quoque Plinius lib. 28. cap. 1. *Cornu cerui mobiles dentes confirmare æstimatur, doloréſque eorum mitigare, siue infricentur, siue colluantur.* Verumenimuerò cùm dentium mobilitatem vix vllus comitetur dolor, vox autem παρηγορῶν hîc dolorem haud dubiè præsupponere videretur, interiorum dentium dolorem interpretari maluimus, qualis ferè illis accidit ratione neruorum, quos substratos habent à tertio pari. Et certè quidem, tanquam ad dolores eiusmodi leuandos aptum, Cornu cerui meritò recipitur in varias compositiones dentium dolori dicatas, Gal. lib. 5. med. κατὰ τόπους.

CAP. LXVI. *αἱ βαλλόμεναι εἰς ἀκάτιον*] Cantharidum hanc eandem præparationem paulò plenius illustrare videtur Gal. 11. simpl. Porrò quanuis earum non ita tutus est vsus, quoniam, vel ipso teste Galeno, interiora viscera, maximè verò vesicam, exedendo seu erodendo tandem interimunt: attamen si medicamentis vrinas mouentibus exigua quantitate admisceantur, tutò interdum vsurpari possunt: ac totæ quidem tutiùs, quàm ipsarum soli ventres: quantumuis variis locis Hippocrates, itémque Arabes omnes, excepto Auicenna, aliter sentire videantur. Fateor equidem & ipsum quoque Galenum ventres solos nonnunquam admittere: quemadmodum in recensendo medicamento lichenum excoriatorio. Sed alius est procul dubiò ipsarum vsus in ore assumendis, alius in extrinsecus admouendis. Exteriùs enim soli ventres rectè adhiberi possunt, vel quia, propter partium quibus adaptantur vicinitatem, non tanta vis penetrandi requiritur, quãtam nonnulli capiti, alis pedibúsq; subesse suspicãtur: vel potiùs, quia pedúmq; alarum additione vesicas excitãdi vis, qua ipsę pollent, fortasse remitteretur: neq; verò membrorũ externorum, perinde vt internorum læsio metuitur. At integræ Cantharides intus assumptæ minùs officiunt: quoniam pedes & alæ venenatam eámque insignem, qua pollent earum ventres tũ alia viscera tum ipsam præcipuè vesicam erodendi exulcerandíque, vim non parum obtundunt: veluti præter Dioscoridem, Galenus, Plinius & Aëtius abundè testantur.

CAP. LXVII. *μάστιν παρασχὼν*] Salamãdram Nicãder & Serenus Medicus nullis flammis obnoxiam prodidêre. Quin & ignem à Salamandra restingui tradidit Arist. lib. 5. de hist. animal. Itidémque AElianus, lib. 2. de Animal. cap. 31. Sed & Plinius, lib. 10. cap. 67. de Salamandra eadem agens: *huic tantus rigor*, inquit, *vt ignem tactum extinguat, non alio modo quàm glacies.* At Sextius, teste eodem Plinio, lib. 29. cap. 4. quemadmodum & hoc loco Dioscorides, ignem ab ea restingui negauit. Gal. verò lib. 3. de temper. & Aëtius cap. de Salamandra, aliquantisper quidem in igne durare affirmant, at verò tandem consumpto humore muccoso ac frigido quo redundat, quique ex rimosa ipsius cute effluit, exuri: id quod etiam non parum multi experimẽto facto comprobarunt. Quinetiã idem Gal. in lib. de comp. med. κατὰ γένη. varia recenset medicamenta, in quæ Salamandra vsta recipitur.

ἕκαστον μετ' ἄλλων] Cum Marcello & Cornario lego κατὰ, καὶ τὰ, μετὰ. Nã & Galenus & Paulus de hac eadem Salamandræ vi agentes, vstam eam desiderant, his verbis: καὶ τῆς Σαλαμανδρας δὲ παυτὸς τοῦ τόπου μεγάλην. hoc est, *vstæ Salamandræ cinerem nonnulli admiscent.* His etiam astipulatur Plinius, lib. 30. cap. 6. dum *Pilos*, inquit, *in palpebru incommodos emulsos remissa non patitur Salamandræ cinis.* Attamen nõ desunt, qui huic nostræ lectioni repugnent: quia sit verisimile, Salamandræ septicam facultatem magna ex parte vstione absumi. Verùm & ego idipsum lubẽs agnosco, hánc que ipsam ob causam eius vstæ, quàm non vstæ vsum innocentiorem censeo. Porrò nihil impedit, quominus & vulgata lectio, ἕκαστον, tolerari vtcunque possit: siquidem oleum cui incocta fuerit, aut quouis alio modo intabuerit Salamãdra, psilothri vim ascisceret ex saliuæ illius maleficæ permixtione potest. At nihilominus eius olei vsum haud ita tutum iudicauerim: quandoquidem verendum est, ne eius illitu non ij tantùm quos in totum tollere lubet, sed & cæteri totius corporis pili, auferantur absumantúrve. Enimuerò, si Plinio credimus, lib. 10. cap. 67. *Salamandræ sanè, quæ lactea ore vomitur, quacunque parte corporis humani contacta non defluunt pili.* Rursúmque lib. 28. cap. 4. *Saliua eius quacunque parte corporis uel in pede imo respersa, omnes in toto corpore defluxit pilos.*

CAP. LXVIII. ἢ λάνιος] Fortasse λάνιον. nam & λάνιον nomine aranei quoddam genus designat Hesychius. Plinius *lupum* nominat, à rapacitate scil. ita dictum: Aristoteles verò totum araneorum genus, λάνιος appellauit.

σπαλιωτῷ] Paulus, ἐμπλάστρῳ, quod idem est. Nã etsi σπαλιὼν nomine propriè accipitur linteolum oblongum, cui emplastrum inducitur: quandóque tamen & emplastrum quoque ipsum, veluti hoc loco, ea voce significatur.

CAP. LXIX. καὶ ἅλατος] ἰοῦτος, non ἅλατος, videtur legisse Ruellius.

CAP. LXX. χαλκιδικῷ] Nicãdri Interpres οἶνον sic dictũ opinatur, ὅτι ἐν Χαλκίδι νῆσος πολυοινος, vti χαλκίδα, ὅτι ἐκ ὀδὸν τὸ οἶνον χαλκίζουσι μαλλον. Quare non immeritò cum Cornario addubitauerim, sitne hoc loco legẽdum οἴνῳ τῷ χαλκιδικῷ, χαλκιδικὸν seu χαλκίδι. Nec enim à Chalcide insula, aut insulæ vrbe, sed à lineamentis æris æmulis id cognomen obtinuisse mihi fit verisimile.

CAP. LXXI. ἐν τῇ Λυδίᾳ] Minimè legendũ esse Λυδίᾳ, quo modo in vulgatis legitur exemplaribus, vel ex eo patet, quòd Lydia sit regio Asiæ minoris: Mauritania verò, pars sit Africæ.

Lacuna legit in vetusto quodam codice, ὁ Ἀσσυρίας Ἄυσις Oribasius habet, ὁ Ἀσσυρίας. At nos, ex fide veteris exemplaris quod præ manibus habuit Io. Sambucus, legendum existimamus, Λίβυος: siue Africam ipsam, cuius pars est Mauritania, siue fluuium Mauritaniæ ita nuncupatum, eo nomine accipiamus. Vult ergo Dioscorides, Scincos non modò in antè memoratis locis gigni, sed & in Libyæ parte Mauritania, aut certè apud Libyam Mauritaniæ fluuium reperiri.

ὁ καρδιακὸς] Cornarius legit, ὁ περιτονικὸς. in alueolo panario. Interpres Oribasij legisse videtur, ὁ κοιλιακὸς, quæ quidem lectio mihi magis placet. Plinius simpliciter falsos afferri voluit.

φακοῦ ἀφεψήματι] Cornarius meritò ambigere videtur, vtrum pro φακοῦ, legendum sit, ἰσατ. scil. Plinij autoritate ductus: qui posteaquā de Scinco egit: *eiusdem decocto*, inquit, *imo cum melle sumptum uentrem mouet*: quasi animal id in seipso eam habeat κάθαρσιν. Sed ipsum potiùs Plinium deceptum existimo, qui pro φακοῦ, σίκυου perperam legerit. Nā & posteriores Græci, Galenus, Paulus & Aëtius, φακοῦ haudquaquā legerunt, ac lentem potissimùm palustrem designauerunt. Cæterùm rostro & pedibus tribuere videtur Plinius, quod Dioscorides lumbis seu partibus circa renes: quanquam & ipse paulò pòst lateroum carnes ad idem efficaciores censeri fatetur.

Cap. LXXII. πρὸς τὰ κινούμενα σκ] Plinius lib. 30. cap. 3. itémque Aëtius Tetr. 1. ser. 2. cap. 168. terrenos Vermes in dentiū doloribus non contrariæ aut oppositæ auri, sed vicinæ infundunt: quod equidē vero similius esse crediderim. Sed & denti vicina auris non modò ἀντίκειται, hoc est, *adiacere*, sed & ἀντίκειται, id est, *opponi* rectè videtur, quoniam illi ex aduerso posita est. Cæterùm hos eosdem Vermes ex passo epotos nó vrinas tantùm ciere, sed & calculos comminuere, communi cōsensu Plinius, Aëtius & Serapio tradiderunt, insupérque regio morbo resistere: quæ quidem vires librariorum fortè culpa in Dioscoride desiderantur.

Cap. LXXV. κυμάχου καὶ ταυρείας] Diuersam lectionem ex vetusti codicis fide agnoscit Lacuna, quam nos margini ascripsimus. Attamen vulgatam lectionem lubentiùs amplectimur: id tantummodò supplemus, quod in ea desiderari videbatur. Nam pro ἀκατρεπτίνου κυμάχου καὶ ταυρείας γάλακτος, reponimus, ἀκατρεπτίνου κυμάχου καὶ ταυρείας πιπλησκομένου καταπολάζοντος. Cæterùm anteà, quo loco agitur de bubulo, asinino & equino lacte, vide an redundent voces illæ, καὶ ὄρειλικὸς: nam & in Aldino codice simpliciter habetur ἄκρατα γάλακτα, hoc est, *uentri sunt magis idonea*. Adde quòd non quicquid aluum soluit, illico eandem conturbat.

τὰ ἰχθυόφαγα κοχλιῶν] κοχλιῶν nomine, Suida teste, λίθους οἱ ἐν τῇ ὕδατι designantur, qui interdum Galeno & Paulo κάχληκες, aliis etiam χάλικες dicuntur. Calculos marinos hoc loco desiderat Plinius: cùm tamen in eundem vsum calculi, qui in fluminum ripis reperiuntur, rectè vsurpari possint. Porrò ignitorum horum calculorum aut silicum vice, ferreos cylindros lacti immittere se solitum commemorat Gal. lib. de simpl. med. fac. 10. sed efficacia maiore: quoniā ferrum sit astringendi vi præditum.

Cap. LXXVII. μανὸν ζυμοῦται δὲ τυρὸς] Paulus lib. 1. cap. 88. non vbi bis térve lac effrbuerit, sed vbi coctura vehementiore serum à lacte discesserit, tùm demùm sero mellis aut aceti multi, aut salis (ἅλατι enim, non ἅλμῃ eo loco legendum videtur, quod satis est addi voluit. Aëtius verò, Tetrab. 1. ser. 2. cap 96. vbi efferbuerit ter quatérve, aliàs acetum mulsum, aliàs etiam aquam mulsam affundit: & illud quidē, si quando crassis pituitosisve humoribus purgandum corpus redundare videatur: hanc verò, si quando acribus ac biliosis. Sed vide num potius αἰθρίῳ, μαλακρῷ, apud Aëtium, ἐξόχως τῷ legendū sit. Orib. ἔμπ. lib. 2. mulsam aut vinum inspergit. Plinius, lib. 28. cap. 9. qui alioqui diuidendi lactis eundē cum Dioscoride modum tradit, mulsum addit, quasi non ἐξύμελι, sed οἰνόμελι legerit.

καὶ ξέσαι ἀργυρῷ] Plinius itidem cyathum argenteum vsurpat, loco citato. AEreī verò vasis frequētiùs in lac demittēdi, non argētei meminit Gal. comm. 4. in lib. de vict. ratione. In acuti sed mendosè, ni fallor, habetur χαλκῷ, ἀντὶ τοῦ, ἀργυρῷ. Aëtius verò, loco antè citato, simpliciter vasis aqua frigidissima pleni mentionem facit, neque addit, quánam ex materia id esse debeat. Cæterùm perperàm distincta esse hæc capita quæ vnico comprehendi debuerant, vel ex ipsa verborū serie cuiuis facilè paret. Nec enim circa capitis huiusce principium aliud voluit Dioscorides quàm seri à lacte diuidendi rationem, ac ipsius quoque vtendi modum tradere: deinceps verò quæ de lactis vsu habentur, ad caput de lacte referenda meritò videntur.

ὑοσκυάμου] Lacuna in vet. cod. pro ὑοσκυάμου, legit, ἀφροῦ· quam ego lectionem iccirco lubenter sum secutus, quod reliqua quę hic recensentur venena, sunt è genere erodentium & aduerentium. Neq; tamen ignoro Lac etiā cōtra potum hyoscyamum valere, vti docet noster hic Dioscorides, aut quisquis est alius autor libri de venenis, cap. proprio de hyoscyamo.

Cap. LXXVIII. κυνὸς γάλα] Quæ de Canis lacte à Dioscoride hoc loco commemorantur, tanquam falsa refellit Galenus, 10. de simpl. medic. fac. his verbis: ἔτι δὲ ὑφ' ἡμῶν φαυλισθὲν, ὥσπερ καὶ τὸ περὶ τῶν κυνὸς γάλακτος, οἷς προλέγοντες αὐτίκα τοιχα ὑπ' ἀλλοτρίων, οἱ καρδιακοὶ αὐτῶν ὀνειδισθῆναι τὸν τρόπον, ὅτι αἱ ῥίζαι τῆς τοιχᾶς αὐτοῦ ὄνου. τοῦτο δὲ ἐστ αὐτὸ λέγειν οἱ γαλαῖται ἄρχει αὐτοὺς δεῖ τῆ' ἀδοίων ἀφύσους ὀχείας καὶ τοιχας, οἱ ἀφροδισιάν ἀφεῖν ἐδέν, ἀνδρωθέντα καὶ πικρὸ τῆ' ἡμερῶν πῆδ, ἐκ παιδίσκου. hoc est, *Alia uero palam mentiti sunt, ueluti quod lac canum, post radiatus emulsos palpebrarum pilos illitū, alios renusa prohibeat. Similiter etiam falsa protulere, quod idem illud pudendis ante pubertatem inunctum, alterum ys locis pilorum exortum inhibere, necnon & potum fœtus enecatos ejcere lienis prodiderunt.*

Cap. LXXIX. ὁ δὲ ἱππάκης λόγος.] Quotquot in manus venerūt Dioscoridis exemplaria Græca, habent ἱππάκης, sed mendosè: ἀφροῦ enim legendum esse res ipsa per se clamitat.

Cap. LXXX. καλουμένη ἱππάκη] De hac eadē Hippace, Scytharū familiari cibo, egit & Hipp. lib. de aëre, aq. & lo. itémque 4. de Morbis: necnon & illius coætaneus Herodotus, historiæ suę lib. 4. Damascenus apud Stob. victum γαλακτο-

φάγρις, hoc est, Scythis, equarũ tãtùm lacte constitisse scribit: vnde caseos cõficerẽt, vt ita eo tũ potu tum cibo vterentur: itáq; δημοτροφίαν fuisse, quòd commeatus vbique ipsis præstò esset. Theophr. verò hist. plant. lib. 9. cap. 13. Scythas Hippaces cibo narrat famem solitos depellere, vti & sitim radice Scythica seu glycyrrhiza retẽta in ore: ita vt solis istis in duodenos dies se sustentarent. At Plinius, lib. 25. cap. 8. Theophrasti mentem non satis assecutus, locũ illum ita peruertit, vt hippacen seu hippicen apud Scythas herbam esse voluerit, quæ non in hominibus modò, sed & in equis eundem illum præstaret effectum. Atque huius exemplo in eundẽ raptus errorem Gaza, Hippacen Theophrasti, herbam equestrem interpretatus est.

CAP. LXXXI. γίνεται δὲ καὶ ἐκ τῶν αἰγείων] Quòd Dioscor. ex ouillo aut caprino lacte butyrum fieri retulerit, mirum Galeno videtur, 10. simpl. med. quippe qui nosset è bubulo confici, unde, inquit, & nomen. Verùm etsi butyrum vt plurimùm è lacte bubulo paratur, attamen ex antè memoratis etiamnum confici posse ipsa docet experiẽtia, scilicet ex eorum parte pinguissima. Quin & butyrum Scythas ex equino lacte factitare solitos memoriæ mandauit, seu Hippocrates, seu Polybus, lib. 4. de morbis.

CAP. LXXXII. ῥαδίην ὑποχώρησιν] Enallage numeri, pro ῥᾳδίας ὑποχωρήσεις, videlicet ἔσται. Sic sequẽti capite, quo loco de lanarum vstarum lotione agitur, habes ἀποπλύνειν, καὶ τὰ ἀποπλύματα.

CAP. LXXXIII. κροκοῦται καίονται] Lanę purpuræ marinæ cruore infectę floccos seu tomenta, etiam Crito apud Gal. κροκοῦται πυγχαῖν nominat. Archigenes verò μαλλὸν πορφύρας. Ad eundem modum AEgineta dixit, λίνον ἢ μαλλὸν πορφύρᾳ βεβαμμένον. Linum seu lanam purpura marina tinctum. & Aëtius, πλῆγμα πορφύρας ἐρίου. plagellam seu hapsum amplianum lanæ purpura infectæ: imò & apud Gal. sæpenumerò πορφύρα pro lana purpurę succo tincta reperitur. Plinius quoq; alicubi lanæ conchylio infectæ meminit. Marcellus Empiricus, lanæ conchyliatæ. Ouidius, tinctæ murice lanæ. Cæterùm simpliciore vrendæ lanæ modo, quàm quibic à Dioscoride describitur, contentus est Gal. 11. med. simpl. vt scilicet vratur in olla noua operculo clausa, crebris foraminibus peruio. Neque verò alia est vrendæ lanæ ratio, quæ habetur apud Gal. 6. de comp. med. & ἧπαρ, in descriptione emplastri AEgyptij.

CAP. LXXXIIII. εἴποτε δὲ λάγνως] Ex verbis Aëtij, lib. 2. cap. 120. colligas sordities seu sudorem feminum & alarum lanis ouium adhærescere solitũ, seu, vt Ouidij verbis vtar, *demptum succum ab ouis mammæ uellere*, nondũ OEsypum appellari, sed tantummodo ῥύπος σκληρὸς, seu ῥύπος ὑπερφυὴς περὶ τὰς θηλὰς τῶν προβάτων γινόμενος: εἴποτε autem tùm demùm dici pinguitudinem illam, cùm eo præparata est modo, quo hic à Dioscoride describitur, & planiùs apertiúsque ab Aëtio, loco antè citato.

ἔστιν ὅτε ὑποχωρεῖ] Addenda negatio ex sentẽtia Marcelli & Cornarij. legendúmque, μὴ ὑποχωρεῖν, aut reponendum, ἀποχωρεῖ. Alioqui, quod facilè crediderim, vox ea redundat. Neq; verò habetur quicquam, quod illi voci respondeat, apud Serapionem, vti neq; apud Aëtium: sed apud hunc eiusce loco leguntur hæ voces, ὑγρὰ καὶ ὕδατα. At verò quid per ὑγρὰ significet, mihi non satis constat. Interpres *sorta* vertit, ac fortè ῥυπὰ vel σπυρὰ legendum existimauit. Cæterùm ὑποχωρεῖν citra negationem apud Dioscor. perperam legi ex eo facile constat, quod dum radicula lanæ purgãtur, ea deperit pinguitudo, quæ ad præparandum OEsypum omnino desideratur. Huc adde quòd inferiùs conceptis verbis admonet Dioscor. præstantius esse id OEsypum, quod e lanis paratur radicula nondum curatis: ἄπλυτον ipse nominat. Porrò σπυρὸς, lanaria est herba, *radicula* Latinis iccirco dicta, quòd struthij vis ad purgandas lanas efficax in radice potissimùm sita sit. *Lauandis enim lanis fructum habet*, inquit Plin. lib. 19. cap. 3. *mirũ quantum conferens candori mollitiéque.*

ἀφρῶδες λευκαῖνον ῥαγάδας] Aldinum exemplar habet, ῥυπῶδες ῥαγάδιον: desideratur verò vox, μαλακτικὸν. Ego pro ἀφρῶδες lego καταφρακτικὸν, idque ex Aëtio: qui quidem horum Dioscor. verborum mentem ita exprimit: ὕστερον ὕπνου ὕδωρ ζέον ἀναπεμπτέον, καταβαπτίσαντα τὰ ὑγρὰ σπυρία ἢ ὑπόψυχρον, ἢ ἐξ ὑπαλοῦ καταχεάντων &c. *Affusa*, inquam *alterâ feruente aqua emurbato, ac poculo alicúue quopiam haustam liquorem & ex alto illidens.* Quibus quidem verbis, quæ obscuriora videbantur apud Dioscor. ita illustrat, vt desiderari amplius vix quicquam possit. Interim aquam, quæ affunditur sordibus è lana exemptis, calidâ feruẽtémq; esse debere obiter innuit: quod fuerat à Dioscor. prætermissum. Itémque non multò pòst, si ad spumam aspergendam aqua marina detur, frigidam simpliciter vsurpare non veretur.

ὡς ἁλὶ δὲ θαλασσίῳ] pro θαλασσίῳ legere malui ex Aëtio, θαλασσῷ, quanquã vtrouis modo legas parum refert. Attamen vtut legeris, in æstiuis ardoribus præparari OEsypum satius esse scitò, quàm alia vlla anni tempestate.

CAP. LXXXV. καὶ αἱματηρὰ καὶ ἐκ θώρακος] In sanguinis ex thorace reiectionibus Coaguli leporini vsum reformidat Gal. 7. simpl. med. id. que propter eam qua prędituin est acrimoniam. Nam & acrium cæterorum remediorum vsum respuendum censet in affectibus, qui astrictionem exposcunt.

μηδὲν τοῦτο ἀφροδισιακὸν εἶναι] Plinius contrà, lib. 28. cap. 19. præstare asserit, vt mares concipiantur, nedum vt conceptio impediatur. Posteaquam enim, *si nullus leporis in cibo sumatur, mares* ait scripsit: illico subiungit, *idem usus & coagulo profici.*

κυνὸς καὶ δορκάδος] Cum Val. Cordo coniunctionẽ καὶ expungendã puto: siquidẽ vox κυνὸς, ad ea quæ sequuntur omnia ceruini generis animantia refertur: horum enim omnium pulli, Græcis κυνοὶ, Latinis *hinnuli* dicuntur. Porrò etsi apud Oppianum δορκὰς idem est cum dorcade, hìc tamen Dioscorides δορκὰς à dorcade manifestò distinguere videtur: siue sexu, siue specie inter se differant. Ac certè quidem I. Cæsar Scaliger exercit. in Cardanum CCVII. δορκάδα, capreolum esse censet, qui est inter μοσχίσκον & damam, quæ αἰγὸς Græcis dicitur: δορκὰς verò, capream esse autumat. Ego contrà δορκὰς capreolum, δορκάδα capreã conuerterẽ. Attamen ne in hac tanta nominum ambiguitate certi quic-

quam ſtatuere velle videret, cum Plinio Græca nomina retinere malui. Cæterùm hoc loco apri perperam meminit Ruellius, cùm in Græcis codicibus tale nihil habeatur.

C. LXXXVI. σίαρ ἀφὸς ἀφὸ τὰ] σίαρ nomine genus omne adipis hoc loco cõplectitur Dioſcorides: quanquam propria ſignificatione ſumptum σίαρ, διὸ τὸ πιμελῆς. hoc eſt, *ſeuum à pinguedine* ſeu *adipe* rectè diſtinxerunt Ariſtoteles 3. de nat. animal. Galenus 11. ſimpl. atque Plinius, lib. 11. cap. 37. Siquidem σίαρ ſeu ſeuum (*adipem* perperàm vertunt Galeni Interpretes) vſquequaque fragile eſt, neq; tam facilè igne liquefit, & poſtquam refrixerit, veluti conglaciatur. πιμελὴ contrà (*adipem* an *pinguindinem* dicas nihil refert) ad ignem celerrimè liquatur, neque apta eſt durari aut concreſcere. Locis quoque diſcrepant: adeps enim inter carnem cutémque ſolet conſiſtere, ſebum in fine carnis ſemper eſt. Huc adde quòd quæ vtrinque dentata ſunt animantibus, tanquam temperamento humidioribus, prouenit adeps: quæ verò cornigera & altera tantùm parte dentata ſunt, tanquam temperamentum ſiccius ac magis, vt ita dicam, terreſtre ſortita, ſebo pingueſcunt.

ἀτιλοῦ φορυτωδέστερος] Lego φορυτωδέστερος. Sic inferiùs cap. 90. ἀλλ' ὀλίγον φορυτωδέστερον. &c.

CAP. LXXXVII. ὕειον δὲ καὶ αἴγειον] Ita legit Oribaſius: attamen ἄρειον, hoc eſt, *vrſinum*, legiſſe videtur Serapio: & hæc quidem lectio, vt Interpretibus aliis, ità mihi quoque magis probatur: tum quia agninus adeps ouillo congener eſt, cuius parandi infrà mẽtio fit, tum quia nullibi in medicina adipis agnini meminit Dioſcorides. Adde quòd vrſinum etiam adipem nuſquam alibi curare docet, cuius tamẽ virium meminit in ſequentibus.

εἰσὶ δὲ ἀναλύσαι] Lacunæ codex, vt ipſe vult, incorruptiſſimus habet, ἀναίνεσθαι. Ego verò non quidem ἀναλύσαι lego, ſed ἀναλύσαι, lapſu vnius literæ perfacili. Eſt verò ἀναλύειν, diſtringere, friare, ſeu in micas frangere, quod Galli *eſmer* dicunt.

φθεῖρας ἀναστομοῦσιν ἀφιεῖσαι] Vel legendum, vt paulò poſt cap. LXXXIX, ἐπὶ τῶν ὑπὸ τὸν πυελὸν φυομένων ἀναστομοῦσιν vel præpoſitio, φθεῖρ. hoc loco περιττεύει. niſi malimus ἐπὶ φθεῖρας τῶν ὑπὸ τὸν πυελὸν ἀναστομοῦσιν, &c.

CAP. XC. ἐκ τυφλώσεως τὸ δὶς ἀφ' ὕδατος] Proculdubiò ἀπὸ τῶν δὶς. legendum δὶς: nam & anteà cap. LXXXVII. δὶς, inquit, εἰς χάραν περιμίσγων τὸ δυσῶδες χωνεύσεις.

CAP. XCI. ὑπὸ ὑγρῶν ὑμένας] Lege σὺν ὑγροῖς, vt habetur aliquoties inferiùs hoc eodem capite.

πῖον καὶ λιπαρὸν] Lacunæ codex habet, πῖον. Ego verò λιπαρὸν potiùs legendum cenſeo, quemadmodum & ipſe Cornarius videtur legiſſe.

χλιαρὸν εἰς κατάπλασιν] Lego, ὑλαῖον, quanquam χαλᾶν *liquorem* ſeu *ſuccum exprimere* ſignificat: ſed huic loco prius illud magis quadrare mihi quidem videtur.

CAP. XCII. φορυτωλέξας] Ita habent codices omnes, in quos equidem incidi: attamen legendum, φορυτωλέξας cum ν, διὸ τοῦ φορυτωλέξαντος.

CAP. XCIII. αἰλουρόμυιαν δὲ ἔνιοι καλοῦσιν] De hoc eodem Leonino adipe ita Plinius, lib. 28. cap. 8. *Magorum*, inquit, *nauitas perunctis eo adipe facikorem gratiam apud Reges populoſque promittere: præcipuè tamen eo pingui quod ſit mœr ſupercilia, vbi eſſe nullum poteſt.* Neque ità multò poſtea *Perunctos eo beſtiæ fugiunt: reſiſtere etiam inſidiis videtur.* Hoc verò ipſum Serapio vrſino adipi, non leonino tribuit: niſi fortè, quod ſuſpicor, error is eſt interpretum Serapionis. *Si quis*, inquit, *vrſino adipe vnxerit corpus ſuum, non timebit malorum hominũ inſultum.* Porro ſimile quodammodo & illud eſt, quod de lupino adipe libri citati cap. 9. refert Plinius: *Maſſurius*, inquit, *palmam lupino adipi dediſſe antiquos tradit: ideò nouas nuptas illo perungere poſtes ſolitas, ne quid mali medicamenti inferretur.*

τὸ δὲ αἰγεῖον εὐθυκίνητον] Galeno minimè probatur, quod hic ait Dioſcorides: ſeuum caprinum proximè memoratis eſſe εὐθυκίνητον, niſi Dioſc. εὐθυκίνητον vſurparit, ἀντὶ τοῦ δριμύτερον. Ac certè quidem ipſum σίαρ, aliàs etiam videtur accipere Dioſcorides, pro *acre eſſe*, veluti huiuſce libri cap. 83. & 84. πικρὸς δὲ σίαρ, tanquam interſit nihil, aſtringens an acre dixeris: cùm tamẽ ſenſus aſtrictionis à ſenſu acrimoniæ ſit longè diuerſiſſimus. Et hac ratione à Galeno reprehenditur Dioſc. tanquam Græcarum vocum ſignificata non pernouerit, vt cui Græca lingua eſſet inſueta. Verùm enimuerò etſi hoc nomine aliàs meritò reprehendi poſſe Dioſc. lubens fateor & agnoſco, attamen ex ipſa ſermonis ſerie facile eſt videre, εὐθυκίνητον hoc loco à Dioſcoride in proprio vſurpari ſignificato: quippe qui ſubiiciat, ea de cauſa dyſentericis conferre. At verò Galenus nõ propterea quòd magis aſtringat, dyſentericis & teneſmoſis ſuillo magis cõferre voluit: ſed quia ille ob craſſitiem citiùs concreſcat: hic verò, etſi acrimoniam magis obtundat, attamen inſtar olei defluat, atque adeò affectibus eiuſmodi minùs conueniat.

ἀμυδρὸν παθυντικὸν] Serapio, ἀναλυτικὸν, legiſſe videtur: quippe qui ſuillum adipem ſale inueteratum paralyſi conferre voluerit: niſi fortè vitium eſt librariorum, aut Interpretis.

ἐχεπίλους ποιῶν] Quod viperinum Adipem pilos ſub alis radicitus euulſos abolere ac renaſci prohibere, itémque ſuffuſionibus mederi ſcripſit hoc loco Dioſcorides, Galenus ipſe falſum experimento ſe compertum teſtatur, 11. ſimpl.

CAP. XCV. Οἱ δὲ δύγκους, ἢ καὶ μὴ &c.] Lacuna legit in vetuſtiſs. codice: Οἱ δὲ [illegible], ὑπὸ αὐτῶν, καὶ ὑπὸ τῶν ἐχεπίλους ἰδίως καὶ [illegible] ἐγρὴ uerò diſcerni poteſt, cuiuſnam ea ſit anomaliæ, niſi ab eo qui ipſam exoſſans uiderit ac repoſuerit. Id etſi verum ac indubitatum eſſe agnoſco, viſum tamen eſt vulgatam lectionem retinere: quippe cùm ex ea verus quoq; ſenſus elici poſſit. Enimuerò velle videtur Dioſc. ęgrè cognoſci, Medulla ſit nẽcne, quæ cruenta ac veluti caro quædam friabilis in oſſibus interdum reperitur. Attamen vtra lectio potior ſit, peritioribus iudicandum relinquo.

ἀπὸ τῶν ἀγρίων καὶ ταυρείων] Hircinam ac taurinam Medullam excipit Gal. 11. ſimpl. quippe qui indurata ac ſcirrhoſa emolliendi vim eas habere negauerit, quoniam acriores ſicciorẽſque ſint.

διαπυητικοὶ] Legiſſe videtur Plinius, ac Interpretes quoque omnes, διαπυητικοὶ, excepto vno

Serapione, qui *sedatiuas esse Medullas* dixit, nulla facta calfactionis mentione. At equidem non nego medullas calfacere, neque ignoro non esse nouum Dioscoridi, primas medicamentorum qualitates secundis ac tertiis subiungere: sed quoniam codices omnes habebant θερμαντικαί, eam quoque lectionem retinere malui. Ac, mea quidem sententia, simplici voce, θερμαντικαί, vtus est Dioscorides pro composita, ὑπερθερμαντικαί: quasi voluerit medullas ad apotherapiam esse accommodatas, scilicet ad eam curandi rationem, quæ quamlibet lassitudinem tollit, virésque reparat, seu ab exercitio, seu ab alia quacunque causa dissolutas. Ea verò curandi ratio quoniam perficitur solidas partes humectando & emolliendo, quę́; in meatibus retinentur euaporãdo: ad hos vtus attrictam Medullam recte accommodari, quis non videt?

ὀβελχώδεσι] Malim genere masculino, ὀβελχώδεσι: siquidem ad μυελοῖς, quàm ad proximum τόποις, referri satius est.

CAP. XCVI. ἀκανθοειδὲς λίθιον] Existimaui aliàs, ἀπὸ τοῦ λίθιος, ἰδέσθαι, aut quid simile legendum: neque enim adduci poteram vt crederem, gallinæ candidæ fel efficacius esse, quàm nigræ. Sed vt nihil hoc loco immutarem, fecit Autoris grauis. Plinij autoritas: qui quidem lib. 29. cap. 6. *fel* quoque *candidi gallinacei* præfert *ad argema, alborugines ac suffusiones*: fortè quia in genere gallinaceo minus sit virium nigris. Sic enim, *multoribus* etiam *nigrum minus esse virium*, scripto tradidit Plinius, lib. citãti cap. 4.

CAP. XCVII. καὶ τὸ τοῦ χαμαιδρυοβατράχου] De viridium Ranarum sanguine, quas brexantas vocant, quod à Dioscoride refertur, experientia falsum comperit Galenus, vti testatur 10. simpl.

CAP. XCVIII. τὸ κατάχρισμα] Addere visum est ex Serapione, quod deesse videbatur, καὶ ἰσχιακοῖς. De huiusmodi autem vsti one, variisque ischiadicos vrẽdi modis, vide quæ fusiùs traduntur ab Aëtio, lib. 12 cap 3. vbi certè quidẽ & hic ipse Dioscoridis locus paulò pleniùs illustratur.

πλαρῷ ἀ]Hoc ciconiarum Stercus comitialibus mederi negat Galenus, 10. simp. facto, vti refert, experimento. Idem quoque pudendum existimat, murium stercus, muscerdam vocant, ad alopecias & irritandã aluum vsurpare, quum ad eos vsus sint nobis ad manum lõgè præstantiora remedia.

κροκοδείλου στέρ.]Fuci è Stercore crocodili terrestris, [illegible]erunt & Horatius & Clemens ipse Alexandrinus. Alias verò stercoris eiusdem vires vide apud Plin. lib. 28. cap. 8. quo loco, *Crocodilean*, ipsum vocari innuit, non crocodili intestina vti falsò credidit Cælius Rodiginus, dũ Plinij verba non satis aduerteret.

ἀλλαντώδεσι] Interpretes omnes rectiùs, ἀλλαντοειδέσι, legisse videntur. Nã & Plinius, lib. 28. cap. 8. de crocodilea verba faciẽs: *Optima*, inquit, *quæ candidissima et friabilia, minumeq; ponderosa*, &c. Quod verò habetur inferiùs, ὄνυξι, non est quòd miretur quispiam ita etiã efferri fœminino genere: veluti alibi apud eundem Autorẽ ἄνυξι, & apud Theophr. μύξαι. Eiusmodi enim compositæ, apud Grammaticos communia censentur.

καὶ χοιζοντες ὑπ' ὀλίγον ἀγχόνης] Hunc locum sic descriptum reperit Goupylus in manuscripto codice: καὶ χοιζοντες ὑπ' ὀλίγον ἀγχόνης, ὅτ' ἀμφὶ τοπίνοιο πέσῃ ἀπὸ σκιδνάμενον: quam sententiam Hermolaus & Marcellus expressérunt: ac nos quoque manuscripti codicis lectionẽ illam potiorẽ duximus. Quæ verò ad capitis calcem Latina fecimus, nõ habentur apud Serapionem, Marcellum, Cornarium: in antiquo tamen codice sic ascripta reperit Goupylus: ἀσθματικοὶ δὲ ξηραὶ σικύαι μάλιστα φυσητῆρσι καὶ ὑστερικοῖς τοῦ πάσσοντος, οἷς καὶ ὑπὸ πυρός, σικυαζομένοις βοηθοῦσιν οἱ κέρατες διαφόρως. Ald. cod. in nothis, αἰσυλοφύτοις διαφόρως. Hæc, quanquam fortè perperam è margine in contextum translata, etiam ab Hermolao expressa sunt, & ex eo loco ab omnibus ferè Medicis descripta.

CAP. XCIX. δάκνει τὰ θαλάσσια] Non ignoro serpentes haberi marinos, quorum sint plura variáque genera: at nullum tamen est (quod equidem sciam) quod viperæ marinæ nomẽ sibi vendicet. Quin neque vsquam alibi viperæ eiusmodi marinæ mentionẽ fieri existimo. Quare cum Marcello & Cornario de marinis echinis hoc accipere, & ἰχνοι hoc loco legere malim, quàm ἰχθύσι cum Serapione cęteris que Interpretibus: maximè cùm & ipse Plinius de Vrinæ humanæ viribus agens, lib. 28. cap. 6. scribat in hæc verba: *Sua cuique* (quod fas sit dixisse) *maximè prodest, confessum per fusso anus morsu, echinorumque spinis inhærentibus*. Porrò cùm ita se res habeat, hoc ipso loco ἀπὸ τοῦ δάκνει, πατάσσει seu πάσσει, legendum puto: neque enim echini, scorpiones draconésque marini dentibus morsúve, sed aculeo feriunt.

ἀφηβοποίας οὐρίζει] Vrinæ impubis pueri potu minimè liberatum orthopnoicum quendam asserit Galenus, lib. 10. simpl. neque etiam eius vsum ad orthopnœam curandam tantoperè necessarium esse ait, cùm copiosa suppetat sylua medicamentorum, quę huic medeantur affectui, Auicenna tamen illius potu nonnullos sanitati restitutos commemorat.

ὅτι τοῦ χρυσίου κόλλα] Chrysocollę factitiæ conficiendæ rationem quoque tradit Gal. lib. 9. & 10. simpl. Quin & ipse Dioscorides eius parandæ rationem lib. 5. repetit.

ὑρπετώδεσι οὐρίοις] Eius vrinæ ὑπόστασιν, quam ὑποπίτυδα vocat Dioscorides, erysipelatis veris minimè conuenire docet Gal. proximè citato libro, vti neque vllum medicamentorum calidorum & acrium: nisi cùm, refrigerato restinctóque erysipelatis ardore, ad resoluentia digerentiáque transire tempestiuum est.

ἄχρι τοῦ καὶ ὠτιάσει] Cum doctis. Cornario legendum putaui, ἄχρι τοῦ καὶ ὠτιάσει: & ita quoque Serapio legisse videtur. Neque verò in hydrope, quę ὑπὸ σάρκα vocant, opus est vrinas per aluum extrahere: sed pituitam potiùs, quæ per vniuersi corporis habitum sparsa est, aut ad vrinæ vias, aut ad ipsam aluum deriuare.

CAP. C. πάσσοντος] Addendum putaui, μᾶλλον πάσσοντος, quo meliùs ista cum sequentibus cohærerent: redditiua enim particula, δὲ, tale quid desiderari significabat. Sic de salamandra anteà, cap. 67. agens Dios. μᾶλλον, inquit, πατάσσει μὴ καίουσα.

CAP. CI. σίμβλου θαλάσσιου] Non ignoro σίμβλου seu σίμβλος nomine apum alueare significari, vnde dici possit σίμβλιον μέλι, ad differẽtiam mellis aërei aut arundinacei: quasi quod intra

alueum apes mellificauerint. Attamen hoc loco τὸ ἁλῶδες legere malim, quàm ἁμάλιον, vnà cũ cæteris Interpretibus. Est enim Hybla mons Siciliæ, cognomini ciuitati proximus, thymo abundans, adeóque Mellis laudatissimi prouentu celebris: vnde & apes Hyblææ & Hyblæa mella tantopere prædicantur.

διαχεόμενον] Legêre Marcellus & Ruellius, διαυζόμενον. Mihi nõ placuit vulgatam lectionem immutare: maxime cùm vnicuique cõstet, etiam foris secus adhibito, melle non parum iuuari antedictas inflammationes.

ξηροδερμικὰ πάθη] Sunt qui legant, ξηροδερμικά, eadẽ propè significatione: nisi quòd ξηροδερμικὰ voce peculiarter siccriores pustulæ designantur. Hermolaus Barbarus & Ruellius legisse videntur, ἐρεθιστικὸν ὄζον. Marcellus, ἐρεθιστικὸν πάθος: quã enim Plinius *eribaum* seruata Græca dictione nominat, illi cum Gaza *uragnem* interpretantur. Sed annotat Goupylus in vetustis exemplaribus scripturam ita esse depraua tam, vt non facile sit eam restituere. Attamẽ *ex Plinio*, ait ille, *intelligi potest hanc fuisse ueterem scripturam*, ἐρεθιστικὸν ὄζον. Sunt enim hæc Plinij verba lib. 11. cap. 26. *Tertium genus mellis minimè probatum syluestre, quod ericæum uocant. Conuehitur post primos autumnos imbres, cum eriza solã floret in syluis, ob id arenoso simile, &c.* Mihi verò non abs re alienum videtur, vt Mel illud hybernum, seu adhibitum seu assumptum, papulas illas excitare possit. Enimuerò quoniam adhibitum sua crassitie meatus ita obstruit, vt excrementa fuliginosa exhalare minimè permittantur, quidni hæc intra cutim retenta pustulas tales excitent? assumptum verò quidni & idem præstet qua præditũ est acrimonia, quemadmodum & quotquot alia inter acria alimenta recensentur? Cæterùm Vetus Interpres exemplar habuisse videtur, in quo hæc tantum verba essent: ἢ χλιαίνει πικρότερον, χεῖρον.

Cap. CIII. κατ' ἔτος ἑκάστου] Quibusdam annis, ait Plinius, lib. 22. cap. 13. ibidémque rationẽ subdit, cur nõ omnibus annis mel pernicio sum existat. Sed & noxium illud virus, quod Heraclio melli accidit, floribus tribuit aquosis vere marcescẽtibus herbæ, quæ ab exitio quidem iumentorum, sed præcipue caprarũ, ægolethron appellaretur. Ea vero, aconitum fuerit nécne, peritiores iudicent.

μετὰ δὲ ἁλὸς] Cum aloë fugillas emendari, legimus apud Plinium, lib. 21. cap. 13. sed vitio librariorum fortassis *aloë* habetur, pro *sale*.

Cap. CIIII. καλάμου δίκην ἐκ τῶν ἄκρων] Saccharũ priscorum, quod Archigenes à salis similitudine Salem Indicũ appellauit, ex iisdẽ arundinibus, è quibus & nostrũ, excipiebatur: circo μαλάμης Arriano dictũ. Sed illud spõte extra arundines iam senio cõfectas lacrymæ aut gummi modo concrescebat: hoc nostrum, succus est è tusis ipsis arundinibus expressus: à quo quidem coctus, in formas pyramidales hodie cogitur.

Cap. CV. λευκαίνει δὲ] Ceram candidam hoc modo factam, Punicam Vitruuius videtur appellasse, itémque Plinius: quanquam hic paulo aliter eius conficiendæ modum tradit, lib. 21. cap. 14. Aëtius eandem variis in locis κηρὸν ἀλόητον nominat, voce, vti videtur, à Latinis derivata, quòd tractando inalbuerit: etsi Phauorinus in suo Lex. nullo, quod equidem sciam, exemplo πραπίζω, τὸ λευκαίνειν καὶ καθαρίζειν interpretatur.

Cap. CVII. ὅσα μὲν πύρνα οἱ σεμιδαλοῦται] Frumentum Græci σῖτος nominant, è cuius generibus est Triticum, isdem πυρὸς dictum. Huius duo sunt genera, à sationis tempore distincta: nẽpe quod autumno, & quod vere seritur. Hoc simpliciter Triticũ appellãt, illud trimestre seu sitanium. Sed rursum Tritici duo recẽsentur genera: vnum, quod Columellæ & Varroni robus dicitur, durum, densum, solidum, ponderosum, quódq; tum intus tum foris rutilo colore splendet. Alterum, quod leuius & candidius est, ac interiori medulla laxius. Latinis siligo dicitur quam quidẽ Plinius propter candorẽ & in mandendo suauitatem commendat, quanquam sine virtute & pondere esse fatetur. Columella eius quidẽ speciem in pane præcipuam esse concedit, sed Tritici tamẽ vitium esse censet: quippe cùm Triticũ vliginoso loco satum anno tertio in siliginem degeneret: vnde & illud constat, Gazam olyram Græcorum, perperàm siliginem interpretari. Porro quod trimestre diximus, Græci quoq; τρίμηνον seu τρίμηνιαῖον πυρὸν dixêre, quoniam tertio à satione mense, locis certè quidem calidioribus, maturescat & metatur. Idem (fortasse quia nonnulla quoque sunt, testibus Galeno & Plinio, διμηνιαῖα καὶ τετραμηνιαῖα) illi ἀπύρους, seu potiùs ἀπύρινον nominant, quasi ἔαρινον, hoc est, *hornum seu hornotinum*. Illam eum vocem apud Hipp. Galenus, Comm. 2. in lib. περὶ ἄρθρων, tex. 44. itémque in gloss. exponit, τὸν ἐν τῷ ἐνεστῶτι ἐνιαυτῷ, ἤγουν, τὸν νῦν ἐπὶ καρποῦ ἐόντα, *quod est præsentis anni, nempe uere, satum*: ἔαρινον enim Ionica lingua significat, ὡς τὸ νῦν τὸ ἔτος, pro quo Attici τοῦτο τὸ ἔτος dicunt. Cæterùm huiusmodi Triticum etsi ab eo quod autumno seritur forma ipsa differre videtur, ad siliginem tamen propiùs accedit: nam *robusta frumenta*, inquit Columella, *semper ante hyemem seri debent*.

τοῦ δὲ ἐκ τῶν σεμιδαλίτεων] Vt panũ differẽtias à coctura varia peritas impræsentiarum omittamus, quinque panis genera facere videtur Gal. 1. de alim. fac. quæ quidem à triticeæ farinæ partibus variis primaria differentiæ nomina acceperunt. Siquidẽ Tritici partes quædam sunt tenuiores ac puriores, aliæ crassiores impuriorésque: quas quidem omnes inter se commixtas tota farina continet. Purissima ac tenuissima, quæq; ab omnibus furfuribus exactè repurgata est, Latinis *siligo* dicitur. Veteres enim eo nomine non modò alteram illam Tritici speciem, sed hanc quoque designant à furfuribus depuratissimam ex Tritico ἀκροθινίῳ, *generoso*, farinã, quam Plinius *tritia delicata* appellauit, proprio vero ac peculiari sibi nomine *pollinem* (siquidem Celsus pollinis nomine sordidã, impuram ac furfuraceam farinæ partẽ intellexit: alius verò, vti Marcello, pollen tenuissimus puluis est magis quàm farina, qualis circa molas pistrinorúmque parietes visitur.) Græci ἄλευρον, à Latinis mutuata voce, appellant, proprio, vt ait Galenus, nomine destituti. Ex huc farinæ portione conflatus panis, μάζιμος Græcis dicitur. Latinis *siligineus* ou *primarius*: interdum etiam, vti Athenæo, ex-

f

πυρὸς, quasi purus: eúmque scribit Paulus esse, τὸ πλεῖστον εὐφυέστατον, hoc est, *plurimum præ cæteris alimenti præstare*. Quæ vero farina tenuis quidem est, sed siligine impurior, vtpote ex qua non omnes, sed crassiores tantùm furfures excussi secretique sunt, σημίδαλις Græcis, Latinis *simila* seu *simulago* appellatur. Et ex ea quidem panis conficitur, Græcis σημιδαλίτης dictus, Latinis *secundarius*: quippe qui in alendo secundas ab illo teneat: quam ob causam secundum quoque bonitatis locum inter panes illi Galenus assignauit. Qui tertium in alendo locum obtinet, Græcis interdum μίνυς, aliàs αἰσυπνείτης seu αἰσύπυρος dicitur: quoniam conficiatur ex tota tritici molis exactius fracta substãtia, non discretis inquam pollinario furfuribus. Ita enim dicitur, ὅτι μηδὲν ἔλαττον αὐτὸς ὁ πυρὸς αἰσυπνείτης διατηρεῖται, *quòd merum ipsum triticum, nulla sui parte adempta, in panificium cedat*. Idem ob farinæ cum furfuribus commixtionem, Dioscor. συγκόμιστος dicitur: quasi qui omnia secum ferat, quippe cui nihil sit ademptum. Supersunt γύμροι duo genera, quæ infimius parciúsque antedictis alimẽtum exhibent. Ex his qui minùs est sordidus, excussa nimirum mollissima purissimáque farina, quartum locum obtinet, & Athenæo quidẽ ἀγοραῖος, quasi *gregarius*, Celso Latinisque aliis *cibarius*, seu *aurr*, dicitur. Festus Pompeius *cæresium* nominat, qui seruorum olim erat cibus: vti, teste Iuuenali, Sat. 5. qui *tener ac nouum mollique siligine fultus* erat, *seruabatur domino*. Quintus omnium sordidissimus infirmissimúsq;, quippe qui minimùm nutriat, Græcis πιτυρίας seu πιτυρίτης aut πιτυρώδης, Latinis *furfurem* aut *furfuroſus*, siue *furfuraceus*. Hic magnam partem extis tritici constat, quæ Græci ἀφαιρώματα & πίτυρα, Latini *furfures*, *amylea* & *apludas* vocant: ac in canum fere gratiam confici solet. Pacuuius iccirco *amylæum* dixit, à canum cibo, vti Festus annotat. Sordidis hisce & is annumerandus venit, qui olim ex polline frumenti tenuissimo ad molæ parietem adhærescente, indéq; multis cum sordibus detersо, vt veriùs pulueris quàm farinæ nomen mereretur, confiebat. Hæc paulò fusiùs explicare visum est, quod hasce panum differentias omnes apud varios Autores variè confundi animaduerterem.

CAP. CVIII. Τὸ δὲ ἐρυσὶ &c.] Isthæc meritò dubitaueris vtrum ad κριθὴ, an verò ad ἄλευρον modò dictã, referri sit satius. Equidẽ de Hordeo seu integro, quod ἄλευρον vocãt, seu etiã decorticato, at non satis cocto, hæc tradi existimauerim: quandoquidem ptissanam constat inter Medicos, siquidem probè cocta fuerit, neque flatulentam esse, neque stomacho aduersari: quoniam si quam habebat anteà flatuum gignendorum vim, facilè longa coctione deposuit, quando scilicet plurimùm inter coquendum intumuerit. Quin & Hipp. libro de vict. rat. in acutis, qui quidem ptissanæ laudibus dicatus est, ideóque de ptissana quoque inscribitur, hanc aie neque astrictionem habere, neque malam turbationem, nec denique in ventre intumescere. Porrò ἐρυσὶς vox deducta videtur Athenæo, lib. 10. ἀπὸ τοῦ ἐρύειν, quod est, tundendo deglubere, seu pinsendo decorticare, &. αὖῶ seu αὐῶ, quod interpretatur EVstathius, ἀλετρεῦω seu ἀλετῶ κριθὰς βεβρεγμένας, Hesychius verò, ἀπὸ τοῦ ἐρύω. Id autem etsi frugibus omnibus, vti oryzæ, chòdro ac tritico, ac nonnunquã etiam leguminibus quadrare possit: πλεονάζει tamen simpliciter dicta, de Hordeo semper intelligitur, quod suo sit castratũ cortice, *mundatum* vocant Officinæ. Ea verò variè in ægrotantium vsum, teste Galeno, præparabatur: fuit enim alia ptissana non colata, quæ ptissana tota dicebatur: alia verò colata, quæ Græcis ἀπόκρισις χυλὸς, hoc est, hordei purgati cremor seu succus dici consueuit.

τὸ δὲ ἐξ αὐτῆς ἄλφιτον] Perperàm hauddubiè habetur hoc loco ἄλευρον, αὐτὸ δ', ἄλφιτα, veluti patet ex ipsius Plinij verbis, lib. 22. cap. 25. Is enim de polenta olim Romanis ignota verba faciẽs, *Ad stomachum*, inquit, *vtilis, aluum sistit, impetusque rubicundi minuit*. Aluum verò quidni sistat, cùm & ipse Galenus polentam exiccandi vi maxima pollere meritò dixerit? Enimuerò ἄλφιτον, Latinis *polenta*, est ipsa hordei tosti farina, quod tamen, priusquam torreretur soléue exiccaretur, aliquoties aqua aspersum fuerit, quemadmodũ ex Plinij verbis licet colligere. Galenus ex optimo & recenti, seu adhuc viridi, hordeo mediocriter frixo laudatissimam simul & suaueolentissimam polentã parari tradidit. Sic & Plinius, lib. 18. cap. 7. *melioremque polentam*, inquit, *fieri tradunt, si non exacta maturitate tollatur*. Cæterùm ex polẽta, humido aliquo (aqua nimirum, vino, oleo, melle, sapa aut horum simul aliquot) permixta & subacta maza fieri solebat: vti è cruda hordeacea, ac interdum etiã alia quapiam, farina ex hydrelæo soluta, quæ Græcis ὑδρόλαια dicta est: quanquam Pelagonio & Absyrto autoribus, ὑδρόλαια mistura sit æqualis fœnigræci, seminis lini & farinæ hordei.

CAP. CIX. πυθίζουσι δὲ τὰς κριθὰς] Zythum non simpliciter ex hordeo præparatur, velut innuere videtur Dioscorides, sed ex hordeo postquam aqua maceratum intumuerit, germináque ceu ligulas emiserit, torrefacto: quo modo bynen præparari docuit Aëtius. Theophrastus 6. de causis pl. ζῦθος seu ζῦθος AEgyptiis appellatum, ex hordeo simul & tritico fieri tradidit. Porrò Zytho nõ multùm dissimili is fuit potus, quem sequenti capite κόρμα nominat Dioscorides: veruntamen paulò aliter præparari solitum sit mihi verisimile. Cæterùm & hæc & alia omnia ex hordeo potus genera, ἑτεροειδῆ οἴνου κράσιν nomine Græci complexi sunt: quoniã iis gentes pleræque vini loco vtebantur, quemadmodum & hodie cereuisiæ variis generibus.

ἐλεφὰς δὲ καὶ ὁ ἔλαφος] Hoc ipsum videtur confirmare Plutarchus, libello inscripto, Num ad infœlicitatem improbitas satis sit, totidẽ verbis καὶ γὰρ ἐλέφαντα τῷ ζύθῳ μαλακὸν ὄντα καὶ χαλῶντα τὰ μέλεα καὶ διαφθείροντα. ἄλλως τε δὲ ἀνάγκη hoc est, vti vertit Interpres: *ebur zytho liquefactum ad omnem dactum sequax flectitur, ac formas diuersas suscipit, alioqui immane*. Id tamen Amato falsum videtur: quauis ab iis, qui eburnea instrumenta fabrefaciunt, ebur cere nisi macerari testetur Cornarius. Cæterùm vide nunquid voce ἐλέφαντος ὑποκρινάμενος deceptus Plinius scripserit, lib. 8. cap. 2. *elephantos optas alterius hordei fuisse mutationi*.

CAP. CXI

CAP. CXI. ὕπνος] Sic Oribasij Interpres. Cornarius verò, ἀνήμερος, legendum censet: quoniam ita quoque legit & citat Gal. 1. de alim. facult. Ac ita etiamnum in vetusto quodã Dioscoridis codice legisse se refert Lacuna. Ego verò Zeam, quam à præstantia, ni fallor, semen nominat Plinius, ἀνήμερον quidem esse facilè admitto: attamen simul etiam ὕπνον, hoc est, *ori gratum* esse minimè negauerim.

Manuale lacunæ desiderium, quæ reperiet Lector hoc loco scholiorũ pag. 13.

† †

C. CXVIII. ὁ δὲ χόνδρος] Vt Latinorũ alicæ, ita & Græcorũ χόνδρου vox est æquiuoca. Nam & frugẽ tritico similẽ ita dictã ea voce significari certum est, & confectionem præterea, quam alicam Latini & recentiores Græci, mutuata à Latinis voce, interdum ἄλικα, alias coniunctim χόνδρον ἄλικος nominauerunt. Quanuis porrò χόνδρος & alica pleriſque Medicis planè vna eadémque res factitia esse videntur, aliquid tamen inter vtranque vocẽ discriminis fuisse sat innuit Paulus: quippe qui non tantùm lib. 1. cap. 78. varias vtrique vires tribuat, sed & aliis locis non parum multis distinctè χόνδρου & ἄλικος mẽtionem faciat, ac vnum pro altero subſtituat. Discrimen autem illud Paulo, vel in ipsa materia fuit, quasi χόνδρον quidẽ è tritico fortassis, ἄλικα verò è zea confici existimauerit: vel in ipsa præparatione, sic vt ἄλικος nomine alicam propriam ac genuinam intellexerit, quæ simpliciter parabatur, χόνδρον verò, cui ex miſtione aliorum color teneritásque accersebantur. Chondrus enim dum præparabatur, vt tenerior candidiórque foret, gypso & arena repurgari solebat, vti patet ex Constantini Geoponicis: aliàs creta candorem perfectionémq; suum assequebatur, vti etiam constat ex Plinij verbis, lib. 18. cap. 12. Vtvt sit, Græcam Chondri vocem hoc loco retinere malui, quã cum cæteris omnibus, *alicam*, aut cum Plinio, *granum*, vertere. Cæterùm χόνδρος qui Dioscoridi sit è zea dicocco, Theophrasto fieri etiam solitus dicitur ex hordeo syluestri: Plinius verò è zea quoque in Africa degenerante fieri, ac tritico etiam adulterari voluit: hanc vtranque ideò alicam adulterinã cognominat. Sed præter ista alicæ genera, quæ pro materiæ ex qua fiunt diuersitate, aut varia etiã præparatione discernuntur, sunt & alia ex contusionis varietate, atque etiam cribri farinarij per quod succernuntur angustia maiore minoréve distincta: siquidem, Constantino & Plinio testibus, vnum est minimum idq; primarium, quod per cribrum angustissimum excutitur: alterum secundarium, quod huic succedit: tertium grandissimum, apharema appellant.

σιγωλικήτερος πολίκης] Citra cõparationẽ cum Oribasio lego, σιγωλικώς. Nec enim fit verisimile Chondrum, qui priscis in ægrotãtium cibo tantoperè commendabatur, oryza fuisse σιγωλικώτερον.

CAP. CXIX. εἰς σίκυους πεπανθέν] Milium etiam, ceu siccis fotibus dolore vrgẽte adhibendis accommodatissimum, commẽdat Hipp. lib. 2. de vict. ratione in acutis, quia sit κοῦφον & εὐστόμαχον, hoc est, *leue ac lene*. Sic quoque Plinius, lib. 22. cap. 25. quoniã sit, inquit, *leuissimũ mollissimúmque & ciborũ aptissimum*.

CAP. CXX. Ὁ ἀπὸ τῶν ῥιζῶν] Cercalibus seu potiùs frumentaceis semiſsibus annumerari Panicum, scribit Dioscorides. Columella itidem lib. 2. cap. 9. Inter frumenta milium & Panicum reponit. At Galenus lib. 6. simpl. ἐκ τῶν ἐμπίπλων, hoc est, *e genere leguminum*, esse prodidit: in quo non satis accurate ἑκάστου τῶν ἀπὸ διίστασθαι esse videtur, maximè cùm ipsemet lib. 1. de alim. ἑκάστου definierit, ἐκεῖνα εἶναι δυνατὸν ἀπὸ τῶν ἀκρίδων ἐξ ὧν ἄρτος πλάττεται, hoc est, *semina illa cerealia è quibus panis munus conficitur*: ibidémque tum è Panico tum è milio in penuria cæterorum frumẽtaceorum panem confici non negauerit: attamen εὐχυμότερον καὶ ψυχρὸν, hoc est, *pauca & frigidi alimenti*.

ὕπνον ἐνεῖναι.] Contrà Galenus milium quàm Panicum minùs aluum cohibere scripsit, lib. 1. de alim. fac. his verbis: κριθῶν δ' ὄντος τοῦ μὲν ἐλύμου πυκνοτέρους τοὺς χυμοὺς, καὶ οἷον ἐπιπλάττοντος, καὶ στυφτικῶς ἔχοντος, & τοῦ δὲ κενοῦντος τὴν γαστέρα, καὶ μᾶλλον τρέφοντος, &c. hoc est, *Ad omnia milium Panico præstantius & in cibo sanius, concoctu facile, manuſque aluum cohibet: at nutrit amplius*.

CAP. CXXI. καὶ τισὶν ἀλγήμασι καὶ ὑπάρχου &c.] In nonnullis codicibus manuscriptis scribit Lacuna legi, ἀποπλάσσουσι καὶ ὑπάρχουσι: in aliis verò tantùm, κατάπλασσι. Marcellus & Plinij autoritate, lib. 22. c. vlt. & meliorũ, vt ipse ait, Dioscodicum fide nixus, pro, καὶ τισὶν (seu potiùs τίλοις) ἀλγήμασι, legit ἀποπλάσσουσι, &c. hoc est, *fullonum*. Ibi enim Plinius inter cæteras Sesamæ dotes, eam stellionis morsibus resistere tradiderat. Veruntamen communem lectionem retinere maluimus, maximè cùm Auicennas & Serapio eidem lectioni astipulentur.

CAP. CXXII. καὶ ἀπχίμου ἀγρίου] Plinius isthæc aliter ac nos, sed perperam, meo quidem iudicio, distinxisse videtur. Nam AEtinã farinã cũ raphano, sale & aceto ad lichenas: ad lepras verò, cum sulphure viuo accommodat.

καὶ ἀφάρπη] Non omnino inepta est Marcelli coniectura, qui pro, ἀφάρπη, ἀφαλλη, hoc est, *bitumine*, legendum existimat: attamen & hoc loco vulgatam lectionem cum Serapione retinere visum est.

CAP. CXXIII. τὸ ὑποπίπτον πίτυρον] Rectiùs, ὑποπίπτον, meo quidem iudicio. Nam potest probè contritam Amyli materiam, affusa aqua verisimile est sursum attolli quicquid est furfurum: densiorem verò tritici substantiam in imo subsidere. Tùm verò innatantes furfures incerniculo vel cochleari crebris foraminibus pervio, quod inceniculi vicem gerat, tolli oportere Autor admonet.

καὶ οἷς ὑγιείαν] Aldinus mendosè, οἷς οἷς ὑγιείαν. Ego, προσγίνεται, addẽdum puto, aut certe genus immutãdum. legendúmque καὶ οἷς &c.

σαπὶς ἔστιν] Hermolaus Barbarus perperam legisse videtur, σίαπις, siquidem interpretatur, *adipis modo*: neque enim crediderim σαπὶς vocem pro sebo aut adipe apud Autorem vllum accipi, quicquid scribat Gorræus.

CAP. CXXIIII. οἷς φλεγμονὰς καὶ ὀγκους] Cui inflammationum generi conueniat Fœnum græcum, rectè distinguit Galenus, dum illo feruentes phlegmonas irritari docet: at curari quę minùs sunt calidæ magisque duræ, propter eam qua pollet discutiendi vim.

χλωρὸν δὲ μᾶλλον ἔχοις αὐτοῦ τὸ] Isthæc omnia

ad capitis vsq; calcem etiã in Serapione desiderantur. Interim vide an vox ,πίτυς, de quibusuis corporis particulis Medicorum more debeat intelligi, an verò restringi ad πὶ τὰς ἐπὶ ἐντέρων πίτυς, de quibus paulò antè. Plinius certè quidem *fœnigræci decoctum vulvæ mulierumque exulceratæ vtilissimum esse* prodidit.

CAP. CXXVI. ἀμφότερα δὲ τὰ διυρημένα] Gal. 6. simpl. med. agnoscit omnia Ciceris genera vrinam prolicere: attamẽ arietino, quàm cæteris, maiorem in ciẽda vrina efficaciam tribuit. Subdit nihilominus paulò pòst, Cicer agreste ad omnia domestico efficacius, hoc est, tũ calidius tum siccius, quantum ex acrimonia & amatore licet coniicere.

CAP. CXXVII. μίσυς θερμὸς & ψυχρὸς] Dioscorides aut potiùs qui ex manuscripti codicis margine in contextum hæc verba transtulêre, Fabam volunt esse in calore & frigore temperatam. Attamen Galeni, Pauli, Aëtij & cæterorum ferè omnium Medicorum communi cõsensu, mediocriter frigida & sicca iudicatur: nisi fortè, quod vult Cornarius, apud eos Autores εἰς τὸ ξηραίνειν reponendum, θερμαίνειν.

ὑπὸ ψυχροῦ.] Desiderari hoc loco videtur continuatiua particula, ἔπειτα, aut certè ἀποδοτέον, ὅτι, vt sit ὑπὸ ψυχροῦ ὄν &c.

CAP. CXXVIII. οἱ πίνακες] Legit Ruellius, πίναλοι, quantum ex ipsius versione licet colligere. Mihi verò πίνακες lectio magis arrisit. Siquidem etiam Theophrastus de huius eiusdem Fabæ foliis scribit in hæc verba, lib. 4. cap. 10. Τὰ φύλλα τοῦ μεγέθους πίλῳ Θετταλικῷ ἴσα ἐστίν. hoc est, *folia magnitudine galerum Thessalicum æquant*. Rursumque de loto paulò pòst agens: ὁ δὲ κύαμος (inquit) ὁμοίως τῷ τῆς κυάμου, καὶ οἱ πίνακες δὲ ὁμοίως. hoc est, *Huic natura cauli similis fabæ, & pectasi similiter*: quanuis alij πίναλα, hoc est, *folia*, alij καρπὸν, hoc est, *fructus*, legunt. Cæterùm Plinius illa eadem AEgyptiæ fabæ folia, personatæ foliis comparare maluit, quę tamen etiam esse πίνακα nemo negauerit.

φύσιν ἔχοντα] Nihil immuto, quanuis σπυρία, hoc est, *nesparum sinus* seu *cellulas* aut *loculos*, legisse videantur plerique Interpretes, verbis Theophrasti fortassis nimiùm addicti: qui quidem de huiusce fabæ fructu ita scribit, ὅλη δὲ τούτου ἡ κεφαλὴ παραπλησία σπυρίῳ ἐστὶν ἐκτὸς, καὶ ὁ ἔγκυος ἐν αὐλάκων τισὶν μικροῖς ὑπὸ μίαν ἑκάστην πίτυν. hoc est, *supra hunc* (nempe caulem) *calyx extat nesparum sinu orbiculato persimilis, ac in singulis cellulis singulæ insuntur fabæ, quæ paulò amplius superemineat*, &c. Hunc verò Theophrasti locum iccirco citaui lubentiùs, quòd me admonuit pro nomine, μικρὸς, in Dioscoride, μικρὸν aduerbium esse reponẽdum. Hęc enim Faba si cum fabis vulgaribus comparetur, magna potiùs quàm parua dici debuit: maximè cùm fabam Græcam, vt habetur inferiùs, magnitudine superet: conceptisq; verbis scripserit Strabo, lib. 17. Geogr. figura quidẽ fabam Græcam imitari, at magnitudine gustúque differre.

κυλίσκια δὲ καλοῦσιν] Ciborij, hoc est, poculi ab inferiori parte in angustum contracti ex AEgyptia faba confici soliti meminit Strabo, 17. Geogr. qui & eodem libro testatur, adeò magna fuisse AEgyptiæ fabæ folia, vt poculorum & catinorum vsum præberent, aptam ad id habentia cauitatem. Plinius quoque lib. 21. cap. 15. AEgyptios tradit *implexu colocasiæ foliis in mariam speciem nasorum potare gratissimum habuisse*. Attamẽ κύαμος seu κύαμον nomẽ, non quidem foliis, sed ipsi fabę tribuere videtur hoc loco Dioscorides, vti & Gal. lib. de Ther. ad Pamph. Aëtius quoque lib. 1. Viridem fabarum AEgyptiarum fructum *Ciborium* appellari scribit.

κεκοσμημένα κολοκασίῃ] Colocasia neutro genere extulit Virg. Eclog. 4. Itidémque ex Nicandro & Diphilo Athenæus, lib 3. & Aëtius, lib. 1. qui quidem κολοκάσιον etiam alio nomine μανζήλιον appellat.

CAP. CXXIX. ἰσχὺ συστελλικὸν.] Sic & Gal. 8. simpl. φασὶ σύφειν μὲν ἰσχυρῶς. &c. hoc est, *vehementer quidem astringere*. Sed contrà de iisdẽ Aëtius, libro 1. σύφειν μὲν οὐκ ἰσχυρῶς, *astringunt quidem non valdè*: id quod etiã sensisse videtur Paulus, dum de ipsis scribit in hæc verba, lib. 7. ἔχειν δὲ καὶ σύφειν. hoc est, *obtinere & astrictionis quidpiam*. Attamen illa in speciem pugnantia recte conciliari possunt: si dixeris hos de Lente decorticata egisse, illum verò de eadem suo vestita cortice. Etsi enim tota Lens astrictoria vi pollet, nihilominus cortex reliqua substantia vehementiùs astringit, aluúmque sistit: idque austeræ qualitatis ratione, qua quidem maiore præditus est, vti testatur idem Gal. lib 1. de alim. Quòd si primarium Lentis decoctum aluum subducit, vti & brassicæ, id ex diuersæ facultatis mixtione accidit. Siquidem Lens, quemadmodum & brassica, duplici constat substantia, vna quidem tenuiore, quæ in ipsa superficie residet, altera verò crassiore, quæ solidæ substantiæ inhæret: ac illa quidem in primario decocto vires suas exerit, longiore verò coctura planè deperit.

τὰ κύπιον Θηβαϊκῶν] Cum Cornario legendum censeo, τὰ κύπιον τὰ φοινίκων Θηβαϊκῶν. Neque enim vsquam alibi pyrorum Thebaicorum occurrit mentio. At palmularum Thebaïcarum, quæ huic instituto satis accommodatę sunt, tum Galenus, tum & ipse Dioscorides aliquoties meminerunt.

CAP. CXXXI. τοῖς λιπωσι] Contrà Gal. lib. 1. de alim. facult. inter Orobos, qui candidi sunt minùs ait esse medicamẽtosos iis qui ad flauum pallidúmve colorem recedunt. Attamen & ipse 1. de Antid. in parãdis trochiscis scilliticis, Erui candidi, tanquàm minùs amari, farinam desiderat.

ῥᾶιν ὄξει] Serapio, aut certè ipsius Interpres, Eruum aqua simul & aceto respergit: sed quam rectè, Lector ipse viderit.

κεκληρώμενα] Lacuna in veteri codice legit, κεκριθώμενα. quam quidem lectionem lubẽs amplector: nec enim durities sisti, sed emolliri potiùs desiderat.

φυσώδεις] Rectiùs ἀνυσώδεις, nimirum ἄλυρον. Nam de erui farina & hæc ipsa & quæ sequuntur, vsque ad, τὸ δὲ ἀπόζεμα, accipienda sunt: atque ideo etiam inferiùs rectè habetur, φυσώδη λυσῖται, neutro genere.

CAP. CXXXII. μικρὸν πυρίου καὶ πυρίνου] Ita legisse videtur Serapio: μικρὸν πυρίου δὲ καὶ πυρίνου πλεῖον ἐν ὑγιεινοῖς ἐσθιόμενα. quæ quidem lectio mihi magis placuit: quandoquidẽ particula, δὲ, non

satis rectè cum præcedētibus connecti mihi videtur. Quòd si constare debet vulgata lectio, addenda hæc necessariò: ἐν δὲ καὶ τὰ ἀγχόμενα ἀκαθαίρει, ὄζει &c. Galenus itidē, sexto simpl. de Lupini eiusdem decocto verba faciens: ἀκαθαίρει δ', inquit, καὶ ὕπερ ἢ καὶ ἰῶνται νεφρῖτις καὶ πνεύμονος ἕδρας ἔχοντα λαμβανόμενον. hoc est, *expurgat & hepar & lienem, cum ruta & pipere iucundissimè gratia sumptum.*

πικρῶν] Sic visum est ista distinguere: καὶ ὄζει δ', ἰχῶδες πάντως τὸ φυσᾶσθαι δὲ καὶ χειμάζεσθαι μᾶλλον. Nam & Plinius, quo loco de Lupinorū viribus agit, hæc ita coniungit, *Panos & strumas mundum aut maturant, &c.*

ἀλλαλουάριον] Aliàs, ἀλλαλούιον. Plinius eiusmodi decoctum pecorum scabiei, non lotione modò, sed & potu, mederi voluit.

CAP. CXXXIII. καὶ τὸν ἄγριον δὲ μικρόπικρος] Sic Plinius lib. 22. c. 25. *sylvestres Lupinos* dicit *omnino modo nocere stomacho, præterquàm amaritudine.* Attamen Gal. lib. 6. simpl. vt efficaciores, ita etiam amariores esse prodidit: quæ fortè causa fuit, vt nonnulli αἱρεῖ τὸ, μικρόπικρος, πικρότατος, hoc loco legerint.

CAP. CXXXV. διαπίλου τὸ ἄγριος] Serapio ac ipse quoque Ruellius, πάνυ, legisse videtur. Ego vulgatam lectionem retinco: verùm ista non foliis, sed radici potiùs, cuius alioqui non meminit Autor, tribui iudico: ita vt desideretur vox, ῥίζαν. Coniectura nostra valeat nēcne, quisque iudicet.

ἔστι δ' ἀλίβιλον γένεται] Plinius lib. 20. cap. 3. de Rapo syluestri agens. Hoc, inquit, *ad lauigandam cutem in facie atque corpore utuntur, mistis urinæ parti mensuræ. Erui, hordei, tritici & lupini radix ad omnia mutatio.* Quem locum ex hoc Dioscoridis contextu paucis immutatis sic emendo: *mista farinæ pari mensuræ erui, hordei, tritici aut lupini. Radix ad omnia mutatio.*

CAP. CXXXVI. μᾶλλον] μᾶλλον ἢ, ὅ, τι aut quid simile puto legendum: neque enim redditur ratio, cur Bunias minùs quàm rapum alimēti suggerat. Porro contrà lenire videtur Diphilus Siphnius, Athenæo teste, lib. 9. quippe qui Napum, ceu rapo dulciorem, & magis alere & concoctu faciliorem esse inuuat: rapum verò, quod γογγυλίδα nominat, extenuare, acre esse, ægriùsq; coqui asserat: vnde & minus alimenti præbere facilè quiuis inferre possit.

CAP. CXXXVII. ὅπως αὐτὸν ὀπταμβαίη &c.] Gal. lib. 2. de alim. fac. notat tum vulgi, tum etiā Medicorū errorē, qui crudas Radiculas à cœna esitabant, iuuandæ concoctionis gratia: quibus quidem verbis Dioscoridem obiter carpere videtur, quippe qui hoc loco ita sentisse videatur, idque tum roborandi ventriculi, tum cibi distributionis adiuuandæ gratia. Simeon Sethi discrepantes hasce sententias adhibita distinctione componere nititur: dum quibus aluus facilè subducitur, quíque flatibus carent, ijs vult exhibendas ante cibum Radiculas: contrà verò à cibo, ijs qui flatibus laborant, quibúsq; cibus in ventriculo supernatat, ac etiamnum difficilis est aluus. Veruntamen neque hoc ipsum quenquam citra damnum experiri posse, cum Galeno crediderim. Cæterùm quoniam quæ Athenienſibus *ραφανὶς* dicitur, aliis nonnullis, vti & Callix apud Athenæum *ῥάφανος* appellatur; id obiter admonitum Lectorem velim, *ῥαφανον* vocem pleroſque antiquiores Græcos, vt ex Apollodoro Caryſtio docet idem Athenæus, lib. 1. pro braſſica vſurpaſſe: vnde Plinio errotis anſa, qui variis locis Raphanum cum braſſica confundit, Raphano tribuens quæ Veteres illi de braſſica prodidēre: quemadmodū & lib. 19. cap. 15. napis tribuit, quæ Theophraſtus, lib. 7. hiſt. cap. 4. περὶ ῥαφανίδων, hoc eſt, de Raphano, tradidit.

ὡς ὠμὸν μίσυος] Sic Plinius. lib. 19. cap. 5. de Raphanis: *Crudos*, inquit, *Medici suadent ad colligenda acria uiscerum dandos cum sale ieiunos esse, atque ita nomitionibus præparare meatum.* Attamen & ipſe ſui velut oblitus, lib. 20. cap. 4. *eosdem uomitum sumno cibo esse utilissimos* ſcribit.

CAP. CXLI. δύναμιν δὲ ἔχει πλείω αὐτῶν] Iiſdem quidem, at imbecillioribus, præditum eſſe viribus fatetur Gal. 7. ſimpl.

CAP. CXLIIII. φαρμακικὴν δύναμιν] Blitum nequaquam vult Dioſcorides, nullius eſſe in medicina vſus, quemadmodum plerique intellexerunt: ſed tantummodò, nulla eſſe præditum qualitate medicamentoſa: quia, vt ait Plinius, iners ſit ac ſine ſapore aut acrimonia vlla. Alioqui nanque varios Bliti medicos vſus recenſet Plinius: ac ipſo quoque Hippocrates in vellete ſubdito vtitur, 2. de morbis mulierib. ad reſiccandum fluxum mulierē. Sed fortè fuit aliud Hipp. Blitū, à Dioſc. Blito. Nam & Hipp. lib. 2. de diæta Blitum facit ἡμῖν, ὑ ὑγροτάτην. hoc eſt, *aliduin minimēque aluum ducens*: cùm tamen Blitum hic ſcribat Dioſcorides eſſe ἐὐσίτιον. i. *bonam faciens alnum.* Galenus verò, ὑγρὸν ἐν ψυχρῷ τῷ κράσει, hoc eſt, *humidum, temperamentoque frigidum.*

CAP. CXLIIII. ὑπάρχοντι πᾶσι χυμοῖς] Contrà Diphilus Siphnius apud Athen. lib. 2. tradit, ſylueſtrē hortenſi meliorē: attamen in genere Maluam agnoſcit eſſe boni ſucci, arteriam aſperam lenire, acres in corporis ſuperficie ſuccos educere, tenum & veſicæ irritationibus prodeſſe, excerni denique facilè ac mediocriter alere.

μαλάσσει δὲ ὑγρὸν] Vetus, μαλάσσει ἁπλῶς μαλακτικὸν, *cum dicit mouere*: at idem Dioſc. 1. ὑλικῶν c. 104. μαλάσσει ὑγρόν, *cum lolio*: ac ſic etiam Aëtius, tetrab. 2. ſer. 2. cap. 68. Apollonius tamē apud Gal. 1. de comp. med. κ. κ. Maluam exiccatam & contuſam vrinæ inſpergit & afficat ad achoras.

CAP. CXLVI. ἀμβλυωπίαν ὁ βοτρύς] Hoc AEgyptiacæ tantummodò Braſſicæ tribuere videtur Serapio, ſed perperàm, niſi fallor. Galenus verò 2. de alim. fac. tantùm abeſt vt cæcutientibus Braſſicam prodeſſe voluerit, quemadmodū ſcribit hoc loco Dioſc. vt contrà diſertis verbis ab eadem, æquè ac à lente, oculorum aciem obtundi exiccationis ratione tradiderit: niſi fortè, velut addit eo loco Gal. totus oculus humidior fuerit, quàm naturalis habitus poſtulet: nec malè. Tunc enim eatenus conferre poteſt, quatenus humidiorem oculum ad mediocrem temperiem reducit. Quin & ipſa planta Græcis κράμβη dicta videtur, quaſi κεραμβὴ, ἀπὸ τοῦ κέρας ἀμβλύνον, *quòd pupillas oculorum hebetet.* Ac in hac quoque ſententia fuiſſe Columellam hoc ipſius carmen luculenter teſtatur:

Hanc ueniæ quamuis oculus inimica crambe.
Attamen præter Dioſc.& ipſe Plinius, lib.20. cap.19. ex ſententia Catonis *Braſſicam oculorum caligini prodeſſe, & repentinas caligines leuare* voluit: itémque alio loco eiuſdem lib.cap.9. *cibum oculorum claritati conferre multùm: ſuccum uerò crudæ angelu uel tenerum tectu cum Attico melle plurimùm.* Verùm hæc vera tùm demum fortaſſe fuerint, cùm oculi iuſto humidiores extiterint.

ὑδὲ ἐν Αἰγύπτῳ] Sic Plinius, lib.20.c.9.de Braſſica: *in Aegypto propter amaritudinem non eſtur.* Sed & Diphilus Siphnius apud Athen. libro 9.amaram ſcribit oriri in Alexandria: quod autem ſemen in Alexandriam è Rhodo fertur, in annum efficere braſſicam dulcem, ſed quæ poſt id tempus pro natura loci amareſcat.

καὶ πρὸ τῆς κραιπάλης] Effectus huiuſce ratione, Græci Braſſicam ἀνακαυσιακὸν vocant. Traditur & in Geopon. è Lycurgi lacrymis, quem Liber pater vitibus alligauerat, natam Braſſicam, eámq; propterea vino aduerſari. Porrò Braſſica non tantùm poſt cibos ſumpta crapulam diſcutit, quod voluit hoc loco Dioſcorides, ſed & ante eoſdem ebrietatem præcauet: vti lib.20.cap.9. refert Plinius, in hæc verba: *vino eam aduerſari, ut inimicum nitibus, ac antecedẽte quidem in cibu, ebrietatẽ auerti: poſtea uerò ſumpta, crapulam diſcuti.* Sic & Cato de re ruſt.cap.156. *Braſſicæ*, inquit, *in conuiuio multum bibere, comedéreque bibentur, ante cenam eſto crudam quantum uoles ex aceto. Et item ubi cenauerit, comeſto aliquid v. folia: reddent e quaſi nihil edero bibériſque, bibeſque quantum uoles.* Eam ob rem etiam narrat Athenæus, lib.1.circa finem, *Aegyptios ex uetuſtate olim id fuiſſe ſolenne, ut ante alia omnem Braſſicam elixam in cœnu comederent. Sibari* ea quoque, vti refert idem ex Timæo, *antequam potarent, eſu Braſſicæ ſeſe munirent. Sed & multi*, inquit ille, *ne ab ebrietate uindicarentur, ſemen Braſſicæ præſumunt. Quam & quamuis Braſſica naſcatur; minum exitus eſſe reperitur.* Hæc ille de Viris & Braſſicæ antipathia: quibus conſentanea ſunt quæ de eadem traduntur à Theophraſto, ſub finem lib.4.de hiſt.Plantarum.

τὸ δὲ κύμα τοῦτο] Plin.lib.20.cap.9. *Ex omnibus braſſicæ generibus ſuauiſſima eſt cyma cæſi mutilo habetur, difficilis manducatu, & ventribus contraria.* Eiuſmodi porrò cymas, étiam ἀνθύλλια καυλοῦ videtur nominaſſe Galenus, lib.10.κατὰ γεν. quo loco, contrà quàm Plinius, eorum decocto ἀκινδύνως ſanari nephriticos ex Antiocho teſtatur.

Cap. cxlvii. καὶ κοκκυδίαν κτλ.] Hæc etiã ex cauſa Braſſica hæc ſylueſtris ſeu erratica, niſi fallor, Petræa quibuſdam vocatur, teſte Plinio: vti EVdemo apud Athen.lib.9. ἁλμυρὰς, quòd ſcil. locis ἁλμυροῖς, *maritimis* prouenerit. Eadem porrò & ipſi Plinio, loco modò citato, propriè appellata *Crambe* dicitur. Hæc rurſum vt eidem illi EVdemo cæteris Braſſicæ generibus, neſcio quàm rectè, ſaporis gratia præcellere dicitur: ita Theophraſto & Catoni efficaciſſima maximéq; medicamentoſa, ipſi verò Plinio, inimiciſſima vino, cenſetur.

Cap. cxlviii. φύλλα τοῦτο] Par.codex. φύλλα χρήσιμα. Aldinus codex legit, μαγεῖα: pro quo μαγεῖα reponendum contendit Matthiolus. Interpretes præterea ferè omnes poſt μαγεῖα, λαπάθια, legiſſe videntur: quæ tamẽ vox in codicibus noſtris deliderat ur. Dalechampius σκεύεσιν legit, ἀλλὰ τῶν, ἀλφίτων. At in tanta lectionum varietate veteris exemplaris, quod præ manibus habuit doctiſs. vir Sambucus, fidem ſequi maluimus.

τοῦ λάπαθος ἢ τρίβ.] Arietinum adipem ad retundendam Braſſicæ marinæ acrimoniam vnâ cum ipſa coquere ſolitos nonnullos, hæc verba ſignificant. Attamẽ cum cæteris Interpretibus, τρίβ. quàm τρίβ. legere maluimus.

Cap. cxlix. ἐμφανὲς δὲ καυλ.] Betam candidam, quam Siculam quidam nominant, ſcribit Theophraſtus, hiſt.lib.7.cap.4.præſtantioris eſſe quam nigram ſuci, verùm pauciorĩ ſeminis. Diphilus autem apud Athen.lib.9. Betam in genere aſſerit, meliorem quàm braſſicã ſuccum gignere: ſed candidã magis aluum ducere, vti nigram, vrinas. Plinius vtriuſque remedia recenſens, lib.20.cap.8. nigram tradit in totum efficaciorem: quanuis & ipſe candidam, niſi fortè validiùs coquatur, ventrem mollire, vti nigram vrinas ciere, fatetur.

Cap. cl. ἴσχει κοινωνίαν] Pena αἰτὶ τῆ, κοινωνίαν, legi voluit, διαφορίαν. Serapio vtrunque & φαινεῖ & κοινωνίαν legiſſe videtur: nec malè. Vtraque enim facultas & refrigerans & aſtringens meritò portulacæ conuenit, quanuis aſtrictoria paulò eſt obſcurior. Atque ideò quoque Galenus de portulacæ viribus agens, eam tradidit κινοῦσαν, καὶ ὀλίγον τοῖς αὐτοῖς μετέχ. hoc eſt, *leuiter aſtringere, & aliquantulum abſterſoriæ qualitatis participem eſſe.*

Cap. cli. Ἀνθέμιχα ἀγρία] Marcellus & Matthiolus hoc caput de Portulaca ſylueſtri hoc loco prætermiſerunt: neque etiam habetur apud Serapionem. Ac certè quidem è libro quarto perperam huc tranſlatum videtur: quanuis non ignoro Portulacam haberi ſylueſtrem, hortenſi & figura & facultate proximam: à qua manifeſtò diſcrepant telephium, peplis & tertium ſedi genus: quæ tamen omnes plantæ apud nonnullos ſylueſtris portulacæ nomen obtinuerũt. Sed ea cuius hîc fit mẽtio, veriùs tertium eſt ſedi genus, quod idcò quoque rectius alio loco à pleriſque inter ſedi genera poſitum eſt. Nos tamẽ caput idẽ bis repetere maluimus, quàm vel tantillum à vulgato exemplari diſcedere. Cæterùm αἰτὶ τῆ πανίσ ες, μαχίνες cum Lacuna legendum cenſuimus. Nam & ita legitur lib.4.cap.90. quo quidem loco totidem ferè verbis hoc ipſum caput reperitur.

C. cliii ὑπωκάθιον] Fortè μυκάθιον, vt habetur infrà, lib.3.cap.de cepa, & apud Plin.lib. 19. c.8.vel μυκαίθριον, vti legitur apud Galenũ.

οὗ δὲ καυλὸν] Legunt Marcellus & Lacuna, οὗ δὲ καυλὸν ὑπ' ὀλίγον ἐφεδίου καὶ βραχίου: quam quidem lectionem nos lubenter amplexi ſumus. Sic quoque Serapio legiſſe viſus eſt. Quin neque aſparagi longiorem coctionem ſuſtinẽt: atque inde manauit Octauio AVguſto vſitatũ prouerbiũ, vti refert Suetonius, ad exprimendã rei feſtinatæ velocitatem, *Velocius quàm aſparagi coquantur.*

ἐμοὶ δὲ δοκοῦσιν] *Inuenio naſci*, inquit Plinius loco modò citato, *& arietis cornibus tuſis atque defoſſis.* Sic & Autor γεωπονικῶν, ex ſententia Di-

dymi: *Scilicet asparagum prouenire voluerit, asperum syluestrium cornua tenuissime contusa sulcu communito, & rigato.* Addit & quosdam amplius quid & παραδόξον prodere, nempe, *Si magna asperum cornua perforentur & pangantur, asparagos producere.*

ὑμὴν δὲ αὐτοῦ ἐσχάτης κτλ.] Marcellus & Fallopius isthæc, quæ sequuntur ad capitis vsque calcem, redundare, ac ceu cuiuspiam addititicium glossema perperam in Dioscoridis contextum irrepsisse suspicantur: quia fortasse κοτυληδὼν seu κοτυληδὼς vocem, quæ in vetustis codicibus proximè præcedere comperitur, haudquaquam animaduerterant. Sed spretis, ceu haud ita firmis, quibus illi nituntur argumentis, existimo priore capitis parte de Asparago syluestri, tanquam præstantiore & efficaciore, Autorem egisse: hanc verò posteriorem satiuo tribuisse, & huius fruticem describere, ceu illo minùs notum: quandoquidem *quas syluestres feerat Natura asperulas* (hæc sunt Plinij verba, lib. 20. cap. 10.) *ut quisque demeteret passim*, non ita pridem fortassis *alales* spectari cœperât. Etsi porrò, vt impræsentiarum communiora illa κοινότερον seu ἁπλούστερον significata omittamus, Asparagorum propriè ac peculiariter à potiori parte ita dictorum varia tum apud Medicos, tũ apud ipsos historiæ variæ Scriptores statuuntur genera: eò tamen omnia reuocari rectè possunt, vt alij dicantur sponte, alij cultura & arte prouenire. Qui quidem inculti sponte nascuntur, μυκητίζοντες dicti, Latinis *asperulæ*, vel in montibus alisve petrosis locis, vel in palustribus nascuntur, proindéque alij ὄρειοι, alij πεδιάδες, alij denique ἅλιοι cognominantur: ac ex illis rursum quidam in ἀκανθώδων censu reponuntur à Theoph. hist. lib. 1. cap. 16. qui quidem spinas gerunt pro foliis. Plutarchus in coniugial. præceptis hoc genus ἀσπαραγώδεις seu ἀσπαραγοειδεῖς videtur nuncupasse. At qui ἡμερῖδες, hoc est, *satiui*, dicuntur, seu κηπευτοί, hoc est, *hortenses*, à prioribus agrestibus minimùm spinosis non nisi cultura & molliore natura distinguũtur: atque horum primores cauliculi, maximéque qui crassiores habitioréque forent, Regiorum, nisi fallor, nomen apud Galenum, lib. de alim. 2. cap. 9. sibi vendicarunt.

πολὺ φοινικώδης] Ex sententia Interpretum omniũ legimus, πτοιώδης. sic Plinius, lib. 20. c. 10. *Asparagorũ tum semen, tum etiam radicum lumborum & renum dolores sedare prodidit.* Quin & ipse Dioscor. alteram Asparagum, Latinis *asperulam* dictum, βοηθῶν νεφριτικοῖς admonuit.

πεῖσαι κύειν καὶ ἄγονον] Fortè ἄκυον. Qui verò id fiat, nempe vt radicum Asparagorũ decoctum partum impediat sterilitatémque afferat, nõ satis video: cùm Auerroes & Simeon Sethi Asparagos augere sperma tradiderint: Auicenna verò præterea addiderit, coitum eos adiuuare & conferre difficultati imprægnationis: nisi fortè alia est Asparagorum, alia radicum vis. Plinius certè quidem, citato loco, *Asparagos Venerem simulare* docet: nec ita multò post, *Veneris causa aquam eorum decoctum bibi ad heminam: ad idem & semen malere cum anetho vernix utriusque obolo*, &c. Et hæc fortasse de causa Asparagus syluestris Atticis ἀφροδισιώνης dictus est, διὰ τὴν ἀφροδίτην, *quia Venerem excitat*, æquè ac περὶ τὰ ἀφροδίσια τίθεται βλαστάνων, *quòd ad germinationẽ properet.* Attamen idem ipse Plinius, sub finem capitis, Chrysippo autore semen Veneri, contrarium esse testatus est.

Cap. cliii. καὶ μακρόπους] Oribasius legit, μακρόπους, hoc est, *longiora*. quæ quidẽ lectio mihi non omnino improbatur. Enimuerò Plantaginis maioris folia lata quidem sunt, at non adeò longa: minoris verò folia pro portione longiora simul & angustiora visuntur.

καυλὸν δὲ χρωμένη] Lege, καυλὸς δὲ χρωμένῃ, vel χρωμένη. Alioqui ista de foliis accipienda essent, quasi voluerit Dioscorides ea iam à suo pediculo angulosо in terram procumbere: atque καυλὸν pro foliorum ipso pediculo vsurparit.

λαχανώδης] Sunt qui cum Lacuna λαχανώδης *betaceum* vertant, quasi Plantaginem betæ similem esse innuat Dioscor. quòd, vt ipsi volunt, beta κατ' ἐξοχὴν Athenienſibus λάχανον diceretur. Alij, vt apud Latinos *olera*, ita & apud Græcos λαχάνου nomine *Brassicam* potiùs designari maluerunt. Ego verò, λαχανώδης, hoc loco *oleraceum* vertere malim: itáque dictam crediderim Plantaginem, vel quod oleris modo feratur ac fruticet, vel potiùs quòd oleris vsum præstet. Nam & inferiùs hoc ipso capite, Plãtaginem λάχανον, hoc est, *olus*, appellare non dubitat: nec ita multò pòst, eam vice betæ cum lenticula coqui solitam testatur.

Cap. cliiii. ὑποκλάδιον] Speusippus secundo similium, folia nõ quidem hipposelino, sed heleoselino, hoc est, *apio palustri*, assimilat, teste Athenæo 2. Deipnos.

Cap. clvi. κατακλάσεις δ' ἔλαττον] Lege, κατακλάσεις, vt respondeat ei quod paulò pòst habetur, ὑποκλάδιον. Alioqui φύλλα addendum, legendúmque ὑποκλάδιον.

Cap. clvii. μαχίμους μὲν οὖν] Quia nonnulli codices, vti etiam vetustus Lacunæ & Catacuzenus, μαχίμους habebant, *aliàs* τὰ πεπτικὰ, ita quoque legendum iudicaui. Attamen si Crithmi, seu, vt legitur apud Galenũ, Crethmi, nomine designatur ea planta in maritimis nascens, quę vulgò portulaca marina nuncupatur, vox illa πεπτικὰ etiam constare rectè potest: siquidem huius, quàm vulgaris portulacæ, folia latiora conspiciuntur.

ὡς πυρρὸν ὄν] Quoniam Plinius de Crithmi semine verba faciens, lib. 26. cap. 8. candidum id intus nucleum habere prodidit, non πυρρὸν, hoc est, *fulvum* seu *russum*, sed πυρὸν potiùs, id est, *tritici granum* cum Lacuna legendum duxi. *Habet*, inquit Plinius, *semen nucleum candidum, quem aliqui cachryn nomine.* Scilicet, vt mihi quidem videtur, ei nucleo id nominis erat inditum ab hordeacei fortè grani similitudine, quod κάχρυς etiã interdum appellatur, quódque à tritici grano non ita longè dissidet. Cæterùm Plinius vel πεπτικὰ legisse videtur, quia nuclei mentionem facit, vel potiùs πεπτικὸν, quoniam feruens etiam eiusmodi semen esse tradidit: quod quidem libanotidis semini, cachryi seu canchyi itidem appellato, rectiùs fortasse conuenit.

Cap. clviii. κατακομιστέον δὲ φύλλα] Ruellius cæteríque Interpretes legisse videntur, κατακομιστέον, quos etiam ſum imitatus. Quin & Plinius Coronopodis, quam herbarũ aculeatarum

ordini accenſet, fiſſuratum mentionē facit, cap. 19 lib. 22. Sic quoque legit Oribaſius. Huc & illud accedit, quòd quid per κατηχματισμένον, id eſt, *figuratum* aut *figuris diſtinctum ſolum*, Dioſcorides deſignare voluerit, non ſatis aſſequi poſſum.

καλλιακοῖς πινοῦσι] Ita Galenus & Aetius ſcripſere, Coronopodis radicem cœliacis auxiliari: nec malè, quia ſit aſtringendi facultate prædita. Sed Paulus, non cœliacis, ſed colicis conferre tradit: niſi forte id errore librarij factū eſt, quod facilè crediderim. Nam mihi non vſquequaque ſatisfacit quod ait Cornarius. Pauli verùs quàm librarij errorem eſſe: quia cùm priùs alaudam colicis conferre ſcripſiſſet, mox ſubiunxerit Coronopodem itidem colicis opitulari, hiſce verbis: Κορωνόπους ῥίζα καὶ αὐτὴ πινομένη κολικοῖς ὠφελεῖ ὁμοίως. hoc eſt, *Coronopodis radix & ipſa ęſtuoſis colicis iuuare creditur.* Enimuero, καὶ, ad poſterius illud ὁμοίως rectiùs, quàm ad καλλιακοῖς, ſiue potiùs καλλιακοῖς, referri puto. Siquidē quemadmodum ad colicos affectus eſtiari dixerat alaudam, quidni rectè ſubdere potuit, ita quoq; radicem coronopodis ad cœliacos ſimiliter in cibis vſurpari? Cæterùm pro, ἄμμων, quod ſub finem capitis legebatur in vulg. Dioſc. exemplaribus χάμαι, optima ratione lego, vnica mutata litera, idq; cum Marcello ac cæteris ferè omnibus Interpretibus.

Cap. clix. σκαλὶς δὲ γογγυλίδος] Marcellus addit ὑπόλευκος. quæ vox etiam apud Oribaſium reperitur. A Ruellio quoque & Cornario non eſt prætermiſſa. Quin & Plinius, lib. 22. cap. 22. *atrumque Sonchum* tam album quàm nigrum (ita enim ille diſtinguit, *mule eſſe cubitali, angulofo, mitis anno*, memoriæ prodidit.

ὁ δὲ ἥμερος σόγχος] Cum priùs de Sonchi tum lævis tum aſperi, ſeu ſpinoſioris, figura & viribus coniunctim facta fuerit mētio, tertium hoc loco deſcribi Sonchum meritò mihi ſit veriſimile: qui itidem ſit ἁφόρμιος, hoc eſt, *mollis ac tener*, ſeu *delicatus*, ad differentiā τῶν ἀγρίων καὶ ἀκανθωδῶν, i. *ſpinoſiorū*. Adde quòd tertium eiuſmodi Sonchi genus, quod ad arboris naturam accedat, agnouiſſe ſeſe Cordus & Anguillara profitentur.

Cap. clx. Σέσελις ἄγριος] Vulgatam hanc lectionem cùm haud dubiè confuſam & depravatam animaduerteret Mathiolus, ita legendum cenſuit: Σέσελις ἀγρία καὶ ἥμερος. ὧν ἡ μὲν ἀγρία ἄγριος καλεῖται, ἡ δὲ ἥμερος, καὶ πολύκλωνος καὶ διπλασιόκορπος τῶν κοπτῶν. τῶν δὲ κοπτῶν ἄλλοι εἴδεσι, &c. Ego verò ita potiùs legendum iudico. Σέσελις ἄγριος, ἀγρία καὶ ἥμερος. ὧν ἡ μὲν ἀγρία πολύκλωνος, ἡ καὶ πολύκορμος καλεῖται. ἡ δὲ ἥμερος, πολυφυλλοτέρα καὶ διπλασιόκορπος τῶν κοπτῶν. τῶν δὲ κοπτῶν ἄλλοι εἴδεσι, &c. Hoc modo Intubus vnus ſylueſtris ſeu erraticus, & ſatiui duo deſcribuntur: illo verò, ſylueſtres duo, è quibus vnus ſatiuus ſeu domeſticus dicetur, & hortenſes totidem: quaſi verò (quod planè ineptum eſt nimiúmque ridiculum) ſatiuum intybum ab hortenſi diſtingui oporteat, ac non potius vnus idémque ſit ſatiuus & hortenſis, ἥμερος καὶ κοπτός. Porrò cum Oribaſio & Marcello nō διπλασιόκορπος, vti habebatur in vulg. exemplaribus, ſed διπλασιόκορπος legimus: & ita neceſſariò etiam ex veteſti codicis fide legendum eſſe, patet ex iis quæ ſequuntur. Alioquin admitteretur in hoc eodem Dioſc. capite manifeſta contradictio. Quandoquidem non ita multò poſt, ſylueſtrem Intybum ſubiungit ſtomacho vtiliorem, quàm ſit ſatiuus ſeu hortenſis: in hæc verba: καὶ μᾶλλον αἱ ἀγρίαι διπλασιόκορποι.

ὀπτικὸς δέ] Forte rectius, ὀπτικὸς, κατὰ τὸ ὀπτικόν, quo modo & cæteri Interpretes videntur legiſſe.

Cap. clxi. ἄμμιον μαγίδι] Lege ἄμμια, vt his ſequentia aptè congruant.

Cap. clxii. πρὸς πυρετοὺς ἐπὶ θερμαίνοις] De febris ardore æſtúque infeſtata ſumma cute iſta intellexêre Plinius, huicq; nimiū addictus Ruellius, cæteníque quotquot occurrêre Interpretes, ac ipſe quoq; Manardus. Enimuero, vt reliquos omittam, Plinius, lib. 20. cap. 3. de Cucurbita agens: *Suauis*, inquit, *ex ſtrigmentis illius cum roſaceo & aceto feruis ardores refrigerat.* Sed eiuſmodi quidem ſucco ſummam cutem refrigerari crediderim, at non itidem ęſtuoſarum febrium ardores. Siquidem inde refrigerata cute, non minùs quàm ab ambiente frigido, per ἀντιπερίστασιν intrò repulſus calor longè magis inualeſcit augeſcitque, nedum imminuatur. Quare mihi Dioſcoridis verba ſimpliciùs multò interpretari viſum eſt, de æſtuis ardoribus peruſta corporis ſuperficie.

Cap. clxiii. ἄμπελος ἄγριος] Contrà Diphilus Siphnius, Athenæo lib. 3. teſte, Cucumerem ſcribit eſſe δυσκατάβατον, hoc eſt, *ægrè per aluum deſcendere.* Sic enim ille: ὁ σικυὸς, ψυχρὸς ὑπάρχει, δυσκατάβατος δὲ καὶ δυσκατάβιβαστος, ὧν δὲ φρονιμώτερος, καὶ ἧττον πικρὸς χολῆς, ἀφροδίσιον τε ἐμπαλίζει. hoc eſt, *Cucumis ut quidem refrigerandi prædictus eſt: at nix tum in corpus degeritur, tum per aluum deſcendit, nuſquéque horrores excitat, bilem gignit, ac Venerem cohibet.* Sed hoc ipſum quod hic poſtremò ſcribitur, Cucumerem Veneris cohibendę vi præditum eſſe, etſi rationi conſentaneum videtur, palàm tamen à Demetrij Ixionis ſententia diſſidet: qui quidem, vti citato loco refert Athenæus, σικυὸν deducit κατὰ τῆς ἀφροδισίου καὶ νοσερᾶς, quia ſit ἐμφορτικὸς, id eſt, *cibo Venus accendatur.*

Cap. clxiiii. τὸ δὲ βρέγμα αὐτοῦ] Non ignoro eſſe qui βρέγματος vocē de Peponis ſumma parte interpretentur, vti non deſint alij, qui pro cortice ſeu corio accipiant. At ego errorem librarij eſſe conijcio: & cum Ruellio αἰὼ τῶ, βρέγμα, legendum potiùs ſuſpicor, ξέσμα ſeu ξύσμα, quemadmodum habetur cap. de cucurbita: quo loco etiam cucurbitæ ramenta ſtrigmentáve ad eundem infantium affectum Dioſcorides accommodauit.

μηλίδες ἀλεύρου] De radicis, ſeminis aut carnis etiam ipſius farina intellexêre Plinius, ac ipſe quoque Galenus. Nanque Plinius, lib. 20. cap. 2. de radice Peponis in farinam tuſa ſcribit in hæc verba: *Hæc farina & in ſtrigmata adiuuat.* Gal. verò 8. ſimpl. arefactis poſteáque contuſis cribratíſque Peponis radicibus & ſeminibus ad illuſtrandam faciem στιγμασι ſeu ἐπιγμασι vice vtitur. At Serapio de farina ipſa, frumentacea ſcil. hoc intellexiſſe videtur: quē nos, dum fœliciùs ipſa Dioſc. verba reddere conamur, hac in parte ſequi voluimus. Etſi verò ἄλευρον ſeu ἄλευρα generaliter de quahbet farina dicitur, ferè tamē ſine adiuncto, pro frumentacea triticeáve fari-

na, accipitur.

CAP. CLXVI. ὑπολήγουσαν] Naturam Lactucæ refrigeratricem tribuit quidē Dioſc. de qua non eſt qui dubitet, at eam certè modicam. Ac eodem forte ſpectat illud Gal. 6 ſimpl. *Lactucam refrigerare quidem, at non extremè, (ſiquidem edendo non ſiret) ſed maximè ſecundum aquæ fontanæ frigiditatem.*

κοιλίας μαλακτικαί] *Alvum ſopioſiores Lactucæ ſoluunt, modicæ ſiſtunt*, inquit Plin. lib. 20. cap. 7.

εἰσὶ πικραί] Hīc Ruellius verba iſta interſerit: *Inflammationibus & ignibus ſacris opitulantur*, quaſi apud Dioſc. hoc loco legerit, φλεγμοναῖς καὶ ἐρυσιπέλασι βοηθοῦσι. Et apud Serapionem quidem, vt & apud Gal. iſtas vires Lactucæ tribui non negauerim.

CAP. CLXVI. τὸν γάλα] Iſta vſque ad μάνην reſtitui, quemadmodum in veteribus libris ſcribi Goupylus annotauit.

μετ' ὀξυμέλιτος] Sunt qui cum Ruellio & vet. codicib. Goupyli, μετ' ὀξυμέλιτος, legant. At Plinius, lib. 20. cap. 7. habet in hunc modum: *Huius lac ſpiſſatum, mox in aceto pondere obolorum duum, addicto aquæ uno cyatho, hydropicis datur.* Quanquam non ita multo poſt: *Crateuas eum & hydropicis obolo duobus in aceto & cyatho uno dari iubet.* Serapio itidem, ὀξυκράτου, legiſſe videtur.

ἕως ἂν ἀνανθῶσι] Fateor Lactucas, ex Plinio, ambuſtis etiam prodeſſe, priuſquàm puſtulæ fiant, cum ſale illitas. At per ἀνανθῆσαι hoc loco particulatim accipio, quæ Galeno dicuntur ἀνανθοῦσαι, hoc eſt, *oculorum ſordida, impura & cruſtoſa ulcera*: quæ dum repurgantur, ſæpe humores effluunt. Ita enim à Paulo deſcribuntur, lib. 3. cap. 22. quo loco ἄνθεσιν diſtinguit τοῦ βοηθοῦντος, καθαιρούσης καὶ ἀφιείσης. Quin & ipſe Plinius ἄνθεσιν in hunc modum accepiſſe videtur. Siquidem de Lactucæ ſucco agens loco citato, *Sanat*, inquit, *omnia oculorum uitia cum lacte mulierum. Arcet nubeculas, cicatrices ſuffuſionéſque omnes, præcipuè caligines.*

CAP. CLXVII. καὶ ποώδεσιν] Hanc lectionem recipiunt Marcellus & Lacuna. Sed in antiquo codice, vt annotat Matthiolus, legitur μετεώροις: pro quo fortè rectiùs ex Plinio cum pleriſque Interpretum reponas, πικρόποις. Nam ille lib. 20 cap. 5. *Gingidium ſtaphylino ſimillimum* ſcribit, *tenuius tamen & amarius.* Cæterùm Anguillara maiorem ſimul denſitatem ſeu ſoliditatem & amaritudinem agnoſcit. Ita enim ex Crateua legendum cenſet: *ſonnin ſimpliciter ſilueſtri ſimile, ſed maius, & ſpiſſius & amarius.* & παραπλήσιον τῷ κήπου: hoc eſt, *herba paſtinaca quidē ſylueſtri ſimilis, at maior, denſior & guſtu amara.*

CAP. CLXIX. φύλλα ἔχον μικρότερα] Marcellus & Ruellius in codice quodam, quem vitiatū cenſet Lacuna, ita legiſſe videntur: φύλλα ἔχον σελίνου ἡμερήσιον, ἀπ' ἄκρου δὲ μικροῦ βραχέος πλατυτέρου. hoc eſt, *foliis apio ſimilibus & in acumine furculi modo multifidis.* At nobis vulgata lectio magis arriſit, qui pro Cyclide eam herbam minimè recipimus, quam Itali vulgò Petroſelinum agreſte nuncupant.

CAP. CLXXI. σκληρύνων κοιλίαν] Mentem Dioſc. aſſecuti videntur, Serapio, Marcellus, Lætémque Ruellius. At Plinius, lib. 20. cap. 12. *Oximū inflationes & uictum ex aceto ſumptum diſſoluere* dixit: quę, cauſa fuit, vt Cornarius *nihil ſibi uentoſius* Auctor, legendum exiſtimauerit. Veruntamen ſi verum Ocimi herbæ, maximéque recentis, temperamentum attentiùs ex Galeno, lib. 8. ſimpl. conſideres, reperies eſſe è ſecundo calfacientiū ordine, ſed excrementitia humiditate plurima redundare: qua de cauſa illud ab eorum cenſu quæ ore aſſumuntur, remouendum ipſe cenſuero. Quæ verò recrementitia eiuſmodi humiditate ſcatent, facilè conſtat eadem flatus excitare, vt & Venerem ſtimulare. Huc adde quòd Auicennas, lib. de viribus cordis, *Ocimū, ſanguinem turbidum & melancholicum gignere* prodidit: quæ verò talia ſunt, ſimul etiam flatulenta eſſe conſentaneum eſt. Quare vulgatam lectionem retinere ſatius fuerit. Non enim illud me moratur, quòd inferius Autor, *Ocimū ſemē inflatu commodum* eſſe perhibuit. Eſt enim alia ſeminis, alia ipſius herbæ facultas: ſiquidem Ocimi ſemen calfactoriæ & attenuantis eſſe facultatis, præter experientiam, Galenus ipſe teſtatur, 2. de comp. med. κατὰ γένη, cap. 1. Sed eſt & aliud de hoc eodem. Ocimo in Plinio reprehenſione dignum. Quum enim lac prouocare Ocimum ſcripſerit Dioſc. Plinius contrà, lactis prouentum extinguere, affirmauit. Et tamen Ocimo lac euocari, quàm extingui ideò eſt verſimilius, quòd moderatè calfacit, neque tamen exiccat. Rurſum tale & illud eſt Plinij, dum citato loco, *Aſſeri addunt*, inquit ille, *ſi eo die feriatur quiſpiam à ſerpente, quo Ocimum ederit, ſeruari non poſſe*, cum tamen contrarū in capitis calce Dioſc. aſſeruerit: quo loco interim eius verba, de ea ipſa die qua quis Ocimum ederit, accipienda ſunt: quod ipſum à Serapione minimè prætermiſſum fuit.

CAP. CLXXII. φυλλοις ὑπολιπαροῖς] Polia ſubpinguia Orobanchæ tribuit Dioſc. Contrà Plinius, eam ſine foliis eſſe tradidit, lib. 22. cap. vlt. Attamen legitimam Orobanchen circa caulem foliolis ſubpinguibus præditam non ſemel obſeruauimus: in ſummo verò caule foliis paulò latioribus, itidem ſubpinguibus, inter quæ flores ipſi emicant. Cæterùm ab hac Orobanche, Theophraſti Orobanchen planè diuerſam eſſe, ex vtriuſque hiſtoria perſpicere licet: hanc verò illius λειόδωρον eſſe, quam alij λειόδωρον nominare malunt.

CAP. CLXXIII. μίσχος μέλας, καὶ ἐκ κάλυκος πορφυρίς] Ego, variis adductus coniecturis, ita legendum exiſtimo: ἔχει δὲ τὸ κεφαλὴ μίσχος μέλας, & ἐκ τοῦ κάλυκος μίσχος, &c. Nam quòd ad calycis nigredinem attinet, nō fit veriſimile à Dioſc. prætermiſſam, quum eiuſmodi calycem nigrū conſpiciamus, & talē etiam Plinius obſeruauerit. Quanquam ſi quis acriùs vrgeat, & ex Theophraſto μίσχος legere malit, non equidem repugnauero: maximè cùm Plinius Tragopogonis calycem non nigrum modò, ſed & latum eſſe prodiderit. *Eſt & (inquit ille lib. 21. cap. 13.) Tragopogon, quem alij amen uocant, caule paruo, foliis croci, radice longa, dulci: ſuper caulē calyce lato, nigro.* Quantū ad illa verba ſpectat, πορφυρίς μέλας, quoniam conſtare nullo modo poterant, ea prorſus immutare viſum eſt. Quorſum enim à ſemine nigro πορφυρίσκος nomen inditum? quaſi verò non aptiùs dicas, πορφυρίσκος, ſeu hirci barbulam, ex eo ſibi nomen aſciuiſſe, quòd è calycis

ſummo floribus euaneſcentibus pappoſa prodeat cæſaries ſeu comoſa lanugo, cui cum hirci barba nonnullam eſſe ſimilitudinem facile quiuis animaduertit. Quin & huic ſententiæ noſtræ aſtipulantur illa Theophraſti verba, lib.7. cap. 7. εἰ δὲ μίσεα ἄλλα, ὧν οἷς καὶ πραγτέον τὰ καλούμενα, ὅς πλείω μὲν ἔχει μακρὰ καὶ γλιχόμενα δὲ φύεται τῶν πρόσω ἴσια, πλείω μακρόπεζα· τὰ γὰρ κυλοῦ δὲ βραχύ, ὥσ' οὐ πάνυ πόλλης μεγάλης, καὶ δὲ ἄκρον μέγα τὸ μεγάλη πολύν, ἀφ' ἧ καλοῦσι πραγτέον. quo quidē loco itidē pro μεγάλη, μίσυ, legēdum videtur, niſi quis μεγάρα legere maluerit. Totam porrò hāc Theophraſti deſcriptionem iccirco lubentiùs huc transferre viſum eſt, quòd Autoris noſtri verbis ea perbellè reſpondet. Eam verò ſic Latinè reddidimus: *Sunt qui infinitis alia olera nominent, inter alia Hirci barbulam, cui radix longa & dulcis, folia croco ſimilia, niſi quòd longiora ſunt: multa breuia. ſuper quē calyx amplior, & è ſummo vertice pappus canus grandior, à quo ſaltus Tragopogonis nomen accepit.*

CAP. CLXXV. ἀφερπὸς, ἄφυλλος] Attamen teſtatur Athenæus lib.2. ex ſententia Pamphili in Gloſſis, ὑὸ ὀφύλλου herbam Tuberibus ſupernaſci, cuius indicio illa deprehendantur. Plinius Tuber, non radicem, vti & Theophraſtus, cùm radicis forma nulla ſit, ſed terræ potiùs callum, eſſe prodidit. Galenus addubitat, vtrum radicibus an bulbis annumeret.

ὑλύσιμος δὲ ἦν] Diphilus apud eundem Athenæum, loco modò citato, Tuberum illam tradit eſſe naturam, vt ægrè coquantur, attamen laudabilem ſuccum gignant & aluum lubricēt, inſuperque ſubducāt: ſed ex iis eſſe nonnulla, quæ æquè ac ipſi fungi ſtrangulent. At Auicenna melancholicos & craſſos ab iis in corpore gigni humores aſſerit, ſæpiúſque comeſta apoplexiam & paralyſin inferre. Sed & Simeon Sethi, lib. de aliim. ipſa tradit humorem crudum gignere, prauique eſſe ſucci, atque adeò ex ipſorum frequentiore nimióque vſu colicos cruciatus & δυσεντερίαν induci, interdum & epilepſiam aut apoplexiam.

CAP. CLXXVI. καὶ ἅλικες] Meo quidem iudicio legēdum, οἷς ἅλικες, ſeu οἱονεὶ ἅλικες. Cùm enim cōſtet ex Aētio, lib.1. cap. de dolicho, Smilacem hortenſem, à ſmilace læui longè diuerſam, eam ipſam eſſe, cuius fructus illius ætate λόβοι ſeu ſiliquæ, anteà verò ἅλικες ſeu σπάθαι dicebantur: (quanuis de phaſiolis antè proprio capite egerit Dioſcorides) nullis, quod equidem viderim, capreolis ſeu clauiculis eiuſmodi planta donata eſt: ſoli verò caules, prout ſunt graciles atque ſequaces, clauicularum modo ſeſe & perticis & vicinis fruticibus intorquent: ac ij ipſi ſunt qui ſolijs comitati, quæ ex interuallis adnaſcuntur, vſque adeò plerunque excreſcunt, vt in opere topiario vmbraculorum vicem gerant. Quare & illud, περιπλεκόμενος, non clauiculis, ſed caulibus ipſis meritò tribuendum eſt: ac pro eo quod deinde ſequitur, αὐξανομένης, reponendum, αὐξανομένοις. Quanuis enim non ignoro, ἅλικα vocem apud Dioſc. tum maſculino tum fœminino genere promiſcuè efferri: id tamen participium, vti & præcedens, iure meliore ad illud καυλοὶ, quàm ad ἅλικας referendum videtur. Quòd ſi etiam in hortenſia Smilace aliquæ clauiculæ ſeu capreoli, aut viticulæ conſpicerentur, tùm quoque, καθ' ἅλικας, potiùs fortaſſe legendum foret, hoc eſt, *clauicularum ope*: quaſi vellet Autor, Smilacis hortenſiæ caules ſequaci clauicularum flexu atque reptatu vicinis fruticibus implicari atque circumuolui.

ὧν οἷς κατέρματα] Eſt hæc κατέρματος numeri nimiùm è longinquo petita, quanuis τῷ καρπῷ nomine ἰδέαν intellexit: quare legēdum videtur ὧν ᾧ, ſcilicet καρπῷ.

τὰ ἰσόχροα] Hæc dupliciter accipere poſſumus, vel quæ non ſint æqualis omni ex parte coloris, ſed diuerſis variata coloribus: vel, quæ ſint coloris diſſimilis. Quoniam è phaſiolorum ſeminibus alia lutea aut rufeſcentia, alia nigra, alia rubea, alia candida, alia denique variis coloribus diſtincta conſpiciuntur. Cæterùm pro voce quæ ſequitur in vulg. exempl. ἀναπεπλεγμένα, reſtitui, ἀναπεπλεγμένοις. Id ſi minùs placet, legendum ex Oribaſio, ἀναπεπλεγμένα ſeu ἀναπεπλεγμένοις.

CAP. CLXXVII. ὑποφαιόν τε καὶ μελάνον] Non immeritò locus hic Marcello & Cornario ſuſpectus videtur. Equidem legendum iudico, ὑποφαιόν τε μελίκρη, vel ὑποφαιόν τε μελίκρης. Enimuerò Medicæ ſemē (ſiquidem Medica noſtrum eſt fœnum Burgundicum) ſiliquulis corniculorum inſtar intortis concluditur, quales etiam in trifoliis nonnullis viſuntur, quæ ex eo recentiores corniculata cognominarunt.

CAP. CLXXVIII. πονηρὸν μελάνον] Lego, μελάνου, ex omnium Interpretum conſenſu: quibus minimè repugnat quod de Aphaca ſcribitur apud Plinium, lib.27. cap.5.

CAP. CLXXIX. Ἀνίησιν] De eodem Plinius aliter, lib.20. cap.6. *Sic & non nel Veneri ſomnóque multum confert.* Itémque pro eo quod habet Dioſc. ὑπνωτικώτατον δὲ ἡ κοινὴ πᾶσιν ὑπάρχει ἰδιότης, &c. ſic ille: *Capitis aquas mouens coctus aluum ſiſtunt & fluxiones ueteres.* Vetus fortaſſe rectius: *inflationes ueteres.*

ὁ δὲ καρπὸς ὀμιλώπερος ἔχει τὴν &c.] Lego: ὁ δὲ καρπὸς ὀμιλώπερος ἔχει τὴν καὶ ἐσθίουσι. Eſt autem ὀμιλώπερος ὁ καρπὸς, idem quod ὁ τυπὸς, *ſeſtinum* inquam & quaſi *tonſile Porrum*, quod τὸ κεφαλωτὸν opponit Diphilus apud Athenæum, libro nono, voce λόπιμον, hoc eſt, *à tondendo* deducta, eadem analogia, qua σπαρτὸς ἀπὸ τῆς σπείρου. Commiſſus autem fortaſſe videtur hic error per librarij cuiuſdam ignorantiam, qui quid καρπὸς nomine ſignificaretur hæſitans, vocisque affinitate deceptus, καρπὸν audacter nimiùm κεφῶ loco repoſuit, ac ſimul & ſemel articuli genus immutauit. Eundem errorem deprehendas apud Pauli Interpretes. Cùm enim Paulus, lib.5. de re med. cap.2. Porrum cum ſale commendet his verbis, ὁ μετὰ ἁλὸς καρπὸς μάλ' ἁλῶν, illorū alter aduerbij καρπὸν (quod *nulde* ſignificat) affinitate deceptus, *Porrū abunde cum Sale* interpretatus eſt: alter vocem illam καρπὸν in vertendo penitus neglexit. Porrò (vt ad rem) quæ hic proximè ſequuntur de Porro ſectiuo, non de Porri capitato, ſemine accipi debere, tum ex Plinij verbis, lib. 20. cap.6. tum vel ex eo ſatis conſtat, quòd ſuccū è Porri foliis quàm è ſemine exprimi eſt veriſimilius. Sed & Paulus diſertè vires haſce ſuppriméndæ hæmorrhagię, non ſeminis, ſed foliorum ſucco tribuit. Adde quòd Serapio ſidus

plerunque Dioſc. Interpres, ſententiæ noſtræ aſtipulari videtur. Hæc cum ita ſint, ac de vtroque Porro, tum ſectiuo tum etiã capitato, hic agatur à Dioſcor. capitis huius inſcriptioni demere quoque viſum eſt illud, πρασωδέ, quod in vulgatis exemplaribus adijciebatur.

ὀπταλέοιο] Lege ὀπταλέης, ſcilicet κεφάλης. Alioqui iſta cum præcedentibus minùs rectè cohærerent.

CAP. CLXXXI. πνευματοῖ] Sic de Cæpis Aëtius: ἐμπνευματοῖ δὲ τὴν γαστέρα, ὅτι ἐν παχυμερεῖ τῆς οὐσίας. hoc eſt, *ventrẽ inflãt, quod ſubſtantia illarum craſſarũ ſit partium*, vnde fortaſſe fit vt ægrè coquãtur. Gal. verò 7. de ſimpl. med. fac. eius euentus cauſam aſcribit ſucci temperamento, qui quidem aqueæ eſt & aëreæ caliditatis. Attamen idem ipſe, primo de Alim. facult. quominus flatulentæ ſint fabæ, ijs Cepas, tanquam calfaciendi tenuandíque vi præditas, admiſcet.

ἐρέξιος ἀκαλήφου] Ruellius in opere de ſtirpibus, quò Dioſcoridem à contradictione vindicet, qui πρόμυσα ἀσιδῆ eſſe, hoc eſt, *Cæpas faſtidium naſcéúmue parere* ſtatim ſubiunxerit, hanc ἔρεξιν ſeu appetentiam, nõ de cibi ſed de Veneris cupiditate interpretari videtur. Verùm quid obſtat, quæſo, quominùs Cæpæ ſimul & ſemel cibi auiditatem excitent, parciore ſcilicet eſu: & immoderatiùs ſumptæ faſtidium inuehant, aut certè, qua pollent acrimonia, nauſeam pariant? ἀσιδῆ] ἀσιδῆ dicuntur τὰ πρόμυσα, vel quia tædioſo ſint halitu, vt & allia: (*huc enim tædiũ halitu, vt Cæpis*, inquit Plinius, lib. 19. cap. 6. *nullũ tamen odiũ*) vel quia eſu largiore faſtidium pariant, vel denique quia, dum os ventriculi acrimonia ſua vellicant, nauſeoſa deprehendantur.

βαρὺ κἀμβλυωπεῖν] Sic Hipp. lib. de diæta 2. Cepam oculis conferre tradidit. Gal. itidem lib 7. ſimpl. iis prodeſſe, qui ſuffuſione laborant, aut iis qui præ humorum craſſitie ſunt acie oculorũ hebetiore. Ipſe quoque Plinius lib 20. cap. 5. & *aſſectu ipſo & delacrymatione ad gui mederi Cæpam* ſcripto prodidit, *magis nero ſuas inunctione*. Contrà Sotion apud Conſtãtinu, τὸ πρόμυσον ἀμβλυωπίαν ποιῶν, hoc eſt, *oculũ hebetudinem inferre*, aſſeuit. Et id quidẽ rectè. Cùm enim vaporoſa atque adeò πνευματώδεις Cæpa deprehẽdatur, quidni eſu largiore eos offendat, quibus alioqui oculorum acies eſt integerrima?

CAP. CLXXXII. Σιτίοιο τὸ μὲν ἔνι] Variæ cùm occurrerent huius capitis de Allio lectiones, ego hanc illámve ex omnibus minimè delegi, ſed partim vulgatam, partim veterem ſecutus ſum, quam in ſuis annotationibus habet doctiſs. Goupylus, quámq; Hermolaus Barbarus, Marcellus & Cornarius, adeóque omnes, excepto Ruellio, Interpretes expreſſerunt.

ἀλλοῖον δ' αὖ τὸ εἶναι φύσει] Allij genus quod ſingulari ſimplicíve capite naſcitur, nullis eiuſmodi nucleis conſtare certum eſt. Quapropter ea quæ in vulgata lectione deſiderabantur, ex vetere ſcriptura ſupplere viſum eſt. Cæterùm eiuſmodi nucleos, ſuis tunicis ac ceu veſtibus diſtinctos, Theophraſtus χίτρας appellat, alij ὄγκους & σπαθίδας: Plinius *nucleos*, *ſpicas* Columella nominat.

ἀκριβεῖν φασιν] Pariſ. φασὶ δὲ. Aldinus, φασὶ, pro quo φασὶν reponendum cenſuimus. Nam & ita Serapio, Lacuna & Fuchſius legiſſe mihi videntur. Ac certè quidem flatus pellere Allium tam ſumptum quàm adhibitum, & multorum autoritate, & variis cõſtat experimentis. Enimuero Simeon Sethi, Allium nõ modo flatus diſſipare, ſed etiam eorum generationem prohibere tradidit. Quin & Galenus ipſe 12. Meth. vt ἄδηλον, ita & ἄφυσον eſſe aſſeruit: nec illud modò, ſed & inter edulitorũ genera omnia flatum potentiſſimè diſcutere. Neque vero obſtat, quod deinde ſubdit Dioſc. Alij vim eſſe ἐμπνευματικὴν ποιότητα, hoc eſt, *ipſum inflationes parere*. Nã vnum & idem remedium, pro ratione materiæ quam nanciſcitur, & flatus pellere & flatus quoque gignere poteſt. Sic flatus quidem diſcutit pellitque Allium, ſi flatus vndecunque genitos nactũ fuerit, dummodò ne corpus ipſum craſſioribus redundet excrementis, quæ gignendis flatibus nouam ſuggerant materiam. Flatus verò gignit excitátve, ſi in pituitoſum excrementitúmque corpus inciderit: ita tamen vt flatum minimè quidem ex ſe, ſed ex occurrente pituita ſuſcitet. Tùm enim quatenus frigidos craſſóſque eiuſmodi humores nimioperè calfacit, liquat & attenuat, viſcidóſque ac lentos incidit, fieri nequit, quin pars eiuſce materiæ abeat in flatulentos vapores. Atque iccirco Hipp. lib. de diæta, Allium prodidit ſpiritoſa vi flatus excitare: itémque lib. de vict. rat. in acutis, flatum ac dolorem circa thoracem facere. Cellus itidem, lib. 2. cap. 26. Allium inter inflantia numerat. Sed nec illud quoque omiſit Plinius, lib. 20. c. 6. dũ Allij dotibus propoſitis, vitia deinde varia recẽſet: ac inter alia, quòd inflationes faciat. Quid quòd, vel ipſo teſte Ariſtophanis Scholaſte, ἀπὸ τοῦ σκορδύλου deducta videtur vox illa σκορδυλᾶσθαι, quæ *pandiculari* ſignificat, non quidem, vt ille voluit quod allia eſu largiore vomitum irritent, tandémne ex acrimonia ſequatur pandiculatio, ſed quòd vaporoſa excrementa interdum excitent & ad muſculos propellant: quæ quidem vti diſſentur, Natura diſtẽtionem, quam σκορδυλισμὸν, hoc eſt, *pandiculationẽ*, vocãt, moliri conſueuerit.

δίψας ποιοῦσιν] Sitim certè gignit allium. Siquidem ſtomachum exiccat: maximè ſi ventriculum pituita vacuum offenderit. Attamẽ Gal. 12. Meth. cõtra quàm opinarentur nonnulli, qui Cæpis etiã ipſis ſiticuloſius eſſe cenſebant, planè ἄδιψον eſſe voluit. Quin & aſſerit Simeon Sethi, Allium proprietate quadã valere ad ſedandam ſitim ab humore ſalſo genitam.

ἐμπνευματοῖ] Lego, ἀλλὰ ποιοῦσιν καὶ ἐμπνευματικὴν, ἀκροκολίαν ὀπτηθέντος σπείρου, ἐμπνεῦσαν αἰμάτωσιν, ſeu potiùs αἱμάτωσιν. Gallicus Interpres ἀκροπνευματικὴν legiſſe videtur, ſiquidem allium innuit aptum natum crepitus excludere. Marcellus itidem ἀκροκολίαν ὀπτηθέντος σπείρου, non ἀκροκολίαν ideò legere maluit, quia, teſtibus Plinio & Simeone Sethi, faciat Allium in totum rubicundiora corpora, dum ſcilicet ſanguinem attenuat. Alij quod habetur in vulgata lectione, ἐμπνευματικὴν διαφορὰν, interpretantur, *flatus diſcutiendi aptoquendique vim*: quoniam fortaſſis ἀκροκολίαν διαφορὰν, hoc eſt, *vim alui arctiorem*, apud Aphrodiſæum in problematis ἀπὸ τῆς κοιλίας διαφορὰς, pro ἀποκρίσεως etiam vſurpari

obseruarunt. Ego verò cum Ruellio, ἀλκιδιῶν, legendum existimaui, Sotionis in Geopon. autoritate fretus: qui quidem refert Allio sanum corpus exulcerari, vti contrà cæpa vlcera ad integritatem reduci. Sed & Gal. lib. 3. de temper. quo loco rationem reddit, cur multa foris admota exulcerent, assumpta verò minimè, in eo censu sinapi, muriam, Allia & cæpas annumerat. Quod ad illud postremum spectat, quod in vulg. codicib. legebatur, ὀμμάτων ἀμβλυωπίαν, hoc est, *vim oculorum acrem hebetandi*, minimè omittendum censui: siquidē æquè ac cæpam oculos hebetare Allium, tum experientia, tum & Plinij & Auicennæ testimonio satis superque constat. Imò & Hipp. ipse, lib. de diæta, Allia scribit oculis officere, eosdémque ἀμβλυοῦν, hoc est, *hebetare*, propterea quòd vehementiorem corporis purgationem moliantur. Attamen Simeon Sethi iure optimo annotauit, quanuis sanam oculorum aciem lædat Allium, eius tamen hebetudinem ex largiore humiditate profectam emendare atque refocillare.

ἀκμάζοντα οἶνον συνεχῶς] Vertunt nonnulli, *si vinum assiduè bibatur*, addúntque alij, *ac temetum*: quasi desideretur in Græco exemplari, τοῦ ἀκρατίου. Ac certè quidem Plinius lib. 20. cap. 6. *primum*, inquit, *contra hæmorrhoidas prodest, cum vino redditum nouum*. Ego continuò post assumptum Allium, vinum superbibi debere interpretor. Nam & συνεχῶς vt & *continenter* apud Latinos, ita interdū accipitur, pro eo quod Gallicè dicimus *tout d'une suite*.

ὅσοι δὲ Ν' ἀναστομοῦσι] Ista sic lego: ὅσοι δὲ Ν' ἀναστομοῦσι σὺν ταριχίνῳ μίσυι. σὺν ἁλὶ δὲ καὶ ἐλαίῳ, &c. Ac ita quoque Serapio ac Ruellius legisse mihi videntur.

καλλίφυλλον δὲ μείζονα] Aliàs πραμνιακὸν legendum suspicatus sum: sed reponendum hauddubiè, μονοφυὲς seu μονόφυλλον. Nam & ea vox legitur apud Hipp. in fine libelli de locis in homine, itémque secundo Epidem. & lib. de visu. Galenus in τῶν γλώσσων Dioscoridem citat, his verbis: μονόφυλλον, ὃ τινες ἀπορήσαντες ὅπως φασὶ σπερίδιον ἐκάλεσαν. quæ verba de hoc Dioscoridis loco accipienda sunt. Eadem est Erotiani sententia, qui, æquè ac Aristophanis Scholiastes, μονόφυλλον dictū existimat, διὰ τὸ μυσαρίζειν, quòd propter odorem tetrum odio dignum & abominandum sit, quasi μισητόν. Hesychius etiam, Pollux & Aristoph. Scholiastes in Equitibus μονόφυλλον interpretantur, ἀπὸ τοῦ σκόροδον δηλ. σκορόδιον. hoc est, *alliacum intritum*, seu *intritum ex Allio*: cui tamē adhiberētur & alia ἀρτύματα, puta porrum, caseus, oua, oleum & acetum. Cæterùm hanc ipsam μονοφύλλου vocem etiam genere fœminino extulit Callimachus, ἐπὶ τὴν ἐπεσταλὴν μονόφυλλον. Masculino verò, Hippocrates & alicubi Athenæus, itémque Theophrastus, lib. 7. hist. Allio enim Cyprio (quod Latinorum fortasse fuit Vlpicum, quódque magnitudine præstare fertur) ὅσοι δὲ μονόφυλλοι χρώνται, inquit ille. Plinius *rurū pulmentaria* conuertisse videtur: alij etymo à Græcis ducto Moretum, quasi *Mosetum* appellarunt.

Cap. CLXXXIIII. καὶ καθαίρειν, λέγει] Secus sentire videtur Aëtius, qui capite de Napy, ἄκρατον, id est, *præstantissimum*, censet, τὸ μαλακὸν καὶ λεῖον, καὶ εὐωδιαστὸν ποιοῦν, id nimirum, quod *mole minus est, quódque mundi sanguinem calorem refert*.

ὅσοι τῶν ἀμβλυωπίας] Attamen ex eo *vinum* dictū scribit Athen. libro 9. ὅτι οὐκ ἀσύμφορον τοῖς ὀφθαλμοῖς, *quòd etiam ipso odorato oculos lædat*. Sicut *cæpam* προσφέρον, ὅτι ταῖς ὄψεσι μάχεται, *quod nos reductis palpebris pupillas oculare cogat*.

Cap. CLXXXV. συνωμίαν παρορμᾷ] Nasturtium è contrario contendit Plinius, lib. 20. cap. 13. *Venerem mirabere & animum excitare*. Huic astipulatur Florentius Geoponicon lib. 12. cap. 27. φασὶ δὲ, inquit, ὅτι ἐσθίοντες καρδιακοὶ, ὀξυπόρους τοὺς ἄρσενας γίνεσθαι· subdit verò deinde, ἀφροδισίων ἐρεθιστικὸν εἶναι. Attamen id & experimēto & Dioscoridis autoritati repugnat.

Cap. CLXXXVI. διοσκορίδης οἶνον ἀπὸ θλασπέως] Gal. lib. 1. de antid. in hanc ipsam sententiam semen Thlaspeos ait quadā sui parte quandam habere veluti compressionem, (θλάσμα vocat) à qua etiam θλασπι nominatum sit. Cæterum pro, διοσκορίδης, Plinius ac Ruellius, φακοειδὴς, legisse videntur, hoc est, *lenticulæ formam referens*, sumpta tamen lenticulæ voce (veluti & φακὸς apud Græcos vsurpatur) pro eo vasis genere, quod ad lenticulæ modum conformatū est. Sic & humor crystallinus apud Aëtium, ὑγρὸν alias φακοειδὲς, aliàs διοσκορίδης appellatur.

ὑγιάζειν δὲ καὶ φασὶν ἰσχιαδικοὺς] Semē Thlaspeos scribunt Galenus & AEgineta per sedem infusum prodesse ischiadicis, quatenus sanguinolenta vacuat. Sic & Plinius, lib. 27. cap. 13. *prodest & ischiadicis, infusum donec sanguinem trahat*.

Cap. CLXXXVII. ὁ δὲ καρπὸς αὐτῆς] Eadem Plin. lib. 27. cap. 9. de dryophono tradit: quod Cordus sat probabili coniectura ductus cum Draba Dioscoridis vnum & idem esse existimat. Serapio Drabam, Oribasio braben dictam, nasturtij generibus annumerat, & nasturtiū Orientale appellat. Cæterùm inter notha Aldini exemplaris, hoc ipsum caput cum Arabidis herbæ inscriptione repetitur, ita vt Arabis & Draba vnius & eiusdem plantæ diuersa nomina fuisse videantur.

Cap. CLXXXVIII. σίαπυ φυτοφάγοις] Σίαπυ hic, vt & alibi sæpenumero, tum apud Dioscoridem, tum apud Theophrastū & alios, αἰνὶ τῷ σιάπει, hoc est, *pro fermento aut farina subacta*, sumitur: vti etiam testatur Hesychius. quod non animaduertens Plinius sæpenumerò fallitur. AEgineta cap. de Erysimo, αἰνὶ τῷ σιάπει, siue σιαπεῖ, ζύμῃ, hoc est, *fermento*, vsurpauit. Esse verò σίαπυ vocem ita accipiendā, ipse quoque Galeni contextus itidem apertè demonstrat, lib. 6. simpl. cap. de Erysimo. vt & αἰνὶ τῷ σιάπει (quæ vox paulò pòst sequitur in vulg. exempl.) legendum iuxta veterū codicū fidem, σιαπεῖ, quanuis apud Gal. Aëtium & AEginetam σιάπει perperam vbique legitur. Cæterùm pro eo quod habetur superiùs, σιαπεχόμενοι, lege, σιαπεχάμενοι: quò sit aptior cum præcedentibus connexio. Sed & fortè hoc eodem cap. αἰνὶ τῷ λεπίδι τῷ καὶ ἁλατῷ, legendum, λεπίδι τῷ καθαρῷ καὶ &c. Nam & ita Serapio legisse videtur.

Cap. CLXXXIX. ὅσοι δὲ μακρὸν πίπερι] Dioscorides, Galenus & ipse quoque Plinius, longi, nigri candidique Piperis eandem esse arborem perperàm existimauēre. At recētiores nonnulli,

quibus licuit de longè petitis aromatibus accuratiùs scribere, in quibus est Garcias ab Horto, varias esse omnium plantas referunt: ac Piperis quidem nigri fruticem à candidi fruticè, què ac nostratium vitium genera inter se, non facie foliisve, sed solo propemodùm fructus granive colore discrepare, vix vt hic ab illo nisi ab incolis internosci possit. Ego verò Piper albũ, quod certè quidem ad nos conuehitur, nón aliud esse iudico, quàm ipsum Piper nigrum cortice suo nigro & rugoso spoliatum. Eo verò cortice spoliari fit verisimile, dum Soli expositum, vt verbis Galeni vtar, ὑποτήκεται καὶ ἀπαμύττεται, hoc est, *tenuum torretur*, ac, vt ita dicam, *superexcoriatur*.

ἥδιον καὶ θερμότερον τοῦ λευκοῦ] Ita & Theophrastus 9. hist. stirp cap. 22. Piper nigrum candido longè validius inuit. Galenus contrà 8. simpl. candidum nigro acrius esse voluit, tanquam superassato ac superexiccato. Rursúmque lib. 9. de comp. med. κα. ν. candidum Piperi & stomacho commodius & acrius quàm nigrum esse tradit. At Plinius, lib. 12. cap. 7. vtroque tã longo quàm nigro lenius esse candidum asseruit.

ὅσον μὴ τὸ ὕστερον] Radicẽ Piperis intellige viribcosto simile. Nam & illud addidit Gal. 8. simpl. Quin ne radix quidem Costus est, sed lignum, si Garciæ ab Horto credimus.

Cap. cxc. ὁ δὲ τῆς Τρωγλοδύτιδος καὶ Ἀραβίας] Fortè καὶ Ἀραβίας. Nam & ita de Zingibere Plin. lib. 12. cap. 7. id *enim in Arabia atque Troglodytica nullis nascitur*. Ac re vera Troglodytica Æthiopiæ pars est, non item Arabiæ.

ῥίζαν μικρὰν] Plin. lib. 12. cap. 7. Zingiber simpliciter *parvæ herbæ radicem esse candidam* scribit. At Garcias ab Horto radice depingit iridis, ac multò maiore quàm Cyperi. quod ipsum confirmat Christophorus à Costa. Sed & Ludou. Rom. lib. 5. cap 14. radicem scribit erui quatuor, octo, ac interdum etiam duodecim vnciarum pondo: quippe cùm minimè sit eadẽ omnibus amplitudo. Quòd ad folia spectat, Garcias iridi aquaticæ aut Gladiolo assimilat, quanquam magis nigricantia esse fatetur. Christoph. à Costa lacrymæ Iobi seu milio solis comparat. Antonius Pigafetta, arundini. Tantopere Autores de Zingiberis historia inter se dissident atque discordãt. Porrò inferiùs ἀπὸ τῶν, ὀχρεωτῶν, rectiùs legas, ἀλχεωτῶν.

μαλακτικὸν ποιεῖται] Aluum leniter emolliunt Zingiberis radices, siquidem recentes ac etiamnum teneræ edantur, multa adhuc humiditate præditæ, cuius quidem ope aluum emolliant ac lubricent: at vetustiores exhaustáque humiditate arefactæ, aluum potiùs astringunt.

Cap. cxci. κωνώπιον ἔχει μικρούς] Pro μικρούς, Lacuna, κενούς, hoc est, *cassos*, reponit ex veteri codice: atque ita quoque legit Oribasius.

Cap. cxciiii. καυθὲν τὸ κάτωθεν] Lacuna ex vetusto quodam exemplari legit, καυθὲν, hoc est, *combustum*. Cui quidem lectioni astipulantur hæc Theophrasti lib. 9. stirpium historiæ de Cyclamino agẽtis verba: ἐκφαίνει δὲ τὸν ῥίζαν ἐπὶ μὲν γονίαν οὐδεμίαν, καὶ οὐ φύλλα· ὅταν δὲ ὀρύξωσιν, ἐκκαίουσιν ὑπὸ τῶν ἀνθρακιῶν, ὑγιάζειν τινὲς λέγουσι, πρὸς τὰς ἀρχὰς, ἢ ἐπιτίθεσθαι: hoc est, *vtile verò radicem ad asserendum parum adallucere. Valet & ad combusta. sed in eum usum effossa comburitur, deinde lino irrigata in pastillos digeritur, ac sic, quæ maculæ dicuntur.*

Cap. cxcv. καὶ ἔστιν πολλὴν] Quoniam alterius Cyclamini radicẽ supernacuam esse scripsit Dioscorides, ista vel ad reliquam plantam, vel potiùs ad ipsius fructum seu acinos (quod facilius credidem) referenda sunt. Quare αὐτῶν, πολλὴν, πολλὴς legendum puto, nimirum κόμης, cuius paulò ante facta est mentio.

Cap cxcvi. ἀρακίδιον ἔχει φύλλα] Alterum caput Dracontij maioris nomine inscriptum, quod meritò à nonnullis inter Dioscoridis notha repositum est, tanquam legitimum agnouerunt Oribasius, Marcellus, Mathiolus & Amatus Lusitanus: ac illud quidem priore loco collocant, hoc verò posteriore. Ego verò cum Serapione illud alterum quanuis in codicibus nonnullis occurreret, consultò prætermisi, tãquam suppositiũ, & ex Crateuæ aliusve fortasse cuiuspiam scriptis perperam contextui Dioscoridis adiectum: maximè cum in vtroque capite diuersas quidẽ vtcunque voces, & vnam tamen eandémque historiam animaduerterem. Si etenim singula expendamus, vix aliud occurret discrimen, quàm quòd Dracontij folia Dioscoridis hederæ comparat, ille verò quisquis fit, lapatho: Itémque colorem fructus à principio herbaceum agnoscit Dioscorides (falso enim in Aldinò exemplari & apud Oribasium χλωρὸν legitur, αὐτῶν, χλωρὸν) ille verò σποδοειδῆ, hoc est, *cinereum*. Seu fortasse Dioscoridis ad folij colorem, lætiorem firmitatémve: ille ad eiusdem longitudinem respexit. Cæterùm, siue descriptionem, siue vires spectes, ferè consentiunt. Porrò si duplex est Dracontiũ, quemadmodum veteres testari videntur inscriptiones, maius inquam & minus, maius Dracontium id agnoscere possumus, quod in plerisq; hortis visitur, Autoris nostri descriptioni aptè conueniens: minus verò, aron passim circa sepes nasci solitum. Sic enim Serapio Dracontij duo constituit genera, vnum quod Dracontium simpliciter, alterũ quod aron appellaretur: ac idipsum innuere quoque visus est Theophrastus, dum tradidit Dracontij genus quoddã aron appellari. Attamen quoniam cognatæ ac congeneres sunt hæ plantæ, ac viribus etiam isdem præditæ, earum nomina nil mirum apud Plinium & alios rei herbariæ Autores ferè omnes passim confundi: quod vel ante sua tempora factitatum testatus est ipse Plinius, lib. 24 cap. 16.

πεπρωτῶν] Marcellus ὑποπρώτων legisse videtur: sed vulgatam lectionem retinere satius fuit. Quanuis enim Gal. 3. de comp. medic. καθ' ἕλκη, ad neruos vulneratos Dracontij radicem vsurpat, attamen eiusdem foliis recentiũ vulnerum agglutinandorum vim idem ipse tribuit, lib. 6. de simpl. medic. facult.

ἐφθὰ τε καὶ ὠμὰ ἐσθίουσιν] Sic Gal. 2. de Alim. Dracũculi æquè atq; ari radices bis térve elixatas iis interdum in cibo offerri tradit, quibus crassorũ lentorúmque humorũm copia in pectore pulmonibúsve congesta est. At Theoph. lib. 7. hist. stirpium, Dracontij radicem ad cibũ inceptam ac prorsus medicamentosa facultate præditam esse tradidit, hisce verbis: ὁ δὲ τῶ δρακοντίου (καλοῦσι γάρ τινα καὶ δρακοντιον αὐτὸν, ἔξω τῶν καυλῶν ἔχει τινὰ ποικιλίαν) ἄκρως καὶ φαρμακώδης. i. Radix Dracontij (quoddam

enim aron Dracontium vocant à caulis mario colore) & eſus inepta & medicamentoſa exiſtat.

CAP. CXCVII. μακρόπεα δὲ] Vetuſti codices fidem ſecutus legi, μακρόπεα, nõ μακρόπυα, hoc eſt, *longiora*, vt in vulg. exemplaribus. Oribaſius quoque ac Serapio videtur legiſſe μακρόπεα. Sed & ita legendum res ipſa per ſe clamitat.

ῥίζα λάβρου] Cõtrà Plinius lib.24.cap.16. Aron radicem nigram habere ſcribit, vti dracunculus ſubrutilam: quod de corticẽ radicis fortaſſis intelligendũ eſt. Alioqui enim candida eſt vtriuſque radix. Imò candidam radicem cùm nominat Hipp. dracontij radicem vult accipi Gal. in Lexico vocum Hippocratis.

ὑγρὸν ἄλευρον ἔνιον] Noſtri quidem Ari radices (niſi fortè cultura melioreſcunt) quantumuis bis térve coctæ, vix tantum de ſua inſigni acrimonia remittere poſſunt, vt in cibos recipiantur. Itaq; plurimùm acres fuiſſe Ari Aſiatici radices, teſtatus eſt Gal. lib.2. de alim. facult. Attamen idem Cyrenis haberi prodidit, quæ minimùm medicamentoſæ ſint & acres, vt rapis etiam ſint vtiliores, ac in cibo præſtantiores. Sic quoque Plinius, lib.19.cap.5. Aron in Ægypto naſci prodidit, *radicæ mollioris naturæ, quæ edatur & cruda.* Tantùm ergo poteſt cœli ſoliq; diuerſitas, vt quæ hîc acres reperiuntur ſtirpes, alibi mitioris naturæ deprehendantur.

CAP. CXCVIII. αἰδοῖον ἀνδρὸς ζῴου] Quod hîc genẽtaliter ſcribitur à Dioſc. de fœminini ſexus genitali tantummodò extulit Plinius: nec malè, velut indicant ea verba quæ proximè ſequuntur. Ita verò Plinius, lib.24.cap.16. *Sed unum miraculum ingens, contacto genitali cuiuſque fœminam ſexus animal in pernoctem agit.*

CAP. CXCIX. κεφαλωθὲν ἀσφοδέλου] Autoribus Theophraſto & Pythagora quodam, ex Plinio, lib.21 cap.17. Haſtulę regię caulis ſeu ſcapus totus, anthericos dicebatur, vti Latinis, teſte eodem Plinio, albucus. Dioſcorides verò prima quidem fronte florem tantummodò anthericũ appellaſſe videtur: nec abs re, nam & ἄνθηξ ſeu ἀνθήριξ Græcis interdum pro ſummo ſpicarũ faſtigio ſumitur. Attamen illud etiam, κεφαλωθὲν, rectiùs fortaſſis ad καυλὸν referri poteſt, vti ego referendum cenſui. Sunt & qui eo nomine ſemen Aſphodeli ſignificari voluerint, quemadmodum Heſychio & Theocriti Scholiaſtæ placuit. At verò EVſtathius in Homerum, ſitne ἀσφόδελος ἀσφόδελον καρπὸς, an verò καυλὸς hæſitat. Cæterùm in deſcribenda Haſtula regia ſemen hoc nigrum minimè prætermiſit Serapio, quale ſcilicet & Theophraſto & Plinio deſcribitur.

κεφαλώσεται δὲ] Lacuna legit, κεφαλὴν. Plinius, *Semine*, inquit *ſumpto turbatur uenter.* Sed & vulgata lectio tolerari rectè poteſt. Illa ſiquidem τὸν παλαιὸν κεφαλήσθαι, ἤτοι καταῤῥαγῆναι, rectè dici poſſunt, quæ aluum cogunt ἀθρόως, violenter & cum impetu deijcere. Sic infinitis locis apud Hipp. καλὸν καταῤῥήγνυσθαι dicitur, quod exponit Gal. ἀθρόως ἐκκενοῦσθαι πολύ. Sed & apud Gal. legitur: ἡ δὲ χαλὴ αὐτῶν καταῤῥήξει χολώδη. Eadẽ quoque ſignificatione vſurpatur illud apud Appianum in Iberica, καταῤῥαγῆναι τὰ ἔντερα, quod Præceptor olim meus piæ memoriæ minùs rectè, *alvus diffluebant*, videtur conuertiſſe.

CAP. CC. ἀπὸ δὲ τῆς πυρώσεως] Contrà Plinius, lib.20.cap.9. *Bulbos nervis utiles* ſcribit, *ideòque paralyticis dari.*

CAP. CCII. δριμύτατον καὶ πυρωτικὸν] Hîc Scillæ vrentem ſeruẽtémve facultatẽ tribuit Dioſc. Attamen Gal. libro 8 ſimpl. in ſecundo tantùm calfacientium ordine eam repoſuit: quem ſecutus eſt Auerroës. Paulus verò calidam ſimul & ſiccam in eodem ſecundo gradu agnoſcit. At Auicenna calidam in tertio, ſiccam in fine ſecundi exiſtimauit.

σκιᾷ δὲ ἐπὶ πολὺ] Ineptè Scillam adipe oblini voluit Plinius, σίαν fortaſſe legens, neque ſatis gnarus variarum τῶν σίων ſignificationum. Sed & luto (quod idem ipſe voluit) Scillam inuoluere ſordidum ait Gal. lib. de ther. ad Piſonem. Iccirco potiùs fermento teneriore oblini debere admonet: quippe cùm Scilla in eo facilè aſſetur, & ab eo quiddam dùm aſſatur accipiat. Dioſcorides, non ita magno diſcrimine, maſſam, ſeu ſubactam farinam, vſurpauit.

τὸ μαλάττειν] Gal. lib.9. de comp. med. κατὰ τόπους, recitans Chryſermi ad ſplenicos medicamentum, in quo Scilla recipitur, hanc purgari dum vult, αἴρειν, inquit, τὸ φλεγμαῖνον καὶ τὸ πυθμένος τὸ σκληρὸν, τὸ δὲ πυρῆνα λαβεῖν. hoc eſt, *Cortẽm detrahe & quod ad fundum durũ eſt: ſumpto uerò nucleo*, &c. Scilicet πυρῆνα, hoc eſt, *nucleum*, appellauit, quod hoc loco Dioſc. τὸ μαλάττειν.

καὶ ἑλκτὰ δὲ ἀλμάδην] Ruellius duos tréſve præparãdæ Scillæ modos, qui hic ſigillatim traduntur à Dioſcoride, minùs è videtur diſtinxiſſe. Sic & Plin. lib.20.cap.9. *Torta quoq; purgatur*, inquit, *& medium eius rursum in aqua coquitur.* Attamẽ palàm edocent Autoris verba, quomodo Scilla tum aſſanda, tum elixanda, tum etiam cruda ſiccanda ſit. Et hoc quidem loco ſiccari eam in vmbra voluit, cùm tamen etiam exiccationem in Sole admittat. lib.5. dum vini ſcillitici præparandi rationem tradit.

σὺν τῷ ῥοιΐνῳ πυκνῷ] μιχθὲν, legiſſe videtur Plinius. Siquidem loco citato de Scillæ viribus agens: *Rimas pedum*, inquit, *ſanat in oleo cocta, & mixta refinæ.*

Ἔστι δὲ καὶ ἀλεξιφάρμακον] Idẽ prodidit Theoph. lib.7. hiſt. cap.12. his verbis: λέγεται δὲ καὶ ὡς τὸ δριμὺ τῆς σκίλλης φυτοῦ ἀλεξητήριον ἐστὶ τῆς ὑπὸ φαλάγγου δήξεως. Hoc ipſum Plinius ex Pythagora refert, lib.20.cap.10. *Pythagoras*, inquit, *Scillam in limine quoque tanuæ ſuſpenſam malorum medicamentorum introitum pellere tradit.*

CAP. CCIII. μακρόπεα δὲ] Plinius itidem lib.27. cap.12. Pancratium (quam aliqui ſcillam puſillam appellare malunt) foliis deſcripſit lilij albi, at longioribus craſſioribúſque.

CAP. CCIIII. ἐν δὲ Μαγνησίᾳ] Mutata vnica litera legendum, Μαρμαρίσι. Nam & Marmaritæ Straboni, lib 17. Geograph. circa finem, populi dicuntur Libyæ, Cyrenis proximi. Hos eoſdem Plin. lib.5. cap.6. Marmaridas nominat. Cæterùm pro eo quod paulò pòſt ſequitur, Λεπτίνεις, repono, Λεπτίεις. Siquidem Galenus quoq; 7. ſimpl. ἐν δὲ τοῖς Λεπτίνεις, inquit, τῶν χωρίων ἡμῖν ἐπιτομήν ποιήσασθαι, ὅσοις καὶ ἐν Λεπτίᾳ, καὶ τοῖς περὶ αὐτὴν ἔθνεσι, μᾶλλον τοῖς περὶ Μαρμαρίδα, ἔστι δὲ τῶν παντάπασι θηριωδεστάτων μοῖραι δυσαιμοτάτων. hoc eſt, *Porrò Cappari quæ in maldè aſperis ferẽtibuſque regionibus proueniunt, ut quam ferè Arabia, multò eſt noſtrate acrior, adeò ut plurimũ etiam*

habeat

habeat aduersus ficulnis. Sed & Plinius, lib. 13. cap. 23. *Cauenda eius genera peregrina. Siquidem Arabicum pestilens: Africum gingiuo nimium: Marmaricum, nullus & omnium inflationibus. Apulum nonnisi fatis, stomachum & aluum mouet.* Quanquam, si Dioscoridi Plinium rectè conciliare placet, legerim lubentiùs: *Arabicum pestilens gingiuo tumidum: Marmaricum*, &c. Marmáricum enim & Africum eadem esse constat.

CAP. CCV. Ἀμίδιον] Ἀμίδιον & Ἄμυλον Democrati dicta, eiusdē plātæ sunt nomina, quemadmodum cap. de Iberide annotauimus. Quanquam est & alterum maius Lepidium à Paulo descriptum lib. 3. cap. 77. quod vulgus à sapore piperis piperitin nominat. Atque hoc ipsum à Plinio quoque designari videtur, lib. 19. cap. 8. dum tradit, *exire Lepidium in cubitalem altitudinem, folys laurinis, sed mollibus.*

Ἐφηκται δὲ εἰς ἁλμαίας] Lepidij vsum in condimentario genere, qui quidē huc pertinere videtur, refert Columella, lib. 12. cap. 8. dum faciendæ oxygalæ rationem tradit, hisce verbis: *Sunt qui satiui uel etiam syluestris Lepidij herbā cum collegerunt, ut umbra siccent, deinde folia eius abiecto cinule die & nocte muria macerata expressaque lachi misceant sine condimento, & salu quantum sacu arbitrantur adiciant: tum cætera quæ supra præcepimus faciant.* Nonnulli recentius *folia Lepidij cum dulci lacte in olla miscent*, &c. Sed & idem Colum. in poemate de cultu hortorum, Lepidium designās, *Ponitur* (inquit) *& lactis gustum quæ condiat herba.* Eodē verò spectare videtur illud Plinij, loco citato, de Lepidio: *usus eius non sine lacte.*

ὀξὺς ὑπερβαλλόντως ὄξους] Contendit Cornarius, πίπερος, legēdum: nec abi re, quandoquidem & Democrates, & quotquot alij è veteribus huius è Lepidio contra ischiadem remedij mentionem fecēre, illud ferè duarum tātùm, trium quatuórve horarum spatio suas vires exerere prodiderunt, fœminis quidem citiùs, viris vero tardiùs.

πρὸς πραχίονα.] Hanc ipsam radicem non collo, vti Dioscor. sed brachio alligari tradit Plinius, lib. 20. cap. 17. *Tradunt*, inquit, *in dolore dentium ad alligatum brachio quā doleat, compesere dolorem.*

CAP. CCVI. ὁ δὲ χυμὸς πλείστου ἄξιος] Hāc etiam à similitudine apij Apiastellū videtur nominasse Apuleius: Plinius verò lib. 20. cap. 11 apiastrum, ipsumque tradit in cōfessa damnatione esse venenarum in Sardinia: quanquam ibidē fatetur, apiastrum Hygino esse μελισσόφυλλον, scilicet ab apibus ita dictum, quibus hoc gratissimum esse consueuit.

ἄλλος γαλακτίζων] Plinius, lib. 25. capite vltimo Ranunculi genera persequitur: *Quartum*, inquit, *simile huic, flore luteo*: vbi *luteo* perperàm legi cōstat, pro *lactro*. Sed & ibidem, pro *Eadem fuit causa seruamentū est*, legēdum haudd ubiè, *fermamentum fiet.*

ὠφελεῖ ἐλίγον] Hoc illud est quod ait Plinius, *alterius remouenda.* Causam subdit Gal. in hęc verba: *Nam si diutius inhæserint, non solum exulcerant uias, sed & in crustum urinæ.* Sic & Apuleius de hac eadem herba, quam Sceleratam nominat: *Non diutius patiatur*, inquit, *quam mosse est, ne & sanum corpus exedat.*

CAP. CCVII. ἐπισπαστικὴ] Lege, ἐπισπαστικὴν, vt hæc aptiùs cohæreant cum sequentibus, ἐπιτέμνει, μάσσει, καθαίρει.

ἡμιωρίτου ἀνατίθεται] Plinius, lib. 21. cap. 23. postquam ex sententia Dioscoridis de Anemone medica, ad coronariarum differentiam, egit: *Hanc subiūgit, errore duūm argemonem putare multi*, &c. Eodem seruato Plinij sensu, Pena hoc loco, nisi fallor, ἀργεμωνίου, ἀπὸ τῆς, ἀνεμωνίου, legendum existimauit: quasi id vnū voluerit Dioscorides, errore manifesto cōfundi Anemonem cum argemone. Veruntamen etsi non negamus, id quidem innuisse Dioscoridem, præterea tamen & quorundam errorem retegere & coarguere voluisse suspicamur: qui quidem veræ ac legitimæ argemones ignoratione, eupatorio nomen argemones seu argemoniæ falsò tribuebant. Nam sic quoque rursum Dioscor. lib. 4. cap. 41. de eupatorio: Ἔνιοι δὲ τῶν ἀργεμωνίας ἐπάλληλον παραλήψονται. ἐπεὶ καὶ τὴν ἕλξιν, ὡς ἐπεδείξαμεν· vbi ἀργεμωνίας, ἀπὸ τῆς, ἀργεμωνίου, perperàm legi apud omnes est in confesso. Cæterùm, quantumuis nō semel rectè monente Dioscoride, error ille nominum ad hodiernum vsque diem ita inualuit, vt etiam vulgus Medicorum eupatorium, detorta argemones in agrimoniam voce, falsò agrimoniam appellet.

τῆς ἀργεμώνης αὐξάνει ὑπόπαχ] Legi, ἀργεμώνης, vti in altero exēplari haberi annotat Goupylus, non ἀγριώνης, vti legitur in vulg. exemplarib. Illud ipsum quoque expresserunt, Oribasium secuti, Hermolaus, Marcellus, Cornarius & Lacuna. Adde quòd ex proximè sequenti capite ita legendum, facilè vnicuique constat. Ego verò ἀπὸ τῆς, ὑπόπαχ, cū Oribasio & Serapione legendum puto, ὑπόπαν: aptiùs enim opponitur ei quod sequitur, ὑπόπιον. Huc adde quòd capite proximè sequenti, quod priuatim argemonæ dicatum est, argemones capitulum quàm papaueris rhœadis oblongius & summa parte latiusculum esse distè scribitur.

ἔτι ὑπὸ αἰτίαν] Sibi pugnantia hoc capite scribere prima statim facie videtur Dioscorides, qui iam succum vllū remittere neget Anemonen: anteà verò radicis eiusdem succū ad purgandum caput prodesse tradiderit. Sed aduertendum aliud ὀπὸς, aliud χυλὸς voce significari. Anteà de expresso radicis succo egit: hìc de liquore, qualem & argemone & erratica papauera sponte & citra vim fundunt, dum caulis potissimùm conciditur, alióve modo aperitur. Sic & chondrillę lactucæque liquorem lacteúmve succum anteliac ὀπὸς appellauit. Nos iccirco homonymiæ vitandæ gratia hìc *liquorem* vertere maluimus, quàm *succum* cum Plinio. Is siquidē, loco modò citato, dum distinctionem tradit Anemones generum ab argemone & papaueri rhœade, sic habet: *Nec aut succum illarum Anemonæ reddūt, aut alyxas habent, nec nisi asparagi similem.* Hisce autem verbis noluit omnino succo priuare Anemonen, sed tantummodò ipsius succum ab argemones & papaueris rhœadis succo diuersum esse indicauit. Aliā verò fuisse Dioscoridis mentem, ex illius verbis facilè quisque iudicet.

CAP. CCVIII. τὸ δὲ φύλλον] Consensus omnium Interpretum fecit, vt quę alioqui in vulgatis exemplaribus deprauata legebātur, ita restituerimus: τὸ δὲ φύλλον αἰτιᾶται ὑχὶ ὀπὸν, ὀχετὸν, αὖος [ὅθι καυλὸς] φυτικῶν, παραλὺν δὲ &c. quanquā

illud, ὅτι καυλὸς, penitus omisit Cornarius: Ruellius post illud, περαλιὼ δὲ, reposuit. Plinius verò sic habet nulla floris facta mentione, lib. 25. cap. 9. *Folia habet Argemonia, qualia anemone, dissecta. Apij modo, caput in cauliculo papaueris syluestris: tenuem radicem.*

Cap. CCIX. περαντικαὶ] Quoniam Gal. 6. simpl. vtrunque genus Anagallidis tradidit admodum extergentis esse facultatis, ex eo colligit Manardus, legendum fortè, ἰοπτικαὶ, aut τῶ, περαντικαί. At ego suspicor legēdum potiùs, βλαπτικαί, quia sint vulneratiæ. Nam & eodem loco monet Gal. exiccandi vim habere mordacitatis expertem, ideóque vulnera glutinare.

Cap. CCX. λειπεῖ ἰχὼ τὰ ὠφελοῦντα] Lacuna in antiquo codice legit, λειπεῖ ἰχὼ &c. quam lectionem cò lubentiùs sum amplexus, quòd & Serapiònem ita legisse animaduerterem.

χρηστὸν καὶ ἐρυθρὸν] Eadem leguntur apud Oribasium. Attamen hæc vox, ἐρυθρὸν, meritò plerisque Interpretibus suspecta fuit, quoniam helicis Hederæ folia nusquam rubentia conspiciuntur. Theophr. lib. 3. hist. stirp. cap. 18. de eadē helice agens, scribit in hunc modum: ἡ δὲ διαφορὰ ἐν μεγέθει μάλιστα φαίνεται· καὶ γὰρ ἡ μὲν ἐλαχίστη τῶν φύλλων ἐστὶν ὡς τὸ μικρότατον καὶ τὴν χρόαν καὶ ἐν τῷ κισσῷ τὸ. τὸ δὲ πολὺ πλεῖστον διαφέρει καὶ ἀπὸ. hoc est, *helix differentijs maximis discernitur. Harum foliis plurimùm distat tum paruitate, tū quòd angulata concinniora que sint, cum Hedera rotundiora simplicia que habeat.* Ita porrò Plinius ijsdem penè verbis sic Latinè reddidit, lib. 16. cap 34. *Plurimas quam habet differētias helix, quoniam folio maxime distat. Parua sunt & angulosa concinniora que, cum reliquorum generum simplicia sint.* Ita quæ Theophrastus ἀδρομόνεα, vel, vt legūt alij, ἀρυθμονεα, vel, vt Paul. Leopardus, ἀδρομονίσκεα, seu pro eodem ἀχαιτονεα dixerat, vertit Plinius, *concinniora.* Ea autem Theoph. autoritate freti plerique etiam hoc loco vocem eandem, ἀντὶ τῦ, ἐρυθρὰ, reponendam censuerunt. Attamen Cornarius apud Theoph. legendū potiùs existimat, ἀλλ' ὑπόπεα: hoc vero loco, ἀτραφῆ. Ego eodem propè sensu hic, ἄτρα, legendum suspicor: nam & *crassa* Serapio cōuertit. Liberum tamen esto suum cuique iudicium.

ἐνδεδέσθαι κίσσιδος] nimirum, si intrò sumatur. Nā & Plinius, lib 24. cap. 10. Hedera, inquit, *nerui instar nocet. ijsdem nerui adhibita foru. prodest.*

κίσσιον πιεῖν] Sic legisse videtur Serapio: vertit enim, *Corpus infirmant.* At ego ἀντὶ τῦ, κίσσιον πιεῖν, vnica mutata litera lego, κάρδιον πιεῖν: maximè cùm clarissi. vir Sambucus ita etiā in vetusto quodā codice legi obseruauerit. Quanquam si corpora infirmant Hederæ corymbi, ex consequenti etiam sterilitatem facere sat intelligi potuit. Ita verò Plinius, loco modò citato: *Hederæ nigræ candidiores corymbi potu, steriles etiam meros faciunt.*

Cap. CCXI. ὁ καρπὸς] Ita Oribasius, Serapio & Cornarius: reliqui, καυλὸς non ita magno discrimine legisse videntur. Vult enim Autor non ex his illisve tantummodò plantæ partibus, sed ex ipsa tota succum elici.

ἡ δὲ ῥίζα πιεῖσα &c.] Lacuna legit in hunc modum: ἡ δὲ ῥίζα πιεῖσα σὺν ὀξυμέλιτι ὄξους ἀδιπῶ καὶ κατάπλασμα μὲν σὺν ὄξει ἐπιτιθεῖσι θεραπεύει καὶ ἕρπητας. ἐπιθαλάσσιος γὰρ πάνυ ἐξαιρετος ἐστὶν. Ego verò, vnica detracta particula, καὶ, ita lego & distingu o. ἡ δὲ ῥίζα πιεῖσα σὺν ὀξυμέλιτι ὄξους ἀδιπῶ, ἐπιτιθεῖσι θεραπεύει, καὶ ἕρπητας, καὶ ἐπιθαλάσσιος γὰρ σὺν ὄξει, ἐξαιρετος ἐστὶν &c.

αἱμορροεῖ] Chelidoniam primo statim hirundinum aduentu è terra erumpere voluit Dioscorides. At Theophrastus & Plinius, iam cùm florere tradiderunt. Siquidem Theophr. lib. 7. cap. vlt. ἐν δὲ τῇ χελιδονίᾳ. inquit. καὶ γὰρ ὅδε ἅμα τῇ χελιδονίᾳ ἀνθεῖ. Plinius verò de Chelidoniæ generibus agens, lib. 25. cap. 8. *Florent aduentu hirundinum, discessu marcescunt.*

ὡς ἔοικέ τις τυφλωθῆ] Plinius & ita sensisse videtur, lib. 8. cap. 27. vbi sic habet: *Chelidoniam iussi saluberrimam hirundines monstrauēre, nexatu pullorum oculis illa medētes.* Itémque lib. 25. cap. 8. *Chelidonia hirundines oculis pullorum in nido restituunt usum: ut quidam auium, etiam eruto oculo.* Idem verò ex Primj sententia retulit in suo carmine AEmylius Macer, capite de Chelidonia. At Cornelius Celsus id commentitium esse existimat, lib. 6 cap. 6. quo loco de sanguine suffusis oculis agit, hisce verbis: *Extrinsecus verò interdum si ictus oculum laedit, ut sanguine in eo suffundatur, nihil commodius est, quàm sanguine vel columbæ vel palumbi vel hirundinis mungere. Neque id sine causa fit, cùm horum aues extrinsecus læsa interposito tempore in antiquum statum redeat, celeberrimique hirundinis. Vnde etiam locus fabulæ factus est, per parētes id herba Chelidonia restitui, quod per se sanescat.* Hoc ipsum & ante tulisse videtur Aristoteles, dum & lib. de hist. animal. 6. cap. 5. & 4. de gener. anim. cap. 6. nullam herbæ factam mentione, pullorū hirundinis nupertimè in lucem editorum oculos si quis præpunxerit, aut stylo vexauerit, resanescere scribit, ac visum posteà planè recipere. Sed & ipse Plinius, lib. 11. cap. 37. *Oculos*, inquit, *serpentium catulis & hirundinum pullis si quis eruat, renascí tradunt.* Id verò si ita est, soli genitali facultati acceptum ferendum est, quæ quidem in recens editis eiusmodi animalibus oculis nondum absolutis insidet. Enimuerò cùm nuper excluſi hirundinum pulli non videant, imperfectique edantur in lucem, punctos tùm etutósve eorum oculos reparari ac resarciri posse non est à ratione planè alienum: quoniam iis nondum absolutis adhuc insidet ea genitalis facultas, quæ deliniationis fungens munere, nacta materiam, damnum sat commodè resarcire possit.

Cap. CCXII. ὁ μέγας ἀνθρωπίσκος] Sic habent omnes codices. Sed equidem cum plerisque interpretibus legere malim, ὁ μέγιστος ἀνθρωπίσκος. Nam & alibi Dioscorides, ἀνθρωπίσκος ὁ χειρίτης.

Cap. CCXIII. ἰχὼ δὲ τὰ φύλλα] Nobis haud secus ac priscis incerta omnino huius Othonnæ historia fuit in causa, vt è recētionibus nonnulli varia variè in hoc capite legerint. Ac inter cæteros quidem piæ memoriæ Præceptor noster Rondeletius, ἀντὶ τῦ, ἐλζίνων, ἐλλόμων, legebat. Doctiss. etiam Dalechampius, ἀντὶ τῦ, πλινθρώδη, vt audio, legit πλύθρια. Marcellus ἀντὶ τῦ, χαλάζωσι, λειχῆνας. Attamen perbellè respondent quæ de Othonna retulit Plinius, lib. 27. cap. 12. cum vulgata Dioscoridis lectione.

Cap. CCXIIII. ἐπιπεμφίου] Sensus erit clarior, si ἐπιπεμφίου legerimus, ἀντὶ τῦ ἐπιπεμφθέντος.

Cap. CCXVI. διαιτᾶται δὲ ὁ αἰπὺς τῇ σὺν αὐτῇ]

Galenus, 6. simplicium, hanc, quia insigni acrimonia prædita sit, valentiùs quàm satiuam desiccare monuit, ideóque valentiùs humidis putrescentibúsque vlceribus obsistere: ad cætera verò minùs antedicta valere: quippe quæ immoderatiùs desiccet atque mordeat.

CAP. CCXVII. ἀφ' ὧν πανακία] Illud, ἀφ' ὧν, mihi meritò suspectum est, quoniam non ex alarum finibus, sed ab ipsa potiùs radice totidem ramulos prodire est verisimile. Quare vel ες voces redundant, vel post eas aliquid desideratur.

Quæ ab operis typographicis pag. 39. per imprudentiam prætermissa fuere, hoc loco supplere visum est.

†† CAP. CXII. ἢ ἀναπύρων] Sic citat Gal. 1. de alim. At Marcellus ἀναπύρων (rectiùs fortassè, ἀναπύρων) legendum ideò putauit, quoniã Galenus & ipsum secutus Paulus κρίμνον dixêre, ἀλφίτου ἀναπλέονος, hoc est, *Crimnon quam polentã ægris anaqui.* Veruntamen nihil impedit, quominùs simpliciter enuntiãtes, κρίμνον ἀναπύρων dicere possimus: si verò cum polenta comparemus, hac ipsa ἀναπλέονος, quemadmodũ etiam tum Gal. tum Paulus pronuntiauerũt. Cæterùm non ex zea tantùm olyráve & tritico parabatur Crimnon, sed & ex hordeo. Nam, vti annotat Gal. in Hipp. 2. prædicti. Crimnon dicitur, quæ effracto hordeo inuenitur farina grandiusculaq; quippe quæ non perfectè molita est. Porrò ὠμὴ ἢ, ἀποτηγάνισις, legitur apud Gal. loco citato, ἀποτηγάνισις, eodem penè significato: quanuis aliud est torrere, aliud verò frigere.

CAP. CXIII. κριὴ ὀλύρας. Olyram Plinius arincam appellari scribit, cámque diuersam penitus facit à zea, contrà quàm existimarit hoc loco Dioscorides itémque Galenus, dum ζειὰς vocem apud Hipp. exponit, ὀλύρας. Huius verò speciem aliquanto deteriorem, typham dici solitam ex eiusdem Gal. verbis facilè licet colligere, quanuis typham cũ Olyra eandẽ fecisset Mnesitheus.

CAP. CXIIII. οὐ τὴς ἀλφιτώδους] Non ex sola zea, aut huius specie, olyra dicta, Atheram seu atharam Aegyptiorum fieri hoc ex loco inferri velim. Nam & ex amylo eam cõstare prodidit Aëtius: Iulius verò Pollux, è miliacea farina.

CAP. CXV. πράσος ἢ χάμαι] Gal. hæc verba citans. 1. de alim. mẽdosè sic habet: πράσος ἢ σπερμα μὴ ἐξεπτυσμένον χόνδρου. Porrò Tragum hunc, quem ab herba maritima cognomine distinguentes nonnulli, σπάνδιν, hoc est, *arenalem*, coguominant, Oribasius, lib. 3. ἀναστον, *far crassius* appellat, nec ineptè quidẽ: quandoquidem à veterũ farre factitio, quod cum Dioscoride κρίμνῳ quodammodo conuenire videtur, eo solo differt, quòd hoc mola in partes confringeretur, ille integer repurgatus asseruaretur Gal. lib. 1. de alim. fac. ex olyra nobilissima vti decet excorticata Tragum fieri prodidit. Sic & Autor Γεωπ. lib. 3. ex olyra præstãti parari voluit, ad eundem modũ, quo ex hordeo ptissana. Alio tamen loco idem Gal. ex zea fieri tradit, cuius vtiq; species est olyra, vel ipso teste Dioscoride. At Plinius, lib. 18. cap. 7 ex ipso etiam tritici semine, dum decorticatur. Sic & Autor Γεωπ. loco suprà citato, è frumento quoque Alexandrino fieri commemorat.

CAP. CXVII. τὰ σπερμὰ] Galenus 1. Alim. non inter frumentacea, sed inter legumina Oryzam recenset. ὄσπρια enim quæ Latinis sunt *legumina*, ibidem appellari scribit, cerealia omnia, semina, è quibus panis minimè conficitur. At quod idem βρίμην, id est, auenam, ex leguminum genere scribit esse, lib. 6. simpl. medo minimè carere existimauerim, atque adeò pro ὀσπρίων, σπερμὰ, esse reponendũ. Est enim alia Oryza, quã ὄρυζον etiam neutro genere nominat Theophrastus) alia auenæ ratio.

IN LIBRVM TERTIVM.

CAP. I. Κρατεῖ ῥίζα] Etsi incertam & ambiguam de Agarico ex opinione vulgi sententiam protulit Dioscorides, illud tamẽ radicem esse voluit, quem in eo deinde secutus est Galenus: quanquam hic ita radicem esse agnoscit, vt tamen non intra terram cæterarũ more latere, sed arborũ caudicibus innasci & adhærescere fateatur. At vetiùs cum Plinio, lib. 25. cap. 9. fungus est, non quidem radicibus, sed ipsis truncis innascens arborum, non glandiferarum modò, (quod voluisse videtur Plinius) sed & coniferarum. Nam & laricibus summis innascitur, quod inter cætera hodie præfertur: quippe cuius apud nos vsus sit frequentissimus, siue ex Allobrogũ, siue ex Valesiæ Alpibus inuehatur.

ἔχει κλάσεις ὑδατίας] Ita sentiunt Aëtius & Auicenna. A Mesuæo verò filamẽta Agarico mari eidémque deteriori potiùs tribui videntur, vti & rotunditas, fœminæ. Sed reuera fœminæ, quæ bonitate antecedit, si frangatur, rectis venarum discursibus & quasi diuisuris constare cernitur: mas verò, in fracturis (quod aliud est) villosus fibrosusve neruorum modo cõspicitur.

ἐκ πυκνῆς] Idem repetit Autor, 2. ἄκ. cap. 13. & 14. Sed quomodo stomachicis Agaricum rectè conuenire possit, dubium fortasse non abs re fuerit. Siquidẽ Aëtius, Tetrab. 1, ser. 3. cap. 40. illud tradidit stomacho omnino aduersari, quia scilicet leue sit, ac in stomacho supernatet. Idẽ quoq; memoriæ prodidit Actuarius, meth. med. lib. 5. cap. 8. Paulus verò, lib. 4. cap. 7. affirmauit nõ esse stomacho valdè noxium. Sed nos cũ Aëtio & Actuario sentire cogimur, quoniã nostrũ nauseabundũ esse quotidie experimur. Fortasse verò præstãtius illud fuit, quod olim è Sarmatiæ regione petebatur, in qua fuêre vrbs, amnis & promontorium eodem Agari nomine, à quibus & Agaricum nomen sibi vendicasse creditur.

CAP. II. οἱ δὲ ῥᾶον καλοῦσι] Hanc radicem Plinius Rhacomatis nomine describit, lib. 27. cap. 12. Galenus & Paulus, æquè ac Dioscorides, Rha seu Rheon appellant, ita dictam à Rha fluuio cognomine supra Pontum & Bosphorum Tanai vicino: quoniam in illius supercilijs ea gignebatur, teste Ammiano Marcellino. Alij quòd è regionibus supra Pontum afferretur, nomine composito Rhaponticum dixêre. Aëtius ῥᾶον Ποντικὸν seu ῥᾶον nominat. Actuarius, inter-

dúmque AEgineta ῥίζαν Ποντικὴν, vti Corn. Celsus, radicem Ponticam. Sed & iidem AEgineta & Actuarius, itémque Nicolaus Myrepsus, Rhei Barbari seu Barbarici nomine, eius ipsius interdum mentionem fecisse videntur. Et tamẽ non desunt è recentioribus primariæ notæ Medici, qui haud ita firmis, si quid iudico, nixi argumẽtis, à Rhabarbarico nostro hodie vsitatissimo radicem hoc capite descriptã toto genere differre affirmauerint. Verùm quoniam ab Arabibus recentioribúsq; Græcis eadẽ propè Raued Scenitico, Rhabarbarico seu Indico assignantur, quæ à Dioſc. Galeno, priscísque aliis olim Rheo tributa sunt, eiusdem generis radices has esse meritò censuerim: sed quæ specie tãtùm differant, ac pro cœli natalisque soli, aut etiam maturitatis discrimine, pondere, odore, colore, sapore ac viribus euarient.

CAP. VII. σπλήνιον] Placet Dodonæi coniectura; qui ἡπατικὸν legendum censuit: maximè cùm Gal. 6. simpl. Gentianę radicem pronuntiet inter cętera, δραστικὸν τῇ ἰσχυρᾷ ἀποψήξει, hoc est, *in abstergendo esse peracrem efficacem*, abstersoriámque illi facultatem esse insignis amaritudo satis indicet. Adde quòd effectus qui proponuntur deinceps à Dioſc. abstersionis potiùs quàm astrictionis fidem faciunt.

CAP. IIII. βοηθεῖ τοῖς λεχοῖς] Id est, *parabus aut puerperijs*. Aldinus codex habet, βοῇ λεχοῖς, id est, *puerperis ipsis*, quem ego secutus sum. Plinius, lib. 25. cap. 8. *inter nobilissimas Aristolochiæ nomen dedisse grauidæ uidentur, quoniam esset εὐτόκιον λεχοῦσιν*, pro quo legendum, λεχοῦσι: quæ quidem vox puerperas aut certè parturientes veriùs denotat, quàm grauidas: quanuis etiam parturientes grauidas adhuc esse minimè negamus. Tantùm verò abest vt grauidis reliquo gestationis tempore opituletur Aristolochia, vt contrà maximè noceat: quandoquidem è locis muliebribus menses, secundas & partus extrahendi vim habet.

CAP. V. διαπίνει ἔχει δὲ πάχος] Plinius, lib. 25. cap. 8. longæ Aristolochiæ radicem ait, esse baculi crassitudine. Ac re vera huius radices inuenias, quæ crassitudine non modò baculum, sed & brachium æquẽt. Quare de iuniore Aristolochia accipiẽda sunt Dioſc. verba, non de proiecta; cuius radices quàm iunioris quadruplo aut etiã quintuplo interdum crassiores cõspiciũtur.

CAP. VI. ἀπίῤῥιζον μικρόν] Sic Oribasius, Serapio & Auicenna. Sed Valerius Cordus pro, ἀπίῤῥιζον, reponit ἀσίφιον, quem deinde secuti sunt Anguillara & Dodonæus. Ac certè quidem palàm est semperuiui folia nullo modo imitari Aristolochiam, nisi fortè quatenus, æquè ac semperuiui minoris, obtusa quodammodo potiùs sunt, quàm acuminata. Theophrastus lib. 9. cap. 13. nulla distinctione adhibita Aristolochiæ foliũ facit στρογγυλοειδὲς ἀλσίνῃ, πλὴν πρόχυλοτερον, hoc est, *alsinæ assimile: sed rotundius*: quo loco Dodonęus ἑλξίνῃ legit, quanuis & alsine helxines folia refert, teste Dioſc. Sed neq; licet animaduertere, qua ratione huius Aristolochiæ flores rutæ floribus assimilentur: vnde etiam suspicor ἀσίφ, πηγανωτὸν ἄνθος fortasse legendum esse. Omnes enim Aristolochiæ licet florum colore dissideãt, eorum tamen figura vna & eadem conspiciuntur, quam esse pileolorum instar Dioscorides anteà tradidit.

ἀσπὶς δὲ καὶ ἐρπύσι] Contrà, rotundam aduersus serpentes aptiorem esse voluit Plin. lib. 25. cap. 8.

ἀκαλύφη, μίσγει τῇ δυνάμει] Clematitidem quoque censet Galenus, 6. simpl. esse quidem cęteris fragrantiorẽ, sed ad medicationes inefficaciorem. Contrà Plinius Clematidi, ab aliis Creticæ dictæ, præcipuam vim esse asseruit, lib. 25. cap. 8. Neque iccirco desunt qui hanc ipsam esse velint, quam κλῆμα Andromachus Senior cognominat, quáq; ea in theriacam suam recipit. Attamen cùm hæc ipsa duplex esse comperiatur, nempe Clematis radice simplici, & quæ Pistolochia est Plinio, ab aliis à densis radicum capillamentis πολύῤῥιζος cognominata, hanc ego cum piæ memoriæ D. Rondeletio suspicor potiùs in theriaca desiderari: quoniam alteri Clematidi & odore grato & medicata facultate antecellere videtur. Nihilominus longam Aristolochiam theriacæ inserunt Nicolaus, Fernelius & plerique alij. Auicenna verò, rotundam.

CAP. VII. ἐνίοτε χίνα] Inter spinosa foliata Glycyrrhizam recẽset Plinius, lib. 21. cap. 15. quia sit *folijs*, inquit ille, *aculeatis merdacitas*. Rursùmq; lib. 22. cap. 9. eandem inter aculeatas plantas commemorat, *foliísque* scribit esse *echinatis*. Ex quibus facile est colligere, Plinium errore manifesto αἰνὶ τῷ, χίνα, legisse, ὑχίνῳ, neque vnquam illi fuisse visam Glycyrrhizæ plantam. Siquidem neutra Glycyrrhizæ species foliis vtitur aculeatis. Alteram quidem fateor echinum gerere platani echino haud absimilem. Sed aliud est echinum habere platani modo, aliud echinatis esse spinosísve foliis. Cæterùm hanc Plinius interdum Glycyrrhizam, nonnunquam etiam Glycyrrhizon nominat, vti & AEgineta. Theophrastus Σκυθικὴν ῥίζαν, itémq; ἀδιψαντικὴν. Hipp. γλυκύῤῥιζον. Nec enim aliter hãc vocem exponit Gal. in vocũ Hipp. Lexico, quàm βοτάνην τινὰ γλυκυῤῥίζαν καλουμένην, *herbam quæ Glycyrrhiza nominatur*.

ἀδιψίαν ποιεῖ] Galenus ideò sitim arcere dixit, 6. simpl. quia sit humana natura paulò frigidior, &, quatenus dulcis, etiam modicè humida. Theoph. lib. 9. cap. 13. de Glycyrrhiza verba faciens, διαπίνει δέ, inquit, καὶ πίνει δίψας παύει, ἐάν τις ἐν τῷ στόματι ἔχῃ· διὸ καὶ τοῖς ἐπὶ τῶν ἐργασιμων ἱδρῶτι φασὶ ἔνιοι Σκυθῶν ἀποχρᾶν καὶ ἕνδεκα ἡμέρας ἐσθίειν. hoc est, *Valet & ad sedandam sitim, si teneatur in ore: quas de causa scala ea cum equino cibo se Scythæ sustentare ad dies undecim uel duodecim*. Sic Plinius, lib. 12. cap. 54. *Quædam exiguo gustu famem ac sitim sedant, conseruántque mures, ut butyrum, hippace, Glycyrrhizon*. Rursúmque lib. 22. cap. 9. *Hæc dicuntur sitim famemque sedari, ob id quidam ἀδίψου appellauêre, & hydropicis dedêre ne sitirent*. Eodem spectat illud Columellæ, lib. 1. cap. 35. *Et quæ famem sitimque sedat Glycyrrhiza, ob hoc ἀδίψου uocata est*.

ἡ σπασμὸν ἐξαναστομοῦσα.] Sic legit Serapio. Sed haud dubiè cũ Plinio legendũ est, σπασμὸν, lapsu literæ vnius per quàm facili. Enimuerò Plin. lib. 22. cap. 9. cùm ante faucium vitiis omnibus conuenire Glycyrrhizã docuisset, paulò pòst, *cõmanducatam stomacho* esse subiecit. Quæ verò dicatur σπασμὸς φαρμακῶν, videre est apud Galenum, lib. 6. περὶ κράσ. τῶν.

κολίνικες ἔχει] Vulgata exempl. habebant κνίνικες: sed lego κολίνικες, veluti etiam legitur apud Gal. 6. simpl. cap. de Glycyrrhiza: quo loco citatur hic ipse Dioscoridis locus, hisce verbis: φησὶ δ' ὁ Διοσκορίδης τὴν ῥίζαν ξηρὰν κατάπλασσομένην, θερμαίνειν τὰ πεπηγότα χολώδη καὶ λεπτὰ φαρμακώδη. hoc est, *refert Dioscorides radicem siccam tritamque puerygijs si inspergatur, per quam idoneum esse remedium.*

Cap. VIII. ἀμυδρὸν μὲν πικρὸν οὐκ ὀλίγον] Ita Oribasius & Serapio. At Plinius, lib. 25. cap. 6. quo loco Centaurium maius totidē fere verbis describit, radicem hanc non quidem acrem, sed amaram esse prodidit cum quadam dulcedine. Cæterùm autor libri de viribus Centaureæ ad Papiam, aliud ex Crateua describit Centaurium maius, ab hoc Dioscoride diuersum, quod sit, *foliis lapathi hortensis, sed minoribus, serratis in ambitu caule trium palmorum altitudine, flauo rubro, capite in acumine squarroso, radice solida & crassa, gusto caula & salsa.* Ex quibus facile est colligere illud ipsum esse, quod simpliciū diligētissimus indagator Car. Clusius, in rariorū Hispaniæ stirpium historia, depingit, ac supra Olyssiponē lapidosis iuxta Tagum collibus inuenisse se commemorat.

ἀκανθῶδες κεφαλῆς] Hęc ad capitis calcē non habentur apud Serapionē: ac meritò quoq; à Marcello & Cornario inter Dioscoridis notha reponuntur.

Cap. IX. ῥίζα μικρὰ, ἄχνης, λεπτὰ] His addūt Marcellus & Ruellius, *gustu amara* esse. quibus tamē verbis nihil est quod respōdeat in Græcis quotquot occurrerunt exēplaribus. Quin & huius amaritudinis, quā afferat radix Cētaurij minoris, nullā facere mētionē Oribasius & Serapio.

ὁ χυμὸς ἰσχνὸς] Autor lib. de viribus Cētaureę, in conficiendo inspissandóque Centaurij succo, post reiecta spissamenta, aquæ excolatæ tertiam partē sapæ adijcit, quam simul decoquit ad iustam crassitudinem.

Cap. X. ἰξίας τῶν ἀκάλυκτων] ἰξία seu ἰξίας appellatio non huic tātùm, hoc est, albo Chamæleoni, sed & nigro iccirco rectè tribuitur, quòd vtriusque radicibus gummi quoddā ἰξῶδες i. *viscosum* æmulū adnascatur. Sic enim Plinius de Chamæleone in vniuersum, lib. 22. cap. 18. *Chamæleonem*, inquit, *aliqui ixiam uocāt: ac paulò post, nigri Chamæleonis* (quod quibusdam κολοφωνὶς & κυνόζολον vocari scribit) *radices tradit uiscum ferre ulceribus utilissimum.* Hesychius: ἰξίας, μανὸς, ὁ καὶ χαμαιλέων. Galenus vero in Lexico vocum Hipp. ἰξίαν interpretatur, φύλλον τὸ λευκὸν χαμαιλέοντος. Reperiūtur tamē nōnulli, in quibus sunt Cordus, Ruellius & Gorræus, qui nomen hoc ad nigri Chamæleonis radicem contrahant, existiméntque ἰξίαν radicem esse nigri Chamæleonis, non quidē cuiusuis, sed eius tāntùm qui viscū profundit: quod locis tantùm quibusdā & statis anni temporibus euenire asserunt. Illorū sententię fauent appellationes variæ Chamæleonis nigri, inter Dioscoridis notha relatæ. Quibusdam enim vlophonon, aliis ixiam, aliis denique cynozolon vocari reperitur. Quanuis autem non negamus Chamæleonis radices, non nigri modò, sed & albi, (si Aētio credimus) habere quid deleterium, (quod tamen nigri tantummodò Chamæleonis radicibus tribuit Gal. 8. simpl. vti & Nicander in Theriacis) nihilominus aliud fortasse veneni genus & à Chamæleonum genere omnino diuersum esse crediderim ἰξίου πῶμα ἀλέξητον Nicādri, seu ἰξίας, cuius sexto libro Dioscoridis aut quisquis est ἀλεξιφαρμάκου Autor, inter venena mentionem facit: siue eo nomine radicem quandam designauerit, (quod verisimile videtur) quia priùs inter radices venenatas in eiusdem libri prooemio enumerauerat, siue viscū fuerit, quod radicibus quibusdam exudaret. Et tamē Dioscoridis lib. 2. περὶ ἀκονίτου, cap. 150. ita scribit: ἰξίου δὲ καὶ μίλακος, χαμαιλέοντος λευκοῦ, καὶ τῶν ὁμοίων βοτῶν, &c. Sic & Scribonius Largus de ixia veneno insigni agens, lib. 2. de comp. medic. cap. 60. *Ixia*, inquit, *quam quidam Chamæleonta uocant.* Verùm & eam quoque tùm fuisse vulgi opinionem sit mihi verisimile, quæ tamen fallax & à vero aliena esset. Enimuerò quo loco venenatas radices commemorat Dioscoridis in citati libri præfatione, à Chamæleonte ixiam manifestò distinguit: quanuis deinceps nullum de Chamæleontis radicibus eo libro peculiare caput habeatur, quia fortè neque etiam apud Nicandrum in Alexipharmacis, è quo pleraque mutuatus videtur. Quin & seorsim ac diuersis capitibus vtriusque Chamæleontis radicum & ixiæ meminēre Paulus & Aëtius, ac multùm differentia recensuēre quæ à sumptis his aut illis eueniunt symptomata. Huc adde quòd, quicquid scribant Anguillara & Dodonęus, ixine, pro qua perperàm apud Plinium habetur *helxine*, itémq; ixia & Chamæleontis genera, tanquam diuersę omnino plantæ, à Theophrasto, hist. lib. 9. diuersis capitibus describūtur. Quanuis tum his tum illis commune id esse agnoscit, quòd lacrymam fundant: ixine quidem è caule, sub alis foliorum: ixiæ vero è radicibus ipsis. Sed & Plinius huic secutus de ijsdem tāquam diuersis egit, lib. 21. cap. 16. Quænam porrò sit fuerit ve ixia propriè dicta, quę viscum est Plinio, equidem hodie penitus adhuc ignorari existimo.

φύεται δὲ ῥίζαις ὑπὸ] Plinius, libro 22. cap. 18. non nisi Chamæleontis nigri radicū facta mentione tradidit, candidum Chamæleontem viscum sub alis foliorum quibusdam in locis gignere.

ἡ πολύμορφος] φύλλα quidem vtriusque Chamæleontis πολυμόρφα agnoscit Theophrastus, lib. 9. hist. cap. 13. Attamen aliàs illis negat esse aculeata folia. Siquidem lib. 6. cap. 3. & 4. Chamæleontem ἀφυμάκανθον esse prodidit. Atque hunc secutus Plinius, lib. 21. cap. 16. *Chamæleon*, inquit, *in foliis non habet aculeos.*

τραχύτερα δὲ] Sic Oribasius, Plinius, itémque Serapio: at codex Aldinus habet, μαχύτερα, hoc est, *crassiora.*

ἡ κεφαλὴ] Vel hoc ipsum spinosum caput cinaræ simile, seu, vt voluit Theophrastus, cynaracanaceum, satis arguere videtur Carlinas nostras à Chamæleonte toto genere discrepare: quo fit vt quænā planta sit Chamæleon albus, certi quicquam nondum affirmare possim. At Chamæleontem nigrum eum esse minimè dubito, quem & ipse Maranta pro Chamæleonte nigro agnoscit. Illud porrò non omittēdum, turpiter Arabes nominum affinitate deceptos Chamelæam cum Chamæleonte confudisse.

καὶ δὲ καὶ ἰσχυρὰ] Sic albi Chamæleonis radicem Nicander in Theriacis inter alias recenſet ὀφίων ἀγκροὶ, *ſerpentium neruus auxiliaris*. Plinius verò, omnium Chamæleonis generum radices ſcorpionibus aduerſari prodidit. Attamen citato loco Nicander diſertè nigri Chamæleonis radicum, tanquam venenatarum, vſum in aſſumendis omnino fugiendum cenſuit: quod ipſum innuit Gal. 8. ſimpl. dum illas ſcribit ἰσχὺν ἔχειν φαρμάκου, *habere quid deleterij*. At apertiùs AEgineta, lib. 7. τὸν, inquit, λευκὸν ἐκλεκτὸν τῷ σώματι, δυνατώτερόν ἐστιν. hoc eſt, *ſi intra corpus ſumatur, potentior eſt*.

ἀναιτίους γὰρ αὐτοὺς καὶ ἀβλαβεῖς] Quoniam ex Theophraſto pleraq; in hoc caput trāſtuliſſe videtur Dioſcorides, ſunt nonnulli qui ex Theophraſto locum hunc ita reſtituendum exiſtimarint: ἀναιτίους δὲ καὶ αὐτοὺς ἰδ. καὶ αὐτοὺς μὲν, σὺν ἀλφίτοις πεφυραμένη καὶ ὑδρελαίῳ δοθεῖσα· οἱ δὲ, μᾶλλον κεράμους μυγαλάς. hoc eſt, *mures & ipſos ac ſues: & mures quidem, ſubacta cum polenta & hydrelæo data: ſues verò, braſſicæ admixta*. Sunt enim hæc Theoph. verba, lib. 9. c. 3. αἱ μὲν δὴ καὶ αὐταὶ καὶ οὗν ἀναιροῦσι μᾶλλον, ἀλφίτοις ἀναφυραθεῖσα μετ' ἐλαίου καὶ ὕδατος· οὗν δ', ὅταν ἐφεψηθῇ μετὰ τῶν ἰρίων. Sed & muribus infenſiſſimam eſſe Chamæleonis albi radicem, ſatis patet ex Plinio, lib. 22. cap. 17. vbi ille: *Hic ſuctus*, inquit, *occidit mures ſuéſque, in polenta. Addita aqua & oleo, contrahit in ſe mures ac necat, niſi protinus aquam ſorbeant*. Galenus quoque mures perimere tradidit, lib. de paratu facilib. medic. ad Sol. Ideóq; in Dioſcoridis contextu nihil immutandum cenſui. Porrò nō tantùm canibus ſuibúſve, ac muribus quoque deleterius eſt albus Chamæleon, ſed & hominibus ipſis. Nam & qui album Chamæleonē hauſerunt, ſtrangulantur, teſte Aëtio, Tetrab. 4. ſerm. 1. Verùm hoc ſi ita eſt, quî fiet, obijciet quiſpiam, vt beſtiarum venenis eſſe pro antidoto, ac ſecurè tutóque intrò aſſumi poſſit? Huic equidem obiectioni facilè reſpōderi poſſe puto, ſi animaduerterimus ex Gal. 5. ſimpl. cap. 18. alexeteria mediam obtinere naturam inter corpora ipſa & venena: ex quo fit, vt quæ venenis aduerſantur, largiùs aſſumpta corpus animantis oblædant.

Cap. xi. καὶ λευκόιον] Reſtituetē ex Theophraſto, λευκόιον, niſi vnus eſſet omnium exemplarium conſenſus. Siquidem ὁ δὲ μέλας, inquit Theoph. loco modò citato, πρὸς φύσιν περίεργος. σκληρότερος γὰρ ἴσχει πολὺ τὸ ἄκρεμον καὶ λεπτότερον. hoc eſt, *Niger Chamæleo* (*vernulagnem* vertit Gaza) *folio eſt ardui, at minore lauroque*.

ἴσχει σκληρότερον] Vel ἴσχον legendū, vt ad Chamæleonē referatur: vel ἴσχειν, vt ad proximè præcedentē vocem χαμαιλέοντος. Porrò aliud quàm quod ſignant hoc loco verba Dioſc. voluit Theophraſtus, nimirum, totā ſtirpem vmbraculi ſpeciem repræſentare, idque verbis hiſce: κόμης δ' ἄνωθεν ἴσον ἄκρεμον σκιάδιον.

κυβερνάδιον] Videtur legiſſe Ruellius, κυβερνήδιον.

ἐλαιῶνα] Addit Oribaſ. ἢ πηγὴν, *nonnunquam vtile*.

Cap. xii. ἐν ὅμοις ἀμμώδεσι] *Naſcitur in ſabuleto*, inquit Plinius, lib. 27. cap. 8. atque hinc colligūt nonnulli, cum Hermolao, ἀμμώδεσι legendum. ὀδοντώδεσι, legendum ſuſpicatur Cornarius, quia τὰς ἐν τῷ ὕδατι ἐναλίους κροκοδείλους τὰς μεγίστας, hoc eſt, *Crocodilos maximas, ſecus aquas naſcentis*, meminerit Gal. lib. 2. κατ. τόπ. Sed & ἀμμώδεσι, ἰσόμωρον ex Plinio legēdum foret, ἰσόμωρον. Is enim eodem loco radicem eam æqualiter craſſam eſſe prodidit. At Oribaſius, ἴσον μῆκος legiſſe videtur.

Cap. xiiii. πυρίους ἀπυρίους] Galenus, lib. 6. ſimpl. itémque Aëtius, ſimpliciter & in genere πυρίους, non addito, πυρίους. Sic enim vterque: τὸ δὲ πυρίους λεπτομερεῖς καὶ θερμοὺς δηλοῖ καὶ ξηροὺς· οὐχὶ δὲ καὶ πυρίους αἰσθήσει πυρός. *Semen ignis eſſentiæ & calidæ facultatis eſt: itaque potui dari conueniet ijs qui conuelluntur*.

Cap. xv. ἄκανθα Ἀραβική] Gal. lib. 6. ſimpl. Spinam Arabic, ā quā & AEgyptiā vocat, ſpinæ quidē albæ ſimilem eſſe refert: at magis aſtringere ſiccaréque quàm ſpinam album, propterēáque ad omnia ad quæ & illa efficaciorem eſſe. Perperàm autem Ruellius nominis homonymia deceptus, lib. de nat. ſtirpiū 3. cap. 13. fruticē hūc cum acaciæ ſpina confundit, arborea ſcilicet illa itidem AEgyptia dicta, quòd in AEgypto naſcatur, de qua priùs Dioſcor. lib. 1. cap. 133. Ei errori fortaſſe Plinius occaſionem dedit qui quidem, lib. 24. cap. 12. *ſpinæ Arabicæ laudes in odorum loco* dixiſſe ſe commemorat, cùm tamen ſolius ſpinæ Acaciæ lib. 13. mentionem feciſſe comperiatur. Et tamen facile fuit animaduertere, Plinium eo ipſo cap. proximè citato Arabicam ſpinam ab AEgyptia ſpina manifeſtò diſtinxiſſe. Cæterùm quod ad capitis calcem addiderunt Interpretes, (*Proximus locus aſperis*) id in Aldini codicis nothis tantummodò legimus ἐγγὺς δὲ ἐστι τραχείᾳ ἄκανθα.

Cap. xvi. διοῦδις κεφαλαντιμῆς] Lege, κεφαλαντιμῆς, veluti etiam aliquoties annotauimus.

ὁ δὲ κάκτος ἡμερὰς] Huius Cardui non herbam ſolam, dum recens teneretur, eſitari ſolitam vel ex eo conſtat, quòd Theophraſtus eius quoque radicem tum crudam tum etiam coctam in cibo gratiſſimā eſſe teſtatur, potiſſimúmque florente Carduo. Sed & Plinius hāc ipſam radicem veſcendo eſſe commemorat. At hodie Cardui radix, ſiquidem Carduus cinara noſtra ſylueſtris eſt, maximam præ cæteris à locupletum menſis inijt gratiam: quæ tamen olim Eratoſtheni in pauperis tantùm cœna laudabatur.

Cap. xvii. αὐτὴ μακρὰ, λευκὴ] Cornarius ex Plinio legit, μακρὰ χλωρὰ. Plinius etenim Poterio (quod etiā phrynium ideò appellauit, quòd rubetarum venenis in potu auxilietur) florem longum & coloris herbacei tribuit, lib. 27. cap. 12. Anteà tamen (rectiùs, opinor) lib. 25. cap. 10. Poterium floribus paruis eſſe tradiderat. Ita Plinius interdum locis diuerſis ſibi pugnantia ſcripſit, vix vt facile ſit, quæ potior ſit ſententia, diiudicare.

Cap. xviii. καθ' αἱ ἀφαιρέσεις] Goupylus hæc ex altero codice huic loco aſcribenda cenſuit, καθ' αἱ ἀφαιρέσεις καὶ χοαί, quæ tamen in vulgatis codicibus deſiderabantur. Cornarius legit, καὶ ἐπ' αὐτῇ χοὴν ἀφαιρεῖν. Illam potrò ſcripturam tum Plinius, tum & Interpretes omnes expreſſerunt. Habētur & eadem verba apud Oribaſium.

ὁ σωσυρηδὴς] Hunc locum ita reſtituo: ὁ σω-

γαλάξιον καὶ ὑφαιμοειδὲς βαμβακώδεις τοῦτας γίνεσθαι φασι. Sic Plinius, lib. 24. cap. 12. *Huic* (scilicet, spinæ albæ) *simulus est spina illa quam Græci ἀκανθοβάτον nominant, minoribus multo foliis, aculeatis per extremitates & araneosa lanugine obductis: quæ collecta etiam nostri quædã bombycinis similes fiunt in Oriente.* Sin minùs placet ea lectio, paucioribus immutatis ita quoque legere possis: ὃς συλλεγόμενος καὶ ὑφ' ἓν ἐλθὼν βαμβακώδεις γίνεται. hoc est, *quæ* (scil. lanugo) *collecta & in unum tractu bombycis gossypii nec speciem præ se fert.* Neque verò ignoro aliud esse bombycem, aliud verò bombacem seu xylum gossypiúmve: sed & Plinium imitari libet, qui xylo quoque seu gossypio bombycis nomen tribuit, lib. 19. cap. 1.

CAP. XIX. ἀκανθοβάτου] Aldinus codex, itémque vetustus & Catac. ἀκανθοβάτου, legunt. Ita & habetur apud Oribasium: quò factum est, vt tum Hermolaus, tum etiã Manardus eam quoque scripturam retinendam censuerint. At Ruellius, Marcellus ac pleriq; alij, qui in Acanthi foliolis, è quibus tanquam ex aluceolis flores prodeũt, nihil quod hyacinthũ figura aut colore referat agnóscunt, ἀκανθίδιον legere malunt. Vtra verò lectio potior fuerit, lector iudicet. Minuta certè quidem illa caulis folia spinulis armata cuiũis obseruare liceat: quorum quidem ratione *branca vrsina* Officinis dicta locũ inter aculeatas plantas, & apud Græcos ἀκανθίου seu ἀκανθίς nomen, sibi vendicauit. Cæterùm pro eo quod paulò pòst sequitur, ὑπωχρὸν, quódque *igneo rubore nitentes* vertunt nonnulli, malim equidem geminato ρ, ὑπερρὸν legere, hoc est, *rufa*.

CAP. XXI. ἀνανθὲς] Lego ἀνονθὲς. Ita enim Theophrastus & Galenus appellarunt, fortè dictum ἀπὸ τῶν ὄνου καὶ ὄνου, quòd ad eam asini pruriginosi sese libenter affricent. Alioqui ἄνονις dicitur, quasi inutilis, quòd aratro ac ipsis quoque frugibus sit inimica.

ἄνανθες] In Catacuzeni exemplari, si Matthiolo credimus, legitur ἀνωδὲς, at perperàm, sensu nullo. Sed neque multò rectiùs Marcellus *cinereo colore* vertit, quasi ἀνοδὲς legerit. Sic & paulò inferiùs Manardus & Fuchsius ἀπὸ τῶν, ἀπορρίπτει, ἀπορρίπτου, hoc est, *abspergat*, legisse mihi videntur. Cæterùm quo loco de radicibus agitur, alter codex, itémq; Oribasius, voci, ῥιζαι, subiungũt, πεχέως, i. *crassas*: sed eam vocem Interpretes minimè agnoscunt.

CAP. XXIII. πινὰ μανξὺ] Vel est μανξὺς vocis μαλθὸν, iungendáque est voci, ἀκανθώδη: vel, ἀπὸ τῶν, ἀπαλὰ, ἁπαλὸς legendum videtur, nimirum ἀκανθώδης.

CAP. XXV. ἀβρυφῆ] ἀ νὶ ἀβρυφῆ legere malui ex vetusti codicis autoritate, quàm cũ vulg. exemplaribus, ἀβρυφέες siquidẽ neutrius Aloës folium teres rotundúmve esse αἰνῶσις satis indicat.

ἀνατέμνειν] Aëtius in delectu simplicium medicamentorũ, huius vocis loco habet, πάνυ ἀναλυτικὸν. Sic & Plin. lib. 27. cap. 4. de Aloë verba faciens: *Improbanda*, inquit, *nigra & dura*, &c.

ψαιβολίῳ] Fortè ψαιβομίλτῳ.

ψιχοὶ ὑγαλακτίδες] Marcellus & Andreas Lacuna ὕδατος γαλακτίδος nomine *serũ lactis*, Græcis ὀρροῦ γάλακτος dictũ, interpretati sunt. At nos cum Plinio & plerisque Interpretibus ὠρίδαμ seu ὠρίδαν conuertimus. Sic enim ille, lib. 27. cap 4. *bibitur*, inquit, *Aloes drachma ad stomachi dissolutionẽ in duobus cyathis aquæ ὠρίδος recentis frigidæ cochlearu mensura, bis terue in die ex mulsella, ut res exigit.* Sed & lacteum teporem γαλακτώδους voce designari satis patet ex variis Galeni & Aëtij locis. Etenim Gal. 7. Meth. τὸ χλιαρὸν ὑδατῶδες, Medicis γαλακτώδη appellari solita innuit, his verbis: χλιαρὸν μὲν ὑδατῶδες ὠνομάσθη, τὸ καλῶς ἔχον δὲ ἐκεῖνο γαλακτῶδες, &c. scilicet *quæ lactis modo repleat*. Sic & Aëtius, lib. 9. cap. 6. μαλάσσειν γαλακτώδη τὴν ἀοῦ dixit, *quod lactei teporis esse tactu deprehendatur*: hoc est, quod neque calidum neque frigidũ esse tactus ipse iudicat. Quin & eodẽ planè significato vocem γαλακτώδης ab ipso Dioscoride vsurpari constat, lib. 4. cap. de betonica: quo loco vinum dilutum tepidum, ὑδαρὲς γαλακτῶδες appellauit. Possem & alia tũ ex Paulo, tum ex Aëtio exempla huc in medium afferre, quibus ista γαλακτώδους vocis significatio confirmaretur. Sed eã rem libens reticeo, quoniam in doctis Cornarij commentarijs Medicis plurima iam annotata reperiet.

ἔνιοτε κάτω χωρεῖ] Quî fit, dicet aliquis, vt ictericum purget Aloë, tùm minimè expurgetur ictericus, nisi humoribus biliosis ab ipsa cute tractis: testetur verò Gal. 8. de comp. med. κῆ τῶν. Aloës vim purgatoriam hepar minimè transcendere, tantum abest vt corpus totum atque adèo cutim ipsam purgare valeat? Verùm facile est respondere, Aloën non nisi ex accidenti & consecutione quadam ictericos purgare, dum scilicet biliis distributionem prohibet, sanguinẽ expurgando qui ab hepate in vniuersum corpus diducendus erat. Huc adde quòd illud fortasse vix præstat, nisi potentioribus admista catharticis.

ξηρὸν δὲ ὑπάρχουσιν] Lege, ὑπάρχουσι. Est autem enallage generis, vt & in priore illa voce, μιγῆ. Siquidẽ non ad αἱλόη, sed per αἱλόης ad subintellectum χύλισμα seu ὑπόμα, referri par est.

αἱμορροΐσιν οὐ μόνον] Non has modò ex hæmorrhoidibus sanguinis eruptiones, sed etiam sanguinis excreationes, vti conceptis verbis antèa monuit Dioscorides, nec nõ & alia quæuis sanguinis profluuia sistere Aloën, præter Galeni aliorúmque veterum autoritatem, vt ratio ita & experientia fidem facit. Contrà verò Mesues & Auicenna, venas hæmorrhoidum reserare Aloën, atque adeò hæmorrhoidibus ac sedi maximè nocere scripto prodiderunt: nec malè. Siquidem, vt nihil, Galeno teste, 3. de temp. sumptum & admotum vires habet easdem, ita & Aloë pro varia vtendi ratione diuersos ac planè cõtrarios sortitur effectus. Nam foris adhibita, qua valet emplastica & sarcotica facultate, fluẽtem vndecunque sanguinem sistit atque cohibet: intrò verò sumpta, hæmorrhoidas aperit, seu totius substantiæ proprietate, seu ex accidenti, vel propter mordacitatem humorum quos educit, vel ob amarorem insignem substantiæ crassitiei coniunctũ: cuius quidem ope & vasorum ostcula reserat, & facultatem expultricem irritat. Sed hæc solutio, dicet aliquis, non vsquequaque satisfacit: quandoquidem Aloën etiam potam scripsit paulò antè Dioscorides, sanguinis excreationes sistere. Huic ergo respondemus, in Aloe substantiam nos duplicem agnoscere, vnam quidem terrenam & crassiorem, al-

teram verò tenuiorem: atque ex hac ſubſtantiæ diuerſitate fieri, vt Aloë ſanguinis quidem excreationes aſtringendo ſiſtat, ipſarum verò hæmorrhoidum oſcula recludat. Siquidem ad partes reſpirationi dicatas, ceu propiores, terreſtres illius aſtringentéſque portiones facilè deducuntur ab ipſa tenui ſubſtantia, in qua amaritudo ſita eſt: contrà verò ad venas ani, ceu nimiùm remotas, illius quidem tenuiores partes ſat facilè, terreſtres verò difficiliùs, peruenium. Tale porrò quiddam & de Cétaurij maioris radice proditũ eſt à Gal. 7. ſimpl. dum ab ea ſcribit tam diuerſos planéque contrarios produci effectus, vt & ſanguinem ſpuentibus aſtringendo proſit, & ueri vaſa potenter aperiat.

καὶ καυδῶν κνημικῶν] Vulg. exempl. ἀκαυδῶν, ſenſu nullo: ideóque legi καυδῶν, dempto α, ex vetuſti codicis autoritate & omnium Interpretum conſenſu. Sic & Plinius, lib. 27. cap. 4, de Aloë verba faciens: *Oculorum*, inquit, *uitia omnia ſanari ea annuent, primum pruriginem & ſcabiem genarum.*

Cap. xxvi. ἀκαῦδι καὶ ἀκαυλόφυλλον] Lego, ἀκαυλόφυλλον. Sic & paulò pòſt, κατὰ τῶν ἄκαυλα δὲ καὶ τὰ τῶν χαλκάνθων, legendum iudico: ἔστω δὲ καὶ τὰ τῶν ἀψινθίου χάλκανθα, &c.

Cap. xxvii. ὧν τὰ μὲν Κατταδοκίαν Ταύρου ἔφη] Quanquam hæc verba etiam habétur apud Oribaſium, tamen non abs re Marcellus & Cornarius ſuppoſititia eſſe, perperámque huc è proximè præcedéti capite tranſlata, cenſuerũt: quandoquidem non eſt veriſimile, plantam maritimam tanta copia in monte Tauro prouenire. Sed & iidem quæ ad capitis calcem adduntur, ἀντιόχεια δὲ &c. ad ſuperius illud Abſinthium Ponticum referri maluerunt: nec malè. Nam & Theophraſtus, lib. 9. cap. 18. luce clariùs Abſinthio Pontico iſta tribuit, hiſce verbis: ἐπὶ καὶ τὰ ἀψίνθια τὰ μὲν ἀκαῦδη ποιεῖται τὰ καὶ ποντικὰ, τὰ δ' ὧν τὰ Πόντια ῥίζαται, καὶ χίονα πάσχει καὶ κρύος, & (ὡς δή τινες λέγουσι) ἐκ ἔχοντα χολὴν. hoc eſt, *Nam & abſinthium pecora huius tractus paſcere quidam negant: Pontum uerò paſcunt: quin & pinguiora pulchriora reddunt. & ut quidam uolunt, ſine felle.* Sic Plinius, lib. 27. cap. 7. *Abſinthij genera ſunt plura: Santonicum appellatur à Galliæ ora: Ponticum à Ponto, ubi pecora pinguiſcunt illo, & ob id ſine felle reperiuntur.*

Cap. xxviii. ὁ ἀπηγμένος Σαρδόνιος] Ald. Σαρδόνιον. quam quidem lectionem Anguillara & Pena præferunt. At ego Σαντόνιον lego, vel cum Gal. Σαντόνικον, & inferiùs αὐτῷ, Σαρδονίδι, Σαρδονίδι vel Σαρδονίᾳ: maximè cùm apud Santonas Galliæ Aquitanicæ populos eiuſmodi Abſinthium giguatur copioſiſſimum, quale hoc loco deſcribitur. Neque verò ignoro eſſe, qui in Galatia Aſiatica regionem quandã agnoſcant Sardonidis nomine. Sed quis eſt, quæſo, è Geographiæ ſcriptoribus, qui Alpium Aſiaticæ Galliæ mentionem vnquam fecerit? Veriſimilius ergo eſt, τὴν καὶ τὰς Κλάτας Γαλατίαν, Galliam noſtram intelligi, ad differentiam Γαλατίας τῆς καὶ τὴν Ἀσίαν, cuius ſequenti capite fit mẽtio. Huc adde quòd Galenus & Plinius palàm huic noſtræ lectioni aſtipulantur. Siquidem Gal. libro 6. ſimpl. Abſinthij Santonici mentionem facit ex Dioſc. *ita*, inquit, *agnominati à Santonia regione, in qua naſcitur.* Sic Plin. lib. 27. cap. 7. inter cætera Abſinthij genera *Santonicum* commemorat, *ſic appellatum à Galliæ ora.*

Cap. xxix. ἀκαυλόφυλλον] Oribaſius, ἀκαυλόφυλλον: alij ἀκαυλόκαρπον. Ac certè quidem ſiue ἀκαυλόκαρπον legas, ſiue ἀκαυλόκαρφον, vnica mutata litera, parum intereſt. Nã & tenue eſt tum Abrotoni, tum Abſinthij ſemen, & gracilis vtriuſque ſurculus. Attamen quoniam Interpretes pleriſque ἀκαυλόκαρπον legiſſe videbantur, eam quoque lectionem libenter amplexus ſum. Sic & inferiùs, cap. de ſtœchade, αἱ τῶ, ἀκαυλόκαρπος, lego ἀκαυλόκαρφος.

πήγνυσι τὰ ῥιγώματα] De periodicis febrium rigoribus hęc accipienda ſunt, vti colligere licet ex Galeno fidiſſimo Dioſc. interprete. Is enim lib. 6. ſimpl. cap. de Abrotono: ἡ μὲν δὴ δύναμις, inquit, ἡ θερμὴ καὶ λεπτομερὴς ῥίγεσι, καὶ τοῖς ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς ἐπιγινομένοις ἐκ τῆς ἀρχῆς, λύει ῥίγεσι. hoc eſt, *Quam & ſi quibus per circuitum redeunt rigores, eos ante, tum aſſumptam perfricuerit, minùs rigore concutiãt.* Sed aliter accepiſſe videtur Plinius, lib. 21. cap. 21. dũ de Abrotono agit in hæc verba: *Efficaciſſimum eſt contra ea quorum ueneno tremores & frigus accidunt, ut ſcorpionum & phalangiorum:* quanquam & ipſe ſtatim ſubdit: *prodeſt & quoquo modo algentibus.*

ἐφθαλμιῶν φλεγμ.] Galenus, 6. de ſimpl. med. fac. cap. de Abrotono, tacitè Dioſcoridem carpit tãquam Empiricum, quòd iſthæc ad oculorum inflammationes & phymata ex Abrotono petita remedia citra diſtinctionem protulerit: quia, vt inquit ille, *ſi ſola Dioſcoridis experientia freti quiſpiam oculorum inflammationibus quibuſuis aut phymatis ſeu tuberculis omnibus propoſitum hæc ab eo remedia citra diſcrimen adhibuerit, plus multò damni quàm adiumenti ſit allaturus.*

ἐς τὸν τῶ ἰρινοῦ] In olei irini compoſitionem nuſquam, quod ſciam, recipitur Abrotonum. Iccirco εἰροβότινον, aut μυροβότινον, legendum cenſuerim. His enim oleis ſeu vnguentis Abrotonum, non item irino, inſeritur.

Cap. xxx. μυρίνης αἰσὶ καρδαμώμου] Cum pleriſque Interpretibus ita legiſſe videtur Serapio: ac ei quoq; lectioni Meſuæus cap. de Hyſſopo ſuffragatur: attamẽ καρδάμου proculdubio legendũ. Siquidẽ Plin. lib. 26. cap. 7. *Hyſſopum*, inquit, *eritum cũ melle utilius, præſumpto naſturtio aut iriote.* Idipſum indicat Macri verſus, qui ſic habet cap. de Hyſſopo: *Cardama ſi iungas, bu ſolues ſtranis alnum.* Huc adde quòd & antè docuit Dioſc. καρδάμου, ſeu *naſturtium*, aluum turbare.

Cap. xxxi. Στοιχὰς ὀνομάζουσι] στοιχὰς. Latinis *ordo*, idem quod τάξις, eiuſdémq; originis: iccirco ſiue στοιχάδα ſiue στοιχάδα legas, res eôdẽ redit. Nam & eiuſdem nominis Stichades ſeu Stœchades inſulæ Maſſilienſium littori vicinæ, ob ordinem quo ſitæ ſunt, ſic dicuntur, autore Plinio, lib. 3. cap. 5. Nec non & eiuſdem ordinis ratione ſingulæ ſuis ita diſtinguntur nominibus, Prote, Meſe & Hypæa, hoc eſt, *prima, media & infima.*

κόμαι θύμου] Coma *hyſſopi*, Plin. lib. 27. cap. 12.

καὶ κινδύνους χρονίους] His à Marcello iſta ſubiunguntur, quæ in Ald. codice inter notha reperiuntur: ἐκφράσει δὲ ἡ λεπτότης καὶ ῥύπτει, ἡ μοναύτη πάσι τὰ ἄγχουσι τοῦτο καὶ ὀλίγα τῶ ζόου τοῦ ἥκιστ. id eſt, *ſiquidẽ ab obſtructione liberas, extenuat, detergit, ac robo-*

vat, tum viſcera omnia, tum & vniuerſum corporis habitum: quæ quidem verba ex Galeno & Ægineta manifeſto deprompta videntur.

CAP. XXXV. *ἀείγαιος Ηεχαι-ἀείγαιον* vocem ab alijs maſculino, ab alijs fœminino, ab alijs denique neutro genere efferri monet Athenæus, libro 2.

CAP. XXXVI. *μᾶλ' ἀλὸς καὶ μάλιτος*] In vulg. exempl. legebatur, *μανὰ ἀλὸς*. Sed ex vetuſto codice reſtituo, *μᾶλ' ἀλὸς* Sic Plinius de Pulegio, lib. 20. cap. 14. *Hepaticis cum melle & ſale bibendum datur: pulmonum vitia excreabilia facit.*

CAP. XXXVII. *οὔν δὶ καρπὸς, οὔν ἄνθος*] Vt Dioſcoridē à vanitatis ſuſpicione liberet Matthiolus, ſic mauult legere: *οὔν δὶ καρπὸς, οὔν ἄνθος σπορίαν* hoc eſt: *neque uerò ſemen, neque flos confert.* Nec id abs re: quia Theophraſtus & Plinius in Dictamno foliorum tantùm vſum agnouerint. Enimuerò Theophr. hiſt plant. libro 9. cap. 16. *χώρημά ἐϛι*, inquit, *ὧν φύλλοις, ἀ πὶς κλωσὶν, ἀλλ' οὐ καρπῷ* hoc eſt, *uſus foliorum, non ramorum aut fructus eſt.* Itémque Plinius, lib. 25. cap. 8. *Foliis tantum utuntur: flos nullus eis, aut ſemen aut caulis.* Eſſe verò Dictamno & florem & ſemē ac etiamnum caulem, (quicquid ſcripſerint Dioſc. ac Plinius) & aliorum priſcorum minimè ſpernēda autoritas, & *κλῶσμα* quoque ipſa palàm faciunt. Nam & ipſe Theophraſtus Dictamnum ſemen habere ſatis innuit, dum *florum, non ſeminis* vſum eſſe tradit. Galenus itidē florem hauddubiè agnoſcit, dum lib. 5. de comp. med. *ἐϛὶ δὲ διπλάσιον ἐχείνου ἄνθος* meminit ex Damocrite in deſcriptione *ἐμπάϛου τῆϛ διπλάσιον*. Sed & Virgilius florem purpureum itémque caulem Dictamno tribuit, his verbis,

Dictamnum genitrix Cretea carpit ab Ida:
Puberibus caulem foliis, & flore comantem
Purpureo, &c.

Attamen quia olim fortè Dictamni ſola folia cum radicibus è Creta exportabantur, ſemine ac flore carere ipſum Dioſcorides exiſtimauit. Quòd ſi non in eundem errorem Plinium loco citato lapſum fuiſſe conſtaret, probabilior foret vetuſti codicis illa lectio: *οὔν δὶ ἄνθος, οὔν καρπὸν ἀφίησι*, quaſi quod antè dictum eſt voluiſſet Autor, *neque florem neque ſemen exportari.* Sed nequid temerè auſi videremur, vulgatam lectionem retinere maluimus.

φασὶ δὶ καὶ τὰϛ αἶγας] Quod capris ſcilicet ſæpius tribuunt, locis ante citatis, præter Dioſcoridem Theophraſtus & Virgilius, itémque Cicero, 11. de Nat. deorum, idipſum ceruis à Plinio tribuitur. Hic enim lib. 8. cap. 27. *Dictamnum*, inquit, *herbam extrahendis ſagittis arui monſtrauere peruſſi eo uelo paſtuque eius herbae cierto.* Rurſúmque lib. 25. cap. 8. *Dictamnum oſtendere (ut uidimus) aruae uulneratae, paſtae ſtatim decidentibus telis.* Quanquam & paulò inferiùs idem ipſe capris minimè expeti Dictamnum ſcripto prodiderit. Sed & canes & quæuis animantia, ſi Serapioni credimus, tela quibus icta ſunt Dictamni paſtu pellunt & extrahunt.

CAP. XXXVIII. *ἐχόμενον ἀνοχμοῦ*] Rationē ſubdit Theoph. lib hiſt. 9. cap. 16. quòd cùm Dictamnum ſolum aſperum vehementer amet, hoc Pſeudodictamnum locis lætioribus exeat, atque adeo reddatur inefficacius: id quod & compluribus aliis euenire ſcribit, nempe vt viribus deterioribus ex loco reddantur.

CAP. XXXIX. *πολὺ δὶ καὶ ἕτερον διϕέρειν ἄκαρπον ἀμπελίτιδος, οὔτε τῷ εἴδει ἔχειν, οὔτε τῇ δυνάμει αὐτῆϛ.* Quæ ſic tranſtulit Plinius, lib. 25. cap. 8. *Eſt & tertium genus, Dictamnum uocatum, ſed neque facie, neque effectu ſimili.*

CAP. XL. *φύκα δὶ μικρὰ πολυειδῆ*] Anguillara & Pena legunt, quo modo etiam apud Crateuam legi aſſe runt, *ἰδιόφυλλα, αἱμὶ τῶν, μαλλοῖϛ πολυειδῆϛ*, atque ita etiam legendum contendunt ex Plinio: ſed quàm rectè, iudicare facilè eſt. Etſi enim *mentae ſimilem totam ſaluiam* ſcribat Plinius, & ipſe tamen paulò antè, dum ſigillatim foliorum mentionem faceret, ea tradidit eſſe *cunei mali effigie*: quod illos minimè animaduerriſſe, mirari ſatis non poſſum.

CAP. XLI. *ἀφροδίσιά τε ἐμποιεῖ*] Mentham venereis voluptatibus cōmendat hoc loco Dioſc. Ac Galenus itidem 6. ſimpl. Venerem affirmat vſu Menthæ mediocriter excitari: id quod & cæteris ſcribit accidere, calidis nimirum & ſiccis, quæ humiditate ſemicocta & flatuoſa participant. Sed & eōdem illud Ariſtot. ſpectare videtur: qui quidem in Probl. ſect. 20. cauſam inquirēs prouerbij huiuſce, *Belli tempore Mētham neque edito neque ſerito*, hanc rationem reddere videtur, quòd quæ potiſſimum ſatiua eſt militum corpora refrigeret & euacuet: id quod coitus nimius ac intempeſtiuus *ἀφροδίσιος* efficere conſueuit. Nec ſecus Hipp. 2. *περὶ διαιτ.* de Mentha verba faciens, quanquā eius etiam vſu tentiginem arceri velle videtur: *διὰ τοῦτο ἐϛὶν ὑγιὴϛ*, inquit, *τὸν σπέρμα ἀπὸ τῶν, ὅϛε μὴ ἐπὶ πολὺ, καὶ ἐπὶ πολὺν κρόνον, ἢ τὸ σῶμα ἀδύνατον ποιῆ.* hoc eſt, *ſi quis eā frequenter neſcius & genitale ipſius ſemen ita colliquefiet ut effluat, & arrigere prohibebitur: corpus denique reddetur imbecillum.* Contrà verò Plinius, lib 20. cap. 14. *Reſiſtere*, ait, *generationi Mentha creditur, cohibendo genituram*: ſic enim legendum, non, *genitalia*) *denſari.* Itémque Florentinus in Geoponicōn lib. 12. *ἰδιόφυλλον ἀφροδίϛοις ὄντως* tradidit *μεῖξαι τὸ ἀφροδίσια*. hoc eſt, *Mentham commodare Veneri.* Sed in his contradictionibus conciliandis non magnoperè laborandum videtur: quoniam hæc etſi prima fronte pugnare videātur, verè tamen antè memoratis autoritatibus minimè repugnant. Neque enim quicquam impedit, quominus Mentha dum liquidū fluxiléque ſemen reddit, Venerem ſtimulet, & eadem ipſa huius, vt ita dicam, fluxibilitatis ratione conceptui generationíque reſiſtat. Cæterùm ad illud Auicennæ reſpondere difficilius fortaſſe fuerit, qui Mentham tradidit ſeminis exitum cohibere, dum & ſemen incraſſat, & ipſa ſpermatica vaſa roborat. Attamen & hæc autoritas cum prioribus illis minimè pugnabit ſi verba iſta, vti par eſt, de Mentha ſicca intelligas: cuius quidē vim quàm recentis longè aliam eſſe quiuis facilè iudicet. Sic & Oribaſij locus, lib. 9. Synopſeos quo aſſerit Mentham æquè ac rutam ijs eſſe vitādam quæ fœcundæ eſſe deſiderant, de Mentha ſicca eáque fortaſſis etiam ſylueſtri intelligendus eſt.

CAP. XLIII. κατὰ κάθαρσιν] Iccirco, ni fallor, ὑφηλιὼ καλεῖσθαι λέγει, quasi æquatium cognominat Nicander in Theriacis, his verbis:

Τῶνος δ' ὑφαιμοῦ πολυγήρως τε ῥίζας
Ὑφηλίῃ καλέουσιν ὀπιζόμενοι χαρίεσσαν.
Πολλὰ γὰρ ἀνθρώπων παρ' ἀέξεται ἄστεα καὶ χθὼν
Ἕρπυσι, καὶ γενεὴν ἀγελαίην καὶ νομὸν ἀνδρῶν πολλάκις.

quæ sic Io. Gorræus Latinè reddidit:

Insignem solys Calamintham ad fluminis oras
Vestigia rapidi, liquidis uberrima crescit
Illa locis, & aquæ magnæ dulcedine capta
Luxuriat ramis, fluuiosque & littora cingit.

ὁ αὐτὸς] Perperàm Serapio, ὁ πυρὸς, legendum videtur.

εἰς μελαγχολίαν] Hanc vocem Gal. luculenter exponit, lib. 7. simpl. cap. de Calamintha, hisce verbis: καὶ μὴν καὶ ἐπὶ τῶν ἐχόντων τὴν μελαγχολίαν ἴσως αὐτοῖς ἐστὶ τῶν ἰσχνότητα ἐργαζομένων, ὡς ἡμεῖς φαμεν. καὶ γὰρ ἔλαιον ἐν τῷ βάθει τῶν ἐνδοθὲν ἐπιφαίνεται, καὶ δριμαίνει σύμπαν τὸ ἀνθρώπειον, ὥστε καὶ ἱδρῶτα ποιεῖν. id est, *Quam & eam exedendis iis qui hac adiecta agritudine vexantur, vtilem remedium adhibent: siquidem quæ in profundo hærent, foras ad superficiem trahit, totumque adeò corpus exalfacit, & eorum ipsam exedendo adurit.*

C. XLV. καὶ πάνυ ἐν ἀγείοις ἐνδοκιμεῖ] Hæc Interpretes nonnulli ad figurã referunt. Equidẽ cum Serapione ad vires facultatémve referẽda censeo. Siquidẽ & Paulus, lib. 7. de Thymbra sic habet: ἡ μὲν ἄγρια τὴν αὐτὴν τῷ θύμῳ δύναμιν, ἡ δὲ ἥμερος, καὶ πάνυ μὲν ἀδύνατός ἐστι, σιτεῖται δὲ βρῶσιν βελτίονα. hoc est, *Thymbra quidem agrestis eadẽ quæ thymus præstat: hortensis autem in omnibus quidem imbecillior, sed ad cibum laudatur.* Cæterùm τὰ θύμβρα numero plurali extulit Aëtius, sicuti & Martialis vocẽ Latinã *saturcia*: *Improba nec prosunt iam saturcia tibi.* Nõ desunt tamẽ qui inter Thymbram seu Latinorum cunilam & saturciam discrimen statuant, Columellæ autoritate freti: qui lib. 10. de re rustica, saturciam thymi ac Thymbræ saporem præ se ferre scripserit:

Et saturcia thymi referens Thymbræque saporem.

CAP. XLVI. ὑπὸ ἔρπυλλον αὐτὸν ὁρᾶται] Contrà Plinius memoriæ prodidit Serpyllum syluestre serpere, satiuum verò in palmi altitudinem increscere. Sed rectiùs, opinor, sensit Dioscorides: cui etiam totidem ferè verbis subscribit Aëtius.

ὑφηλὸς ῥοδίνου] Hæc verba quoniam transposita videntur, ita restituenda ex Aëtio: ὑφηλὸς οὐ λίαν ἐστὶ καταξηραίνει μετρίως αὐτοῦ ῥοδίνου. Cætera verò quæ cap. de Serpyllo deprauata legũtur apud Aëtium, ex hoc ipso loco facile est emendare. Eorum porrò dubitationi, qui in phrenitide Serpyllum minimè censent admittendum, satisfacere videtur Aëtius, hisce verbis: ὅτι φρενιτικοῖς οὐ χρηίζουσι δριμέος. Nec enim circa phrenitidis principium id genus remedij, sed tantummodò circa statum declinationémve, conferre satis supérque innuit.

CAP. XLVII. Σικελὸς ἀμάρακος] Scribit etiam Diocles, lib. de med. lethalibus, amaracũ à quibusdam Sampsuchũ appellari, vti testatur Athenæus, lib. 15.

CAP. XLVIII. κρατίζει καὶ ἰδιάζει] Sic Plinio, lib. 21. cap. 11. *laudatissima Melilotos, quæ sit croco quàm simillima.* Hanc verò croci similitudinem ad colorem refert Serapio: at Plinius, ad odorẽ. Odor enim *Meliloti* (vti scripto prodidit eiusdem lib. cap. 9.) *crocо maximè, & flos*, &c. Plinij autoritati vetusti codicis margo suffragatur. Cæterùm pro eo quod sequitur, μηλίζον, sunt qui μηλίζων legant: quam quidem lectionem Serapio secutus videtur, dum *fœnogræco* similem dixit.

CAP. 2. ὅσον δὲ κοιλίαν καὶ ἔμφυσιν] Sic Aegineta mediocres astringendi vires Acino tribuens, aluum mẽsésque sistere scripto prodidit. At contrà Plinius, lib. 21. cap. 27. *Acinum vrinæ menstruaque ciere* tradidit. Si quæ pláta sit Acinos, nobis bene constaret, huícne potiùs, an illis esset habenda fides, iudicium ferre possemus.

CAP. LI. ἡ ἄνιμα] Ἄνιμα legebatur in vulg. exemplaribus: sed cum Marcello, ἄνιμα, legendum censui. Nam & Plin. lib. 21. cap. 6. de Baccharе agens: *gracili*, inquit, *solo nec humido prouenit.* Sed & in Nothis Dioscoridis, ἄνιμα legitur: quo loco hæc eadem perperàm capiti de Ataro ascribuntur.

τὰ δὲ φύλλα συστατικὰ] Sic Aegineta Baccharis folia astringendi vi prædita agnoscit: at radici vim obstructiones aperiendi, menstésque & vrinas ciendi tribuit.

CAP. LII. περὶ τῆς συκῆς φυόμενον] Plinius, lib. 19. cap. 8. *Rutæ amantem* ait esse *cum fico, in tantum vt nusquam latior prouenerit, quàm sub ea arbore.* Sic & Palladius *Rutam* scribit *sub fico arbore luxuriùs acquiescere.* Sed Rutę φύσις longè maiùs fuit Aristoteli ac Theophrasto, dum Rutam iuxta ficum inseri voluerunt. Hæc siquidem, lib. 5. de causis plant. cap. 7. de hac Rutæ in fico satione agẽs: δοκεῖ γὰρ δὴ (inquit) καὶ τοῖς γένεσι φυτοῖς τὰ ἐναντία ἐναντίως ἔχειν, καὶ τὴν πήγανον ἐν τῇ συκῇ φυτευόμενον. hoc est, *Rutæ in fico satæ optima fieri creditur. Cortici verò infixa ferrum, serráque obtunditur.* Ille verò, Probl. sectione 20. quærit, διὰ τί πήγανον κάπτειν καὶ πλῆθος γίνεται, ἐὰν τις ἐμφυτεύσῃ εἰς συκῆν. συμφυτεύεται δὲ οὐκ ἐπὶ φλοιὸν καὶ ἔκτομὴν ἄνωθεν πολλῶν. id est, *quamobrem ob causam Ruta in ficum insita pulcherrima plurimaque prouenerit. Inseritur verò circa arborem, lunaque obumbratur.* Plutarchus verò, 5. συμπ. qu. est. 9. vtrunque simul innuit, & sub fico seri, & ipsi fico inseri Rutam, his verbis: τὸ πήγανον φυόμενον ὑπὸ τῇ συκῇ καὶ ἔχει φυόμενον, ἄδηλον εἰ καὶ τὸ χωρὶς μαλακώτερον. id est, *Rutam sub fico nascentem aut ipsi etiam admiscẽtem suauiorem reddi mitioresque sapore.* Porrò licet Theophr. & Aristoteles eam Rutæ ex fico fœlicitatem calori fici acceptam referre videantur, à formarum ἀρέσει quadam amicitia ea potiùs pendere videtur, ob quam nõ modò fœliciùs proueniat, sed etiam suauior in cibo reddatur: quanquam & suauitatis huiusce rationem non ineptam reddidit Plutarchus citato loco, nempe quòd ficus dulci suo succo ingratum ac virosum Rutæ saporem temperet, aut dum acrem Rutę succũ vnà cum alimento ad se ficus allicit, ipsius Rutę succus, subtracta nimirũ acrimonia, dulcior iucundiórque relinquatur.

γνώριμον ἐθέντων] Hinc & ipsi πήγανο nomen, vt rectè obseruauit Plutarchus 3. Symp. quæst. 1. hisce verbis: φασὶ δὴ καὶ τὸ πήγανον κατὰ τῆς δύσεως μένειν ἀπαθὲς. πήγανον γὰρ ἔνιοι διὰ τοῦτο τὸ ὄνομα, καὶ ὅλως πολέμιον εἶναι τοῖς μύωψι. hoc est, *aiunt Rutam peganon ex eo dictam, quòd ob fœtorem calori venenato semen genitale magdes, adeoque situm totum prægnantibus minuat.*

ἐλαιόμελι ἄκρατον] Oleo rosaceo faciem inũgi oportere, addit Serapio. Plinius cicutæ succum in eum vsum commendare videtur: quandoquidem lib. 22. cap 13, *cicutæ succũ prodesse* scribit *manibus colligentium Rutam.*

ἀπὸ δὲ τῶν ἀγρίων] Enallage generis, ἀπὸ τῆς, ἄγριας, nisi ad radicem referre velimus: aut certè ad ῥίζαν, quæ vox est Peloponnesiis familiaris, & παρὰ Νικάνδρῳ apud Nicandrum in Theriacis.

Cap. LIII. ἄλθεα δὲ Ἀλυάκμονα] Cùm haberetur in vulg. exemplaribus, Ἄλμων, & in quodã manuscripto, Ἄλμον, neque eius nominis fluuiorum mentio fieret vsquam apud Geographos, Ἀλιάκμονα seu Ἀλυάκμονα restitui, ex veteris exemplaris fide, quod præ manibus habuit doctiss. Goupylus: præsertim cùm eiusce nominis flumẽ in Macedonia esse constet ex Ptolemæo, itémque Plinio, ac ipso quoque Strabone, in lib. 7. fragmentis. Est verò extra rem, quod, Ἀλιακμονᾶς, idem Goupylus legendum suspicatur, cùm illud nomen sit oppidi Bœotiæ, non fluuij.

Cap. LIIII. ἀγχοῦ ἴουσα] Hoc Moly à Mercurio Vlyssi traditum contra Circes veneficia & incantamẽta describit Homerus, lib. 10. Odyss. Theophrastus, lib. 9. de hist. plant. cap. 15. hoc ipsum Moly *folio scillæ* agnoscit, & pro eo quod Dioscorides hic radicem Βολβοῦ describit, ille *rotundam* esse tradidit, μεγαλοβολῷ πρασίῳ *Magnitudine porri* reddit Plin. lib. 25. cap 4. Et tamen Galenus, libro simpl. 7 facit, μαλλον βολβῷ σφηκώδους ὑποῤῥιζα ἀχρὶ τοῦ ἀνθους ἀναπεμπούσης] Hæc verba eo planè quo vertimus modo intelligenda sunt. Nam & Gal. 7. simpl. (quo loco nostrum hoc μῶλυ, μώλιν appellat) id esse scribit σκοροδώδη ὑποκόμην, ὅπερ & addit ille, μαλλον πνεύματος ἀλλήρου περιεκτικήν, ὥστε διαπεπλῆσθαι μᾶλλον τὰ ἔνδον ἢ διαπορεύεσθαι. hoc est, *ut contrahendi pollere, non ut resolvendi Dioscoride cum farina loliacea adhibita malvæ apertæ medeatur.* Ex quibus quidẽ verbis facilè quoque est iudicare, pro eo quod paulò pòst habebatur apud Dioscoridem in vulg. exemplaribus, ἰσχνὸν μᾶλλον, vel, vt in v. exstat, legendum, πλεῖον πλάθοντα. Ac certè quidem loliaceam farinàm hoc loco esse vnguento itinò conueniẽtiorem; vel ex eo patet, quòd de remedio hîc agitur contra vuluæ apertiones accommodato. Vnguentum autem irinum efficaciter aperire cuiuis est in confesso.

Cap. LV. φύεται περὶ τὰς ἀυλὰς] Panacis Herculei folium describit Theophrastus, lib. hist. plãt. 9. μεγα δ' ἐπανθεῖ, περιπέταλον πολυφυλλῶδες *magnum latum, adeo ut quaquauersum tres maiores palmos æquet:* ita vt interdũ addubitauerim, essétne, vt in vetusti codicis margine habetur, πίνος aut πάνου legendum, quasi & Autor noster cucumeris folio illud conferre voluerit. Sed & Oribasius & Serapio qui ex Dioscoride omnia propè totidem verbis exscripserunt, τῶν ἀυλῶν palàm legisse videtur, quod quidem ad folij ficulnei seu coloré seu figuram seu etiã magnitudinẽ referre licet: quanuis Serapio minimè magna esse Panacis huiusce folia subiunxerit. Cæterùm perperam Mesuæus hæc eadem ferulæ foliis assimilauit.

ἐπὶ τῶν ἐδεσμάτων] Plerique omnes hanc vocem ad vsum cibariorum transtulerunt, quasi semen ex agnatis ramulis seu coliculis minùs nutriret voluerit Autor; quàm quod ex media ferula seu caule medio erumpit. Sed cùm ipsius seminis temperamentum & sapor satis indicet, in cibos eiusmodi semen recipi nusquam posse, satius visum est *semen ex agnatis caliculis minùs esse succulentum* vertere: Gallicè aptius diceremus, *n'estre si bien nourri* ἔτερφον enim. Græcis non tantùm dicitur, πόα τερφής, sed & ἰμὰς τερφέστερος, ita vt tam passiua quàm actiua significatione vsurpetur.

ὁ ἐξωθεν δὲ] Articulus, ὁ, hoc loco redundat, sicut & vox quæ paulo pòst sequitur, ἄκανθος, nisi fortè mauis ἀπὸ τῆς ἀκάνθου, δὲ ἄκανθος ex vetusto codice reponi. ἄκανθον attamen nescio qua ratione quáve autoritate freti *acerum* verterũt Hermolaus atque Ruellius.

κεφαλικοῖς διαπλάσμασι] κεφαλικὰ φάρμακα interdũ in genere accipiuntur, pro medicamentis omnibus capiti dicatis, velut habetur apud Gal. in Isag. ita vt quæ ad achoras, capitis furfures, aliáque eruptiones valent, itémque quæ ad capitis dolorem & κεφαλαίαν aliósque capitis affectus accommodãtur remedia, eo nomine comprehendantur. Aliàs angustiore significato κεφαλικὰ dicuntur, quæ capitis fracturis adhibentur emplastra: quæ quidem, vt habetur lib. 2. de comm. medic. κατὰ γένη, abstergendi, digerendi & siccandi facultate sunt præditæ, cæteris in genere dictis ideirco valentiora, quòd acrimoniam quandam, qua quidem ista carent, præterea fortita fuerint. Sed vtrouis modo cephalicorum nomen hîc accipiamus, parum interest: nam & ad cephalæam & diuturnos id genus capitis affectus Opopanax vsurpatur, & cephalicis quoque medicamentis meritò accommodari potest. Panacis certè quidem radix, maximéque cortex, apud Gal. & in mecil. med. & alibi passim, inter cephalica recẽsetur. Et hanc ipsam quoque Plin. lib. 25. cap. 11. *in oleo contritam capitis dolori mederi* prodidit.

λῶμα καθαρτικὸν ἀμβλύ] Lege, κατακαυστικὸν ἀμβλύ: quod genus medi apud Dioscor. sæpius occurrit. Sic & Theophr. loco antè citato, adhibita distinctione, Panacis Heraclij radicem scribit esse remedio ἀκαῶν τῶν μὲν ἰσχνῶν ξηρασιῶν τῶν δὲ ξηρῶν ἐπὶ τὰ μαλακώτερα, *ulcerum*, inquã, *aridorum quæ siccæ fuere: humidorum, quæ molli sit cutis.*

Cap. LVI. ὅμοια μαράθῳ] Theoph. Asclepij Panacis folium simile scribit esse Thapsiæ, attamen crassius. Sed & Thapsia folio est fœniculi, ita vt in folio nulla sit apud Theophrastum & Dioscor. diuersitas. At in radice, eu non parua est. Siquidem Asclepij radicem scribit Theophrastus esse dodrantali longitudine, valde crassam & albam. Dioscorides contrà habet: ῥίζα δὲ μακρὰ quanquam Anguillara, illa fortassis Theophrasti autoritate fretus, μακρᾷ legendum censuit. Ruellius & Cornarius ex Oribasio, nisi fallor, & Serapione, addunt, καὶ λευκή. Marcellus ex Theophrasti sententia, καὶ λευκή. Matthiolus in suo codice ἀπὸ τῆς, μακρᾶς πυκνᾶς legi annotat: quam vocem etiam reddidit Serapio. Cæterùm quo loco de foliis agitur, ἀπὸ τῆς, ἀκάνθης, legit Oribasius, ἀκάνθου. quam etiam lectionem Anguillara amplecti maluit.

Cap. LVII. ἀμαράκῳ ὁμοῖον] Lacuna in vetusto quodam codice legit: κόμμι δὲ ἐχει ἐκτὸς ὅμοιον ἀμαράκῳ ὀπῷ. hoc est, *folia habet extrinsecus amaraco similia.* Serapio, μαράθῳ, legisse videtur. Theophrastus autẽ sic habet: ἔχει δὲ χρώματα φύλλα

μᾶλλον ἁμαρτεῖν πικρότερον, μᾶλλον δὲ καὶ δριμύτερον. quem secutus & ipse Plin. lib. 25. cap. 4. *folium* habere scribit *lapathi similе, maius tamen & hirsutius.* Porrò Nicandro in Theriacis cum Dioscoride bellè conuenit: siquidem ille ab amaraci foliorum similitudine ἀμαρακοειδὲς vocat etiam Panacis Chironij χείρωνα agnouit. Sed & in radice discrepat à Dioscoride & Plinio Theophrastus, dum radicem Chironio Panaci longam tribuit.

CAP. LVIII. *ἰσχνὸν δὲ δυσμαχὲς ὄζει*] Aldinus, ὄζειν, legit, vt & Oribasius, hoc est, *ori gratum & acceptum.* At nihil impedit, quominus Ligusticum, λιγυστικὸν Gal. dictum, ori gratū sit, stimul & stomacho vtile. Ac certè quidem Plinius Ligusticum scripsit *stomacho utile*, lib. 20. cap. 15. etsi in plerisque exemplaribus mendosè legitur, *inutile.*

CAP. LIX. *σικυωνίαν φαρ.*] Hinc Diphilus apud Athen. libro 9. Pastinacam tradit φιλτρὸν à nonnullis dictam esse, quasi amatoria facultate præditam.

CAP. LX. *γογγυλιφόρος*] Addi scribit Lacuna in vet. codice σφαχὶς, *asperum.* Serapio verò, πλατὺς ἢ σκληρὸς, legisse videtur, hoc est, *latum & crassum.*

σέσελις ἔνιοις σίλις, Seselim seu *silim* seu *siler monstrauêre aruæ*, vt scribit Plinius. Sed illæ nō tantùm pariunt, verùm etiam enixæ à partu ea herba pascuntur. Siquidē Arist. lib. 9. de hist. anim. cap. 5. ceruas statim à partu ad Seselim quam depascantur accurrere prodidit. Sic quoque Plinius, lib. 8. cap. 32. de ceruis agens: *Fœminæ*, inquit, *ante partum purgantur herba quadam quæ Seselis dicitur, facilioremque uenere uterо. A partu duas habent herbas quæ aros & Seselis appellantur: pasta redeunt ad fœtum*, &c. Rursúmque, lib. 20. cap. 5. de Seseli Cretico, quod hic σέλινον Dioscoridis Paulo γόγγυλον, Nicandro ὄρειον dicitur, mētionem faciens: *Hoc maximè*, inquit, *pasci dicuntur aruæ parturæ.*

CAP. LXII. *καρπὸς πλατύτερος*] Anguillara in codice quodam legit, πυκνότερος, *densius.* Pro eo verò quod in capitis calce habetur, φύεται δὲ καὶ ἐν Ἰδῃ. Ruellius & Marcellus videntur legisse, φύεται δὲ ἐν ταῖς νήσοις, hoc est, *in Insulis.*

CAP. LXIII. *μετὰ μάλιστα*] In antiquis hæc verba fini huiusce capitis ascripta testatur Goupylus: ἴχνη δὲ πλείονα πολλὰ φερουσίζοντα, μαλίζοντα, πορφυρίζοντα, καὶ ἐπ' ἄκρου ὅμοια, σφαιρωλοειδῆ ἔχοντα ἐπάλληλα ὡς σπέρματα τὰ αὐτῆς, aliâs, ἴχνη ὡς σπέρματα τὰ αὐτῆς. hoc est, *Habet autē ramulos multos ad purpureum, luteum & purpureum colorem uergentes, & in racemum simules: quæ rotundæ figuræ utrimsecus semina uelut flores habent.* Hæc eadem Hermolaus in contextum Dioscoridis retulit. At Marcello, & meritò quidem, suspecta videntur. Cornarius ad notha relegauit.

CAP. LXIV. *Κύμινον τὸ μὲν &c.*] Principium capitis vsque ad illa verba, Τὸ δὲ τὸ αὐτὸ, quod in vulgatis Græcis exemplaribus reperiebatur, vna litura induximus: quippe quod perperàm ex proximè præcedenti capite eò translatum esset. Sed neque defuêre vetusti codices aliquot, qui caput hoc de Aniso ab his tantùm verbis rectè auspicarentur. *Κύμινον τὸ μὲν ἥμερον διώκειν, &c.*

CAP. LXV. *ἐν Κιλικίᾳ φύεται*] Galenus tamen lib. 2. de alim. fac. ait, Cari radicem melioris esse succi quàm pastinacæ, & tamen ægrè concoqui.

CAP. LXVII. *ἐπὶ ὀπτωμένοις*] Fortè, ὀπτωμένοις. Lenes *nonnunquam* vertunt alij: ego verò sensu propè eodem, vomitiones eorum quæ in ventriculo summo fluitant. Inferiùs autem pro, κατωτάτω, lego, καταστάσει, vt & alibi frequenter.

CAP. LXVIII. *κυμίνου τὸ ἥμερον διώκειν*] Cum Lacuna διώκειν legere malui, maximè cùm satis constet, ori esse non mediocriter ingratum. Stomacho verò maxime vtile esse sat indicant illa Plinij verba, libro 20. cap. 15. *Satiuo Cumino magnus usus, in stomachi maximè remedijs.*

ἐν Γαλατίᾳ ἢ ἐν Λιβύῃ] Lege, Γαλατίᾳ τῇ ἐν Λιβύῃ, ad differentiam Galliæ quæ ad Alpes est, quæ etiam Γαλατία Græcis dicitur. Sic & sequēti capite, quo loco habetur, Λιβὸς τῆς Γαλατίας, lege, Γαλατίας τῆς Λιβυκῆς.

ἡμιμάκτῳ ἀλεύρῳ] Placuit magis altera illa lectio, ἡμιμάκτῳ, quàm vulgata, μείῳ, maximè cùm & Serapio ita legisse videatur, & in hunc ipsum vsum fabaceam farinam desideret Auicēna. Sed & nominatim docet Galenus, fabaceam farinā testibus inflāmatis iccirco aptè adhiberi, quòd ij moderate refrigerari postulēt. At lolium cùm nimiopere calfaciat, quis non facilè iudicet vt aliarum partium, ita & testium inflammationibus haud ita congruere?

CAP. LXXI. *διύουσι δ' ἰσχνὸν ψυκτικὸν*] De Coriandri temperamento ac viribus, magna est inter rei Medicæ Scriptores controuersia. Enimuerò illi Simeon Sethi, lib. de alim. æquè ac Dioscorides refrigerandi vim tribuit. Sic & Plinius, lib. 20. cap. 20. *Vis magna ad refrigerandos ardores uiridi Coriandro.* His etiamnum apertè subscribit Celsus, lib. 2. cap. 27. dum ipsum inter refrigerantia olera recenset. Auicenna quoque, aliique ferè Arabes, præter Auerroëm, in frigidorum simplicium numero Coriandrum reposuêre. At Hipp. contrà, lib. de diæta, calidum censuit: quo loco de semine tantummodò verba fieri nonnulli existimauerunt. Galenus quoque tum lib. simpl. 7. tum lib. de attenuante victu, calidum id esse iudicauit: & acriùs reprehendit Dioscoridem, qui vim refrigeratoriam illi assignauerit, & indefinitè protulerit, erysipelatis conferre: quanquam exquisitum erysipelas eo curari minimè possit, nisi fortè sublata iā inflammatione, quo quidem tempore excalfacientia digerentiáque medicamenta exposcit. Sūt qui Autores hos rectè conciliasse se existiment, dum, quod citato loco visus est innuere Plinius, viridem herbam refrigerare, siccam calfacere inquiunt. At licet fortassis aliquatenus verum id sit, cùm vnius & eiusdem plantę recentis ac siccæ vires nunquam sint planè eædem: certior tamen contradictionis huiusce solutio ex ipso Gal. petitur, qui quidem lib. simpl. 7. Coriandrum docuit è contrariis constare facultatibus: quippe quod plurimum quidē habeat essentię amarę, quę tenuium sit partium ac terrea, at non parum etiam aqueę humiditatis obtineat, quæ tepentis sit facultatis, & his præterea adiunctum sit adstrictionis pauxillum. Id cùm ita sit, mirum ampliùs videri non debet, si pro vario vtendi modo varios Coriandrum exerat effectus. Porrò quòd χειρώδης ex Dioscoridis sentētia discutiat, non tam caloris dissipātis ratione fieri crediderim, quàm quòd moderatè repellat exiccando: maximè cùm magna

polleat

polleat penetrandi vi, quam ſortitum eſt ex ſubſtantiæ ſuæ tenuitate.

κάρφωσι δὲ ἡ σπερμολογία] Contrà Auicenna, lib.2. cap.144. illius vſu ſperma exiccari tradit: quod ipſum etiam confirmat Serapio ex autoritate Alkanei.

πλεῖον δὲ λαμβάνει] Plerique ſucco ſoli, non item ſemini, veluti Dioſc. vim hanc maleficam venenatámque tribuerunt. Quin & Nicādri Scholiaſtes cùm duo agnoſcat Coriandri genera, domeſticum inquàm & ſylueſtre, hoc vnicum lethale eſſe voluit. Contrà verò Palladius, *Coriandrū nūquam niſi fatum prouenire*, prodidit. Itémque Plinius, lib.20.ca.20. *Coriandrum*, inquit, *inter ſylueſtria non inuenitur.*

Cap. LXXIIII. ἀσκεῖ δὲ καὶ τὸ κοίλιον] Ex ſententia Dioſc. ad eadem valet Apium, ad quę coriandrum, cui refrigeratoriam facultatem antè tribuit: proindéque inflammationibus oculorū æſtuantique ſtomacho conuenit. Contrà verò Gal.8.ſimpl. Apium palàm aſſerit vſqueadeò calidum, vt & vrinas & menſes cieat. Illos Apij effectus, quos commemorat Dioſcorides, agnoſcunt Aduerſariorum Autores, & tamen hanc Galeni de Apio ſententiam ceu veritati cōſentaneam tuentur, hoc reperto diuerticulo: eſſe præſidia non parum multa, è quo iſta ſint numero, nempe Coriandrum & Apium, quæ quidem contrarijs aut valdè diuerſis polleant facultatibus, & tamen eidem medeantur affectui, eiuſdem etiam incrementi & modi: ſed alia quidem per ſe illud præſtent, alia verò ex accidenti.

καὶ ἀλείφει τὸ οὖρον] Hipp. contrà, lib. de diæta 2. Apium aluum mouere innuit, quanuis idipſum vrinas magis quàm aluum mouere fatetur.

Cap. LXXV. τοῦτο δὲ ὅσον καὶ τὸ κοπτόμενον] Hipp. ſeu quiſquis eſt autor lib. de affectionibus, ſcribit, πλείστα δὲ λαχανα τῇ ἡμέρῃ τοῦτο ἔχει διαφέρον, hoc eſt, *paluſtre Apium vim quàm ſatiuum maiorem obtinere.*

Cap. LXXVI. τοῦτο παραφυῆ] Etſi Aldinū exemplar habet μαντανίου, pro quo Marcellus μάντρα reponit: τοῦτο tamen potiùs eſſe legendum, & Oribaſij codex & quæ de hoc Apij genere Theophraſtus & Plinius tradidêre, ſatis ſupérque indicant.

Cap. LXXVIII. ἱππόσ. λιβανό] Marcellus addit, ἱππόσ λιβανό, idque ex Theophraſto, vti veriſimile videtur. At in eo fallitur, quòd Dioſcoridis & Theophraſti Hipposelinon vnum & idem eſſe exiſtimauerit: quanquam Theophraſti Hipposelinon, ipſum eſt Smyrnium, de quo proxēme ſequenti capite agitur.

Cap. LXXIX. γλυκύζουσι δὲ ὀσμήν] Hoc loco Dioſcorides haud dubiè odorem & ſaporē myrrhæ Smyrnij ſemini tribuit. At Plinius, eiuſdem radici. Is enim, lib. 19. cap. 12. *Smyrnium olus*, inquit, *ferunt ſydem locis, myrrhamque radix reſpirat.* Rurſúmque, lib. 27. cap. 13. *Odor myrrhæ habet qualitatem, vnde & nomen.* Sed & loco priùs citato, *Libanotis*, inquit, *odorem thuris habet, Smyrnium myrrhæ.* Ita enim legendum iudico, non, *murrha myrrhæ.* Theophraſtus autem, lib. hiſt. plant. 7. hipposelinum (id verò eſt Smyrnium Dioſc.) lacrymam fundere ſcribit myrrhæ ſimilem, quam etiam nonnulli in totum myrrham eſſe affirment: ac illud ipſum repetit eiuſdem hiſtoriæ lib.9. Cæterùm circa finem capitis, quo loco habetur, ἱππομολῶ, legēdum fortaſſis, ἱππολοσσῶ, ſiue ἱππολον.

Cap. LXXXI. τὸ δὲ λιβανωτίδος, &c.] Hanc lectionem comprobat Serapionis interpretatio. Atque ita quoque legiſſe ſe teſtatur Lacuna in veteri quodam codice. Nos itidem cum Cornario, ceu vulgata lectione potiorem, delegimus.

ἴσον μέρος ὀξυδόρκου] Hinc etiam deductum videtur μάσθλον, καὶ τὸ μαστὸν, παρὰ τὸ μαστᾶν καὶ ἁπτεῖν, ἢ βαστᾶν, quaſi quod lucidè & clarè videre faciat: vti me pridem admonuit acerrimi vir ingenij D. Dortmannus, Regius apud Monſpelienſes Profeſſor, & in inueſtigandis nominum originibus ſagaciſſimus.

Cap. LXXXIII. καὶ λεπίνεται] Sic legit Oribaſius: at Marcellus ex Plin. lib. 25. cap. 9. λεπύνεται, legendum ſuſpicatur. Idem ὡς ἢ ὦτα, ἢ πόδας, ex Nicandro in Theriacis, δακόντων, repoſuit.

ὧν δὲ Κρῆτες, καὶ ἐπὶ ὄφεις] Plinius, ibidem: *Ex aliis uſus ſeminis, ex Creta radicis dulcis, & magis ad ſerpentes, eſt*: quo loco reſtituendum videtur: *Ex Cretia, & radicis & magis ad ſerpentes.* &c.

Cap. LXXXIIII. σελφινίου κλῶνας] De Delphinio caput verunque, ſpurium falſóque Dioſcoridi aſcriptum plerique iudicant. Ac certè quidē neque Galenus, neq; Paulus, nec Aëtius, neque etiam Plinius vllam eius mentionem faciunt. At Oribaſius tamen ſilentio minimè prætermiſit.

Cap. LXXXVI. πεχωνίδες] Interpretes plerique, ac ipſe quoq; Serapio (quos libēter ſecutus ſum) ὄχωνίδες, legiſſe videntur. At Manardus vocem, πεχωνίδες, retinendam cenſuit.

Cap. LXXXVII. μαραθρῳ ὁμοία] Hanc Libanotida πεχωνίδα seu πεχωνοφόρον Nicandro dictam ſcribit Theophr. lib.9. hiſt. plant. πετώλῳ ὁμοίῳ folium habere ſimile, at multò maius. Plinius non folia, ſed radicem, oluſatro aſſimilat, lib.20.ca.12. Eam ob rem plerique contendunt, aliam eſſe Dioſc. frugiferam Libanotidem, ab ea quam loco citato deſcribit Theophraſtus. At excepto folio non video notam aliam, in qua Autores hi inter ſe diſſideant.

πρὸς τὰ ἐπισκοτήματα] Ita vbique legitur: ſed neceſſariò, πρὸς τὰ σκοτώματα, vel πρὸς σκοτώσεις, reſtituendum: alioquin ſenſus nullus conſtaret.

Cap. LXXXIX. ὅτου γυμάζων] γυμαστικὸν ſeu γυμαστήριον, aut certè, μισθὸν τῶν γυμάτων, legendum mihi videtur. Niſi mauis, γυμαζοντα, accipere pro exercitatore, ſeu eo qui exercitio præſit, & tùm ἐπεκτάτης, ſeu ὁ γυμαστήριον, ſubintelligi.

Cap. XC. ἔστω δὲ πυκνὸν] Lege, πυκνὸς, ſcilicet, καρπός. Sic inferiùs καὶ τὸ καταζόμενον, vt habebatur in vulg. codicibus impreſſis, legi καταζόμενος, quanuis Ruellius, καταζόμενος, legiſſe videatur.

Cap. XCI. καὶ ἰδρῶτας κινᾶ] Videtur aliter ſenſiſſe Plinius, niſi fortè alia vis eſt ſeminis, alia radicis. Is enim, lib. 20. c. 23. *Ferulæ radicē ex oleo & aceto contra ſudores immodicos, uel in febribus, proſtare tradidit.* Sic & ibidem, quod de caulibus paulò pòſt ſcribit Dioſcorides, adhibita diſtinctione protulit Plinius. Siquidem non niſi plures ſumptos, capitis dolores facere innuit: alioqui verò decoctos, eſſe ſtomacho vtiles.

ἐπὶ κεφαλὴν καὶ πόδας] Hæc ad capitis vſque calcem ſuperaddita videtur Marcello, ac ipſi quoque Ma-

nardo. Sed & iſta Ferulæ deſcriptio non legitur apud Oribaſium. Ego verò ea ſaltē ſuſpecta habeo, quæ de ſagapeno ex hac Ferula manante, ſubiungūtur. Cæterùm αὐλὶ τῆ, μαχόνεκα, Ruellius βαχόνεκα, legiſſe videtur. Nos vulgatam lectionē retinentes, *craſſiora*, reddidimus.

CAP. XCII. ἄχνας δὲ γίνεται ὑποδίκας] Sic Andreas Lacuna ex vetuſto codice legit: & hanc quidem lectionem rectè quoque ſecuti ſunt Oribaſius, Serapio atque Cornarius. Ruellius & Marcellus, vulgatam lectionem ὑποδύεται, expreſſerunt, quam nos vitioſam cenſuimus.

ὑγρὸν δὲ ἐκπῖπτει τῆ ἐκκοπῆ &c.] Ita legit Lacuna in antiquo codice, contra quàm habetur in vulg. exemplaribus, ὑγρὸν δὲ ἐκπῖπτει τῆ χυλοῦ ὑπὸ. Sed illā lectionem cum Oribaſio & Serapione lubentiùs iccirco amplexus ſum, quòd & Galenus, 8. ſimpl. cap. de Peucedano, ταύτῃ τῆ χυλῆ prætuliſſe videatur. Etſi verò Ruellianam lectionem id ſtabilire videtur, quòd alibi Dioſcorides ſuccos ab hyoſcyamo & mandragora expreſſos earundem plantarum liquoribus lacrymiſve anteposuerit: aliam tamē ego rationē eſſe iudico liquoris qui è calidioribus, & eius qui è frigidioribus plātis emanat. Cæterùm Theophraſtus, hiſt. lib. 9. Peucedani radicem ſolam probans, liquorem inutilem æquè ac ſemen eſſe cenſuit.

ὁ δὲ Σαρδόνιος] Ita Oribaſius & Serapio: Cornarius tamen ex Theophr. lib. 9. & Plinio lib. 25. cap. 9. αὐλὶ τῆ, Σαρδονίᾳ, Ἀγκαδίᾳ reponendum ſuſpicatur.

λεπίδας ἔχει ὑγιεινὰς] Plin. lib. 26. cap. 14. *Item Peucedanum, cui ad recentia vulnera nulla tam eſt, ut ſanē oſſibus extrahat.* Sed eum locum ex Dioſc. ſententia ita reſtituendum iudico: *Cui ad recenſa vulnera nulla tam eſt, ut ſquamas oſſibus extrahat.*

CAP. XCIII. φύεται ἔχον μαγὶ] Serapio αὐλὶ τῆ, μαγὶ, μαλακὰ, legiſſe videtur: ſiquidem *mollia* convertit. Alij iuxta lectionem alteram legendū cenſent, καθάπερ ἀπὸ τριγώνου, μαρόνεκα δὲ. Quomodo legerit Oribaſius, penitus ignoratur: quoniam apud eum Autorem caput hoc omnino deſideratur.

ἐκπιπτόμενον ὡς ὑδρὸς] Lego, καθαπτόμενον. Nec enim videtur Melanthium ſeu melanſpermon inter pinſendū panibus addi ſolitum, quēadmodum videtur voluiſſe Marcellus, ſed tantummodò panis cruſtæ, ac inferiori potiſſimùm, inſpergi. Sic enim Plinius, lib. 19. cap. 8. *panes ruſtici cruſtæ papaver candidum inſperſa tradidit, inferiorem verò cruſtum apium githque arcali ſapore condire.*

καὶ οἶνῳ παλαιῷ ὑπόπιον.] Legendum hauddubiè cum Serapione, οὔρῳ. Nam & Plinius de Melanthio, lib. 20. cap. 17. *Alvum & claus* (inquit) *in pedibus mederi tritum in urina.* &c. Sic & inferiùs, quo loco habetur, μετ' οἴνου πόσις, cum Serapione & Lacuna, μετ' οὔρου, legendum cenſemus, Plinij eiuſdem autoritate ducti, qui quidem citato loco ita quoque habet: *Difficultatem ſpirandi deſcribit, addito mero potum.*

CAP. XCIIII. ὁ χυλὸς μέλανος] Hoc eodē nomine Dioſcorides inferiùs, haud ſecus ac Plinius, folia ipſa à nonnullis nominari ſolita commemorat. Atque ita quoque Theophr. hiſt. lib. 6. cap. 3. τὸ δὲ φύλλον ὁ καλοῦσι μέλανον, ὅμοιον τῇ πλάτει. id eſt, *folium quod maſpetum vocant, apio ſimile.* Idem confirmant Pollux & Heſychius. Plautus verò in Rudente, ac Solinus Polyhiſt. cap. 15. *ſirpe*, corrupto τὸ σίρπιον vocabulo, videtur appellaſſe. At ſuccus ſeu liquor, qui Græcis ὀπὸς τοῦ ἐκφυοῦ dicitur, Plinio *laſer* eſt: Plautus loco citato *laſerpitium* potiùs videtur appellaſſe, quaſi *lac ſirpicum*. Nam & *primùm*, teſte Solino, *dictum eſt lac ſirpicum, quoniam manet in modum lactium, deinde uſu derivante lac nominatum.*

ὃ καὶ ἐν ὄξει] Particula ὃ hauddubiè redūdat. Eius loco Lacuna ex vetuſto codice ſupplere videtur, καὶ ἐν ὄξει, vt ſit, σίλφιον καρπὸν καὶ ἐν ὄξει, καὶ ἐν ὑδρομέλιτι &c.

ὑγρὸν ἐκπῖπτον τῆς ῥίζης] Liquorem qui è radice profluebat, *ſilias*, vti alterum qui è caule capiebatur, *cauliam*, diſtinctis nominibus appellauit Theophraſtus, ſexto hiſt. plantarum libro: ſic & Plin. lib. 19. cap. 3.

ἔλαιον δὲ αὐτοῦ] Plinius *ſinapi probationem aſſerit, in dolore modicè tuſſo, & cum frangitur candido manu, mox tranſluentem*, &c.

ἐκεῖνο τοῦ γάλακτος τῷ μέλιτι] Hoc poſterius, τῷ γάλακτι, *præſtare* mihi videtur.

καὶ ἡ ῥίζα μαγόδαρις] Sic Colum. lib. 6. cap. 17. *ſuci & radix quam Græci uocant μαγόδαριν.* Attamen Theoph. hiſt. lib. 6. cap. 3. Itémque Plin. lib. 19. cap. 3 Silphij caulem magydarin videntur appellaſſe. Pollux verò, lib. 6. cap. 10. ſemen ipſum μαγόδαριν nominat. Ita enim eo loco, pro, μαγόδαριν, μαγόδαριν reſtituēdum videtur. Heſychius id ipſum nomen Silphij liquori tribuit.

ἐνίοτε εἰς τὰ βρώματα] *Non inſuerim*, (ſcribit de Laſere Plinius lib. 22. cap. 23.) *quod Autores ſuadent, unctis dentium in dolore molarum ora includi, magno experimento hominis qui ſe ea de cauſa præcipitauit ex alto.*

ἐγχριόμενος εἰς ὀδόντων] fortè, ὀδόντας vel ὀδοντιάσις. Sic inferiùs αὐλὶ τῆ. ἐκκαθαίρουσι, lego, non ἐκκαθαίρουσι, vti Ruellius, ſed ἐκκαθαίρουσι. Deinceps verò αὐλὶ τῆ, κόνδυς, κονδύας. Sed hæc librariorū πράγματα quiuis vel mediocriter in Græca lingua verſatus facilè fortaſſe deprehendet.

ἀλλὰ καὶ ἀφεψόμενον] Libenter adderem, καρφὶ, id eſt, *arva*, vti habetur in Ἀγρ. lib. 1. ca. 229. aut ἀνὰ ῥᾳδ. μέλιτ. id eſt, *denario melle*, ſicut apud AEginetam, lib. 3. cap. 20.

ἐκθλίβει πινόμενον] Legendum cenſeo, πίνεται. Plin. lib. 22. c. 23. *æquè ex aceto bu qui coagulum laſtis ſorbuerint.* Sed eo loco legendum. *qui coagulatum lac* &c. ex hoc Dioſc. contextu facilè conncio.

ἡμιονιὰς ἐν Ἀσίᾳ] hanc circa Syriam naſci ſcribis Plinius, nec prouenire in Cyrenaica regione: gigni & in Parnaſſo monte copioſiorem.

CAP. XCV. πίνακα παρθενικὸν] Sagapeni plantam panaci ſimilem eſſe ſcribit Gal. in lib. de antidot. Meſuæus arborem deſcribit oleaſtro montano ſimilem: ipſum verò liquorem (qui καλλιγενὴς, vti monet Gal. 8. ſimpl. plantæ ex qua emanat nomen retinuit) ammoniaci lacrymæ ſimilem eſſe tradit Plinius, lib. 20. cap. 18. Porrò cùm anteà ſcripſerit Dioſcorides, cap. de ferula, è radice ferulæ ſauciata manare Sagapenum, hîc verò plantam aliam in ferulaceo genere agnoſcere videatur, è qua ipſum extillet: facile eſt coniicere liquorem hūc, æquè ac ſuccos alios, de quibus in ſequentibus capitibus agitur, illi fuiſſe ipſa planta notiorem.

CAP. XCVI. *διὸ καὶ τὴν καφησωνίδα*] Gal. lib. 9. comp. pharm. *κατὰ τόπους*, cap. 4. EVphorbium plantæ cuiusdam spinosæ in Mauritania nascentis liquorē esse prodidit. Plin. lib. 25. cap. 7. *herbam quam* EVphorbiam *nominat, spectari ait ferulæ speciem, folys acanthi, nus.* Atque hinc fortassè ducta coniectura D. Io. Bauhinus, in simplicium cognitione magna cum laude versatus, *αὐτὴ τὴν καφησωνίδα*, *ἀκανθώδη* reponendum suspicatur. Mesuæo vero EVphorbium *arbor est, folys*, vt ipse vult, *primum quidem hirsutus aut lanuginosis, deinde ubi hæc deciderunt, polio marino similibus.* In tanta varietate cui potissimùm Autori sit habenda fides, iudicare est difficillimum. Arborem quidem nescio quam Andreas Marinus in suis in Mesuæ cōm. depingit, à Saraceno quodam, vti prædicat, ex Africa pro EVphorbia sibi allatam. Dodonæus verò herbam potiùs aculeatam delineare videtur, quam Bruxellæ in Io. Boisoti horto ex vnico folio in terram depacto, ficus Indicæ folij modo, genitam scripto prodidit.

ὄρος ἐν τῇ κατὰ Μαυρουσίαν Τμώλῳ] Nullus mons; quod equidē legerim, Tmoli nomine in Libya aut Mauritania refertur à Geographis: sed est mons eiusce nominis in Lydia Asiæ minoris prouincia, qui quidē Sardibus incumbit. Quare cum Marcello & Cornario, *Ἄτλαντα* potiùs, quàm *Τμώλῳ*, legēdum nobis videtur: maximè cùm & vanis in locis Plinius in monte Atlante vltra Herculis columnas EVphorbiam gigni, indéq; portari, tradiderit. Est vero Atlas Mauritaniæ mons, ab Atlante rege Mauro ita cognominatus. Sed & Damocrates apud Gal. lib. 7. comp. pharm. *κατὰ χόλην*, in myracoporum compositionibus. EVphorbium, ab Atlante monte in quo inuenitur, *Ἀτλάντιον* cognominat. Cæterùm Gal. lib. 3. *κατὰ χόλην*, EVphorbium scribit ex Occiduis regionibus asportari solitum; veluti Sagapenū ex Orientalibus.

κοιλίαις γοῦν αἰγείαις] Gal. lib. 9. pharm. *κατὰ τόπους*, EVphorbium ventriculis ouilis excipi & asseruari solitum iccirco scribit, quòd hos solos minimè erodat. Plinius verò de EVphorbij excipulo agens, hœdini ventriculi meminit, ac ibidem quoque hœdino lacte EVphorbium à Getulis adulterari commemorat.

ἀπὸ τοῦ καυλοῦ] Cùm antè EVphorbium arborem esse dixerit Dioscorides, mirari subit *καυλὸν* iam nunc mentionem facere. Quanuis enim, autore Theoph. lib. 1. hist. cap. 9. *καυλὸς* nomen *κοινὸν ἐπὶ ἐντίμων καὶ χορτίων*, attamen in arborum genere *καυλὸς* nomen frequentius esse consuetum, vti eodem loco idē ipse innuit: *caudicem* Latini vocitant.

οὐδὲν τοῦτο Ἰούβας ἀπὸ τῶν ἰδίων] Plinius non Iubæ tantùm ætate inuentū fuisse EVphorbium scribit, sed illud ampliùs, ab ipso etiam Iuba inuentum. Sic enim ille cap. 7. lib. 25. *Inuenit & patrum nostrorum ætate Rex Iuba quam appellauit* EVphorbiam, *Medici sui nomine & fratris Musæ*: nec ita multò pòst: *Sed Iuba uolumen quoque exstat de ea herba & clarum præconium*: quod ipsum etiam innuit Galenus loco citato, lib. 9. *κατὰ τόπους*, his verbis: *καὶ μάλιστα οἱ περὶ Ἰούβαν βασιλέα τὴν φύσιν τόδε τοῦ βοτάνου ἱστορήσαντες Μαυρουσίων*. hoc est, *& de* EVphorbio *conscriptus est exiguus libellus à Iuba Mauritanorum Rege.*

Ἀπὸ ἄλης τῆς ἡμέρας πλείω] Hæc vox, *πλείω*, fortassè redundat, nec etiam eam videtur legisse Serapio. Innuit siquidem suffusionibus inungi EVphorbium, sed deinde tota die vstionis sensum relinqui, eámque ob rem illi mel collyriáve alia minùs acria rectè admiscere. Quòd si quis ad ipsam etiam Dioscoridei contextus seriem diligentiùs attendat, vocem illam, *πλείω*, hoc loco omittendam meritò iudicauerit.

CAP. XCVII. *τὸ ἔνιοι μετώπιον καλοῦσιν*] Antè, lib. 1. cap. de metopio vnguento, dixerat Dioscorides, *τὸ ξύλον ἐξ οὗ ῥητίνη ἡ Χαλβάνη, μετώπιον καλοῦσιν*. hoc est, *lignum è quo Galbanum emanat, metopium appellari.* Hoc verò loco non lignum seu lignosum corticem, aut plantam ipsam, sed liquorem seu lacrymam qui ex ea stillat, *μετώπιον* vocari scribit. Theophrastus verò non *μετώπιον*, sed *πάνακα*, eiusmodi ferulam seu ferulaceam arborem nominat, lib. 9. hist. At Plinius, lib. 12. cap. 23. arborem è qua hammoniaci lacryma stillat, metopium vocari palàm innuit.

ἀπὸ τῶν λεγομένων] Videtur præterea legisse Serapio, *ἀπὸ ἀμμωνιακοῦ θυμιάσεως*: vtriusque enim & thuris & hammoniaci meminit. Sed & Plinius quoque, lib. 12. cap. 25. Galbanum vult esse ad similitudinem hammoniaci.

τοῦ σπέρματος καὶ τῆς ῥαφάνου] Fortassè reiecto *σπέρματος*, *καὶ* legendum, *σπέρματος τῆς ῥαφάνου*. Nam & Aëtius, in electione simplicium, probatissimum censet Galbanum, quod seminis aliquid admixtū retinet, neque *τῆς ῥαφάνου* mentionem facit. Ac, vt vere dicam, pugnáxta scribere videtur Dioscorides probat id Galbanum cui aliquid ferulæ sit admixtum, cùm antea probasset *ἄξυλον*, hoc est, *minimè lignosum*, seu, vt Celsi verbis vtar, *quod est sine furculis*: nisi *ἄξυλον* dicis velimus, *quod minimum habeat lignorum* seu *furculorum.*

ὀσμὴ βαρεῖα] Galbanum ab odore hoc graui, quo præditum est, Nicander in Theriacis, *βαρύοδμον* cognominat.

ἔξω σωθῇ ἔξω] Marcellus legit, *σωθῇ οἶνος*, tum vetustiorum codicum fidem, tum etiam Plinij autoritatem secutus: qui quidem libri 24. cap. 5. Galbanum venenis, maximéque toxicis, aduersari scribit, cum myrrha & in vino: atque ita etiā Serapio legisse videtur. Idem quoque de Galbano tradit Auicennas.

δοκεῖ δὲ καὶ δυσουρίαν ποιεῖν] Marcellus & Cornarius pro, *Δυσουρίαν ποιεῖ*, *δυσεξίαν ποιεῖν*, iccirco legendum suspicantur, quòd & Plinius, loco modò citato, de Galbano agat in hæc verba: *Nocere urinæ existimatur.* Sic etiam Lacuna in veteri codice legisse se annotat, neque eam lectionem ratione carere subdit: quandoquidem quæ vehementer diuretica sunt, vti etiam cantharides, interdum lotium supprimunt ratione exulcerationis, quam vesicæ ipsiúsque collo inducunt. Equidem quanuis præterea Serapionem eodem quo illi modo legisse animaduerterem, de immutanda vulgata lectione malùi liberum esse suum cuique iudicium.

ὀλιγουρίαν ἢ δυσουρίαν] Marcellus & Lacuna *ἀπὸ τοῦ, δυσουρίαν*, ex antiquioribus codicibus restituendum existimant, *λιπαρὸν*: maximè cùm pinguia, tanquam aërea, ferè supernatent. Sordes verò, ceu terrenæ substantiæ magis participes, grauitate sua subsidere soleant. Sed quoniam in Gal-

bani, quantumuis legitimi, ſordibus exiguorum lignorum, ſurculorum cæterorúmque id genus ſua natura leuium, non minimam portionem conſpicimus: nõ eſt dubium, quin ſi Galbanum aquæ feruenti demergatur, eiuſmodi leuia vnà cum pinguitudine quadam fluitent: id quod ex ipſis facile eſt vnicuiq; animaduertere. Quamobrem nihil immuto.

εἰς ὄξος καὶ ὕδωρ] Legit Lacuna veteris cuiuſdam codicis autoritate fretus, ἢ εἰς ὄξος καὶ ὕδωρ &c. quippe Dioſcoridem exiſtimat præter illam priorem, alteram hoc loco purgandi Galbani rationem tradere, quam cæteri cum ſuperiore confundant. Verùm equidem vnicam in hoc toto contextu purgandi Galbani rationem deſcribi exiſtimauerim. Scilicet, vt primùm in aquam feruentem coniiciatur Galbanum, quò quicquid eſt ſtipularum aut lignoſorum ſurculorum aquæ innatet, conchaque aut alio id genus inſtrumẽto facilè detrahi poſſit: deinde verò reliquum quod ſubſidet in imo, reiecta ſcilicet aqua, ad ſeparãdam denuò terram, arenam, lignum denſius aliúdve eiuſmodi craſſamẽtum, in vas aliquod per linteum rarius excoletur, iuuante in id aquæ calore, quæ in vaſe duplici efferueſcat. Tùm enim purius Galbanum per linteum in vas ſubditum excolabitur: craſſior verò ſordities intra linteum remanebit. Neque verò fit veriſimile, quod verba Dioſc. innuere videntur, id tantùm quod innatat excolari debere, vt pinguitudo fluitans à ſordibus ipſis ſecernatur: quippe cùm in eo quod ſubſidet ſordium etiam & craſſamentorum non minima portio reſideat. Cæterùm Pharmacopœi noſtri minùs laborioſè, ac fortaſſis aptiùs, Galbanum purgant: dum aceto alióve accommodato liquore ipſum diſſoluunt, diſſolutum colo transfundunt; tranſfuſúmque tandem igni lento decoquunt ad inſtam ſpiſſitudinem.

Cap. xcviii. τὸ θύϊνον θράυσμα] Plinius, lib. 12. cap. 23. paulò aliter ac Dioſc. thrauſton (quod cum thrauſmate idem eſt) nominat id Hammoniacum, quod eſt maſculi thuris ſimilitudine: phyrama verò, quod eſt pingue ac reſinoſum. Fortaſſe verò θράυσμα ſeu θραῦσις idem illud eſt, quod Galeno recentioribúſque Græcis ἐμπλαστικὸν θραῦσμα iccirco appellatũ fuit, quòd ad ſuffimenta deſideraretur.

Cap. xcix. λίθου ῥητινώδους] Legi, ῥητινώδους, cùm antehac, ῥητινώδους, legeretur. Plin. lib. 24. cap. 14. Sarcocollam ſpinę lacrymam eſſe putat, tríque tribuit non quidem, vti Dioſc. amarorem, ſed cum quadam acrimonia dulcedinem. Gal. verò in ſimpl. ſcribit eſſe modicè amaram ſimul & emplaſticam. Portò vt de colore etiam aliquid dicamus, Meſuæus in ſimpl. itémque Plin. lib. 13. cap. 11. non ſubfuluam Sarcocollam eligunt, vti Dioſc. ſed candidam. *Candidum eiuſmodi gummi*, inquit Plinius, *quàm rufum melius*. Rurſúmque, lib. 24. cap. 14. vbi Sarcocollam docuit vetuſtate maximè nigreſcere: *melior*, inquit, *quò candidior*.

κατακλιθὲν τραυμάτων] *Hinc ex ui poteſtatéque ſua nomen mouens*, inquit Plin. *Carnes enim in vulneribus glutinat*.

Cap. c. κεκαυμένος δὲ ἁ] Videtur legiſſe Plinius, ῥυπαίνων, lubrico & facili duarum literarum lapſu. Is enim, lib. 27. cap. 10. folia Glaucij deſcribit *mucoſa & ſordidiora*, *quàm ſint papaueris*: ibidémque, ipſius grano, quod paulò poſt foliis Dioſc. ipſe, tribuit. Siquidem nõ e folus, ſed è grano ipſo vult ſuccum illum exprimi.

Cap. ci. ἐκ δύο ξυλοκόμων] Appellatur hęc ab vſu ξυλοκόμα, vti & παιδοκόμα: à materia verò ex qua conficitur, nimirum à coriis bubulis ſeu taurinis, βυρσόκολλα. *Præſtantiſſimum* tamen *Glutinum* cẽſet Plinius, lib. 28. cap. 17. *ex auribus taurorum & genitalibus*: quanquam ſubdit illico. *Adulterantur nihil æquè quibuſuis pellibus muceratis, calamentiſque etiam decoctis*. Fuit autem alia κόλλα ἐκ τῶν βοτείων, de qua Gal. in ſimplicib. *quæ fit*, inquit ille, *è ſimilagine & pellibus*, non garo, vti vertunt Interpretes omnes: quandoquidẽ non γάρου, aut, quod rectius eſt, γάρεως, ſed γάρεως, ἀπὸ τοῦ γάρυ, vel potiùs, γάρεος, ὁ loco legẽdum eſſe vel mediocriter eruditus nunquam inficiabitur.

Cap. cii. ἡ δὲ ἰχθυοκόλλα ἀγγελίου] Ichthyocolla, inquit Plinius, lib. 32. cap. 7. *appellatur piſcis ea glutinoſum eſt carnium, idemque nomen glutino eſt*: quanquam & ipſe ſubdit deinde: *Quidam ex ventre non è carne fieri dicunt ichthyocollam, ut glutinum murium*. Cæterùm ad tetanothra quomodo ea præparanda vſurpandáque ſit, ibidem leges apud Plinium: quod huc tranſcribere nihil fuit neceſſe.

ἐμπλαστικὴ δυνάμεως] Quæ ſint emplaſtra Medicis Cephalica dicta, docet Galenus, lib. 2. comp. med. ad ῥᾶ, ſcil. quæ caluariæ fracturis peculiariter dicata ſunt: abſtergendi, digerendi ſiccandíque vi prædita. At illud ignorans Plinius, ea eſſe falsò credidit quę capitis dolotibus accommodarentur. Sic enim ibidem de Ichthyocolla: *Valere eam in capitis doloribus affirmant & tumoribus*.

Cap. ciii. ἡ ἀφὶ τὴν ἰτέαν] Nulla, quod equidem ſciam, quercus ſpecies eſt, quæ buxeo folio conſpiciatur. Quamobrem iſta buxi folia, non quercui ſeu robori tribuenda ſunt, ſed ipſi potiùs frutici: qui cùm ſuam ſedem nõ habeat, perpetuò in aliena ſede, ac in quercu potiſſimùm, viuit, eiúſque radice nititur & alitur. Ideóque ſic videtur emendandus hoc loco Dioſc. cõtextus: γίνεται δὲ οὐ ἐπὶ δρυὸς μόνου ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ξυλωδῶν ὧν ἀφὶ, ἰσχάδος καὶ φήγου, &c. Porrò frutex hic non in quercu aut robore tantùm, ſed, vti etiam deinde ſubdit Dioſc. in aliis pleriſque naſcitur arboribus, veluti pyro, malo, cerro, terebintho, ilice, pruno, caſtanea, ſorbo, larice, abiete, pino, ac ipſa quoque olea, ſaltem in Paleſtinæ regione: ſi quibuſdam fides habetur, qui eo loco viſcum in olea rubentibus baccis naſci retulerunt. Attamen ex Theoph. ſententia, lib. 2. de cauſ. plant. cap. 23. quod abieti pinóque innaſcitur viſcum, priuatim Stelis EVboenſibus, & Hyphear Arcadibus dici videtur. Cęterùm quãuis idẽ Theophraſtus, ipſúmq; ſecutus Plinius, Viſcum naſci prodiderint ex ipſius acinorũ ſemine, per aluos reddito turdorũ, palumborum cæterarúmque id genus auicularum, poſtquam acinorum baccarúmve pulpam intra ſuos ventriculos cõcoxêre: verior nihilominus ſummi tũ Philoſophi tum Medici Iul. Cæſ. Scaligeri ſentẽtia mihi videtur: qui quidẽ in exotericis in Cardanũ exercit. eundẽ fruticẽ ſpõte naturæ potiùs

ex aliqua arborum quibus innascatur portione, seu potiùs ex ipsarum arborum vitali excremẽto gigni retulit: haud secus atque belluarum cornua ex ipsorum ossium internis primordiis pullulare consueverunt. Atque eò quoque spectasse videtur Ion poeta Chius, dum, in fabula Ceneo, Vrticum quercus sudorem esse prodidit.

Cap. cxiii. μυόδρυον μέζα εἶναι] rectiùs, μυόδρυς; vti antè, χαμαίπιτυς. Sic & superiùs καὶ τὸ, ἀσπερίχρωτος, legendum haud dubiè, ἀσπερίχυτος, seu ἀσπερίχυτος.

Cap. cv. ἀνάπτυξις, φύλλα ἔχει] Tam variæ sunt discrepantésque quæ à variis Autoribus assignantur Alysti descriptiones, vt quænam vere planta sit ἄλυσσος, internoscere sit perquàm difficile: siquidem Dioscoridis descriptio satis est manca, vt & aliæ pleræque. Gal. verò, 2. de antid. Alysson herbam scribit esse marrubio similem, sed asperiorem magísque spinosam circa suas pilulas seu verticillos, (στάχυας nominant) flore interim in cæruleum inclinante. Aëtius autem, lib. 2. eam & eandem sit existimari cum Heraclea sideritide, quæ secus vias vbique nascitur, flore purpurascente foliísque crassioribus: aut, si ἀσπερόφυλλα legere mauis, asperioribus. Rursúmque lib. 6. cap. 24. sideritidem Heracleam ab Alysso minimè differre palàm indicat, vti & Paulus, lib. 5. cap. 3. At Plinius lib. 24. cap 11. erythrodano seu rubiæ similem facit. Nam posteaquam de erythrodano egit: *distat ab eo*, inquit, *qui Alysson vocatur, folys tantum & ramis minoribus.* Auicenna denique, lib. 2. tract. 1. Alysson, quod *Algnasson* appellat, facit lilio proximum. Quanta verò sit similitudo lilij cum rubia, sideritide, marrubio, vnicuique iudicandum relinquimus: interimque de Alysso certi vix quicquam statuere possumus.

Λυγμοὺς παύει δίχα πυρετοῦ πίνει] Hanc mirificam planéque insignem Alysti ad singultum inhibendum vim atque facultatem silentio minimè prætermisit Plutarchus, συμπ. lib. 3. his verbis: τῶν δὲ ἄλλων καὶ λευκάδιον βοτάνιον καὶ καβόρνης ἐστὶ τῶν χεῖρα μόνον, οἱ δὲ καὶ σφόδρα βαστάζοντες, ἀπαλλάττονται λυγμοῦ. ἐν γοῦν δὴ καὶ πανηγύρει ἀγαθὴ καὶ αἰσχύνει, παρεκρουόμενον τῆς καταφορᾶς. hoc est, *Alysson herba nel manibus tantùm contrectatum, aut etiam suspecta, liberat à singultu. Ferunt & armenus & gregibus nullo, si conseratur circum illorum cubilia.* Ex iis verbis satis intelligitur, emendandum Plinij contextum, quo loco de Alysso agens, *Mirum est*, inquit, *quod additur sanem conspecto omnino frustra eo fieri.* Neque verò legendum, vti voluere nonnulli, *insanã sanari*: sed, *singultum sanari*, restituendum videtur.

φακοὺς καὶ ἑφηλίδας] Gal. & Aëtius, ἀλφοὺς καὶ ἑφηλίδας διαπαντὸς, *alphos & solares maculas expurgat.* Paulus, πρὸς τὰ τῶν νεφρῶν ἐμφράγματα καὶ ἑφηλίδας ἰσχύει, *renum obstructiones amouet, & solares maculas abstergit.* Hunc imitati Auicennas & Auerroës Alysson renum etiam obstructiones liberare prodiderunt.

δηγὴν δὲ καὶ λύσσαν κυνὸς] λύσσαν κυνὸς pleriq; interpretantur, *canis rabiem*: quibus quidem verbis nescio an significare voluerint rabiem à morsu canis inductam. Equidem apertiùs tollendæ ἀμφιβολίας gratia, *rabidi canis morsum* reddidi. Gal. lib. 6. simpl. πρίμνας δὲ καὶ λύσσαν κυνὸς, ἤγουν τὸ δηγμα τοῦ ὑπὸ λύσσης κυνὸς διηγμένου, &c. Idem repetunt Paulus & Aëtius. Plinius loco citato: *nomen*, inquit, *accepit Alysson, quòd à cane commorsos rabiem fenire non patitur.* Hæc cùm ita sint, in hac voce ἀλύσσου σ geminandum esse nemo non videt: quantumuis in vulgatis exemplaribus cum simplici σ scriptum reperiatur. Cæterùm illud obiter annotandum, quod lib. de Antidotis ex Antonij Coi sententia Galenus admonet: legendam eam herbam subtilitu Caniculæ, deberéque siccatam tundi, cribrari ac diligenter asseruari, ne diffletur.

Cap. cvi. ἡ μανίας καὶ μάψας] Lege, μαλάψας, vel, μάψα. Sic Paulus libro septimo, de Asclepiade: κατασκευάζει δὲ πρὸς ὄφεως τὰ τοιαῦτα, καὶ ἐπὶ τὰ μάψα καὶ μανίας ἐπιτήδεια. hoc est, *adhibita profuit ad venenatorum morsus, & vuluæ mammarumque malignas vitia.*

Cap. cvii. ἄτρακτος οὗτος ἐστὶν ὁ καλούμενος κόκκος] Atractylin alio nomine κόκκον ἀγρίαν nominant Paulus & Oribasius. Aëtius verò aliàs φύλλον ἔχειν, aliàs verò ἀκρόκομον, appellari scribit. Theophr. hist. stirp. libro sexto, capite quarto, postquam enici vtriusque syluestris mentionem fecit, ex hísque genus alterum scripsit enico sativo simile esse, καὶ (inquit ille) ἡ ἄτρακτος ὁμοίως· δεῖ γὰρ καὶ ταύτην (sic enim legendum, non καὶ ταύτης) ὑπάρχειν ἐν ἀρχῇ τοιοῦτόν τι χωρίον, hoc est, *nisi quòd caule sit rectiore seu rigidiore: quam ob causam eo nonnulli priscorum uteres pro cole usurpant:* paulò pòst etiam Atractylidis mentionem facit, quam scribit, ἔχειν ἔγκλιτα φύλλα, ἐν ἀμφοτέροις καὶ τὰ περὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αἱματώδη πολὺ τὸ χολῶδες· διὸ καὶ φοινίσσει τὰ κλαυθέντα τῶν ἄκρων ταύτης· ἔχει δὲ τοῦτο ἐμφανῶς ἡ ἀτράκτου ῥίζα καὶ χολὴν δοκεῖ, vel potius, καὶ χολὴν φοινίσσει. id est, *peculiare id habere in folio, vt decerptum oculique admotum cruentum succum ex se reddat. vnde hæc spina φοίνιξ, hoc est, cruenta, nomen apud quosdam inuenerit. Habet verò odorem grauem succúmque cruentum.* &c. Hac ipsa de causa existimo etiam apud Aëtium ἀκρόκομον nomen obtinuisse. Hanc porrò Theophr. Atractylin, quæ affricto folio succum sanguineum redderet, sæpiùs Copetij in arcis horto, studio ac diligentia nobilissimi honestissimæque matronæ vxoris D. Cleruantij, satam conseruatámque, magna cum voluptate conspeximus.

Cap. cix. ἥμισυ δὲ τούτου] Aut particula, οὗ, hoc loco redundat, aut pro ea legendum πως, vt sit, αὐτῆς ἥμισυ πως &c. *flores quodammodo similes.*

Cap. cx. ῥίζαι ἔχουσι] Malui hæc singulari numero legere, quàm vt habet Aldinus codex, ῥίζα μελαίνη ἔχουσα, &c. Sic enim Plinius de Leontopetalo, lib. 27. cap. 11. *Radix rapo similis, grandi, nigra.* Neque verisimile est plures esse Leõtopetali radices, totidem rapis similes. Huc adde quòd quæ planta vulgo creditur esse Leontopetalon, quæque Dioscoridis & Plinij descriptioni satis aptè respõdere videtur, vnica radice prædita visitur.

Cap. cxi. ὑφηνόδοντα πίνει ἄριστα] Plinius, lib. 25. cap. 5. Teucrium (ab inuẽtore Teucro sic dictum) neque florere vnquam neque semen gignere scribit, quo loco hemionitim Dioscoridis describit. Ac illicò pòst de Teucrio vero agens. (Teucriam aliàs vocat, Τευκρίδα Oribasius) so-

lium non quidem ciceris, sed fabæ illi tribuit, & ramos hyssopi.

CAP. CXII. καὶ ἀλκυονίδη] Tam leue est inter πάγχρεστον & τὸ ἀλκυονίδιον discrimen, vt harum vocum alterutram hoc loco redundare sit existimandum: nisi malumus ista, καὶ ἀλκυονίδη, cum sequentibus coniungere, hunc in modum: καὶ ἀλκυονίδη δὲ ἡ πρασίλλις. Hanc lectionem ego eò lubentiùs secutus sum, quòd & Plinius, postquā Trissaginis vires ex Dioscoridis sententia fusiùs persecutus est, libro 24. cap. 15. *Exalfiat*, inquit, *pernicie*. Sed & Serapio ipse ita legisse videtur. Habet enim ipsius Interpres: *Et quando linitur cū ea corpus, calefacit ipsum*. Cæterùm Theoph. hist. lib. 9. cap. 10. aliam vim foliis, aliam semini Trissaginis assignat, his verbis: τὸ δὲ χαμαίπιτυς τὸ μὲ φύλλα ἔχον τὸ ῥίζωμα καὶ ὁποῖα τὸ τραῦμα ἰᾶται ἐλαίῳ καθέψον, ὁποῖα καὶ τὸ πολύκνημον ἐλαίῳ· τὸν δὲ καρπὸν καθαίρειν χολὴν, ἀγαθὸν δὲ καὶ ὑδρωπικοῖς. ὁποῖα δὲ τὰ λεπτόφυλλα ποιοῦσί τινες φύλλον τρίψαντες ἐν ἐλαίῳ, &c. hoc est, *Trissaginis quidem folia ad vulnera & vulnera in oleo trita valent, itémque ad depascentia ulcera: semen verò bilem purgat, oculis etiā beneficium est. Sed & folium tritum in oleo argemæ adhibetur.*

CAP. CXIII. λευκὸς ἱστὰ] Suspicatur Plinius, lib. 27. cap. 11. eandem esse cum Leucade leucem quandam mercuriali similem, quam mesoleucon quidam vocarint, quòd per medium folium lineam candidam transcurrentē habeat. Sed quàm rectè, aliorum esto iudicium.

CAP. CXIIII. Λυχνὶς πρασίλλις] Lychnidem plantam, à lychnitide planè diuersam, Plinius rosam Græcam appellat, lib. 21. cap. 4. aliàs flammeam nominat.

CAP. CXVI. ἔχουσιν ὁ ὄζη] Sic Gal. 6. simpl. cap. de Lilio: καὶ περιχύσεις δὲ αὐτὸ ἐν ὄξει, καὶ χαλάσῃ φαρμακεῖδε. Hinc patet, apud Plin. lib. 21. cap. 19. pro, *folia in acto cocta vulneribus imponuntur*, fortasse legendum, *folia in acto cocta, &c.*

μηλὶς ὄξει ἢ μέλιτι] Cum Cornario & Serapione καὶ τὸ σκόλυμον ἀφεψηθὲν, ἢ, restituere malim σκολυμὸν, ᾗ, vt sit: μηλὶς ὄξει ᾗ μέλιτι. Sic enim Gal. 6. simpl. de Lilio. ἀναδίδωσι δὲ καὶ, inquit, καὶ τὸ ἀφεψημα χλιὸν, ἐγχριόμενον σὺν ὄξει ἢ μέλιτι. πυρετόντας δ' ἐν ὑγρᾷ ἕξεως ἔσεσθαι, καὶ τὸν ἀδένων τὸ φαρμακον εἰς σκίρρον τι ἐκφαῦλον ἐκ τοιούτου δυσίατον χρεὼν τὸ δένδρον, καθάπερ ἔστι τὰ τραύματα μιχθέντα, &c. hoc est, *Imposuimus etiam quandoque & foliorum succum cum aceto & melle ipsum æquemus, (erat autem succus ad utrumque quintuplus) sicque insigne medicamen ad ea omnia quæ citra morsum malignum exiguri possunt, aut vulnera omnia magna.* Hunc secutus Aëtius, lib. 1. scribit in hæc verba. ἀναδίδωσι δὲ καὶ τὸ φύλλον χλιὸν, ἐγχριόμενον σὺν ὄξει ἢ μέλιτι μίσχει σκολύμου ὑγροῦ, βάλλοντες τῆς μὲν χυλοῦ μέρη πέντε, μέλιτος δὲ καὶ ὄξους ἀνὰ μέρος ἓν· &c. Sed & Dioscor. lib. 1. *Ἰάσεις*. cap. 183. quo loco hoc idē remedium iisdem propè verbis repetit, sic habet: καὶ αὐτὸς ὁ (σκόλυ) χυλὸς ἐγχριόμενος ἐν χαλκῷ σὺν ὄξει καὶ μέλιτι καὶ ὄξει, ἕλκεσιν ἐκκόπτει ὑγρὰ γίνεται, hoc est, *Quin & lilij foliorum succus in ære mixtus cum aceto & melle vlcus, præstantissimum existit medicamentum liquidum, quo imbuuntur conserta linamenta, quæ deinde ulceribus induntur.* Paulus lib. 7. de Lilio agēs, compositæ vocis vsus est, his verbis: ὁ δὲ χυλὸς αὐτοῦ καὶ περιχύσεις αὐτὸν σὺν ὄξυμέλιτι. *Liliorum succus succidaneis vicibus prodest cum oxymelite.* Cæterùm καὶ τὸ, ὑγρὰν, in contextu, lege ὑγρὸν: atque eò spectat illud Aëtij, loco citato, μίσχει σκολύμου μᾶλλον ὑγροῦ, id est, *ad mollis liquidiorisve consistentiam.*

πυρουῖτιν δ' ἢ λεύκιον γινόμενον] Id fortassis innuere voluit Dioscorides, quod & Plin. lib. 21. cap. 9. dum arte tingendorum Liliorum rationem tradit, vt deinde purpurea nascantur. *Mirum verò*, inquit ille, *ut tinga aliquid, ut nascatur infectū.* Porrò pro, ἀφορμὴ, quod statim sequitur in Dioscoridis contextu, lego, ἀφύσιμα. Est enim euidēs τὸ ἀφορμὴ καὶ τὸ ἀφυσικὸ discrimen.

CAP. CXVII. καὶ προσφύσεως] Κ μάλιστα addidimus ex Oribasio & vetusto Lacunæ codice. Nigrior etiam adijcit Plinius, libro 27. cap. 8. *Balloten alio nomine*, inquit, *melampyrum Græci nomine, herbam fruticosam, angulosis caulibus, nigra, hirsuta, foliis nectentibus maioribus quam porri & nigrioribus, granoc'enabus.* Verùm eo loco Plinius vocis similitudine aut corrupti codicis vitio deceptus, σκόροδον, quòd est *marrubium*; in σκόλυμον, quod est, *porrum*, cōmutauit: vti & cùm de Stachy agit lib. 24. cap. 15. Stachyn enim, quam Dioscor. & Gal. marrubio similem esse agnoscūt, porri similitudinem habere tradit. Sed eundem quoque Plinij lapsum in hormino deprehēdes.

ἀδένιτιν κάνιτις] Lego λευκὴ, vt ad præcedens ἄνηθον referatur. Nā quod ad caules spectat, iam in principio capitis Autor hīgricantes eos esse admonuit.

CAP. CXVIII. ὁ ὅμοιος μελίττῃ κεφαλῇ] Eodem ferunto nominis etymo, Plinius etiam melittida nominat. lib. 21. cap. 20. *Melissophyllo*, inquit, *siue melande si pernoctauit alueatia, non fugent apes.* Nicander in Theriacis etiam μελιτοφυλλον appellat, quo loco sic habet:

τοῖόν τοι μελίφυλλον ὀλωιτόκιον βοτάνης,
αἰ δὲ μελίσσαισιν. τῆς γὰρ ἀπὸ φύλλα μέλισσαι
ἑδμὴν πλησάμεναι μέλιτος ῥοιζηδὸν ἴασιν. Sic Virg. 4. Georg. per syncopen dixit:

Tritis melyphylla & cerinthe ignobile gramen.

Sed illud ab Apiastro perperam distinguere videtur Plin. lib. 21. cap. 12. quo loco, ceu diuersa, Melissophyllon & Apiastrum circum apum aluearia serenda esse scribit.

ὄζουσι δὲ κεφαλαὶ] Cum legeretur in impressis vulg. cod. κεφαλαὶ, legēdum censui, κεφάλαι, vel etiam κεφάλαιαι: nam ὄζειν cū vtroque casu rectè iungitur. Anteà lib. 1. malum eiusmodi citrium vocarat, κιδρόμηλον, nisi fortè eo loco vitium fuit librariorum.

τῶν ἰσχυρῶν μονάνων στραγγάλους] *Melissophyllon præstantissimum esse contra vulnerum strangulationes, addit mox*, scribit Plinius, lib. 21. cap. 20. quo quidem loco fortasse *fungorum strangulationes* legi oportet, quantum ex hoc Dioscor. contextu licet colligere.

CAP. CXIX. δεινὸν, ἕλκεσιν] Sunt qui ῥύπιον legant: sed ἰώδη potiùs meo iudicio legendum foret, hoc est, *rugosum*.

στυφοῦς ἕλκεσι] Lege, ἕλκη, quia vocem hanc referri par est ad superius illud, τὸ φύλλον: nisi mauis, ἕλκεσι, legere, cuius oppositū, ἕλκεσι, habuimus in præcedenti capite.

CAP. CXX. Λεύκη, λευκὴ] Plinius, lib. 24. cap. 15. Stachyos folia, quæ hic cādida describuntur à Dioscoride, *olorea* ait esse *in lineum modum*. Ibidem, vt sæpenumerò aliàs, fallitur vocum σκόροδον & σκο-

σίου similitudine deceptus, dum Stachyn porri similitudinem habere scribit: quod & iam antè annotauimus.

CAP. CXXI. ἡ δὲ σίμωνος ἐγχωμιάζουσα] Lego, ἐγχωμιάζουσι, vt ad proximum, φύλλα, referatur: maximè cum Phyllitidis sola folia sint in vsu.

CAP. CXXII. οἱ δὲ φάλαγγιον] Malim φαλάγγιον vel φαλάγγιον. Ita enim nominat Gal. 8. simpl. quo loco, φαλάγγιον, inquit, ὅτινες ὀνομάζουσι, οἱ δ' ἕνεκεν τοῦ ἔχειν φάλαγγιον ὀνομάζουσι. hoc est, *Phalangium ex eo nomen sortitum est, quòd à phalangio demorsis opituletur:* quod ipsum totidem ferè verbis repetit Paulus AEgineta. Sic & Plin. lib. 27. cap. 12. *Phalangium à quibusdam phalangon vocatur, ab aliis leucanthemon, aut* (vt in quibusdam exemplaribus inuenio) *leucanthe*, &c.

κάρφει δὲ μικρῷ] Lego, πάνυ: quod enim paulò pòst dicitur, quàm lentis dimidiæ gracilius esse, crassitudini non bene respõdet. Huc adde quòd & Plinius ita legisse videtur. Nam loco modò citato, *Phalangium* scribit esse *semine nigro, lato, ad lenticulæ dimidiæ figuram, multò tenuiore.*

ὅταν γὰρ σπάλλωνται] Dalechampius vir doctiss. legit, vt audio, ἀναλλάττωνται. Verùm nihil immutandum censui, quanuis, dum tẽporis lapsu contrahitur corrugatúrve radix, verisimile quoque est, si anteà fuerit viridis herbaceæ coloris aut pallida, ex consequenti colorem quodammodo immutari.

CAP. CXXIII. οἱ δὲ ἐξόφυλλοι] Plinius tria facit Trifolij genera, ac suis singula quæque distinguit nõminibus, lib. 21. cap. 9. his verbis: *Folio ornatur & Trifolium: tria sunt genera. Minyanthes nomine Græci, alij asphaltion, minore folio, quo unctur unguentarij: alterum acutum, oxytriphyllon: tertium ex omnibus minutissimum.* At Galenus, lib. 8. simpl. æquè ac noster Dioscorides, vni & eidem plantæ diuersa illa tribuit nomina. τρίφυλλον, inquit ille, οἱ δὲ ἀσφάλιον, οἱ δὲ ἐξύφυλλον, ἔστιν δὲ μικρὸν τοῦ σίου τὸ φυτὸν, οἱ δὲ κνίδιον ὀνομάζουσιν. ὅτου μὲν οὖν συμβεβηκότος τοῦτο τὸ ὄνομα τοῦτο ἔσχεν, οὐκ ἔχω λέγειν. hoc est, *Trifolium quidam asphaltium seu bituminosum, quidam oxyphyllum nominant, nonnulli minyanthes: sunt & qui cnicum vocent. tria quidem primo nomina ab ijs quæ frutici accidunt: reliqua duo, haud scio quæ ex causa.* Quanquam Cnicium dictum nos existimamus, quod, teste eodem Gal. lib. de ther. ad Pis. semen agresti cnico simile gerat. μικρὸν verò ἀπὸ τοῦ μείονος, ὅσον ἐπὶ μικρὸν ἡ θερμότης, καὶ ἡ ὥρα, deducto vocabulo, quòd vel exiguus huic Trifolio sit flos, vel breuis durationis, aut etiã ἀπὸ τοῦ μείονος, ὅσον πάλαι, quòd flos ille ad minij colorem accedat. Quòd si cui scriptura altera magis probatur, μινυάνθης dici potuit ἀπὸ τοῦ μινύου, τοῦ ὠχροῦ ὄντος ἀνθους, quia vel flore suo sese prodat, vel ipsum statim initio veris ostẽdat. Sed vt ad rem: Columella quoque grauis autor Simonianum Trifolium cum asphaltio, ab odore graui neque bitumini absimili ita dicto, & acuto Trifolio propter figuram ita vocato, idem omnino facit, lib. 6. de re rust. cap. 17. Cæterùm siue hîc ἐξύφυλλον legas, vti & habetur apud Galenum, siue ὀξυτρίφυλλον, velut apud AEgineta, Plinium & Scribonium Largum, parum interest.

Had. Iunio Scio mendosum legi placere.

μικρὸν, χαμαίζηλον] Lego, χαμαίζηλον: sed nolim sublata distinctione vocem eam cum proximè sequenti, προσφυές, iũgere, vti Marcellus faciendum censuit.

φύλλα ὅμοια λωτῷ τῷ κήπῳ] Hanc herbam Galenus, lib. de Ther. ad Pis. scribit, ὑακίνθου ὁμοιοῦσθαι, ἐπίσημον τῷ ἄνθει γενόμενον ἤδη τότε. Verùm quænam est, quæso, huic Trifolio cum hyacintho similitudo, nisi forte in floribus? & tamen tùm demum hyacintho simile esse eo loco scribitur à Gal. cùm verno tempore semine prægnat. Quamobrem cõijcio apud Gal. potius legẽdum, κατάγειν ὀσμὴν ὁμοίαν, hoc est, *bitumen præsefert*, nempe odore. Nam & idipsum innuit Dioscorides æquè ac Nicander: nonnisi cum adoleuerit, bitumen redolere. Porrò Marcellus non loto arbori, sed loto pratensi potiùs hoc Trifolium assimilandũ suspicatur. Ac reuera Nicander λωτῷ simpliciter Trifolij huius folia comparat: quod quidẽ dubitandi ansam non mediocrem illi præbuisse videtur. Sic enim Nicander in Theriacis, de hoc τελεσφόρῳ agens (ita enim nominat, aliusque μονανδρίς, alius φερέσπονδον dictum admonet: quem in locum Scholiastes Dionysio ὁ ἐν τοῖς ῥιζοτομικοῖς, μονανδρὶς, Callimacho verò φερέσπονδον dictum annotat.)

χαίτῃσι μὲν λωτῷ, ἑοικὼς γε μὰν ἄνθεσιν ὕδρῃ
ἔστιν ὅτ' αἰθὴρ πάσσῃ δ' ἀνθέλικα πετήλῃ
εἴδεϊ τ' ἀσφάλῳ ἀπομοιοῦται, &c. quæ sic elegantèr vertit Io. Gorræus:

Crine refert lotum, rutæque effundit odorem,
Cum nec adhuc flores, foliúmque decora
Exulit, asphalto flagrat grauis.

Sed & ipse quoque αὐτὸ τὸ λωτῷ τῷ κήπῳ, lubenter restituissem λωτῷ τῷ ὑμέρῳ, nisi aliquoties Trifolij huius folia animaduertissem, saltem ea quæ in cacumine cernuntur, non malè suo acumine ac reliqua quoque figura loti arboris folia referre: at non item ternorum foliorum consociatione: quod etiam minimè voluisse Dioscoridem liquidò constat. Scribonius, Largus cap. 163. *Trifolium acutum* facit *folijs & specie & numero simile cõmuni trifolio, nisi quòd huius plenora sunt, & quasi lanuginem quandam super se habent, & in extremis parua uelut aculeum emittunt. Sed huius frutex*, inquit, *duorum pedum interdum, aut etiam amplior conspicitur, & odorem grauem emittit: quorum nihil arua prætense trifolium inueniunt.* Hæc ille. Columella verò, de re rust. lib. 6. cap. 17. ipsum ita describit, Simonianum Trifolium appellans, ducto fortasse cognomine à Simo illo Medico, cuius mẽtio fit apud Plinium, quo loco de eodem hoc Trifolio agitur: *Inueniuntur*, inquit, *confragosis locis, odoris grauis, neque absimilis bitumini & acuto. Græci ἀσφάλιον appellant: nostri autem propter figuram nomine trifolium. Nam longis & hirsutis foliis stirpi, aculeumque robustiorem fundit quàm pratense.*

ἄκρον ὑπαίθριον ἔχον] Hunc apicem seu aculeum non semini, sed folijs tribuere videtur Scribonius, loco antè citato.

ἔλασσον τοῦ πόαιου] Lege ἔλαιον: deincepa enim seipsum Autor explicare videtur.

καὶ ἔπειτα ἔλασσον ἔχειν] Cornarius censet interserendam negationem, μὴ, vt legatur, ἔλασσον μὴ ἔχειν. Quin & ita sensisse videtur Gal. lib. de ther. ad Pis. his verbis: τὸ τρίφυλλον ἐπὶ τῶν ἀσφαλίων τινῶν, οὐκ ἔστι τοῦ δίγλωσσον τοῦ φαλαγγίου ἐλάττων, οὐδὲ ἐπιπλατύνεται τοσοῦτον, οὐδὲ ἐπὶ δύο ἐπιπλατύνεται ἐγγίζουσι. οἱ δὲ ἐν ἄλλοις μὲν διδυμόφυλλον τὸν ἐγγὺς ἔχοντα τοῦ εἴκοσι ἐπιπλατύνεται

κεκινημένων, τοῦ αὐτὸν ἕλκειν καὶ τοῦ αὐτοῦ ἐθίσαι ἑκάστους τῶν διδυμίων τοῖς ἑαυτῶν ἴσοις, &c. hoc est, vti nos conuertimus, *Trifolium si quis plurimum discoxerit, dein locum à phalangio aut vipera commorsum eius decocto fouerit, malo remedium afferet, atque illico dolorem sinet. Si uerò in alio quopiam minimè demorso locum sanum eodē illo decocto fouerit, parem doloris sensum pariáque omnia excitabit in eo symptomata, atque solent esse quibus demorsus infestatur.* Verùm aliud quiddam proculdubiò videtur voluisse Dioscorides, quàm verba illa Galeni prima fronte significēt. Vult enim Autor eandem illam aquam decoctam, quæ priùs affusa fuerit à serpente percusso, si alteri, cui ex quacunque alia causa vlcerata sit cutis, admoueatur, eundem doloris sensum inferre, quem percipiebat à serpente percussus. Plinius aliter censet, lib. 21. cap. 21. Postquam enim minyanthes Trifolium scripsit celebratis Autoribus tradi pro Antidoto contra venena omnia, aliáque non pauca in remedijs eius ascribi: *Me, inquit, cōtra sententias eorū grauissimi uri auctoritas mouet. Sophocles enim poēta venenatū id dicit. Simus quoq; Medicus decoctū aut contritū succum infusum corpori, easdem uredines fuare, quas sentiunt percussi à serpente* [vel, *quæ fiunt percussis à serpente*: alterutro enim modo legēdum, si quid rectè iudico.] *Ergo non aliter accipiendum eo, quàm contra uenena accepimus: fortassis enim & his uenenis inter se contraria sit natura, sicuti multis aliis.* Hactenus Plinius. Sed tum Sophoclis illud, tum & quod in eandem sententiam Simus ille Medicus in medium protulit, de Trifolij succo accipi debere indubitatū est, qui venenato ictui morsuíve priùs adhibitus fuerit, indéque parem veneni labem contraxerit: quod & ipsum Dioscor. & Galen expressa verba testantur.

μίγνυται καὶ αὐτῆς] Supplendum, *βοτάνης*, aut potiùs legendum. *αὐτῆ*, vel, *αὐτῇ*.

CAP. CXXIIII. *μικρὰ ὡς πολλαὶ τοιαῦται*] Non quidem capitula sola Polij, sed & ipsa folia canis hominum similia describit Plinius, lib. 21. cap. 7. quo tamen loco Polium cum Tripolio Dioscor. confundere manifestò deprehenditur.

βαρυόδμου μυκὶ πολὺς λευκὰς] *λευκὰς* itidem legunt Oribasius atque Serapio. At Lacuna in antiquo quodam exemplari, *λευκάνας*, quæ vox *fœtorem* significat, legisse se asserit. Ac certè quidē Nicander in Theriac. odorem Polio grauem simul ac tetrum tribuere videtur, hisce verbis:

ἢ πόλιον βαρυόδμοιο, ὃ δὴ μάγιστον ὀδώδει, hoc est, *aut Polium graueolens, quod perquam tetrum expirat odorem.* nisi fortè (quæ mea est sententia) legendum potiùs est, *ἢ δὴ ἥδιστον ὀδώδει, quod suauissimè olet.* Porrò Scholiastes in eum locum annotat, Polium folio esse molliore & hirsutiore quàm thymi, radicē verò, lignosam. Atque illud ipsum est, quod de eo totidem ferè verbis refert Plin. lib. 21. cap. 20. *folia eius*, inquit, *thymo similia tradunt, nisi quod molliora sunt & lanatiore cuticle*, &c.

τὸ ὑπόζωμα πινόμενον] Quo ex liquore in singulis his affectibus propinari debeat, apertiùs definit Plinius, citato loco, hisce verbis: *Medici cum uino decoquunt recens uel aridum, illinúntque: uel splenetias propinant ex aceto, morbo regio in uino, & hydropicis accipientibus in uino decoctum.*

Τὸ δὲ τοῦ στομάχου] *Stomacho tamen inutile esse, atque eo implere, & aborsum fieri potu aliquis memorat*, vti Plinius ibidem admonet.

σφοδρὰν κολλᾷ] Galenus certius aliquid de hac glutinandi facultate statuit, idque adhibita distinctione: dum ita scribit, 8. simpl. καὶ χλωρὸν δὲ ὑπάρχον ἔν τισι τῶν μεγάλα σφόδρα καὶ μάλιστα τὰ δασυόδη ἄνθη ἔχει. ξηρὸν δὲ ἡδύοσμον, ἰάσιμα τὰ ἕλκη ἐπιτιθέμενον, καὶ μᾶλλον τὰ ἐν ἀρῷ τῶν μαστίγων. id est, *Polium etiamnum uiride magna uulnera glutinat, præsertimque species eius frutescas: aridum uerò cum fuerit, maligna ulcera sanat insperſum: & ad hoc efficacius id quod minus est.* Quo quidem loco perspicue satis Polij duo genera Galenus agnoscere videtur.

CAP. CXXV. *φύεται δὲ ἐφυτῶς πάντως*] In Scordij natalibus videtur à Dioscoride discrepare Plinius: quippe qui libro 25. cap. 6. prodiderit reperiri in Ponto, campis pinguibus humidíq;. At quidni etiam in montibus campi eiusmodi pingues humidíque reperientur, in quibus Scordium nasci possit?

ὁμοίαν χαμαιδρύι] Plinius ibidem Scordium describit, *magnitudine cubitali, quadrangulo caule, ramosum, quernæ similitudine, folijs lanuginosis.* Sed eo fortè, loco legendum, non, *quernæ*, sed, *querulæ*, quo quidem nomine non ineptè *χαμαίδρυν* designare potuit.

σφοδρὰν κολλᾷ] Gal. 8. simpl. Scordij viridis & ficci vires æquè ac polij. ita distinguit: καὶ μὴν τὰ μεγάλα σφόδρα χλωρὸν ὀδωδότα διάπυρα δὲ τὰ ῥύπια ἐκ καὶ εἰς ὑγιὲς ἄγει τὰ ἕλκη ξηρὸν ὀδωδός. Sic enim legendum ex Aëtio, non, ὀδωδότα. hoc est, *Viride quidem Scordium magna uulnera conglutinat illinum: sed aridum insperſum, sordida expurgat, maligna que ad cicatricem perducit.*

ἀναχεόμενον δὲ ὑπὸ τοῦ Πόντιον] Lege, ἀναχεόμενον. Addit Lacuna ex vet. cod. τὸ Λυδικὸν, εἶτα δὲ τὸ Πόντιον, &c. *Effusissimum*, inquàm, *Lydicum, deindéq; Pontium.* Galenus primo de Antid. Scordium præfert Creticum: at non improbat tamen quod in aliis regionibus reperitur.

CAP. CXXVI. *ὁ μὲν θῆλυς τοῦ ἄνθους τοῦ κύπρου*] Contrà habebatur in Paris. codice: ὁ μὲν θῆλυς τοῦ ἄνθους λευκὸς, ὁ δὲ ἄρρην τοῦ κύπρου, χλωρός. Sed vetus & Aldina lectio potior, quam nos secuti sumus. Sic & Plinius, libro 26. cap. 6. folia Bechij agnoscit *subalbida à terra, supernè pallida.* Ita enim χλωρὸν reddit, quæ nos *uirentia herbaceæ coloris* interpretari maluimus. Ex ijs porrò est Plinius, quos tum in in operis totius præfatione, tum & hoc loco reprehendit Dioscorides, vt qui falsò opinati sint, Bechium caule, floribus ac semine carere.

αὐτὸς ὠχρὸς] Quoniā Bechij flos luteo ac propemodū aureo fulget colore, ὠχρὸν, *ex luteo albicante* vertimus, non vt plerique, *pallidum*: quanquam & aurum Catullo pallidum dicitur. Enimuerò τὸ ὠχρὸν, Platone teste, ex albo & flauo colore conflatur.

ῥίζα λευκὴ, ἄχρως] Oribasius vocem, ἄχρως, prætermisit. Cornarius legit, ἄκρως, nec malè: nam & deinceps radicis vsus traditur minimè contemnēdus: neque is etiam à Galeno prætermissus est.

καὶ τοῦτον φλεγμονὰς ἰᾶται] Gal. 6. simpl. cap. de Bechio: τοῦ μὲν δὴ χλωροῦ φύλλα καὶ τὸ φλεγμαίνοντα μέρη ἐπιτιθέμενα σύνεστιν, ἔξωθεν κατασκευάζοντα, ἔξω τὰ ἔσω μεθιέντα τῆς ἰδιότητος ἐχόντως, ὡς ἄκρατα τοῦ χλωροῦ &

εἶναι, τὰ μὲν μᾶλλον, τὰ δ' ἧττον μανίκῃ. τὰ γὰρ ὧδε ξηρὰ φύματα τῆ βηχὶ, ἁρμόττει ἔστι, ἃ καὶ τὰ φλεγμαίνοντα, δυσίατος. hoc est, *folia aridæ partes phlegmone ægrè ad maturitatem perueniente obsessas adiuuant, sorus adhuc: nempe propter aqueæ humiditatis admixtionem: quæ quidem urentia teneraque omnia, alia magis, alia minùs, participant.* Nam aridæ Bechij *folia sunt acriora, quàm ut partibus inflammatis conueniant.* His verbis Dioſc. mentem Galenus aperuit.

ὑπὸ ξηρᾶς βηχός] Plin. lib. 16. cap. 6. *Tussilaginis aridæ cum radice fumus per harundinem haustus & deuoratus, ueterem sanare dicitur tussim: sed in singulos haustus passum gestandum est.* Veterem tussim dixit, quam Dioſc. ξηρὰν, id est, *aridam.*

Cap. CXXVII. αἱ ἄνθαι μὲν] Reliqui Interpretes, quantum video, flores hos tenuiori tantùm Artemisiæ à Dioſc. tribui existimarunt. At cùm Artemisia πολύκλωνος duplex statuatur Dioſcoridi, altera ἁπλῆς, hoc est, *crassa & uegeta*, altera tenuior, neque illę nisi florum virgultorúmque amplitudine aut tenuitate inter se differāt: equidem flores vtrique pares tribui facilè crediderim, quod & ipsa sermonis series satis per se significare videtur. Præter has verò etiam tertiam μονόκλωνον dictā deinceps describit Dioſc. quam perperàm Plinius, libro 25. cap. 7. cum ambrosia confundere videtur.

κιρνάμενα τῷ χυμῷ] Lego, κιρνάμενον: ad illud enim, οἶνος, referri debere mihi sit verisimile. Oribasius & Hermolaus, κιρνάμενα, hoc est, *ærugine*, legisse videntur.

πίνῃς ⟨ι.⟩] Plinius, lib. 26. cap. vlt. drachmā vnicam desiderare videtur: *Folia*, inquit, *potæ drachmæ, ad eadem omnia prosunt, uel impositi uētriculo cum farina hordeacea.*

Cap. CXXVIII. Ἀρτεμισίης κεφάλαιον] Meritò à viris doctis. Cordo, Trago, Marcello, Cornario & aliis propè omnibus, caput hoc, tanquam spurium & ascititium, à Dioſc. contextu expungitur: cùm neque in vetustis exemplaribus reperiatur, neque vllo modo Dioſc. phrasin redoleat. Adde quòd de eadem Artemisia ipsiúsq; viribus præcedenti capite iam coniunctim egisse Dioſcoridem vnicuique constat. Interim quæ isto capite continentur, totidem ferè verbis reperias apud Apuleium, cap. de Artemisia tenuifolia: vbi & aliæ eiusdem Artemisiæ vires commemorantur.

Cap. CXXIX. σικύδιος, ἰόδης] Aptiùs legas, ἰόδης. ad illud enim, ὄμφακος, referri oportet.

κατακαυμάτων εἴρεται.] In vulg. exempl. legebatur perperàm, καταπλασμάτων. Plin. lib. 27. cap. 4. Ambrosiæ discutiendi vim, non item reprimendi, tribuere videtur, hisce verbis: *Vsus eius ad ea quæ discuti opus est.*

Cap. CXXX. ὑγιάνει αἱμορροΐδας] *Ita Ambrosia magni nominis est, & aliæ aliàs herbæ fluctuati*, vt Plinij verbis vtar, lib. 27. cap. 4.

Cap. CXXXI. γεράνιον τὸ λεῖον] Præter ista duo Geranij genera, tertium quoddam tradidit Plinius ex Latinorum sententia, libro 26. cap. 11. *simile cicutæ, foliis minutioribus, & caule breuiore, rotundo, saporis & odoris iucundi.* Sed à recentioribus artis herbariæ Professoribus longè plura Geranij genera recensentur: necnon & ab iisdem alteri Geranio, cuius nullum vsum Medicum sua ętate agnouerat Dioſcorides, vires variæ ac multiplices assignantur.

Cap. CXXXII. πινὸν δὲ καὶ αὐτὸ ἄνθος] Vires alias Gnaphalij, præter eas quę hic à Dioſc. commemorantur, apud Plinium & Aëtium reperies.

Cap. CXXXIII. φύλλα ἔτινα] Theoph. lib. 4. cap. 11. folium illi denegare videtur, his verbis: ἰδίωμα δὲ τούτου τοῦ γένους, καὶ τὸ ἄφυλλον εἶναι. hoc est, *Typhæ id est maximè peculiare, quòd folio careat.* Sed eo loco clariss. vir D. Dalechampius, αὐτὸ τὸ, ἄφυλλον, ἀφυλλαῖς, legēdum rectè censuit. Folia siquidem habere Typham satis compertum est: at flos non est foliis reliquorum more stipatus: quod ἀφυλλαῖς voce designare voluit.

πολλοὶ λεῖοι, ὁμαλεῖς] Quotquot occurrerūt Interpretes, λεῖοι, prætereà legisse videtur. At eam vocem, aut aliam quæ illi respondeat, in Græcis exemplaribus minimè reperio, vti neque apud Oribasium. Porrò ὁμαλοῦ voce, æquabilem simul & enodem caulem significauit Dioſcorides. Nā & Theophr. hist. plant. lib. 1. cap. 8. scribit in hūc modum: τὰ δὲ τύφη καὶ ἴτεα καὶ ἑλείαι καὶ λιμναῖαι ὁμοίως αὐτοφυῆ καὶ ὁμαλῆ, καὶ ἀκανθώδη χωρίς. hoc est, *Typhæ & quædam palustria aut lacustria, similiter nullo nouæ dente modo æqualia sunt, nelutā iuncus.*

ἁρμοστικαί] *Gustus calidi*, reddidit Plinius, lib. 27. cap. 8. eúmque secutus est Hermolaus. At nos vtrum ad saporem, an verò ad facultatem ipsam vocem eam referri oporteat, in dubio relinquimus.

ἕνα μυεῖ δ'] Cornarius legit, ἕνα οἰνηρίαν δ'. quę nos eo lubentiùs secuti sumus, quòd & in radicis pondere Plinius à Dioſc. multùm euariat. Is enim, citato loco, scribit, *macerari oportere in sextarys tribus quadrantes radias contusæ noctem & diem.* Ac vt verè dicam quod sentio, maior videtur quatuor librarum quantitas, quàm vt earum infusum triduo propinari possit. Adde quòd tantam radicum molem vix tres vini sextarij capere possent, quin à radicibus vinum longè superaretur.

ἡ δὲ κιρκὶς γάλα κατακαῦ] Plinius contrà, eodem illo loco, *Semine*, inquit, *lac mouetur in uino aut aqua mulsa potum*: nisi fortè eo loco pro, *mouetur*, *mouentur*, restituendum est. AEgineta certè quidem de Circæa scribit inhunc modum: ὁ δὲ κιρκὶς σὺν ῥοφήματι πτισάνης, γάλα ἐξωθεῖ. *semen cum sorbitione ptisanæ, lac generat.* Sed & ipse Gal. Dioſcoridem citans, sic habet: κιρκαίας τὸν σπόρον τὸν μὲν ῥίζαν φασὶ Διοσκορίδης σὺν οἴνῳ γάλακτι πινομένην ὑγιάσαι ἀκαθαρσίαν, ὕσαν ἔλυσεν καὶ ἀποκαθαίρειν. (lege ἁρμοστικὴν.) τὸν δὲ κιρκὸν ἐν ῥοφήματι διδόναι, ὡς ῥᾶστον γάλακτος ἀναγωγόν. id est, *Circææ radicem scribit Dioſcorides in uino dulci potam nullam expurgare, cùm sit bene odorata & salfactoria: semen autem in sorbitione exhibitum, ad lactis generationem conferre.*

Cap. CXXXV. ἀμπέλου καὶ ἑτέρου.] Supplemus cū Lacuna ex veteri codice, καὶ ἑτέρου & reguum morbum. Paulus quoque, posteaquàm de œnanthe, hoc est, labruscæ flore, paucis, vt solet, egit, de OEnanthe herba, Dioſc. verba citans, scribit in hunc modum: ὁ δὲ Διοσκορίδης ἑτέραν ἀμπέλου ἔφατο, ἀγρίαν τινὰ δυναμένην ἔχουσαν· ὅθεν δὴ καὶ φησὶν ἐκβάλλειν κύστεις, καὶ πυελονέφρους καὶ ἤπατος πάθη. hoc est, *At Dioſcorides alteram describit uitis siluestris facultatem prædictam: unde & ipsam secundas pel-*

lere dicit & ſtranguria vtique morbo mederi.

CAP. CXXXVI. ἡ ὑπὲρ μικρὰ καλή] Theoph. 6. hiſt. plant. cap. 7. Itémque Plinius, lib. 21. cap. 11. priora hæc genera Conyzæ (quam à necandis pulicibus *pulicariam* vertit Gaza) etiam deſcribunt: minorémque ac tenuiorem, fœminam: maiorem, marem appellant: neque aliam vtriuſque, quàm in folio, differentiam agnoſunt. Sed Plinius locis pluribus eundem cũ Conyza cõfundere deprehenditur: quo tamen nomine aliàs thymbram, aliàs origani ſpecies varias deſignare videtur.

CAP. CXXXVII. ταὐτὸ μάλιστα, ὁ ἔλεγον πρότερον] In huius radicis vſu mentem Dioſcor. non ſatis expreſſit Plinius, dum ſic habet, lib. 21. cap. 21. *Hemerocallis radix cum melle impoſita venerem, aquam pellit & ſanguinem etiam inutilem.* Nam φαρμακὰ apud Medicos dicuntur quæ peſſi modo ſubduntur induntúrve naturalibus, non item quæ ventri imponuntur. Plinius alibi ferè *apponi* reddidit.

ἐκκαθαίρουσα] *quippe cùm ea radix*, inquit Gal. 6. ſimpl. *leniter digerat ac diſcutiat, ſimulque mamillæ repellentis ſiculnas obtineat.*

CAP. CXXXVIII. ἡ μάλιστος, ἡ ἀνθοῦσα] Iſta verba, ἡ ἀνθοῦσα, in Leucoio redundare exiſtimat Marcellus. Sed neque apud Oribaſium & Serapionem quicquam habetur, quod iis reſpõdeat. Quin & Plinius nullam cæruleæ violæ mentionem facit, lib. 21. cap. 6. quo loco ſic habet: Violarum plura genera: purpureæ, luteæ, albæ: attamen deinde cap. 19. violam Martiam, pro Viola purpurea videtur accipere: manifeſto errore. Cæterùm dum ῥίζαν δὲ μάλιστος λευκοίου vſurpat Hipp. lib. de nat. muliebri, μάλιστος nomine purpureum haud dubiè deſignat. Sic & ἰὸν μαλακὸν ſeu μαλάκιον Theophraſto dicitur, viola Martia, à nigricantis purpuræ flore.

οὐ δὲ αὐξηρὰ] Sic & Galen. lib. 7. ſimpl. Leucoij flores ſicciores potiùs, quàm recentes deſiderat. Rationem reddit Plinius, lib. 21. ca. 19. hiſce verbis: *Minor vis eſt recentibus, ideoque aridis poſt annum utendum.*

καὶ ἄλλοι ὑπὲρ φλεγμονῆς] Scilicet virium floris vehementia, admiſta aqua ita retũditur & mitigatur, inquit Gal. loco citato, vt ad inflammationes fiat vtile medicamentum.

καὶ δὲ μάλιστα ἕλκη] Idem habet Gal. Plinius verò non oris, ſed capitis vlcera intellexit, lib. 21. cap. 19. Adde quòd foliis tribuit, quod Dioſc. & Gal. floribus. Sic enim ille: *folia cum melle purgant capitis ulcera: cum aceto, vimas ſedis & quæ in humidis ſunt.*

CAP. CXXXIX. οἱ δὲ κεφαλλήνιον] Hoc κεφαλλήνιον, ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ἢ γνώμης ita dictũ. Theoph. lib. 9. hiſt. plant. cap. 19. κεφάλιον (niſi quis error ſubeſt) nominat, & φυλλὰ ſcribit, ὅμοια λίνου πέλεκυν, naſci inſtar *lini ſtriatim*. quibus vocibus haud ſcio vtrũ μαλάκιον deſignare voluerit, quòd illi folia ſint lini æmula, an verò pro iis μαλάκιον ſit reſtituẽdum. Plinius autem, lib. 27. cap. 8. *Crataegonum ſpica ſtriata ſimile fiat*: quod dum ſcriberet, fortaſſe cum ſpica tritticea non quidem ipſius folia, ſed culmorum cacumina, cõferre fuit in animo.

ἰσχυρὸς δὲ πρὸς] *vehementer aſperum guſtu*, dixit Plinius. Gal. verò Dioſc. ſecutus, 6 ſimplicium: Κεφαλλήνιον, inquit, τὴν πᾶσαν ἡ κάρπος καὶ δριμὺς γλυκὺς μέτριος δὲ καὶ ὑγρὸς χυμὸς, λίγχου δὲ κεφαλλήνιος, id eſt, *Crataegoni herbæ ſemen guſtantibus acre eſt, & vehementer quidem iis qui eo vtuntur, multo ſimile.* quaſi velit, ſi quis tantum deguſtet, acre percipi: & vehementer acre, ſi quis non guſtet modò, ſed etiam vtatur. Oribaſius habet tantummodò, δριμὺς γλυκάζοντος δὲ καὶ ὑγροῦ ſapore idem acre ac vehemens eſſe innuens. Pro his perperam apud Paulum habetur de eodem ſemine, καὶ δριμὺς γλυκάζοντος δὲ καὶ ὑγροῦ, καὶ λίγχου κεφαλλήνιος, hoc eſt, *& acre guſtantibus eſt & frigidum, multo ſimile.*

CAP. CXL. κίσσηρι βρύον, ἔχει &c.] Etſi deſcriptio vtriuſque Phylli apud Theoph. lib. 9. c. 19. ex nonnullorum ſententia mercuriali tum maritum fœminæ aptiùs conuenire videtur, quàm Dioſc. Phyllo, attamen ex illius verbis hunc ipſum Dioſc. locum manifeſtò deprauatiſſimum ita reſtituendum cenſemus, dum certiùs quid alius quiſpiam in medium protulerit: κίσσηρι βρύον ἔχει ἐχέτριον ἐλαίας, ᾧ ὁ φύλλος χλωρότερος, καυλὸς &c. Nos verò hîc inter vertendum βρύον Græcam vocem retinere maluimus, quàm inepte muſcum interpretari, ſicuti fecit Gaza variis apud Theophraſtũ locis: cùm tamen βρύον, de quo hoc loco & apud Theoph. ſæpiùs agitur, nihil habeat cum muſco commune. Neque enim dubiũ eſt, quin (quod accuratè obſeruauit doctiſſ. Scaliger) βρύον inter cætera etiam ſignificet, non verum quidem arborum quarundam florem, ſed quiddam quod illi proportione reſpondeat, illiúſq; vicem impleat: quale in ficu, olea & quercu conſpicitur.

ἐξ ὧν φύλλα ἐλαίας ὁμοιοῦται] rectiùs fortaſſe, ὁμοιοῦνται, ſcilicet, καρπός. Sed & hunc locum ita reſtituere viſum eſt: ἔχει δ' ὅμοιον καὶ τῷ ἐξ ὧν φύλλα ἐλαίας ὁμοιοῦνται. Nam ſi vulgatam lectionem retineamus, durius fortaſſe videatur ὅμοιος accipere, pro eo quod flori ſuccedit, nimirum incipientis oliuæ rudimento. Vbi enim, quæſo, florem in olea quæras, ſi iam ſponte deciderit? Porrò neutrius φύλλου Galenum, Paulum, Aëtium, Oribaſium, & Serapionẽ vſpiam meminiſſe valde miramur: etſi, manente integra noſtra Dioſcoridei contextus emendatione, φύλλου vtrunque Dioſc. nullis refragantibus notis id eſſe iure optimo contenderimus, quod Phylli nomine nobis non ſemel à piæ memoriæ Præceptoribus Rondeletio & Aſſatio in Monſpelienſi agro demonſtratum eſt.

CAP. CXLI. ἐλαία μαλακὴ ὁμοία] Theophr. lib. 9. hiſt. plant. cap. 19. ὄγχνης folium deſcribit, παραπλήσιον δὲ καὶ ἐλαίου. hoc eſt, *quale laſerpitij, ac lauus & mannæ.* At eo loco legẽdum haud dubiè, σκινδάλμου. Siquidem & ipſe Plinius de Orchide agens, lib. 26. cap. 10. *Quidam*, inquit, *folio ſcillæ eſſe dicunt, ſatyrio ac mannæ, caule ſpinoſo*: in quo & ipſe fortaſſe deceptus vocis ὁμωνυμίᾳ labitur. Cùm enim alicubi legiſſet, καυλὸν ἄκανθωδη, *caulem ſpinoſum* vertit, rectiùs, ni fallor, dicturus, *acantho ſimilẽ*: quippe cùm ſit Orchidi caulis cum florum nucamento, qualis acantho. Sed vt ad rem: Idẽ ipſe Plinius haud ita multò pòſt, Satyrium prius nullo pacto diſtans à Dioſc. cynoſorchide dum deſcribit. illud ait eſſe *longioribus foliis, quàm oleæ, caule quatuor digitorum.* Rurſúmque apertiùs, lib. 27. ca. 8. *Cynoſorchon*, inquit, *aliqui Orchin nomine, folijs oleæ mollibus, nemine* &c.

Ita variæ ſunt diſcrepantéſque ὄρχεων deſcriptiones, quæ tamen hoc loco nimia ſcholorum quorundam temeritate videntur in vnum coaluiſſe. Sed vt ei vitio medicinam aliquam ſalutarem afferamus, ita legere placet: σκληρὸν μαλακὸν ὁμοίως, στρογγύλον δὲ καὶ λεῖον. Vel potiùs, vt ſit lectoribus optio: μαλακὸν, ὑγρὸν ὁμοίως, μακρόγλωχ &c.

καὶ τοῦτο μὲν πάχυν] Legit Lacuna ex vetuſto codice, καὶ τοῦτο μὲν σκληρὸν, τοῦτο δὲ μαλακώτερον καὶ ῥυσόν. hoc eſt, *& hanc quidem duram, illam uerò mollioremque & rugoſam.* Ego verò legere malim hunc in modum, καὶ τοῦτο μὲν πάχυν καὶ μαλακὸν· τοῦτο δὲ σκληρὸν καὶ ῥυσόν. Nāq; & ita Plinius, nuperrimè citato loco: *radix obłõga, duplici ordine, ſuperiore quæ durior eſt, & inferiore, quæ mollior.* Neque verò dubium eſt, quin maior radicis bulbus, qui idem demiſſior eſt, ſuccoſior ſit atque adeò mollior ac tenerior: qua etiam ratione ἁπαλὸν deinde Dioſc. dicitur: minor verò, qui ſublimior, tanquam flaccidus ac rugoſus, durior & aridior. Siquidem mollia ferè ſunt, quæ humidiora: & è contra dura, quæ ſicciora. Quòd ſi cui placet vulgatam lectionem retinere, neceſſe eſt μαλακὸν hoc loco pro *flaccido* accipiat.

τὸν μὲν ἁπαλὸν] Enallage generis: ea enim vox per σύνεσιν ad ὄρχιν aut βολβὸν referenda. Porrò effectus huiuſce, qui hoc loco à Dioſc. commemoratur, cauſam hanc affert Galenus, 8. ſimpl. quòd maior bulbus copioſam humiditatem excrementitiam flatuoſámque obtineat: minor contrà vſque adeò elaboratus ſit, vt ipſius temperamentum ad calidius ſicciúſque deuergat. Ita fit, opinor, vt quanuis geminæ radicis vtrique bulbo idem ſit ſubſtantiæ modus, idémque ſapor, maior tamen craſſa flatuoſáque ſui ſubſtantia flatus excitet: minor verò, aridiore illo & macilento ſuo corpore humorem exiccet, à quo flatus excitatur, qui ſalaces facere conſueuit. Cæterùm niſi me moueret Galeni & Plinij autoritas, illa de eodem bulbo recente & ſicco à Dioſc. recitari facilè crederem, quo modo & Serapio verba Dioſc. accepiſſe videtur.

Cap. CXLII. ἐνιοῦσιν δὲ καὶ οἱ βολβοὶ] Hunc tamen ὄρχιν παχυτάτην, quem etiam νεόρχιν appellant Paulus & Aëtius, ait Galenus, quia antedicto ſiccior ſit, ad ſtimulandos coitus non eſſe perinde accommodatum.

Cap. CXLIII. ῥίζαι βοτρυώδεις] Hanc radicem Plinius, lib. 26. cap. 10. ex Græcorum ſententia *geminam* ait eſſe, *cuius inferior pars & maior, mares gignat: ſuperior & minor, fœminas.* Sed vereor, ne hac in parte Satyrium cum Orchide confuderit.

Cap. CXLIIII. σπέρμα λιτοσπέρμῳ ὁμοιότατον] *Aliud genus Satyrij erythronium uocant*, inquit eodē loco Plinius, *ſemine uiticis, maiore, læui, duræ radicis tortæ rubro*: quibus verbis, aliter atque Dioſc. ſemen viticis Erythronio tribuit. Sed & in corticis colore ab eodem illo nonnihil diſcrepat.

Cap. CXLV. ὅρμινον ἄγριον] Quoniam excepto ſemine reliqua deſcriptio vtrique tam ſylueſtri quàm ſatiuo Hormino conuenire videtur, ἀγρίου vocem à Dioſc. contextu expungendam exiſtimauerim, vt & ab ipſa capitis inſcriptione: cùm hoc vno eodémque capite de vtroque Hormino palàm agatur.

πρὸς τοῖς διαιτητικοῖς φαύλ.] Plin. lib. 22. cap. 25. aliter ac Dioſc. alterius nimirum ſylueſtris Horminī ſemē candidius eſſe dixit, quod hic Dioſc. φαύλ. i. *fuſcum*. Attamen & illud tolerari poteſt, quoniam fuſcum nigro comparatū, etiam candidius eſſe cōſtat. Satiui autem Horminī ſemen κυμινώδης, hoc eſt, *cumino ſimile*, faciunt Theoph. atque Plinius, ipſúmque inter fruges cereales enumerant: quemadmodum & ipſe Gal. in lib. de alim. fac. quo loco Horminum inter irionem & cuminum mediæ eſſe naturæ prodidit.

Cap. CXLVI. ἐν αἰγιλῶπι καὶ πυροῖς] Naſcitur & inter aphacam, vti ſcribit Theoph. 8. Itirpiū hiſt. lib. eámque etiamnum ſuo complexu necare dicitur, non item lentem, vti habetur apud Plin. lib. 18. cap. 17. cùm ἀνὰ τὰς ἀφάκας, φακὰς fortaſſe legiſſet. Lenti enim non Securidaca, ſed aparine ex ipſius Theoph. ſententia peſtilens eſſe fertur.

Cap. CXLVIII. ὁ αὐτὸς δὲ μηδ καὶ ὁ σπόρος] Quæ recitantur à Dioſcoride Nymphææ vires, radici tantùm ac ſemini tribuūtur: quippe quibus refrigerandi ſimul & exiccandi facultas eſt. At flos ipſáque folia humectandi refrigerandíq; vim habent, quod præter experientiam Arabum familia teſtatur.

ἐν Ἡλείᾳ διὰ τοῦ Ἀνίγρου] Amnis hic Anyger is eſt, qui Helidem regionem irrigat. Ille idem Μινύας, ac ipſi quoque Homero Μινύαι dicebatur, ἀπὸ τοῦ Μινύου, qui eò cum Chloride Neſtoris matre ex Orchomeno Minyæo venerant. Deinde verò Ἀμφιεῖς dici cœpit, ἀπὸ τοῦ ἀνῆχθαι λαοὺς εἰς Φωκέας ἐκεῖθεν, vti recitant Pauſanias & Strabo.

Cap. CL. πλὴν δὲ τῆς λευκῆς] Ἰασὶ τῶν, restituimus, λευκῆς, ex Oribaſio, itémque Plinio, qui lib. 27. cap. 4. de Androſace ſic habet: *Androſaces herba eſt alba, amara, ſine foliis, ſiliculas in ſpiris habens*, &c.

Cap. CLI. ἄκανθαι λευκαί, αἱ δὲ ἐκτελεῖαι] Aſplenū à Scolopēdrio diſtinxiſſe videtur Gal. lib. 15. ſimpl. cap. 12. dū remedia maioribus lienis obſtructionibus dicata recenſens, vtrunq; ſeorſim enumerat, ἄκανθαν τινὰ καὶ σκολοπένδριον. Verùm eo loco alterutrum redundare facilè crediderim: quoniā idē ipſe, locis aliis, & maximè lib. 9. de comp. med. τὸ τῶν ἡμιονίτιδος κόμας λεῖον ἢ σκολοπένδριον, nomina huic vni eidémque plātæ manifeſtò tribuit. Sed & Theophraſtus ἡμίονιτιν & σκολοπένδριον prima fronte diuerſa feciſſe cuipiam videbitur: quoniam lib. 9. cap. 19. τὴν ἡμίονιτιν, ſeu potiùs, τὸ ἡμιόνιτιν, ita dictum, quòd (quemadmodū ipſe teſtatur) eo muli delectentur, ſcribit ἡμιόνιτιν ἔχειν φύλλον σκολοπενδρίῳ. Veruntamen & eo loco legendū fortaſſe fuerit, vt hîc apud Dioſc. σκολοπένδρᾳ, vel etiam σκολοπένδρῳ. Nam & id animalculi genus vtroque modo apud Græcos effertur.

ῥύπτει ἐν τοίχοις ἢ πέτραις] Malim, ἐν πέτραις ἢ τοίχοις τοῖς ἐκ λιθολόγων. Nam vel inter ſaxa, vel in parietibus humidioribus, qui è calculis ſilicibúſve coagmentati ſint, ferè Aſplenon inuenitur. Ita verò parietes id genus diſtinguere voluit Autor, ab iis qui è ſolida ſtructura, nempe vel è quadrato lapide, vel è lateribus probè iunctis exiguntur.

Cap. CLIII. ῥίζα ἄκανθ πηχυαίου] Plinius, vt prius Anthyllium (ſic enim nominat) in ſabuloſis naſci prodidit, (quem nos in eo, vt & Dioſc. vetuſtum codicem ſecuti ſumus, quanuis vulgatæ lectioni aſtipuletur Auicenna, ſub finē lib. 2.)

ita & posterius addit, *in saxosis nascuntur.*

CAP. CLIIII. χρυζοῦσα αὐτὴ] Lego, ἔνδοθεν μὲν χρυζοῦσα, αὐτὴ δὲ ἔξωθεν ἐρεύθουσα) &c. At Theoph. lib. hist. 7. cap. 13. in anthemo, quod idē est cum Anthemide, τὸ ἀπὸ μέσου τοῦ αὐτοῦ χλωρὸν dixit, ea voce minime significans viride aut herbaceum, sed potiùs luteum: nisi forte de floris ima parte cōcepta culo proxima illud intellexit. Superiùs verò ἀσπίδ, κιτρίαν, lego cum Marcello, φωσφόρα. Nam & ita Serapio legisse mihi videtur: & ita legendum etiam ipsa contextus series per se satis indicat. Sed & inferiùs, pro eo quod est, πάζοντα δὲ, aptiùs legas mutato numero, πάζοντα δὲ.

συγκνέφαλα μετ' ἐλαίου] Cum Cornario viro doctiss. συγχύσεως, legendum censeo: nam & ita legisse Serapionē mihi sit verisimile. Sed & Chamæmelo, ad eum quem tradit Dioscor. modum in pastillos digesto, solitos perungi febricitantes ex Nechepsonis AEgyptij sententia docet Aëtius, cap. de Anthemide: quanquam & ipse non negat, etiam in potu febricitantibus exhiberi. Sunt autē hęc Aëtij verba: Νεχεψὼν δὲ ὁ Αἰγύπτιος παραλαβὼν αὐτὸ τὸ ἄνθος καθαρὸν τῆς χαμαιμήλου ἀκμαιότατον συλλεχθὲν, καὶ κοπὲν εἰς ὑγρὸν, ἵνα λεπτὸν ᾖ μᾶλλον καὶ ὑγρὸν, & διαπλάσσει ἐγχύτους σμικρὰς, καὶ ξηραίνει ἐν σκιᾷ ἀκριβῶς, & χαλάσας δηλονότι ἐγχύτου ἕνα, ἢ δύο ἐφθῷ ἐλαίῳ ἢ σφονδύλιον τὸ ἀρκεῖν, χρίει τὸ σῶμα ὑπὸ ἀφῆς ἄχρι πόδων ὅλου τοῦ πυρέσσοντος, &c. hoc est, *Nechepson autem AEgyptius purū Chamæmeli florem mœgram maturitatem assecutum colligi iubet. & in pila tundi ac exactissimè cōteri, atq; ex eo trochiscos mediocres formari, qui accuratissimè in umbra siccati reponantur. Vsus tempore unum ex ipsis teri oportet, oleo primario quantum satis sit affuso, indéque cutis febrientis corpus à capite ad pedes illinit*, &c. Huius quoque ipsius vsus Chamæmeli ad febres abigendas & ipse Galenus meminit, tertij simpl. cap. 9. Sed, quicquid censeant AEgyptij, eas potissimùm febres Chamæmeli perunctione sanari scribit, quæ citra viscera alicuius inflammationem infestāt, ac præsertim quæ ex humoribus bilios is aut cutis densitate proueniunt: quanquam & cæteris febrium generibus, si modo concoctæ fuerint, non parum conferre deinde fatetur.

CAP. CLV. Παρθένιον, οἱ δὲ ἀμάρακον] Sic Plinius, libro 21. capite 30. *Parthenium, alij leucanthemon, alij amaracum* (sic enim legendum ex Dioscor. & Gal. non, *tamnacum*) *vocant. Celsus apud nos perdicium & muralem herbam.* Sed eo loco nominis Parthenij ὁμωνυμία Plinium fefellit. Neq; enim Parthenion, de quo agit Celsus, libri 2. cap. 33. aliud est quàm helxine Græcorum, herba ab hoc Dioscoride Parthenio longe diuersa. Parthenij verò, nomine præter helxinen diuersas quoque alias plātas designari, (vt Dioscoridis & Plinij testimonia impręsentiarum omittam) vel ipse Galenus in vocum Hippocraticarum expositionibus docet apertissimè, videlicet anthemidem, mercurialem & amaracum. Cæterùm nostrum hoc Parthenium (siue sit matricaria vulgò dicta, vti voluēre Hermolaus, Matthiolus & Dodonæus, siue quæ vulgò Cotula fœtida vocatur, vti censent Amatus Lusitanus, Fuchsius & Pena, quibus ego lubenter assentior) amaraci nomine intelligitur apud Galenum, Paulum & Actiū, velut iam antehac in vnguento Amaracino annotauimus.

φασιήλου καὶ χαλβάνης] Suppleo, μίλτου, aut etiam adijcio: quādo & Serapio ita legisse videtur, nec absre quidē: quoniam cum epithymo confertur, cui vis est bilem atram detrahere. Huc adde quod Paulus, lib. 7. cap. 4. Itémque Auicenna, lib. 2. cap. 21. Parthenio vim bilis atræ deijciendę tribuunt. Sed & ipse Plin. lib. 21. cap. 30. de Parthenio herba agit in hæc verba: *Sitis cum melle & aceto pota*, (ita enim legendum, non, *imposita*) *bilem detrahit atram*, &c.

CAP. CLVI. ἐστὶ καὶ ἀνθέμιδος] Ita crisimo dictum βοῶφθαλμος, quòd flos ipsius maiorem oculum præ se ferat. Βοῦς etenim, & huic voci & similiter aliis plerisque in compositione additū, significationem augere nemo ignorat, præter eum qui Græcæ linguæ plane sit ignarus. Attamen Gal. 8. simplicium, Βοῶφθαλμος dictum putat, ὅτι τὸ αὐτὸν ἐοικὸς ἀνθεμίδι τῷ κατὰ τὸ μέσον βοὸς ὀφθαλμῷ. hoc est, *quòd flores figura boui oculum repræsentent.* Sic & Plin. lib. 25. cap. 8. *Ist & Euphthalmos similis boum oculo*, &c. Sed eo ipso loco, vti ex reliqua contextus serie facile est iudicare, è diuersis Bophthalmi & chrysanthemi descriptionibus vnicam videtur conflauisse Plinius, quasi vna eadémque herba foret, diuersis signata nominibus.

CAP. CLVII. βαμμίτιδι καρύᾳ ὁμοία] Plin. lib. 27. cap. 10. *folia Pæoniæ qualia Iſatu, pinguora rotundioraque & minora.* Sed ego pro Iſatu, Iuglandu reponendum esse suspicor.

φοινικῶδες σμυρνίζουσα] Plin. ibidem: *fœminæ folia myrrham redolent & densiora sunt*: ex quo patet, aut τῇ, σμυρνίζουσα, σμυρνα legisse, manifesto errore quanuis & Smyrnium à myrrhę odore saporéve, quem refert, ita dictum est.

ῥίζα δὲ τῆς ἀβὶ ἀείρους] Idē posteaquàm de fœminæ radicibus egit: *Mas*, inquit, *plures habet, quoniam non una radix nixus est, palmi altitudine, crassitudoque.* Sed ego ita potiùs legendum censeo: *Mas plures non habet, sed una radix nixus est.*

χωλεῖν ἡ ῥίζα] *Stirpem*, addūt Ruellius & Marcellus, quasi, ξύλον, præterea legerint: sed in exemplaribus nostris ea vox minimè occurrit, nisi inter Aldini codicis notha.

μετὰ τοῦ ὑποῤῥόδου ἐσθίων] ῥοῦς ὑποῤῥόδου dixit, ad differentiam τοῦ λευκοῦ. Enimuerò μετὰ χυμαμήλου etiam ipsi Dioscoridi pro coloris varietate duplex fuit, alius λευκός, hoc est, *albus*, alius ὑποῤῥόδος, id est, *rubēs.* Hunc porrò nos cum Scrib. Largo *fluorem sanguinolentum* vertimus. Is enim, cap. 29. *Mulieribus*, inquit, *quæ fluore sanguinolento infestantur, quod πρῶτο ὑποῤῥόδον Græci dicunt*, &c. Plinius *rubentes menses* reddidit. Agens enim de Pæonia, loco citato: *Rubra grana* inquit, *rubentes menses sistunt, xv. ferè pomi in uno nigro.* Alio tamen loco, nempe lib. 26. cap. 12. generaliùs illud ipsum protulit, his verbis: *Sanguinis profluuia sistit herbæ Pæoniæ semen rubrum.*

πυκνοῖς πώμασι] Goupylus in antiquo vtroque codice fini capitis hæc ascripta reperit, quæ Aldinus codex ad notha reiecit: οὕτως δὲ ὁ ὑφηλοτέρας ὄρους καὶ ἀκροτόμους. quæ nos etiam conuertimus, quoniam ita rem habere comperimus. Plinius, lib. 27. cap. 10. *Pæoniam in sylua nasci* prodidit, quanquam & antè, lib. 25. cap. 4. nasci scripserat, *in opacis montibus.*

CAP.

CAP. CLVIII. οἱ δὲ αἰγίνηχον] Hanc ipsam plantam, quæ ἀνθέμωνον profert, etiam αἰγίνηχον vocant Paulus & Oribasius.

ὑγρὰ ὑμοία ἐλαίᾳ] Plinius, libro 27. cap. 11. *Lithospermon* foliis ait esse *duplo maioribus, quàm rutæ*: in quo quidem non ita multùm à Dioſc. mente alienus eſſ[illegible] detur. Sed dum addit, *semen proferre ciceris magnitudine*, lacrymam Iobi vulgò dictam potiùs quàm verum Lithoſpermon deſcribere ſit veriſimile: quoniam multum abeſt, quin etiam maioris Lithoſpermi ſemen ciceris æquet magnitudinem.

δίχαλος ὑγρὸς] Pariſ. codex habebat, δίχαλος· ſed cenſui legendum δίχαλος, ὑγρὰ, δριμὺς, ἵνα δίχρους. Aldinus codex habet, δίχαλος, fortè ἀπὸ τοῦ, δίχαλος. Nam & in eadem ſignificatione δίχαλον voce vtitur Ariſt. licèt Doricam Dialectum magis reſipere videatur.

CAP. CLIX. ἀπόμυσσε δὲ μετὰ τραχήλου] Sunt hîc voces nonnullæ tranſpoſitæ, quas ita nullo negotio reſtitues: ἀπόμυσσε δὲ τραχήλου μετὰ ὕδατος πινόμενον. Alioqui ſenſus nullus conſtaret.

CAP. CLX. ἰρυθρόδανον, ἐρυθρανὸν] Vis eadem Erythrodano tribuitur apud Theophr. hiſt. plant. lib. 9. cap. 14. Sed deſcriptio planè diuerſa: ſiquidem eius folium ſimile facit κιττῷ, τοῦτο γὰρ ὑπολαμβάνω, hederæ, ſed rotundius: quanquam, κισσῷ, potiùs eo loco legendum ſuſpicor. hoc eſt, *aſtivo*.

ἢ φύλλον κιττοῦ] Etſi Serapio quoque ipſe legiſſe, videatur, καυλὸς μικρὸς ἢ φύλλον κιττοῦ, velut habetur in Aldino exemplari, placuit tamen Cornarij coniectura, qui pro κιττοῦ, ὁμοίως legendum ſuſpicatus eſt. Nam & Plinius, lib. 24. cap. 11. *Contra ſerpentes*, inquit, *rubiæ ramum cum folijs imponunt*.

CAP. CLXII. διαίρων δὲ ἐχ τραυματελοῦ] Alterius Lonchitidis foliorũ vſum diſtinctiùs tradidit Galenus, 7. ſimpl. hiſce verbis: χαυλοὶ μὲν οὖν πλείονες ἐρυθρόδανου, ξηρὸν δὲ μετ' ὄξους πινόμενα σπλῆνας ἰᾶται σκιρρώδεις. hoc eſt, *Viridia quidem ad vulnera glutinanda ſunt idonea, ſed ſicca cum aceto potu, lienes induratos ſanant*.

CAP. CLXIII. πιεῖν δὲ καὶ φοὺς δυσεντερίας] Has vires radicis decocto tribuit Gal. 6. ſimpl. quippe quæ aſtringentem quandam facultatem obtineat. Plin. lib. 20. cap 21. Eandem *coctum in aqua alvum ſiſtere* tradidit. Contrà verò, eiuſdem lib. cap. 4. de hibiſco agens, (quod idem eſt cum Althæa, licèt ipſum paſtinacæ ſimile dixerit) *Folia eius*, inquiebat, *ex aqua pota alvum ſoluunt*. Ex quibus patet Althææ, vti & non paucis aliis, vires eſſe diſpares, imò etiam planè contrarias: ſiquidem eius folia decocta alvum ſoluunt, radicis autem, æquè ac ſeminis, decoctum, eandem ſiſtit.

πίνεται δὲ ἡ ῥίζα] Idem narrat Theophr. lib. 9. cap. hiſt. plant. 19. in hæc verba: πυριῶσι δ' ἔνιοι καὶ τὴν ἀλθαίας ῥίζαν (λέγουσι) ἵνα ὡς πολλὰς ἐμβάλωσι καὶ ὑπὸ τὸν ὑετὸν θῶσιν. hoc eſt, *Aſunt & Althææ radicem addenſare, ſi quis tritum aquæ iniecerit & ſub dio poſuerit*. Id verò accidit ratione lenti glutinoſique ſucci, (muccaginẽ vocant) quem Althææ radix infuſa exſeſe remittit & in aqua deponit. Porrò ibidẽ Theophr. Althææ florem, quem Dioſc. ἰοειδὲς dixit, & figuræ & coloris habita ratione, μέλαινον facit: quod tamen veritati minimè repugnat, quoniam & Althææ genus quoddam flore luteo reperitur. Subdit verò, ῥίζαν ἰσχὺν & λευκὴν, vbi meo iudicio rectiùs legas, ἰξώδη, ὑγρὰν, γλίσχρον. Hæc enim voce vſus eſt Dioſc. quippe quæ eiuſdem eſſet cum illa ſignificationis.

CAP. CLXIIII. λευκαὶ πλατεῖαι] Plin. πλαγίαι, aut τῶν, πλατειῶν, videtur legiſſe: ſiquidẽ ſcribit, lib. 27. c. 4. *Alceæ radices eſſe albas, cum plurimùm ſex, octobules, obliquas*. Attamen Serapio quoq; *latas* reddidit. Sed de Alceæ viribus, quarũ apud Galenũ nulla fit mentio, ita ſcribit Paulus: καὶ οἶνῳ δὲ πινομένη, δυσεντερίας καὶ ὄξους ἰᾶται, &c. hoc eſt, *in vino verò pota, dyſenterias morſuſque ſanat*. quo loco καὶ τοῦ, ὄξους, reponendum videtur, ῥίζης, hoc eſt, πικρᾶς. Sic enim ſolitus eſt Paulus, ſi quarum plantarum vires à Galeno præterminſſæ ſunt, eas ex Dioſc. ipſo totidem ferè verbis tranſcribere.

CAP. CLXVII. ἐκτὸς δὲ κεφαλαλγίας αὐτὸν αἴτιον] Suſpicatur doctiſs. Cornarius legendum, ἐκτὸς δὲ τοῦ φαλάγγια ταῦτ' εἶναι. nec id abs re: cùm & ipſe Plinius, lib. 27. cap. 4. *Anagyri radicem in vino potam dari ad phalangiorum morſus* cõceptis verbis tradiderit: cephalalgiæ verò non meminerit, quanuis eo loco reliqua Dioſc. verba reddidiſſe videatur.

τὴν δὲ ῥίζαν χριεῖς] Ruellius, φριεῖς, legiſſe videtur. Plinius certè quidem radicem Anagyri diſcutiendis concoquendiſque adhiberi ſimpliciter pronuntiauit. At Galenus, lib. 6. ſimpl. nominatim radicis corticem ad vſus hoſce deſiderat.

CAP. CLXVIII. μαλοῦ μήλου πτερὰ] Lege, μαλάκια, niſi magis placet cum Paulo iſthæc radici tribuere: quanuis eam inutilem pronuntiauit Plinius, lib. 26. cap. 8. Ita verò ex ſententia Pauli legendum foret, μάλιστα δὲ πιεῖν ἡ ῥίζα μαλῆς ἐψήσασα. hoc eſt, *Maximè verò id præſtat radix cum decocta*, &c.

CAP. CLXIX. καὶ πρόφους καὶ δυσεντερίαν] Vel legendum, καὶ πρόφους ἢ δυσεντερίαν, ſeu προφθόους καὶ δυσεντερικοὺς, vt hæc cum præcedentibus cohæreant. Vel fatendum nonnulla deſiderari, puta, πιεῖν καὶ ὄφεις πρόφους, &c. aut, πιεῖν ſeu λεῖον καὶ πρόφους &c.

ἐπὶ πᾶσι ὕδατι πιεῖν] Quas vires Aliſmati tribuit Dioſc. dũ ſcribit aluum ſiſtere, dyſenteriæ mederi & œdemata mitigare, neutiquam ſe experſum palàm profitetur Gal. 6. ſimpl. attamen experientia certa comperiſſe ſe, valere radicis decoctum ad renum calculos comminuendos.

CAP. CLXX. ἄκορον ὀφθαλμικὸν] 8. ſimpl. Galenus, Dioſcoridis optimus Interpres, Onobrychidem arefactam ad finiendas ſtrangurias deſiderat, vti recentem, ad diſſipanda tubercula.

CAP. CLXXI. αὐτὸς ἔχει μάλιστα] Oribaſ. addit, λευκὸν ὑμοῖον. i. *leucoio* ſeu *malæ albæ ſimile*: quæ verba noſtræ verſioni ideò etiam lubentiùs adijcere libuit, quòd & apud Serapionem haberi animaduerterem. Sed in eo quod ſtatim ſequitur, ἐμπεσεῖν εἰς τοῖς δακτύλοις, præpoſitio, εἰς, redundare meo iudicio videtur, niſi velimus, inter, ſignificare, &, *inter digitos tritum*, vertere.

κωνάρια ἐνδοθεν, περιπλεκόμενα] Ego lubẽter cum Cornario legerem, κωνάρια ἐνδοθεν, καρπὸν περιπλέκοντα. Nam & Gal. 8. ſimpl. de Hyperico agens, καρπὸν nomine deſignat ipſius θηκάριον ſeu calyculum vnà cum ſemine intus concluſo: quo loco ad vrinas menſéſque ciendos, non ſemen tantùm, verumetiam totum fructũ, vſurpãdum

censuit. Sed vnica duntaxat immutata voce, *αἰνὶ τῷ, κωνάεια, κεφαλὴ* seu *δυλάκια*, vel potiùs, vnica expuncta litera, *κωνάεια*, legere placuit: maximè cum Hyperici ramuli minimè subhirsuti videãtur, sed ipsa tantùm siliqua seu ipsum pericarpium. Ita porrò Dioſc. Hyperici calyculos meritò *κωνάεια* nuncupare potuit, quòd sint quodammodo *κωνοειδῆς*, hoc est, *turbinati*, coni ceu nucis pinæ specie, quam etiam *κωνάειον* Myrepsus appellauit. Ab eadem quoque figura *κωνάειον* vocatur glandula in cerebro, à basi lata in mucronem fastigiata, *γλανίδιον* velut innixa. Cæterùm siue *κεφαλὴ*, siue *δυλάκια*, siue etiam *κωνάεια* legerimus, deinceps *αἰνὶ τῷ, ἐν ᾧ, ἐν οἷς*, restituẽdum fuerit.

μάλιστα κριθῆς] Quantum à Dioſc. mente recesserit Plinius, nemo nõ videt, dum lib. 26. cap. 8. *Hyperican* describit *semine in siliqua nigro, mastruerunt cum hordeo.*

CAP. CLXXIII. *αἰνὶ δὲ χολὴν ἐρίνεον*] Plinius, lib. 27. cap 4. *Androsæmi omnis tritas sanguineo succo manare* dixit, quasi *αἱματώδη χολὴν* legisset. Serapio verò, *μελανώδη*, legisse videtur. Sed tolerabilior Pliniana lectio: nam & sanguineus succus vini exactè rubicũdi liquorem non ita malè referre videtur.

CAP. CLXXIIII. *πρὸς τὰς ἰσχίας*] Vocum *ἰσχίας* & *μηρίνας* similitudine, vt videtur, deceptus Plinius. Coris folia, nõ ericæ, sed tamaricis foliis, assimilauit: quanuis est ericę & tamaricis foliorum non parua similitudo. Sic verò ille, lib. 26. cap. 8. *Est aliud hyperican, quod Corin appellant, folio tamaricis, & sub ea nascatur, sed pinguioribus foliis & minoribus, rubentibus.* Ita enim legendum existimo, non, *minus rubentibus*, vti habetur in noſtris exemplaribus.

CAP. CLXXV. *Ἀλωίων ἰωνίαν*] Hæ eædem appellationes apud Athenæum, lib. 15. ex Apollodoro Chamæpityi tribuuntur. Sic enim ille: *Ἀπολλόδωρος δ' ἐν τῷ περὶ θηρίων φησὶ· χαμαιπίτυν οἱ μὲν Ἀλωίων ἰωνίαν, οἱ δὲ κατ' Εὐβοίαν, σιδηρῖτιν.* hoc est, *Apollodorus in lib. de bestijs venenatis Chamæpityn aut Athenensibus Ionicam dictam, Euboensibus verò, sideritin.* Sed nouus Athenæi interpres pro, *χαμαιπίτυν*, legit, *χαμαίπιτυν δίαν*, hásque ipsas voces ad violam nigram refert.

CAP. CLXXVI. *βοτάνιον λᾶον*] Quomodo quámque rectè tertiã Chamæpityn lævum pronuntiarit Dioſc. mirum videri debet, cùm illico subiungat folius esse hirsutis & caule aspero. Neque vero dubito, quin hîc mendũ aliquod subsit, maximè cùm neque Serapio neque Oribasij interpres *λᾶον* vocem expresserint. Fortassis ergo legendum *αἰνὶ τῷ, λάῳ, λειῷ* vel *λειῷ*, aut certè, *λᾶον, αἰνὶ τῷ ἀδίᾳ ὕπνῳ καλοῦ*, accipiẽdum: quo modo accipi interdum admonet Hesychius.

IN LIBRVM QVARTVM.

CAP. I. *ὃ Ῥωμαῖοι βετονίκλαν*] *κάρφος ψυχρόφυτον*, seu potiùs *ψυχροτόφυτον* dictum, quòd frigidis locis gaudeat, Latinorum Vetonicam esse fatetur & ipse Galenus, 7. simpl. Attamen, lib. 5. sanit. tuendæ, cap. 5. Vetonicã à Cestro, quod in Gallijs nasceretur, saxifrago seu potiùs saxifrago dicto, apertè distinguere videtur: nisi fortè eo loco pro copulatiua particula, *καὶ*, disiunctiuam, *ἤ*, reponi oportet, vti nonnullis placuit: quibus & ipse lubenter assentirer, nisi & Aëtius, lib. 4. cap. 30. eadem illa quæ apud Galenum ibi habentur totidem ferè verbis repetijsset, quanuis ea minimè expressit Latinus eius Interpres. Paulus verò, lib. 7. cõceptis verbis, Vetonicam duplicem facit, vnam *λεπτόκλωνον*, ramulis pulegio similibus, at tenuioribus, & insipidam, quæ Veronica recentiorum fortasse fuerit: alteram quæ Dioſc. *κάρφος* dicatur, quæque nihilominus exceptis viribus, quæ pares vtique sunt, nihil habeat cum antedicta similitudinis. Sed & altera Vetonica inter Dioſc. notha reperitur, quæ ab illa altera Pauli tota facie diuersa est, quæque illam potiùs referre videtur, quam nonnulli volũt esse Plinij Cantabricã. Acerrimi viri iudicij Scaliger, Theophrasti *φλόμον* seu *φλόμον* esse existimauit: vulgato idiomate noſtro ab odore caryophylli, quẽ flos imitatur, *gyrofflée* dici consueuit.

ἴσους φυλλ] Plinius, lib. 25. cap. 8. *Vetonicam* scribit *à radice folia spargere ferè lapathi.* Talia verò sunt, quæ proximè sequenti capite à Dioſcoride Britannicæ assignantur.

τὸ κάτωθεν ἐστάχυωται] *Spicatum* vertimus, imitati Antonium Musam, lib. de herba Vettonica. Sed spicatum semen intelligimus, in caulis spicã dispositum, qualis & in thymbra Dioſc. thymo, stœchade ac similibus alijs cernitur, frugum cerealium spicam quodammodo præ se ferens. Σῖτος enim Græcis, Latinis spica, propriè dicitur, quicquid nucamẽti modo compactum mucronato fastigio semen inclusum gerit.

τὰ δὲ φύλλα διάπυρα] Lege, *διάπυα*. & in fine huius periodi, *αἰνὶ δ', πυοιδέα, πυοιδέα*. Sic paulò post, vbi legitur *μαλακωτικὰ δὲ*, malim, *μαλακωτικά τε*.

CAP. II. *ῥίζαν μελαίνην καὶ βραχεῖαν*] Hanc eandem radicem nigram describit Plinius, lib. 25. cap. 3. Autores Aduersariorũ bistortam noſtrã, Britannicam veram ac legitimam esse censent: & quò meliùs sententiam suam tueantur, *αἰνὶ τῷ, μελαίνῃ, μελαίνας* reponunt: & *φύλλα δασέα* exponunt, non quidem pilosiora, sed rigidiora ac firmiora. Quàm verò id audacter, vnusquisque viderit.

CAP. III. *πορφύρου ἄνθος*] Non desunt qui *αἰνὶ τῷ, πορφύρᾳ, πορφυρῷ* reponendum suspicentur, Plinij autoritate non contemnenda freti: qui quidem, lib. 25. cap. 7. Lysimachię florem purpureum assignat. Ac certè quidem præter Lysimachiam Dioſc. auri colorem, nõ dubium est quin & congener altera flore purpureo, aut certè in purpuram inclinante, reperiatur.

CAP. V. *πολύγονον ἄρρεν*] Prioris Polygoni duo genera, marem & fœminam agnoscit Plinius, lib. 27. cap. 12. Quæ enim hic fœmina est Dioſcoridi, tertium Polygoni genus est Plinio, quod *oreon* vocat, quia, vt ipse vult, *in montibus nascatur*. Attamen Dioſc. in aquosis riguisve gigni tradit: quæ sententia hauddubiè potior censenda est. Siquidem, vti verisimile est, Polygonos fœmina ea est, quæ hippuris similitudinem refert, quámq; Herbarij propè omnes pro

legitima Polygono fœmina videtur agnoscere.

CAP. VI. φυτὸν ὃ καλοῦσι Αἰγύπτιον] Sic Oribasius. At codex Dioscor. Ald. φύεται δὲ καὶ ἐν Αἰγύπτῳ. Marcellus in vetustis quibusdam codicibus legisse videtur, ὃν Αἰγύπτιον: quæ lectio vt Cornario, ita & mihi iocirco placuit, quòd & Plinius de hac Clematide agens, lib. 24. ca. 15. eam AEgyptiam cognominat, subditque AEgyptum eam maximè gignere. Huc adde quòd hic rursum ad finem capitis legitur, φ ἐστὶν ὁ χυμὸς. quanquam & intultum solum nihil obstat quo minus simul etiam pingue lætúmque esse possit.

κληματὶς δὲ ἔχει μικρά] Sic Oribasius & Paulus. At cum Cornario lego, μακράς. Nam & Clematidem longam ac tenuem agnoscit Plinius, loco citato, sed & ἀνθὴν ita legendum admonet. Sunt enim longa, imò interdum longissima, eius Clematidis quam Vincaperuincam vocant sarmēta, seu vitiginea flagella: vnde & natum proverbium, μακρὰς Αἰγυπτίας.

CAP. VIII. εἶδος σκωλὸς] Lacuna in vetusto codice legit, σκώληξ. Plinius etiam, lib. 25. cap. 6. Polemoniam scribit esse radice crassa. Sed vtramuis lectionem recipias, parum interest. Nam Monspelienſium Polemonia, quæ Dioscoridis descriptioni aptè respondere videtur, radice simul & crassa & cubitali conspicitur.

CAP. IX. κεῖται φύλλα, παραπλήσια δὲ, ὡς δύμου.] φύλλα non habent vulg. exempl. vti neque Oribasius. Matthiolus verò & Anguillara legendum suspicantur, παράκειται δὲ καὶ φύλλα, ὡς δύμου. Ego Aldinum codicem secutus sum.

συμφύτου φυσικωτάτου] Symphyton petræum describens etiam Plinius, lib. 27. cap. 6. inter alia, *salutem dicere* scribit. Sic & Apuleius. *Salutem prouocare.* Et ea certè quidem ratione ἄδηλον esse crediderim. Attamē pro iis vocibus apud Oribasium legitur, σπλάχνα. quæ lectio Matthiolo probatur.

ἐκπιοῦσαν] Oribas. ἐκπωθὲν. Plinius, citato loco, *Symphyti petræi radium potulam* describit: Apuleius, *salutem.*

περιπλόκου ἰδιάφυα] Lege, περιπλόκου ἰδιόφυον, aut certè, ἰδιάφυα καὶ ἄνθος. Est autē περιπλόκου, idem quod περιπλοκῆς, ἧς σπάργανα, qua voce deinceps vtitur Dioscor. sequētib⁹ proximè capitibus. Plinius *vulneribus sanandis vnum* scribit esse *Symphyton præstantius, vt carnes quoque, dum coquuntur, conglutinet additæ: vnde & Græci nomen imposuerunt.* Apuleius *hāc herbam hoc argumentum habere* prodidit, *vt carne bubula incisa & in arabum missa, eam radicis si misero drachmas duas, vocta caro in vnū cohæreat.*

CAP. X. σύμφυτος λευκὴ] Symphyti alterius florem *nigrum* perperàm dixit Apuleius, quasi μέλανα legerit.

CAP. XI. ἀνθοῦσι δὲ ἄνθει] ἀνθεῖ, ἀνθεῖν, legit Oribasius: quem Marcellus etiam secutus in eo videtur. At ego, ἀνθεῖν, cum Lacuna legere malui: qui quidem in vetusto quodam Dioscor. codice, quem sæpenumerò citat, ita se legisse testatur. Cæterùm non, ἄλειστον, sed ὄλειστον, seu ὀλίστον ex autoritate Galeni & Plinij legendum iudico. Ita enim κατ' ἀντίφρασιν dictum est, quasi ὄλεθρον ἀνθρώπου, quod ipsum apertè innuit Plinius, lib. 27. cap. 10. his verbis: *Holostium herba sine duritia ex aduersa appellata à Græcis, sicut fel dulce* &c. Langius in epist. non ἄλειστον, sed ὀνείατον, ex Absyrto legendum coniecit.

CAP. XII. πίσσα] Addunt codices alij, γάλακτος, quam vocem etiam reddere visum est. Nam Stœben, tanquā ætate sua vulgo cognitam, minimè describendam duxit Dioscorides. At nobis est hodie penitus incognita, quanquam & Theophrasto & Plinio eadem cum Phleo fuisse videtur. Sed & frutex Phleos vocatus quinam olim fuerit, æquè ignoratur. Id tantùm ex variis Theophrasti locis nobis colligere licuit, Phleon seu Stœben, herbam esse lacuttrem, fruticosam, aculeatā, folio carnoso, iuxta quod in caule gerat aculeum (non item *in folio*, vti voluit Plinius) cuiq; præterea lana, seu panicula lanuginosa, quæ placentaceum quiddā referat, mollis ac rubida, seu ad rufum colorem inclinans. Subit autem hoc loco mirari ridiculū planè quorūdam errorem, qui iccirco in Stœbes foliis hepatis figuram requirunt, quòd Gal. tum in lib. de form. fœtus, tū & alibi in Anatom. adm. scripserit, hepatis σπλάγχνα spatia inter ipsius vasorum diuisuras inania perinde ac Stœbē implere & infarcire. Enimuerò & ipse Gal. lib. 7. de vsu partiū, etiā pulmonum σπλάγχνα ratione eadē ipsi Stœbæ comparat, dum scribit, subtilantiam mollem ac spongiosam inter arteriæ asperæ cæterorúmque pulmonis vasorū ramu os necessariā fuisse, quæ spatia inter ipsa inania Stœbes instar oppleret, esséq; simul illis ceu firmamētū atq; propugnaculū. Porrò iis verbis haudquaquam dubie non quidem ipsi herbæ pulmonē aut hepatis σπλάγχνα, sed σπλάγχνων vsum vsu cōparat, quē præstabat herba ipsa, aut ipsius certè αἴσθησις seu mollis lanugo, cuius mentionē fecit Theophr. lib. hist. 4. ca. 11. nempe quoniā illa, vti & cæterarū tomentitarū plātarū partibus nonnullis, stibadia, puluinaria & dossuariorum iumentorum (τομάρια Græci vocant) segmata tomenti loco inferciebantur.

CAP. XIII. κύμινδι περὶ Σάμον] Clymeni descriptiones duas longè diuersas afferre videtur Plinius, lib. 25. c. 7. Scilicēt illi, pro Autorū quos secutus est diuersitate, duplex Clymenon facere visum est: è quib⁹ posterius cū Dioscoridis Clymeno aptè cōuenit: alterum, etsi quibusdam, vel ut etiam Theophrasto, Clymenon dictum. Dioscoridis tamen periclymenon repræsentare videtur: quod idē ipse Plinius, veluti sui oblitus, rursum periclymeni nomine describit, lib. 27. c. 12.

καὶ ἡ ὑγρὰ ἕως σπέρ.] Ex hoc loco satis patet, sistendi sanguinis vim, quæ apud Plinium vitio librariorū Cyclamino tribuitur, c. 12. lib. 26. Clymeno potiùs ascribendam esse, & pro *cyclamino*, eo loco restituendum, *Clymenos* seu *clymenon*, in hūc modum: *Sanguinis profluuiū sistit herbæ paonæ semen rubrū. Eadē & in radice uis. Clymenos* verò (nō *cyclaminos*) *siue ore sanguis ruticiatur, siue tussibus, siue alui fluat, siue fœminarum uero*, &c.

CAP. XIIII. ἐπὶ ἡμέρας τριάκοντα] Tricenis diebus scribit Plinius, Clymeno ista tribuens, lib. 26. c. 8. quāuis & rursum, lib. 27. cap. 12. de Periclymeno agens, idem ipsum repetit, addítque præterea, vrinam cruentam cieri à decimo statim die. Ex quibus patet, in præfiniendo huic potui dierum numero, Plinium à Dioscoride discrepare.

καὶ αἱμάτων ἐκκρίσεις ποιεῖ] Sic Galenus, libro octauo simpl. cap. de Periclymeno: ξηραίνει δὲ καὶ αἷμα. καὶ ἔστι φαῦλον, εἰ ἔθέλοιτο τίνειν, πολλὴν αἱμάτων ῥύσιν ἐργάζεσθαι καὶ πίνεται. ἐμοὶ δὲ δοκεῖ

καὶ πεντεκαίδεκα ἡμερῶν ὅλη τῇ πανσελήνῳ, καθὰ καὶ Διοσκουρίδης, ἐνίοτε καὶ πεντεκαιδεκάτῃ λέγων ἐκφύεσθαι αὐτά. οὗτος δὲ καὶ τὸ ὄφρον ἀκμαιότερον γίνεσθαι φησὶν ἀπὸ τῆς ἕκτης ἐπὶ ἡμέρᾳ. hoc est, *Desinant quoq; semel prolificam arationique nonnulli, qui capiosis liberint, omnino steriles esse.* Nec desunt qui ad eam potionem certum dierum numerum præfinant, nempe septem & triginta, quemadmodum refert Dioscorides: qui & ipse urinam aſeroſam die cruentum reddi prodidit. At Theophr. lib. 9. cap. 19. vim istam Clymeno tribuens scribit in hunc modum: ἀδυνατοῦσι δέ φασι ῥιζῆσαι, καὶ ἐὰν ἐκ τοῦ παυλίου τὸν καρπὸν λάβῃς σπείρῃς τε ἐκεῖνα τὰ ἔσπερα ἐπὶ ἡμέρας ἐν οἴνου λίτρᾳ, συμβαίνει ὅσον χείνικα τὸ ἔσπερ αὐτὰ ἐφεξῆς ἡμέρας. ἐστὶ γὰρ ἀπαλὸν τὸ φυτὸν, καὶ γονῆς τὸ ὅλον. id est, *Gignere nequaquam posse aiunt, & qui semen Clymeni collectum modo sextarij trigintà assiduè diebus portionibus aquis biberit ex uno albo. Sic enim penitus sterile esse hominem aiunt.* Hùc etiam secutus Plinius, lib. 25. cap. 7. de Clymeno verba faciens: *Hic medicandum est*, inquit, *dum medeatur, sterilitatem potu etiam uiros fieri.* Sed certum nullum isti potui dierum numerum præscribit: vrinam tantummodò cruentam cieri à decimo statim die monuit, lib. 27. cap. 11. quod iam antè annotauimus.

Cap. XV. χρωμάσι αὐθμάχου] Ego cum rei herbariæ Aduersariorum nouorum Autoribus, ἀφάκῃ, legere malim, aut certè, φακῷ vel ἀφάκῳ. Siquidem Tribulus terrestris Arachi, (quæ Plinij est Cracca, nisi mendum subest, quámque ab Araco distinguit Gal. 1. de alim. fac.) itémque lentis & aphacæ folia quodámodo æmulatur. Theophrastus certè quidem, lib. 6. hist. stirp. alterius Tribuli terrestris folium scribit esse ἐριβωλώδες, hoc est, *uelutì cicera*: quo loco duo agnoscit τριβόλου ἔπιγείου genera, vnum ἐριβωλώδες, alterum φυλλάνθου. Secutus & eum Plinius, libri vigesimiprimi capite decimosexto, duo constituit præter aquaticum Tribuli genera, quorum vni folium scribit esse cicerculæ, alteri aculeatum: vbi tamen cicerculam cum cicere confudisse videtur.

καὶ ὃ καίριον μακρὰ] Vox, μακρὰ, desiderabatur in vulg. exemplaribus, sed eam addit Oribasius, itémque vetustus quidam Dioſc. codex, testibus Lacuna & Matthiolo. Quin & longas esse Tribuli terrestris viticulas, αὐτῶν ipsa indicat.

ὀξεῖς αἰεὶ ἄκανθαι φυόμεναι] Esset fortasse legendum, ὀξεῖς δὲ καρποὶ: spinosum enim seu aculeatum fructum vtrique Tribulo tribuunt Theophrastus & Plinius: quod & ita habere omnibus rei herbariæ peritis compertum est. Stare tamen etiam potest vulgata lectio: à viticulis enim haud ita dissitæ sunt spinæ, quæ fructum ambiunt. At sunt & alteri Tribulo aculeata folia, quem φυλλάνθου descripsit Theophrastus, ita vt illud, ὀξεῖς αἰεὶ, non omnino malè ad folia etiam ipsa nonnulli retulerint. Porrò φυόμεναι αἰεὶ ἄκανθαι Metaphoricè dixit Dioscorides, vti & nos *acerbas*; quòd attrectantibus molestum interdum vulnus infligant: quale etiam acerbum Latinorum nonnulli dixêre.

φύεται δὲ ἐπὶ ποταμίοις] Sic legit Serapio. Attamen redundare videtur illud, ἐπὶ ποταμίοις, & à sciolo quodam ex proximè sequenti periodo huc fuisse translatum. Vix enim fuerit verisimile, vnam & eandem plantam & iuxta flumina & in domorum areis nasci solitam. Plinius certè quidem in hortis terrestrem Tribulum nasci prodidit, vti aquaticum in fluminibus, lib. 22. cap. 10.

φύλλα πεντε] πλείονα, legisse videtur Plinius: qui quidem libri vigesimiprimi capite decimosexto, Tribulum palustrem folio *ad effigiem olmi* depingit.

Cap. XVI. λεπίνας δὲ καὶ μαρίνας] Præter vetusti codicis fidem, fecit etiam Plinij autoritas, vt pro, μαρίνας, μαρίνας, reponendum existimauerim. Is enim libri vigesimi capite octauo: *Est & beta syluestris*, inquit, *quam Limoniam uocant, alij neurodes, multum numeribus semineribus ac denſioribus foliis, undecim sæpe, asparagi.* Sic enim legendum, non *caulium*.

Cap. XVII. φύεται δὲ ἐν ποταμίοις] Lagopoda *in segetibus* nasci scribit Plinius, libro 26. capite octauo. Ego ποτάμιοι iccirco *segetum areas* verti: quanuis ποτάμιοι, hortorum areas propriè significant.

Cap. XVIII. ἴριος εἶδος] Cùm vulgata exemplaria, ἴριδι, haberent, restitui, εἶδος, quo modo legit Oribasius. Sed & Lacuna itémque Goupylus in vetusto quodam codice ita se legisse testantur: sic etiam habet Epitome Pselli. Plinius tamen lib. 27. c. 11. *Medium* scribit *folia habere iridis satiuæ*. Sed & eo loco, *feridis satiuæ*, reponere latius fuerit: siquidem iris minimè (quod equidem legerim) in syluestrem & satiuã discernitur: quanuis Theophr. ἴριδος ἀγρίας, quæ cum xyride Dioscoridis eadem est, mentionem faciat. At Seridis tum Dioscoridi, tum & ipsi Plinio, duo traduntur genera: vnum syluestre, satiuum alterum.

τὸ δὲ σπέρμα καὶ ὁ ῥίζα] Ita Galenus Medij radicem ac semen contrario scribit esse temperamento, simpl. libro septimo. Siquidem illa austera est, fluorémque muliebrem cohibet: hoc verò, menses ciet, quippe quod tenuium sit partium & incidendi vi præditum. Contrà verò Plinius, loco modò citato, *Medij semen contra fumantium abundantiam* dari prodidit.

Cap. XIX. τὸ φύλλα λίθῳ μετ' ὄξους] Plin. libri vigesimiseptimi capite nono: *Epimedij folia in uino trita urinam maximè cohibent.* Hic vinum, ille oleum, haud ita magno discrimine, desiderat.

Cap. XX. φύεται δὲ μάλιστα ἐν ὑγρόποις] Xiphiõ, quod hîc Dioſc. in aruis potissimùm gigni prodidit, Plinius, lib. 25. ca. 11. *in humidis* nasci tradit. Sed vtraque sententia rectè constare potest. Quid ni enim etiam arua plurima humida reperiantur? Huc adde quòd, si ad Dioſc. verba diligentiùs attendas animum, illum perspicies non planè negauisse, quin etiam in humidis locis aliis Xiphium nasci possit. Cæterùm Plinius Gladiolum, etiam Cypirum nominat, lib. 21. cap. 17. & 18. & ipsum à Cypero distinguit: vtriusque tamen historiam manifestò confundit.

Cap. XXII. καλάμιος ὅμοιος, στρογγύλος] Quærat aliquis, quomodo Xyridis semina fabis similia simul & rotunda esse possint, siquidem fabæ oblongæ sunt & latæ, non item rotundæ. Vt à contradictione Dioscoridê vindicet Matthio-

las, Xyridis semen ait, nō figura, sed odore tantummodo, fabas referre, quasi id voluerit Dioscorides, præterea quòd comperisse se Spatulæ fœtidæ vulgo dictæ semina (quam quidem legitimam Xyrida esse autumat) fabas omnino redolere. Illud verum nécne sit, nondum equidem exploratum habeo. Neque tamen dubito, quin etiam illa Xyridis semina fabarum figuram referre voluerit Autor. Sed animaduertēdum fuit, & Theophrasti & Dioscoridis aliorumque priscorum fabas à nostratibus fuisse longè diuersas, quippe quæ & minores essent & penitus rotundæ, vti pluribus argumētis ex eorum testimonio & autoritate ductis doctè & luculenter probat Dodonæus, cap. de Bona seu phaselo maiore.

γλυκίας πλατυφύλλου] Serapio legisse videtur, μετὰ γλυκίας πλατυφύλλου, sed perperàm meo iudicio. Nusquam enim alibi, quod sciam, γλυκίας πλατυφύλλου mentio occurrit.

Cap. xxiii. ὁμοίαν τῷ ἐρυσίμῳ] Ad hanc ipsius lactucæ foliorum similitudinem, quæ in Anchusa reperitur, respiciens Nicāder, ἀγχούσης ἐρυσιμοειδοῦς χαράσσει dixit, in Theriacis.

πρηξία, μέλαινα] Orib. αἱμὶ τῷ, μέλαινα, μεγάλα, legisse videtur. At Lacuna vtrunque, & μέλαινα & μεγάλα, reperit in vetusto codice, quantum ex ipsius verbis licet colligere.

ἀφεστηκυῖαν τῇ γῇ] Quarum stirpium folia hoc modo per terram repunt, ἀπηρίδωτα nominat Theophrastus. De Anchusa verò contrà ac Dioscoride videtur sensisse Plinius, libro 22. cap. 16. Postquam enim ea commemorauit, quorum caulis per terram repit, è diuerso stare scribit Anchusam, inficiendo ligno ceriscq; radice aptam. Sed illud ipsum non de tota planta, sed de caule tantummodò, accipiendum est. Quæ enim Anchusæ folia radici proxima sunt, terræ velut affixa reperias.

ἐκ τοῦ δίκην ἑρπύσματος] Hæc vox, ἑρπύσματος, mendi suspicione minimè vacat, idque non immeritò. Lacuna legit in vetusto suo codice, ἀνειλήφ. Marcellus ex antiquissimi cuiusdam exemplaris fide restituit, γεννωμένης: quam lectionem ego secutus sum. At Auicennas alicubi legisse videtur, ἀφαυαινομένης, aut quid tale. Scribit enim lib. 2. Anchusæ radicem si acutè tangatur astringere, & sanguineo colore manus inficere.

καὶ παλαιὰ ἕλκη] Sanat ulcera in æruum (inquit Plinius, lib. 22. cap. 20) præcipue senum, & aduſta: quasi παλαιὰ ἕλκη, ulcera senum reddere debuerit.

καὶ λειχῆνας δὲ λείφεται] Plinius, loco modò citato, Anchusæ radicem lepris & lentigini ex aceto illini scribit. Rursumque proximè sequenti capite, de altera Anchusa: lentigines, inquit, ac lepras radix illinitur. Verobique verò, mutiginem, pro, lentigine, reponendum videtur.

ἐφέλκει καὶ σύμφυτα ἐκμοχλεῖ] Coloris potiùs conciliandi gratia radicem Anchusæ vnguentis addi innuit Plin. lib. 13. cap. 2. Vnguentis, inquit, color causa additur Anchusa.

Cap. xxv. ἔστι δὲ καὶ ἄλλη] Anchusæ non tria tantùm, sed quatuor genera agnoscit Galenus: verùm ei secunda recēletur, quę deinceps Dioscoride λιθόσπερμος dicitur: Paulo verò, vti & Nicandro, λιθοσπέρμη.

Cap. xxvi. καὶ πρηξία δὲ πρηξία] Etsi antèa in vulgatis exempl. legebatur ἡμηχάνου δὲ πρηξία, attamen quia præter vetustū Dioscoridis codicem, etiā Oribasius habebat, πρηξία καὶ πρηξία, lectionem hāc iccirco recepi, eóq; lubentius, quòd & Plinius lib. 27. cap. 11. de Lycopsi agit in hæc verba: *Lycopsis longioribus quam lactuca est foliis, crassioribusque*, &c.

Cap. xxvii. οἱ δὲ ἐχεῖδα] Paulus ἀχειάδα vocari scribit. Plin. lib. 22. c. 20. dorida, vbi ita scribit: *Est & alia similis, pseudanchusa ob id appellata, à quibusdam verò Echion aut doru, & multis aliis nōminibus*, &c. Eadem enim est cum Echio, quam pseudanchusam ibi nominat. Fortè verò etiam pro, ἀλκιβιάδιον, ἀλκίβιον, legēdum. Alcibion porrò *qualis esset herba, apud Autores non reperiri* scribit Plin. lib. 27. cap. 5. Reperire tamen potuerat apud Nicandrum, qui quidem in Theriacis docet, Echion Alcibium dictum ab Alcibio quodam, qui primus Echij vsum contra serpētes adinuenisse fertur, cuiusque historiam aliquot versiculis prosequitur. Alio verò Theriacorum loco, æquè ac teste ipsius Scholiaste Numenius autor non contemnendus, ἔχιος seu ἔχις, & per ἐπένθεσιν ἐχεῖος, duo genera constituit. Sed cōrum alterum illud est, quod Ocimoidis nomine sequenti capite describitur.

πρηξία ὑπολευκὰ] Orib. ὑπολάβρα, sed minùs rectè, meo iudicio. Inferiùs verò pro eo quod habetur, ὠφελεῖ ἢ ἐπ' ἄκρῳ, lego, ὠφελεῖ καὶ ἐπ' ἄκρῳ.

ἀλλ' ἐχεῖδος πιεῖν] Illud est quod voluit Paulus, dū de Echio apertè scribit in hunc modū: ἵνα ἐχεμόμενος ἀσκαλεῖς ἀφυλάκτως. Non enim voluit Echij potu arceri serpentiū morsus, sed ita irritos reddi, vt nocere minimè possint.

Cap. xxviii. ὑοσκύαμος μελανθίου] Sunt qui putent siliquas Ocimoidis hîc melanthij vasculis assimilari. At quoniam illius siliquas iam pronuntiauit Autor hyoscyamo similes esse, hoc loco iudico tum Ocimoidis tum melanthij semina potiùs inter se conferri. Quamobrem, ὑοσκύαμος, ibi, ὑοσκύαμος, legendum censeo.

καὶ μετὰ μέλιτος] Marcellus & Cornarius addunt, *& vino*. Ruellius, *cum melle & vino*. Sed illud, *& vino*, quid opus fuit ex præcedenti periodo repetere, cum satis per se subintelligatur?

Cap. xxix. οἱ δὲ ἔριν] Ita Plinius de Erino, lib. 23. cap. 7. *Utcunque decerpta lacte multo & dulci manat herba*, &c. Neq; dubito quin ab eo lacteo liquore siue succo, quo Erini caulis foliáq; turgent, ad caprifici ἔριον siue ἔριθον dicti similitudinē, id nominis hæc herba sibi asciuerit. Plinius Erineum nominat, ipsiúsq; descriptionē sermoni de caprificо statim subiūgit, *propter gentilitatē*, vt ipse ait. Galeno ἔρινος dicitur, 6. simpl. Paulus tamen seorsim & Erini & echini meminit, quasi diuersas esse plātas existimauerit. Alij hanc eandem ocimum aquaticum appellant.

ὠφελεῖ μέλιτος] In Aldino codice vox, καθ' ὕδωρ, quæ habetur in Paris. minimè reperitur: atq; hîc etiā redundare visa est. Nam & Paulus de Erino agens, scribit in hunc modū: ἔριος ὑδρώδης ἐστὶ πόα, ἧς τῶν κεφαλῶν ἑκάστη μετὰ μέλιτος ἑκάτερον ἐγχεόμενα, μύσεις ὀφθαλμῶν ἵστησιν. hoc est, *Erinos aquatilis herba est, cuius seminis drachmæ duæ cum melle drachmis quatuor illitæ, oculorum fluxiones sistunt*. Quamobrem & ego in Dioscoridis contextu cyathorum vice drachmas supplendas esse duxi.

ἀβλὴ πλατύφυλλος ἐκτὸς ἐρίνεος] In hac periodo cum Serapione veteris exemplaris lectionem sequi placuit. Plinius quoq; , lib.24.cap.19. *Gramina*, inquit, *radix decocta in uino, tormentis medetur & urinæ difficultatibus, ulceribusque uesicæ, & calculos frangit.* Quòd si quis vulgatam lectionem, *τὴν ἐκτὸς πλατὺ ἐρινεὸν ἀβλὴ ἐστὶ ῥίζα*, retinere maluerit, minimè repugnabo.

CAP. XXXIIII. *καὶ ἔστιν ἐπὶ πλεῖστον*] Posterius, *καὶ*, libenter expungo: vel adijcio, *μάλιστα*. Alioqui vocem illam, *ἔστιν*, non ad *ἀκρεῖαι*, sed ad *κρασιὸν* referri oporteret: quod minùs placet.

CAP. XXXV. *ὁ δὲ ἴδιος καὶ ἀμυλώδης*] Siderion Heracleon, quale hic describitur, *iuxta lacus & amnes nascentem* scribit Plinius, lib.25.cap. 4.

διαφέρουσι] Lacuna vetus codex habet, *διαφορούμενοι*. Plinius etiam de Sideritidis genere quodam ita scribit, lib.25.cap.5. *Hanc etiam præcisos nervos glutinare fingunt.* Sed ego cum Lacuna vulgatam lectionem magis probo.

CAP. XXXVI. *ὑπόπυρα*] Ita Serapio. At Oribas. *ὑπόπυρα*, *subamara*. quæ secutus est Marcellus. Sed & Lacuna in vetusto Dioscodice, *ὑπόπικρα*, legisse se testatur.

λευκὰ καὶ χρυσίζοντα] Serapio expressiùs tradit, Achilleæ flores in principio albos, deinde verò aureos conspici, vti & Oribasij interpres. At cæteri Interpretes, *purpureos*, addunt: ex usque nonnulli volunt Achilleę flores vario inter candidum, purpureum & aureum colore cõspicitalij in varijs Achilleæ plantis tres illos floris colores obseruari. Cæterùm præ ea voce, *ὑπόπεπλα*, quæ est ad capitis calcem, sunt qui, *ὑπόπεπλοα*, legisse videantur.

CAP. XXXVIII. *ἐξ ἧς ἡ καλουμένη ἰὼ τῆ ἴδῃ*] Scribit itidem Plinius, lib.16.cap.7. *Rubi verum genus Idæum nascisse Græcis a loco:* Rursumq;, lib.24.cap. 14 *Idæum rubum appellatũ esse, quoniam in Ida non alibi, nascatur.* Sed apertè fallitur, dum non alibi quàm in Ida nasci opinatur: cùm passim occurrat. Rectiùs Dioscorides qui quoniã copiosus in Ida proueniat, ideò Idæum dictum asserit.

CAP. XXXIX. *ἑλξίνη ἧς φύλλα*] Cissampeli cognomentum rectè adijciunt Interpretes ex Gal. & Paulo: qui quidem de hac eadem Helxine agentes, *ἣ καὶ κισσαμπέλου ὁμοίως*, addũt, ad distinctionẽ alterius Helxines, seu muralis herbæ, de qua deinceps hoc eodem libro Dioscorides acturus est. Neque porrò existimandum Helxinem, de qua agit Plinius, lib.21.cap.16. harum alteram esse. Siquidem alia est, quam ixinen verùs nominare debuit cũ Theophrasto, lib.hist.6.cap.4. ex cuius verbis suam ipse historiam depromsisse videtur. Hoc verò capite descriptam Helxinen, rectiùs Plinij *cunolunium*, lib. 21.cap.5. commemoratum, esse dixeris, eo nomine donatũ, quòd suarum viticularum ope vicinis sese aduoluat adminiculis.

ἀνθεῖ κατὰ] Gal. & Plinius huic Helxinæ vim tribuunt *διουρητικὴν*, in quo minimè (quod voluit Marcellus, Dioscoridi repugnant: quandoquidem vtraque facultas, & discutiẽdi & soluendi aluum, potest citra controuersiam vni eidémque plantæ competere.

CAP. XLI. *ὑπομέλαινα σφηκοειδὴς*] Malim, *σφηκοειδῶς*, vt & proximè sequẽti capite: *serratum* vertit Apulcius: quanquam & *σφηκοειδὴς* aduerbium, *Ilicu modo* significat, cuius itidẽ folia serratis incisuris diuisa sunt.

ἕτερον ἀφηκμένον] Ex Dioscorverbis quæ habentur, lib.2.cap. de anemone, satis patet legendum hoc loco, non *ἀφηκμένον*, sed *ἀφηγμένον*. Ibi enim eos erroris insimulat, qui EVpatorium & argemonen vnam eandémque plantam esse existimabant. Et is tamen error ita hucusque inualuit, vt Dioscorium, nonnihil immutato nomine, agrimonia vulgo dicatur.

CAP. XLII. *ὑπόκειται ἐκτόμοις*] Hæc ipsa *σφηκοειδῆ* folia virgineis assimilat Theoph. lib. hist. 9.cap. 14. his verbis: *ἔχει δὲ τὸ μὲν φύλλον ὅμοιον ὑπάρει, μικρὸν δὲ καὶ τῷ χρωτὶ ὑγιεινόν.* hoc est, *habet quidem folium instar uuæ, sed paruum & colore simile:* quanuis fatear quibusdam alijs locis apud eundẽ Autorem *ὑπαρον* pro vnedone seu arbuto vsurpari. Porrò Dioscalia eadem mentæ comparat: fortè sic partim magnitudinis, partim ipsius formæ habita ratione, vti ille ad colorem simul & formam videtur respexisse. Cæterùm falli meritò existimatur Plinius, dum lib 25.cap.9. *Quinquefolium fragis gignendo commendari* scribit: siquidem alia est planta quæ fraga gignit, *fragaria* vulgò dicta.

ῥίζαν δὲ ἔχει ἐφθύσθαι] Plinius, loco modò citato, *Quinquefolium* scribit *cum effoditur, radicem habere rubram sed quæ intereant nigrescat & angulosa fiat.* Illud vero a Theophr. descriptit, cuius hæc sunt verba, de eadem Quinquefolij radice: *ὁμοίως ἐρυθρά. ξηραινομένη δὲ, μελαίνει γίνεται καὶ τετραγώνη.*

ὅτι μὴ τὰ πτερύγια] Legit Lacuna in antiquo exemplari, *ὅτι μὴ τὰ πτερύγια πεπεσε, ὅτι δὲ τετραπέτηλα, ὅτι δὲ τερμινθώδη*, &c. In eundem quoque sensum Plinius, lib.26.cap.11. *Quinquefolij folia quidam terna ternarum dedêre, quaterna quaternum, plura cæterum: alijs omnibus, obolo trium cum pipere ex aqua mulsa.*

CAP. XLIII. *καὶ αἰωρεῖται γλιὼ ὁπὸ μικρ.*] Diuersas plane vites Phœnicæ herbæ tribuit Plinius, lib.22.cap.25. *Est & herba*, inquit, *Phœnicea appellata Græcis, nostris uero hordeũ marinum. Hæc trima è uno pota, præclarè aiet menses.* Ex quibus verbis colligit doctiss. Guillandinus, diuersas esse plantas Phœnicæam herbam Plinij & Phœnicem Dioscoridis. Sed equidem vel lapsum Plinium, vel in ipsius verbis mendum subesse, potiùs crediderim.

CAP. XLIIII. *Ἰδαία ῥίζα*] Idæam herbã vocat Plin. lib.27.cap.11. quam Dioscorides hîc à parte potiore radicem denominat. *Idæa herba*, inquit ille, *folia sunt quæ oxymyrsines: adhærent his uelut pampini, in quibus flos*, &c.

CAP. XLVII. *ἔστιν ἐπ' ἐκ*] Interiectis quæ in cod. Ald. nothis reperiuntur, sic malim: *ἔστιν ἐπ' ἐκ παλαιᾶς ἐπὶ ἐρίδος, ἔνθ. μείζων ὁ πυθμὴν, ὑπόπικρος· νέμεται δὲ ἔχει βραχ.* Aut: *ἔστιν ἐπ' ἐκ παλαιᾶς ἔχει ἐρίδος, ἔνθ. μείζονα δὲ πυθμὴν, ὑπόπικρον, νέμεται οὐ δέονται βραχυτέρας* &c.

CAP. XLVIII. *μικρὸς σφηκοειδὴς*] Sunt qui *μικρὸς σφηκοειδὴς*, *σφηκοειδὲς* vel *σφηκοειδὲς*, legẽdum suspicentur. Siquidem Coccum tinctilẽ, (quam *quisquilũ* Plinio dictam puto) ceu excremẽtum quoddã ferè ex ilicis aquifoliæ simili arbuscula, eáque humili, decerpitur. Neq; tamẽ negauerim in ilice quoque & robore interdum repetiri.

Quin & eiusmodi grana rubentia radicibus pimpinellæ locis quibusdam adhærentia nonnulli obseruarũt. At Pausanias in Phocicis, Coccũ baphicam scribit esse, *fruticem rhamni magnitudine, foliis lentisci, sed nigrioribus & mollioribus, fructu solano, eius magnitudini, in quo gignãtur animalcula cultellis similia.* E senescẽte quoque Cocco nostro talia auolant animalcula: sed ne tam repente gignantur, meliúsque grana conseruentur, lecta illa aceto vinóue albo irrigantur, aut butyro alióue pingui illinuntur. Iccirco verò (quod velut in trãscursu dictum velim) & Cocci genus quoddã σκωλήκιον dictum refert Plinius, quod celerrimè in vermiculum sese mutaret. Inde quoque factum putarim, vt Coccum nostris *vermillon* dictum fuerit.

ἔστιν ἡ ἐν Ἀσίᾳ] Vox hęc. Ἀσία, mendi suspicione minimè vacat: quoniam & Galatiam & Armeniam Asiæ regiones esse constat. Quare aut accipienda hoc loco Asia, pro Lydiæ ciuitate, Asiæ vni ex mundi partibus cognomine: aut, Ἀσιάδος vel Πισιδίας, reponendum fuerit. Siquidem gigni etiam Coccũ in Africa & Pisidia refert Plinius, lib. 16. cap. 8. Serapio certè quidem, Σουσίᾳ, legisse videtur.

μικρὰ ἔχουσι κατακαυσάμενα] Alij cum oxymelite tetunt, inquit Gal. 7. simpl.

ἐν τῇσ δρυσὶ] Anguillara reponit, ἐν τοῖς σφόνδυλοις, seu ἐν ὄζοις σφονδύλων, quoniam σφόνδυλος etiã genere masculino effertur apud Theophr. In ilice vero gigni Coccum, Theoph. lib. 3. hist. de ilice agens admonet, hisce verbis: φέρει δὲ καὶ σφόνδυλος τὴν βάλανον τοιαύτην οἵαν φοινικοῦν. hoc est, *fert & ilex præter glandem granum quoddam punicum*, &c. Πεῦκον autem ibidem arborem describit, cui sit folium δρυώδης, ἔλαττον δὲ, καὶ σκληρότερον, id est, *quernum, at minus, aculeatum*, &c. Sed & apud Columellam ilicis mentio fit, quæ spinas non habeat. Porrò siue, ἐν τοῖς δρυσὶν, siue, ἐν τοῖς σφόνδυλος, legas, parum refert: quoniam δρυὸς nomine glandiferæ omnes arbores comprehenduntur, inter quas & ilicem recenseri nemo negauerit. Cęterùm pro eo quod sequitur, πλατεῖαι, Marcellus & Cornarius, ἀπλᾶι δίφυες, *asperum*, reponendum non malè suspicantur.

Cap. xl. ix. τὸ φύλλον χίνου ὅμοιον] Galenus itidem, lib 8. simplicium, Tragium hoc lentisco simile facit. At Plinius parum sibi constat, dum lib. 13. cap. 21. *Tragum* quod aliàs *tragonin* vocat, *fruticem* scribit esse *urebintho similem*: lib. verò 27. cap. 13. eundem ipsum *iunipero similem* facit *& semine & folio & ramis*.

Cap. li. Τραγίσκος, οἱ δὲ, τραγίνος] Plin. lib. 13. c. 21. *Tragum* (ita enim legẽdum) *siue scorpionem* describit, *ueprem siue solys*, &c. Rursúmque, lib. 21. cap. 15. *Tragum seu scorpium in totum spinam* esse asserit. Sic. & lib. 22. cap. 15. *Scorpium asparago similem describit, habentem in cacumine aculeum*. Sed illa Theophrasti Scorpio, quem Nepam vertit Gaza, verius conueniunt, quàm Dioscoridis Trago: quanuis non negauerim, Tragi ramulos acuto esse cacumine. Siquidem pusillum eum fruticem Tragum esse lubens agnosco, qui non procul à Monspelio apud oram maritimam nascitur, sine foliis, fructúmque profert, cùm ematuruit, esculentum rubi Idæi fructui haud ita dissimilem, quem indigenæ, *raisin de mar*, quasi marinum racemũ, appellant. Verùm quoniam is ab Autoribus Aduersariorum pleniùs describitur ac elegantissimè depingitur, eò Lectorem reiicere latius fuerit.

πόνους καρπὸς, ὡς φησὶ] De Trago siue scorpio ita Plin. lib. 27. cap. 13. *Huius ramorum decem aut duodecim acuminum trita, ex uino potu, cœliacas, dysenterias &c. auxiliantur*. Eum verò locum ex hoc Dioscoridis contextu ita emendo: *Huius ramorũ decem aut duodecim acini triti ex uino potũ*, &c.

Cap. lii. τὸ δὲ ὑπὲρ αὐτὴν καλάμινον] Theoph. lib. hist. 4. cap. 13. quo loco plantas aquaticas persequitur, paulò secùs tria hæc iunci genera distinguit. Nempe acutum sterilem primum cõstituit, quem marem appellat: alterum frugiferum, priore crassiorem & carnosiorem, quem μελαγκέφαλον vocant, quia semen nigrum gerat in cacumine, (atriferum Gaza, alij atricipitem vertũt:) tertium denique crassitie carnositatéque insignem, qui holoschœnos vocatus est, ad vitilia texendáque tegetes ideò vtilissimus, quòd mollis carnosusque est. Theophrastum, quanuis obscurius paulo, secutus est Plinius, lib. 21. c. 18. Duo enim facit iunci prima genera, võum marisсum, alterũ marinum oxyschœnõ dictum: cuius duo rursum constituit genera: (perperam enim *tria* apud Plinium legi existimo) neinpe marem & fœminam. Tertius enim quem subiungit, holoschœnos dictus, idem est profecto, meo quidem iudicio, cũ marisco primo loco commemorato, quémque, nisi fallor, priores Latini *serpum* appellabant. Galenus itidem, deindéque Aegineta, Oribasius & Aëtius, χῦτον ἁπλοῦν, vel potiùs ἁπλοῦς, id est, *iuncum palustrem*, duplicem faciunt, ὀλόχοινον (pro quo mendosè habetur apud Galenum, ὁλοχόλινος) & ἐξόχοινον. Hunc verò rursum duplicem cõstituunt, κάρπιμον & ἄκαρπον. Is est in iunci generibus distinguendis Autorum penè omnium consensus: à quibus tamẽ hoc loco Dioscoridis quodammodo dissentire videtur, nisi fortè (quod magis placet) χῦτον ἁπλοῦν & ὀλόχοινον vnum & eundem iuncum esse voluit. Alioqui enim si singula verba spectemus, tria iunci summa genera statuere videtur, nempe læue, acutum & ὀλόχοινον dictum: acutum verò deinde subdiuidere in ἄκαρπον & κάρπιμον, *frugiferum* inquam *& sterile seu infructuosum*.

τραχείᾳ τῇ δυσὶ] Lego, μαχμίᾳ. Sic enim Theophr. postquam de duobus iunci acuti generibus egit, addit: καὶ ἔστιν τὸ μεγέθει καὶ τῇ παχύτητι καὶ ἁπτομένῃ δηλοῦσθαι, ὃ καλοῦσιν ὁλόχοινον. hoc est, *crassitie magnitudine, crassitie & carnositate præstans, quæ holoschœnos appellatur*. Ita & Plinius, *Melancranes*, inquit, *crassior & fruticosior magisque etiam ferax, quæ uocatur holoschœnos*. Galenus itidem, 8. simpl. μαχμίᾳ δὲ καὶ χαυνοτέρᾳ καὶ ὑπολιγόχοινον, pro quo repono, ὁλόχοινος.

πτίσσουσι μικρὰ κεχυμένα] Plinius, loco antè citato: *tosti semen ustum & in aqua potum sistit aluum, & fœminarum menses aspiritúsque dolores facit. At quæ uocatur holoschœnos, eius folia quæ proxima sunt radici, commanducantur aduersus aranearum morsus*, &c. Ita Plinius aquâ pro vino diluto vsurpat, itémque folia quæ morsibus imponit Dioscoridis ore assumenda præcipit.

Ἡ ΑΙ Διοσκουρίδου] Dioscoridis codices partim ΑΙ Διοσκουρίδου habent, partim ΕΤ μικροῦ. Sed vtraque vox mihi, æquè ac Valerio Cordo, suspecta est. Plinius cer-

tè quidem EVripici iunci meminit: *Inuenio*, inquit, *channum unum iunca genus, quod* EVripum *uocant.* Sed quæ hîc seu AEthiopico seu EVripico iunco tribuuntur à Dioſc. eadem Galenus & Serapio ἑλκέιρινῳ tribuunt, ita vt merito dubitari poſſit, ſitne hoc loco legendum, ἢ δὲ ἑλκέιρινος: niſi tamen Alexandrini ſiue EVxini χοῖνος, holoſchœni ſpecies eſt, à certo loco ita denominata.

CAP. LIII. βρύον τὸ πετρόβιον] Lichena nõ eſſe verè muſcum, ſed potiùs quaſi muſcum, palàm oſtendit Gal. 7. ſimpl. his verbis: λειχὴν ὁ δὴ καὶ πετρόβιον, καὶ μᾶλλον ἂν βρύον τις ἡγήσαιτ' ἂν ἐρυθρᾶς ἐπιπλάζοντος αὐτῷ φυτοῦ. hoc eſt, *Lichen in petris naſcens, eſt uelut muſcus quidam, attamen recte in plantarum genere conſeri poteſt.* Plinius quoque, lib. 26. cap. 4. inter Lichenis genera hoc ipſum recẽſens, *Eſt aliud*, inquit, *genus Lichenis, petra tamen inhærens ut muſcus, qui & ipſe illinitur*, &c. Iccirco etiam in Dioſc. contextu ante dictionem, βρύον, vocem λιθοῦ ſeu λίθου deſidero. Illud porrò ὁ παρόδῳ annotes velim, quo loco apud Gal. Lichena δεῖ τοῖς ὑγροῖς καὶ διαπίδυσι πάσχειν φύσεσι, hoc eſt, *humidis & granulentibus petris innaſcatur*, ſcribitur, legendum ἀνὰ τῶ, διαπίδια, διαπίδια, ὑπόνιτα, ὑπόρρυτα, hoc eſt, *roſa.du.*

ἡλεχίμενον. σίμωνος] Plinius, loco citato, *Morbum quoque regium*, inquit, *cum melle ſanat, ore illitus & linguæ*: quaſi legerit, μετὰ μέλιτος ἡλεχιμένων τῶ στόματος καὶ τῆς γλώττης. & ἰδιώματος παραπλησίως. Neque verò Ictericis illinitur tantùm Lichen, ſed & propinatur. Siquidem Gal. lib. 9. de comp. φάρ. ex Archigene Lichenas cum aqua mulſa aut meraco potui dat ictericis. Cæterùm verum Lichen hæmorrhagias ſiſtere valeat, dubitaſſe quodammodo videtur Gal. 7. ſimpl. hiſce verbis: εἰ δὲ καὶ αἱμορραγίας ἴσασι, ὡς Διοσκορίδης φησὶ, τὸ ἰχθυοκολλᾶ. i. *An verò hæmorrhagias ſiſtat, uti retulit Dioſcorides, id uero neutiquam dicere queam.*

CAP. LIIII. παρωνυχίας καὶ κηρία] Ruellius & Marcellus, σταφυλὰς, legiſſe videntur: attamen, κηρία, legendum eſſe ſatis innuũt Galeni verba, 8. ſimpl. quo loco & ipſum Dioſc. citat. Παρωνυχία εἰσήνεγκεν ἀπὸ τῆς ἐνεργείας. ἰᾶται γὰρ παρωνυχίας. οὕτω δὲ Διοσκορίδης φησὶ, καὶ κηρία. hoc eſt, *Paronychia ab effectu nomen traxit, ſiquidẽ paronychias ſanat, & ut Dioſcorides refert, fauos quoque.*

CAP. LV. κυπείρου ὅσον] Sunt qui exiſtimẽt hîc à Dioſc. Chryſocomes ſeu chryſitæ radicem, cyperi radici ſaporis ratione conferri. Verùm quoniã ipſemet anteà, lib. 1. cap. 4. cyperum ἰσχνόπικρον, hoc eſt, *amaro guſtu*, eſſe voluit, hîc verò Chryſocomes radicem palàm aſſerit eſſe ὁ πρὸς γλυκὺ ὑπάνθρακον, hoc eſt, *ex dulci quodammodo auſteram*, vero ſimilius eſt figuræ tantùm quantitatiſve ratione hanc illi comparari. Aliqui tamen, κυπειῶνος, ὅσον τῆς ῥιζοτόμου, legendum cenſent, vti & nonnulli, πυρεθροῦ, ὅσον τῆς ῥιζοτόμου. At nobis religio fuit vulgatam multorũmque codicum autoritate ſtabilitam lectionem immutare.

σκίλλης κάθαρσιν ἴσχουσι] Ruellius Chryſocomes radicem cõtra vuluæ purgationes prodeſſe credidit. At nos veriùs *ad purgandam ualuam* reddidimus. Siquidem Gal. loco citato docuit, ἴσχει δὲ τῆς ὑστερικῆς καθάρσεως περιττωμάτων. hoc eſt, *menſtruæ purgationis prouocãdæ uim quandam obtinere.* Sed & Plinius de eadem radice agẽs lib. 21. cap. 20. *Potui datur*, inquit, *ad uiuina dolores in aqua mulſa decocta, aut menſtrua*, &c.

CAP. LVII. ἐλίχρυσον] Theoph. lib. 9. hiſt. ſtirp. ἑλιχρύσου nominat, Gaza ab aureo flore *Auricham* denominat. Plinius verò, lib. 21. cap. 25. ἑλίχρυσον potiùs dictam putauit, *quoniam*, vt ipſe vult, *flores illius ad ſolis repercuſſum aureæ lucis fulgent.* Themiſtagoras Epheſius, libro quem inſcripſit aureo, tradit inditum fuiſſe nomen ab Elichryſe nympha, quæ prima decerpſerit, vti teſtatur Athenæus, lib. x v. qui quidem Elichryſi florem ibidem loto aſſimilat. At Gal. nuſquam Helichryſi facta mentione, Amaranto vires eaſdem tribuit, quas Dioſc. Helichryſo, vt minimè ſit dubium, quin Galeni ἀμαράντου, ſit Dioſc. ἑλίχρυσον. Paulus ſeorſim amarãti & Helichryſi meminit, attamen locis diuerſis eaſdem vires aſcribit.

ἴχει δὲ καὶ καθαρσιν] Plinius χαμαιτέων ῥιζῶν, αἱ τῶ καμαίτου. legiſſe videtur. Siquidem loco modò citato, *Folia eius*, inquit, *trium obolorum pondere ſiſtunt profluuia mulierum in uino albo.* Attamen Paulus de Helichryſi coma, καὶ καθαίρουσι, inquit, βοτρύοι. Gal. verò cap. de amaranto, in genere ἀμάραντον ῥύματα ξηραίνουσι τε) ſcripto prodidit, hoc eſt, *fluxiones quaſuis exiccandi ui pollere.*

CAP. LVIII. πρὸς ἰσχιάδας καὶ] Pierique Chryſanthemon hoc & buphthalmon, tertio libro deſcriptum, vnam eandémque plantam eſſe crediderẽ, quoniam vtrique vires plane eædem à Dioſc. tribuuntur. Ac reuera Galenus cæterique Græci buphthalmi quidem meminére, nõ item Chryſanthemi. Sunt tamen qui χρυσάνθεμον, Caltham poëtarum, officinis Calendulam dictam, à buphthalmo planè diuerſam eſſe exiſtimarint. Inter cæteros verò acerrimi vir iudicij Gul. Peliſſerius Monſpelienſis Epiſcopus, vt nequid in deſcribenda Caltha deſideraretur, locum hunc ita reſtituendũ cenſebat: χρυσάνθεμον ἢ καλάθη, πρόσφατοι πίνα ἔκφυλλοι, πολίου εἰδοῦς φυτὸν πολύκλωνον καὶ φυλλῶδες, πολυχρῶ δὲ ἄνθη. hoc eſt, *Chryſanthemon ſeu Caltha, uenera eſt herba frutteſa, plures proferens caules, itemque folia, flores uero multifidos.* Attamen & florum, qui (niſi mendum ſubeſt) κάλυκα dicerentur, ex Nicol. Damaſceno & Alcmane Poëta meminit Athenæus, lib. x v. At ſunt etiam nonnulli, qui & in hac voce & in cæteris penitus vulgatã lectionem ſeruant, & Chryſanthemi nomine plantam aliam oſtendunt, à buphthalmo notis aliquot manifeſto diſtinctam.

CAP. LIX. καὶ παλαιστὴς] Lacuna in vetuſto codice legit, διὰ παλαιστῆς, hoc eſt, *duũm palmorum altitudine.* Ita quoque legi conſtat apud Oribaſium: ſed & Plinius, lib. 27. cap. 4. *Ageratum ferulaceam* eſſe ſcribit, *duorum palmorum altitudine.* Attamẽ viderit, quàm rectè vox, διὰ παλαιστῆς, cum ſequenti voce, ἑκατὸν, conueniat.

περαλείαι] Malui, περαλείαι, legere, quàm περαίνει. Siquidẽ Ageratum ſcripſit Gal. lib. 5. ſimpl. ἔστιν διναμικὸν διαφορητικὸς τε καὶ ἀπεπτικὸν τῶν αἰφαλιωμάτων. hoc eſt, *uim habere digerendi ſimul & meſenteria tumores arcendi*: quas quidem vires ab vrendi viribus quàm longiſſimè diſſidere nemo non iudicauerit.

CAP. LX. δεσμὶ δὲ ὀνομάζουσι] Verbenaca hæc, recta, vti quæ ſequẽti capite deſcribitur, ſupina, à Græcis dicta eſt. Latinis vtraque ſexu diſtinguitur: ſiquidem illa, mas: hæc, fœmina dicitur.

Περιστερεὼν autem vox ex eo deducta est, quòd circa eam herbam columbæ libenter versari soleant, vti certe quidem voluêre Dioscorides & Galenus. Alij verò, quòd ipsiδὲ iucunda esca sit, vti voluit Apuleius, vel quod ipsidem familiaris, vti Plinius. At piæ memoriæ Præceptor Rondeletius iccirco περιστερεὼνα dictâ putabat, quòd circa columbaria frequêtissimè reperiatur: quippe quam ex ipso fimo columbino prouenire crederet.

CAP. LXI. πολὺν μὲν πολεῖ τετράγ.] Lacuna legit in antiquo exemplari, πολὺν οἶνον πολεῖ καὶ ἡμιν τετράγ μιᾷ ἐφ' ἡμέρας πεπτικὸν πιόμενον. quæ quidem lectio probatior fortasse fuerit. Siquidê & ipse Plinius, lib.26.cap.12.inter alias Verbenacæ dotes scribit, *morbum regium impugnari Verbenacæ folio, obolo tribus ex vino albi hemina quatriduo.* Cæterùm lôgè plures Verbenacæ vires legas apud Aëtiû ex Archigene, Tetr.1.ser.1.quo loco eandem, Veneris etiam herbam nominat.

C. LXII. τραγὶ, μελαίνης] Plin.lib.26.cap.8. Astragali radices non nigras, sed *rubras* dixit, ibidémque addit, *in petrosis & apricis nasci*, pro eo quod habet Dioscor. ἐν ἀνάντεσι & σκιεροῖς, hoc est, *montosis & opacis.* Legitur tamê in vetere quodã Dioscoridis codice, *in montosis vel apricis seu Soli expositis.*

ἐν Μεμφιδὶ τῆς Ἀρκαδίας] Gal.6.simpl.de Astragalo: πάνυ δ' ἄφθονος ἐν Φενεῷ τῆς Ἀρκαδίας φύεται, i. *copiosissima frutex in Phenco Arcadiæ nascitur.* Plinius itidem, loco citato: *Nascitur in petrosis, apricis, & ijsdem montibus, sicut Phenco Arcadiæ.* Quamobrem & nos pro, ἐν Μεμφιδὶ, ἐν Φενεῷ, cû Oribasio reponendum censuimus: maximè cùm apud Autores nulla fiat Memphidis Arcadiæ mentio.

CAP. LXIII. πολὺν οἶνον τεθραμμένον λιπαρὸν] Plinius πολὺν ὦν, λιπαρὸν, γλυκὺν, legisse videtur. Sic enim ille de Hyacinthi radice, lib.21.c.26. *E vino dulci illita pubertatem celerat, & non patitur erumpere.*

ἡσσωμένης ὠμίζα] Sunt qui pro, ἡσσωμένης, κιττικαῖς, legant. At ego illa, ἡσσωμένης ὠμίζαις, minimè expungêda duxi, quoniam & Plinius, citato loco. *Contra serpentes & scorpiones morbumque regũ semen Hyacinthi cum abrotono dari*, commemorat.

CAP. LXIIII. φύεται ἐν ἀγρούσαις] Sic Theoph. lib.9.cap.13. ἐν γε δὴ μέσοις ἀγροῖς καλλίστη, σπαρτοῖς μὲν ἀχείοις τε καὶ ἐδέσμοις, ἐν δὲ τοῖς ἀγρανέσιν ἧττον εὐθαλὴς καὶ ἐν τοῖς κριθίνοις. οὗτος δὲ ὁ ἄγριος ἐρυθρὸν ἀ. *Aliud papaver erraticum agronomicũ, cichorio sylvestri simile; quamobrem in cibos etiam recipitur. Nascitur in aruis ac potissimùm inter hordea. Florem verò habet rubrum*, &c. Plinius autem, lib.19.cap.13. *Spontaneum quidem sed in aruis maximè cum hordeo nascitur, crucæ simile, cubitali altitudine. flore ruso & protinus decidente*, &c. vbi florem *rusum* dixit, quem Theoph. ἐρυθρὸν & Dioscor. φοινικοῦν.

ὁμοιότερον] Comparationem, quæ sit Papaveris erratici cum origani & thymi foliis, temerè & perperàm additam meritò suspicatur Cordus: quoniam cichorio sylvestri aut crucæ nulla est cum origano aut thymo foliorum similitudo.

πολλὸν δὲ χρείαν] Placuit mihi, æquè ac Manardo viro doctiss. Marcelli lectio, qui ἀπὸ τῶν, χειμῶνα aut potiùs, χρειῶν, χρείαν reposuit.

CAP. LXV. ἀλλὰ μέντοι ἀμείνων] Huic inscriptioni, τοῦ κέρατος, addere libuit, quod in vulg. exempl. desiderabatur: quoniam in hoc ipso cápite non de Papauere tantùm satiuo, sed & de varijs sylueſtris generibus agitur.

ὁ καὶ κόρυς] ἡ, ἀπὸ τῶ, ὁ, reponendum cẽseo: quoniam cognomen κόρυς, nõ semini, sed toti plantæ tribui sit verisimile. Quin neque seminis, sed ipsius potiùs capituli ratione, nempe à dolioli figura, planta ipsa cognomentum illud videtur accepisse.

ἔστι γὰρ ἁλίου πλῆθος] Sinceri opij alia experimenta legas apud Plin.lib.20,cap.18.vti & aliam parandi meconij rationẽ, quàm quæ deinceps habetur apud Dioscoridem.

ἄκαρ δὲ φασὶ] Attamẽ & ipse Gal.lib.2. comp. pharm. κατὰ τόπους, cap.1.collyria ex opio testatur multis tanto fuisse detrimẽto, vt etiam ἀμβλυωπίαν & βαρυωπίαν induxerint. Ideóque alio loco, nimirum lib.3.cap.2. non nisi magna vrgẽte necessitate ea vsurpanda monet, quia ferè particulas ad immedicabilem frigiditatem perducant. Sed & idem luculentiùs, quanta collyriorum ex opiò vsum damna sequãtur, docuit, lib.3.meth. med.cap.2.rursumque, lib.13.cap.vlt.ac proinde subiunxit, siquando illis vti nos cogat necessitas, non ita multò pòst ad illa transeundum, quæ vim opij maleficam corrigere valeant.

CAP. LXVI. φύεται ἐκ λιθῶν] Subnigra potiùs agnouisse videtur Theophrastus, dum lib. 9.cap.13.de Papaueris corniculati foliis scribit in hunc modum: ἔστιν δὲ φύλλον, ὡς φύλλον τῆς μελαίνης, πλὴν δὲ μείων. *esse* inquam *eum herbasæ nigræ, at minùs nigrum.* Iccirco fortassis & hoc loco Hermol.Barbarus αἰγὸς ὦν, λιθῶν, reponendũ censuit. Plinius certè quidem, lib 20.cap.19. folia corniculato Papaueri tenuiora tribuit, quàm cæteris sylueſtribus.

κεφὶς δὲ μικρὸν] Apuleius itidem ceratitis Papaueris fructũ paruum describit. Attamen Cordus non μικρὸν, sed μακρὸν potiùs legendum censuit: idque eo argumento, quòd Papaueris huiusce siliqua, etsi non ita crassa, oblonga tamen conspiciatur.

μέλανας, πυκνὰς] Hanc radicem Theoph.loco citato βραχεῖας describit, quo loco fortassis ἀπὸ τῶ, βραχεῖα, πυκνῶν subsituendum fuerit: quoniam eam crassam, neque tamen ita breuem esse, ipsa ἀπόψις indicet.

φύεται δὲ ἐπὶ θαλαττίοις] Et ipse Theophr.de hoc eodem Papauere sic habet, loco citato: φύεται δὲ ἐπὶ τῶν θαλαττίων, ἢ ἐπὶ τῶν πετρῶδῶν χωρίων. hoc est, *nascitur iuxta mare, locis saxosis.* Plinius itidem, lib.20.cap.19. *Nascitur in asperis maris, aut petrosis locis*: sed *petroso* potiùs *loco* legendum ex illo Theoph.contextu, quinis facilè iudicet.

πίνεται ἐξυδατούμενον πόσει] Plinius aliter, loco citato: *Alnum purgat diuidit cantabulo in mulso.*

CAP. LXVII. Ἡρακλεωτικὸν καλούμενον] In huius cognomenti reddenda causa frustra nonnulli sese torquent, dum hoc Papauer aut ab Hercule, aut ab Heraclea ciuitate ita dictum putant. At ego aptiùs ita dictum existimauerim, quòd à nonnullis contra comitialem morbum, qui etiam Herculeus dicitur, vsurparetur, vti & ipse Theophrastus, citato loco, testatus est.

σπυρὸν ἐπείρου] Sic Theoph.de Heraclio Papauere: ἐν δὲ φύλλον ἔχουσι τὸ σπυρὸς, ὃ ἐστὶν λεπτὸν ἀσπαράγου. *filiza Asparagi tenuitate.* hoc est, *filum habet quale struthum, quo linea dealbantur: radium eandem, in summa arca superficie sparsam*, &c. Sed

eorum verborum legitimum ſenſum mirum quàm infœliciter aſſecutus ſit Plinius, πτυελοῦ vocis homonymia deceptus, dum ſcribit in hæc verba: *Alterum è ſylueſtribus genus Heraclium uocatur, ab aliis aphrodes, foliis ſi procul intuearis ſpeciem paſſerum præſentaneis, radice in ſumma terræ cute, ſemine ſpumeo. Ex hoc lina ſplendorem trahunt æſtate, &c.* Fecit portò idem ille Theophraſti locus, vt αἱ μὲν ὠφέλιμαι δὴ λευκὴν ἔσεσθαι, ῥίζαν δὲ κοκκίνην ἔσεσθαι, reſtituendum iudicauerim, quanquam eorum, qui ſecùs cenſuerint, iudiciis non valdè repugnauero.

CAP. LXXIX. *αἴρῃ μαλακωτέρῃ*] Malim, *μαλακωτέρῃ. κέρμα μαλίζοντα*, hoc eſt, *ad colorem lanarum leuiter inclinantem*, ſcilicet *flores*, dixit Galenus, 8. ſimpl. cap. de Hyoſcyamo.

μανιώδης ἰσχὰς] Xenoph. in OEcon. *οἱ ὑοσκύαμον φαγόντες, ἐξεμανησαν γενόμενοι*: *qui hyoſcyamum ſumpſere, mente percellebantur*. Inde & Hyoſcyamus *altera* nomen apud Latinos obtinuit: neque enim vox eſt Arabica, vti exiſtimauit Plinius, ſed Latina potiùs. Altercum ſiquidè ita dictum putauit Scrib. Largus, *quòd qui biberint, mente abalienentur cum quodam uerborum altercatione.*

βέλτιον τῷ ἑνὶ ἢ χείρονα] Cùm duo modò tradita ſint à Dioſcoride ſucci ab Hyoſcyamo extrahendi genera, verbis hiſce plerique Interpretes ſignificari voluerunt, poſterius priore & præſtantius & innocentius eſſe. Cùm tamen vtrumque illud iure χείρονα ſit, ac neutrum ἑνὶ nomẽ mereatur, veriſimilius eſt cõferri hæc Hyoſcyami χυλίσματα cum lacteo ſucco aut liquore, qui ex vulnerata eadem plãta promanarit: quanuis non inficior interdum à Medicis κατεχρήσθαι ἑνὶ, αἱρῇ τῷ χυλῷ, ἤτοι χυλίσματος, & viceuerſa voces haſce pro illa, vſurpari.

CAP. LXX. *φύλλον ἔχει παραπλήσιον*] Plin. lib. 25. capite 11. *Pſyllium folijs* ait eſſe *cumino capiti non diſſimilibus*: quo loco *cumini capitis* nomine *κυνοκεφάλιον* herbam ſignificare videtur, quæ etiam *κυνόρριζον* ſeu *κυνόρριον* dicitur: à cuius folijs haud ita diſcrepant Pſyllij folia, niſi quòd anguſtiora conſpiciuntur.

ψυλλαλοῦ] Addit Lacuna ex vet. cod. *καὶ σταλικοῦ*. At alij codices vtrunque habent, *καὶ μαλαλικοῦ, καὶ σταλικοῦ*. Plinius, loco citato: *Vtitur ad refrigerandum & diſcutiendum ingens.* Nobis vulgata ſcriptura potior viſa eſt, maximè cùm ei Serapionis contextus ſuffragaretur. Attamen & illud ſcitu dignum eſt, Pſyllij ſemen diuerſis conſtare partibus, quarũ aliæ calfaciant, aliæ refrigerent. Siquidem interior medulla palàm calfacere guſtu deprehenditur: cortex verò refrigerandi vi præditus eſt.

δυοῖν οὐγκιῶν ἑξαπλοῦς] Legendum hauddubiè ex Interpretum omnium ſententia, *ἑξάλεως*. Nam & Plinius de Pſyllio, citato loco: *Acetabuli menſura in ſextario aquæ denſat ſe & aſperabit.* Sextarius autem cotylas binas continet, quæ Latinis *heminæ* dicuntur.

CAP. LXXI. *τρίχος καταῖος*] Gal. in ſimpl. *τρίχον* nominat, quanquam & *τρίχα* vocem agnoſcit Plin. lib. 21. cap. 31. *Strychno*, inquit, *quem quidam trychnon ſcripſêre*, &c.

CAP. LXXII. *οἱ δὲ φυσαλίδα*] *Veſicariam* hanc Latinis vocari ſcribit Plinius, lib. 21. cap 31. *quoniam ueſicæ & calculo proſit.* Attamen vt Græcis *φυσαλὶς*, ita & *veſicaria* Latinis iccirco potiùs dici videtur, quòd veſicam imitetur folliculus, quo acinus ipſe continetur quem quidẽ Dioſc. *πυρρὸν* deſcribit, Plinius verò *cæruleum*, Serapio *rubrum*, & rectè: ſiquidem exactè maturum rubentis ceraſi ſpeciem præ ſe fert.

CAP. LXXIII. *ὁ λεῖος πρανίζοντα*] Ita Serapio & Apuleius. At Theophr. hiſt. lib. 9. cap. 12. *πυῤῥότερον κόκκου, ὅσον rubicundiorem*, dixit. Eius autem verba referre libet, quoniam & in alijs deſcriptionis partibus à Dioſcoride euariat: *καὶ ὁ μὲν κύαμος πυῤῥὸν ἔχων τὸν ῥίζαν ὅσον αἷμα πυῤῥότερον ξηραινομένου δὲ, λευκόν. καὶ καρπὸν πυῤῥότερον κόκκου, φύσιν δὲ ἔχοντα μήλου, ἢ μᾶλλον τῇ γλυκείᾳ, καὶ αἱματώδει.* vbi legendum fortaſſis *αἱματώδει τῇ, γλυκείᾳ, καὶ ἁδρίᾳ.* hoc eſt, *Et ſomniferum quidem ſalanum ſanguinis modo rubentem habet radicem, dum effoditur: at cùm ſiccatur, candidam: fructus autem magis rubet, ſolitum thymallo ſimile aut malo cotoneæ, idque birſutum.*

CAP. LXXIIII. *ὁ ἔγχυτος*] Theoph. hiſt. ſtirp. lib. 9. cap. 12. *ὁ δὲ, κανθὸς, οἱ μὲν πυῤῥότερον* (aliàs *βρύτερον*) *καὶ μᾶλλον αἱματῶδες, οἱ δὲ, ἐρυθρόν.* Plinius, æquè ac autor librorum de Venenis, qui Dioſcoridi tribuuntur, Dorycnion & Solanũ manicũ omnino confundere videtur, dum Dorycnij appellationem huic Solano tribuit, itáque appellatũ ſcribit *ab eo quòd cuſpides in prælijs tingerentur: illo paſſim naſcente.* Attamẽ & erythron & neurida, itémque peritton alijs cognominatũ fuiſſe commemorat.

ἡ ἴδε, ἐργμὴ] Iſta verba nõ ſatis aſſecutus videtur Apuleius, dũ cap. de herba Solata LXXIIII. *Naſcitur*, inquit, *in collibus uel montoſis locis, thyrſos emittens deum uel duodecim ulnarum, ſine, ut Græci, orgyorum*, &c. At rectiùs Serapio, qui *mules illi deum aut duodecim* tribuit, *quorũ ſingulis ſit binũm brachiorum longitudo.* Theophraſtus itidẽ de hoc ipſo Solano: *ἔχει δὲ καὶ φύλλα ὅμοια δἰκύμῳ πολλῷ μείζω, τὸν δὲ καυλὸν, ὅσον ὀργυιᾶς.* i. *folium habet erucæ ſed maius: caulem ulnæ unius longitudine.*

καὶ παχυτέραν] Lego cum Oribaſio, *παχυτέραν*, hoc eſt, *craſſius*. Nam & Theophraſtus, loco citato, quanquã capitulum hoc, quod eſt in caulis cacumine, gethyo, nõ, vti Dioſcorides, oliuę, comparat, ſic habet, *κεφαλὴ δὲ ὅσον γηθύου, μείζων δὲ καὶ παχυτέρα*. i. *capitulum uerò eſt gethyi, at maius & craſſius.* Gaza *piloſius* vertit, quaſi *δασυτέραν* legerit.

καὶ πλατυμῶνα] Aldinus habet, *πλατυμόνιον*: quã lectionem ſecutus eſt Serapio, bonáque pars Interpretum, qui *planicea*, hoc eſt, *loca planis conſita*, verterunt. Reliqua exemplaria habent, non quidem, *πλατεῖαι*, quod idem planè eſſet, ſed *πλατυμῶνας*. Quàm verò varia ſint *πλατυμῶνος* ſignificata, videre licet apud Suidam, Heſychium & Theonem Arati Scholiaſten: necnon & apud Galenum, in exegeſi vocum Hipp.

δύο δὲ κ τριῶβολα] Theophr. loco iam ſæpiùs citato: *δίδοται δ' αὐτῆς, ἕως μὲν ὑπὸ ὄψιν ἔρχεται, καὶ δεκαδύο δραχμὰς τὸν ἀριθμὸν ἔνιαι, ὀκτὼ δραχμαὶ τὸν ἐλάττω μεγέθει δὲ καὶ φαυλότητι ὑπάρχουσι φαίνεσθαι, δύο δραχμαί. ἐὰν δ' ὦσι μὴ πανυπόπτως μεγάλαι, τρεῖς. ἐὰν δὲ συμπεφυκυῖαι φανῶσι, ὥσπερ κύλικες. ἐὰν δ' ὦσι λεπταὶ λίαν, πέντε δραχμαί.* hoc eſt, *Datur quidem eiuſce radicis drachmæ pondus, ſi ut quis laudat ſeque pulcherrimum putet placuerit. Sin uolueris magis ut inſanias, ſpectráque uaria ſibi repræſentet, drachmis duabus opus eſt: ſin ut perpetuò*

insaniæ, tribus. At si interimere animas fuerit, drachmæ quatuor ex ea exhibendæ. Plinius verò, lib.21. cap.31. *Drachmæ, inquit, pondere Græci autores lusum pudoris gigni dixerunt, species manes imaginesque conspicuas euersari demonstrantes. Duplicatum hunc modum, letiferam insaniam fuere. Quicquid vero adjicitur ponderi, repræsentare mortem,* &c. Sed eo loco vtrúnne vox, *pudoris*, redundet, ipse videris.

CAP. LXXVI. *μᾶλα ὄϊς ἐμφρὴς*] Sic Oribas. & Serapio, quanuis huius Interpres *mespila* vertit. Nonnulli, in quibus est Marcellus, *ὄϊς, ouis*, aut potiùs cum vet. cod. *μᾶλα λευκὰ ἐμφρὴς, ouorum luteo*, videntur legisse. Plin. lib. 25. cap. 13, Mandragoram hunc *mala* ferre scribit *nucum auellanarum magnitudine.* At Theoph. stirp. hist. lib. 6. cap. 2. fructum Mandragoræ describit, *μήλοις, μαχρὸν καὶ εὐῶδη τὴν χρόαν*, hoc est, *nigrum, acinosum & suaue odoratum*: ex quibus verbis satis patet, inter Theophr. & Dioscoridis Mandragoram esse haud leue discrimen. Adde quòd cùm vtrique Mandragoræ caulem deneget Dioscorides, caulis tamen meminit ibidem Theophrastus, quod ipsum etiam Plinium loco citato fecisse constat.

ὃν ἔνιοι νάρκισσον καλοῦσιν] Plinius *narcissum* aliquibus vocari scribit, & rectiùs: ita enim dictus videtur, quemadmodum & qui tertio loco describitur, quòd *ναρκοῖ*, hoc est, *stupefacit*, inducat. *Νάρκωσιν* inferiùs vno vocabulo eleganter dixit Dioscor. pro quo Marcellus falsò, *νάρκαρσιν*, reponendum esse suspicatur.

Λεῖα δὲ καὶ πάχεσιν] Iuxta vulgatam lectionem ita vertendum fuerat: *Quæ tritum postquam densatus fuerit, fictili vase recondi oportet.* Sed malim *αἰὲν τῷ, λειάνασι*, legere, *λειάνασιν*: quæ itidem omnium Interpretum sententia fuisse videtur. Neque verò sit verisimile, succum, vbi densatus fuerit, priùs teri oportere, quàm fictili vase reponatur. Siquidem vim suam longè melius compactum ac solidum, quàm in puluerem cõtritum, retinere facilè quisque iudicet.

CAP. LXXVII. *αἰδοῖον καλεῖται*] Hac voce appellari potuit Aconitum Pardalianches, quasi *πανθήμερον, ἔνιοι, δι' ἡμέρου τινὰ χαλεπαίνειν*, &, vt explicat Nicandri Scholiastes, *καιρῷ μέρει αἰσθομένῳ, malo mortæ perimens*, aut, vti voluit Plin. lib. 27. cap. 3. *radicis cammaro marino simula* ratione: nam & pro cammaro, quæ *καμμάρου* est species, *καμμάρι* vox apud Galenum, in Lexico Hipp. itémque apud EVstathium reperitur: quanquam idem frequentiùs *καμμάρος* dicitur, vti & Latinis cammarus seu gammarus. Hoc idem Aconitum etiã *θηλυφόνον* vocem obtinuit, fortasse *quia tactis genitalibus fœminei sexus animalium eodem die mortem inferat*, quemadmodum voluit Plinius, eiusdem lib. cap. 2. licet Theophrastus, qui quidem hoc genus Aconiti priuatim *θηλυφόνον* etiã appellauit, in genere & citra sexus distinctionem protulerit, lib. 9. cap 19. *κτείνουσι πᾶν τετράπουν, ταῦρόν τε καὶ ἀνδρῶν ἢν ῥίζα ἢ χυμὸς, αἰσθομένου*. hoc est, vt idẽ Plinius alio loco, puta lib. 25. cap. 10. expressit, *quadrupedem omnem necari. impositum ulcerandis radicem, aut folio mortis eundem diem.* Alij quòd feras seu belluas alias, si ab eis edatur, occidat, *θηροφόνον* seu *θηριοφόνον* cognominandũ censent: vti *μυιοβότανον*, quoniam, vt Plinij verbis vtar, lib 27. cap. 3. *procul & è longinquo muscas odore necat.* Sed quoniam nominum variorũ origines & causas attigimus, quod à nobis alibi perpetuò præstitum est, eadem quoque opera *ἀπὸ τοῦ* etymon expendere non abs re fuerit. Siquidem *ἀκόνιτον* dictum existimauêre Plinius, loco citato, & Ouid. 7. Metamorph. *ἀπὸ τοῦ ἀκόνιτον, id est, a cotibus*, in quibus nudis nasceretur, *nullo iuxta se puluere quidem nutriente.* Theophrastus verò *ἀπὸ τοῦ Ἀκονίτου* itidem cognominatum censuit, sed qui vicus fuerit Petiandynorum, seu potiùs, Mariandynorũ. Nam & in his Heraclea Ponti sita est, in qua præstantissimum eiusmodi Aconitum gigni idem Theophrastus asseruit. Porrò & aliam, at longè incertiorem, ex aliorum sententia nominis rationem Plinius attulit: *quoniam*, inquit, *Acontius eadem in morte esset, quæ cuibus in ferri ictu deterenda, statimque admota velocitas sentiretur.*

ῥίζα σκορπίου ἐκφαίνει] Ab hac scorpij similitudine nonnullis Aconitum Scorpium dictum fuisse à Theophrasto & Plinio traditũ est. Ille enim, *ἀπὸ τοῦ τὰς ῥίζας ὁμοίας ἔχειν σκορπίῳ*, scorpium appellatum scribit, Plinius etiam hũc imitatus, lib. 25. cap. 10. ita dictũ scribit, *propter radicis cum scorpio similitudinem, cuius etiam tactu moriantur scorpiones.* Alio vero loco, nempe lib 27. cap. 3 *quod radix mauruum pondus scorpionum modo*: id quod & ipsa Dioscoridis verba sonare videntur.

CAP. LXXVIII. *ὁμοία τῇ τῆς πεύκης*] Theophrastus, lib. 9. hist. cap. 16. folium habere scribit *κυκλοτερῆ, ῥίζας δὲ ὁμοίας τῷ χρώματι καὶ τῷ χυμῷ τερμίνθου. folium*, inquàm, *cichoraceum, radicem tum figura tum etiam colore nuci proximam.* In quibus, vt & in cæteris ferè omnibus, Theophrastus à Dioscoride planè discrepat. Sed quòd ad folium spectat, Dodonæus eo loco *ἀντὶ τοῦ, κυκλοειδὴς, βαθυκοίλους*, legendum esse suspicatur. Ego verò quantùm ad radicẽ (cui vni vim materiferã Theoph. tribuit) vna cum Marcello *ἀντὶ τοῦ, καρύᾳ, καρύϊνοι*, restituendum suspicor. quoniam etiam radicem Dioscor. *καρύοις* comparauit, vti Plinius, qui Aconiti genera minimè distinxit, *cammaro marino.* Alioqui Theophrasti Aconitũ aliud fuerit à Lycoctono Dioscorideo, quale nimirũ in postrema editione Dodonæus ad amussim repræsentasse videtur.

τῶν μακρόνεκρα πολλά] Præter veteris codicis fidem, mouit me Marcelli & Dodonæi autoritas, vt *μακρόνεκρα*, legere maluerim, quàm cũ vulgatis exemplaribus *μακρόνεκρα*: maximè cùm Aconito nostro *ἀνθρώπῳ*, cui Dioscoridis descriptio perbelliè conuenit, folia esse longè quàm platani minora sensus ipse iudicet.

CAP. LXXIX. *φύεται δ' ἐν πάρνηθι*] Plinius, lib. 25. cap. 13. *Cicutæ folia non ferulæ sed coriandro similia* dixit: & id quidem verùs fortassis. Quamobrem & Anguillara hoc loco *ἀντὶ τοῦ, πάρνηθι, πεδιάδι*, reponendum suspicatus est.

τὴν κώνειον αἰσθομένῳ] Cicutam potenter refrigerare, suáque illa vi refrigeratoria etiam enecare, apud omnes ferè Medicos est in confesso. Iccircóque mirari subit Cicutæ semen à Celso inter rodentia numeratũ fuisse, lib. 5. cap. 6. vnde fortassis & eorum manauit error, qui antehac semen Cicutæ, loco seminis Harmel, in compositionibus nimiùm leuiter vsurpabant. Verùm enimuerò cùm etiam Cicutæ semen, haud secus ac reliquas herbæ partes, refrigeratorium esse

conſtet, vel Cicutæ nomine dicendum herbam aliam deſignaſſe Celſum, vel ipſum hallucinatũ eſſe confiteri par eſt: vti & dum alia complura omnino roſionis expertia, gallam nimirũ (niſi fortè vſtam intellexit) lentiſcum, myrrham & omphacium inter rodentia ibidem recenſuit.

βοηθῆσαι δὲ οἰκείῳ τρόπῳ] Conſtat ex temperamentorum contrarietate manifeſtiſſima, *mentem Cicutæ*, (vt Plinij verbis vtar, lib. 23. ca. 2. *merum*) eſſe remedio, tanquam depellendæ, quam Cicuta intulerit, iniuriæ opportunũ: quod & ipſe agnouit Plato, in Dialogo qui Lyſis inſcribitur. Attamen & aliter verba hæc Dioſcoridis accipi poſſent, quaſi voluerit vino meraco vim Cicutæ maleficam adiuuari, dum ſcilicet vinum vehiculi vicem præſtans, vim eam cicutæ ad vitalia deducit: quod & ipſum Plinius innuit, lib. 25. cap. 13. quo loco de Cicutæ vi refrigeratoria & enecante agẽs, ſcribit in hæc verba: *remedio eſt, priuſquam perueniatur ad uitalia, uino naturæ exanſtatorio. Sed in uino potu, irremediabile exiſtimatur.*

ἐπιχέουσι δέ] Codex Catacuzenus ſic habet: *ἐπιχέουσι δὲ ϑάτερα Κρητικὸν καὶ οἶνον τὸν Λέσβιον ἡμιόλιον, καὶ τὸ Μενδαῖον, καὶ τὸ Λήμνιον, καὶ τὸ Κῶον.* Lacuna itidem ex vetuſto quodã codice *οἰνόμελι, Χίῳ, Κῷ* reponit. At Plinius, loco modò citato, *Maxima uis*, inquit, *uetæ ſimbus* (non, *Suſis*) *Parthorum, mox Lacunicæ, Creticæ, Aſiaticæ: in Græcia uerò, Megaricæ, deinde Atticæ.*

CAP. LXXX. *σμίλαξ, οἱ δὲ, Σίμαλον*] Arbor hęc eadẽ à Nicãdro in Alexiph. *σμῖλαξ*, à Theoph. verò, ſturpiũ hiſt. lib. 3. c. 10. *σμῖλος* appellatur: factũq; eſt vocis huiuſce ſimilitudine, vt hanc cum fraxino, quæ *μελία* eſt, confuderit Plinius: dum nõnulla fraxini foliis tribuit, quæ Taxi foliis veriùs à Theophraſto tribuuntur. Illam porrò eandem arborem à nonnullis etiam *Σίμων* vocari ſcribit Paulus, lib. 5. cap 48. itémque Autor librorum de venenis, qui hos de materia medica libros prõximè ſequuntur. Dioſcorides, hoc loco, *Σίμαλον* à quibuſdam vocitari ſolitam tradit.

ὁλόκληρα πῖσσα φύουσι] Theophraſtus, citato loco, Taxum nõ æquè ac abietem proceram eſſe ſcribit, eſſéq; magis *μαλακόξυλον*, id eſt, *abi ſimatum*, necnõ & folio quàm abietis pinguiore molliorẽque. Porrò & ab hac abietis ſimilitudine Nicãder in Alexiph. *σμῖλον ἐλατίδα*, eleganter dixit: & epitheti vice addit, *κακὸν δενδρύλλιον μελανόκαρπον δίπυρον*, hoc eſt, *in ſaltum, quæ morte luctuoſa perimit.*

ὑδρόλα μαλάσσουσι] Lacuna legit in antiquo codice, *πίνουσι*, vel *πίνοντα*. At ego malim, *μαίνεται*, hoc eſt, *ſaginatur*. Nã & hoc modo veteres Dioſcoridis Interpretes videntur legiſſe.

ἀμφοτέρως εὐστόμους] Contrà Theophr. lib. 3. c. 10. Taxi quidem fructum ab aliquibus etiã mãdi ſcribit: at ſuauem eſſe & innoxium. Plinius verò, *Taxi bacis lethale in Hiſpania præcipuè uenenum ineſſe* tradit, lib. 16. cap. 10.

ὡσαύτως τῇ Ναρβωνίᾳ] Quæ hìc de Narbonenſi Taxo prædicantur, eadem de Arcadica narrãtur à Plinio, loco modò citato. Arcadicę quidẽ Taxi fateor meminiſſe quoque Theophraſtum, lib. hiſt. 3. ſed non in eam ſententiam. Quin & idem Arcadicæ ſimilacis eodẽ libro meminit, verùm quæ ſit à Taxo longè diuerſa, & ilici ſimilis. Ea verò ipſa eſt, cuius etiam decoctum à Gal. lib. 6. *Περὶ τῶν τόπων*, cap. 3. ad columellam inflammatam vſurpatur. Taxi enim, quæ, vel ipſo teſte Galeno *δυνάμεως δὲ δυνάμεως*, mentionem eo loco fieri nullo modo fit mihi veriſimile: quanuis Cornarius, in ſuis commentariis, contrà ſenſiſſe videatur.

πίνουσι δὲ καὶ ϑύουσιν] Plutarchus, 3. Sympoſ. de pernicioſa iſta Taxi vmbra agẽs, tùm demùm eam ſcribit *ἀναπνεῖν καὶ ἀναπεφύκειν, ὅταν ὀργᾷ μάλιστα ὁποῖς τὸν ὕπνον*. hoc eſt, *lethalem eſſe Taxi umbram ſub ea ſopitis, quando turget & ad aperiendos flores ſuos natura ſponte mouetur.*

CAP. LXXXI. *κυνὸς κυάνου*] *Apocynon mœret quadrupedes omnes*, ſcribit Plin. lib 24. cap. 11. Galenus verò, 6 ſimpl. etiam hominibus venenum eſſe tradit, nec niſi impoſito eo vtendum cenſet, ad diſcutiendum. Et Plinius tamen, eodem illo loco, *Apocyni ſemen ex aqua pleuriticis omneſque laterum dolores ſanare* ſcribit: quod de ſumpto Apocyni ſemine intelligendum videtur. Verùm in eo Plinij loco mendum fortaſſe ſubeſt, quod meritò ſuſpicatur Cornarius.

CAP. LXXXII. *εἰς κυνας*] Lege, *εἰς αἶγας*, ſeù potiùs, *εἰς παχύνον, αἰγυπρίῳ*: vel, ſi mauis: *παχύνει ὁ ὑμφυὲς αἰγυπρίῳ παρεφ, καὶ αἰγυπρίῳ, πῖσι* &c. Paulò poſt verò, *αἰνὸν δὲ, ἰκανὸν ἔσεις*, iuxta vetuſti codicis fidem lego, *ἰκανὸν ἔσεις*. Siquidẽ quod intra Nerij ſiliquam continetur ſemẽ, lanoſis floccis albidis eſt implicitum, qualea & ij ſunt pappi, qui in Acanthio viſuntur.

ἀλφόμενον δὲ νεκτάλαι] Eadem planè de Nerio ſeu Rhododẽdro (*ἀλφὸν αἶγειον* vocat Lucianus, *laureã roſam* Apuleius) referuntur à Plinio, lib. 16. c. 20. At contrà Gal. 3. ſimpl. Nerion intrò ſumptũ, non pecoribus tantùm atque aliis quadrupedibus, ſed & hominibus pernicioſum venenatúmque eſſe cẽſuit. Verùm fortaſſe quod hominibus ſanis venenum eſt, idem ipſum à ſerpẽte demorſis eſt remedio: ſunt enim venena plerunque aliorum venenorum *ἀλεξιφάρμακα*.

CAP. LXXXIII. *Φόλιμοι δὲ εἰσι*] Fungos *Φόλιμους* dixit Dioſcor. quippe qui copioſum alimentum ſubminiſtrent, quanuis id craſſum & excrementitium: *alibiles* ex Varrone vertimus. Sed & ſi *Φόλιμους* accipere voluerimus, quaſi *βρωσίμους* ſeu *ἐδωδίμους*, pro *in ſaltus qui eſculenti ſunt*, non incõmodè, vt opinor, hæc ipſa periodus aliter ita verti poſſet: *Cæterùm qui fungi in alimentis locum habent, ægrè quoque diſſoluuntur*, &c. Porrò quibus ſignis eſculenta fungorum genera à venenatis & pernicialibus internoſcantur, & quænam his ſint remedio, illa verò quomodo præparari oporteat, quò innocentiora euadant, reperies & apud Athenæum, lib. 2. quo loco ipſius Diphili Siphnij verba recitantur.

CAP. LXXXIIII. *οἱ δὲ ἐφήμερον*] Galenus & Paulus duplex faciunt Ephemeron, Colchicum & illud alterum minimè venenatum, proximè ſequenti capite deſcriptum, quod iris ſylueſtris appellatur. Ita autem Galenus, 6. ſimplicium, vtrunque diſtinxit, quod Ephemeron radicem oblongam, Colchicum verò rotundam eandem proferat. Serapio hermodactylo tribuit, quæ Dioſc. vtrique huic Ephemero. At Paulus Ephemeri genera ab hermodactylo manifeſto diſcreuit, dum de hermodactylo & Ephemeris diſtinctis egit capitibus. Neque tamen Dodonæi ſententiam improbauerim, qui

officinarum

officinarum Hermodactylum, innocens Colchici peregrini genus esse existimat.

οἱ δὲ ἓξ ἀχεῖαν] Galenus & Paulus hoc genus Ephemeri etiam alio nomine ἓξ ἀχεῖαν appellari testantur: attamẽ à Serapionis Interprete Dodonæi censura confirmatur, qui κρῖνον ἄχειον hoc loco legendum existimat.

ἄνθη λίλιος] De Ephemero paulò aliter Plin. lib. 25. cap. vlt. in hæc verba: *Ephemerum filia habet lily, sed minora, caulem parem, florem cæruleum, semen supernacuum*, &c.

Cap. LXXXVI. *οἱ δὲ ὑγρολιθ ἀχεῖαν*] ἰξιόλιθ ἀχεῖαν, legendum cõiicio ex Apuleio: qui quidem, inter alia Helxines nomina, & huius etiam meminit. Ita porrò dicta videtur, quòd ipsius semina capitulis lappaceis inclusa sint, quæ quidem tenaci nexu instar visci vestes quibus adhæserint ad se trahãt, unde & ἑλξίνη quoque dictam volunt. Ἀκχεῖαν autem vocem ego corruptam existimo, ac pro ea fortasse reponendum πρόσινον, (siquidem & ab aliquibus ita vocari narrat Plinius, quoniam illius semine perdices præcipuè vescantur) aut etiam, si mauis, Vrceolarem aut Vitrariam. Nam & ista nomina huic eidem plãtæ à Latinis indita sunt, quòd detergendis vitreis vrceolis esset efficax: quanquam & alij à solo natali muralium seu muralem herbam vocauêre.

ὅμοια λιτοζώνῃ] Plinius *folia mistæ similitudinem plantagini & marrubio* esse scribit, libro 22. capite 17.

Cap. LXXXVII. *ψυκτικὸν, σταλτικὸν*] Contrà Gal. 6. simpl. Alsinẽ esse tradit aquæ & frigidæ essentiæ, adeóque citra astrictionem refrigerare: id quod itidem Paulus, Oribasius & Aëtius Galenum secuti testantur. Sed fortasse vox hæc, *σταλτικὸν*, perperàm & præter mentem Dioscoridis in contextum irrepsit. Et certè quidem in veteribus quibusdam codicibus minimè legitur.

Cap. LXXXIX. *καὶ ἀργιλώδεις*] *Γουνὸν, ἀργιλῶδες*, id est, *argillosis*: argilla enim terra ea est, è qua figuli vasa sua figlina conficiunt. Plinius hunc locum fortasse non satis assecutus, lib. 25. cap. 13. Ἀκχεῖον *mares in filiolibus masculo seri tradidit.*

Cap. XCI. *φύσιν ὑπὸ πόρκης*] Marcellus nonnulla hoc loco adiicit, ex libro 2. capite de portulaca agresti hauddubiè transcripta. Ac reuera quidem quod hîc tertium Sedi genus nominatur, & quæ sylvestris portulacæ nomine eo loco describitur, vna eademque planta esse mihi videntur, quæ duobus variis sit descripta capitibus, quemadmodum & suo loco anteà monuimus.

ἔχει θερμαντικὸν] Plinius, lib. 25. cap. 13. Sedi generibus omnibus vim eandem tribuit, refrigeratoriam nimirum & astringentem, in quo palàm à Dioscoride discrepat: qui quidem tertium hoc Sedi genus, calfaciens, acre & exulcerans constituit.

Cap. XCII. *φύσας πρὸς αἰδοίοις*] *astrictis pudenda laxat, seu, coarctata eadem dilatat.* Id enim sonãt verba Dioscoridis: neque dubium est, quin vitium id, quod φύσας seu φύσαιρας Græcè dicitur, nunquè in vulua muliebri atque in cole virili, interdum conspiciatur. Alioqui equidem, *Conectum olus glandem mutat*, reddidissem, sicque aptiùs vi-

rorum φύσαιρας expressissem.

Cap. XCIII. *καὶ λιθοβρύει*] Plinius, *lithospermi*, perperàm legisse videtur. Sic enim, lib. 25. cap. 13. de Cotyledone: *Est & aliud genus*, inquit, *eiusdem, sordidius folio*, &c. Ibidem, pro eo quod hîc habetur, *πρὸς δὲ μέσῃ καὶ τὰ ἀκρόφυα*, habet ille: *vsus eius ad eadem quæ iam*; pro quo legendum coniicio, *priora*, scilicet alterius Cotyledonis. Nam & vtriusque Veneris umbilici vires ab auxoi vtriusque viribus haud ita discrepant.

Cap. XCIIII. *κατὰ δὲ καὶ ἁιμόρροον*] Cùm Vrtica caliditate suâ partiúmque tenuitate menses cieat, mirum fortasse cuipiam non abs re fuerit, quòd Dioscorides sanguinis è naribus profluuia eandem sistere paulò antè pronuntiauerit. Et hoc ipsum tamen etiam retulit Plinius, lib. 22. cap. 13. scribens, *Vrticam tritam naribus inditam sanguinem sistere, & magis radicæ*: rursúmque, non ita multò post, *Sucum urticæ expressum litúmque fronti sanguinem narium sistere.* Sed & Aëtius, tetrab. 2. serm. 2. cap. 94. *Sanguinis è naribus eruptionem sistere* ait *foliorum Vrticæ sucum linamento exceptum & inditum, itémque folia ipsa tritu ac fronti impositu.* Quid quòd & ipse Gal. lib. de comp. med. κατὰ τόπους 4. cap. 8. Vrticam non dubitat inter ea recensere, quæ astringunt simul & repellunt? etsi vires planè contrarias illi tribuisse videatur, lib. 6. simpl.

Cap. XCVII. *ῥίζα ἄχρηστος*] Plinius, lib. 25. c. vlt. de Senecionis radice verba faciẽs, habet hûc in modum: Radices *aly* (dixerunt esse) *supernacuas, aly nervis vtiles, aly pene strangulasse.* At Senecionis quidem radicem superuacuam agnoscit Dioscorides, folia verò neruis vtilia, & pappos potu strangulare tradit. Ista fortè non satis assecutus Plinius, radici tribui putauit, quæ foliis & pappis rectiùs conueniunt.

Cap. XCVIII. *Θαλλιζῶν*] Galenus & Paulus Σκαλίζων vocant, itémque Plinius Thalietrũ: atque hîc quoque verisimile est lapsu propter similitudinem facili in κ mutatum. Porrò Thalietro Plinius, lib. 27. cap. 13. caulem assignat papaueris, quem Dioscorides eúmque secutus Galenus πτερὸν seu πτερὸν ἀπὸ μίσχου esse pronuntiarunt, hoc est, *rutundi crassitudine.*

Cap. XCIX. *σκαρδὰς, ἰχρὸν*] And. Lacuna legit in vetusto codice, *αὐλὸν ὃν σκαρδὰς, βρύθρῳδες*, hoc est, *lactucæ folio*: quam ego lectionem iccircò prætulerim quòd & ipse Theophrastus, lib. hist. stirp. 4. cap. 7. Musco marino folia tribuit herbacei coloris, lactucis non dissimilia, sed rugosiora & contractiora, hisce verbis, quę ita legi par est: *ἄλλο δὲ βρύον ὁ φύλλον ἔχει πᾶσι τῷ χρόᾳ, πλατὺ δὲ καὶ ἐν αἰδοίοις τοῖς βρύθρωδεσι, πλὴν μικροῖς καὶ ἄγαν συνεσταλμένοις.* Huius quoque vestigiis insistens Plinius, libri decimotertij capite vigesimoquinto: *Aliud*, inquit, *genus fruticum Bryon nomatur, folio lactucæ, rugosiore tantùm*, &c. Rursúmque, libro vigesimoseptimo, capite octauo: *Bryon marinum herba sine dubitatione est, lactucæ foliis simile, rugosa, nequi contracta, pluribus ab una radice exeuntibus foliis*, &c. quanquam etiam libri vigesimosexti capite decimo, *fucum marini genus, quod conchylijs substernitur*, faciens *lactucæ simile*, Muscum cum fuco confundere videtur. Ex illis porrò Theophrasti & Plinij locis hoc Dioscoridis caput illustrantibus palàm fit, *βρύον θαλάσσιον* non esse corallinam, vt

plerique sat turpiter hallucinati autumant, sed potiùs quod pro Musco marino altero depingitur à Matthiolo, itémque à Dodonæo pro fuco marino priore, quique lichenem, quem *hepaticum* vocant, aut potiùs pulmonariam vulgo dictam, referre videtur. Corallina verò ad fuci marini genera potiùs referenda videtur, siue is sit quem πτερόφυλλον, hoc est, *capillaceo folio*, simile fœniculo describit Theophrastus, siue etiam qui gramini similis esse traditur. Equidem apud Dioscor. corallinam esse crediderim, quam is φῦκος λεπτὸν, aut potiùs à foliis crispis tortisve, aut etiam mollibus, μαλακὸν nominat.

πρὸς σύψεις λειπόμενος] Ruellius, ψώρας, legisse videtur: in quam sententiam Plinius etiam, loco modò citato, sic habet: *Præcipua sistendi ex spissandique uis, & collectiones omnes inflammationésque cohibendi, præcipuè podagræ, & quicquid refrigerare opus sit.* Galenus itidem de Bryo seu Musco marino, libro 6. simpl. καὶ πᾶσι δὲ τοῖς διὰ θερμὴν κακοχυμίαν ἀναρρέουσι μᾶλλόν τι καὶ ψυκτικὸν. hoc est, *calidos omnes affectus euidenter refrigerando iuuat.*

Cap. C. τὸ δὲ λευκὸν] Lacuna legit in vetusto exemplari, οὐκ, hoc est, non, vtille quidem vertit, *capillaceum*, sed, *crispum & intortis* seu etiam *mollibus foliis*. Plinius quoque, libri 26. capite 10. Fuci marini tria constituit genera: vnum quidem latum, alterum longius, quadantenus rubens, tertium crispis foliis, quo in Creta vestes tingantur. Idipsum paucis immutatis repetit, libri 32. capite 6. Alibi verò, libro de cimotertio, capite vltimo, totidem quidem statuit Fuci marini genera: sed primum scribit folia gignere lata, colore viridi: alterum capillaceo esse folio, simile fœniculo: tertium graminis simile, radice geniculata & caule qualiter calami. Quin & Theophrastus, ex quo illa deprompsisse videtur. Algæ marinæ tria hęc agnoscit genera, lib. stirp. hist. 4. ca. 7. duo quidem φυτώδη, hoc est, *inuncta terram nascentia*, tertium verò πλεῖον, seu πλάγιον, hoc est, *in alto mari proueniens*, quanquam & idipsum in Creta φυτὸν τῇ γῇ φασὶν fatetur: ac φυτωδῶν quidem vnum statuit πτεροφύλλου, herbaceóque aut viridi colore, quod quidam à porracei folij figura & colore πράσιον, alij à forma & fortassis etiam vsu ζωστῆρα nominarêt: alterum πτερόφυλλον, hoc est, *folio capillaceo*, fœniculo simile: πόαν verò, quod tertio loco recensetur, gramini assimilat. Sed quid sibi voluerit Plinius, satis demirari non possum, dum, loco postremò citato, negat linguam aliam habere nomen. quod Græci vocant φῦκος, quoniam Alga herbarum magis quàm fruticum vocabulum intelligatur: interea tamen, lib. 32. c. 6. & alibi eundem Fucum algæ nomine designare non veretur.

πολυσχιδὴς καὶ πᾶς φαγ.] Rectiùs fortassè, πολὺς πολύχους (seu πολυσχιδὴς ὡς δάκτυλος) καὶ πᾶς φαγγιωτός.

ὅπως ἀλόπου ῥίζιον] Anguillara quidem tertij Fuci folia à Cretensibus fœminis commanducari & ad fucum adhiberi solita narrat: at de radice nil tale commemorat. Anchusæ verò radice colorem etiam natiuum olim solitas mentiri mulieres non est dubium, quoniam malas eleganti commendet purpurisso: attamen, quicquid affirmet Dodonæus, haudquaquam occurrit Græcus vllus Autor, apud quem radix ea φῦκος nomine significetur. Quare verùs φῦκος, è quo Latini fucum suum mutuati sunt, existimauerim non quidem radiculam fuisse, sed factitiũ potiùs quoddam medicamentum è cerussa paratum, cuius etiam Galenus ipse meminerit, lib. 9. simpl. tum cap. de cerussa, tum etiam in præfatione, quam metallicis medicamentis præfixit. Quin & illud ipsum Aëtius, quodam loco, φῦκος βαφικὸν cognominauit. Sed vide num fortè sit apud Dioscor. hoc loco legendum ἀπὸ ῥίζιον, ψιμυθίου, cùm aliud nil sit φῦκος, quàm cerussa ipsa varia lotura ad mulierum fucos præparata.

Cap. CI. ἄμυον αὐτὸν] Potamogeton, vt scribit Plinius, lib. 26. cap. 8. *similis betæ foliis, minoribus tantum hirsutoribusque*, &c.

Cap. CII. χωρὶς ῥίζης ξύν] Verisimile est, si non sunt huic plantæ veræ radices, fibras saltem radicum loco subesse, quibus velut ore alimentum suscipiat: quo quidẽ, dum viuit, carere nullo modo potest. Alioqui non minùs fabulosum hoc foret, quàm quod & ipse Dioscor. de malabathro prodidit, lib. 1. cap. 11. Quòd verò & huic plantæ radicem hoc loco negauit, ideireò factũ est, quòd folia fortasse sessili sua basi radices ita occultant, vix vt illę conspici possint.

πρὸς τὰ τῶν αἱμοῤῥαγίας] Plinius, lib. 24. cap. 18. de Stratiote aquatica: *Sanguinem quoque qui defluit à renibus potu cum thure masculo mirificè sistit.*

Cap. CIIII. καὶ τῆς λευκῆς ὁ αὐ] His verbis quatuor Verbasci genera traduntur à Dioscoride, dũ Verbascum distinguit in album & nigrum, albúmque subdiuidit in marem & fœminam. Dioscoridem in tradendis Verbasci differentiis iisdẽ sequitur & ipse Gal. 8. simpl. hisce verbis: ὁ μὲν γὰρ τῶν φύλλων πλατύς, ὁ δὲ μέλανος. καὶ τῆς λευκῆς ὁ μὲν ἄρρην, ὡς καὶ φύσιν ἔνιοί φασιν ὁ δὲ θῆλυς, ὡς μείζων. hoc est, *Est quoddam Verbasci folijs candidis, alterum ipsdem nigris: & illius quidem duo sunt genera: mas, cuius folia angustiora: & fœmina, cuius grandiora*, &c. At Plinius, libro vigesimoquinto, capite decimo, vnicam duntaxat Verbasci differẽtiam agnouisse videtur, dum scribit in hæc verba: *Verbasci genera habet prima duo: album in quo mas intelligatur: alterum nigrum, in quo fœmina.* In cæteris tamen quæ sequũtur à Dioscoride haud ita multùm euariat.

ἔχει δὲ κλῶνας] Quidam vetus codex αὐτὸ τὸ, κλῶνας, legit, δακτύλους. pro quo fortè reponendum esset, σπονδύλους. Lacuna verò in alio vetusto codice legit in hunc modum. φύσιν διπλασιαζομένην ἔχει κλῶνας οἷον τοὺς βαλάνους, ὥστε περίπλεκτον. Eandem quoque lectionem secutus videtur Oribasius. At ego vnica mutata vocula lectionem vulgatam retineo, nempe αὐτὸ τὸ κλῶνας, lego, κλῶνα. Neque enim foliorum, sed florum potiùs situm circa virgas hîc depingere velle videtur Dioscorides, qualem nimirum & in vtroq; marrubio describerat, dum marrubij quidem nigri flores diceret περιεστάναι τοῖς κυκλοῖς ὀχετοῖς, albi verò, οἷονεὶ σπονδύλους.

Cap. CVI. διώσματα καὶ ὑγρὰ] Hæc eadem repetũtur à Galeno, 6. Simplicium, totidem verbis: sed ad perniones & ambusta, nulla fœminis Arctij facta mentione, radices, folia & caules tãtummodò commẽdantur à Dioscoride in lib. 1. περὶ ὑγρ. cap. 178. & 179. vnde & quidam hoc loco αὐτὸ τὸ,

κυρτὰς, καμπὰς legendum ſuſpicantur.

CAP. CVII. Τὰ ὀπὸ τῶν λυγισμῶν] τὰ ὀπὸ τῶν λυγισμῶν ἄρθρα ἀλγήματα, *dolores articulorum ex contorſionibus ortos* verto cum Ruellio: nonnulli alij *ex artuum confractionibus ortos* interpretantur: quoniam λυγισμὸν repertum apud Heſychium exponi, ἀνάκαμψιν μελῶν: pro quo ibidem rectiùs fortaſſe legas, ἀνάκαμψιν μελῶν. Nam & antè idē Heſychius τὸ λυγίζειν expoſuerat, κάμπτειν ἢ στρέφειν; hoc eſt, *flectere aut torquere*, deducta ſcilicet voce ἀπὸ τοῦ λύγου, *lumbi*, ἰσχνὸς φωνῆς, ἀπὸ μέσης ſcil. ſeu *ſalix amarina*, quæ quidem inter vitilia omnia lentore & flexibilitate pollet. Hinc factum eſt, vt λύγισμα ſeu λυγισμὸν ἀπὸ τῆς στρέμματος accipiendum putarim, hoc eſt, *pro luxatione ſeu contorſione*. Nam & hac voce vſus eſt Cicero, quamuis pro ea quæ in articulis fit contorſione, *luxationis* vox in vſu frequentiore ſolet eſſe.

CAP. CX. Διαφύσει λύγιος] Addo ex Gal. & Plinio, ὅσον ὁ κύπρος, quāuis alioqui ſat iſta ſubaudiri poſſent. Quia enim Fumariæ ſuccus inſtar fumi lacrymoſus eſt, (hanc enim vocem Horatij exēplo vſurpare libet) tota herba apud Græcos κάπνος ſeu καπνὸς, vti apud Latinos *fumaria*, nomen inuenit.

τοὺς ὀφθαλμοὺς ἀπὸ βλεφάρου διπλοῦ] Lacuna ex vet. cod. legit: τοὺς ὀφθαλμοὺς βλεφάρου διπλοῦ ἐλκωδεστέρους τρίχας ἀπὸ πάλλει ἢ κάμπτει, &c. quam lectionem plerique Interpretum ſecuti videntur. At ego vulgatam lectionem lubens retineo: ſed, ἐλκωδεστέρους, ex Lacunæ codice addo: vix enim Fumariæ ſuccus illitus eiuſmodi pilos aboleret, niſi priùs volſellis euulſi forent. Per διπλοῦς autem βλεφάρους, cum palpebrarum ſeu potiùs ciliorum affectū deſignari exiſtimo, qui à Medicis διπλοῦς ſeu διπλόης, & ab Autore Iſagoges etiam διπλόης dictus eſt. Eſt autē is βλεφάρου ſpecies, per quam ſub ciliis naturalibus pilorum ordo alius præter naturam ſuccreſcit, qui oculorum membranas pungit, atque adeò fluxiones in oculos ſæpenumerò concitat.

CAP. CXI. Ὁ δὲ χαλκάνθης] Quod hîc Dioſcorides expreſſo è Loto ſatiua ſucco, idem ipſum Plinius, lib. 22. cap. 21. illius foliis tribuit, hiſce verbis: *folia eius cum melle, oculorum cicatrices, argema, nubeculas diſcutiunt.*

CAP. CXIIII. περὶ δὲ καύλου τοιούτου] Caulem hunc, non vulgaris quidem fabæ, ſed AEgyptiæ, cauli conferri facilè colligitur ex Theophraſto: qui quidē, lib. 4. ſtirp. hiſt. cap. 10. vbi fabam AEgyptiam deſcripſit, illico poſt huius etiam Loti partes omnes, nempe caulem, folia, flores, caput & radicem quoq; ipſam, quam κάρηνον nominat, ita luculentè depingit, vt ad lucem huic capiti Dioſcoridis afferendam nihil ampliùs deſiderari poſſit. Inde & ſua mutuatus eſt Plinius, lib. 13. cap. 17.

λευκὸν, ἐρυθρὸς κρίνου] Callixenus Rhodius in ſuis de Alexādria libris, vti refert Athenæus, lib. xv. floris Loti duplicem agnoſcit colorem: *alterum*, inquit, *ſimilem roſæ, ex quo nectebantur corona, quas proprie vocabant Antinoias: alterum cyaneum, è quo latina corona fiebat.*

CAP. CXVI. περὶ καυλοῦ καὶ τῆς φύσεως] Plinius, lib. 24. cap. 16. floris inſuper mentionem facit, hiſce verbis: *Myrrhis, quā aly ſmyrrhizam, alij myrrhem vocant, ſimillima eſt cicutæ, caule foliiſque & flore: minor tantùm & exilior, cibo non inſuauis*, &c. Varia porrò nomina, quæ huic herbæ tribuuntur, omnia ſat conſtat ab odore myrrhæ, quem refert ipſa radix, indita fuiſſe.

CAP. CXVII. μύαγρος] Paulus AEgineta, lib. 7. in litera M locis duobus diuerſis de hac eadē planta egit: ac priore quidem, μύαγρον appellat, poſteriore, μύαγρον, ἥτις ἀγρίομυρον: hîc quidē Dioſcoridis, illic verò Galeni ipſiſſima verba referens. Cæterùm in hoc ipſo capite αἱ ἀπὸ τῆς, φαρέτρας, πάλλει ſeu πάλιν reſtituendum eſſe amplius nemo fortaſſe dubitat.

CAP. CXVIII. ὀνάγρα, οἱ δὲ ὀνοθήραν] Hāc plantam itidem ὄνυχον, ὀνοχείλην, ὀνοθήραν nominant Galenus, Paulus & Oribaſius. Attamen rectiùs ὀνάγρον aut ὀνάγραν, vel etiam ὀνοθήραν legas ex Theoph. & Plinio: quoniam ἀπὸ τῆς ὄνου, nimirum *à faculate aſini, quam refert*, nomen accepiſſe videtur: ſiue quòd radix arefacta vinum oleat, vti referunt, ſiue quòd haud ſecus atque vinum feritatem animalium mitiget. Crateuas apud Plinium etiam OEnotheridem appellat. Porrò ex Theoph. cap. 21. lib. 9. ſtirp. nōnullā, quæ in hoc contextu vitio non carent, emendare facile fuerit: ſcilicet pro, λευκάνθεμα, reponendum καπνόφορα, itémq; pro, ῥίζαι μικραὶ, μακραὶ, vti nos fecimus, veterū codicum fidē ſecuti. Sed & ex Theoph. ſententia, longā OEnotheræ radicem fecit Plinius, lib. 26. cap. 11. In radicis tamen colore manifeſtò diſcrepat à Dioſcoride Theophraſtus; dum hic illā ἐρυθρὰν καὶ μεγάλην, *rubram & grandem*, ille λευκὴν *albam* deſcribit: niſi fortè Dioſcoridi de interiore, Theophraſto de exteriore radicis parte agere viſum eſt.

τὰ θηριώδη ἕλκη] θηριώδη ἕλκη aliàs *effera* ſeu *efferata*, vel etiā *ferina ulcera* verti. Hîc Plinij exemplo, à cuius ſermone vix niſi coactus diſcedere ſoleo, *efferantia ſeſe ulcera* interpretari viſum eſt. Siquidem & apud Plinium, lib. 26. cap. 14. quo loco legitur: *per ſe OEnotheria efferentia ſeſe ulcera ſanat*, pro *efferentia*, *efferantia* legendum eſſe ex hoc loco quiuis facilè coniiciat.

C. CXIX. τὰ κάτωθεν φυλλάρια] Hunc locū depraua tū eſſe, & pro, φυλλάρια, vocē aliā deſiderari crēdiderim. Neque enim veriſimile fuerit vnius & eiuſdem herbæ folia ab imo roſeorū ſpeciem referre, puſilláque eſſe: reliqua verò quæ è caule proſiliunt, bugloſſo ſimilia & longiora. De caule itidem, τετράγωνος τὰ κάτωθεν, legendum videtur: quoniam paulò pòſt ſubdit Autor, τὰ ἀλοιπὰ τοῦ καυλοῦ ὀλιγωρίᾳ, hoc eſt, *ſummam caulis partem rotundam eſſe*. Ita porrò imam caulis partem ſummæ videtur opponere, dum hanc ſcribit eſſe rotundam, illam verò triangularem. Sed & γωνίαι ſeu anguli, de quibus deinde agitur, minimè ad folia, ſed ad caulem potiùs referri debere videntur, cui quidem tres illi ab imo anguli tribuuntur. Etſi verò ſuſpecta mihi eſt tota iſta periodus, attamen verbum verbo reddere ſatius duxi, quàm (quod fidum Interpretem minimè decet) citra codicis vllius autoritatē liberiùs quicquam immutare.

καὶ μακρόπους] Plinius, μικρόπους, legiſſe videtur, vti etiam in vetuſto quodam Dioſc. codice habetur. Ille enim de Cirſio agens, libro 27. cap. 8. *folia*, inquit, *bouis linguæ ſimilia, minora*. Idem plantam hanc, quæ in Aldino Dioſc.

codice per literarum metathesin χρυσίον nomine effertur, rectiùs Crysium nominat, ducto scilicet ἀπὸ τῆς χρυσῆς nomine, hoc est, *à auriacha*, quibus illa remedio esse fertur.

CAP. CXX. περυρωῦ ἢ μάλιστα] Sic legunt Serapio, Oribasius, Ruellius, Cornarius & Anguillara. At Cordus, Marcellus & Matthiolus, loco disiunctiuæ particulæ, ἢ, copulatiuam, καὶ, reponunt. Existimant enim idem genus Asteris hic describi, quod floris foliola, quæ quidem capitulum ipsum ambiunt, habeat purpurea, medium verò capitulum luteum. At ego duo Asteris genera floris colore distincta depingi existimo, quorum vnum illa eadem floris foliola habeat purpurea, alterum lutea: nam in vtroque genere quod medium floris locum tenet, citra controuersiam melinum seu luteum visitur.

αἱρεῖ δὲ σύμπαν] Hæc omnia vsque ad illud, λημίζει, in vetusto quodam codice minimè legũntur: & certè quidem ex capite de Viola totidem penè verbis translata, atque adeò huic capiti perperàm adiecta videntur. Enimuerò tale nihil de Astere proditum est à Galeno, Plinio aut Auicenna: qui tamen hac ipsa periodo recẽsitas vires violæ rectiùs tribuerunt. At Serapio easdem planè facultates in vtroque capite retulit.

CAP. CXXI. τὸ κατ' ἄκρον τὸ πέταλον] Plinius itidem in hanc sententiam sic habet, libro 27. capite 11. *Isopyron aliqui Phasiolon uocant, quoniam folium quod est ansis simile, in pampinos*, (vel vt Cornarius ex veteri codice restituit, *in phasioli pampinos*) *torquetur*. Vt vt sit, vox, πέταλον, hoc loco mihi non parum suspecta est. Assimilat enim Autor Phasiolo Isopyron, quoniam ad similitudinem Phasioli in summo vel extremo folio clauiculam gerat. At certè quidem est Phasioli syluestris genus quoddam, cuius foliorum pediculi in capreolos exeunt. Attamen si noster Phasiolus cum Dioscor. Phasiolo seu Smilace hortensi vnus & idem est, vti certè videtur, nusquam (quod & antè in cap. de Smilace hortensi admonuimus) in ipsius folio, sed neque in aliis illius partibus clauiculam seu pampinum liceat animaduertere: nisi fortè velimus caulis extremitatem, quæ vicinis perticis fruticibús ve aduoluitur, ab vsus similitudine πέταλα nuncupare. Sed faciamus ita esse. Attamen si Isopyron Phasiolo huiusmodi clauiculæ ratione assimilatur, tùm quoque hoc loco non, κατ' ἄκρον τὸ πέταλον, sed potiùs, κατ' ἄκρον τὸν καυλόν, legendũ fuerit. Dodonæus quò promptiùs ab hac difficultate sese expediat, nobisque faciliùs persuadeat, praetense trifolium esse Dioscoridis Isopyron, vna litura ista Dioscorides verba expungenda censet: τὸ κατ' ἄκρον τὸ πέταλον ἕλικα φύειν.

CAP. CXXIII. ἑνικὸς βρυωνίης] Vulgata exemplaria ἀφὶ ἑνὸς πεταλίου, perperàm. Marcellus ex veterum quorundam codicum fide ita legit: λεπτὸν αὐτὸς ἔχει ἑνικὸς βρύου ἢ πεταλίου. At nos vetusti alius codicis, qui in Sambuci, itémque eius qui in Lacunæ manus incidit, autoritate freti, ἑνικὸς βρυωνίης, legere maluimus: maximè cùm ei plantæ, quam cum Autoribus Aduersariorum Cacaliam esse credimus, quæque in vicinis nostris montibus satis frequens visitur, muscosum florem Bryoniæ flori haud ita dissimilem esse compertum habeamus.

ὁ οὖν βρυχεδὴν] Galenus, nusquam Cacaliæ facta mentione, tribuit eadem Cacano seu Cancano, quæ Dioscorides Cacaliæ: vnde facilè colligitur, vnam & eandem esse herbam Cacaliam Dioscoridis & Galeni Cancanon. At Paulus errore manifesto diuersas fuisse plantas satis innuit: dum, Cancani priùs facta mentione, Cacaliam deinde facit Cancano similem. Atque id genus erroris apud Paulum tam frequens deprehenditur, quàm quod maximè.

CAP. CXXIIII. Ἐν δὲ τοῖς ὀποπάνακι] Inter naporum genera Bunium hoc recẽsuit Plinius, lib. 20. c. 4. Sed semen, quod Dioscorides nominatim σίμινον esse pronunciat, ille contrà *urinam mouere* scripsit, *si non lini semen una bibatur*. Etsi enim paulò antè apud eundem Scriptorem Bunium legatur, *uesicæ & urinæ utile*, pro *urinæ* voce, *Remoræ* eo loco legendum coniicio: quoniam illa Dioscoridis verba exprimere voluisse sit verisimile, quæ sic habent, καὶ πορεῖς καὶ κύστεως ὀφελοῦσιν, futuráque sit alioqui in paucis illis Plinij verbis manifestissima contradictio.

CAP. CXXVI. μαχαίνης δὲ] Fuchsius, Dodonæus & Autores Aduersariorum hederam, vulgò terrestrem dictam, veram & legitimam Chamæcisson esse dum sibi persuadent, hoc loco pro, μαχαίνης, μαχαίνης legendum censent. Dodonæus præterea cùm terrestris hederæ folia floribus longè amariora esse deprehenderet, transposita iudicauit quæ hîc de florum amaritudine dicuntur, eáque potiùs ad folia referri debere. Mihi quidem, dum quid certius sese obtulerit, nihil immutare visum est. Attamen cùm Plinius lib. 24. cap. 15. suam Chamæcisson faciat *spinum tritici modo*, aliam fuisse à Dioscoridis Chamæcisso, aut in Plinio mẽdum aliquod subesse, facilè crediderim.

ὀβολὸν ὑδρομέλι ἑνὶ] Ruellius, λ' ἢ μ', legisse videtur. Dissidet itidem à Dioscoride Plinius, dum citato loco scribit in hæc verba: *Bibunt Ischiadici pilulæ tritæ obolo in uini cyathis duobus, septem diebus, admodum amara potione.*

CAP. CXXVII. Χαμαιλεύκην πιεῖν] Galenus & Paulus χαμαιλεύκης itidem mentionem faciunt. At Plinius, libri vigesimiquarti capite decimoquinto, seorsim Chamæleuces & Chamæpeuces meminit: & Chamæpeucæ quidem eadem tribuit, quæ Dioscoridis Chamæleucæ. Chamæleucen verò eam esse tradit, quæ alio nomine Farranum seu Farfugium, aliàs Bechion nominetur: vti reuerà & inter Bechij synonyma in Dioscoridis nothis vox illa reperitur. Iccirco & *Chamæpeucen* potiùs, quàm *Chamæleucen* legere visum est, Valerij Cordi exemplo, qui ita quoque in emendationibus quibusdam Dioscoridis codicibus scriptum reperisse se asserit. Huc & illud accedit, quòd cùm herbam hanc Dioscor. λεύκανθον esse profiteatur, ei minùs aptè conuenit χαμαιλεύκης appellatio: quippe quæ indubitanter *humilem populum* designet: populi verò albæ folia altrinsecus incana lanugine vestiri, nedum λεύκανθα conspici, vnicuique constet.

CAP. CXXIX. ἄκαυλον ὅλη γῆς] Aut Dioscorides tùm demùm caule vacare Cynoglosson intelligi voluit, cùm humi sternitur: aut certè

ab eo Plinius dissidet, qui eidem plantæ caules seu thyrsos assignat, & recte quidem. Quoniam Cynoglossum (liquidem illud est, quod vulgaris Cynoglossi nomine passim occurrit) cum primum assurgit seseque à terra attoliit, caules incipit producere, quos Plinius thyrsos appellauit: ante verò id tempus, nempe primo aut altero, interdum etiam tertio sui ortus anno, caule penitus vacare deprehenditur.

CAP. CXXXI. Ἀκτινίδιον] Ista herbula Cemos Plinij fortasse fuerit, tum quia vox ea in Dioscoridis nothis etiam inter Leontopodij synonyma reperitur, tum quia & Cemon ad amatoria proiecisse innuit Plinius. Ab hoc verò Dioscoridis Leontopodio longe diuersum fuisse constat illud, cuius aliquoties meminit Plinius. Sed & quod Actius & Apuleius Leontopodium nominant, non aliud quàm Leontopetalon esse palàm est.

CAP. CXXXII. ὑπογλωσσον] Ex Galeno & Paulo legere malim, ὑπογλωσσον. Nominis verò etymon declarat Galenus, & simpl. hisce verbis: ὑπόγλωσσον ὠνόμασται διὰ τοῦτο, ὅτι τῶν ἄνθους ἐστὶ κεφαλῆς τὰ ἄκρα ὑπὸ τὴν γλῶσσαν ἔχον. hoc est, *Hypoglossum ex eo nomen traxit, quod summos illius corymbos proximæ velut ligulæ subiiciat.* Hypoglossam itidem vocat Plinius, eámque ita describit, lib. 27. cap. 11. *Hypoglossa folia habet sylvestri myrti, amara, spinosa, & in his ceu linguas folio parvo exeuntes de foliis.* Lacuna neque ἐπιγλωσσον neque etiam ὑπόγλωσσον, sed ὑπογλωσσον potiùs legendum existimat, itáque dictum censet, quod foliola, quæ de foliis exeunt, epiglottida imitentur.

CAP. CXXXIII. ἁμαρὶς ἀνάκαμπτος] Theophrastus, lib. 9. hist. stirp. cap. 21. ἀντίρρινον (malè siquidem legitur, ἀντιρρίζιον) καλοῦσιν, ὅμοιον τῇ μὲν ἄνθει ἐλατίνῃ ῥίζᾳ δ' οὐχ ὑπάρχον. hoc est, *Antirrhinon simile est aparinæ: radicæ verò nullæ ac ferè nullæ subsunt.* At Plinius, lib. 25. cap. 10. *Antirrhinon simile facit lino, radix nulla, flore hyacintho, semine muli nertum, &c.* Vterque in collatione palàm à Dioscoride discrepat.

λύκοι ἀχεῖαι λυχνίς] Sic & Galenus, in Gloss. Hipp. vt βουκράνιον, ita & λυχνὶς ἀχεῖα nominari Antirrhinon scribit. Ex hoc autem loco coniiciunt nonnulli, priùs in florum comparatione legendum fuisse, ὅμοια λυχνίδι, non item, ἀδιάντῳ. Sed & Dioscorides ipse anteà λυχνίδος florem ἀδιάντῳ assimilauit: quare nihil refert, siue λυχνίδι, siue ἀδιάντῳ legas. Plinius haud ita magno discrimine Antirrhini florem, vti modò dictum est, hyacintho similem prodidit.

CAP. CXXXIIII. κάρδαμον δὲ ξυρανθέμῳ] Malim, ξυρανθέμῃ, nempe καλαμίνθῃ. Neque enim verisimile est ipsum semen ita curuari contrahique, vt milui exanimati vngues referat. Sunt qui de Catanances capitulis, seu potiùs siliquis, hoc intelligi voluerint. Plinius certè quidem, lib. 27. cap. 8 simpliciter protulit, Catanancem herbam Thessalam electam ad amatoria coniectura, quoniam arescens contraheret se ad speciem vnguium milui exanimati.

μῆλου μήλῳ ἴσα] Plerisque vox ista, μήλου, hoc loco merito suspecta est: quandoquidem alienum videtur, vt herba malo fructui magnitudine assimiletur. Ego de malo arbore hìc agi existimaui: siquidem μῆλον Græcis non fructum modò, seu & arborem ipsam, significat. Dubito tamen, an Dioscor. μήλου μερικῷ nomine χαμαίμηλον designare voluerit.

CAP. CXXXV. κυπείρου τὸ εἶδος] Ista eadem de Polij non quidem floribus, seu foliis ipsis, refert Plinius, lib. 21. cap. 7. *folia Polij* scribens *mane candida, meridie purpurea, sole occidente cærulea inspici*: quo loco, vt & alibi non semel, Polium cum Tripolio videtur confudisse.

CAP. CXXXVI. τὰ διάκαυλα] Quoniam paulò post caulem Adianto negatum scribit Dioscorides, παβδία exauuquo codice restituere visum est: quippe cùm & ea voce vsus sit Auctor cap. proximè sequenti, de Trichomane. Huiusmodi prætenues virgulas, è quibus folia ipsa prodeunt, non malè *ramos* dixit Plinius, polytrichi mentionem faciens: aliàs *ramulos* nominat: Theophrastus caulem trichomanis appellare minimè dubitat. Attamen *virgulis* illis caulis seu cauliculorum appellatio minùs aptè congruit. Siquidem Caulis seu Thyrsus in herbis, haud secus atque Caudex in arboribus, id propriè dicitur, quod à radice simplex prolilit & in altum assurgit, alimentum à radice haustum singulis plantæ partibus impertiens.

φύσει ἁπλᾶ ἀλλ' ἐκεῖ] Ista sciens prudénsque omisi, quoniam neque apud Oribasium, neque apud Serapionem habentur, videntúrque temerè à sciolo quopiam ex proximè sequenti capite huc translata: quando verisimile non est folia eadem simul & coriandro & silici comparari. Cornarius & Tragus nonnulla potiùs hoc loco desiderari existimauêre, quæ ita suppleri: ex Theophrasto voluerunt. Ἀδίαντον, οἱ δὲ πολύτριχον τὸ μὲν ἄνθος ἀπὸ τῆς ἀδίαντος, φυλλάρια ἔχει παραπλήσια τούτοις, ὑπόκαυλα ἐν ἄκρῳ. τὸ δὲ καυλίον τῷ ἐλατίνῃ, μέλαινα, ἰσχνὰ λίαν, καὶ ἀκανθώδη, καὶ βραχέα. τὸ δὲ ἄνθος μέλαν, ἔχει φύσιν ὁμοίαν πτερίδι. hoc est, *Adiantum alijs polytrichō: est ut eo genere candidum, cui pusilla folia coriandri similia, in extremo imaturis dimissa cauliculis è quibus exeunt nigri sunt, prætenues, dodrantales & minores. Alterum verò est nigrum, cui folia filicis, & quæ sequuntur.* At nos etiamsi eam dictionis immutationem admitteremus, quod minimè facimus, contrà tamen hìc ἀδίαντον, illic μέλαν legi vellemus. Cùm enim ex sententia Theophrasti duo sint Adianti genera, vnum quidem album, alterum verò nigrum, hoc quidem existimamus esse legitimum Capillum Veneris officinis dictum, illud verò, quod rutæ murariæ aut saluiæ vitæ nomine vulgo notum est. Præter hæc verò & Polytrichum vulgo dictum Trichomanes esse agnoscimus, proximo capite describendum, & à prioribus illis omnino discrepans: quanuis inter Adianti genera ipsum perperam reposuisse, adeóque cum Adianto confudisse videatur Plinius, Theophrasti mentem non satis, opinor, assecutus.

ῥίζα ἄχρηστος] Radicem Adianto tribuit Dioscorides, sed inutilem ac superuacuam. Contrà Plinius Adianto & Trichomani radicem nullam esse dixit, libri vigesimi secundo capite vigesimoprimo. Sed & de Trichomane Theophrastus, ῥίζα δ' οὐχ ὑπάρχει, scripsit, lib. 7. c. 13. quod Gaza Theophrastum velut excusans, ita reddidit, *Radicem esse minimam ac ferè nullā.* Idem

quoque apud eundem Theoph. de Antirrhino reperias eodem modo à Gaza conuersum. Scilicet vtrobique nullam, aut potiùs quasi nullam, radicẽ esse voluit Theophrastus, vti & Plinius: quam vsqueadeò exilem deprehenderat, vt vix radicis nomen mereretur.

ἄγλιδι καὶ ἰσατίδι] Adianto dispares, imò etiam pugnantes, facultates tribui videntur à Dioſc. dum ipsum mẽses ciere scribit, sanguinisque rejectiones cohibere: quoniã ista simul stare nullo modo possunt. Sed nodum hunc satis appositè soluere videtur Mesuæus, in Simpl. dũ Adiantũ admonet dissimilaribus constare substantijs, aquea nimirũ simul & terrea, mediocriter tenui: altera itidẽ superficiaria, calida & supramodùm tenui. Illius enim vi dubium nõ est, quin Adiantum aluum astringat, fluxionésq; cohibeat, maximéque siccum: huius autem ope quidni obstructa aperiet, crassa extenuabit, aluum (quod voluit Mesuæus) subducet, præsertímque si recens fuerit?

ἢ τοῖς ὄρτυξι] Quod coturnicibus tribuit hoc loco Dioſc. idipsum de perdicibus refert Plin. libro 22. cap. 21. his verbis: *Perdices & gallinacei pugnaciores fieri putant Adianto in cibum eorum addito.*

καὶ ἀδίαντος καὶ τρίχωμανες] Theophr. quoque, lib. 7. hist. stirp. cap. 13. de Adianto scribit, φύεται μάλιστα ἐπὶ τοῖς ὑγροῖς καὶ ὑδρηλοῖς, nasci loais aquosis: de trichomane verò, χωρὶς φιλεῖ σκιερῶν, loca amare umbrosa. Plinius itidem, lib. 22. cap. 21. de Adianto vtroque: *Vmbrosas*, inquit, *petras parietúmque aspergines ac fontium maximè specus sequitur, & saxa muscosa: quod mirum, cùm aquas nõ sentiat.* Sed & paulò antè: *Aliud*, inquiebat, *adianto miraculũ: æstate uret, brumis non marcescit, aquas respuit, perfusum mersumue sicco simile est: tanta dissociatio deprehenditur, unde & nomen à Græcis*, &c. Hæc ille: quæ quidẽ omnia ex Theophrasti citato loco mutuatum constat, vbi sic habetur: ἴδια δὲ καὶ ἐπὶ τούτων ἐστὶν ἐν τοῖς παίδιαις, ὅτι ἔστι τὸ ἀδίαντον ἀμβλύτατον. ἔστι δὲ ὑγρότατον τὸ φύλλον βραχύφυλλον, ὥστ' ἐπιδηλόν τι καὶ τοῦτο τοῖς ὑγρὰν ἔχουσιν οὐσίαν, ὅθεν καὶ ἡ ἐπωνυμία hoc est, *Inter herbacea Adianto proprium id est, quod liquore perfusum non madescit, sed ne humoris quidem vel tantillum ei adhærescere comperitur, unde & herba nomen accepit.* Hanc ipsam porrò proprietatem, cuius ratione nomen Adianto factum est, διὰ τὸ διαίνεσθαι, βούλεται λέγειν ὑγρὸν καὶ ὑδρηλόν, *quia pluuia rorémue perfusum non madescat*, elegãter & ipse Nicander expressit in Theriacis, hisce versiculis:

αἰχμῆς τ' ἀδίαντον, ὃ τὸν ἄμβροτος ἀμφέπεσσε
Ἀνθρακίην νίπτουσα νότος πτολίεσσιν ὀπίζω.

Ea sic transtulit Gorræus:

Et nunquam madidum Veneris compone capillum
Cui non infidum effusi nubibus imbres.

Cap. cxxxvii. ἀσπλήνιον ἡδύοσμος] Theophrastus, loco modò citato, ἡδύοσμον κατ' αἰνησιν ἀλπίλων. Plinius verò, lib. 22. cap. 21. *contrarijs pedicelli densa inter se ex aduerso*: rursúmque, lib. 27. cap. vlt. *Trichomanes folia aduersa inter se* dixit: quibus verbis hæc ἀσπλήνια ἀλπίλοις. aptissimè expressit.

Cap. cxxxix. καρπὸς ἔχει C] Serapio, quantùm quidem ex Interpretis versione constat, legisse videtur, καρπὸς ἔχει β ἢ γ ἑλκυστά, αἱ ἐν &c. Vult enim semẽ duabus tribúsve vestiri tunicis, à quibus aristæ prodeant.

Δηγανίου ὕσιμα] Quod Dioscorides ipsi herbæ, id Plinius semini tribuit, dum de Ægilope scribit, libro 25. cap. 13. his verbis: *Ægilopas sanat herba eodem nomine, quæ in hordeo nascitur, trina folio, semine austero cum farinæ permixto impositaque, uel suco.*

Cap. cxl. βρόμος πόα λίαν] Sunt qui caput hoc de Bromo, tanquam suppositititium & adulterinum, vna litura penitus obliterent: quoniam de bromo inter frumentacea iã antè lib. 2. egerit Dioscorides. Alij vnam quidem & eandẽ plantam & hoc loco, & lib. 2. à Dioscoride tractari putant: sed illic, de seminis: hîc verò, de herbæ ipsius viribus agi. At ego eorum sententiæ lubentiùs subscribo, qui libro secundo de auena satiua & esculenta, neque postremum inter Cerealia locum obtinẽte, mentionem fieri existimãt: hîc verò, de eadem sponte nascente ac sterili, quæ inter segetum vitia numerari soleat. Neque desunt qui illam βρόμον, hanc verò rectiùs βρῶμον dici putent: quanquam vtrobique apud Dioscor. βρῶμος legitur. Nescio tamen, an vtroque loco rectiùs βρόμος legi possit. Ab vtraque illa auena rursum discrepat commemoratus antè Ægilops, quæ Plinio *festuca*, Gazæ verò perperàm *auena* dicitur. Est autem is & sylvestris planta, sed quę peculiariter, vti æra triticum, hordeum enecet, & in ipso potissimùm nascatur, quasi hordeũ in illam degeneret. Hoc ipso tamen Ægilopis nomine Theophrasto & Plinio etiam arbor è glandiferarũ genere, itémque Plinio bulbi genus quoddam designatur.

Cap. cxli. γλαυκὸς πεφυκὼς ἢ φακῆ] Haud dubiè ex vetusto codice pro, πεφυκὼς, restituendum, πεφακωμένος. Est enim Cytisi & lenticulæ foliis haud parua similitudo: at hederæ & lenticulæ, non item. Huic emendationi suffragatur & Plinij autoritas, cuius hæc sunt verba, lib. 27. cap. 9. quæ quidem hîc exscribere visum est, quoniam cum Autoris verbis quæ sequuntur itidem non planè consentiunt: *Glaux*, inquit ille, *antiquitùs βρυγαλλὶς nominabatur, cytiso & lenticulæ foliis simulis: auersa candidiora. Rami in terram serpunt quinis senisue, admodum tenues & uadicæ: flosculi purpurei exeunt. Inuenitur iuxta mare. Coquitur in sorbitione similaginis ad excitandam uberiorem lactis: eam qui hauserint, halmas uti conuenit.* Ita Glaucem Dioscoridis ramulos à terra emittere, hic eosdem in terram serpere scribit: ille ad excitandam lactis vbertatem coqui cum farina hordeacea, sale & oleo voluit: hic in sorbitione similaginis. Sed quæ Plinius, sequenti capite, glaucio seu glaucij succo tribuit his verbis: *lactis uberem intermissa restituunt*, huic ipsi Glauci rectiùs conueniunt.

Cap. cxlii. γάλακτος ἐπίσχυσιν] Plinius Polygalam gustu astricto esse scribit, lib. 27. cap. 12. quasi ἐπίσχυσιν legerit. Gal. 8. simpl. eadẽ scribit, αὐστηρὰ ἔχει μᾶλλον τὸν χυμὸν, *mediocriter austera habere folia*: cui subscribit Paulus. Cùm verò, testibus Theoph. 6. de causis plantarum, & Gal. 1. simpl. manifesta sit inter sapores, astringentem, acerbũ & austerum, differẽtia, quinam veriùs senserint, nihil decerno, quoniã adhuc incertum est, quæ verè plãta Polygalæ voce significetur: quanquã ab effectu, quem in cuocando lacte præstat, eam

esse cõijciò; quæ à Dodonæo floris Ambaruallis nomine designatur.

CAP. CXLIII. ὅσπερ λίνῳ μέγεθος κ.τ.λ.] Quod solijs Dioscorides, idipsum semini tribuit Plinius, lib. 27. cap. 12. *Osyris*, ait ille, *ramulos fert nigros, teres, & in ijs folia nigra cubitus, semenque in ramulis nigrum instar lini, deinde calore mutato rubescens. Smegmata mulieribus suauiùs ex his. Radicis decoctum potum sanat arquatos.* Hæc ille. Sed pro eo quod ex Osyridis ramulis Smegmata fieri scribit Plinius, hoc est, (siquidem vsitata Medicis significatione vocem eam vsurparit) cutem detergentia medicamẽta, Galenus lib. 8. simpl. ex ijsdem τὰ κατάπλασμα, hoc est, *scapas*, fieri prodidit. Est enim κάπασμα seu κάπαστον Græcis, idem quod ἄλειμμα seu ἄλειπτον. Etsi verò scripserit Fuchsius ex autoritate Suidæ & Phauorini κατάπλασμα nomine etiã τὰ κάμματα designari: fallitur tamen, dum Smegmata Plinij & κατάπλασμα Galeni non ita multùm differre existimat. Quãdoquidem κατάπλασμα voce, non quod ille volùit, intellexêre Suidas & Phauorinus, nempe comptorium & venustans faciem medicamentum, quo cutis extergeretur & læuigaretur: sed, vti exponit Scholiastes Aristoph. τὸ σκῦρον, ᾧ τοὺς τοίχους κατακαίουσι τὰς ἀράχνας ἀφαίρουν. hoc est, *euerriculum quo domorum sordes euerruntur*. Cæterùm priuatim Osyridis radici vsum ad arquatos tribuit eo loco Plinius, quem Dioscorides toti plantæ tribuere videtur, dum nihil peculiariter designat.

CAP. CXLIIII. ἴσχει φύλλα κ.τ.λ.] Theophrastus, qui accuratissimè Smilacem hãc descripsisse videtur, lib. hist. stirp. 3. cap. vlt. folium ei tribuit, κυκλοτερῆ, μικρὸν, ἀγκιστρῶδες. Similiter quoque secutus eum Plinius, lib. 16. cap. 35. *Smilacem è Cilicia primùm profectum folio* scribit esse *hederaceo, paruo, non angulose*. Rursumque, lib. 24. cap. 10. *similitudinem habere* ait *hederæ, minoribus foliis*.

αἱ δὲ ὀπωρικαὶ κ.τ.λ.] Smilacis asperæ fructum, hîc Dioscorides ὀπωρικὴν similem facit, hoc est, (vt alia ὀπωρικὰ significata à Suida & Aristoph. Scholiaste commemorata, tanquam huic loco non satis conuenientia, omittam) exili racemulo: quales ij esse solẽt qui vel summis palmitibus supra folia ipsa innascuntur, vel immaturi vindemiæ tẽpore inter folia latitant. Theophrastus, citato loco, scribit esse, ἀνατροφὴν τοῦ τρύχου, καὶ τοῦ μικροῦ, καὶ μάλιστα τῆς ἐλαιώδους σταφυλῆς ἐχούσης. καλαρίσκους δὲ οἱ βότρυες, inquit ille, καὶ ὁ τῶν. παραπλήσιον δὲ ὡς φησὶ καὶ σταφυλῇ. *fructum* inquàm ait esse *solani & uuæ albæ fructui simile, maximéque uuæ syluestri uuam capitatæ. Pensiles autem sunt racemi, ceu hederæ, uerùm ad unam propiùs accedũt.* &c. Sed & Plinius, lib. 16. cap. 35 de Smilace eadem, quanuis paulò aliter: *fert*, inquit, *racemos labruscæ modo, non hederæ, colore rubro*, &c.

ἐν νήσοις γίνεται] Plinius, lib. 24. cap. 10. huic Smilaci natalem locum alium assignat, nempe *in uenallibus opacis*. Smilacem verò alteram ibidem *culta amare* scribit.

ἡ νήσου δὲ μόνη] Plinius, loco modò citato, alium vtendi modum tradit, dum scribit: *acinorum corymbos contra uenenata omnia efficacissimos esse, in tantum vt acinorum succo infusibus sæpe insullato nulla postea uenena nocitura sint.*

CAP. CXLV. φιλεῖ λεῖα, ὁμοία] Non desunt qui Smilacem hanc læuem eandem esse cum sativa seu hortensi lib. 2. descripta existimarint: tũ quoniam vtrique descriptio propemodùm eadem virésque itidem eædem à Dioscoride tribuuntur, tum quia Galenus & Paulus, Smilacis hortensis in simplicium censu nulla facta mentione, huius ꝑquis tantummodò meminerunt. At nos cum peritioribus rei herbariæ Professoribus inter vtramque manifestum discrimen agnoscimus, Smilacémq; hortẽsianam eã esse credimus, quæ λόβια seu phaseolos profert: hanc verò, ad asperæ differentiam læuem dictam, eam quam Recentiorum plerique Conuoluuli maioris aut etiam albi nomine designarunt.

πόσου δὲ καρποῦ] Gal. lib. 7. simpl. Smilacem hãc, quam μικρὰν λεῖαν vocat, similes quodammodo Smilaci asperæ vires obtinere voluit. At Plinius contrà, lib. 24. cap. 10. *nullius esse effectus*.

CAP. CXLVI. τῆς πτελέας φλοιοῦ] Malim, μελαίνης: alioqui ex his vocibus, πτελέας & φλοιοῦ, alterutram redundare necesse fuerit. Serapio verò postquam fructum hunc itidem rotundum esse scripsit, addit insuper, *aliquantulum depressum & læuem*: quod neque apud Dioscoridem legitur, neque etiam est veritati consentaneum. Sed longè turpiùs ille fallitur, vti dudum admonuit vir doctiss. Nic. Leonicenus: dum, leuissimo nixus argumento, Cubebas cum Myrti syluestris fructu eisdem esse decernit.

φύεται ἐν τραχέσι τόποις] Hæc, quæ per librarij incuriam manifestò transpositа videbantur, suo loco restituere non dubitauimus.

CAP. CXLVII. καρπὸν δὲ ἐν μίσυϊ] Cordus, Anguillara & Dodonæus Hypoglosson cum Lauro Alexandrina vnum & idem esse existimarunt: licèt à Dioscoride & Galeno diuersis capitibus memorentur. At cur ita sentiant, non video: cùm vtrique differentes tum notæ tum vires assignentur. Enimuerò, vt reliquas notas omittamus, quòd ad fructum attinet, certum est Hypoglosson baccam gerere inter folium maiusculum & minus illud, quod è folij cauæ parte ceu ligula quędam exire videtur. At Theophrastus laurum Alexandrinam, lib. 3. hist. stirp. cap. 17. palàm testatur esse ὑπωρικόκαρπον, atque in folij dorso fructum gerere, æquè ac myrtum syluestrem, quam, eo ipso loco, κατατρώγιλον nominat.

μετ' οἴνου γλυκέος] Lacuna in vetusto codice, κυάθου ἑνός, addi testatur. At Plinius, dosibus immutatis, lib. 23. ca. 8. *Laurus Alexandrina siue Idæa* (inquit) *partus aderes facit, radicæ potu trium denariorum pondere in uini dulcis cyathis tribus.*

ἄχρι δὶ καὶ ἄμμα] His verbis innuit Dioscorides, quod clariùs expressit ibidem Plinius, hunc in modum: *Secundas etiam pellit menséfque, eodem modo potu.* Sed & Gal. lib. 6. simpl. Laurum Alexandrinam scripsit, ὑμένας τε καὶ ὕστερα κινεῖν, *menses & urinas prouocare.*

CAP. CXLVIII. ἡ δὲ ἰχνόπορα] Lacuna legit in v. cod. ἰχνόπορα: quod magis placet. & naturę foliorũ laureolæ vulgò dictæ magis conuenit. Plinius quoq;, lib. 15. cap. vlt. Daphnoides crassiore molioréq; quàm laurũ folio esse prodidit. Sed & Serapio, ἰχνόπορα, potiùs quàm, ἰχνόπους, legisse videtur: siquidem illius Interpres *uestigia* vertit.

καρπὸν μέλανα] Plinius, loco modò citato, *Daphnoidis baccas è nigro rufas* esse scribit: quod de

baccis fortasse nondum exactè maturis intelligendum venit.

ἄχλη δὲ τὸ φόβον] Plinius, lib. 8. cap. 13. *Daphnoides*, inquit, *alvum solvit vel recenti folio vel arido, drachmis tribus cum sale in hydromelite. Manducata, pituitas extrahit: folium, & vomitus. stomacho mutile. Sic & baccæ quinæ denæ purgationis causa sumuntur.* Hæc Plinius: quæ quanuis in vulgatis exemplaribus paulò aliter habeantur, ita tamen & distinguenda & legenda esse ex hoc Dioscoridis loco satis patet.

CAP. CXLIX. λειόφυλλα δὲ πυκνῶ] Ex Lacunæ vetusto codice addo, καὶ λειόφυλλα, *& tenuifolia*. Nam & Serapio vocem eam expressit. *Chamædaphnen* etiam *folio tenui, lauri similitudine*, describit Plinius, lib. 24. cap. 15. huius ipsius Chamædaphnes mentionem faciens. Nam & Clematin seu vincaperuincam eodem illo nomine appellat, lib. 21. cap. 11. Et rursum tamen (vti interdum sibi parũ constat) eiusdẽ lib. cap. 27. vincaperuincæ seu Chamædaphnes nomine hãc ipsam Dioscoridis Chamædaphnen innuere videtur, dum illi *aquas hydropicorum trahendi* vim tribuit: quæ quidem Clematidi daphnoidi nullo pacto conuenit.

σμάχευ ἰγκαίνων] Plinius itidem, de Chamædaphne agens, lib. 24. cap. 15. *Illinitur*, inquit, *alvum dolentibus recens: ardores refrigerat.* Attamen pro, ἰγκαίνων, legere malim, ἐμπυρισμάτων: maximè cùm & Serapio ipse *inflationes* verterit. Adde quòd verisimile nõ est, Chamædaphnen, cuius eadẽ est, Galeno teste, natura, quæ daphnoidis & lauri Alexandrinæ, ardoribus stomachi succurrere: quum eximio suo calore stomachi potiùs ardorem excitare debeat. Fuerit autem vero similius illã, vt tormina à flatibus concitata, ita & stomachi inflationes discutere.

CAP. CL. ἑρυθρὰ πλὴ χόλαι] Ita videntur legisse Oribasius & Serapio. Attamen facilè subscribo Marcello & Cornario, qui καὶ τὰ, χόλαι, φάγι, legendum suspicantur. Nam præter vetusti codicis, quẽ doctiss. Sambucus præ manibus habuit, autoritatem, me quoque in eam sententiam pertraxit Plinius: qui, lib. 25. cap. 5. *Ellebori albi folia* scripsit esse *betæ maiorem: hæc quoque nigriora & canalium dorso rubescentia.* Porrò de facie Ellebori vtriusque varias quidem discrepantésque sententias proponit Theophr. lib. 9. cap. 11. sed quæ ibi describuntur Elleboti nigri genera, nullo pacto videntur cum Dioscoridis conuenire.

αἰεὶ τὸν πεφυκότ'] Ita Plinius, loco citato, *Elleborum* tradit *tempestivum esse messibus*. Theophr. autem, de Elleboro: αἱρεῖσι (inquit) τῷ μετοπώρου, τοῦ δ' ἦρος ἄωρος. hoc est, *tempestivus autumno: vere intempestivus*. At Mesuæus & vere & æstate radices Veratri colligi voluit.

καὶ πλατύφυλλος χολῆ] Pro πλατύφυλλος, πλεῖας, legebatur in vulg. exempl. Sic etiam apud Actuarium: atque ita quoque legit Marcellus: sed & pro, σπείρεται, σπουδάζει, reponendum suspicatur. At cæteri Interpretes καὶ τὰ, πλεῖας, πλατύφυλλος, legisse videntur: & rectè quidem. Nam & v. codex sic habere comperitur: & Paulus lib. 7. cap. 10. δεῖ μὲν τὸ ἐλλέβορον (inquit ille) χολῆ πλατύφυλλος ἢ ἅλικας, ἢ διὰ πυκνότητος· ἀλλ' ὅ γε τὰ πλάτανα δὲ μᾶλλον τὸ ἐλλέβορον εὐεκβόητος δὶς πίνει. hoc est, *imbecillioribus inueteratæ*

meri ptissanæ aut halicæ Elleboti vtplurimùm drachm. ij. vt maximum vero, drachm. j. propinato. Porrò ibidem & Paulus, ex Antyllo, Elleboti balanos ex melle parat, quos sub finem capitis Dioscorides ex aceto confici voluit.

ὃ πλεῖόν ἐ φασῖ] Plinius, loco nuper citato de Elleboro agens, sic habet: *Album & in dulci datur: aptissime vero, in lacte aut pulte.* Sed vel ex hoc loco pro, *lacte*, legendum esse *lenæ*, facilè conijcio.

CAP. CLI. οἱ δὲ ἔντομον] Entomon nominat Plinius: at ego malim, ἔντομον, vti legitur apud Hippocratem, lib. 1. περὶ χυμῶν. itémque Galenũ, in glos. quo quidem libro vocem eam exponit, ἐλλέβορον μέλανα, *Elleborum nigrum*, vti & Hesychius: itémque Erotianus in Onomastico, quo loco etiam à Diocle Elleborum nigrum sic dictum asserit.

ἐν αὐτοῖς καθαίρει] Illud, ἐν, *per*, videtur. Plinius Prœtidas à Melampode sanatas scribit, nõ Elleboro quidem, sed lacte caprarum, quæ Elleborũ pastæ fuissent. Sic enim ille, lib. 25 cap. 5. *Melampodis fama divinationis omnibus nota est. Ab hoc appellatur unum Elleberi genus, Melampodium. Aliqui pastorem eodem nomine muenisse tradunt, capras purgari pasto illo animaduertentem, datoque lacte earum sanasse Proetidas furentes*, &c.

τῷ δὲ χόλαι βαφυειδὴς] Vulgaris nostri Veratri nigri, quod cum Theophrasti descriptione satis conuenit, præstantes effectus non semel obseruauimus: maximéque ad detrahendam bilem atram valere varijs experimentis cognouimus. Attamen si flores & semẽ spectes, illud Dioscoridis descriptioni minimè respondet. Respondet illud potiùs, quod à plerisque recentioribus Saniculæ fœminæ nomine designatur, quódque successu fœliciſſimo ad purgandam citra molestiam atram bilem quotidie vsurpamus. Quare fatendum cum Dodonæo, legitimum hoc esse Dioscoridis Veratrum nigrum, vel eo nos carere: vel certè in ipsius Dioscoridis contextu mendum aliquod subesse. Quin & fortasse quod de racemosis floribus hîc dicitur, Elleboro albo potiùs tribui debuit.

εἰ δὲ Ἀνθικύρα συναμφοῖν] Figuræ ratione hoc semen non male Sesamoides ab Anticyrenis vocari satis luculenter testatur Theoph. lib. 9. cap. 10. dum scribit his verbis: εἰ δὲ Ἀντικύρα, καθάπερ φασί, τὸ (ἐλλεβόρου καρπὸν καλοῦσιν. ἔχει δὲ σησαμοειδῆ τὸν. hoc est, *Anticyreni, vt ferunt, Elleboti semine purgantur, quod est sesamoides.*

καὶ Παρνασσῷ καὶ Αἰτωλίᾳ] Theophrastus, eiusdem lib. cap. 11. OEtæum quidem Elleborũ maximè probat: qui quidem cum Anticyreno vnus & idem esse videtur, quoniam OEta mons est in finibus Thessaliæ, Anticyræ insulæ adiacẽs: Parnassium verò & AEtolicum videtur improbare, his verbis: ὁ δὲ Παρνάσσιος καὶ ὁ Αἰτωλικὸς (γίνεται γὰρ καὶ οὗτος πολὺς καὶ εὐανθὴς, καὶ πυκνὸν ἐν αὐτοῖς) σκληρὸν καὶ ἄγαν θελυκλεῖς. hoc est, *Parnassius & AEtolicus nam & in locis istis genti à vulgo ignaro & emuntur & venduntur, præduri sunt & valdè asperi, ita vt non nisi magna cum molestia purgent.*

πλεῖ αὖν κολίαν] Ex omnium Medicorum tam veterum quàm recentiorum consensu, vt Veratrum album vomitu potissimùm purgat, ita & nigrum, per inferna. Quare indubitanter hoc

loco,nō,πίνω αὖω,sed,πίνω τρὶς τοσούτου, legendum, vti etiam præter Marcellū Interpretes omnes videntur legisse.Plinius de hoc eodem Veratro: *purgat per inferna.*

ἡ τοιαύτην ὁλκὴν] Pondus hoc non ad salem,vti plerisque placuit,sed ad Veratrum potiùs referri debere constat. Plinius de Elleboro: Ex *aqua*, inquit,*datur ad leniter molliendam alvum plurimùm drachma una: modicè quatuor obolis. Misscere aliqui & summonteam,sed tutius salem*,&c.

κυνὶ ψώρας μετὰ λύσσ.] De quadrupedum scabie hoc intellexit Plinius, dum scribit: *sanat scabiem quadrupedum cum thure aut ære picæ,vel cum piscelæo.*

αἰνεῖ καθαίρειν] Theophr. eiusmodi vinum, non quidē per alvum purgare, sed vrinas potentissimè ciere,innuit.Nam de Eleatico Elleboro in vitibus nascente agens,ita scribit:φασὶ δὲ τὸν Ελλέβορον ἐν ταῖς ἀμπέλοις φύεσθαι, καὶ πιεῖν τὸν ὀίνον ὕστερον, ὅστε λαγαρεῖς ἢ πολυούρους εἶναι. hoc est, *Eleaticum aiunt in vitibus nasci, vinumque reddere usque adeò urinam pronocans, vt qui biberint, graciles ventre contracto efficiantur.*

δίδωσι γὰρ πάντως] Quæ tum de religiosa Elleborisi collectione, tum de aquilæ volatu sodicitibus infausto hīc recitantur à Dioscoride. Plinius paulò aliter narrat.in hæc verba: *Primum enim gladio circumscribitur: dein qui sucturus est, Orientem spectat, & precatur, vt id liceat sibi precantibus Dijs facere, observatque aquilæ volatus: ferè enim secundis mœret est: & si prope adulauit, moriturum illo anno qui sucidat, augurium est.* Tale quid etiam habet Theophr.lib.9.cap.9.

διὰ τὴν καρηβαρίαν] Aggrauari etiam *capite Elleboro albo* Plinius admonet, quod hic Dioscorides de nigro tantummodò intellectum voluit. Idem & Theophr. loco modò citato, de Elleboro in genere ex aliorum sententia recitat: ideóque ad præcautionem allia præsumi, vinúmque subinde bibi solere.Sed hæc tamen & id genus alia, tanquam ridicula & fabulosa, proponere videtur.

Cap. CLII. τὸ μέγα,τὸ λευκόν] Galenus, o-&auo simpl. hoc Sesamoides itidem, magnum: quod verò posteriore loco describitur, album nominat. At quòd illud Anticyricum Elleborū dicatur,aliam ac Dioscorides rationem reddit, nempe quoniam semen ellebori modo purget, cæterisque viribus sit elleboro simile. Porrò Dioscor.sententiæ astipulatur & Strabo, libro 9. Geogr. Postquam enim duas monuit olim fuisse Anticyras, vnam ad OEtam montem in sinu Maliaco, alteram in Phocide, subdit statim in Maliaca quidem optimum nasci elleborum: at in Phocēsi, meliùs apparari,ideóque multos ad hanc purgandi sanitatisque causa solitos proficisci. Nasci enim in Phocide Sesamoides, quo OEtæum temperetur veratrum. Sic & Plinius: lib.25.cap.5. *Elleborum* (quanuis de nigro agat, contra quàm intellexerit Dioscor.) *in Anticyra insula nascentissimè fumi* scribit,*quoniam Sesamoides admisceant.* Cæterùm quod Theoph.lib.9.hist.stirp. cap.11.ad vomitum faciliùs concitandum, elleboro albo elleborines herbulæ semen admisceri scribit,aliquam mihi suspicionem mouet,Sesamoides hoc loco descriptum, Theophrasti elleborinen esse.

τετράμετρον αὖω] Plinius,lib.22.cap.25.*Est etiam*nō inquit,*aliud Sesamoides Anticyræ nascens, quod idē aliqui Anticyricum nomunt, cæterā simile erigenti herbæ, de qua suo dicamus loco: granum sesamæ.* Datur *in uino dulci ad detrahendos quantum tribus digitis capitur*,&c. Ibi *dari in uino dulci ad detrahendos* dixit, quod Dioscor.*dari in aqua mulsa ad vomitiones* innuit, vt illa vox (αὖω) satis indicat.Porrò Cordus immeritissimò Plinium accusat, quasi vires hīc à Dioscor.Sesamoidi tributas Sesamæ assignauerit. Quod enim librariorum fuit vitium, qui Plinij verba malè distinxêre,id Plinio ipsi perperàm imputat.

Cap. CLIII. φύματα & ἰδύματα] De hoc eodem Sesamoide Plinius, ibidem, *Detrahit bilem in aqua potum. Semen illinitur igni sacro: discutit panos:* quasi pro,ἰδύματα,ἐρυσιπέλατα,legerit,& pro, φύματα, φύγεθλα. Est enim inter vtranque hanc vocem Medicis haud leue discrimen.

Cap. CLIIII. ὁ δὲ ἔλατος κυάθους γ'.] Addit Lacuna ex vetusto quodam codice,νῦν δὲ ἡμέρας τρεῖς. At Goupylus in vetustis exemplaribus legisse se testatur,νῦν καὶ ἡμέρας γ'. Ita quoq; Cornarius videtur legisse.Et hæc quidem lectio mihi quoque magis arrisit. Siquidem verisimilius est voluisse Dioscoridem interpositis diebus aliquot potiones eiusmodi propinari,quàm singulis,iisque continuis. Quin & ipse Aëtius, Tetr.3.ser.2.cap.36.rectè monet,non nisi ex longioribus interuallis vtendum aquam ducentibus medicamentis:quippe cùm frequētius continuatus eorum vsus vires manifestò dissoluat.

Cap. CLV. ὁ δὲ τοῦ καρποῦ χυλός] Sermonis series postulat, vt καρπὸν hoc loco *fructum* vertamus, potiùs quàm *semen*. Attamen *Elaterium* fieri *succo expresso è semine cucumeru sylvestris* nominatim scripsit Plinius, lib.20.cap.1. Eodem loco, pro cultello, arundinem ad incidendos cucumeres desiderat: & quòd ad Elaterij præparationē attinet, obscurior videtur, nec satis Dioscor.mētem assecutus. Sed neque Interpretibus, quōrquot occurrêre, conuenit de hac Elaterij præparandi ratione, vti facile fuerit ei animaduertere, qui varias eorum interpretationes inter se contulerit. Qui verò apud Mesuæum extat Elaterij parandi modus,planè mancus atque concisus est, vt vix certi quicquam elici possit. Cæterùm pro eo quod habetur deinceps transpositа præpositione, *διαξηραίνει. ὁ δὲ ὑγιὴς*, lego,*διαξηραίνει δὲ ὁ ὑγιὴς*.

ὑπολεύκου τοῦ λάπαθου] In Elaterij genere *pallidum* itidem *herbaceo melius* esse scripsit Plinius.At Paulus,lib.7.cap.de simpl.med.purg.præfert ὑπόπυρον, hoc est, *porraceum*, quod nominatim Dioscorides & Plinius improbauerūt. Cordus Pauli sentētiam magis probat: quippe qui vix credat Elaterij succum, quantumuis diligenti insolatione, ad illum candorem,seu etiam pallorem, peruenire posse.

σκευάζουσι λύχνου ἄνθει] Multi variè se torquēt in hac Elaterij bonitatis nota:& quoniam Dioscoridis contextum depraua tum esse censent, alij pro,λύχνου, ἀνθει seu potiùs ἄνθει,alij ἀνθίνῳ, restituendum suspicantur. Enimuerò Theophrastus,lib.hist.stirp.9.cap.14.tantum in se humiditatis Elaterium continere asserit, vt etiam ad quinquagesimū annum lucernis admotum

earum lumina extinguat. Ita enim illius verba legi debēt, ἄχρι πυρίσῃ τῶν φύλλων τὰς κεφαλὰς τοῦ λύχνου. Addit & Plinius veri Elaterij experimentum esse, si admotum lucernæ eam, priusquàm extinguat, scintillare sursum ac deorsum cogat. At ego tum hos, tum etiã Dioscoridem rectè sensisse, adeóque quam illi sibi fingũt contradictionem facilè solui componíque posse iudico. Nihil enim obstat quominùs Elaterium pinguitudinis ratione, quam ex seminis medulla contraxit, admotum lucernæ facilè accendatur & conflagret, flammámve concipiat, ac simul etiam humoris adiuncti ratione, dum vrendo vaporem ex sese fundẽs crepitat, lucernæ lumen sursum deorsúmque scintillare cogat, atq; tandem etiam extinguat: quandoquidẽ accendi facilè & obiectum lumen extinguere nullo planè contrarietatis modo sibi inuicem opponuntur.

χλωρὸν ἐρεβίνθου] Oribasius κατὰ τὸ, ἐρεβίνθ, ῥόμβου, legisse videtur: at ex Interpretibus nonnulli, μέσον ἐρεβίνθ καὶ πέπονος, ídque de colore interpretantur, quasi Elaterium id vitiosum esse censuerit Dioscorides, quod medij sit coloris inter eruum ac cinerem. At ego in vulgata lectione nihil immuto: neque dubito quin Elaterium interdum è cinere, quo quidem exiccatur, nonnihil sibi asciscere possit, insupérque à nonnullis vt amylo, ita & erui farina adulterari: quemadmodũ conceptis verbis admonuit Autor lib. de simpl. medicamentis ad Paternianum, qui quidem Galeno falsò tribuitur.

ὁ διὰτρὶς ἡμίζεσ] De Elaterij tum ætate, tum etiã tempestiuitate grauissimorum Autorum variæ sunt discrepantésque sententiæ. Siquidẽ Theophrastus nullum ex medicamentis longiore æuo durare, & quò vetustius, eò melius esse scribit: quin & addit ducentis annis seruatum Elaterium, cuius tamen excellentes vires Medicus quidam haud insolens neque mendax fœliciter expertus fuerit. Theophrasto Plinius astipulatur, prætereáque à trimatu tempestiuum eius vsum esse scribit. At AEgineta Elaterium laudat, μὴ παλαίτερον ἐνιαυτοῦ, non vetustius anno: nisi fortè (quod ego suspicor) pro παλαίτερον, νεώτερον, recentius, legendũ videtur. Mesuæus verò ipsum asserit triennio seruari, post semestre vsurpandum. Ab his porrò omnibus Dioscorides (cui tamen plurimum tribuimus) manifestò dissentit.

σίμωσιν ὅσαι χεῖλος] Literarum affinitas in eum errorem librarios omnes induxit, vt vno quasi consensu, σίμωσιν, hoc loco legerint, κατὰ τὸ, στόμωσιν. Attamen, σίμωσιν, vocem, hoc loco nullo modo constare posse vel ex eo facile est animaduertere, quòd nusquam alibi prisci Medici stibio seu crudo seu cocto in remediis internis vsi sunt: sinapi verò contrà diuersis ex Elaterio medicamentis fœliciter admiscuerunt. Adde quòd & ipsissimum hoc remediũ ad dyspnœam apud Gal. 7. καθ' ὑπερ ex Andromacho recitatũ reperies, hisce verbis: πάσχοντες τὰ αἰ, ἀλοὺς πινοῦσι τριώβολον, ἀλατεῖον τριώβολον. οἱ δὲ ὅλον ἄ. ξ. λαμβάνουσι μὲν ὕδατος κύαθους τρεῖς· τοῖς δὲ ἀπὸ ὑμέρας μὲν ὑφορμίζουσι. Præterea & apud Dioscor. ipsum lib. 2. περὶ ὀλιγοσίτων, cap. de dyspnœa, eiusdem planè medicamenti fit mentio, nisi quòd pro sale nitrũ adhibetur. Sed & apud Aëtium, simplicium dosibus emẽdatis, repetitur lib. 8. cap. περὶ ὑγροκοιλίας, hunc in modum: ἁλατεῖον ὑμιώβολον, τίφυον ὑμιώβολον, ὀνίσου ⊰ α. λειώσας ἐν ὕδατι κυάθοις τρισὶ πινέτω.

τῶν δὲ ἡμέρων σικύου] Quæ hîc ad capitis calcem adduntur de satiui cucumeris radice, quanuis à cæteris Interpretibus omissa atque huc, vti equidem suspicor, ex capite de Pepone perperàm translata sunt: quia tamen in impressis exemplaribus omnibus habebantur, non visum est prætermittere. Nihilominus quid de eo additamento sentiremus, obiter indicare voluimus.

Cap. CLVI. ὑπάρχειν ἐν τῇ μίλτῳ] Plinius de nucleo Staphidis agriæ, lib. 23. cap. 1. *Mauresat*, inquit, *cum mundema, negrescitq; : quum nuc tuminia rubentes morimus acmos, scaramíscque illam in aprum nasci, hanc non nisi in opacis*, &c. Eo loco inter vuã taminiam & Staphidem agriam, à nonnullis nihilominus falsò, vt ait, vuam taminiam dictam, discrimen ponit: quanuis alio loco parum sibi constans Staphidis agriæ vires tribuat vuę taminiæ. Sed & Celsus, lib. 3. cap. 22. περὶ ἀκρίδων Græcorum, vuam taminiam nominari apertè docet. Nos tamen qui vitem syluestrem, à labrusca diuersam, verius vuam taminiam Latinorum esse existimamus, Staphidem agriam potiùs ab effectu cum Scribonio *pediculares herbã* appellabimus, aut cum Marcello Empirico *pedunculariam*, vel cum quibusdam aliis, teste Plinio, *pituriam*.

ὑπὸ πίσσης τῇ ἢ τῇ] Serapio & Ruellius simpliciter legisse videntur, πί. At Marcellus & Cornarius, πίσσης ἡ ἢ πί, quam ego lectionem vulgatæ prætulerim.

σπαστῶς μαλάττουσι] Sunt qui vtrunque aduerbium, σπαστῶς simul & σπαχῶς, expresserint. Ego κατὰ τὸ, σπαστῶς, σπαχῶς malim: quo modo & Serapio legisse mihi videtur.

στεφάνῃ καὶ] Lacuna legit in vetusto codice, στεφάνῃ καὶ ἐπιτίθει καὶ μετὰ σπαθομέλιτος, καὶ ἔλαίῳ σπαχιώδους. Ego hanc lectionem secutus sum, quoniam & Serapio ita legisse visus est. Adde quòd & Plinius, loco citato, *Staphidem agriam facultas admixta fandaracha & caput & reliquum corpus phthiriasi liberare* scripsit.

ὕλαι τε ἰδιοπαζόμεναι] *gingiuas fluxione infestatas: rheumatissimos cicatricum* ibidem perperàm & sensu nullo dixit Plinius, pro, *gingiuarum*, scilicet vocum ὑλαὶ & οὖλαι affinitate deceptus: quum tamẽ ὑλαὶ, *cicatrices*, οὖλαι, *gingiuæ* significet.

Cap. CLVII. ὁ Θάψος] Thapsum insulam, si non Siciliæ, at certè à Sicilia non ita longè distitam, innuit Autor. Nam & ideò Nicander in Theriacis radicem Thapsiæ τριναχρίαν cognominauit. Siciliam verò etiam Trinacriam olim dictam fuisse constat, deducta appellatione à tribus iugis seu promontoriis, quæ in ea insula præcipua sunt.

μᾶλλον ὁ καυλὸς] Etsi vulgata exempl. omnia, καρπὸς, legerẽt, attamen nemo Interpretum quin καυλὸς hic sit legendum addubitauit. Sed huic eorum consensui accedit præterea vetusti codicis fides & autoritas. Plinius autẽ *Thapsiam inuni esse caule* dixit, *nec excedere bacali longitudine*: quasi, κατὰ τὸν καυλὸν, legerit.

ὑγροποιὸν τὸ φλοιὸν] Plin. lib. 13. cap. 22. de Thapsia: *Quydam*, inquit, *caulem incidunt per messes &*

in ipſa exeuntem radice, quò ſuccus influat, arefactumque tollunt : quo quidem loco excipiendi Thapſiæ liquoris ſeu lactis, vt ipſe vocat, rationem breuiter nimiùm, nec ſatis apertè, exprimit.

βρομαπολίσειον] Rectiùs fortaſſe, βρομαδίσειον. Sed & inferiùs αὐῶ τῶ, ὑφαιῶ, legendum, ὑφαίνω, vel, ὑφαίνων.

ὑπόπικά τε ἄμα] Theophr. hiſt. ſtirp. lib. 9. cap. 22. de Thapſia: διώκουσι δὲ καὶ τὸ πικρομελὲς ὑπόπικον. ὑπόπικα δὲ πάντα, ἀπὸ ἕλκους, quo loco legendum hauddub è videtur: ὑπόπικα δὲ πάντα ἅμα ἕλκους, hoc eſt, *ſugillatu aliis omnibus citiùs reddit*. Gaza perperàm *ſuppurationes* vertit, quaſi ὑπόπυα legerit.

Cap. CLVIII. μαυρὰ δ' ἀφίησι] Etſi Plinius geniſtæ vires eaſdem ferè tribuit, quæ hoc ipſo capite à Dioſcoride Spartio aſcribuntur: attamen & ipſe dubitat, lib. 24. cap. 9. *an Geniſta ſit, quam Græci Autores Sparton appellauêre*. Sed vel ex hac nota ſatis conſtat, Spartium Dioſc. minimè geniſtam eſſe: ſiquidem geniſtæ ſeu vulgari, ſeu etiam Hiſpanicæ, folia ſunt plurima, quantumuis fugacia. At Spartium Dioſc. etſi, cùm primùm pullulare incipit, nonnullis cingatur exilibus foliolis, quia tamen quamprimùm ea decidunt, foliis ferè viduum cernitur, ideóque etiam illius ῥάβδοι ἄφυλλοι Dioſc. dictæ ſunt. Σπάρτου quidem ſeu σπαρτίου, aut etiã σπάρτης (niſi mendoſus eſt Galeni contextus, 8. ſimpl.) nomine plantas varias deſignari fateor, quę vinculorum vſum præſtent, dum & ijs palmites alligantur, & ex earũ ramulis ſeu ſurculis flexilibus aqua maceratis funes intorquentur: ſed tamen triplex potiſſimùm eſſe Spartiũ, cum doctiſſimo Guillandino lubens agnoſco: vnum quidem Plinij, Hiſpanicum ſeu Ibericum, quibuſdam χαμαιπεύκην dictum, qui quidem verè *tantus eſt aridi ſoli, uni terræ datus uſus*, vt inquit Plinius, lib. 19. cap. 2. Hoc Medici minimè vtuntur, niſi fortè in hordeo fricando. Nam in hunc vſum aſperitatis ratione vſurpatur à Galeno, 2. de alim. fac. ſiquidem hoc illud eſt, quo ait ipſe iumentis ſoleas necti ſolere. Reliqua verò duo Sparti genera, fruticum generibus annumeranda, à Medicis varios in vſus accommodãtur. Ex his vnum eſt Dioſcoridis Spartium, quod, ſi Guillandino credimus, in EVropa non habetur, víxque alibi quàm in Aſia naſcitur: attamen & in Hiſpania & in Africa reperiri à Carolo Cluſio memoriæ proditum eſt, qui inter rariores Hiſpanię ſtirpes, ipſius duo genera eleganter depinxit. Alterum denique Spartij genus fuerit, quam Latini geniſtam vocauerũt, ab vtroque illo Spartio non odore modò, folij, ſeminis & ſiliquarum figura; ſed & vitium efficacia, diſtinctam.

ὥσπερ φακέλους] Lege, φακῆλος, vel φακήλου. Meſuæus, niſi fortè vitio Interpretis factum id eſt, Spartio ſiliquas ſcribit eſſe *orobinu ſimiles*: at Plinius, ceu phaſeolorũ. Tradit enim, lib. 24. cap. 9. *ſemen geniſtæ in ſiliculis phaſeolorum modo naſci*. Verùm equidem hîc à Dioſc. phaſelorum potiùs, quàm phaſeolorum mentionem fieri crediderim. Sunt autem phaſeli à phaſeolis longè diuerſi, ac ſi non ijdem cum eruilia & cicercula, at certè ijs congeneres, vti palàm teſtatus eſt Gal. 1. de alim. fac. cap. 28.

ἀλλὰ ὀβολῶν ἑ] Plinius de ſemine: *purgat*, inquit, *helleberi uice drachmæ & dimidia potu in aqua mulſe cyathis quatuor tritum*. At Meſuæus longe maiore ponderis diſcrimine: Datur, inquit, *Spartij flos à drach. ij. ad drach. v. ſemen, à drach. ij. ad drach. iiij.*

τὸ ῥαδίως ὑγραίνεσθαι] Plinius, non aqua, ſed aceto macerat. Sic enim ille, lib. 24. cap. 9. *Ramos ſimiliter cum fronde in aceto maceratos pluribus diebus & tuſi ſuccum dant iſchiadicis utilem, cyathi unius potu*.

Cap. CLIX. τῆς δὲ ῥίζης ἡ ἰσχὺς] *Silybum in Medicinis nullum uſum habere* dixerat Plinius, lib. 22. cap. 22. Et tamen, lib. 26. cap. 7. *Eſt & Silybo*, inquit, *lactens ſuccus, quo denſatus in gummi ſimilitudinem cum mille denarij ponderc* &c.

Cap. CLX. δένδρου μυρέψικ ἐστὶν] Varij Autores de huius folij figura variè ſentiunt. Enimuerò Plinius, lib. 12. cap. 21. Myrobalanum (quæ illi, vti & Aëtio, eadem eſt cum glande vnguentaria, longè alia ab Arabum myrobalano) *glandem alit eſſe arborem heliotropio ſimili folio*. Theophraſtus, lib. 4. hiſt. ſtirp. cap. 2. eanuẽ glandem βάλανον ſimpliciter nominat, & ipſius arborem *folio* ſcribit eſſe *myrti, ſed longiore*: quo loco fortaſſe vitium eſt librarij, qui ipſum facili, μυρσίνου, αὐτὸν τῶ μυρίκης, repoſuerit.

Πεπλῶ καρπῶ] Fructus huius ſpecies magnitudine diſtinguit Meſuæus, dum *maiorem nucis auellanæ magnitudine* eſſe ait: *minorem* verò, *ciceris ſiſtun*. Dioſc. & Plinius abſolutè Glandem hanc nucis auellanæ magnitudine deſcribunt. At Theophr. citato loco, *magnitudine ſimul & figura fructus cappari* aſſimilat.

αὐτὸν ὀστοῦν ἐλαιόφυτον] Corticem tantùm ab vnguentarijs, ſcilicet pro ſtymmate ſeu ſpiſſamento, odoris conſeruandi gratia, deſiderari ſcripſêre Theophraſtus & Plinius: quò factum eſt, vt hoc loco nonnulli αὐτὸ τῶ, ὀστοῦς, οὗτος, legendum cenſuerint. Sic porrò Theophr. lib. 4. cap. 2. τὸ καρποῦ δὲ τὸν κάλυφον χρῶνται οἱ μυροπῶλαι πρὸς. ἐλαίου γὰρ ἔχει. τὸν δ' ὑπὸ τοῦτον αὐτὸ ὀστοῦν. Itémque Plinius, lib. 12. cap. 21. Vnguentarij (inquit) *tantum corticem premunt, Medici nucleos, tundentes affuſa ne pauxillum calida aqua*. At Galenus, æquè ac Dioſcorides, carnis ipſius ſucco pingui vnguentarios vti conceptis verbis ſcribit, 6. ſimpl. id quod longè videtur eſſe veriſimilius.

ἥδιον δὲ αὐτῆς ὑγρὸν] Meſuæus recenti Glandi vetuſtam præfert, contrà quàm Dioſcorides. Sed recens ideò à Dioſc. anteferetur, quòd plus humoris quàm vetuſta reddat. Illa contrà Meſuæo expetitur, quòd minus humiditatis excrementitiæ contineat, adeóque ventriculum minùs ſubuertat.

λευκὴ περὶ ἄλσι.] Plinius, pro regionũ in quibus Glans iſta naſcitur varietate, varios ipſius colores agnoſcit: quam tamẽ *longè optimam* ſcribit eſſe *Petream, cortice nigro* ait eſſe, *nucleo uerò candido*.

μετὰ αἰγείου ἀλείφου] Meſuæus in lienis cataplaſmata vnguentariæ Glandi farinam lupinorum & ſpicam admiſcet. Galenus verò, farinam erui vel lolij.

τὸ δ' ἀκαυμάτιστος] Goupylus legit in altero exemplari, eodem planè ſenſu: τὸ δὲ ἀπὸ αὐτῆς ἀκαύστου ἀκαυμάτου. Hoc verò illud ipſum eſt, quod Gal. 6. ſimpl. cap. τὸν βαλανίου μυροψικὸν, ἄκαυστον nominat, τὸ ἀκαύστου τοῦτ' ἔλαιον, τὸ γλυκὺ καὶ εὐλαβῶς

Celsus verò, lib. 6. in medicamento Tryphonis recensendo, *myrobalanos magnas*. Iccircò Galenũ Dioscoridis fidum Interpretem sequi malui, quàm cum Ruellio *Glandes mala expressáque succum* vertere.

CAP. CLXI. κρίνου ἕνεκα] Theophrastus, hist. stirpium lib. 6. cap. 6. haud ita magno discrimine, folia Narcissi foliis asphodeli comparat, hisce verbis: ἀλλ' ἔστι τῷ μὲν φύλλον ἀσφοδελῶδες ἔχει, τὸ δὲ πλατύτερον ἧττον καὶ μᾶλλον ἐκ τῆς ῥίζης. Non ita magnum esse discrimen vel ex eo patet, quòd & asphodelus seu hastula regia foliis est maioris porri, vel ipso teste Dioscoride lib. 2. cap. 119.

ἔστιν δὲ κραυῶδες] Plinius Narcissi duo genera Medicos in vsu recipere scribit, libro 21. cap. 19. *unum purpureo flore, alterum herbaceum*. Verùm eo loco, nõ *herbaceum*, sed, *croceum* seu *croco* potiùs, legendum suspicor. Etenim Narcissus caulem quidẽ habet herbaceũ, vti monuit Theoph. ac fortè tota etiam planta herbaceum quiddam resipit, teste Dioscoride: at si de flore sermo est, id hauddubiè quod medium calycem cingit album quidem est: medium verò ipsum, aliàs luteum, aliàs purpureum.

CAP. CLXII. καὶ μακρὸν εἶναι τὸν] Plinius, lib. 22. cap. 12. *Hippophyes* (sic enim ille nominat, Hippocrates & Theophrastus ἵππουριν, Galenus in Glosis Hipp. etiam, quia spina sit fullonia, κναφεῖον, & alio nomine κόκκον, scribit esse *spinus albus*: sed qua plantæ parte sint eæ spinæ, non satis explicuit. At Theophr. lib. 6. cap. 3. ἱππόφωνον (vtroque enim modo & ἱππόφωνον & ἱππόφοινον appellat, nisi fortè prius illud mendosè legitur, *Iappagonum* vertit Gaza) tradit ἀκανθῶδες esse τὰς φύσεις, hoc est, *foliis esse minimè spinosis aut aculeatis*: ac paulò antè illud inter ea recensuerat, quæ ὅσα τὰς ἀκάνθας ἔχουσι φύλλον, hoc est, *quæ folium instar aculeum gerunt*. Ex quo patet, Hippophais spinas non quidem in foliis ipsis, sed inter folia esse: quod & ipse Dioscorides hoc loco apertè significat.

καὶ μέλαν τὸ κόκκον] Plinius, loco citato, acinis tribuit, quod Dioscorides floribus: dum *Hippophyes* scribit, *candida & ex parte rubentibus* esse *acinis*.

ἴσον ἑλκοῖς] Ruffus Ephesius, libello ἀνεφ' ἁπλῶν de purgantibus medicamentis, liquoris qui ex Hippophais radice excipitur maiorẽ dosin exhibere non veretur, his verbis: μᾶλλον δὲ τοῖς βουλόμενος τὸ ὑγρὸν, ὃ ἐκ τῆς αὐτῆς, ὀβολοὺς γ'. εἰ δὲ τὸ ὑπὲρ τὸ ἐρεύγειν καθαίρειν, δραχμὴν μίαν ἐν μελικράτῳ. hoc est, *si valentiùs purgare voluerit, dabis liquoris per se obolos iij. sin ex eo qui cum erui farina præparatur, drachmam unam in mulsa*. AEgineta, lib. 7. liquoris eiusdem obolum vnum cum erui farina exhibitum, bilem ac pituitam purgare scribit.

CAP. CLXIII. ἱππόφωνον] Paulus AEgineta ἱππόφοινον scribit, vti & interdum Plinius: quanquam hic ipse, libri 22. cap. 12 posteaquam egit de vtraque hippophye, quarũ altera eadem est cum Hippophaësto: *Debent*, inquit, *esse accommodatæ equorum naturæ, neque ex alia causa nomen accepisse*: quo quidem loco illam alteram lectionem, ἱππόφωνον, prætulisse videtur. Sed aliis etiam nominibus præfixam vocem, ἵππου, magnitudinem præstantiámve potiùs significare vnicuique cõstat. Ego verò tum ἱππόφως tum & ἱππόφωνον, ceu fullonias plantas, sic dictas existimo, quod valdè candidos ac lucidos seu splẽdidos pannos redderent.

ῥίζαν δὲ πυκνὴν] Plinius, lib. 17. cap. 44. *Hippophaësti radicem albam* esse scribit: crassitiei nõ mẽminit. Quin & lib. 27. cap. 10. dum *Hippophaëstum* tradit *radiculas habere albas, molles*, satis innuit, se in radicis crassitie à Dioscoride discrepare.

CAP. CLXIIII. κίκιν Κυρηναῖοι] Herodotus, in EVterpe, κρόμμυον vocat, quod idem est: nã & Plinius ipsum sesili, *sili* plerunq; nominat, atque ind etiam corrupto vocabulo suum Siler Officinæ deduxerunt. Porrò ibidem Herodotus κικιννόμενον κάμπι, ab AEgyptijs (qui Ricinum in Græcia sponte prouenientem eliciendi olei gratia copiosè serebant) κίκι vocatum affert.

δένδρου δὲ τοῦτο] Cùm Ricini planta, quæ ad arcendam talparũ iniuriam nostris in hortis quotannis seritur, neque valdè crassa proceráve sit, neque etiã vsqueadeò lignosa, nisi cùm exaruit, vixque præterea diutiùs quàm per annum eduret: meritò dubitarit quispiam, sitne in arborũ censenda genere, vti vult hoc loco Dioscorides, an verò fruticum potiùs, qui quidem, vel ipso teste Valla, lib. 4. eleg. ab arboribus ita distant, vti à fruticibus herbæ. Nostram quidem Ricinum fateor caudice vnico ramoso nodosóque arboris instar esse præditam: at quia tamen stirps est διετηλύες & annua duntaxat, non item rediuiua ac perennis, rectiùs hauddubiè in fruticũ quàm arborum numerum ascribetur. Quæ verò ab oculatis testibus P. Bellonio in Creta insula, itémque Car. Clusio in Bæticæ maritimis aliisq; id genus æstuosis regionibus visæ & obseruatæ traduntur, cùm haud secus ac AEgyptiæ, quarũ factam à Dioscoride mentionem sit verisimile, in crassitudinem altitudinémque longè maximam excrescant, aliarum instar arborum multis prægrandibus ac robustis brachiatæ ramis, qui quidem complures annos perdurent, nec nisi quarto quintóve anno putentur: has ego minimè dubitarim cum Dioscoride non arbusculis tantùm, sed & arboribus annumerare: seu inquam sponte, seu adhibita cultura tales euadãt.

σπάνιος μεγάλη μίγ.] Plinius, lib. 15. cap. 7. de Ricino paulò aliter habet in hæc verba: *In Hispania reperiẽtur proceræ, altitudine oleæ, caule ferulaceo, folio vitium, semine vuarum gracilium pallidarumque*. Obiter verò notãdus ex Theophr. lib. 2. de causis stirpium, cap. 22. Ricini foliorum μεταχωρισμός. Illa enim adhuc nouella & recèns edita rotunda visuntur, ac in angulos deinde sinuantur, καθάπερ ἀπαλλαττόμενα, vt inquit ille, *quasi tùm demùm suæ conformationi perfectionem adepta*.

ἕως ν' πίνειν] Sic legit Serapio. At Matthiolus, ἕως γ' πίνειν. Mensuras autem Ricini quinque septémve, aut ad summum quindecim, grana exhibenda tradit.

κινεῖν δὲ καὶ καταπλάσσειν] Lego, κινεῖ δὲ & καταπλάσσει, videlicet, ὁ κρόμμυς, aut, κινοῦσι δὲ καὶ καταπλάσσουσι, nempe κίκινοι: deindéque legendum, καθαίρουσι. Hìc enim de Ricini granis agi vel ex eo patet, quod deinceps Autor nominatim foliorum vires persequitur. Sed & quæ hac periodo commemoratur purgandi detergẽdíque vis, etiam semini seu nucleo Ricini tribuitur à Galeno & Serapione: quanquam & folia eandem vim,

vim, sed debiliorem participant.

CAP. CLXV. ἡ ἀμυγδαλοειδὴς] Cognomina Tithymalo Characiæ à Dioscoride tributa Plinius partim κατοφύλλῳ, partim ἀμυγδαλοειδεῖ ascribit. Siquidem dendroidem cognominatum narrat Plinius, lib. 26. cap. 8. *alius cubitos, alius* (quod ego miror) λεπτόφυλλον dici. *Sicus* κατοφύλλον *aliis myrsinen, aliis amygdaloidem a similitudine.* Tertium verò Tithymali genus σφηκίαν dictum, quod Dioscorides inferiùs τετραπλείδα, ita & μύρσινα appellari scribit, tertium Ille fecit Papaueris syluestris genus, lib. 20. cap. 19. Hunc verò eundem Theophrastus etiam κύπρον nonnullis dictum refert, lib. 9. cap. 13. quo quidem loco, æquè ac antiquissimi herbarij Crateuas & Mycon, (siquidem Interpreti Nicandri credimus) tria tantùm Tithymalorum genera cõstituit, paralium videlicet, masculum & myrsiniten, qui fœmina existimatur.

ὑπὲρ πῆχυν] Theophrastus, loco citato: τὸ δ' ὅλον μέγεθος δίπηχυ μᾶλλον, quo loco nõ quidem ramosum, sed plantæ totius altitudinem dimetitur. At Plinius ipsius ramos describit, *digitali* quidem *crassitudine, longitudine* verò *cubitali.*

φύεται πραχὺ καὶ ἐρημίας] Plinius, lib. 26. cap. 8. de Characia Tithymalo: *Nascitur*, inquit, *in asperis maritimis.* At Theoph. de Tithymalo myrsinite agens, cui natales eosdem assignat Dioscorides, φιλεῖ δ' ἐρημικὰ χωρία. *amat locos montosos.*

ἀφίησι τὸν χυμόν] Sic Theophr. τὸν ἐπίζουσαν ἅμα τῷ πρωϊνῷ. hoc est, *huius succum lacteum eliciunt tempore matutino.* At Oribas. ἐπίζουσι δὲ τῇ πεντεκαιδεκάτῃ ἀφιᾶσι τὸν χυμὸν τὸν, hoc est, *circa* mensem *quintum Tithymalo succus exigitur.* &c. Plinius: *Succus maiorum ponorum lanugine defractis ramulis excipitur farina cruda, aut fabis, ut cum ijs aresiat: quinas guttas singulis excipi satis est.*

ἐγκλιδῶσι] Sic legerunt plerique Interpretes: at ego malim, ἐγκλίδῳ, quo modo etiam Serapio videtur legisse. Enimverò ramulos in fascem collectos sectósque in vase decliues collocari oportet, quò facilius lacteus succus in vas ipsum cõfluat. Sic paulo pòst, αἱ τῶν, πραχιῶν, legendum hauddubiè, πραχιῶν.

φθινοπώρου σπείρεται] Theophrastus qua tempestate legatur semen Tithymali Characiæ, quem ipse marem appellat, non quidem peculiariter designat: sed de Paralio tamen ita scribit: ἀμᾶται δ' ὅταν ὀπὸν ἀφιῇ τὸν χυλόν. De Myrtitis autem fructu: ἀμᾶται δ' ὅταν ἀφιῶνται αἱ κάρυαι. Secutus eum Plinius, de Paralij quidem semine sic habet: *Colliguntur una florente:* & alio loco: *Colligitur maiente uua*, hócque idem repetit de Helioscopij semine: At de Myrtite: *Colligantur*, inquit, *cum uua hordeo turgescente*: rursúmque de fructu: *Demetitur cum messium maturitate.*

ἐλαΐῳ δὲ καὶ ὄξει] Plinius, fortassè minùs rectè: *Colluuntur*, inquit, *radicis decocto* (dentes) *ex uino aut oleo.*

μείζονα δὲ καὶ τὴν] Plinius fœminam describit, *foliis myrti acutis & pungentibus*, sed *mollioribus*; nisi forte, *maioribus*, legendum est. Theophrastus tantùm: τὸ μὲν φύλλον ἔχει, παραπλήσιον δ' ὡς εἰπεῖν, πλὴν ἐλαττόνως ἐν' ἄκρου, hoc est, *folium quidem habet myrti, sed summa parte aculeatum.*

παρ' ἐνίοις πάρειον ὄνομα.] Serapio perperàm; *fructum ferre ter in anno.* Theophrastus: ἔνια (scilicet μορίνου καυλικὰ) δ' οὐχ ἅμα φέρει τὸν καρπὸν, εἶναι παρ' ἔτος, τὰ μὲν τοῦ, τὰ δ' ἐκ τοῦ. hoc est, *Myrtino Tithymali sarmenta non simul fructum proferunt: sed alternis annis, alia hoc anno, alia posthoc.* Plinius verò: *fructus non pariter maturescit, sed pars anno sequente, & nec necatur.* quod itidem addit Theophrastus hisce verbis: ὁ δὲ καρπὸς αὐτῶν καλεῖται κύμινον. Porrò nisi ab oculato teste & fide digno Compatre meo Stephano du Plex intelexissem, coccum orientalem, ex quo trito, addito caseo, illicia captandis piscibus apta parantur à multis, fat proceræ arboris esse fructum, coniicerem Tithymali myrsinitis fructum esse, de quo agitur. Nam & ea bacca nuci Ponticæ similis quodammodo est, quamuis laurinæ baccæ propior, & pisces in vertiginem agit, tandémque necat: quem Tithymalis effectum præter Dioscoridem etiã Galenus tribuit. Suspicionem auget, quòd Theophrastus quoddam Tithymali genus, κύπρον etiam dictũ fuisse testatur. Cordus eiusmodi baccas, nescio quã rectè, solani manici apud AEgyptios nascentis fructum esse asserit.

σπερμάτιον, ὁποῖόν λέγω] Theophr. de hoc eodem Tithymali genere: φύλλον ἔχει στρογγύλον: hoc est, *folium habet rotundum*: deindéque eiusdem καρπὸν λευκὸν, *fructum candidum*, facit, quem Dioscorides & Apuleius μυρσίνην, id est, *myrtum*. Theophrastum secutus Plinius, *Paralion folio rotundo* describit, *ac semine albo.*

ὅτε ἐν φύλλοις] Vulgata exemplar. ἐν κεφαλαίοις, *in capitulis.* Oribasius & Marcellus cum vetusto codice legunt, ἐν φύλλοις. Apuleius itidẽ *semina uelut in foliis.* Eandem lectionem iccirco secutus sum, quòd Tithymalus hic inter folia duo florẽ ac fructum proferre videatur.

CAP. CLXVI. ἡ ἐπὶ δίζα ‹ δ'.] Plinius de Pityusa, lib. 24. cap. 6. *eadem & pinaster*, inquit, *per aluum detrahit radix decocta hemina, aut seminis ligulæ in balanos, &c.* Mensuræ verò dosis corticis radicis Pityusæ seu Esulæ maioris, *quam Alsarbam* ipse vocat, longè minor est: nempe, *ad aeratos duobus ad septem*, itémque *lactis ab uno ad tria.*

CAP. CLXVII. πῖς τῆς ἀμυγδαλῆς] Plinius, lib. 27. cap. 11. *Lathyridis folia* tribuit *multa, lactucæ similia, tenuiora: magno ut uidetur, figuræ discrimine. Eius uerò grana exempto cortice piperis magnitudine* describit.

ὅσον ζ' ὀβ.] Plinius ibidem de Lathyridis granis ita scribit: *Hæc mœsta in aqua pura aut mulsa potu, hydropicos iuuant.* Actuarius itidem, in lib. de comp. med. illius grana maiora quidem quindecim, minora verò viginti dari prodidit: subdítque, illis qui vehementiùs purgari voluerint, mãdenda: qui minùs, deglutienda. At Ruffus, lib. de med. purg. Lathyridis grana decem ad purgandum ait sufficere: succi verò, tres obolos.

καὶ ὀρνιθείῳ] Iure gallinacei etiam folia Lathyridis incoqui debere scribit ibidem Ruffus. At de ipsis granis illud idem prodidit Plinius, loco citato: *Qui*, inquit, *uehementius purgari uelit, cum folliculis ipsis sumunt ea: nam stomachum lædit. Itaque inuentũ est, ut cum pisce aut iure gallinacei sumerẽtur.*

CAP. CLXVIII. οἱ δὲ μίσυριν ἀφρίδα] Galenus, in Gloss. Hipp. μίσυρις, & μίσυρα ἀφρίδι & μισυρίτης, atque etiam χαλκανθίτης nominari tradit.

ὑδρομέλιτος κοτύλας] Quantûuis κοτύλου habeatur in vulg. exemplaribus, κοτύλας lego ex vetusto codice, cũ Hermolao & Cornario. Plinius de Peplo, lib. 27. c. 12. *Media*, inquit, *potio acetabuli mensura in aquæ heminis tribus.*

CAP. CLXIX. πεφύδης τῷ χυλῷ] Gal. simpl. lib 8. de Peplij semine: σπέρμα χρήσιμον καὶ φυσῶδες, *semen utile & flatuosum*: vbi αὐτῷ τῷ, φυσώδης, πεφύδης, hoc est, *feruentis gustus*, restituendum vel ex hoc loco satis constat. Nam & πέπλιον φύσας ἄγει, hoc est, *Peplion flatus pellere*, dixit Hipp. 1. de morb. mulierum, & ex ipsius sententia Aëtius, φυσῶν τε καταῤῥηκτικὸν, *flatus discutere*. Attamẽ Ruffus, in libello de purg. med. peplum & Peplium asserit, pituitam & bilem cum plurimis flatibus, quantumuis arefacta, trahere: quo loco videtur innuere, ab ijs non tantùm flatus pelli, sed etiam excitari. Cæterùm Plin. lib. 20. cap. 20. *portulacæ, quã Peplion vocant, memorabiles usus* lõgo sermone persequitur: qui tamen huic Dioſc. Peplio non satis respondere videntur.

CAP. CLXX. ἢ ἀκροχορδόνας] Plinius, lib. 24. cap. 15. *Chamæsyce illita uerrucas omnium generum tollit* scribit: ibidémque *Chamæsycen*, quam Dioscorides ad oculorum vitia cum melle inungendam præcipit, ille *in uino coqui* voluit, *priusquam inungatur.*

C. CLXXI. διαύτους] μυχίους, legitur in vulg. exempl. itémque apud Oribasium: at Goupylus in altero codice legit, καὶ διαύτους. Ita & Lacuna: hanc ideò lectionem sequi placuit, maximè cùm & ipse Serapio ita legisse videatur. Sic inferiùs, αὐτῶ, ἴσον μύχιος, quod habebatur in vulg. codicibus, legi ex altero Goupyli codice, ἴσον βραχίων, quo modo legũt Oribasius, Hermolaus & Lacuna.

αἱ περιττότητες] Mesuæus alias insuper extrahendi Scammonij rationes edocet, in censu purgantium medicamentorum.

ὁ δὲ Συριακὸς] Præter Mysium Scammonium, commendantur Plinio *Colophonium & Prienense*: cùm tamen Priene ciuitas sit Syriæ. Mesuæus Antiochenum & Armenium laudat, Corascenum vituperat.

ὁ παρωτίλου] Paulus, lib. 7. cap. 4. Scammonium dari vult ἀκυρέπεις, & stomacho alioqui bene affectis, pondere obolorum quatuor, cum sale aut pipere aut zingibere, alióve quodam oxyporo stomacho grato, aut cũ melle: ex eo quoque cum gummi catapotia fingit. Aëtius itidẽ, lib. 3. c. 25. *dari ex eo* scribit *scrup. ij. plus minus pro uirium ratione*. subditque *ipsi salem & thymum aut pulegium admiscent. In his uerò quæ ferre possunt, præstat*, inquit, *aloen miscere: datur & per se cum melle aut ptissanæ cremore, si dandum exhibere uolumus.* Hæc ille. De eodem Plinius, lib. 26. cap. 8. *Dedère & per se ex aqua mulsa & sale quaterni oboli, sed utilissimè cum aloë, ita ut mapienter purgatione mulsum bibatur.* Oribasius succi quidem Scammoniæ drachmam vnam ad summum dari tradidit: radicis verò etiam drachmas duas exhibere non veretur. At religiosior profectò Mesuæus, qui in exhibendo per se Scammonio grana duodecim minimè transcendit.

καθαίρει δὲ καὶ τῆς ῥίζης] Purgandi gratia radice quoque Scammonię vtitur Oribasius, vti modò retulimus: sed Theophrastus, lib. hist. stirp. 9. cap. vlt. succi tantummodò vsum esse scribit, hisce verbis: τῆς δὲ σκαμμωνίας ὁ ὀπὸς μόνον χρήσιμος, ἄλλο δ' οὐδέν. hoc est, *Scammoneæ succus tantummodò utilis, ac præterea nihil.*

CAP. CLXXII. ἐλαία θαμνώδης] Sic Plinius, libro 24. capite 15. *Chamelea similitudinem foliorum oleæ habet.* Alibi tamen, nimirum libri 15. capite 7. *Chameleam* dixit, *foliis oleastri bacisque.* Sed & libro. 13. capite 21. de thymelæa agens, cuius folia Dioscorides Chameleæ assimilat, eam etiam *oleastro simulem* facit. Verùm inter oleæ & oleastri folia haud ita magnũ discrimen, nisi quòd hæc illis magnitudine cedunt.

διαφόρους αἰγιλῶπας] Alius & ab isto discrepans est Chamelææ vsus apud Plinium, lib. 24. cap. 15. quo loco sic habet: *Detrahit pituitam bilémque, folijs in duabus aï sinthy partibus decoctis, succoque eo cum melle potu.*

CAP. CLXXIII. ἢ κάπρου] Ex Hipp. in lib. de morbis mulierbr. non κάπρου, sed κύπρου legendum: quam vocẽ Gal. in Gloss. exponit, κύπρου. Sic & apud Plinium, lib. 13. cap. 21. inter varia Thymelææ nomina non Cestrum, sed Cnestron habetur.

πολὺ στυφότερος] Mesuæus Mezereon foliis esse quàm oleæ maioribus scribit: quod falsum esse deprehenditur, siue ille Thymelæam, siue chamelæam mezerei nomine acceperit. Enimuerò eas plantas & inter sese, &, quod turpius est, cum vtroque chamæleonte videtur confudisse. Cæterùm inferiùs, pro μικρὸν αἰσῦ, lego, μικρὸν αἰγῶν, scilicet, ἀφῶν.

καθαίρει κάπρα] Contrà Plin. lib. 27. cap. 9. (nisi fortè mendum subest) de cocco Gnidio: *sistit*, inquit, *alvum*: quod & rationi & experientiæ omnino aduersatur.

μαλθᾷ κοιλίαν δ'] Theoph. lib. 9 hist. stirp. cap. vlt. de cocco Gnidio: *dicunt*, inquit, σφόδρα καθαίρειν λίνον ἐν ὕδατι ἑφθὸν ἢ σῦκα ἑφθὰ πίνοντες. quo loco Gaza, à Plinio fortasse deceptus, illud, σφόδρα καθαίρει λίνον, *contra alvi solutionẽ*, minùs rectè interpretatur. Sed & σῦκα perperàm *adipem* conuertit: cùm tamen σῦκα nomine vt plerunque alias, ita & eo loco, τὸ σῶμα significetur. Plin. lib. 27. cap 9. *Coccum Gnidio ne adurem. Itaque cum paue deuorauerim, ne aduratur, cum gulam transit.*

CAP. CLXXIIII. πολὺν βαλανεῖον] Theophrast hist. stirp. lib. 3. cap. 13. de Sambuci folio ita scribit: ὁ μὲν δὴ τοῦ ἀκτοῦ καὶ ἔχοντος μελανὸν, σκίμπους, οἷς τὸ τῆς πλατυφύλλου δάφνης. μᾶλλον δὲ καὶ πλατύτερος καὶ ὀλιγοσχιστότερος ὑμένιος καὶ κάτωθεν. τὸ δ' ἄνθος εἰς ὀξὺ μᾶλλον τελευτᾷ, κύκλῳ δ' ἔχει ὑποχλωρόν. &c. id est, *folium singulare, molle, oblongum, an lauri latifoliæ, nerium maius, latius ac rotundius, cum circa medium, tum parùm in fronte, extremo magis acuminato, in ambitu Lacinatum.*

ἐν τοῖς μέλασι] Acinos Sambuci nigros describit Plinius: id quod de illis perfectè maturis accipiendum est. Sed & Theophrastus, loco citato, de ijsdem sic habet: χρῶνται δὲ πυκνοῖς μέλασι, οἷόν ἐστιν ὁμφακώδεσι· μᾶλλον δὲ μικροῖς μείζων ὁ βότρυς, καὶ ὑγιαίνει δὲ εἰκότως τὸ ὄψιμον, &c. id est, *Acinis maturescens nigrescat, immaturus unam acerbam refert, magnitudine paulò maior eruo, succo uino similo.*

ξηραντικὴ] Marcellus præterea alicubi, ψυκτικὴ, legisse videtur. Actuarius quoque, meth. med. lib.5.ca.8.sambucum & Ebulum, omissa siccandi vi, scribit, refrigerandi facultate pollere. Sed & Plinius, lib.24. cap.8. *refrigerare inflammationem* dixit, *maximè recentes ambusta*. Attamen neque sambucus neque Ebulus refrigerant, nisi fortè ex accidenti, dum bilem extrahunt: calfacere verò vtranque certum est, licet in primo gradu duntaxat: id quod satis innuit Galenus, 6. simpl.

Cap. clxxvi. καὶ ἁμιώνης] Plinius, qui de Pycnocomo eadem ferè habet quæ Dioscorides, lib.26.cap.8. id ait esse *eruca folys, crassioribus & rarioribus*: vbi pro, *rarioribus*, vel ex hoc loco, *acrioribus* legēdum, coniicio. De eiusdem radicis viribus agens ibidem, *non alvum modo & bilem, sed & pituitam exmanare*, scribit.

Cap. clxxvii. εἰ δὲ ἰχάδια, εἰ δὲ χαμ.] Malim, ἰχάδι, vel potiùs ἰχὰς, in recto casu. Sic enim nominat Theophrastus & Plinius: fitq; verisimilius ex radicis cum carica similitudine id nominis inditum illi fuisse, quàm ab efficacia contra coxendicum dolorem. Sed & αὐτὸ τὸ, χαμαιβάλανος, χαμαιεύφορος, ex Paulo legendum censuerim. Is enim, lib.7. cap.4. inter ea quæ pituitam detrahunt, *apij dimidium id quod ad radicem est & à quibusdam* χαμαιεύφορος *appellatur*, commemorat. Rursúmque, eiusdem libri cap 10. Ἀπίου, *radicis* inquit, *pars ea quæ ad acrē vergit si edatur, supernè purgat*: (*quidam ipsam* χαμαιεύφορον *nomine*) *quæ verò ad radicem est, infernè. Tota verò si edatur, vtrumque mouet*. Plinius & hanc ipsam radicem, ῥίζαν ἰχάδος vocari testatur, lib.26 cap.8.

ἀσφοδίλου] Sunt qui, ἀσφοδίλῳ, malint, vti Marcellus & Cordus. Cæteri, ἀσφοδίλου, indubitanter legunt, vti etiam legitur apud Theophr. Is enim, lib.9. hist.stirp. cap.10. ἡ δὲ ἰχὰς, inquit, ἣν ἄνω φύλλον ἔχει παραπλήσιον, βραχὺ, παχὺ, ἀνθηρὸν· ἡ δὲ ῥίζα ὑπὸ τὴν γῆν ἐστί. ῥίζαι δὲ τῆς ἀσφοδίλου, πολὺ λεπτότεραι. hoc est: *Ischas, seu Apios, folio constat vnico, breui: cauliculo vnius palmi, vnus quaternisue: radix ea asphodeli, verùm squamosa*. At Plinius, loco antè citato, Apion describit, *radix ea, sed ampliore*.

τὸ μὲν ὑπόδυτον] Lego, αὐτὸ δυτὸν, non, ὑπόδυτον. Ita enim legendum esse constat ex loco Pauli antè citato. Sic quoque Plinius, de Apij radice, loco antè commemorato: *Effoditur*, inquit, *vere, tusáque in fictili mergitur, desertóque quod supernatat, reliquum succus purgat vtraque parte sesquiobolo in aquæ mulsæ*.

Cap. clxxviii. πηροβάλου βάλος] Huius medullæ Colocynthidis, quam Hippocr. ἀνιώσης σίκυος nominabat, apud varios Medicinæ Autores varia est dosis. Mesuæus, cerastia decem: Paulus drachmam integram exhibere non veretur. Ruffus itidem, drachmam j. ex aqua mulsa propinat. At Aëtius scrup.ij. exhibet in aquæ mulsæ cyathis duobus: eodémque loco, imbecillibus etiam scrupulum j. sat esse scribit.

λαμβανομένη σὺν γάρῳ] Ita distinguit & legit Cornarius: *μιᾷ ὑδρομέλιτος λαμβανομένη. καὶ σὺν γάρῳ δὲ καὶ σμύρνῃ καὶ μέλιτι ὀφθαλμίοις καθαίνουσι*. Eum iccircò secutus sum, quòd & sensus eo modo clarior est, & ita quoque videtur Serapio legisse.

ὠμὸν ἐσθίειν τὸν ἔξω] Nonnulli ad literam illthæc ita interpretantur, vt velint pomum hoc Colocynthidis, exempta medulla simul & semine, luto oblitum incoqui aceto & nitro. Sed absurdum illud est. Quare malim legere, ὠμὸν ἐσθίειν τὸν ἔξω καὶ νίτρῳ, aut, ἔξω σὺν νίτρῳ: quo modo Serapio, Cornarius & Marcellus videntur legisse.

ἀναπλάσσουσι μαλάγματι] Modum hunc præparandi diluti Colocynthidis paulò pleniùs describit Aëtius, libro 3. capite 35. in hæc verba: ἀφαίρουσι δὲ κεφαλὴν βουλόμενοι, λαμβάνουσι δύο κολοκυνθίδας ὁμοίας, καὶ πάντῃ κενώσαντες αὐτὰς τοῦ ἐντέρου. ὅταν τὸ γαστρίδιον αὐτῆς ἁλείψωσι τῷ ἀπύρου, καὶ πλήσαντες αὐτὸ ἑφθοῦ γλεύκους ἢ οἴνου γλυκέος παλαιοῦ, ἵνα βραχῇ ἐμέσῃ καὶ νίτρῳ· ὕστερον ὀπτήσουσι (sic enim legendum, non ἀφήσουσι) μάλιστα τὸν οἶνον, καὶ ἀφαιροῦσι, δίδου πίνειν. hoc est: *Quòd si mitiùs purgare voluerit, sumito colocynthidem instæ magnitudini, eamque aperito superne, & semen totum eximito: deinde quicquid in ipsa tamen specien præ se fert, rursus extra semen in ipsam indito, & repletam sapa aut mulso dulci vetere per diem noctémque macerari sinito: tandemque vnum calfactum per panum exolatum propinato*. Ruffus itidem, in libello de purgantibus medicamentis, nulla tamen medullæ facta mentione, sic habet: ἀφαίρουσι δὲ κεφαλὴν βουλόμενος, τὸ μὲν σπέρμα τῆς σικυώνης ἐκβάλλουσι. ἐγχέας δὲ οἴνου γλυκέος εἰς τὴν φαλῆν ἕψειν ἐᾷ μαλακώτερον, ἔστ' ἂν πεπέσῃ. μασθῷ, τὸν οἶνον πίνειν. id est: *Quòd si quis mitiùs purgare volet, semine colocynthidis extracto, affusóque intra cortices mulso dulci, lento igne eum ipsam oportet, dum probè maduerit: illud tandem potandum exhibeto*. Sed & Paulus, lib.3.cap.13. eodem modo præparatum Colocynthidis dilutum in morbo comitiali propinat.

Cap. clxxix. θύμου τὸν ἄνθος] Hinc plerique colligunt, Epithymum Dioscoridis & reliquorum Græcorum aliud esse ab Epithymo Arabum: & Græcorum quidem. Epithymum, aliud nihil esse quàm ipsum thymi durioris florem. At ego Epithymum Græcorum & Arabum planè vnum & idem esse indico, scilicet inuolucrum thymi capillaceum, cui tamen flos ipse thymi interdum implicatur: quippe qui à capillamentis illis rectè secerni vix possit. Sed & ipse Autor, libro de simpl. ad Paternianum, Epithymum diserte describit, *florem assimilem setæ, subuiridem & nauseosum*. Quoniam enim Epithymum crinium vel cincinnorum modo capitula thymi quadam florum imagine comare conspicitur, florem iccircò dici constat, idq; nominis ratione minimè refragante. Quandoquidem si ἄνθος dictum est, vti voluit Etymologicus, παρὰ τὸ ἄνω θεῖν, τουτέστι, τρέχειν ἐπὶ τὰ ἀνώτερα, quidni eiusmodi capillamento ἄνθος, hoc est, *flori*, nomen aptè conueniat? Cæterùm ea capillamenta non in thymo solo, sed & in thymbra, stœbe, lino, hyssopo, serpyllo, vrtica, polio, genista, chamædry & compluribus aliis plantis reperiri

certũ eſt. Verùm quod thymo innaſcitur, peculiariter ὀθύμιον dicitur, vti quod thymbræ, ὀθύμβριον, quod ſtœbe, ὀθονίδιον. Iſta verò capillamẽta ſine radice naſci iccirco ſcripſit Plinius, quòd nullam euidentem habent radicem, vti neque viſcum, quod arboribus innaſcitur. Scilicet cui inſident planta, ea illis eſt ſedes pro terra, & qua parte inſident, ea eſt pro radice.

σύριγξ ἴχνια] Ioſephus Scaliger doctiſsimus, acerrimique iudicij vir, cuique omnium ætatis huiuſce Criticorum vix vllum prætulerim, in ſuis in Propertiũ caſtig. à Dioſc. hoc loco non quidẽ figuram Epithymi, ſed thymi duntaxat durioris proponi exiſtimat, ideóque reponendum cenſet, σύριγξ ἴχνια εἰς στάχυι, quaſi thymi durioris ſpicam voluerit Author eſſe mucronata cuſpide, qualis eſt ſtœchadis. σύριγξ verò dici putat, ipſos ſpicarum mucrones, à ſimilitudine cuſpidũ in haſtilibus, quæ quidem Homero σύριγγες ὀξυστόμοι appellantur. At equidem ex ipſius ſententia εἰς τὴν, ὦ σύριγξ, σύριγξ reponendum iudico: ſed quoniam non de ſpica thymi, verùm de Epithymo ipſo hîc agi veriſimilius eſt, nihil præterea immuto: ac interim σύριγξ voce caudas ſetoſas (quas quidem Epithymi capillamẽta referunt) ſignificari puto: quemadmodum & Hippocrates, ſeu quiſquis eſt autor libelli de corde, σύριγξ καρδίης, cordis caudam nominauit, ea metaphora volens conum ipſius deſignare. Ad eundem quoque modum EVſtathius σύριγξ Xenophonti μαλακόσυριγξ dici annotauit, ἡ σύριγξ τῆς φάλαγγος, ὥς φησιν καὶ Ὅμηρος, τίνα ἐξ ὀπισθίων σύριγγα, ſeu vt alibi, ἡ φύσις σύριγγος ἔχουσα.

μέχρις ὀλκῆς ϛ. ℈.] Sic Galenus, lib. 14. Meth. Epithymi drachmas iiij. ex aqua mulſa vel ſero propinat. Aëtius quoque, lib. 3. cap. 29. adultis Epithymi contuſi & cribrati ſcrup. xij. cum paſſo & aceto mulſo ac modico ſale exhibet. Auicenna ad quatuor aureos progreditur. Cæteri vel ampliore, vel parciore doſi ipſum exhibent. Et Paulus quidem, lib. 4. cap. 26. ad cancrum Epithymum quatuor drachmarum & dimidię põdere ex ſero vel mulſa porrigit. Libro vero 7. eiuſdem drach. v. tritas dari ſcribit, ex ſeri lactis hemina. Oribaſius, Collect. lib. 7. cap. 27. ſenas drachmas dare nõ veretur. Ruffus itidem, in lib. de purg. med. drach. vj. & amplius ex vino dulci. Plinius quoque, lib. 26. ca. 8. Epithymum aluum ſoluere tradit, à quatuor drachm. ad ſex. Meſuæus drachm. vij exhiberi poſſe tradit. At Actuarius, Meth. libro 5. idem quod Aëtius refert, ſed tantùm v. mentionem facit. Et ipſe Oribaſius lib. 1. εἰκ. ἴατρ. de euacuationibus agens quę ſanis conueniunt, binas tantùm drachmas in oxymelite propinari voluit: ſimilitérque, Synopſ. lib. 1. cap. 17. eiuſdem triti & cribrati binas vult exhiberi drachmas ex vino dulci, aut plus eo cum melle, ſale admiſto.

Cap. clxxx. αἴγωψ μαλακός] De Alypo ſic habet Plinius, lib. 27. cap. 4. *Alypon auricula eſt molli capiti, non diſſimilis betæ, acre guſtum ac lenitum:* quæ quidem verba ex hoc Dioſc. loco ſic emendo: *Alypon auricula eſt gracilibus, molli flore, radice non diſſimili betæ: ſemen acre guſtum*, &c. Porrò in eo quod ſequitur, εἰς ῥίζαν πότου, metathеſis eſt particulæ εἰς. legendúmque, ῥίζα εἰς πότον, vti paulò pòſt, σπέρμα εἰς ὄξυμελι. pro quo Actuar. Met. lib. 5. habet, σπέρμα εἰς ὄξυμελι.

πίνει πότῳ] Ex Paulo, lib. 7. c. 3. & 4. (qui quidem de plantis agens à Galeno prętermiſſis, ipſa Dioſc. verba ſolet tranſcribere) ſic emendandus hic locus: πότῳ ἴσον ὀθυμίου λαμβανόμενον μετ' ἀλῶν καὶ ὄξους. Eſt autem Alypon, eodem teſte, herba eadẽ cum ea quæ illius ætate Alypias dicebatur.

Cap. clxxxi. εἰ δὲ φακοειδὴς] Empetron Galenus, Paulus & Aëtius alio nomine φακοειδὴς appellari ſcribunt: nec deeſt ſuſpicio, quin & apud Dioſcor. pro φακοειδὴς, φακοειδὲς, legi oporteat.

εἰ δὲ φακοειδὲς μᾶλλον] De eiuſdem plantæ diuerſis partibus iſta prima facie intelligenda videntur, quaſi voluerit Dioſcorides, quæ pars Empetri terræ propinquior fuerit, amaram reperiri, &c. Sed aliter ex ſententia Plinij accipienda ſunt, quaſi nimirum velit quod Empetrum mari propius eſt, ſalſum: quod ab eodem remotius & terræ propinquius, amarius ſentiri. Sic enim Plinius, lib. 27. cap. 9. vti certè quidem habent vulgata exemplaria: *Empetron, quam noſtri ſaxifragum nominant, naſcitur in montibus maritimis, fere in ſaxo: quò propius mari fuerit, minus ſalſa eſt: potaque bilẽ trahit ac pituitas: quòlongius magiſque arrepta, amarior ſentitur.* Verùm quo ſit maior Plinij cum Dioſc. conſenſus, illa ſic legenda videntur: *quò propius mari fuerit, magis ſalſa eſt*, &c. In iis verò quæ proxime ſequuntur, Plinius palàm Empetrum maritimum cum ſaxifraga confudiſſe videtur.

Cap. clxxxiii. ἀνελκύσαι δὲ οἶνῳ] Iſta ſic reſtituit Cornarius: ἔνιοι ῥίζαν ἀνελκύσαι δὲ οἴνῳ πλατυτέρᾳ, καὶ μετ' ὕδατος πινέτωσαν κυάθους β'. Geſnerus legendũ ſuſpicatur, μετ' ὕδατος ξηραίνειν κυάθους β'. monuit. At ego cũ Serapione, Marcello & Ruellio ſic legere malim: ἔνιοι ῥίζαν ἀνελκύσαι δὲ ὕδατι, καὶ μετ' οἴνου πινέτωσαν πλατυτέρᾳ κυάθους β'. Nam & Plinius, lib. 23. cap. 1. de Ampelo agria, (quam tamen nominis ἀμαυρώσει deceptus cum labruſca interdũ temerè cõfundit) ſic habet: *Radix decocta in aqua, potui data cum cyathis duobus, humorem alui facit, ideò hydropicis datur.* Rurſúmque, lib 27. cap. 27. *Radix eius decocta in aquæ cyathis vrnæ additis cum Coi cyathis duobus, aluum ſolui lenuiter, ideoque hydropicis datur.*

Cap. clxxxiiii. διὰ βρυωνίας] Gal. lib. 1. de comp. pharm. κατὰ γένη ἀμπέλου ἀδαλὶς & βρυωνία ſeparatim, tanquam diuerſa, commemorat: nec malè, quandoquidem ipſemet, 6. ſimpl. vitem nigram propriè βρυωνίαν vocari ſcripſerat: quod ipſum Plin. lib 23. cap. 1. admonet. Quòd ad vocem ἄχνων ſpectat pro ea fortaſſis, ἴχνιον, reponendum: ſiquidem ἴχνιον Hippocrati dictam Galenus in Gloſſ. ἀδαλὶς βρυωνίας exponit.

ὑπνωτικὸν δ' ἐστίν] Plinius de Vitis albæ radice, lib. 23. cap. 1. *Et ipſa autem largior aliquãdo ſenſus purgat:* quo loco, *ſenſus urbat*, reſtituendum eſſe, hinc eſt facile colligere.

ὁ ψιλοθρὶξ ὁ ἄγριος] Hunc Vitis albæ fructum coriariis etiam vtilem eſſe ſcripſit Galenus, 6. ſimpl. ac idipſum loco citato luculenter confirmat Plinius. Attamen Theophraſtus, hanc coriapilis ſpoliandi vim, vitis ſylueſtris fructui tribuit, libro nono, capite vltimo: quo loco de vite ſylueſtri agens, οὗ καρπὸν, inquit, ψιλὸν ἔχει ὁ ἄγριος. Sic enim legi par eſt, non, οὗ ἄνθρα, vt in impreſſo codice.

CAP. CLXXXV. μέλαινα ἔξωθεν] Mesuæus huius Vitis nigrę radicem scribit esse cineritiam foris, intus albam, non tamen albedine eius quę alba dicitur. In cæteris videtur planè cum Dioscoride consentire.

ἥττον μέν τι ἀσφαλῶς] Rectiùs fortassis, ἀσφαλῶς. quanquam vtrouis modo sensus bene constat. Gal. itidem, 6. simpl. nigram Vitem alba in totũ inefficaciorem esse prodidit. At contrà semel aũ iterum inculcat Plinius, *Nigræ radicem ossa infracta vel effracta extrahere, quam albæ.*

CAP. CLXXXVI. οἱ δὲ βαλῖχοι] βαλῖχον etiã nominauit Nicãder, in Ther. Theophrastus verò, lib. de causis plant. 1. cap. 8. βαλῖχοι, nisi fortè, quod ego cum doctiss. Scaligero malim, eo loco τοὺς βαλῖχους pro pulegio, quàm pro Filice, interpretari satius fuerit.

καὶ ἄνθρα] Sic Plin. lib. 27. cap. 9. *Filicis duo genera nec florem habere* scribit, *nec semen.* Theophrastus itidem, lib 9. hist. stirpium, cap. vlt. de Filice sic habet: σπέρμα δ' οὐκ ἔχει, οὐδὲ ὑγρόν, *semen non habet neque liquorem:* quo loco αἷμα τῶν, vnis, Cornarius reponit, ταὐτὸν. Posset &, αἷμα, pro eadem illa voce reponi. Sunt porrò nonnulli quo in numero & ipse Tragus est) qui è Filice semen certis temporibus colligi affirmant. Sed planè fallũtur, dum minutulum eum puluerem, qui auersis foliis velut inhæret, pro semine accipiunt.

σκολοπένδριον] Cornarius, δραχμὰς, legisse videtur: ac Plinius certe quidem, lib. 27. cap. 9. *Filicis radicem melùs tænias detrahere* scribit *cli sammony pari pondere.* At ego vulgatam lectionem retineo, quanquam dudũ tantùm obolorum Serapio mentionem facit.

ἡ ῥίζα πεπόνα] Hæc vox, (πεπόνα) Marcello & Cornario non immerito suspecta fuit, adeóq; ab ijs prætermissa. Equidem dubito vtrum potiùs, πεφθεῖσα, seu βλασθεῖσα, seu etiam λεανθεῖσα, legi oporteat. Nam & Plinius de Filicis radice sic habet, lib. 24. cap. 11. *Harundinis radix contrita & imposita, Filicis scirpem corpore extrahit: itémque harundinem, Filicis radix.* Sed & Celsus, libro 5. c. 16. *Pessima*, inquit, *ex sureulo harundo est, quia asperа est. eademque offensa etiam ex Filice est. Sed usu cognitum vtranque aduersus alteram medicamentosam esse, si cuerita superimposita est.*

ἴνδικα δὲ πολύ] Marcellus locum hunc minimè interpretatur, cum tanquam mutilum asterisco notasse contentus. At Cornario ita restituere visum est ἴνδικα δὲ πολὺ κάλαμος, καὶ πολὺ βαλῖχος σταφὶς, ἀφανίζουσι κάλαμος. καὶ πάλιν, ἴνδικα πολὺ βαλῖχος καὶ πολὺ κάλαμος σταφὶς, ἀφανίζουσι βαλῖχος. Ego verò locum eundem ita potiùs restituendũ iudico: ἴνδικα δὲ βαλῖχος καὶ πολὺ κάλαμος σταφὶς, ἀφανίζουσι βαλῖχος καὶ πολὺ, ἴνδικα δὲ κάλαμος, καὶ πολὺ βαλῖχος σταφὶς, ἀφανίζουσι κάλαμος. Est enim verò similius ex ijs plantis eam quæ copiosior fuerit, parciorem alteram enecare atque perimere. Plinius, lib. 18 cap. 6. de eadem, quæ inter harundinẽ & Filicem est, dissensione dissociationéve seu discordia, ἀσυμφωνίαν Græci vocant, paulò aliter habet in hæc verba: *Aiunt & arua solstitum* (filices) *amulsas non venasci, nec harundine sectas, aut exaratas vomeri harundine impositа. Similiter & harundinem exarari Filicе vomeri impositа præcipiunt.*

CAP. CLXXXVII. πάχηται] Plinius, lib. 25. cap. 9. de vtraque Filice: *Radices*, inquit, *vtrique longæ in obliquum.* Ex quo loco patet, nõ πλατῖαι, vt plerique voluerunt, sed, παχῖαι, potiùs hoc loco legendum: quemadmodum & Hermolaus Barbarus & Marcellus emendarunt.

σαὶ εἰσὶ δὲ πτίλωται] Sic Theophr. lib. 9. hist. stirp. cap. 20. ἡ δὲ θηλυπτερὶς, χρίεται φησὶ καὶ ἁλμυρὰς καὶ ἡ πλατεῖα καὶ ἡ λεπτή. φησὶ μὲν γὰρ τὴν πλατεῖαν, αἱμοδυσεντερίαν μάλιστ' φησὶ δὲ καὶ λεπτὴ, ἐν οἴνῳ γλυκεῖ μετ' ἀλφίτων διδομένη. χωλαῖς δὲ καὶ ἡ δεδῃ, καὶ μὴ ἐχούσαις ἢ, ἀναβαίνειν φασίν. καὶ δὲ μὲ, ἡ ὅλον ἔτος γίνεται. Quæ quidem verba reddidit Plinius, libro 27. cap. 9. ad hunc modum de Filicum radicibus agens: *Pellunt intestinorum animalia: ex hu tænias cum melle: cætera ex mulso dulci triduo potæ, &c.* Ac deinceps: *Neutra danda fœminis, quoniam grauidæ abortum, cæteris sterilitatem faciat.* Ex his locis palàm fit, Lacunæ & Marcelli lectionem, καὶ ἔχουσαις δὲ λαθῇ, probatiorem esse. Eam iccircò secutus sum, maximè cũm Serapionis verba idem planè sonare videantur. Inferiùs itidem pro, ἐπιπλεόντων, rectiùs hauddubiè legas, ἐπιπλεόντων: quod mendi genus & aliàs sæpenumerò occurrit.

CAP. CLXXXVIII. ἐν δὲ τοῖς ἀγκίοις] Serapio cæterique ferè Interpretes ista sic legisse videntur, ἐν τοῖς ἀγκίοις ὀρίμοις ὑπὸ δένδρων, μάλιστα δὲ δρυῶν. Plinius autem, lib. 26. cap. 8. *Polypodion* scribit *in petru nasci, aut sub arboribus vetustis.* Vtut sit, ἐν τοῖς, ἀγκίοις, ἀγκίοις legendũ omninò videtur.

δυσεντερικὰ δρασὶ] Plinius, ibidem, de Polypodij radicis ad aluum soluendam vsu aliter, in hæc verba: *Ipsa concisa inspergitur oleri, vel betæ, vel maluæ, vel salsamento: vel cum pulticulis coquitur ad aluum vel in febri leniter soluendam.*

φλεγμὴ καὶ χολὴ] Plinius itidem, de Polypodij radice agens, æquè ac Dioscorides, *bilem* absolutè scribit *ab ipsa detrahi.* Attamen de bile nigra id accipiendum, quo modo intellexêre Aëtius, Actuarius, Serapio, atq; etiam Mesuæus.

CAP. CLXXXIX. βρύωνος] βρυώνης, hauddubiè legendum. Vsum verò Bryopteris seu potiùs Bryoteris ad psilothra, qui quidem proximè sequitur, aliter ac ipse Dioscorides, refert Plinius, libro 27. capite 9 hisce verbis: *Psilothron est radix tusa. Illinitur enim usquedum sudores euocet: iterumque & tertio, ita ne sudor abluatur.*

CAP. CXC. καυλοὶ δὲ πολ.] Plinius contrà, lib. 21. cap. 16. *Cnicon* vno *caule, nec ramosum* scripsit Sed tùm de syluestri potiùs Cnico, quàm de hoc sativo egisse crediderim.

θαμίαι] Plerique Interpretes, quibus haud immeritò vox θαμίαι suspecta fuit, ἐλαίαι, legisse videntur. θαμίαι enim, æquè ac θαμὶν, constat pro oleæ potissimùm germinatu primo vsurpari solitum: at ipsum oleæ fructum vspiam eo nomine designatum vix crediderim.

Θασίων] Fortè Θασίων, supple, καρύων, βοτάνων, ἀμυγδάλων. Nam in amygdalarum genere Thasię ex Thaso insula, etiam teste Plinio, lib. 14 cap. 7. celebrantur. Cæterùm pro, λελεπυσμένων, rectiùs legas, λελεπισμένων.

ἐχόμενα τῆς ὀφεως] Non abs re dubitet quispiam, vtrum ista caricarum caro mellis ante memorati vicem supplere debeat, an verò præter caricarum pulpam mel etiam adjici oporteat. Serapio certè quidem in hac placentularum præparatione vtriusque & mellis & caricarū pulpæ meminit, dum præter caricarum triginta carnem, mellis etiam quantum sat fuerit adjicit.

Cap. cxcii. ὡσεὶ ὅτε πτελέας μικρὸν] *iuxta folia*, seu potiùs, *iuxta foliorū pediculos*. Rectiùs Plinius: qui quidem lib. 25. cap. 5. de hoc semine Mercurialis agens, *id mari iuxta genicula fieri* prodidit.

ἡ πρὸς ἄρρενα] Ad iuuandam masculorum aut fœminarum conceptionem vtēdi vtraque Mercuriali modos alios recensēt Plinius, loco antè citato, quos quidem ascribere hoc loco nolui, locum indicasse contentus.

Cap. cxciii. ἀπὸ τοῦ σκέλους] Theophr. lib. 9. de hist. stirpium, cap. 19. Scorpium dictum putat, quòd scorpioni similem habeat radicem. Verùm illud non quidem de hoc Heliotropio, sed de aconiti genere, thelyphono dicto, intelligendum est, cuius & ipse meminit Plinius, lib. 27. cap. 3. hisce verbis: *Radix mirarentur in paulum scorpionum modo: quare & scorpium aliqui appellauere.*

ἀπὸ τῆς ὥρας ἐπωνύμου] Heliotropiū solstitio florere, autor est Theophrastus, circa finem libri 7. hist. stirp. Inde fortasse potiùs nomen illi datum est, quàm quòd sese cum sole circumagat. Eadē ratione ἡλίου τροπὴ ἰσάτιν ἴδιον ἔρνος vocatur à Nicandro, in Theriacis: quem locum explicans Scholiastes, etiam ἡλιόκαυτον dictum annotat: sed haud ita rectè folia oleę candida eidem tribuit. Apuleius verò nominis etymon vtrinque repetit. *Nomen enim*, inquit, *accepit quod æstuo solstitio floreat, uel quòd Solis motibus folia conuertat.*

ἐπιπόρφυρον] Lacuna in vetusto suo codice legit, ἐπιπόρφυρα ὑ ἐπιπορφυρα. Sed magis placet lectio altera, λάθιαι, ἐπιπόρφυροι, &c. Nam & Apuleius *florem Heliotropio maiori* tribuit *in summitate tenuem & neluti purpureum, atque uncatum in similitudinem caudæ scorpionū.* Plinius verò, lib. 22. cap. 21. *cæruleum florem* eidem *ascribere* videtur.

φύεται ἐν τραχέσι τόποις] Sic Apuleius, *maius Heliotropium* scribit in *aspero loco nasci*, vti *minus, in amœno.* At Plinius, loco modò citato, postquā duo genera fecit *Heliotropij, heliosæpium* in quàm & τριόφθαλμον: *illud nasci*, inquit, *non nisi in pingui solo cultoque, triophthalmon ubique.* Sed vide, num Plinius eo loco Heliotropion minus seu tricoccon cum maiore confuderit.

μετ' ὄξους καὶ πηγάνου] Ruffus Ephesius, in fragm. de purg. med. Scorpiuron addito vino propinari scribit. Eius enim hæc sunt verba: Σκορπιουρος μὲν καθαίρει φλέγμα καὶ χολὴν. δρᾶται δὲ ὅταν διεφθαρμένων ὑγρῶν ὑποκρᾶσις τοῦ ὕδατος γένηται τοιαύτη. hoc est, *Scorpiurus quidem purgat pituitam & bilem. Sabificit uero manipulus ex aqua maderata calefacta, potuique affuso mane.*

Cap. cxciiii. κατὰ κοκκίδιον] Singula quidem grana rotunda sunt, sed perpetuò terna sibi inuicem cohærentia: vnde & Aëtio, tetrab. 4. lib. 3. cap. 14. itémque Plinio hoc genus Heliotropij κόκκινον cognominatur.

καὶ καρδάμῳ] Lacuna in vetusto codice legit, καρδαμωμῳ, & sic etiam legitur apud Paulum, lib. 7. quanuis Interpres non *cardamomum*, sed *nasturtium* verterit. Attamen tam nasturtium, quod καρδαμον Græcis dicitur, quàm cardamomum ipsum lumbricos pellit, vel ipso testa Dioscor. idcóque vtrumuis legas, parum refert.

Cap. cxcv. ἑρπύλλου σπερμίου] De hac ipsa herba sic quoque scribit Plinius, lib. 22. cap. 15. *Scorpius herba semen habet ad similitudinem caudæ scorpionis folia parua* &c. Hanc tamē eandem notam, sed falsò, vti certè videtur, tribuit idē Plin. lib. 22. cap. 21. heliotropio minori, quod tricoccon, & alio nomine scorpiurum vocauit, idque his verbis: *Semen eius est effigie scorpionis caudæ, quare & [illegible].*

IN LIBRVM QVINTVM.

Cap. l. χλὸς πτελέας] Plinius, in procemio lib. xxiii. quo loco lōgè plures Vitis partium medicos vsus prosequitur, succum hūc non dat bibendum, sed infundit tātummodò, hisce verbis: *Succus eorum dysenteriis infusus medetur.* Sed & ibidem, quem ad lienis tumores commendat Dioscorides sarmentorū cinerem duntaxat impositum, is ad lienis remedia dati etiam ad bibendum scribit, aceto conspersum.

Cap. lii. ἄκυροι, ὀξύμαχοι] In vinaceis seruatas Vuas stomachum infestare scribit Plinius, lib. 23. cap. 1. contrà quàm hìc tradat Dioscorides: cuius tamē sententię astipulatur & ipse Gal. lib. 2. de alim. facult. Nam de hac Vua ollari agens: πνεῦμα, inquit, ὀλίγου χωρὶς ὑ πάνυ σφοδρὸν, καὶ ὃς αἰσθήσεως ὀλιγιστὴ σχεδὸν ἐνδιδοῖ ὀσμήν. hoc est, *Ventriculum dissolutum eiusmodi Vua roborat, & cibū fastidientibus appetentiam excitat.*

Cap. liii. καὶ πυρούς ἢ κριθὰς] Plinius quoque, lib. 23. cap. 1. de Vua passa sic habet: *Nucleus exēptus uesicæ nullo habetur & tussi.* Sed mox statim subdit *alba nitior*: cuius tamen contrarium sensisse videtur Dioscor. qui paulò antè albam κυκλομήρου (nisi fortè cum Manardo malis ἀσταφυλίδος) esse prodidit. Nam si magis astringit, vesicæ ac tussi minùs vtilem esse fit verisimile.

μετὰ ἁλφίτου πυρίνου &c.] Plinius ibidem, de Vua passa, *Testium*, inquit, *inflammationes cum farina cumini aut coriandri imponitur*: quasi legerit, μετὰ ἁλφίτου κυμίνου, ἢ κορίου. Ac certè quidem ad testium inflammationes coriandrum cum Vua passa impositū valere prodidit Dioscor. lib. 3. cap. 71. Eodem verò lib. agēs de cumino satiuo, cap. 68. id cum Vua passa commendat ad easdem inflammationes, sed addita lolij farina.

Cap. v. τῆς ἀχείας ἀμπέλου καρπὸς] Sic Plinius, lib. 12. cap. 8. *Oenanthe, est uitis labruscæ uua: colligitur cum floret, id est, cùm optimè olet.* At apertiùs Gal. lib. 8. περὶ τροφῶν, cap. 1. οἰνάνθη δ' ὀνομάζουσι τὸ ἄνθος ἀχείου ἀμπέλου ἐκλάστημα καὶ τὸν αὐτὸν, ἐξ οὗ τοὺς ὀμφακίτας ποιοῦσι γίνεται. id quod perperàm vertit interpres hunc in modum: *Oenanthen appello uitis syluestrium germen unà cum floribus, ex quo sauendenis diebus mustum fit.* Ego verò malim, *ex quo succus*

ulibus unus fieri solet.

πρὸς τὰ σκληρὰ τραχέα] Omnes Interpretes, λεῖα, legisse videntur: quam ego lectionem & ipse prætulerim.

CAP. VI. ἔστι πικρὸς] Plinius, in præf. libri 23. inter cæteras Omphacij dotes ipsum conferre scribit *acetariis maradis*, vt aliàs non semel, ita & hoc loco, ni fallor, vocum ἅλυκος & οὐλὰς similitudine deceptus. Addit ibidem, *conferre ossibus purulentis limosis*: pro quo legendum iudico, *auribus purulentis limosis*: hæc enim iungit Dioscorides. οὐλοκατάδικος, ὧν πυορροούντων.

CAP. IX. ὁ δὲ πρόλιμνος] Vti Vina ἀθάλαττα seu ἀπαράλια Galeno dicuntur, maris expertia, quibus scilicet neutiquam aqua marina erat admixta: ita contrà θαλάττια ἢ πρόλιμνα, quibus alioqui languidis debilibúsve aqua marina addebatur, seu ad firmitatem gratiámve conciliandam, seu ad vetustatem accelerãdam, seu denique quò fœliciùs asseruarentur, diutiúsque perennarent. Eorum variè parãdorum temperandorúmve rationem deinceps Dioscorides, itémque pleniùs ipse Plinius & Columella edocent. Priuatim verò Plinius, lib. 14. *marinæ aquæ Vino misendæ originem ductum* tradit *a seruo furto, sic mensuram explente.* Aliud verò fuit eidem Vinum thalassites, cui præcox vetustas conciliabatur vasis musti deiectis in mare.

κακοσμαχὲς] In eandem sententiam Mnesitheus Athenienſis apud Athenæum, lib. 1. sic habet: οἱ δὲ ὀπτιμάτιστοι πρὸς καπνὸν ὀπτοί, ἀκραιπαλοί τε εἰσὶ, καὶ πάλαι λύουσι, δύσθυμοί τε τὸν σύμπαντα, ὑμφαίνεις τε ἐπιῤῥιζοῦσι καὶ συγκαπνίζοις) πάνυ ἡδέως. &c. hoc est, *Quæ maris aquæ satis diligenterque Vina condiuntur, caput crapula neutiquam grauat, alium soluunt, insuperque os ventriculi mordent atque lanantur, inflationésque gignunt, ac simul etiam aborsum conuectionem promouent.*

κηλὶς δὲ μελαμψ.] *Psithium ex melampsithio*, vt scribit Plinius, lib. 14. cap. 9. *passi genera sunt, suum saporem, non vini, referentia.* Sic verò dicta sunt à Plithia vite, quam Columella, lib. 3. inter Græculas commemorat.

ἧς ἀκροθωνίτης] Lacuna ex vetusto codice legit, ὑμνεῖς, quanquam vtranque lectionem recipi posse asserit. Ita tamen & ipse Plinius legisse videtur. Is etenim, lib. 23. cap. 1. *Vina*, inquit, *resina condita, frigidæ stomachis vtilia, existimantur nõ expedire nomotoribus.* Contrà tamẽ sensisse Celsum iccircò fit vero simile, quòd lib. de rẽ med. 4. cap. 4. agens de stomachi resolutione cùm cibi tenax non est, in eo affectu Vinum austerum & resina conditũm potui aptissimum esse scribit.

CAP. X. δεῖ τὸν οἶνον ἀεὶ] Vt Marcello, ita & mihi placuit magis veteris codicis lectio, λεῖον, αἰεὶ τῷ λευκῷ, quod habebatur in vulgatis exemplaribus. Cùm enim paulò antè Vina ista pronuntiarit Autor ἀδρομερῆ, hoc est, *crassarum esse partium*, minimè certè ipsorum tenuitas in causa fuerit, cur neruos minùs seriant: neque enim vina eadem & tenuia & crassarum partium simul & semel esse possunt. At nihil obstat quominùs, etsi crassarũ sint partium, etiam λεῖα, hoc est, *lenia*, dici possint. Ita nanque cum Terentio & Celso *lenia vina* libet appellare, quæ asperis opponuntur, vti & aliàs μεμαλαγμένον, teste Eustathio Homeri Interprete, σαφῶς οἶνον ἐπὶ τοῦ ἀπαλοῦ καὶ λείου, hoc est, *vina dura mollibus* opponuntur.

ὁ δὲ Πραινεστὸς] Quinam locus Præpiano vino nomen dederit, mihi nullo modo constat, quoniam eiusce nominis vini neque apud Athenæũ Plinimve, (qui tamen quamplurima id genus vina commemorãt, sed neque alibi vspiam (quod sciam) vlla fit mentio. Paretypiani cognomen Interpretes nonnulli non magis certa, opinor, vocis origine reposuerũt. Plinius certè quidem, lib. 14. ca. 6. Pyctanon quoddam vinum (nisi fortè mendum subest) ex Adriatico sinu à Græcis miris laudibus celebrari narrat. Attamen hoc loco cum Cornario Πραιβουτικὸν potiùs legendum ego suspicor, quoniam & Plinius, citato loco, eiusmodi vini meminit. Est autem Prætutianus ager, vti ex ipsius Plinij verbis, lib. 3. cap. 13. & 14. colligere licet, ab Adriatico agro Adriáque colonia haud ita dissitus. Ideóque cùm vinum Præpianum scribat hic Dioscorides, ἐκ τῆς κατὰ Ἀδρίαν παραλίας εἶναι, ignotúmque planè sit Præpiani vini aut etiam Paretypiani cognomentum, Πραιβουτικὸν potiùs reponendum esse iudicaui. Vbi verò capite proximè sequenti legitur, καὶ ὁ Πραινεστὸς ἐκ τῆς Ἀδριανοῦ, ego legere malim, καὶ ὁ Πραιβουτικὸς καὶ ὁ ἐκ τῆς Ἀδριανοῦ. Neque enim Prætutianum vinum ex ipso Adriano agro deuehebatur, sed ex locis Adriæ Adrianóve agro vicinis.

CAP. XII. κηλοειδὴς ὑμφακίνης] Hoc factitii vini genus, quantum ex eius conficiendi ratione licet colligere, illud ipsũ est, quod bion seu potiùs βίαιον, à violentia scilicet quæ illi contingit in festinatione, Plinio dictum videtur, lib. 14. c. 8. itémque lib. 23. cap. 1.

CAP. XIII. καὶ αὐστηρὸν] Aliam fuisse ætate Galeni Loræ conficiendæ rationem, scilicet citra coctura salísque admixtionem, vnicuique patet ex iis quæ ab ipso Gal. scribuntur, lib. 2. de alim. facultatibus: quo loco Loram à Græcis quidem πρῶρα, & à popularibus suis συμφυλέτης, ab Atticis verò λιτρεῖαν nominari tradit. Sed Polluci præterea φρυγανώδης οἶνος dicitur. Plinius, libro 14. cap. 10. Loram inter operaria vina recenset, quorum tria genera ibidem commemorat.

αἱματώδη μετ' ὀπώρας] Marcellus, ἐκ ὀπώρας, legẽdum suspicatur: malim ego mentem Marcelli secutus, ἐπὶ ὀπώρᾳ. Plinius certè quidem, posteaquàm operariorum vinorum conficiendorum rationem tradidit loco citato, illicò subdit: *Nulla ex his plus quam anno vsus.* Sed neque apud ipsum salis soliti Loræ Dioscoridem adiici vlla fit mentio, cuius tamen nõ paruam esse vim ad vini cuiuscunque conseruationem nemo nescit.

καὶ ὅτι τὸν οἶνον αἱμ.] Vel legendum, ὅτι τὸν ἐκ τούτου καταλαμβανόμενον, vel, ὅτι τὸν ἑαυτοῦ καταλαμβανόμενον. Nam & actiuè τὸ καταλαμβάνειν dicimus, ἰσχὺν seu ἑαυτὸν, & neutraliter idem verbum ἐπὶ τῶν, καταλαμβανόντων seu καταμιζόντων ἐπὶ τῆς τέχνης, ἅπερ καθαίρουσι τὰς ἀκρότητας, vsurpatur.

ἴσον μέρος] Inter Dioscoridis & Plinij vinum ἀδρόμερον, hoc est, *crassarum*, illud est discriminis, quòd in eo præparando Dioscoridis musti & aquæ pares recipit portiones: apud Plinium verò, lib. 14. cap. 16. dupla legitur musti ad aquam proportio.

CAP. XVII. χρώμενοι δὲ τῷ ἀφρῷ] Vtrobiq; simpliciter, ἀφρῷ, legit Marcellus, quemad-

modum in vulgatis exemplaribus habetur. Manardus autē, *αἰ ἀφεψῶμεν*, priore hoc loco legendum ſuſpicatur: quaſi *αἰ ἀφεψῶμεν non æquere* ſignificet. Sed eo ipſo loco legendum potiùs, meo quidem iudicio, *πρὶν ἀπεψῆσαι*. vel, *μὴ ἀφεψῶμεν*. Eſt enim certum ex Gal. 12. Meth. cap. 3. itémque 3. de victu in acut. Mulſam coctā, vt minùs aluum ſubducit, ita magis nutrire: contráque crudam, vt minùs nutrit, ita & aluum magis ſubducere.

δεῖ δὲ μικροφύτου] Plinius non, *μικροφύτου*, ſed *μικροΐχου* legiſſe videtur. Sic enim, lib. 22. cap. 24. de aqua Mulſa ſermonem faciens: *Frigidam*, inquit, quo loco *crudam* legendum cenſeo) *dari ualetudinis uenerii melliendo inuento apud Autores, & hunc potum bibendum alfiosis, item anum humulis & præpara hominibus, quos illi dixere μικροΐχους.* Qua verò ratione *μικροΐχους* cōueniat, deinceps prolixa ſatis oratione proſequitur.

δὶς ὕδατος] Vt hæc aptiùs cohæreant, vel legi velim, *δικαίου ὕδατος*, &c. vt in contextu: vel *δεῖν ὕδατος ὑμεξέου παλαιοῦ μεγυδρίου καὶ ἁλιαζομένου*.

ὑμεξέου παλαιοῦ] *Quinquennio ad hoc ſeruari cœleſtem aquam iubent*, inquit Plinius, lib. 14. cap. 17. In eundem vſum, vt ſcribit Columella, lib. 12. cap. 12. *multos antè annos cœleſtem aquam uaſis includunt, & ſub dio in ſole habent, deindéque eam ſæpiùs in alia uaſa transfundunt & eluant*, vt craſſamentum deponat. *Quibus non fuit curæ cœleſtem inueterare aquam, recentem ſumunt, eámque uſque in quartum partem decoquunt*, &c.

τὸ ὑπὸ μέλιτος] Cum Cornario legendum, *τὸ ὑπὸ μέλιτι τὸ ἀκρατόμελι* &c. vt ad poſteriorem articulum referatur Hydromel, quod tanquam generis nomen ſtatuitur, cuius reuera ſpecies eſt *τὸ ὑπόμελι*. Quid ſit autem hoc *ὑπόμελι*, videre eſt apud Galenum, AEginetam, Oribaſium & Aëtium: à quibus pleniorem illius conficiendi rationem licet repetere. Hoc ipſum porrò Hippocrates aliique veteres *ὀξύμελι* videntur appellaſſe: quanquam ſi ex ſententia Galeni duplex eſt Apomelitis differentia, vnúmque dulce eſt, acidum alterū, ſeu tempore áceſcat (quod quidem maximè accidit, vbi ex áqua pluuia confectum non eſt) ſeu etiam addito aceto acritudinem illam contraxerit: hoc alterum *ὀξυμέλιτος* appellationem potiùs mereri videtur. Sed & citra acetum duplex Apomeli fuiſſe cōſtat ex ſententia Philagrij & Aëtij: alterum quod è fauis ſolis in aqua decoctis, alterum quod ex melle è fauis aqua elotis exempto & cum aqua ipſa decocto conficeretur. Cęterùm Apomeli cū mella Columellæ vnum & idem eſſe mihi videtur.

ἀκρατέστερον πιεῖν] Alij, *ἀκρατέστερον πιεῖν*, legunt. Sed verouis modo legas, conſtabit ſententia. Nam vertere potes, *ἀκρατέστερον πιεῖν*, *purius ac ſincerius fiuere*, ſic vt neque cera aliæve fæces ſubſidant, neque ſpuma ſupernatans vlla relinquatur: vel, *meracius conflare*, hoc eſt, *minùs dilutum*: quo modo etiam mulſam cui minimè ſeruata proportione mel copioſius additur, meraciorem ac minùs dilutam, contráque cui mel parciùs adijcitur, magis dilutam Medicis nominare mos eſt. Quòd ſi, *ἀκρατέστερον πιεῖν*, legeris, vertere quoque poteris, *meracius bibi* oportere, hoc eſt, *nunquàm addita aqua*. Nam & frigidam, ſiquidem Oribaſio credimus, Apomeliti miſcebat Galenus, quò magis refrigeraret ac ſitim reſtingueret. Poſſet & *αἰ πῖ, ἀκρατέστερον, πιεῖν*, legi: ſiquidem ex Philagrio docet optima ratione Oribaſius, med. collect. lib. 5. cap. 17. inueteratum Apomeli ſubito ac recenti longè præſtantius eſſe.

ὅτι νοσοῦντι] Mellam quoquo ſuā Columella, lib. 12. cap. 11. negat languētibus poſſe pro aqua mulſa remedio eſſe, quoniam ſi bibatur, inflationem ſtomachi & præcordiorum facit, ideóq; illā ad condituras tantùm deſtinat. At Aet. tetr. 2. ſer. 1. cap. 137. Apomeli ſcribit, in morbis quibuſdam, quos eo loco recenſet, conferre: at calidis & ſiccis naturis aduerſari, itémque morbis calidis & inflammatis præcordijs noxium eſſe. Sed fortaſſe Dioſc. dum Apomeli in vniuerſum ægrotantium potui minime aptum eſſe prodidit, haudquaquam eam nouerat, quę extat apud Aetium, illius præparandi rationem, per quam quicquid cerolum eſt, penitùs tolli poſſet.

CAP. XVIII. *γλυκυμέλιτος*] Pugnantia iungere Dioſcorides cuipiam fortaſſe videatur, qui Aquam cōmendarit dulcem ſimul & *ἄποιον*, *qualitatis expertem*. Sed certū eſt hoc loco *γλυκὺς* vocem in proprio ſignificatu minime accipi, ſed quo modo interdum à Philoſophis æquè ac Medicis vſurpari cōſueuit. Aquam enim dulcem Autor intelligi vult, non quæ verè propriéq; ſit dulcis, ſed quæ ſaltē ſit *ἥδιστος ὕδατος πόσις*, vti loquitur Paulus, lib. 1. cap. 50. ſeu *τὸ γλυκὺ σωτηριωδέστερον*, vti Aetius, lib. 3. cap. 165. Poteſt & dulcis Aqua eiuſmodi non tantùm comparatè dici ad ſalſæ aliáve qualitate præditæ Aquæ rationē, ſed quæ, licet inſipida ſuapte natura, dulcem tamē ſaporem facilè poſſit ſuſcipere. Nam & eadē ratione pituitam inſipidam, *dulcem* nonnullis cognominare libuit.

CAP. XXI. *ὄξος ψύχει*] Acetū mixtæ eſſe qualitatis, frigidæ videlicet pariter & calidæ, demōſtrat Gal. lib. 1. ſimpl. ita tamen vt calidam frigida ſuperet. At Dioſcorides hoc loco, Acetum frigidum ſimpliciter pronuntiauit. Plinius, lib. 23. cap. 1. *Acetum*, inquit, *ſummæ uim eſt in refrigerando, non tamen minor in diſcutiendo.*

CAP. XXII. *ἁλὶς ὀλκάδιον*] In temperando Oxymelite ſalem itidem addit Plinius: at Galenus, quanuis lib. 4. de ſan. tu. triplicé Oxymelitis conficiendi rationem tradat, nulli tamen ſalem admiſcuit.

ὕδατος ὑμεξέου] Sic & Plinius, lib. 14. cap. 17. pluuiam aquam deſiderat. At lib. 23. cap. 2. (quo loco itidem Oxymelitis parandi rationem totidem verbis repetit) aquæ marinæ ſextariorum quinque meminit.

ὑπὸ ὑδρὸς τῆς καλουμένης σηπὸς] Plinius itidem, lib. 23. cap. 2. *Oxymeli contra ſerpentes prodeſſe* ſcribit, *quos ſepas uocant*. At cum Cornario viro doctiſs. in Dioſc. contextu particulam, *καὶ*, interſerendam iudico, adeóque ſic legendum, *ὑπὸ ὑδρὸς καὶ τῆς καλουμένης σηπός*. Neque enim Seps viperæ genus eſt, ſed certè aut ſerpentis genus aliud, aut lacerta quædam. Hoc iccirco dictum velim, quòd varia eſt apud Autores varios Sepis hiſtoria: dum alij lacertarum, alij ſerpentium generi eam aſcribunt. At certè quidem *σὴψ* Nicandro ſerpens eſt, hæmorrhoo tum figura tum etiam colore haud ita diſſimilis, alio nomine *σηπών*, vt videtur, eidē Autori dictus: quanquam

& σαῦρος anguis, & σαυρίδιον itidē serpentis meminit AElianus, diuersis libris & capitibus, nempe lib. de animal. 15. cap. 18. & lib. 16. cap. 40. Eiusdem quoque serpentis mentionem facit Pausanias, in Arcadicis, non longè à principio, eúmque describit *mirandæ superæ magnitudine æqualem, cinereæ coloris* (nisi fortè pro, πάρα ὑμῆνις, eo loco legendum, σαύρα ὑμῆνις, vti ego suspicor) *punctis maculisue minimè omnino varium, capite lato, collo angusto, ventre ampliore & cauda brevi, incessu denique obliquo cuncti in morem.* Sed & Aëtius, cap. 16. Tetrab. 4. ser. 1. serpentem qui Seps appellatur, *longitudine binûm cubitorũ reperiri* scribit, *capite lato, ore exacuto, universo corpore ex crasso in tenuia abeunte, multis albis maculis variegato, incessu recto nec obliquo.* Attamẽ quòd ad huiusce serpẽtis ingressum spectat, Aëtius, æquè ac Nicander, à Pausania videtur dissentire. Verùm vt ad aliud σαῦρος significatum transeamus, à Dioscoride nostro σαῦρος nomine lacertę genus quoddam intelligi potiùs videtur: quoniam, libri 2. cap. 7. ab aliquibus σαῦρα χαλκίδικὴ nominatam asseruit, quod ipsum & apud Plinium, lib. 29. cap. 5. reperias. Eandem, nisi fallor, Aristoteles, 8. de hist. animal. cap. 24. χαλκὶς appellat, alijs, vti monet, δρυὶς seu ζυγὶς vocatam, similem inquàm paruis lacertis, sed colore serpentium, quos πολίους cæciliásve nominant. Idem lacertæ genus agnouit & ipse Nicãder, in Theriacis, hisce verbis: οἷόν γε μέλαν πεδιάδα δρυὶν σαύρην ἀλύξας. vbi supplendum, ἐοικώς. Eum verò locum exponens Interpres, οἷόν, inquit, ὅμοιον δὲ τῇ σαύρᾳ. χαλκὶς δὲ καὶ χαλκὶς· οὐχ ὁ ἐστὶ τῷ τόπῳ χαλκιζούσης ἰωδέος. δὶ ἐκπ πολλαχοῦ. hoc est, *Sepi est lacertæ similis. vocatur & chalcis: habet enim in dorso quasi venas æris coloris. Est autem octo palmorũ*, &c. Porrò Sepa serpentem à Chalcide diuersam esse tum ex antedictis satis cõstat, tum etiam ex Plinio, qui quidem, lib. 32. cap. 5. apertè sepa à chalcide distinguit: itémque ex Aëtio, qui, Tetrab. 4. ser. 1. capitibus diuersis agit de chalcide lacerta & serpente quam sepa nominant. Præter vtrunque hoc mortiferum rabificúmve, vt Lucani vtar epitheto, σαῦρος genus, ita dictum ὅτι ἀεὶ σύρεται διὰ ἀμμώδους, ἔνθα πανήγυρις, est & Plinio, lib. 10. cap. 2. & lib. 29. cap. 6. *è millepedarum genere quadam, quæ non arcuatur: eam*, inquit ille, *Græci sepa vocant.*

ὑπὸ δὲ ἀλῶν ἁλισθέντων] Quod de Aceto falso seu acida muria proditur hîc à Dioscoride, nimirum mederi sanguinis fluxioni post excisos calculos, idipsum simplici aceto tribuit Plin. lib. 23. cap. 1. At Celsus, lib 7. cap 26. agens de curatione calculo euulso habẽda: sub acri aceto, cui aliquantum salis sit adiectum, sanguinem ferè conquiescere & astringi veficam, ideóque minùs inflammari scribit.

Cap. xxv. ἔστι δὲ καὶ ὑμῆνις ζ'] Paulus isthæc eadem ex Dioscoride describens, lib. 2. cap. 11. ὑμῆνις ξ' legit, atque ideò hîc quoque suspicatur Cornarius pro ξ' suppositum fuisse ζ'. Et reuerà quidẽ Autores omnes in maceratione Scillæ numerum dierũ maiorẽ desiderant, nempe Plinius xlviii. Palladius & Aëtius, l. Myrepsus, modò xl. modò xlviii dierũ meminit. Columella dierum quadraginta mentionem facit: quamuis paulò antè in vini scillitis cõpositione Scillam duntaxat xxx diebus macerari voluit. Vnus Actuarius viii diebus cõtentus est.

ἀπαλεξιφάρμακος] Marcellus & Lacuna *antidotos* vertunt, sed omnino malè: quandoquidé aliud est ἀπαλεξιφάρμακος, aliud ἀλεξιφάρμακος.

καὶ ἐγχριόμενος] *Tardiorem aurium gargarizatione purgat, & transitum auditus aperit*, vt scribit Plin. lib. 23. cap. 2. Cornarius cùm inanis videretur ista verborum, ἐγχρίεσθαι & ἐγχριόμενος, vnũ & idem significantium, repetitio, legendum ex Plinio censuit, καὶ ἐπὶ ὑγρότητι. At ego malim, siquid mutandum est, καὶ ἐπ' ἀκοὴν ἐγχριόμενος.

καὶ νευρῶν] Contrà Plinius, loco modò citato, Acetum Scillinum neruis infirmis perquàm vtile esse prodidit: quanuis & ipse anteà vesicæ & renum infirmitatibus acetũ omne nocere admonuerat.

Cap. xxvi. ξήραναι δὲ ἐν σκιᾷ] Quemadmodũ ad parandũ acetum Scillinum Dioscorides Scillam in vmbra siccari voluit: ita & reliqui Autores, vno excepto Dioscoride, dum parandi Vini Scillini rationem scripto prodidére, frusta seu segmenta Scillæ in vmbra siccanda præcipiunt: ac ipse quoque Galenus, in lib. de med. par. fac. Scillam priùs dies decem in vmbra siccari voluit: Columella, sectas Scillæ talcolas in vmbra suspendi, vt assiccentur. Addit & Palladius disertis verbis, procul à Sole siccari easdem oportere.

Cap. xxviii. Κηδὼν δ' οἰνόμελι] Quanuis hîc abijciendi Cydoniorum corij nulla fit mentio, fieri tamen id debere dubium non est; maximè cùm plerique alij, apud quos Cydoniæ vini parandi ratio præscribitur, id diserte monuerint, ac inter cæteros Palladius: qui quidem mensis Octob. cap. 20. alios ab his diuersos parãdi Cydoniæ modos recitat. Sed illius cõfectiones in vinorum genere censeri minimè debent.

Cap. xxx. ὑδρόμελιτος σκευάζεται] Hydromeli nusquã meminêre Latini Autores: at apud Paulum & Aëtium duæ habentur Hydromeli conficiendi formulæ, quæ ab hac Dioscoridis confectione haud ita multùm discrepant. Cæterùm Aëtius aquam, è qua paretur Hydromelum, ad tertias decoctam desiderat.

Cap. xxxi. μέλιτος ἑξαρίου] Paulus, lib. 7. cap. 15. in Omphacomelite conficiẽdo, succi vuę acerbæ sextarios tres & mellis sextarium vnum itidem miscet, sed ad dies quadraginta insolat, aut decoquit. Palladius quoq; mensis Decemb. cap. 13. seruata eadem tum mellis tum succi proportione, ad dies xl. sub Solis radijs decoquit. At Aëtius mellis quantitatem auget minuitve, pro succi crassitie aut tenuitate.

Cap. xxxii. Ἀπύρου σκευάζεται] Palladius, mensis Feb. cap. 25. aliud è pyris vinum parat: scilicet è pyris contusis compressísque succum elicit, qualis esse videtur, quo vini loco Neustrij, seu Northmanni nostri, vti consueuerunt, Pyraccum vocant, vti quod è pomis, Citream.

Cap. xxxiiii. ἐκ ῥοδίνου] Paulus, lib. 17. cap. 15. in præparãdo vino Rhoite, mellis tertiam partem adijcit, ipsúmque decoquit cum succo Punicorum ad tertiæ partis consumptionem.

Cap. xxxv. μοῦστ μίνυ] In conficiendo vino Rosaceo Plinius, lib. 14. cap. 16. discrepat à Dioscoride, tum in pondere rosarum, tum in musti

ρ, meritò restituit Cornarius. In hoc eodem capite, pro eo quod in vulgatis exemplaribus legitur, δυσπνειας, Aldinus codex habet mendosè δυσπρηξιας. At Marcellus & Lacuna legêre, δυσπνοιας: quam lectionem, ceu probabiliorem & thymi viribus aptiùs respondentem, secuti sumus.

CAP. LXIIII. φοίνικος, κάσσιας.] Dum Aromatiten describit Plinius, lib. 14. cap. 16. pondera nulla ascribit, ac in priore quidem descriptione palmam omittit: in posteriore verò minimè Phu meminit: adijcit autem palmam, iuncum & cinnamomum.

ὑγιοῦν χοίνικα] Hic aromatum modus maior est haud dubie quàm par sit, habita vini ratione: ideóque pro, χοίνικα, restituendum, οὐγίας, cum Cornario censuerim: maximè cùm facilis fuerit vtriusque notæ lapsus.

CAP. LXV. ἕως ὀλόκλ.] ὀλόκλ. dicit Dioscor. quod alibi, ὀλοχερῶς κατακόπτων, nisi fortè ὀλόκλ. intelligendum est, quod non in minutas partes diuisum, sed adhuc integrum contunditur ac leuiter tantummodò conquassatur.

CAP. LXVI. ῥίζης ξηρᾶς ὑγιᾶ.] Cum Aldino codice, ὑγιᾶς ϛ. quàm cũ Paris. ϟ legere satius visum est. Plinius itidem in vini Nectaritis confectione radicem ponderis XL denariorum in sex musti sextarios addit. Sed eo loco pro, *sextarios*, *congios* existimo legi oportere: quò maior sit inter radicis pondus & mẽsuram musti proportio. Georg. Agric. pro, *sex sextarios*, *triginta sex*, legendum suspicatur.

CAP. LXX. ὀλόκλ. ϟ'.] Malim, ὑγιᾶς ϛ'. Nam è radicis sex duntaxat drachmis amphora musti (quæ congios octo, sextarios verò 48. capit) haud ita magnam vim ascisceret.

CAP. LXXVII. γίνεται δὲ καὶ οἰνίτης ἁπλ.] Hoc ipsum vini genus, quod οἰνίτην hoc loco, vti apud Plinium (quanuis alij *ecteronatum* legunt) cognominatur: Cato de re rustica & Autor γεωπονικῶν itidem concinnant, vitium radicibus circunsartis & purgatis, deinde veratro atro tuso aut in fasciculos colligato circundatis. Attamen non alias illius vires quàm ad mouẽdam aluum agnouisse videtur, proindéq; & Autor γεωπον. καθαρτικὸν, hoc est, *purgatorij* cognomen illi tribuit.

γίνεται δὲ θεσπιμαχικὸς] In vtroq; codice, tum Aldino tum Parisiensi, manifesto librariorum errore factum est, vt hoc loco, γίνεται, repeteretur: pro quo legendum, δίδοται. Sed ipsa sermonis series illud satis indicat. Cæterùm αὐτὸ τοῦ, θεσπιμαχικὸς, legitur in Ald. codice minùs rectè, θεσπιμαχικός.

CAP. LXXXI. εἰς αὐτὸν ἡμιμαδίου] Vinũ è Mandragora citra coctura quomodo præparari oporteat & antea, lib. 4 docuit Dioscorides, capite de Mandragora: sed eo loco dosin aliã proponit. Siquidem corticis radicis Mandragoræ minas tres in vini dulcis metretam conijcit.

CAP. LXXXII. ἁλατόβρου ϟ ιβ.] Cato de re rust. veratri albi manipulum conijcit in amphoram vini musti: atq; vbi efferbuerit, de vino manipulum ejcit, & vinum seruat.

εἰς ἀμφορέα γεῦσαι ϛ'.] Ista verba vsque ad, μὴ ἡμ. Cornarius, ceu παράλογα, expungit. Goupylus partim ex veteribus codicibus, partim ex Interpretibus, verba hæc ita restituit, vt habentur in contextu Paris. cod. εἰς ἁλατόβρου χοᾶς ϟ ἢ ϛ'. Est tamen è veteribus, in quo sic legitur, ἢ εἰς χοᾶν ἁλατόβρου ϛ' ἢ ϟ' ὕδωρ. &c. At ego cùm neutro modo satis constare sensum animadverterem, Aldini exemplaris lectionem prætuli: ἢ εἰς ἁλατόβρου χοᾶς ϛ' ἢ ϟ', quanquam fortasse pro vncijs drachmas reponere satius fuerit.

χοᾶς ϛ' ιβ'.] Pro vncijs vt hoc loco, ita & plerisque alijs huiusce capitis, drachmas reponit Cornarius: neque dubium est, quin in hoc toto propemodùm capite pondera valdè deprauata sint.

ἢ καὶ εἰς ἁλατοδάκρυ.] Quantùm ex versione Cornarij licet colligere, ita ipsum legisse fit verisimile, ἢ καὶ εἰς γαλβάνης εἰς ἁλατοδακρύου σταγόνας μικρὰς (καὶ δὲ μικρὰς χοᾶς ϟ) λαβὼν γάλακτος ϟ ϛ'. quæ quidem lectio mihi quoque valdè placet. Attamen paucioribus immutatis, sic etiam legi posse videtur, καὶ λαβὼν γαλβάνης εἰς ἁλατοδακρύου σταγόνας μικρὰς, &c. vti habentur in contextu. Porrò, χοᾶς ϟ. legit Cornarius: alij legisse videtur, χοᾶς ιβ'. Et reuerà quidem cùm duplex sit metretes, Italicus inquàm & Atticus: hic quidem duodecim capit congios, ille verò, qui vnus & idẽ est cum ceramio Italico seu amphora Romana, cõgios, ex ipsius Pauli sententia, octo duntaxat. De vtro verò intellexerit Dioscor. non satis constat: ferè siquidem si de metreta alio quàm Attico locuti sunt Græci, vocẽ Ἰταλὸν addere soliti sunt, vti & ipse fecit Dioscorides, cap. de aceto scillitico.

CAP. LXXXIIII. χρῶνται κατὰ ποδός] Plinius, lib. 34. cap. 10. Cadmiæ botryitis cognominatæ duos scribit esse colores, *deteriorem aereum, pumicum meliorem.*

πλείστην τὴν ἐπὶ ποσὶ] Falluntur cum Fallopio qui de factitia tantùm Cadmia mentionẽ à Dioscor. factam existimant. Nam de fossili quoque sermonem illi fuisse vel hæc ipsa verba, εἰ δὲ μὴ πλείστου μέλοι τοῦτο ἐρευνᾶσθαι, luculẽter testãtur. Quin & ego non de alia, quàm de fossili, Dioscor. egisse existimo, vsque ad illud, ῥυπτικὴν δὲ. atque iccirco placet eo loco lectio Lacunæ, ῥυπτικὴν δὲ ἐκ τοῦ ἀνδρείου, &c.

ἐπὶ τὰ ὀφθαλμ.] Plinius, citato loco, *botryitin oculorum quidẽ medicamentis vtilissimam scribit, onychitin verò, vulneribus maximè vtilem.*

καθαρτικὸν ῥύπου] Ad oculorum sordes ista restringere videtur Plinius: siquidem Cadmiæ effectus esse scribit, *purgare & oculorum sordes purgare.* At dubium non est, quin & alia cuiuslibet partis sordida vlcera Cadmia detergere valeat.

καὶ ἐξαιρεῖ] Fortè pro hac voce, ἐξαιρεῖ, rectiùs reponas illud, ἕλκεσι, quod αὐτὸ τὸ, ξηραίνει, legitur in quibusdam codicibus. Enimuerò Cadmiam crustas inducere haudquaquam sit verisimile: siquidem, vel ipsius Gal. iudicio, 9. simpl. in caliditate ac frigiditate quodammodo temperata censetur: quæ verò crustas inducunt, in quarto calidorum gradu collocari vnicuique constat. Sed cùm Cadmiæ fossilis æquè ac factitiæ complura sint genera, quædam fortasse reperitur Cadmia fossilis, quæ quidem minimè lota vim ἐξαρωτικὴν habeat. Id quod tamen de Galenica Cadmia verè dici minimè possit: quippe quæ ab ipso Gal. cæteris omnibus Cadmiæ cuiuscunque

generibus mitior esse perhibetur.

ἀπὸ τῆς χαλκῖτιδος τοῦτο.] Rectiùs ista legas, detracta præpositione ἀπὸ. Nam Cadmia etiam æraria non ex ære solo fit, sed è terra potiùs seu lapide æroso, (huic etiam Plinius Cadmiæ nomen tribuit) è quo æs ipsum conflatur: nimirum vi flammarum ac flatuum egerente fuliginem seu fauillam, quæ varijs fornacum partibus applicatur, ac tandem diuturnitate temporis in certa quædam corpora cogitur.

ἐπὶ δὲ αὐτῶν.] Pro hac voce, αὐτῶν, Interpretes plerique, μέλδει, aut quid simile, videtur legisse. Ego hoc, αὐτῶν, ad ipsas fornaces refero.

τοιαῦτα μὲν ἐν ὄντα.] Factitiæ Cadmiæ duo tantùm genera agnouit Gal. 8. simpl. botryitin inquàm & placitin (ita enim, æquè ac Plinius, πλακώδη Dioscoridem dictam nominat.) Illa ceu leuior è fornacum cameris dependet, ac in editioribus earum locis reperitur: hæc in humilioribus, putà ipsis fornacum lateribus: quippe quæ, vti scribit Plinius, *propter grauitatem ad cameras peruenire non potuit*. Inde Galenus botryitin tenuiorum, placitin crassiorum esse partium meritò colligit.

ἐν τῇ νήσῳ Σολεῖ.] Lege, Σόλοις. Solœ enim vrbs est Cypri insulæ, cuius meminit Strabo, lib. 14. Geogr. Illius incolæ Solij appellantur. Porrò scribit Gal. 9. simpl. quo tempore in insula Cypro peregrinabatur, Solis parcissimâ Cadmiam fornacariam extitisse: at alibi in eadem insula extra fornaces, scilicet in montibus & circa riuulos, frequentem repertam Cadmiam lapidosam, quæ quidem esset omnium longè præstantissima. Eam verò lapidem Calaminæ vulgo dictum esse iudico, qui solet in æs assumi ad conficiendum aurichalcum.

ἐξ ἐλάττονος ἐπὶ τὸ χεῖρον.] Ista verba, ἐπὶ τὸ χεῖρον, redundare nemo non videt, adeóque expungenda. Paulò pòst pro, συνεπιπώσεως, lege, συνεπισείσεως.

ἐπὶ πλεῖον ἐκπέζειν.] Vox, ἐκπέζειν, mihi valdè suspecta est, quippe quæ nullam, quod equidem sciam, huic loco satis aptam significationem habeat. Marcellus tamen *exudato humore cire* vertit: cæteri simpliciter, *cire*. Vnus Cornarius ἐκφλύζειν, hoc est, *bullulas excitare*, videtur legisse: quanquã, si ita legi oporteret, tùm quoque pro, ξηραινόμενον, ξηραινομένῳ, reponendum foret. Verisimilius enim fuerit, Cadmiam dum siccatur in Sole, bullare, quàm iam antea siccatam.

κωνεῖον δὲ.] Plinius non tantùm Cadmiam ex fornacibus depromptam, sed & ipsum lapidem quàm grauissimũ ipsissimúmque vrit ex Nymphodori & Iollæ sententia: cùm tamen anteà, capite eodem, lapidem ex quo fit æs, quémque alias æroſum seu ærariũ ipse nominat, medicinæ inutilem dixisset. Itaque vt à cõtradictione vindicetur Plinius, hæc de Cadmia accipienda censeo, quæ non vstione præparata fuerit.

ἐν οἷσπερ ἐφρύγη.] Supple, δεῖ: alioqui ἐφρύγη legendum foret, vti priùs κωνεῖον: quanquam vt aliàs sæpenumerò Infinitiuum pro Imperatiuo vsurpari potest.

Cap. LXXXV. Ῥομφόλυξ σποδὸς.] Non ignoro σποδὸς genere fœminino, & σποδὸν neutro, vel ipso teste Gal. 9. simpl. pro eodẽ vsurpari, itémque σποδιά. Nam & hæc vox sub finẽ huius capitis pro eodem legitur. Attamen non σποδοῦ hoc loco, sed σποδιᾶς, vel potiùs σποδοῦ, legendum esse indicat id quod haud ita multò pòst sequitur: μᾶλλον δὲ, &c.

πολλῶν δὲ ὄντων.] Quæ sequuntur de Pompholygis & spodij confectione, paulò sunt obscuriora: attamen ita declarantur à Gal. 9. simpl. vt ei qui verba ipsius attentiùs legerit, non alio videatur opus illustramento.

ἀκριβῶς δὲ ἐρεῖν.] Ista nonnullis de spodio videntur accipienda. Sed quamuis, cùm sint eiusdem generis & Pompholyx & spodium, vtrique ista rectè tribui possint, de Pompholyge tamen interpretari ea visum est: quoniam à Plinio, Oribasio & Aëtio eadem de Pompholyge recitantur. Adde quòd dũ supperit Pompholyx, haud ita multùm, maximè in externorum remediorũ confectione, de spodio laborandum videtur: quandoquidem ex Gal. sententia Pompholyx spodio longè & præstãtior & efficacior existit.

πολίζουσι πυῶδες.] Apud Oribasium legitur, λίζουσι πυῶδες: quam lectionem prætuli, quoniam etiã apud Aëtium legitur, ὥσπερ ἰώδη, quod eodem redit. Apud hunc eundẽ tamẽ pro eo quod paulò pòst legitur, ἰώδη τὴν χροιὰν ἐμφαίνουσι, restitue ex hoc Dioscoridis loco, λίπος δὲ τὴν χροιὰν ἐμφαίνουσι.

κατὰς πυρώδεις.] Quæ sequuntur, de lotione Pompholygis simul & spodij in genere accipiẽda sunt. Nam & vox κατὰς illud innuit, & in sermonis serie vox σποδὸν toties indiscriminatim repetita, id satis indicat.

πολὺς ξηραινόμενος.] Additur in quibusdam codicibus: καὶ δὲ καὶ τὸν ἥλιον ψυχόμενον. quam sententiam Interpretes Ruellius & Marcellus expressêrunt. At Manardus optima ratione illa expungenda censet, quoniam nil simul frigidum & ξηραινόμενον esse potest. Nihilominùs illam fuisse Dioscoridis sententiam palàm faciunt illa verba, cap. de plumbo eloto: καὶ καθόλου πᾶν ὅσα καὶ ὑπανδῆ, ὅταν τὸ ξηρανθῇ. i. spodij effectus præbet, nisi quòd crustas haudquaquam inducit.

Cap. LXXXVI. Τὸ φύλλον τοῦ μύρτου.] Dioscoridis disertis verbis myrti folia simul cum floribus & baccis hoc loco desiderat. At Plin. lib. 34. cap. 13. cinerem myrti foliorum cum tenerrimis ramorum partibus inter Antispodia numerat, nulla facta florum & baccarum mentione.

μαλίστατον αὐτῆς.] Lege, μανότατον αὐτῆς, scilicet τὸ μανότατον φύλλον. &c. Sic inferiùs pro eo quod habetur in impressis codicibus, ὃ δὲ μὴ, lego, ὧν δὲ μὴ, vel, οἱ δὲ μὴ.

τῆς ἐχούσης ἐλαίας.] Paulò alia fuit Dioscoridis lib. 1. cap. 138. Antispodij ex oleastro præparatio. Siquidem eo loco voluit oleastri folia cum floribus in fictili crudo vri, dein vino restingui, rursumque vino subacta similiter vri, tandémque cinerem cerussæ modo lauari & cogi in pastillos.

κριθῆς σπόρου.] Plinius, loco citato, non ficũ tantùm arboris cinerem inter Antispodia recẽsuit, sed & caprifici. Anteà quoque Dioscorides, lib. 1. cap. 150. nucleorum dactylorum crematorum & vino restinctorum cinerem, spodij vicem explere, monuit Auicenna harundinum quarundam aut potiùs Cypri (*al. anna* vocãt) radicum exustarum cinerem pro Spodio vsurpat. Officinæ in ipsius locum ebur vstum, ex sententia Platearij, vel cornu ceruinum similiter vstum sufficiunt.

Cap.

CAP. LXXXVII. ὁ δὲ χαλκὸς ὁ ἀκρατος.] Plinius, lib 34 c.10. nō clauos illos æreos priſcis olim vſitatos, ſed ſimpliciter Aes Cypriū vti ſcribit. At recte Bulcaſis, qui neque clauos æreos neque ipſas æris laminas, ſed ipſam AEris limaturam hoc eodem modo vrēdam cēſet. Et certè quidē iſta commodiùs & ex æquo tam intus quàm foris exuri poteſt.

ὁ ψωρὸς καλούμενος] Plinius, poſtea quàm de Cadmię vtribus egit loco modò citato: Et AEs *ipſum*, inquit *ad eadem omnia vritur, præterquàm albuginis oculorum & cantheris.* Sed eo loco pro, *præterquàm*, legendū ex tomo *præterēque*. Alioqui & à vero aliena, & ab hoc Dioſc. loco diſcrepans eſſet illa Plinij ſententia.

CAP. LXXXVIII. μιγνύουσι τῷ ψωρῷ] Vox iſta, τῷ ψωρῷ, mihi valde ſuſpecta eſt: quoniam hoc loco nullum ῥύπου ſignificatum ſatis conuenit: ideo pro, τῷ ψωρῷ, τῇ ψώρᾳ vel ὁμοίως aut quid ſimile reponendum cenſuerim. Cornarius legendum putauit, μιγνύουσι τῇ πλείονι μέρει, hoc eſt, *multi figura & numero pauum*: ſed quam recte, vnuſquiſque viderit. Cætera per ſe patent, & AEris florem, quem interdū Hipp. ἄνθος ſimpliciter vocat, egregiè depingunt. Equidem legitimum AEris florem, quiſquiſque & ad amuſſim huic Dioſc. deſcriptioni reſponderet, iā antè cōplures annos dono accepi ab amico integerrimo D. Ioachimo magni illius Ceneratij filio, eximio tū Medico tū Philoſopho Norimbergēſi, qui quidē & alia cōplura metallica perquàm exquiſita mihi liberaliter communicauit.

εἰς δέλτους] Plinius AEris florem, nō æris limaturā, ſed pri ſquamā adulterari ſcribit. Sic enim, lib. 34. ca. 11. *adulterari florem* ſcribit, *ut ſquama æneat pro eo.*

CAP. LXXXIX. χαλκὸς Ruell. χαλκὸς λέπων] φαύλων, ἢ λέπων, videtur legiſſe Plin. cōtrà. lib 34. c. 11. *fit & ex cælato ære ſquama, Cypria longe præſtantior.* Sed eo loco fortaſſe reſtituēdum, *præſtantior*, quo modo videtur etiam Cornarius legiſſe.

τὰ βλεφαρίδια πρὸς τὸν] Dioſcorides (quippe qui tenuiorū quam Squama ſit partium) prodidit hoc Gal. lib. 9. ſimpl. his verbis: ἐκπίπτουσι δὲ ἀπὸ τῶν βλεφαρίδων τὰς τριχώδεις τραχύτητας, αἱ συνάγουσι τὸν ἐπίφορα. hoc eſt, *Merito igitur ſi his ex eo collyrio decidant aſperitates quas ſyſtaſes appellant.*

ἀφαιρεῖ δὲ μᾶλλον] rectiùs, ἀφίστησι, legiſſe videtur Cornarius. Squamam enim quæ fundum petit nō veriſimile eſt abiici oportere, cùm Dioſc. diffuſa priore aqua illi aliam deinceps conceptis verbis affundi velit.

CAP. XC. λεπὶς δὲ ἡ χάλκωμα] Χάλκωμα ſimpliciter dictum, vel cum adiuncto, σιδήρου χάλκωμα, vti nominare ſolet Aëtius, ferri hauddubiè genus eſt, quod aciem ſeu chalybem appellant, ſcilicet ex ſententia Ariſt. 4. Meteor. cap. 38. ferrum igne liquefactum, & hoc modo purius & defecatius durioſque rédditum, vel ferrum in aciem mucronémve firmatum & chalybe exacutum atque roboratum, qualia ferè ſunt quæ ad gladiorum inſtrumentorumque fabrilium formam accommodātur. Atramen Plinius, lib. 34. c. 11. Stomomatis nomine non ferrū huiuſmodi aliquod intelligi volui, ſed *ſquama æris alterum genus ſubtilius ex ſumma*, ſcilicet, inquit, *lanugine deraſſum*: quibus quidē verbis τὸ ψωμαῖον ſignificationē nullo modo videtur aſſecutus. Fateor & apud Celſum, lib. 6. c. 6. in Cleonis collyrio iſta legi: ſquamæ æris quod χάλκωμα appellant, &c. ſed vel Celſus æque ac Plinius ſignificati ψωμαίου ignoratione deceptus eſt, vel potiùs errore librariorum vox *æris* ſuppoſita fuit, quum *ferri*, legi oportuerit. Enimuerò vti ſunt ſquamæ æris duo genera, candidi inquàm & rubiginoſa & ſquamæ ferri totidem eſſe conſtat ex ipſius Gal. verbis, 9. ſimpl. ca. de æris & ferri ſquama: ferri, inquā, ſimplicis, & ferri Stomomatis: ſed & huius ipſe Plinius, citati lib. c. 15. ſeorſum mentionem fecit his verbis: *Squama quoque ferri in uſu eſt ex acie aut mucronum.* His enim verbis nil profectò aliud, quam χάλκωμα λεπὶς ſeu σκωρία, hoc eſt, *ſtomomatis ſquamam*, videtur deſignaſſe.

CAP. XCI. ὄνυχας ἀλάστους] Supplendū hoc loco, poſt dies decem lamellas deradi oportere. Has enim ipſas, vbi vna ex parte AEruginem cōceperint; deinde inuerti, ſimiliterq, vinaceis cōtegi oportere innuit, tandémque etiam deradi. Alioqui pro, ἀλάστους, λέπας, legendum foret, vt in præcedentibus.

ἀλοιφὴ δὲ χαλκάνθου] Plinius, lib. 34. cap. 11. præter hęc etiam gummi AEruginem adulterari ſcribit. Sed & Dioſc. cap. ſequentì, ſi in raſili paranda AErugine non ſucceſſerit ex voto, ammixto gummi ſcoleciam æruginem adulterari ſolere admonet: quam tamen omnino improbat.

τὸ ἀμιγὲς] Ita diſtinguitur AEruginis ſincera, ab ea quæ ammixto marmore aut pumice adulterata eſt. Cùm enim illa dentibus facilè cedat, læuitaté nque omnino præ ſe ferat, hæc cōtrà ſtridet in frendēdo, vti loquitur Plinius, dum de illiuſmodi AErugine verba facit.

οἱ χάρακες ἐρυθραί εἰσι] Lege, ταινίαι εἰσὶ τῶν ἐρυθρῶν. Sed hoc genus vitij typographicis infinitis occurrit locis quemadmodum & alibi ſubinde annotauimus.

τὸ χλωρὸν ἐκλείπει] Quæ ſinuata eſt, ſuum colorem retinet quæ mixta ſtramento, virides ſint, vti cōceptis verbis monet Plinius, loco iam citato.

CAP. XCII. ἄλλος ἐπιτηδείως ἐξαιρεῖται] Aëtius, lib. 2. dum hanc ipſam confectionē Scoleciæ rationē tradit, ſic habet etiam mutatis pōderibus: κονιᾶσι σκωλήκων δραχμὰς δ'. ἢ ἄλλος ἐρυθρὸς δραχμὰς δ', καὶ ἐξαιρεῖται λίθου καὶ σπόδου, πυρὸν ἀποκαίων τὸ ἥμισυ, εἰ δὲ μή, ὅλον τὸν πῆχυν. hoc eſt, *aluminis rotundi drachm. iiij ſalis feſſilis tantundem, tranſtundi lapidis candidi & ſolidi, hoc eſt, ſpeculi aut lapidis, dimidiam partem: ſimul omnia, nitri tantundem.* Sed veriſimile eſt deceptū Aëtium, qui ἐξαιρεῖται vocē, quæ hîc à Dioſc. ceu epitheton ſalis foſſilis tribuitur, eo modo tanquam diuerſum quid à ſale ſeiunxerit, & ea voce lapidem ſpecularem intellexerit, quoniam ἐξαιρεταὶ λίθοι, id genus lapidis deſignat: de quo vide Gal. 4. περὶ τῶν.

ἀπὸ χρόνου κεκαυμένον] In hac temperanda nitrum addit Plinius, libro 33. cap. 5. quo loco ſic habet: *Chryſocollam & auriſices ſuis uendicant agglutinando auro, & inde omnes appellatam ſimiliter uenires dicunt. Temperatur autem ea Cypria æruginē & pueri impubis urina, addito nitro*, &c. Galenus, 10. ſimpl. cap. de vrina pueri, confici eam ſcribit ex vrina pueri diu multumque ad Solem agitata

piſtillo æris rubrii in mortario ex eadem materia.

δακρυον ἀχαιτ] Rectiùs fortaſſe Plinius, cuius hæc ſunt verba, lib. 34. c. 11. *Vis Aeruginis delacrymationibus mordendo profuciens*, &c. Iis enim verbis lacrymas inuoluntarias æruginis ope cohiberi potius & comprimi, quàm cieri videtur innuere.

ἀπυλαινῶν, ἰλλει] Galenus, libro 8. ſimpl. cap. de AEruginе, obiter eos reprehendit, qui AEruginem & eiuſmodi alia *πικρὰ εὐρώτες φάρμακα, ἀπυλαίνειν* eſſe ſibi perſuadebant, quòd vlcera contrahere animaduerterent: quoniam, velut innuit eo loco Galenus, id non ex ipſa eorum medicamẽtorum vi cõtingit, ſed vel ex aliorum permixtione, vel quia ipſa minùs diu vlceribus immorentur, aut parciore quantitate adhibeantur: alioqui enim carnem colliquarent.

ἀπὸ χαλκὸς ἢ ἰόπτρου] Videris num *ἀπὸ τῦ, χαλκῦ, χαλκαίῳ*, potiùs legendum ſit. Nam ita legitur, cap. 129. 1. *Δόσις*, Dioſc. quo loco hoc idem ad lepras tollẽdas remedium totidẽ verbis repetitur.

Cap. xciii. *πραχὶα βαλίφαγες*] Plinius, lib. 34. cap. 15. de Rubigine ferri verba faciens: *Vtuntur*, inquit, *& ad ſcabritias genarum puſtulaſque totius corporis cum aëre & oleo myrteo.*

Cap. xcv. *ὑπὸ χῦσεχ κατ' ἀλίγον*] Iſta, quæ hauddubiè corrupta ſunt, ita reſtituo: *τῷ ὑπὸ χῦσεχ καὶ ἀλίγον ἐπιχέοντι τὸ ὕδωρ οἷον μελανίζον*, hoc eſt, *miniſtro ſenſim aquam affundente, quæ hoc modo nigreſcit ſeu liuorem contrahit.* *τὸν ὑπὸ χῦσεχ*, pro *miniſtro* accepit & antè Dioſc. cap. de pompholyge, vbi ſic habetur: *ὁ ὑπὸ χῦσεχ τὸ ὑπὸ πιτῦ πιτῦ*, &c.

ἀλίγον μολίβδυτος] Quidam, inquit Plinius, lib. 34. cap. 18. *limatum plumbum ſic terunt: quidam etiam plumbaginem admiſcent, alij uerò acetum, alij unum, alij adipem, alij roſam.*

ψυχρὸν, ξηρὸν] Etſi Plumbum eſt ſuapte natura frigidum atque ſiccum, quia tamen agit in nos ratione partis cuiuſdam partim humidæ, partim tenuis & aëreæ quam in ſe habet, quæque facilè à noſtro calore alteratur, ipſum humectare potiùs quàm ſiccare cenſemus. niſi fortaſſis vſtum: quoniam pars illa tenuis & aërea vſtione deperit. Illud ipſum etiam eſſe Plumbi temperamentum, ſcilicet frigidũ & humidum, Galenus aſſeruit, libro nono ſimpl. quanuis nonnullæ quas eo loco ſententiæ ſuæ rationes profert Galenus parum firmæ videantur, vti rectè monuit Fallopius, lib. de metallicis. Illud ſi verum eſt, vti certè eſt, minimè profectò exiſtimandum Plumbum aſtringere, quantumuis id palàm ſonẽt verba Dioſcoridis: ſiquidem humiditas aſtrictionem impedit.

κρᾶσιν δ' αὐτὸ τοιαύτην] Plumbi temperamẽtum, quod frigidum & humidum eſſe demonſtrauimus, huic etiam caua explendi vi refragatur: ſiquidem caua explent quæ ſiccant & moderatè calfaciunt. Sed neque excreſcentem carnem cohibet Plumbum, niſi fortè ſuo pondere: neque enim vim vllam erodendi fortitum eſt, quę illud præſtet: neque ideò lauatur, quòd acrimonia vlla aut erodendi vi præditum ſit, ſed tantummodò quòd maiorem tenuitatẽ altiúſque penetrandi vim aſciſcat.

ὅτε καὶ ἡ σποδὸς] Ex antedictis Plumbum lotũ, ſquod quidem minimè vſtum fuerit, ſatis cõſtat ſpodij vires nequaquam obtinere: quandoquidem ſpodiũ ſiccare, illud verò humectare compertum eſt.

Cap. xcvi. *λίτρα ἀνθρᾶκες*] Plinius, lib. 34. cap. 18. rudes itidem ad hoc opus ferreas deſiderat, aut ferulaceas.

ψιμυθίου παραπλήσιον] Ceruſſam aut hordeum pari menſura cum Plumbo à quibuſdam miſceri ſcribit Plinius, loco citato: paulò antè verò in coquendo plumbo ſulphuri ferrum ammiſcuit, niſi fortè eo loco mẽdum ſubeſt. Sed (quod cum bona Lectorum venia dictum velim) falli profectò videtur Plinius, qui Plumbi coctionem ab eiuſdem vſtione diſtinguat, & ſeparatim plumbi coquendi, deindéque vrendi modum doceat.

ὅτι δίκης ἐξῆ πρὸς] Ita quidem hauddubiè legendum & diſtinguendum, quamuis Hermolaus & Manardus aliter diſtinguant hoc modo: *λειόδης ὅτι δίκης ἔξη, πρὸς χρῶτα*. vti legitur in vulgatis exemplaribus.

Cap. xcvii. *μολυνδὶς δὲ*] fortè rectiùs, *μολιτηδὶς*. De eadẽ enim Scoria ſic habet Plinius, lib. 34. cap. 18. *Scoria optima quæ ad luorem maximè colorem accedit, ſine plumbi reliquijs*, &c.

τὸ φλοιῶδες μᾶλλον] In Scoria non aſtrictionẽ maiorem quàm plumbo vſto, ſed vehementiorem acrimoniam videtur agnoſcere Plinius, loco citato, hiſce verbis: *Scoria plumbi eoſdem effectus habet quos plumbum, ſed acriores*, niſi fortè, *acriores*, pro, *maiores aut vehementiores*, vſurpauit.

Cap. xcix. *οἱ δὲ λαβάστρα*] Alabaſtrum etiam nonnullis vocatum teſtatur Plinius, lib. 33. cap. 6. Nominis autem *μανιοφθάλμου* rationem declarat idem, hiſce verbis: *Vis Stibio primaria circa oculos: namque ideò etiam plerique μανιοφθάλμου appellauêre quoniam in palpebris mulierum dilatet oculos: & fluxiones inhibet oculorũ exulcerationeſque*, &c. Hipp. idem Stibium *παραγωγὸν* etiam appellat, teſte Gal. in gloſſis Hipp. Cæterùm cùm Stibij Plinius duo conſtituat genera, marem in quàm & fœminam, de fœmina potiſſimùm, ceu quæ magis probatur, agere Dioſcoridem exiſtimandum eſt.

σταν σεσταδὶς] Poſteaquàm Plinius monuit, loco citato, vri Stibiũ offis bubuli fimi circũlitũ in clibanis, deindéq; docuit ſat copioſè, quomodo vſtũ idẽ præparari debeat, *Quidã*, ſubdit, *nõ ſimo vtuntur coquẽtes, ſed adipe*. Scilicet, vt aliâs perpetuò, ita & hoc loco *σταν adipem* cõuertit, quaſi nõ eſſet alia *τῦ σταν* ſignificatio, quę huic loco aptiùs quadraret. Nos cũ cæteris ferè interpretib⁹ *farinã ſubactã* vertimus, & rectè quidẽ. Etenim *τὸ σταν* (vt ipſius vulgare ſignificatũ omittã) tũ hîc, tũ aliâs nõ ſemel apud Dioſc. vti & interdũ apud Gal. Paulũ & Actiũ, *τὸ σῖτος*, h. e. *maſſã ſeu farinã ſubactã*, *ὕπνι ζυμὶ*, h. e. *fermentũ* haud dubiè ſignificat, veluti etiã exponitur ab Heſychio. Serapio tamẽ, haud ſecus atque Plinius, vocis homonymia deceptus, ad pe indẽ Stibiũ circũlini ſolitũ ſcribit: id quod Fallopio viro alioq; doctiſſ. nõ vſqueadeo abſurdũ videtur. Hic enim ſtibium, quod vrere fuerit animus, larido obuoluendum ſuadet.

μολιβδοῦται] Plinius ibidem, de Stibij vſtione: *Ante omnia vrendi modus neceſſarius eſt, ne plumbum fiat*: quaſi diutiùs vſtum Stibium in plumbum degeneret. Sed hoc loco, *τὸ μολιβδοῦσθαι*, niſi fallor, *non in plumbũ degenerare*, ſed potiùs, *plumbi inſtar eliquari* ſignificat. Id ſaltem voluiſſe Autorẽ mihi ſit veriſimile.

CAP C. ...] Hanc notam fossili Molybdenæ tribuit Plinius, lib.34.cap.18.quam Dioscorides factitiæ potius tribuere videtur.

...] Rectiùs ibidem Plinius, de Galena, seu Molybdæna quam metallicam nominat, ad differentiam Molybdænæ, quę censetur in stirpium genere: *Adhæresat*, inquit, *& auri & argenti fornacibus*. Neq; enim est quòd quisquam existimet, ex auro argentóve ceu materia gigni Molybdænam. Quòd si reperitur in fornacibus, in quibus aurum & argentum eliquantur, id etiam euenire certum est plumbi ratione, citra cuius admixtionem vix vnquam metalla illa eliquescerent.

...] Gal. ... hoc tantùm discrimen agnoscit, quòd & crassiorum partium & frigidior est Molybdænæ essentia: spumæ verò argẽti, & tenuiorum partium & in medio posita caliditatis & frigiditatis.

...] ... pleriq; *emplastra mammæ medicata* vertunt, seu quę sine rosione medẽtur. At nos hoc loco cum Cornatio ... potiùs legendum cẽsuimus, quo modo & Plinius legisse videtur. Sic enim ille: *Vsus*, inquit, *in liparas ad linẽda* (fortè, *lenienda*) *refrigrandáque ulcera, emplastrisque quæ non alligantur, sed illita ad cruorem perducunt.*

CAP. CL. ...] Rectiùs ..., quę vis etiã antè molybdęnę tributa est. Adde quòd fieri vix potest, vt vnum & idem medicamentum simul & astringat & attrahat, cùm vires eiusmodi ex diametro inter se pugnent.

CAP. CLI. ...] Plinius, lib.33.cap.6. certiùs videtur Spumæ argenti discrimina tradidisse: *Genera*, inquit, *spumæ argenti tria: optima quæ Chrysion vocant, secunda quam argyrion, tertia quam molybdæon*, &c. Subdit verò non ita multò pòst: *Chrysitis ex ipsa se fit argyritis, ex argento, molybdæna, plumbi ipsius fœtura.* Ita tum Dioscoridem tum etiã Plinius varias Lithargyri materias assignãt. At quicquid vterque voluerit, minimè argentũ, multò magis aurum Lithargyri materiam esse constat, sed solum plumbum: quod quidem vel veræ argenti, dum hoc expurgatur, naturaliter admixtum reperitur, vel ab ipsis metallicis ad ea ab argento separãdum additur. Est porrò Lithargyri color varius, aureus inquàm, & argenteus, pro ratione maioris minorisve exustionis, non item ex materiæ diuersitate, aut quod, vti voluit Matthiolus, æris vaporis argento admixti plus minúsve intra se receperit.

...] Quoniam Dicæarchia, quam alio nomine Puteolos vocarunt, ciuitas est Campaniæ ita fortasse legendum fuerit: ... *Dicæarchiæ vel Campaniæ, vel in Sicilia.*

... *Sicilia*] ... seu ..., legisse videtur Oribasius. aut certè ipsius Interpres: & ea quoque lectio, quantum video, doctiss. Fallopio placuit. Est verò ... seu ..., nõ tantùm ... *aut fuscum*, sed etiam ... *quod est plumbei coloris*, nimirum ... *medium inter nigrum & pallidum.*

...] Ald. & vetus codex, ... quam lectionem etiam Manardus sequitur. Sãne fossilis obolum in Spumæ libram addit Plinius, sed manifesto errore: ideóq; apud Plinium, pro *obolo*, *pondo*, restituendum censuit Cornarius.

...] Lacuna legit in vet. codice, ..., quo modo etiam legẽdum videtur. Ruellius addit negationem, quasi legerit ... Marcellus verò pro eodem, ... Plinius, lib. 33. cap. 6. *Aly in lana candida* [*aquunt argenti spumam, cum fuba, donec lanam non denigret.*] Innuit quippe idipsum quod Dioscorides, quoties denigratur lana, toties eam immutãdam, similitérque iterandam Spumæ argenti cocturam.

CAP. CLII. ...] In hoc priore Cerussam parandi modo haud ita discrepat à Dioscoride Plinius, nisi quòd, lib.34.cap.vlt. pro latere seu lamina plumbea (*massam* cum Vitruuio vertere placuit) *ramenta plumbi tenuissima* sumit: *fit*, inquit ille, *ramentis plumbi tenuissimis super vrnas aceti asperrimi impositis, atque ita destillantes*, &c.

...] Ex verbis Plinij, ..., legẽdum hoc loco coniicimus. Is enim de Cerussa, lib.34 cap.vlt. scribit in hæc verba: *Fit & alio modo, sudio in vrnas aceto plumbo vrnam per dies decem.* At Vitruuius certum nullum temporis spatium designat. Sic enim ille, Archit.lib.7.cap.12. *Post arcum*, inquit, *tempus aperiemus inueniemusque è massis plumbeis Cerussam.*

...] Malim equidem, ...; aut certè, ...: siquidem Inferne sursum calor ascendit. Inferius quoque, ..., lego, ...

...] Ex sententia Plinij, lib.33.ca. 6. itemque Vitruuij loco nuper citato, è Cerussa in fornace cocta vstáve sandarachá efficitur: quam quidem priuatim Plinius *adulterinum* cognominat; ad differentiam naturæ seu fossilitiæ, quæ arsenicum rubrum est. Ex eadem *illa tosta*, iuxta eundem Plinium, *admixto æque rubrica pars fit sandyx, nec sinopide & sandyce nouis, Syriacum*, pro quo perperàm, *Scyriacum*, ibi legitur. At secundùm Dioscoridem, itémque Galenum, 9. simpl. Sandyx aliud nil est, quàm Cerussa penitùs vsta crematáve ... Officinæ nominant. Apud Paulum & Aëtium hæc eadem Syrici nomine intelligitur: quanquam & aliàs illam ... *Cerussam ex ambusham rubefactam* iidem appellant. Cæterùm constat à Sandyce rursum aliud esse, quod ... Galeno & Aëtio dicitur, cap. de Cerussa, nimirum Cerussam ad fucum præparatam, de qua & nos antèà, in libro 4. capite 100.

CAP. CLIII. ...] Chrysocollæ nomine apud Plinium, libro 37. capite 10. gemma significatur, alio nomine Amphitane dicta. Sed alia est Chrysocolla, de qua hìc agit Dioscorides, itémque Plinius ipse, libro 33. capite 5. scilicet metallum æris putre, aqua alióve humore per se defluente aut cura artéve quapiam immissa in venam metalli. Iccirco *laudatior* etiam, Plinio teste, *quæ in ærariis fit metallis.* Attamen & in auratiis itémque argentariis, adde etiam plumbariis fodinis inuenitur: siquidem in iis æris aliqua portio fuerit. Præter illam natiuam Chrysocollam est & factitia, quæ Santerna Latinis dicebatur, quámque Dioscorides antèà inter æruginis Scoleciæ genera reposuit.

...] Marcellus codicum quorun-

dam veterum fidem secutus, αἰνὶ δὲ, σίλλου, ἁλικῶν, restituit. Et terrè quidem vsum Chrysocollæ in medicina ad purganda vulnera cum cera & oleo agnoscit Plinius, lib. 33. cap. 5. Attamen & ibidem collyrijs misceri proditur ad oculorum cicatrices, itémque viridibus emplastris ad cicatrices trahendas.

CAP. CV. *σὺν Ἀρμενίῳ*] Vulg. exempl. λίθῳ addunt, sed ex lapidis Armenij inscriptio meritò nobis suspecta æquè ac Falloppio. Est enim Armenium, de quo hic agitur, pigmentum ab Armenio lapide diuersum: atque iccircò etiam Aëtius de hoc ipso Armenio seu Armeniaco verba faciens, statim adijcit, *οὗτοι ζωγράφων, ὅτου φασὶ οἱ ζωγράφοι χρῶνται, quo inquam pictores vtuntur.* Paulus diuersis capitibus vtriusque mentionem facit: & hoc quidem Armeniacum simpliciter nominat, illius verò inter lapides meminit.

τὸ χρῶμα κυάνου] Armenio cæruleum colorem tribuit hoc loco Dioscorides. At Plinius de eodem, lib. 35. cap. 6. *Optimum est*, inquit, *quod maximè vires communicato colore cum cæruleo*: & deinceps: *Distat a cæruleo mutare medio, qua veneriorem hunc efficit colorem.* Mesuæus lapidem Armenium eligit, colore inter viridem & obscurũ terreum indúmque medio, maculis tum viridibus tum nigris distinctũ. Theophilus, lib. de vrinis flammeum illi colorem tribuit, *φοινικοῦν*, vt ipse vult, à Galeno vocatum. Vsqueadeò de Armenij colore variæ sunt Autorum discrepantésque sententiæ, quoniam fortassis Armenij nomine alij aliud intellexêre. Siquidem Dioscor. Armenij nomine medicamentum designauit, quod quidem ex Armeno seu Armutheo lapide contrito atque macerato parabatur, quóque pictores vti solitos testatur Aëtius. At Plinius & Mesuæus de lapide ipso Armenio verba fecêre, qui quidem verè coloris est virentis, inclinantis in cæruleum. Hic ipse porrò est, quem, æquè atque veratrum album, ad bilem atram seu vomitione vacuandam, seu per aluum deijciendam valere testantur inter Græcos Alexander Trallianus, & ex Nechepsi sententia Aëtius: itémque Actuarius, qui tamé, æquè ac Aëtius, Armeniacum pictorium cum Armeno seu Armenio lapide confudisse videntur. Mesuæus, ex Tralliani sententia, in illũ vsum veratro ipso tutiorem affirmat. Paulo aluum quidem purgat, sed stomacho noxius est.

ἀλικῶν] Et ipsum etiã lapidem Armenum facilè friabilem dixit Mesuæus: quãquam Stephanus, lib. de vrbib. duritiem illi tantam tribuit, vt in eo figilla sculpi & cælari queant.

CAP. CVI. *ἄμμου δίκην ἰόβρυος*] Lego, *διηρτημένου*, scil. *ἄμμου*. Existimo enim hic agi nõ de Cyano qui sit *κυανοῦς*. hoc est, *natiuus*, cuiusmodi est Cyprius modò dictus, sed de factitio, *σκευαστὸν* Græci vocant: qui quidem ex arena fortassè tali cum nitri flore subtiliter contrito & æris Cyprij delimata scobe temperabatur, quemadmodum fat multis verbis docet Vitruuius, Architect. lib. 7. cap. 11.

ὅτε καὶ ἄῤῥενι] Dubitet quis non immeritò, vtrum ad *ἄμμου*, quæ fœminino genere effertur, an ad *κυανοῦ* ista referri debeant. Nam & *κυανοῦ* Græci, teste Gal. 9. simpl. vtroque genere & masculino & fœminino efferunt.

τοῦ ἰοβρύος κυάνου] Cyanon tamen agno scit Mesuæus, colore ex viridi cæruleo. Plinius verò, *Cæruleo colorem* ait esse *cæruleum cum quodam colore albo*, lib. 35. cap. 6.

μετρίως στύφειν] Huic quantumuis septica sit facultas, nihilominùs Arabes ipsum lotione præparatum, æquè ac Armenum, cui cognatum est, ad deijciendam bilem atram vsurpant. Sed facultatis eiusce purgatoriæ Græcorum nullus meminit, quicquid scribat Mathiolus. Fateor equidem Galenum, 9. simpl. Cyano vim *καθαρτικὴν* tribuisse, sed quæ longè sit alia à vi cathartica: quod tamen discrimen bonus Mathiolus haud quaquam animaduertit.

CAP. CVII. *περὶ Ἰνδικοῦ*] Vulg. exemplaria λίθου, adijciunt: sed vocem, λίθου, temerè, vti & antè, ascriptam iudico, ac illius loco potiùs reponendum, *μέλανος*. Siquidem hoc Indicum, *μέλαν*, hoc est, *atramentum* Paulo dictum, eodémque modo apud Galenum, libro 4. de comp. med. varijs locis cognominatum, toto genere differt ab Indica gemma Plinij, quæ eadem est cum Indico lapide Pauli & Aëtij: quem quidem illi appẽsum ad sistẽdas hæmorrhoidas commendarunt.

τὸ Ἰνδικὸν γενέσθαι] Hoc Indici genus Plinius etiam, libro 35. capite 6. *ex India venire* scribit, *arundinum spumæ adhærescente limo*: quãquam ipsemet paulo antè, *quod ex India Indicum apportatur, sibi adhuc inexplorata inuentione esse* palàm professus fuerat.

ὑπὸ βαφέων πορφυρᾶς] Hoc Indici genus, quod apud infectores fiebat, existimauit Plinius, (quantum quidem ex illius verbis colligere licet) spumam esse purpurarum, quæ scilicet in officinis purpurarijs attollitur per ebullitionem sanguinis & saniei purpurarum, quæque ceu flos ipsis innatabat æreis cortinis. At nihil tale hoc loco intellexisse Dioscoridem facilè is perspiciet, qui attentiùs ipsius verba perlegerit. Nil enim sonant aliud, quàm fieri Indicum (vti adhuc hodie fit) è spuma purpurea efflorescente in cortinis infectorum, in quibus scilicet glastum feruefactum fuerit. Hoc verò vel ex eo palàm fit, quòd eædem propè vires à Dioscoride antea tributæ fuêre glasto, quæ hic Indico ascribuntur.

ἃ δὲ ἐν τοῖς πυρίνοις] Paulus, libro 7. de Indico ipsissima Dioscoridis verba citans, pro, *πυρίνοις*, legit, *ψυχίνοις*: & hanc lectionem secutus hoc loco est Cornarius. Ego verò Pauli lectionem illam minùs probauerim: maximè cùm glastum, cui consimiles vires Indicum habere sit verisimile, nullatenus refrigeret, sed calfaciat potiùs, itémque in astringentium numero censeatur, dum sanguinis profluuia sistere perhibetur: quod palàm afferunt tum Dioscorides, libro 2. tum etiam Galenus, 6. simpl.

CAP. CVIII. *Ὠχρᾶς δὲ τῆς ἐξ Ἀττικῆς*] Galitidem comm. 2. in Prognost. Hipp. Ochram laudatissimam asserit, natione Atticam. Celsus quoque, lib. 5. cap. 18. Ochræ Atticæ meminit, in malagmate aduersus panum & phymata. Quin & Vitruuius optimã quidem fatetur Ochram Atticam, sed eius vsum sua ætate in Italia exoleuisse scribit, Archit. lib. 7. cap. 7.

ὠχρᾶ λίθου] Ochra etiam ab Oribasio inter Septica medicamenta recensetur. At Galenus inter incidētia, cáque minùs calida, eandem commemorat, lib. simpl. 5. cap. 13.

CAP. CIX. ἀμμίῳ πανόμῳ] Plinius hunc eundem errorem non semel coarguit. Is enim, lib. 29. cap. 1. *Comperi nuper* (inquit) *pro Cinnabari Indica in medicamenta minium adiri, myrta nomine, quod esse venenum docemus inter pigmenta.* Rursum idem, lib. 33. initio cap. 7, *Milon* (fortè, *ammion*) quanquam & idem alibi μίλτον Σινωπικὸν, miniū Sinopicum interpretatur, *nocare Græca nomina: quadam Cinnabari, unde natus error Indicæ Cinnabaris nomine.* &c. Nec ita multo post: *Illa Cinnabaris antiqua, medicamenti, quæ utilissima est. At hercule Medica, quæ Cinnabarim vocant, pro ea utuntur hoc minio quod venenum esse paulo ante docuimus.* Attamen Theophrastus in libello de lapid. de minio agens, ipsum Cinnabari appellare non dubitauit, atque duplex illud constituit: vnum quidem αὐτοφυές, hoc est, *natiuum*, alterum ψευδεπίγραφον, hoc est, *factitium*: cuius inuentorem Callian quendam Athenienſem prædicat.

ψευδεπίγραφον] Factitij quoque minij meminit Theophrastus, lib. de lapid. verùm id non è lapide, sed ex arena quadam in argenti metallis in cocci modum nitente confici tradit, & ab ista diuersam eius præparationem, per trituram scilicet atque loturam, subiicit. At verò præter factitium hoc minium, natiuum aliud ibidem agnoscit. Sic & Plinius, lib. 33. cap. 7. *inuenitur*, inquit, *in argentariis metallis minium quoque & nunc inter pigmenta magnæ auctoritatis, & quondam apud Romanos non solum maximæ, sed etiam sacræ.* &c. Rursúmque paulò pòst idem ipse ex Theophrasti sententia minium natiuum in Hispania reperiri scribit, sed durum & lapidosum. Illa enim Plinij verba, *Reperiri iam olim in Hispania, sed durum & harenosum*, sic ego restituo: *Reperiri autem natiuum in Hispania, sed durum & lapidosum*: atque ita ex Theophrasto legendum censeo, cuius verba sic habent, loco nuper citato: αὐτοφυὲς μὲν οὖν ἐστι τοιοῦτον, σκληρὸν σφόδρα, καὶ λιθῶδες, &c. Eiusdē etiā minij meminit Strabo, lib. Geogr. 3. quod ex Hispaniæ Turditania tradit exportari, sed ipsum terra Sinopica non esse deterius asserit.

ἐκ λίθου ἁπτοῦ] Antèa ex Theophrasto & Plinio minium factitium ex arena quadam rubente in argenti metallis fieri docuimus. Sed & Plinius, lib. 33. cap. 7. alterius præterea minij mētionem facit, quod *secundarium* nominat, idque similiter atque hoc loco Dioscorides fieri docet *ex usto lapide venis argentariis & plumbariis permixto, non ex illo*, inquit, *cuius nomen est argentum vivum, quique ipse in argentum exæquatur, sed ex alio simul reperto.* Porrò lapidem cum scoria potiùs glebam, ex qua temperatur minium, Anthracem videtur appellasse Vitruvius. Architect. libro septimo, capite tertio. *Foditur*, inquit *gleba quæ Anthrax dicitur, antequàm tractationibus ad minium perueniat, uena prunæ similis* (ita enim eo loco legendum suspicor) *magis subrufo colore, habens circa se rubrum puluerem.* Subdit vero, (in quo à Plinij verbis modò citatis discrepare videtur,) *Cùm id foditur, ex plagis ferramentorum crebras emittere lacrymas argenti uiui, quæ à fossoribus stuppa colligantur.*

βαυκάλιον ἢ βαυκάλιον] Illa vox, βαυκάλιον, fortassis è margine in contextum ureptit: palàm siquidem hoc loco redundat. Legendum ergo, ἐστὶ δὲ καὶ βαυκάλιον, &c.

τῷ αἵματι ὁμοιοῦται] Plinius, libro trigesimotertio, capite septimo: itemque Solinus, capite vigesimooctauo suæ historiæ, in eo errore versati sunt, quem Dioscorides hoc loco notat: quippe qui existimarint Cinnabarim Indicam sanguinem seu saniem esse draconis elisi elephantorum morientium pondere, permixto vtriusque animalis sanguine. Verùs autem, vt ex Arriano, in lustratione maris rubri liquet, Cinnabaris Indica cognominata, lacrymæ instar ex arboribus colligebatur in insula Dioscoridis appellata nascentibus. Eiusmodi verò arborū in insula quoque Sancti portus appellata hodie nascentium meminēre Aloisius Cadamustus Venetus & Theuetus, ac alij nonnulli: sed illas omniū optimè, indito Draconis nomine, depinxit medicæ materiæ studiosis. Carolus Clusius, in tarraconensium Hispaniæ stirpium hist. lib. 1. Ac fortassis & eiusdem generis arbor ea fuit, quam Strabo, ex Potidonio, Gadibus nasci prodidit, lib. Geographię tertio. Porrò arboris illius lacrymam sanguinis appellatione designarunt, quia vix est color alius, qui in picturis magis propriè reddat sanguinem. Memoriæ quidem ἄιμα δράκοντος Actius, tum alibi sæpius, tum etiam, tetrab. 4. sermone 3. capite 12. in emplastro purpura inscripto: sed fallitur, dum suum illud ἄιμα δράκοντος in India, ex herba quadam dracunculo appellata colligi scribit. Sic & Serapio, dum Sideritidis Achilleæ succum sanguinis Draconis nomine describit. Cæterùm etsi Cinnabaris Indica arboris lacryma sit, vt antè demonstrauimus, non est quod quisquam miretur inter metallica hoc loco à Dioscoride recensēri, quoniam cum metallicis Dioscorides simul & semel substantiæ nominisve cognatione quadam coniuncta pigmenta persequitur. Sic & antè, huius libri capite 107. Indici cuiusdam meminit, quod in pictorum vsum venire solitum erat, quanuis metallicum non esse satis vnicuique constet.

δύναμις δὲ ἴσχει τὸ Κιννάβαρι] Vis Cinnabaris illius Indicæ recensetur. At nostri vsus Cinnabaris factitia, quæ quidem ex argenti viui & sulphuris diu arte quadam igni torrefactorum certis portionibus temperatur, ab vsu Medico in assumendis penitùs abdicanda est: quandoquidem intigniter erodit & exulcerat: tātùm abest vt Cinnabaris Indicæ viribus vlla ex parte respondeat. Sic & Minium Veterum Plinius pluribus locis venenum fuisse docuit.

CAP. CX. ἄιμιον λεγόμενον] Quod hîc minium Dioscoridi dicitur, non illud est factitium præcedenti capite commemoratum, sed natiuum aliud, videlicet lapis ille qui hodie Cinnabaris fossilis appellatur, è quo etiam hoc sæculo argentum viuum elicitur. Plinius itidem, libro 33. capite 8. τὸ ἀπὸ τούτου fieri prodit è minio, quod tamen secundarium nominat: sed fallitur, dum eo ipso loco hydrargyrum ab argento viuo diuersum facit, & hoc quidem nomine quod natiuum est, illo verò quod factitium significari existimat: cùm

tamen vtrunque pariter Latini & Græci Hydrargyri nomine designarint. Nam & hi suum χυτὸν ὑδράργυρον, καὶ τὸ ὑδραργύρου minimè distinxêre. Vitruuius, lib. 7. Archit. cap. 8. Argentum viuum colligi scribit ex anthrace gleba, è qua & ipsum minium eliciebatur.

αἰθάλου κινναβάρεως] Lego, κινναβαρίτου: quo modo & cæteri Interpretes videntur mihi legisse.

ὑδράργυρος χύσις] Alterum modum Argenti viui parandi, quod Hydrargyrum priuatim appellat, refert Plinius, lib 33. cap. 8. videlicet, *æres mortarijs pistillisque trito minio ex æquo.*

διείσπασις τοῦ ὑδράργυρου] Argentum hoc natiuum Galenus ignorasse videtur. Siquidem lib. 9. simpl. Hydrargyrum non ex sponte nascentibus esse medicamentis asserit, sed ex his quæ arte præparantur. At verò Fallopium rectiùs censuisse crediderim, qui Argentũ viuum factitium nullum agnoscit: quoniam etsi arte & calore quodam blando interdum eliciatur è proprio metallo, nullam tamẽ ab arte alicuius momenti mutationem videtur suscipere.

ἐν ὑγροῖς] Imò & ligneis vasis & animalium vesicis asseruatur Argentum viuum, si modò diligenter obturentur: metalla verò omnia tum hic recensita, tum & alia qualiacunque exest, quibus inhæserit, vti quotidiana constat experientia. Atque iccircò Plin. lib. 33. cap. 6. *Argentum viuum* (inquit) *exest, & perrumpit vasa, permanans tabe dira.*

τοῦ βαρὺ ἔμβριθες.] Non pauci è Recentioribus varijs didicerunt experimentis Argẽtum viuum quantumuis assumptum minimè erodere, imò & ipsius pondus in causa esse, vt eò citiùs citra rosionem intestina permeet. Sed & Argentum viuum suapte natura perquam frigidum & humidum esse docent Auicennas, Auerroës, Fernelius & Mathiolus, tantùm abest vt erodendi vi præditum sit. Alij calidum & humidum esse censuerunt. Vnus Fallopius calidum & siccum esse asserit, non tamen vsqueadeò vt exurat: quam verò humanæ naturæ infert offensam, existimat ex occulta proprietate contingere. Attamen & Gal. 4. de fac. simpl. cap. 19. inter pernicios a medicamenta, quæ per erosionem interimunt, Argentum viuum enumerat. Sed vel locus ille corruptus est, vti voluit Fallopius: vel est verisimile, tale quid protulisse Galenum ex aliorum potiùs sententia, quàm quòd ita sentiret: maximè cùm ipsemet, 9. simpl. palàm fateatur, se nunquam expertum, an seu assumptum seu admotum interimat.

Cap. CXI. συμίγνυται δ' ἐν τῇ Καππαδ.] Theophrastus, lib. de lapid. inter rubricæ genera Sinopidis Lemniæ simul & Cappadociæ meminit, his verbis: *εἶναι καὶ ἡ Λημνία, καὶ καλοῦσι Σινωπικὴν* (perperàm legitur, *σφηλικὴν*) *αὕτη* (fortè *ἀείστη*) *δ' ἔστιν ἡ Καππαδική. πωλεῖται δὲ καὶ ἡ Σινωπική. i. sed & Lemnia quam nonnulli Sinopicam. Optima verò est Cappadocia, quæ Sinopem defertur.* De eadem Sinopide sic Plin. lib 35. cap. 6. *Sinopa*, inquit, *inuenta primùm in Ponto: inde nomen à Sinope urbe. Nascitur & in AEgypto Balearibus, Africa: sed optima Lemno & in Cappadocia effossa è speluncis.* Vitruuius itidem, Archit. lib. 7. cap. 7. *Rubricæ copiosæ multis locis eximuntur, sed optimæ paucis: vti Ponto, Sinope & AEgypto, in Hispania Balearibus, non minùs etiam Lemno.* Sed & Strabo, lib. Geogr. 12. de eadem sic habet: *ἐν δὲ τῇ Καππαδοκίᾳ γίνεται καὶ ἡ λεγομένη Σινωπικὴ μίλτος, ἀφ' ἧς ἡ πασῶν. ὠνομασμένη δ' ἐστὶν αὕτη καὶ ἡ Ἰβηρική. ὠνομασμένη δὲ Σινωπική, καὶ διότι κατῆγον ἐκεῖθεν οἱ ἔμποροι, πρὶν ἢ τὴν Ἐφεσίων ἐμπορίαν μαλλον ἢ νῦν ἐκδοθῆναι τοῖς Ἑσπερίοις ἀνθρώποις.* hoc est, *In Cappadocia nascitur omnium præstantissima rubrica, quæ Sinopica dicitur: cum ea tamen ærugo etiam Hispanica. Sinopica verò illa cognominata est, quod eò soleremus eam deuehere mercatores, prinsquam Ephesiorum negotiatio ad horum regionis hominum prouocaretur.*

ὑπαιζουσι] Sinopidis tria genera pro coloris varietate facit Theophrastus, libro nuper citato: *σινωπὶς* (inquit ille) *ἐρυθρὰ σκοτία, ἡ δὲ ἰλλυρικὴ, ἡ μέση.* Sic & Plinius Theophrastum secutus, lib. 35. cap. 6. *tres Sinopidis species recẽsct, rubram, minii rubentem, & inter has mediam.* Hanc *αὐτόφυτον*, hoc est, *sua bonitate ortum*, appellat Theophr. quòd non misceretur, cùm reliquas mercatores miscere solerent.

Cap. CXII. τῆς ὤχρας κατασκευῆς] Posteaquàm de Rubrica fabrili natiua egit Dioscorides, iam ad factitiã transire videtur, ideóq; non absre Cornarius hunc Dioscontextũ sic emẽdat: *ἐρυθρὰν δ' ἐστὶ καὶ ἐκ τῆς ὤχρας κατασκευαζομένη, &c.* Enimuero & de eadem sic Theophr. lib. de lapid. *γίνεται δ' ἐκ τῆς ὤχρας κατακαιομένης, οἷον χείρων. ἡ δ' ἐρυθρὰ Κυθνία.* hoc est, *fit ex ochra exusta, sed deterior. Est autem nitentum Cydy*, &c. Contrarium verò sonant Plinij verba, lib. 35. cap. 6. Postquã enim egit de Rubrica quæ nascitur in ferrarijs metallis, subdit statim: *Ex ea fit ochra exusta. Rubrica in ollis nouis luto circumdatis.* Facilè verò ab errore vindicabitur, si cum Cornario sic legerimus: *Fit & ex ochra exusta Rubrica*, &c. Neque enim è Rubrica exusta fit ochra, sed è contrà, ex ochra vsta, Rubrica.

Cap. CXIII. ἡ δὲ Λημνία σφρ.] Galenus, 12. simpl. in Lemno, AEgæi maris insula, narrat ad Hephæstiada vrbem quæ Orientem spectat, in colle quodam planè alioqui sterili terram triplici differentia olim repertam. Erat enim terra sacra, cui non capræ imago, vti voluit Dioscor. sed Dianæ sacrũ sigillum imprimebatur, quaq; ideò *Λημνία σφραγὶς* appellabatur. Erat & altera propriè ac verè *μίλτος*, hoc est, *rubrica* cognominata, qua potissimùm vtebantur fabri. Erat & tertij generis terra extersoria, cuius vsus ad lintea ac vestes eluendas. Plinius verò rubricã cum Lemnia sphragide confundit, cùm tamen hæc diuersa sit à rubrica, & quamuis haud ita colore discrepet, minimè tamẽ lotionis ratione manus inficiat, sicut illa: quemadmodũ apertè docuit Gal. 9. simpl. itémque 1. de Antid. Attamen & Paulus AEgineta, lib. 7. *Λημνίας μίλτου* appellatione, sigillatam intellexit. Sed & in Nicandri Theriacis *Λημνὶς μίλτος* pro Lemnia sphragide reperitur, similitérque in versibus Andromachi, apud Gal. in Ther. ad Pis.

μίγνυται αἷμα αἰγείου] Galenus, qui quidẽ (prout erat simplicium medicamentorum studiosissimus indagator) in Lemnon insulã huius vnius terræ visendæ studio nauigarat, huic terræ caprinum sanguinẽ ammisceri solitum pernegat, atque vel hoc nomine Dioscoridẽ obiter ac velut in transcursu incusat.

CAP. CXIIII. *παῦρ, ὑφδὲν, ἀμαυρὸν, ἀσθενὲς*] Isthæc omnia nomina redundare videntur. Saltē priora illa duo expūgi omnino debere compertū est, quandoquidem Chalcanthi genera, concretitiū & coctile, tanquā factitia, à stillatitio, quod natiuū est, etiā ab ipso Dioscoride non ita multò pòst manifestò distinguūtur. Inferiùs verò, in recensendis bonitatis Chalcanthi notis, quo loco habetur, *παυρότητα δευτέρα, ἀσθενῆ, παυρὸν*, ex Oribasio, *παυρὸν*, reponendum censemus.

σκόλιον δὲ ἴσχει διαφορὰν] Et hunc ipsum parandi Chalcāthi modum illustrat Plinius, lib. 34. cap. 12. Sed & plures alios eiusdem parandi modos eodem loco subdit. Chalcanthum porrò longiori tempore in Chalcitin saltem extima sui parte transire obseruatum à se testatur Galenus, 9. simpl. velut etiam Chalcitin in Misy: id quod de natiuo Chalcantho intelligendum est.

βοηθεῖ καὶ ὕδατι πότου] Contra fungorum venena ex aqua potū Chalcanthum commēdat hoc loco Dioscorides: lib. verò de venenis, cap. 23. de fungis, idem ipsum ex aceto propinari suadet.

CAP. CXV. *ἡ μελανὶς*] Recentem (inquit Plin. lib. 34. cap. 12.) *putant utiliorem esse, quoniam inueterata sory fiat.* Sed inueteratam, misy potiùs fieri, quàm sory, testatur Gal. 12. simpl.

μαρείως εὑρόντων] Goupylus in altero exemplari, *μαρείως σκόπτων*, legi scribit: attamen vulgatam lectionem magis probat. Ego verò contrà malim, *σκόπτων*, quàm, *εὑρόντων*. Iam enim anteà Chalcitidi vim *σηπτικὴν* tribuit, quæ iccircò frustrà hìc repeteretur: quanquam eo loco pro, *σηπτικὴν*, Ruellium & Marcellum, *ῥυπτικὴν*, legisse non ignoro. Præterea verò Chalcitin quæ vsta non sit, non septicam modò, sed & *ῥυπτικὴν* facultatem habere satis constat.

CAP. CXVI. *σκωρίᾳ κυπρίᾳ μέσῃ*] Galenus, lib. 9. simpl. ad Psorici confectionem non quidem cadmia, sed lithargyro vtitur, eáque tantùm in re à Dioscoride discrepat. Celsus, lib. 6. cap. 6. *Chalcitidis aliquid & cadmiæ dimidio plus ex aceto simul conteri prodidit, idq; in ollas fictile additū, & antefixum ficubus siluis, subterra reponi, sublatumque post dies viginti rursus teri, & sic ψιμύθιον appellari.*

δυνατώτερον ἐστι] Gal. 12. simpl. Psoricon deficcatorium quidem esse scribit, at minùs Chalcitide mordax, quippe cùm partibus sit tenuioribus.

καυστὸν δὲ αὐτοῦ] Marcellus perperàm de Psorico hæc interpretatur: nam vel pronominis genus ipsum ad Chalcitidem referri debere satis indicat. Atque vel hinc constat, caput hoc à superiore minimè distingui debuisse.

ὅτι μὲν οὖν πολλῶν] Dubium non abs re fuerit, vtrū hoc generatim de metallicis omnibus intelligendum veniat, an de Chalcitide sola, quæ aliàs humidior, aliàs siccior conspiciatur: sed illud prius sit mihi lōgè vero similius, quantumuis alij aliter interpretati fuerint.

CAP. CXVII. *ὁ δὲ ἀφρώδης χαλκὸς*] De Misy optimo in Cypriorū officinis sic Plinius, lib. 34. cap. 12. *Nota sunt frusta aurea scintillæ, & cùm vrantur arenosa natura fine terrea Chalcitidi similia.*

ὁ δὲ τοῦ μίσεος ἧττον καὶ] Hoc discrimē illustrat Galenus, 12. simpl. dum scribit, æquè cálida esse Misy & Chalcitin: attamen Misy tenuiorum esse partium quàm sit Chalcitis, adeóque duris corporibus adhibitum minùs Chalcitide mordicare.

CAP. CXVIII. *πανταχοῦ τοῦ αὐτοῦ τοῦ μίσεος*] Melanteriam scribit Galenus, 12. simpl. omnia propemodùm astringentia tenuitate partium exuperare.

CAP. CXIX. *σκωρίαν δὲ τὴν Αἰγύπτιον*] Sic & Plinius, lib. 34. cap. 12. *Sory Ægyptium maximè laudatur, superato Cyprio, Hispanensi & Africo: quanquam colorum quoque curationi quidam nullus Cyprium putant: sed in quacunque natione optimum, cui maximum virus in afflatu, tristique pinguior nigrescens & spongiosum*, &c. Ita enim illa distinguenda esse ex hoc Dioscoridis contextu facilè colligitur.

τὸ δὲ μὴ λαμπρίζον] Contrà voluisse videtur Plinius, loco citato: postquam enim de Sory Ægyptio, ceu optimo, egit, statim subiicit: *Alterius nationis omnium splendescit, & misy est lapidosius.* Hinc ego suspicor in Dioscoridis contextu expungendam negatiuam particulam.

διαφέρει δὲ ἧττον καὶ πολίου] Crassiorum tamen est partium, quàm & chalcitis & misy. Atque ideò quoque cùm in Cypri metallis hæc tria Sory, chalcitis & misy sibi inuicē substrata, teste Galeno, reperiantur, infimum quidem Sory, summum misy, medium chalcitis locum sibi vendicare deprehenditur.

ὠφελεῖ εἰς τοὺς ὀδόντων πόνους] Plinius de Sory, lib. 34. cap. 12. *Prodest autem & dentium dolori, si continuatur atque colluatur.* Scilicet in dolore dentium alium vtendi modum præscribit.

τὴν δύναμιν ἰσοπαχυτέραν ἐστί] Quæ enim suapte natura acria sunt, vti testatur & ipse Galenus, vstione mitiora redduntur: quanquā & alias qualitates, maximéq; tenuandi facultatem sibi asciscunt. Contrà quæ minimè acria sunt, vstione acrimoniam acquirunt.

CAP. CXXI. *ἐν δὲ αἰμωρροΐσι*] Malim, *ἐν δὲ αἱμορροΐσι*, sicuti sequenti capite, *ἐν δὲ ῥοϊκοῖς*, &c.

ἡφαιστόλιθον ὃν Μισυῖτιν] Plin. lib. 33. cap. 4. eiusmodi *Auripigmentum* scribit *in Syria fodi pictoribus.*

ψιλοῖ δὲ τρίχας] Addit Galenus, 9. simpl. si diutiùs moram traxerit, nec cuti etiā ipsi parcere.

CAP. CXXII. *αἱμαλθοῦσιν ῥινῶν*] Plin. lib. 34. cap. vlt. de Sandaracha: *Explet*, inquit, *alopecias ex aceto illita.*

CAP. CXXIII. *οἱονεὶ τῆς βωλίτιδος*] Dioscoridis verba sonāt, Alumen scissile gleboſi veluti florem esse. At Plinius, è lapide quem, vti videtur, chalcitin vocabant, fieri voluit: quippe cuius sudor sit in spumam coagulatus. Sic enim ille, lib. 35. cap. 15. de Alumine scissili: *Hoc fit è lapide, ex quo & id chalcitin nocant, ut sit sudor quidam eius lapidis in spumam magulatus.* Hinc non omnino malè suspicatur Marcellus hoc loco legendum, non quidem *βωλίτιδος*, aut *βωλίτιδος*, vt alij codices habent, sed *χαλκίτιδος*. Ac præter eum Plinij locum est & alius apud Gal. qui coniecturam istam quodammodo confirmare videtur. Hic enim in Lexico vocum Hipp. autor est, quā Græci simpliciter *σχιστὸν* vocabant, ab Hipp. *σχιστὸν χαλκίτιδα* dictam fuisse.

αὐτῶν ὧν πάντων] Quanuis Dioscorides trium potissimùm Aluminis generum in vsu Medico receptorum meminerit, plurima tamē alia fuisse genera & ipse agnoscit hisce verbis. Ac Plinius quidem, lib. 35. cap. 15. Aluminis duas facit ex

colore differentias, candidum, inquàm, & nigrũ: ex conſiſtentia vero totidem, liquidum & ſpiſſum ſeu concretum: liquidi rurſum alteram ſpeciem, nempe impuriorẽ ὑπόχυσον appellari ſcribit: quod verò limpidum eſt, φοίνικον. Et certè quidẽ Galenus, 6. τῶν κατὰ τόπους, φοίνικος συνηθείας etiam meminit. Spiſſum verò ſeu concretum duplex idem ille conſtituit, ſciſſile & rotundum: illudq; rurſum duplex, vel glebarum inſtar aut aſſulosè compactum, vel ſigillatim in capillamẽta quædam caneſcentia dehiſcens, quod ideò τριχίτης, quaſi capillare nominatum fuerit. Rotundum itidem duplex: ſpongioſum inquàm quod in totum damnatur. & pumicoſum, quod melius eſt. Præter haſce plures etiam, alias habet Gal. 9. ſimpl. Aluminis appellationes, nimirum ἀστραγαλίτιδος, στυπτηρίας & μελινοῦς. Sed & Recentiores hodie Aluminis factitij varia genera commemorant: Alumen fæcum è vini fæcibus Sole ſiccatis donec albeſcant, deinde vſtis: Alumen Catinum, è cineribus herbæ Kali ſeu ſodę vulgaris: Alumẽ denique ſquaiolæ ſeu ſquamoſum, quod ſit è lapide quibuſdam ſpeculari dicto. Sed & in factitiorum genere cenſentur Alumen rupeum & zuccharinum. Illud quidẽ è certo quodam lapide candido, interdum etiam ſubrubro ſæpiùs præparato: hoc ex Alumine rupeo, ſaccharo, & oui albumine conficitur.

διορίσιμος δὲ καὶ λίθος] Lapidem hunc Alumini ſchiſto ſeu ſciſſili ſimilem, Amiantum eſſe patebit ex verbis Dioſc. cap. de Amianto. Sed & Plinius hunc eundem Alumini ſimilem teſtatur, lib. 36. cap. 19. Fecit verò ea ſimilitudo, vt etiam apud vulgum lapis ille *Aluminis plumæ* nomen obtinuerit.

ὁ πυφολιγώδης] Serapionis Interpres nõ *bullis turgens*, ſed *põpholygi ſimile* vertit. Ac videtur quoque ea interpretatio doctiſs. Manardo placuiſſe.

καὶ πυρώδης ὀσμὴν ἀναπνεῖται] In Aldino Dioſc. exemplari, itémque apud Oribaſium legitur, πυρώδη ὀσμὴν ἀναπνεῖται hoc eſt, *caſu odorem ſpirans*: quæ quidẽ lectio verior nécne ſit, à Marcello in dubiũ vocatur. Plinij certè quidem verba, πυρώδη, legendum admonent. Sic enim ille: *Liquidi probatio ne ſit limpidum lacteúmque ſine offenſis frementium, cum quodam igniculo calore.*

χρῶνται δὲ καὶ οὕτως] Aluminis vrendi modum explicat Aëtius, lib. 9. dum Alumen in ollulam nouam conjectum carbonibus imponit, ac vbi diffuſum liquatúmve fuerit, tolli iubet, tandémque, vbi refrixerit, conteri.

σὺν ὄξει καὶ νίτρῳ] Serapionis Interpres, *cum aqua pira*, quaſi legerit ille, σὺν ὕδατι πικρῷ, & per ὕδατι πικρῷ *picem liquidam* intellexerit, aut quod πικλαῦσι Dioſcoridi dictum eſt, lib. 1. cap. 95. quódque ibidem eundẽ quem pix liquida vſum præbere ſcribitur. Plin. lib. 35. cap. 15. de Aluminis viribus agens: *Sic & ambuſtis*, inquit, *prodeſt & furfuribus corporum cum ſero & pice*: quo loco legendum quoque videtur, *cum ſero è pice*, hoc eſt, piſſelæo ſeu picino oleo iam dicto: niſi malumus, iuxta Dioſc. vulgatam lectionem, cum *cerno & pice* legere.

οἰδήματα π] Sic quoque legiſſe videtur Serapio. Attamen Marcellus, pro οἰδήματα π. reſtituit, *oid* δι, &c.

Cap. cxxiiii. τὸ σκορπιῶδες] Vires quæ ſequuntur Sulphuri viuo ſeu ἄπυρα potiſſimùm aſſignat Dioſcorides: quoniam, vt ſcribit Plinius, lib. 35. cap. 15 *eo ſolo ex omnibus generibus Medici vtuntur*. Quatuor autem paulo ante Sulphuris genera idem recenſuerat.

ὀδήματα καθαίρει τὰ μετὰ ὕδατος] ὀδήματα καθῆκον ἔδατι, legiſſe videtur Serapio: & rectè quidẽ. Nam & hic idem Autor. 2. eiusd. capite de remedijs ad icterum, ſulphur in potu commendat ὀδήματα καθῆκον ὕδατι, hoc eſt, *aquæ miſperſum*: ſed & plane ridiculum & à ratione alienũ foret exiſtimare, icterum ſeu morbũ regium inſperſo fronti Sulphuris cochleario ſanari.

Cap. cxxv. πλὴν ζέοντι οἴνῳ] Plinius itidem de Pumicis viribus agens, lib. 36. cap. 21. poſtquã ex Theophraſti autoritate prodidit, potores in certamine bibendi præſumere farinam Pumicis: ſed, niſi immenſo potu impleantur, perichitari, ſubdit, *tantam, eodem autore, ei refrigerandi naturam eſſe vt multa ferucre deſinant Pumice addito.* Attamẽ Theophr. lib. hiſt. 9. cap 19. poſteaquàm retulit EVdemũ Chium, qui vna eademq; die viginti duas veratri potiones ſumpſerat, neque vomitu neque ſecessu purgatum fuiſſe: quia poſt ſeptimã veratri potionem Pumicem hauſiſſet acri aceto reſperſum, rurſúmque eundem reſumpſiſſet mero dilutum & maceratum: non de vini muſtive liquore, ſed quouis alio hoc memoriæ prodidiſſe videtur: quòd ſi quis in feruẽtem vinum Pumicem iecerit, feruorem non ad tempus tantùm, ſed ex toto reſtinguet. *Extant enim*, inquit ille, *pœnitaſſime & ſpirituum omnem ſpuma conceptum in ſeſe recipit & abſumit.*

C. cxxvi. ἀμμωνιακὸν τὸ ὄρυκτον] Sal iſte quẽ ἀμμωνιακὸν τὸ ὄρυκτον vocauit Dioſcorides, ſeu à regione Ammoniacum verti) nomẽ haud dubiè ſortitus eſt ab Ammonia Libyæ regione Mediterranea, per cuius ſitiẽtia detractis arenis olim inueniebatur. Quanquã enim & alibi naſcebatur, attamen ei à Medicis palma perhibebatur, qui in eius Cyrenaici tractus deſertis arenoſiſq; locis eruebatur, circa quæ delubrum erat Iouis Ammonis oraculo celebre. Plinius verò, lib 31. cap. 7. eundem Salem maluit ita dictum, *quòd ſub arenis inueniretur*. Sed & ipſam illam regionem ἀπὸ τῆς ἄμμου, *ab arenoſo* inquã & *ſqualenti ſolo*, quo ferè tota prędita eſt, nomen obtinuiſſe nemo eſt qui neſciat.

ὑγρὸν π] Iſthæc aliter videtur legiſſe Plinius. Sic enim ille de Sale Ammoniaco, ibidem: *Similis eſt calore* (Corn. legit *corpore*) *alumini quod ſcyphi nocent.*

καλλίστου δὲ Ταττάου] Hanc lectionem confirmant Plinij de Salis generibus varijs agẽtis hæc verba, loco citato: *Marinorum maxime laudantur Cyprius à Salamine: at eſtagnis Tarentinum & Phrygius, qui Tattæum vocatur.* Eſt autem Strabonis, lib. 12. poſt Galatiam Auſtrum verſus lacus nomine Tatta, Cappadociæ maiori vicinus, iuxta Morimenos, in Phrygia maiore, à quo quidẽ lacu Sal ille Tattęi cognomen ſibi vendicauit. Aldinus codex pro voce, Ταττάου, habet, ταττου, ἢ ταττάου ἢ γαττάου. quas quidẽ voces expreſſit Ruellius. Attamen omnino expungendæ videntur, & earum loco vulgatam lectionem retinere ſatius eſt.

τῶν μαλθάκων δὲ τῶν ὑάλου δίχα.] Gal. x 1. ſimpl. inter ma-

rinum & fossilem Salem differentiam hanc esse scribit, quòd Salis fossilis essentia magis compacta sit, quàm marini, proindéq; partium crassitudo & astringendi vis in illo maior sit.

πανδίονας] Cornarius haud satis aptè, *pandiones*, *ossium carnem* hoc loco interpretatur. Aldinus codex habet, πηνδόνας, pro quo, mutata nonnihil voce vocisque casu, legendum iudico, πανδίονας. Sic enim vocat Aristoteles, 9. de hist. anim. insectorum aculeatorum genus quoddam, crabroni vespæ haud absimile. Nicãder in Ther. nisi mendum subest, πηφονίδια nominat: apud Hesychium etiam ἀσπάλαθοι alio nomine appellatur. Ego malui, seruata voce Græca, Tenthredines vertere, quàm cum Gaza Arist. Interprete, Teredines, nullo quod sciam Latini Autoris exemplo. Marcellus, ἀσπάλωνα, hoc loco legendũ censuit, quoniam ἀσπάλων crabronem significat, & Plinius Salis vires recensens, vesparum simul & crabronum meminit, his verbis: *Aduersus crabrones uerò uel uespas, similáque ex aceto*, &c.

Cap. cxxvii. ὀπτόμενα δὲ γίνεται ἁφρώδης] Pro ἁφρώδης, legendum haudquaquã, ἀφρώδες. Gesnerus etiam in corollario de Halosachne, pro, ὀπτόμενα, νιτρόμενα, seu ὀπτώμενα, legendum suspicatur. Galenus & Paulus ἅλας ἄχλυν scribũt esse, ὑπόψαμα seu ὑπόψημα τοῦ ἁλὸς, hoc est, *Salis spumosam uelut efflorescentiam*. Salem enim plurali τοῦ ἁλὸς numero designari constat. Plinius aliãs *Spumam salis* nominat, aliãs *Spumam muriæ aridam*. Nos eo nomine Salem è marina spuma genitũ intelligimus.

Ἀναίμακτα δὲ ἔχει] Gal. lib. 11. simpl. Spumam salis multò tenuiorum esse partium scribit, quàm salem ipsum, proindéque magis extenuare & discutere: at minùs cõstringere. Plinius, lib. 31. cap. 9. posteaquàm salis vires etiã fusiùs quàm Dioscorides ipse persecutus est: *Ad summa*, inquit, *spuma salis nullior incandiorque*.

Cap. cxxviii. τὸ δὲ ἅλμαδὸς] Sic Plin. lib. 31. cap. 8. *Mariam apud Mediterraneos fore aquæ maris inæ mensam pensare* scribit: quanquam idé, proximè præcedẽti capite, (si eadem est cum Muria Salsugo seu Salsilago, de qua loco illo agit) *æquas marinæ salsiores esse atque in distare* scripserat.

Cap. cxxix. πεπιέζθω δὲ τὸ Νίτρον] Cordus, in tractatu de Halosantho, legendum ex Plinio censet: διαῦ δὲ πεπιέσθω, *quoniam*, inquit ille, *Flos salis res fluxilis nõ est, sed marina*. Sic verò Plinius, de Salis flore, lib. 31. cap. 7. *Ægyptus inuenit, mediterráque Nilo deferri, & fontibus tamen quibusdam inuenit*: quo loco quod de lacubus aut stagnis hîc refert Dioscorides, idem de fontibus Plinius recitat.

πάνυ λεπτὸν τὸ χνόος] Plinius, loco citato, posteaquã de fauilla salis, ceu leuissima & candidissima salis parte, paucis mentionem fecit, de altero salis Flore scribit, in hæc verba: *Appellatur & Flos salis in omni diuersa res humidioríque natura, & croci colorem aut rufi, uelut rubigo salis, odore quoque in grato, aut pari, dissentiens a sale, non modò a spuma*. Hũc eundem salis Florem, ὀχρὸν φαίνεσθαι esse etiã testantur Galenus & Paulus.

τὸ δὲ ἅλμαδον] Non solùm rubrica, sed etiam testa trita Florem salis adulterari solitum scribit Plinius, loco suprà citato, his verbis: *Adulteratur tingiturque rubrica, aut plerunque testa trita*, &c.

πεπιεσμένον] Cum Gesnero, in Corollario de Halosantho, *ami ũ*, πεπιεσμένον, πεπιεσμένον, vti, teste Goupylo, in altero veteri codice habetur, legendum existimaui: maximè cùm & ipse vetus Interpres & Serapio atque etiã Hermolaus ita legisse videantur. Huc adde quòd verisimile est, cùm Flos salis crocei sit coloris, pilos vix inalbaresat cùm maxima extergendi vi polleat, rationi magis consentaneum est, pilos crassiores duriorésque extenuare. Sed amplius quiddam de eodem Salis flore, quod ad pilorũ corruptionem spectat, refert Plinius, his verbis: *detrahit & ex palpebru pilos efficacissime*.

Cap. cxxxi. Ἀφρὸς δὲ νίτρου] Ἀφρὸς νίτρου nomine Dioscorides & Aphronitrum & ἄφρον νίτρου, hoc est, *nitri spumam* priuatim dictam comprehendere videtur. Vtrunque tamen, ἀφρόνιτρον, inquam, seu ἀφρολίτρον, ἀπὸ τοῦ ἀφροῦ νίτρου seu λίτρου distingui oportet, non quidem, vti voluêre nõnulli, quòd Nitri spuma factitia sit, illud verò fossile; sed, quemadmodũ testatur Galenus, 9. simpl. quòd Flos seu Spuma nitri (vtrouis enim modo & ἀφρὸς νίτρου & ἄνθος νίτρου Galeno dicitur) alba sit & triticeæ farinæ similis: Aphronitron verò neutiquam farinæ speciem habeat, sed quiddam coactum compactúmque sit. Plinius inter spumam nitri & Aphronitron nihil discriminis agnouisse videtur. Sic neque Martialis in suo illo pentametro:

Spuma nouæ nitri, dicar & Aphronitrum.

ὁ ἀφρώδης] Malim, καὶ ἀφρώδης, vti legerunt Oribasius & Serapio.

Ἀναπίπτει μᾶλλον κυμάτων] Vel legendum, ἀναπίπτει μᾶλλον κυμάτων καὶ πάσσει μᾶλλον ὑφαλμύρας ἢ ὑφάλμυρας ἐπὶ τῆς θαλάσσης &c. Vel, ἀναπίπτει μᾶλλον κυμάτων ἢ πάσσει τῆς θαλάσσης διαφερόντως τῇ ἁλμυρᾷ. ἢ πάσσει ἢ ἀνίησιν, καὶ πάσσει μᾶλλον ὑφαλμύρας ἢ ὑφάλμυρας. Hoc certè quidé modo Plinius videtur legisse. Sic enim ille, lib. 31. cap. 10. *Discutit & urinam, si denarium libratur pondere drachmæ cum ruta uel acetabulo uel cumino*. Pleriq; verò Interpretes, ac inter cæteros Serapio, ὑφάλμυρα hoc loco *sapam* interpretantur: at nos cum Cornario & Marcello ἁλμυρὰ ἀναπίπτειν accipi oportere iudicauimus.

θερμαντικὴν ἰσχύουσαν] Sic Plinius, loco citato, vbi fusiùs multò naturam ac vires nitri & Aphronitri persequitur: *Contra algores horroréſque prodest, manibus pedibuſq; confricatu cum oleo*. Rursúmque: *Pernox ante accessiones, frigidas nitro & oleo multo præcapere*.

κατεσθιόμενα ὑπὸ ἰῶν ἑαυτῶν] Plinius ibidem: *Contra canis morsus, addito & resina, mirifici cum aceto illinuntur*.

ἀναιρεῖ τοὺς ὀδόντας] Plinius: *seruncules admixtum resinæ extrahit, aut cum una alba passa, nucleus eius simul trahit*.

μίγνυται καὶ πάσσεται] Nitri vsum in linguę paralysi aliter exponit Plinius, hisce verbis: *Paralysi in lingua cum pane imponitur*.

Cap. cxxxii. πίνεται δὲ καὶ ὄξους] Horum pleraque, quę in genere de Fæce profert Dioscorides, aceti Fæci priuatim tribuit Plinius, lib. 23. cap. 2. Paulus aceti Fæcem in totum Face vini valentiorem magisque astringẽtem esse scribit. Plinius de eadem: *Fax*, inquit, *eorũ pro materia acrior sit necesse est, multoque magis exulceret*.

ἐν δὲ κεραμίοις] Cremum vires amplas: siquidem cre-

mutio illi malorum virium adijcit, inquit Plinius, loco modò citato. Sed & cremationē causticam vim ascisciſ, teſte Paulo: qui quidem crematam fæcem φύκιλλαν alio nomine vocitari ſcribit. Sed φύκιλλαν potiùs legendum eſſe, tum ex Suida, tum ex verbis Critonis à Gal. recitatis, cap. 8. lib. 1. περὶ κρ. πόνων, licet colligere. Ita porrò φύκιλλα dicitur, quaſi fęcula, voce nimirū à Latinis derivata.

CAP. CXXXIII. ἐαὶ μὲν λιθώδεσιν] Malim, ἐαὶ μὲν λιθωτοῖς ἢ ψάμμοις, nempe, ὄνυξιν.

ἐκ τῆς χοιράδος μαλακώτερον] Plinius, lib. 36. cap. 6. *utiliorem* ſcribit *Calcem è molari lapide*: quo loco fortaſſe legendum, *è marmore* Ibidem verò damnat *è ſilice; utiliorémque* ſubijcit *eſſe ex effoſſo lapide, quàm ex ripa fluminum collecto*. Sed de vtilitate in ſtructura tectoriſque potiùs, quàm in Medicina agere eo loco videtur.

κατακαὶς, ἐκ ἀσβολωθείσης] Viuæ ſeu inextinctę Calci, quæ ἄσβεστος ἄπυρος cognominatur, eædem tribuuntur vires à Galeno, lib. simpl. At, eodem teſte, Calx extincta maximéque inueterata minùs & vrit & cruſtas inducit: calfacit tamen etiamnum, carnémque liquat. Quòd ſi ſæpiùs abluta fuerit, omnem morſum deponit, egregiè citra morſum eroſionémve exiccans.

CAP. CXXXIIII. ἐμπλαστικὴν] Gypſo vires eaſdem tribuit Galenus, lib. ſimpl. verùm ſi crematum fuerit, non æquè emplaſticā vim habere, attamen tenuiorum eſſe partium, valentiúſq; exiccare ſcribit. Eſſe autē Gypſum duplex, quod è lapide coquitur, & quod è terra foditur, monent Theophr. de lapid. & Plin. lib. 36. cap. 24.

CAP. CXXXV. πλείονα] Marcellus, neſcio qua ratione, κάτω τῶν, πλείονα, πίνειν reponendum ſuſpicatur. Sed nos vulgatam lectionē retinendam cenſuimus, maximè cùm & lixiuium ſicus idē Dioſcorides *contra præcipitantes vtiliter propinari* anteà, lib. 1. cap. 187. diſertè ſcripſerit.

CAP. CXXXVI. κίονα γωνίον ὄντα] Plin. lib. 32. cap. 8. quatuor tantùm Alcyonij genera recenſet, ac illud ſilentio præterit, quod fungo ſimile hoc loco deſcribitur. Sed & idem ipſe reliquorum generum notas inter ſe planè confundere videtur. Rurſum & quartum, quod optimum cenſet, ſpongiæ putri ſimile, penè purpureum, vocari Mileſiū ſcribit, cōtrà quàm Dioſc. qui tertio Mileſij appellationem tribuit. At Galenus in recenſendis Alcyonij generibus à Dioſcoride minimè diſcrepat: addit tantummodò ſecundum genus figura eſſe oblongius eo quod primo loco recenſetur, quod ipſum ex Serapionis verbis etiam colligitur. Sic & tertium compage molli eſſe admonet.

τὸ δ' ἑξῆς] Orib. ſic habet: τὸ δ' ὑπὸ τοῦτον & ὕστατον. Ita & Serapio de quarto & quinto Alcyonij viribus ſimul agit, ac vtrique vires eaſdem tribuit. Galenus, lib. ſimpl. quarto eaſdem quas tertio vires aſcribit, ſed longè imbecilliores: quintum verò omnium calidiſſimum cenſet, vt etiam altè cutem erodat & exulceret.

CAP. CXXXVII. σκευαζομένη ἀδάμας] Gal. lib. ſimpl. quouis genere hanc vocem efferri monet, maſculino quidē genere ἀδαμᾶς, ſeu ἄδαμος, fœminino ἀδάμη, neutro ἄδαμον. Sed & varia nomina eidē tribuit locis alijs. Nā & λιμνίον, & λιμνάδα, ſeu etiā, vt Actius, λιμνίτιδα nominat, ſcilicet ἀπὸ τῶν λιμνῶν, hoc eſt, *à paludibus* in quibus naſcitur. Inſuper & ἀφρολιμάδα dici poſſe ſcribit idem Galenus, lib. περὶ κρ. κ. cap. 1. quòd arundinibus adnaſcatur. Plinius itidem καλαμίχνην nominat, quaſi arundinum lanuginem, (quidā ἀπὸ τῆς ἀχνης. i. *ſpuma* καλαμίχνην maluit:) ſed fallitur, dum Adarcam Latinam eſſe vocem exiſtimat, lib. 32. cap. 10. his verbis: *inter aquatilia dici debet & καλαμίχνη, Latinè Adarca appellata.*

ὃς καὶ Ἀδάρκην] Sic & Galenus Adarcen ſcribit eſſe, ὅτου ἀφρὸν συνηγμένον ὕδατος ἁλμυροῦ, hoc eſt, *veluti ſpumam concretam aquæ ſalſuginoſæ*. Plinius verò, modo citato loco, *naſa* tradit *aut arundines tenues è ſpuma aquæ dulcis ac marinæ, ubi ſe miſcent*: & lib. 20. cap. 22. *in cortice calamorum ſub ipſa cana naſa*, quod & antè ſcripſerat, lib. 16. cap. 36 dum de arundinibus ageret hiſce verbis: *Eſt & in Italia*, inquit, *naſcens Adarca nomine paluſtre in cortice calamorum ſuo ipſa cana*, &c. Sic enim ex illo loco priùs citato hunc reſtituendum cenſeo.

καὶ δεῖ δὲ ἀφρῶδες] Vim etiam cauſticam illi tribuit Plinius, lib. 32. cap. 10. Galenus etiam, lib. ſimpl. ſcribit propter acrimoniam & inſignem caliditatem nunquam intrò ſumi, ſed interdum aliis admixtum foris adhiberi.

CAP. CXXXVIII. ἡ δὲ σπόγγων πᾶσα μία] Ariſtoteles, lib. 5. hiſt. animal. cap. 16. triū generū Spongias recenſet, ſpiſſas videlicet, raras & quas Achilleas nominant. Hunc ſecutus Plinius, lib. 9. cap. 45. tria quoque facit Spongiarum genera, *ſpiſſum* inquàm, in quo genere prædurę & aſperæ τραγεῖς vocentur, *mollius* autem & tenue, *denſumque*, ex quo penicilli, Achillæum. Verùm idem, lib. 31. cap. 11. eodem etiam modo Spongiarum genera diſtinguit, quo & noſter Dioſcorides, nempe in marem & fœminam.

τὸ μὲν δὴ καὶ ἄλυπος] Lego, τὸ μὲν τραχὺ δὴ καὶ ἀλυπές, vt ἀλυπὲς per ι legatur, nō ité cum Lacuna per ο, & τραχὺ opponatur τῷ μαλακῷ, quod paulò poſt ſequitur. Sic & inferiùs vbi legitur, τὸν καὶ τοῦτον, legi malim, τὸν τε καὶ τραχύν, quanquā & τοῦτο Spongias dicere poſſis, quæ à cochleis exiguis & id genus animalculis mundatæ ſunt.

ὁ δὲ μαλακὸς ἄχνης] Plinius contrà, lib. 31. cap. 11. de Spongijs verba faciens: *Recentes*, inquit, *diſcutiuntur, mollitur, mutuum. Veteres conglutinatur naturæ*, niſi fortè cum Cornario pro, *conglutinatur*, legendum, *non glutinatur*.

CAP. CXXXIX. καὶ βυσσώδεσιν] Cornarius & Marcellus legiſſe videntur, ἕλκεσι χρώμενον, καὶ βυσσώδεσιν ὕπνοις συνεχόμενοι, ὑγιεῖς ἐποίει ἄνδρας. Sed τῶν αἰσθητικῶν ἡμῶν ἀφῶν: quaſi voluerit Dioſcorides, quemadmodum ferrum candens aqua temperatum merſúmve ſolidatur, ita & Corallium mari exemptum cumprimùm ab offuſo aëre tactum eſt, durari & concreſcere. Ego verò cùm eiuſmodi lectio nullius, quod ſciā, veteris exemplaris fide confirmetur, tum probabili ductus coniectura, tum & veruſtum Dioſcoridis Interpretem imitatus, pro, βυσσώδεσιν, legere malui, ἀγρυπνώδεσιν ſeu ὑπνώδεσιν. Sic enim ſenſus is rectè conſtat, quem nos in Latina verſione expreſſimus. Atque illud ipſum eſt, quod Ouidius, 5. Metamorph hiſce verſibus declarauit:

Nunc quoque Coralijs eadem natura remanſit,
Durities tactu mutatur ut aëre, quodque

Venus in aquore erat, fiat super aquora saxum:
Rursumque, lib. XV.

Sic & Coralium quo primum contigit auras
Tempore durescat, mollis fuit herba sub unda.

Solinus etiam, in Polyhistore, fruticem hūc scitè admodum scribit, *quantūsper fuerit in aquarum profundo, fluxum esse & tactu propè carundeum: deindè ubi in supera tollitur, natalibus derogatu lapidem fieri.* Inde quoque Coralium, quod τὸ ἐξάλιον nominat Theophrastus, quibusdam λιθόδενδρον dictū est, & alio nomine, vti Metrodoro, ita & Plinio, Gorgonias appellatur, propterea quòd Gorgonas in lapides versas fingant Poëtæ.

ἱματίοις αἱματοῦς] Placet Cornarij coniectura, qui, σαρδοειδέσι, pro, αἱματοῦς, reposuit, maximè cū & Serapio ita legisse videatur. Rubentem siquidem, seu è puniceo rubescentem colorem exprimere voluit Dioscorides, qualis nusquam in asphodeli flore conspicitur, quem αἱματοῦν vocat, quique è contrario candidus est.

τῇ χρόᾳ φαιόν] Cornarius legit, τῇ χρόᾳ ὠχρόν. Ego voces illas, τῇ χρόᾳ, ceu redundantes expungere contentus, φαιὸν ex Plinio *fuluum* conuerti. Sic enim ille de Corallio, lib. 32. cap. 2. *Probatissimum quidem maximè rubens, & quidem vanosissimum, nec fuluum aut lapideum, uel rursus inane aut concauum.*

κατεάγμασι καὶ ἕλκεσι] Aut, vti vult Cornarius, redundant hæ voces καὶ ἕλκεσι, huc, ni fallor, ex proximè præcedenti lineâ perperàm translatæ, aut, quod magis placet, addendū, λύθρωσιν. Nam & Plinius, loco citato, de Corallio agens: *Vlcerum cana explet: cicatrices extenuat.*

Cap. CXLI. φοίβοις χρ.] Fallitur Plinius, dum Phrygium lapidem fingendis ueshibus tenuium utilem esse scribit, lib. 36. cap. 19. Nā & ad vsus medicos plurimùm valet, quos Græci Medici silentio minimè prætermerunt.

κρίνεται δὲ ὁ λίθος] Aliam vrendi lapidis Phrygij rationē repeto ex Gal. 4. lib. κατὰ τόπ. cap. 5. quo loco medicamentum aridum ad tuendam oculorum valetudinem describit.

Cap. CXLII. ἰσχαιόνων] Hunc Asiæ petræ florem farinę tenuissimę comparat Galenus, IX. simpl. qualis pistrinorum parietibus adhærescit, atque ex ipso sapore salso eum oriri conijcit ex rore marino, qui primùm lapidi insideat, ac, deinde à Sole sitiretur.

περὶ ἄσσον πόλιν] Hinc etiam lapis Assius, ab Asso Troadis vrbe circa quam nascitur sic dictus, quique idem est cum hoc nostro Asio, veluti tellatur Galenus, Aëtio, lib. 7. cap 39 Celso, lib. 4. ca. 24. & Plinio lib. 2. cap. 96. itémque, lib 36. cap. 17. Sarcophagus appellatur, idque ab effectu, quòd carnes exedat, & corpora defunctorum condita in eo absumi constet intrà quadragesimum diem, exceptis dentibus, siquidem scripto Plinij fides tribuenda est. Sed interdum Assium seu sarcophagum lapidem ab Asio perperàm videtur distinxisse Plinius, qui de vtroque seorsum egerit.

ἰχναίνουσι] Ista minimè ad σπυρὶς referri oportere patet ex ijs quæ sequuntur, idcóque pro, ἰχναίνουσι, legi malim, ἰχνοσπορίαν, &c. Itémque pro, κατασπασθῶσι, κατασπασθῇσι: atque ita rectè constabit sensus, quem nos expressimus, longè aliter atque Ruellius.

Cap. CXLIII. Πυρίτης λίθος] Pyritæ nomen tribuit Plinius lapidum generibus, è quibus percussis ignis exeuntur. Sed cuius hoc loco meminit Dioscorides is est, quem *Marchasitam* Arabes appellant, quémque idem ipse Plinius, lib. 36. cap. 19. duūm constituit generum, vnum argenteo colore, cuius etiam meminit Aëtius, & alterum aureo.

Cap. CXLIIII. τῶν ἀκροτηρίων] Lacuna ex vetusto codice restituit, ἀκροτηρίων, quam lectionem etiam secutus videtur Serapio. At Oribasius, Ruellius, Marcellus, Cornarius vulgatam lectionem illi plane contrariam retinēt, cui etiam suffragatur Plinius. Is enim de Hæmatite agens, lib. 36. cap. 20. *Vrunt*, inquit, *ut Phrygum, sed non restinguitur uino.*

ἐν τῇ χρόᾳ] Lego, ἐν δὲ τῇ χρόᾳ, vel, ἐνδὲ τῇ χρόᾳ. Vult enim Autor fraudem seu adulterium dupiici modo deprehēdi, & scissilibus venis, & colore ipso. Atque illud, σφῶν αὐτῶν, quod prius habetur, tale quid desiderari satis indicat.

ὁ ἡματίτης] Vtut sit, Gal. 9. simpl. Theophrastum secutus, Hęmatitē à sanguinis, scilicet concreti, coloris similitudine sic dictum scribit: alij quòd sanguinis fluxum sistat, vel quòd attritus aquarijs cotibus sanguinēū reddat succum.

Cap. CXLV. διάφορον δὲ τοῦ σχιστοῦ] Schistos & hæmatites cognationem habent, inquit Plinius, lib. 36. cap. 20. & ea quidem cognatio non solius est formæ, sed & virium, nisi quòd infirmiorem esse Schiston Medicis omnibus est in confesso. Veruntamen quanuis infirmior est Schistos, quem *fassilem lapidem* Celsus nominat, oculis nihilominùs affectis, potissimúmque inflammatis, teste Gal. IX. simpl. vt hæmatite mitior est, ita & accommodatior.

Cap. CXLVI. κοσμαλόεντα τῇ ὄψει] Sic Gal. IX. simpl. Gagatem scribit igni admotum perfimilem bitumini odorem exhibere. Nicandri etiam Interpres, dum accensus vtitur, ὀσμὴν καὶ ἰσχὺν ἀσφαλτώδη ἔχει. Plinius verò de eodem verba faciens, lib. 36. cap. 19. *Cùm uritur*, inquit, *odorem sulphureum reddit, nutrimque* (nam & hoc addit) *accenditur aqua, oleo restinguitur:* id quod de Thracio lapide, proximè sequenti capite, refert Dioscorides.

ἡμεῖς δὲ ἐν Κιλικίᾳ] Legendum haudubiè, ἐν Λυκίᾳ, vti etiam legerunt Marcellus & Cornarius. Nam præterquàm quòd iuxta Geographos Gagas seu Gagates seu Gangis & oppidum & fluuius est Lyciæ, ita etiam legi oportere ex Galeno, Plinio & Nicandri Interprete Diphilo satis superque constat. At Galenus quidem, IX. simpl. Dioscoridem ipsum citās, Gagatem scribit in Lycia reperiri ad fluuium nomine Gagatem, quem tamē fluuium se vidisse negat, quanuis Lyciæ totius littora parua nauicula legerit. Plinius autē loco nuper citato *Gagates*, inquit, *nomen habet loci & amnis Gagis Lyciæ.* Diphilus itidem Nicandri Scholiastes Gagatem ἐγχώριόν τινα λίθον à Nicādro in Theriacis vocatum scribit, à ciuitate Lyciæ, cui nomen Gagas aut Gangis. Fit & apud Strabonem lapidis Gangitis mētio, qui idem esse videtur. Cæterùm ex ijsdem locis colligo, in sequentibus pro distinctiua particula, δὲ, legendum, γὰρ, hunc in modum: ἔστι γὰρ ὁ λίθος καὶ πολὺς ἐν Γαγαῖ.

Cap. CXLVII. διάφορος δὲ τοῦ αἰσήτου καὶ γαγάτου]

Attamen ſcribit Gal. 9. ſimpl. cap. de gagate, Thracium lapidē nullius eſſe in Medicina vſus.

ἐμφέρεται δὲ ἀκάτῃ Θρᾴ] Idipſum tradit Nicander de Thracio lapide, quem *σκληρὸν λίθον* appellat, in carminibus à Galeno citatis eodem illo loco, nimirum ſi vratur aqua affuſa, totum flagrare, oleo verò reſtingui. Plinius, qui hoc etiam Gagatæ tribuit, vti antè monuimus, idem ipſum de Thracio lapide refert, hiſce verbis, lib. 33. cap. 5. *Calx aqua accenditur, & Thracius lapis, idemque oleo reſtinguitur.* Sed & Ariſtoteles, lib. de aud. mirab. aut quiſquis eſt eius libri Autor, In Scytharum Medorúmque regione Thracia dicta fluuium eſſe tradit nomine Pōtum, in quo lapides reperiantur, qui, contrà quàm carbones è ligno confecti, dum vruntur, ſiquidem follibus ſufflentur, citiſſimè extinguantur: ſin aqua irrigentur, flagrent diluciditus.

CAP. CXLVIII. *πέτρος ἀγχίτης*] Plures alios Magnetis lapidis etiam Medicos vſus recenſet Plin. lib. 36. cap. 16. Galenus quoque, 11. ſimpl. hæmatitæ vim illi tribuit. Porrò Magnes, Græcis *μαγνήτης* ſeu *μαγνῆς*, quibuſdam *μαγνάτης*, aliis *μάγνης*, appellatus eſt vel ab inuentore Magnete, quod à Nicandro traditum eſt, teſte etiam Plinio: vel à Magneſia terra, in qua primùm inuentus eſſe creditur: quam ſententiam ſequitur Lucretius, lib. 6. Sed & ab eiuſdem Magneſiæ Heraclea oppido *ἡρακλεώτης*, ſeu *ἡρακλεώτις*, alio nomine dictus eſt. *σιδηρῖτιν* verò appellant, ob eam quam habet ferri attrahendi efficaciam, contrà quàm Theamedes, qui quidem ferrum reſpuere & à ſeſe abigere creditur.

CAP. CXLIX. *ἔστιν ἐλέφαντος ὁμοίᾳ*] Lego cū Lacuna, *ἐλέφαντι ὁμοίᾳ*, hoc eſt, *ebori nonnihil maculoſo.* Sed hunc eundem Arabum lapidem, qui & Arabica gemma Plinio dicitur, tum Galenus, 11. ſimpl. tum etiam Plinius, lib. 36. cap. 21. ſimpliciter ebori ſimilem ſcribunt.

C. CLI. *γαλακτῖτιν αὐτὸν καλοῦσι*] Hinc etiam nomē obtinuit. Nam ſcribit Gal. 11. ſimpl. Galactitæ lapidi nomen inditum, quòd in ſuccum ſolutus lactis ſpeciem referat, vti melititę, quòd ſuccum remittat dulcem melliſimúmque. Cæterùm huius lapidis varios vſus, quos hic ſiluit Dioſc. ex Plinio repete, lib. 36. cap. 19.

CAP. CLII. *ἔστιν γαλαξίου*] Galaxiam, qui idem eſt cum Morochtho, quem Galenus & Aëtius *μοροχθὸν* appellāt, Plinius cum Galactite confudit, lib. 37. cap. 10. *λευκογαίου* verò herbam eſſe falsò opinatus eſt, lib. 27. cap. 11. cui vires eaſdem tribuit, quas huic lapidi noſter Dioſcorides. Porrò hunc *λευκογαῖον* ideircò dictum refert Aëtius, quòd cùm ſub viridis appareat, ſi ad cotem affricetur, aut ad aſperius pallium, locū inalbat. Idipſum voluit Plinius, cùm ſcribit, lib. 37. cap. 10. *Melichri porracea lacte ſudat*: quo loco fortaſſe, *Morochthus*, rectius legas.

καὶ λίτρου ὁμοίως] Addo, vt iſta ſibi rectiùs cohæreant, *καὶ μετὰ νίτρου ἀναγράπτεον*.

CAP. CLIII. *λίθος ἀλαβαστρίτης*] De hoc lapide ſic Plinius, nominis etymon ſatis ſupérque explicans. lib. 36. cap. 8. *Onychem lapidem*, inquit, *aliqui Alabaſtritem vocant, quem vnguenta ad naſa vngentaria, quoniam optime ea incorrupta ſeruare dicitur.* Itémque, lib. 13. cap. 2. *vnguenta optima ſeruantur in alabaſtris.*

CAP. CLV. *ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ*] Idem lapis tum Galeno tum & Aëtio, quoniam in Paleſtina Syriæ naſcatur, Syriacus dicitur: eiuſque & maſculi & fœminæ mentio fit apud Gal. lib. 10. *κατὰ τόπους*.

χρυσῖτις βαλανωτὶς] Iudaicum lapidem, quem glādis effigie deſcribit Dioſc. ſub Tecolithi nomine, *oliuæ nucleo ſimilē* facit Plinius, lib. 37. c. 10.

ὃν οἱ νῦν λίθον] Hinc *πυελίτης* dictus Paulo & Aëtio, vti etiam Plinio. Attamen Gal. 11. ſimpl. experientia teſte, negat ad veſicæ calculos quiēquam profecille, eſſe verò ad eos qui renes obſident non parum efficacem. Aëtius itidem in veſicæ calculis nihil eximij præſtare teſtatur, quàm tumuis ad veſicæ calculos ipſum tantoperè Nechepſus extuliſſet. Plinius ſimpliciter citato loco, *tibentum* (ſic enim legendum pro, *Ingentium*) *calculos frangere pellereque* ſcripſit.

CAP. CLVI. *ἑφαπλοῦς πίναξ*] Eiuſmodi, ſi non planè idem, fuit linum carpaſium, quod negat Pauſanias, lib. 1. *τῶν περὶ Ἀττικήν*, itémque illud vium, *ἀσβέστινον* ex argumento naturæ Græcis vocatum, e quo mappas ſolitas confici teſtatur Plinius, lib. 19 cap. 1. quæ quidem ſordibus exuſtis ſplēdeſcerent igni magis, quàm poſſent aquis. Plutarchus, in lib. de defect. oracul. queritur ſuo tempore huius lapidis, quem Caryſtium vocat, venam deſiſſe glomos lapideos proferre, è quibus lina nebantur, cùm tamē ex eo mantilia, plagulæ retiáque olim contexerentur, quæ vſu ſordidata dum in flammam conjiciebantur, inde nitida ſplendidáque efferebantur, nedum comburerentur aut quicquam igni deperderēt. Apollonius itidē ex autoritate Taci in mirab. hiſt. ē lapide Caryſtio mappas factitatas ſcribit, quæ igni immiſſæ, haud ſecus ac aliæ aqua lotæ, à ſordibus mundabantur. Addit verò, eundem illum lapidem augeſcere circa pleniluniū, turſúmque luna decreſcente minui.

CAP. CLVIII. *καθαρτικὸς λίθος*] Memphitem inter marmoris genera numerat Plin. lib. 36. cap. 7. quo loco *Vocatur & Memphites*, inquit, *& ex, gemmantis naturæ. Huius vſus, vnguenti, & ijs quæ lurenda ſint aut ſecanda ex aceto illino. Obſtupefacit ita corpus, nec ſentit cruciatum:* quibus verbis, ex aceto illinendum monet.

CAP. CLIX. *διὰ τί διαφανὴς*] Dum rationem reddere nititur Dioſcorides, cur lapis iſte, vtronis modo nomines, à Luna denominationem ſit fortitus, non ſatis perſpicuus ac vtilis fortaſſe videtur. Iccirco Geſnerus, in lib de lapid. ita potiùs legendum putat. *διὰ τί διαφανὴς αὐτὸν νομίζουσι τὸν τῆς σελήνης μιμεῖσθαι καταυγάσμα*, hoc eſt, *quòd immutetur noctu, dum plenæ Lunæ magnem reddit:* aut etiā *διὰ τί φύσει διαφανὴς αὐτὸν νομίζουσι πλήρεσι τῆς σελήνης μησὶ καταυγάσαι*, *quòd noctu effulgente Luna ſplendens reperiatur.* Attamen varijs de cauſis neutra lectio mihi ſatisfacit. Iſidorus Selenitem lapidē ex eo dictum putat, quod interiorem eius candorem cum Luna creſcere atque deficere aiunt. De eodē ſic Plin. lib. 37. cap 10. *Selenites ex candido tranſluet, melleo fulgore, imaginem Lunæ continens, redditque eam in dies ſingulos creſcentis minuentiſque numero: naſcique putatur in Arabia*, &c. *Ἀφροσέληνον* vocat Galenus, 9. ſimpl. quaſi in quem Luna deſpumet. Idem porro eſſe videtur qui eidem Gal. lib. 9. de anat. admin. *διαφανὴς λίθος* ex eo dictus eſt, quòd perſpicuus eſſet, ac vitri modo

modo transluceret. Ibi enim corpus, quod dextrorsum cerebri ventriculum à tenuitro distinguat, scribit, εἶναι λίθον, ὃς διὰ τοῦτο ἐν τοῖς ἀμφιβλήστροις τιθέμενος τοῦ ἀνθρώπου, διαφαίνειν ἐκ τοῦ ἐναντίου τὰς ἰχθύας, ἐφ' ὧν ἐστὶν ἀναβάντα, ἢ ἐπὶ τοῦ πλοίου ἑστῶτα, ἢ ἐπὶ τῆς ἀκτῆς, id est, adeò esse tenue, ut per clara luce diffetho admittatur, splendorem transmittat lapidis transluidorum modo, qui in tenues lamellas fecti fenestris accommodantur. Et certe quidem id genus lapidibus in tenues seu exiles crustas fissilibus Antiqui in fenestris pro specularibus vitri loco vtebantur, quibus aerem quidem excluderent, lumen verò transmitterent. Atque hoc ex argumento lapis specularis Plinio dicitur: Paulo, corrupta voce, σπεκλαρ ἐστιν seu σπεκλαρ ἐστι: Aetio simpliciter διαφανὲς appellatur. Sunt & qui eúdem esse cum Phengite existimauerint: quanuis vtrumque distinxit Plinius, lib. 36. cap. 23.

Cap. CLX. λίθοις φλεγματικοῖς] Plinius, lib. 37. c. 8. ex Iaspidum generibus omnes in vitio esse scribit cæruleas, aut crystallo similes, aut myxis. Quo quidem loco similes myxis dixisse videtur, quas Dioscor. εἰκότως φλέγματα. Siquidem μύξα Græcis significat crassiorem pituitam mucúmve, qualis narib. à capite fluit, aut in cochleis ac testudinibus visitur.

Cap. CLXI. κατέχει τὰ ὑστερικὰ] Plinius, lib. 36. cap. 21. postea quam Actitem distinxit in marem & fœminam, eiúsque quatuor genera recensuit. Africum, Arabicum, Cyprium & Taphiusium: Actitæ, inquit, omnes grauidis adalligata muliebribus, vel quadrupedibus in pelliculis foetificatorum animalium contentæ partus, non nisi cùm parturiunt remedio sunt: alioqui nullius vtilitatis. Sed vnà parturientibus auferantur, omnino non pariunt. Attamen, lib. 20. ca. 3. non nisi aquilæ nido ereptis lapidibus hisce vim medicam tribuerat: quod ipsum rursus, lib. 30. cap. 14. confirmare videtur, dum scribit in hunc modum: Lapis Actites in aquilæ reperius nido, custodit partus contra omnes abortuum insidias.

μεγάλως βοηθοῦντα] Actius, qui alioqui caput hoc ad verbum trãscribit, pro, βοηθοῦντας, habet, καὶ πρὸς τοὺς ἐκ φαρμάκων.

Cap. CLXII. ὁ δὲ καλούμενος] Plin. lib. 36. c. 7. Ophitæi marmor] serpentium maculæ simile, unde & nomen accepit. Deindeque paulò pòst: Duo eius genera, molle, candidum, nigricans durum. Dicuntur ambo capitis dolores sedare adalligata, & serpentium ictus. Quidam phrenitas aclethargas adalligari iubent candidorem. Contra serpentes autem a quibusdam laudantur præcipuè ex his quem Tephrian appellant, & colore cinerii. Hæc iccircò ex Plinio trãscripsi, vt illum etiam, æquè ac Dioscor. Ophitæ tria genera agnouisse quisquis intelligat. Quanuis enim duo tãtùm priore loco constituerat Ophitæ genera, nihilominus tandem & tertium subiecit. Siquidem τεφρίαν appellat à colore cineris, quem Autor ἀποδιδῷ τῷ χρόα hoc loco describit.

Cap. CLXIII. καὶ ὁ ἐν κύπρῳ λίθος] Sic Plin. lib. 36. c. 19. Spongæ lapides molliores (aut, vti legit Cornarius, cystolithos) iucundæ, quoniam ueficæ medentur: calculos rumpunt in uno pot. At Gal. id tantummodò de tenuum calculis fatetur, ac mendacij etiam insimulat eos qui spõgiarum lapidibus vesicæ calculos comminuendi vim tribuerunt: & tamen idem ipse hanc eandem vim paulò pòst ophitæ lapidi ascribere non veretur.

Cap. CLXVI. ἐκ τῆς ἄλλης τῆς καυστικῆς] Goupyli codex alter habet: ἐκ τῆς, minus rectè, ἐκ τῆς, ἀσβόλου. Sed, ξυστικῆς, potius legendum suspicor. Aetius certè quidem, 1. tetr. ser. 2. de Smyride sic habet: ἀλλ' ἐκ σμύρεως (scribitur enim eo loci per ι. vti & apud Galenum) ἔχει τι δριμὺ, καὶ ἐξ ὧν μιγνύουσι καυστικοῖς ἐμπλαστροῖς δύναμιν. hoc est, At Smyris quippiam habet acre, propterque ustiuas & exiccandi in præditis remediis admisetur.

Cap. CLXVII. ξηραίνει δὲ ἰδιαζόντως] Hoc curationis genus, quod per arenam perficitur, Paulus ἐξ ἀμμιασμοῦ nominat, lib. 3. cap. 48. in curatione Hydropis. At Orib. collect. lib. 10. ca. 8. ἀμμοχυσία vocat, nec tantùm hydropi, sed & plerisque aliis morbis ex nimia humiditate profectis accommodat.

Cap. CLXVIII. ἀλοιτικὰς ποιεῖ] Naxia quidem alis retrimentum, inquit Paulus, refrigeratorij esse creditur, adeóque virginum mammas & puerorum testes obiicere. Oleariæ uero alis (ἀλοιτρίβιον nominat) retrimentum, aut detersorium, alopecas conferre. His verbis quod in genere protulit Dioscorides distinguit Paulus, vt alias aquarias, alias olearias cotis vires esse doceat.

Cap. CLXIX. λίθος γενέθλιος] Plinius, lib. 36. cap. 19. Gagatis lapidis peculiariter meminit ex argumẽto sic appellati, quòd uentã intra se amplectatur. At deinceps cap. 21. ipsum inter actitæ genera complecti videtur, qui tamen ex argumento nominis distingui debuit.

Cap. CLXXII. καλοῦσι καλλαΐαν] Quã Dioscorides καλλαΐαν nominari scribit, Plinius Syropicum appellat. Sic enim, lib. 35. cap. 16. Samiæ, inquit, duæ sunt, Syropicum & quæ Astier appellatur.

Cap. CLXXIII. ἀμβλυωπίαν πῖς αἰσθητηρίοις] Tertius hic casus, πῖς αἰσθητηρίοις, ἀμαυρωτικὸν, potiùs quàm, ἀμβλυωπίαν, legendum esse satis superque indicat: id quod rectè animaduertit doctiss. Cornarius. Alioqui enim legeretur, ἀμβλυωπίαν πῖς αἰσθητηρίοις, vti habetur, lib. 7. cap. 1. ἀμβλυωπίαν πῖς ὀφθαλμοῖς, & apud Athenæum, lib. 2. ἀμβλυωπίαν πῖς ὄμμασι. Huc adde quod Plinius de Samio lapide agens, lib. 36. cap. 21. vertigines, inquit, sedat, mentesque commotas restituit. &c. Quod si ita est, simul & semel organa sensuum hebetare vix credibile fuerit.

Cap. CLXXVI. γίνεται δὲ καὶ] Cimolia terra seu creta, à Cimolo vna è Cycladũ insulis sic denominata, duplex cùm sit, alba inquàm & ad purpurissum inclinãs, albam esse existimauerim, quam Hipp. ob vim abstergendi qua pollet, σμηκτρίδα γῆν appellat: siquidem & Erotianus & Galenus in Gloss. Hipp. σμηκτρίδα seu σμηκτρίδα γῆν, τὴν Κιμωλίαν exponunt. Theophrastus eandem fortè σμηκτρίδα γῆν nominat, quippe qua fullones in detergendis, eluendis atque poliendis vestibus, cen smegmate, vterentur. Plin. lib. 35. cap. 17. Inter Cretæ genera Cimoliam recenset, cuius duo facit genera ad Medicos pertinentia, candidũ, inquàm, & ad purpurissum inclinans. Laudat verò plurimùm Thessalicã & Lyciam. Reliquarũ vsum tantùm in vestibus esse scribit, nempe Vmbricæ, eius quam saxum vocant, & Sardæ: & hanc quidem omniũ Cimoliarum vilissimam, illas pretiosiores esse asserit.

Cap. CLXXVII. ἔστι τῆς Ἐρετρ.] Eretriadem quæ cinerea est Dioscor. intelligit. Gal. cùm

que ſecutus Paulus terram Pnigitem, à Pnigeo vico Libyæ Marcotidis ſic dictam, ſtram eſſe aſſerunt.

CAP. CLXXX. ἐμπρὶς Μελιάδι] Meliam terram, à Melo inſula ſic dictam, Autor cineream Eretriadæ colore imitari ſcribit. Plin. contrà, libri 35. cap. 6. *Melinum* (ſic enim Meliam terram is appellat) *candidum eſſe volunt, atramento eandem in Medicina uſum habere, quem Eretria creta.* Autor verò, vim aluminoſam eidem tribuit.

καὶ ζώνης Λιπαρᾶς] καὶ illud, ceu perperàm trãſpoſitum, ita ſuo loco reſtituendum: ἀσπάνης Λιπαρᾶς καὶ κυπρίας ἀσπάνης χάριν, &c. Eſt enim in terræ cuiuſuis apud Medicos receptæ electione illud communiter obſeruãdũ, vt recens ſit, mollis, friabilis, liquoris cõtactu diui facilis ac minimè lapidoſa.

CAP. CLXXXI. οὐδὲ βραδίως πυκάζει] Poſtquam Plinius, lib. 35. ca. 16. *Ampeliten experimentum* eſſe monuit, *ſi ceræ modo acerpto oleo liqueſcat*, alterum illicò ſubdit, nempe *ſi nigrum oculos muneat tollat.*

καὶ δὴ καὶ ἀμπελίτου χρίσις] Hinc etiam, teſtibus Galeno & Aëtio, nomen obtinuit. Siquidem hæc terra non iccircò Ampelitis dicta eſt, quòd ſerendis vitib. apta ſit, ſed quia *auxilium*, hoc eſt, *vermiculos gemmarum teneris oculis infeſtos* eneceat, nempe ſi ipſorum oculorum radici, vti voluit Gal. aut potiùs, quemadmodum Aëtius, ipſarum vitium radicibus illinatur. Sed & pharmacitis alio nomine dicta eſt ex eorundem ſententia, quòd terris aliis efficaciorem vim medicamentorum obtineat. Galenus eam & multum à terris aliis differre & propè ad lapidis eſſentiam ſcribit accedere. Cæterum ex eo quòd Ampelitidem & Plinius loco citato facit bituminis ſimillimam, Poſidonius bituminoſam appellat: nõnulli carbonem eſſe foſſilem exiſtimauêre, id quod variis de cauſis mihi vix perſuaſerim.

CAP. CLXXXII. σπόδιον, ἀφρώδης] Iuxta vetuſtorum codicum & ipſius Pauli lectionem σπόδιον, ἀνθρακῶδες, quæ vox habebatur in vulgatis exemplaribus, reſtituimus ἀφρώδης, maxime cum apud Autores reliquos, qui Fuliginis huiuſmodi meminêre, nulla fieret aſtrictionis mentio, ſed tantummodo facultatis ſeptica, virentis ac diſcuſſoriæ.

καὶ κατάγμασι] Apud AEgineram, lib. 7. capite de Fuligine, quam καπνίαν etiam nominat, legitur, καὶ καύμασι, quo loco Oroſcius, ſi καταγμοῖς, reponẽdum arbitratur. Sic verò Paulus à Dioſc. verbis alioqui nihil euarians ἀνωδύνως δὲ καὶ ἀκαύμασι καὶ ἀφλεγμάντοις ἰᾶται.

CAP. CLXXXIII. ἐκ τῆς τοῦ κέδρου κ.] καὶ ἀλόης, legitur in Pariſ. cod. Sed verißimilior omnino eſt vetuſti codicis lectio, ἐκ τοῦ κέδρου κ. quam etiam retinuit exemplar Aldinum. Alioqui non foret iuſta fuliginis, quæ totius medicamẽti baſis eſt, ad ipſum gummi proportio.

IN LIBRVM ΑΛΕΞΙΦΑΡΜΑΚΩΝ.

περὶ θανασίμων φαρμ.] Si Cornarij, Guillandini & plerorumque doctorum virorum teſtimonijs fides habetur, Dioſcorides horum de venenis tã aſſumptis, quàm ictu morſúve inflictis tractatuũ Autor, non is eſt Anazarbæus qui priores libros quinque de re medica cõcinnauit, ſed alius eiuſdem nominis, ſiue is fuerit qui Galeni patrum ætate vixit, ſicut teſtatur ipſe Galenus, in Gloſſis Hipp. ſiue quis alius, qui quidem ſuis therapeuticis libris hos fortaſſe tractatus ſubiunxerit. Iccircò & nos à præcedentibus quinque de materia medica voluminibus duos hoſce poſteriores, ceu diuerſi argumenti, libros ſeiungimus, adeóque cum Cornario ceu ſuppoſititia expungenda cenſemus, quæ ad nexum horum librorum cum præcedentibus in ipſo ſtatim procemio à nonnullis perperàm adiecta videntur. Sed &, niſi firmus fuiſſet exemplarium omnium quotquot occurrêre conſenſus, libenter, ipſius Cornarij exemplo, poſteriorem theriacum tractatum huic Alexipharmaco præpoſuiſſemus, tum quoniam præfatio proximè ſequentis libri ita fieri oportuiſſe palàm teſtatur, tum quia & Nicãder, Paulus & Aëtius eundẽ ſunt ſecuti ordinem, vt theriacis alexipharmaca poſtpoſuerint. Porrò cùm manca eſſet huiuſce libri inſcriptio, quaſi de venenorum aſſumptorum præcautione, non item de eorundem curatione in eo ageretur, iis verbis, καὶ τῆς ἀπὸ τοιούτων, nos, καὶ θεραπείας, meritò adiunximus.

τῶν καθαρτικῶν] Ruellius & Marcellus, καθαρτικῶν, ſeu potiùs, καθαρτῶν, legiſſe exiſtimantur. Lacuna legit in vetuſto codice, καθαρτικοῖς φαρμάκοις. quæ quidem lectio mihi ſatis arridet: quoniam velle videtur Autor, venefico, dũ ſuam fraudem celare ſtudent, venenis ſuis factitiis commemorata illa ſimplicia, ceu cognatam quodammodo venenis qualitatem ſortita, permiſcere: eóque conſilio dolum hunc adhibere, vt ſi qua in venenis inſignis qualitas deprehenditur, ea ſimplicibus illis potiùs quàm venenis ipſis imputetur. At Cornarius vulgatam lectionem retinet, & καθαρτικὰ φάρμακα interpretatur, *ignauos, mualida, quæque malidam uim nullam obtinent*: ſed huius generis haudquaquam eſſe recenſita medicamenta nemo non videt.

καὶ καθαρμάτων] Siue, καθαρτῶν, legas, ſiue cum Cornario, καθαρμάτων, parum intereſt. καθαρτὸν, certè quidem, hoc eſt, *candidum*, legitur apud Paulum, qui totidem verbis illhæc omnia videtur tranſcripſiſſe, lib. 5. cap. 27.

ἀνταλλάσσει χάριτος] Sic legit Manardus, ſenſu penè nullo. Cornarius, ἀνταγωνίζει, reſtituit. Ego cũ Paulo, qui cap. modò citato locum hunc illuſtrat, ἀνταλλάττει, legi malim: quanuis eo ipſo loco Andernacus, καταλλάττει, legendũ exiſtimauerit. Siquidem aliud nil voluêre tum Dioſcorides, tum & ipſe Paulus, quàm, ſi quis aquæ quod ſatis eſt præſumpſerit, expleta inde nimia appetentia facilè deprehenſurum ſingulorum quæ deinceps in cibo potionéve aſſumpturus eſt qualitates intenſas, adeóque ipſas vitaturum.

ἑτέρα δὲ τῶν] Lego, ἑτέρα δὲ τις τῶν ἀντιπαθῶν. δὲ γὰρ ὑγρὸν, &c. Sic Paulus: ἑτέρα δέ τις τῶν ἀντιπαθῶν ἀντιπαθέστερα δὲ γὰρ &c.

ἀπὸ κυάμου φύλλα] fortaſſis etiam addi debuit rutæ foliorum & iuglandium numerus, quandoquidem caricarum numerus aſcribitur, adeóque

sic legendum, ἢ πηγάνου φύλλα ἢ καὶ κράμβον ἄγριον ἐσθίειν ἀναπηδῶντας, ἢ ἄλλο τι τοιοῦτον, &c. In sanctuariis (inquit Plin. lib. 23. cap. 8.) Mithridates maximi Regis deuicti Cn. Pompeius inuenit in peculiari commentario ipsius manu compositionem antidoti e duabus nucibus ficis, totidem rutæ foliis uiginti simul tritis, addito salis grano, & qui hoc ieiunus sumat, nullum uenenum nocturum illo die, &c. Hanc eandem Galen. Apollonio Muri acceptam refert, lib. 2. de antid. cap. 43. ac eius rursùm mentionem facit, lib. 2. de alim. fac. cap. 28. & lib. de cibis boni & mali succi, cap. 14. Aëtius ipsissimam compositionem ex Stratone describit, Tetr. iiij. serm. 1. cap. 46. Sed eam præclarè uersibus his expressit. Q. Serenus Samonicus, cap. de uenenis prohibendis:

Antidotus uerò multis Mithridatia fertur
Consociata modis: sed Magnus scrinia Regis
Cum raperet uictor, illem deprendit in illis
Syntheſin, & nigris satis medicamina uisit:
Bis denas rutæ frondes, sale & breue granum,
Iuglandesque duas, totidem cum corpore ficus:
Hæc orientæ die parco conſperſa Lyæo
Sumebat, metuens dederat quæ pocula matri.

τὸ κύμινον τοῦτο] Addit Paulus, τὸ ἡμίεφθον Αἰγυπτίων κυάμων μάζης, hoc est, antidota quę deinde commemorãtur tutò admodũ præseruare, si cum uino quotidie fabæ Aegyptiæ instar assumantur.

ἐν τοῖς ἀναβάθροις] Dum subdialia loca designat Autor, ne sub arboribus quidem fercula coqui struive uoluit: quoniam interdum ex pinu piceáue, aliisque id genus arboribus, haud secus ac è contabulationibus, infecta mortifera delabuntur, uti admonet Paulus, cap. de uenenis.

τὸν οἶνον ἀγγείοις] Non uinaria tantùm uasa, sed & ea è quibus aqua hauritur, aut quibus opsonia incoquũtur, iccircò diligenter operculari oportere probè monet Paulus. loco modò citato.

ἀναπηδῶντας τινας] Cum Lacuna & Marcello legendum esse, τῷ λαμβάνοντι φάρμακον, patet ex iis quæ sequuntur. Cur enim ista impediant, quominùs corpora uicerentur, ratio statim subiicitur. Attamen apud Paulum legitur, τῷ καιρίᾳ τὸ φάρμακον ἀναπηδῶντας, hoc est, *malignitatẽ uenenorum obsistentes*: quam quidem lectionem Cornarius prætulit.

θρυαλλίδων καὶ σκευῶν] Post, καὶ σκευῶν seu καὶ σκευασμάτων, addit Paulus, καὶ μάλιστα τῶν ὑλικῶν: id quod etiã interferendum censui, quò arctior esset nexus cum iis quæ sequuntur.

μανδραγόρου] Apud Paulum pro, μανδραγόρου, perperàm, κώνειον, hoc est, *cicuta* legitur. Cicuta siquidẽ graui quidem est prædita odore, at amarore, quod sciam, nullo. Papaueris uerò succum insignem habere amaritudinem ac simul etiam odoré qui latè diffunditur, & Dioscorides & Paulus ipse alibi apertè testati sunt.

εἰ δὲ μὴ τοῦτο ἦν] Ista sic restituo: εἰ δὲ μὴ τοῦτο μόνον ἐστὶ τὸ ἐναντιοῦσθαι, &c. Alioqui uix ullus sensus constaret. Paulus sic habet. ἐστι δὲ τοῦτον ὅπως τὸ τοιοῦτον αἰτιάζεσθαι ἵνα φάρμακα, hoc est, *ita ut hinc uia sit facilis ad singula uenena accommodata remedia*: qui quidem sensus à præcedenti non multùm euariat.

γλαύκιον] Isthæc, ἢ γλαύκιον, cum Cornario redundare, adeóque omittenda, aut aliud quidpiã substituendum iudico: glaucium enim hic nullo modo esse utile, illius uires omnibus notæ satis indicant.

τὸ φαρμάκων δυνάμενος] Hoc loco placet sequẽtem periodum addere ex Paulo, qui cætera quoque hinc uidetur transcripsisse: μετὰ δὲ ταῦτα γάλα θήλεος αἰγὸς ἢ ἀνάγαλλιν ἢ φαρμακώδεις τινὰς ποιοῦσι διαδόσεις ἀποσκευασμοῦ. id est, *Post hæc lac potui datur: huius enim ope quicquid noxium uenenatumque est, facilè alteratur seu immutatur*. Sed & Dioscor. lib. 2. c. 77. lac recens tradidit efficax esse contra tolliones & inflammationes à medicamentis exitialibus factas, uti à cantharide, pityocampa, sălamãdra, bupreste, attupigmento, dorycnio aut ephemero, &c.

σεσκίου χυλὸς] σεσκίου, legitur apud Paulum & Aëtiũ. Sed siue, σεσκίου, hoc est, *porri*, siue σεσκαίου, hoc est, *marrubij* succum legas, parum refert. Siquidem Dioscor. libro 3. cap. de marrubio, iis marrubium dari testatur, qui uenena hauserint, aut à serpentibus demorsi fuerint. Idem ipse, lib. 2. cap. de porro, succum porri ex melle potum aut illitum tradiderat contra uirulentarum bestiarũ morsus auxilio esse.

τὸ σίλφιον] Addé ex sequentibus, quod errore librariorum transpositũ uidetur, καὶ ὁ βίζα, λῶν καὶ μαγύδαριν ἀκάλουσι. Silphij nanque seu laserpitij radix ita nonnullis appellatur: quanquã non ignoro & aliam esse radicem Libycam itidẽ magydarin dictam, laserpitij radici penè similem & eiusdem cum illa facultatis, uti præter Dioscoridem, lib. 3. cap. 94. Theophrastus & Plinius retulerunt.

καὶ ἄνηθος] Goupylus annotat in altero codice deesse, καὶ ἄνηθος: & hanc etiam scripturam Hermolaus, Marcellus & Cornarius minimè agnouerunt. Sed neque apud Paulum tale quicquam habetur. Fortasse uerò αἰπὶ τῷ, σίλφιον, ex Aëtio, Tetr. 4. ser. 1. cap. 48. σκόρδιον, legere non absre fuerit. Nam & Scordium maximè, si quid aliud, uenenorũ omni generi obsistere uariis tum ueterum testimoniis, tum etiam recentiorum experimentis constat.

ἀγαρικὸν τὸ φύλλον] Inter radices agaricum numerat Autor, quippe qui cum aliis non pauci Agaricum radicem esse falsò crediderit: at uerius fungis annumerandum esse antea, in cap. 1. lib. 3. iam abunde monuimus.

τῶν δὲ καὶ λαχανίων] Marcellus addit, δένδρων, atque ita legendum censet, δένδρων δὲ, τῶν γε λαχανίων: taxus enim, cuius statim fit mentio, uerè arbor est, non item herba aut olus. Apud Paulũ habetur, τρυφῶν δὲ καὶ λαχάνων. Ego uerò apud utrunque Authorem legendum potiùs coniicio, τρυφῶν δὲ καὶ τῶν, seu, τῶν δὲ καὶ τρυφῶν omissa uoce λαχάνων. Nam præterquàm quòd in τρυφῶν genere τὰ λάχανα recensentur, ad quid, quæso, olera hoc loco inter uenenata reponentur, quùm λάχανα herbæ tantùm sint esculentæ, uenenatas uerò omnes cibis abdicandas esse nemo dubitet? Uoce autem τρυφῶν plantas quaslibet, quę ramis quodammodò brachiarę spectantur, comprehendimus, nempe arbores, frutices & ipsa quoque uirgulta. Sunt porrò, fateor, Aristotelis de plantis, primariæ ac summæ plantarum species quatuor, δένδρα, θάμνοι, ὑπόπετα καὶ λάχανα, si modò locus mendo uacat. At rectiùs Theophrastus, dum totidem species plantarum recensẽt, tres quidẽ illas priores memorat, sed αὐτὰ τὰ λαχανώδη,

φρυγάνων meminit: *suffrutices* vertit Gaza, nos interdum *virgulta*, aliàs *cremia* interpretamur, à cremando sic dicta, vti Græcis φρύγανα, quasi ξηρὰ βοτάνη. herbarum autem nomine, quę illi πόα dicuntur, ὧν ἀπὸ τῆς πόας καὶ τῶν λάχανα comprehendit. Verum enimuerò quoniam nonnulla in plantarum genere reponuntur, quæ ad nullam harum speciarum referri rectè possunt, nos (quod obiter dictum velim) cum Costęo viro doctiss. de vniuer. stirp. nat. lib. 2. cap. 10. illam plantarum diuisionem mancam etiamnũ esse suspicamur, aut certè Theophrasto fuisse in animo, perfectarum solummodò plantarum species enumerare. Perfectas nomino, quæ primas & maximas habent plantarum partes, superficiem inquàm & radicẽ, vti imperfectas, quæ harum alterutra carent, aut certè carere videntur. Hoc in genere numerantur, fungi, tubera, epithymum, cassuta, viscum & cætera id genus, quæ nemo vnquam arbores, frutices, virgulta aut herbas esse iudicauerit.

διὸ ἕτεροι πρόσωπον] Vterq; Goupyli codex hũc locum sic scriptum habet: φαίνεται διὸ ἕτεροι μᾶλλον καὶ πλείους, atque ita etiam legit Hermolaus. Cornarius verò rectiùs: φαίνεται διὸ ἕτεροι δύσμορον (alij δύσμορον) μιμεῖσθαι δὲ βέλτιον πεπλάνηται. Sic Dioscor. taxum capite proprio nonnullis δύσμορον appellari prodidit. δύσμορον verò dictam, tum hic ipse de venenis Autor, tum etiam Paulus retulerunt.

σανδαράχης δύο] Dum sandarachæ duplicis Autor meminit, tum natiuam tum etiam factitiam ex auripigmento innuere videtur: quanuis fateor & alias esse sandarachæ Græcorum natiuæ differentias, tum in colore, tum etiam in figura. Enimuerò quædam valdè rufa & cinnabaris colorem referens conspicitur, alia minùs rufa & quasi sublutea. Rursum alia globosa est, qualis plerunque inuenitur, alia puluerulenta, cuius etiam Theophrastus ac Vitruuius meminerunt.

Cap. 2. δίδοται δὲ καὶ πρὸς] Idem refert Paulus. At Nicander in Alexiph. πάλιν καρὸ δὲ καὶ ἀκρεῶν desiderat, nempe *cerebella suis & agni* &c. nec abs re: siquidem cerebella etiam multò magis quàm carnes ipsæ, quãtumuis probè coctæ, nauseam excitant. Aetius, tetr. 4. ser. 2. ca. 49. eiusmodi quidem carnes ad vomitum prouocandum laudat, sed ea ipsa etiam porcellorum cerebella commendat.

γλωσσῶν ϟ α΄.] Ruellius cùm fortasse hanc passi mensuram, ceu parciorem, corruptam esse, vixque tot pulucrum drachmas vna liquoris drachma dilui ac dissolui posse animaduerteret, passi mensuræ in sua versione planè non meminit. At rectiùs Cornarius, qui quidem pro drachma, κοτυλίσκῳ, hoc est, *hemina* reponit, adeóque legendum censet, μετὰ γλωσσῶν ϟ α΄. Scribonius Largus remedij huiusce ad Cantharidas mentionem faciens, ad Samiæ cretæ P. iiij. passi cyathos quatuor desiderat: Aegineta Cimoliæ drachmas quatuor propinat cum melicrato: Dioscor. in lib. 2. περὶ Σαμίας ϟ δ. μετὰ μέλιτος.

Cap. III. Θηβαϊκὸς βοτάνης] Remittẽte sese demùm acerbitate mali, iámque decedẽte periculo, palmarum fructum exhibendum censet Dioscorides Nicandri fidus Interpres, quando scilicet iam Bupresti dis symptomata desierint, & tumor ferè totus resederit. Tùm siquidem ille nõ leui astrictione interna viscera roborat, exiccat humoris vitiosi reliquias, ac denique calore suo non exiguo nostrum etiam non mediocriter adauget.

Cap. IIII. ἀφωνίας ὑπνώδεις] Paulus pro, ἀφωνίας, habet, κατηῦς, id est, *fermonis*: quam quidẽ lectionem secutus est Marcellus. At nostræ huic lectioni, præter Aëtium & Auicennam, suffragatur & ipse Nicander, hisce verbis: περὶ γὰρ νέκυς φρένες αἰμβλυώσσετ', *nam mens obtusa macillat.*

μετὰ πάχους] Hæc symptomata, quantumuis frigida, Salamandræ haustum consequuntur, liquatis à calore præter naturam, acri inquàm & adurente, (quem illa excitat) cerebri humoribus, vel in caput aliũde subuectis, ac per nernos sparsis atque adeò illos obturantibus: non item, quia sit Salamandra frigida vi prædita, vti voluêre nõnulli, ac inter cæteros Auicennas, qui curationem illi perinde atque opio adhibendam censuit.

ἐπιγίνεται ἀνατρίβει] Inter symptomata, quæ haustæ Salamandræ superueniunt, Aëtius & Plinius totius corporis pilorum defluuium præterea recensent.

ῥητίνῃ πεπτοῖσιν] Resina pinea occulta potiùs quàm manifesta qualitate cum Salamandræ veneno pugnat. Siquidem est illa non mediocriter calida: hoc verò supramodùm calidum atque etiam causticum, nedum sit frigidum, vt placuisse videtur Alberto, & ipsi quoque Mathiolo. An potiùs existimandum resinam non quidem veneni, sed symptomatum frigidorum quæ illud consequuntur, nempe torporis, paralysis & tremoris esse alexipharmacum?

σκευαζόμενα κρίνῳ] Sic Aëtius: Sed Gorræus κρίνῳ, id est, *lilio*, meritò restituit, κρίσῃ, hoc est, *farina crassiore*, idq; ex Nicandro, cuius hæc sunt verba:

-κρὶ νῦν κύδιλλα
ἐψιάλλειν κρίμνοισι παλαιοτέροις ἀλφαρῆσιν
ἀκρήτῳ χεύσειν, &c. quæ sic Gorræus:

-& ipsam
Vrticam tosti conspersam polline, coctam
Ex aceto edesse, &c.

Quid quòd Dioscor. 2. περ. contra Salamandram potam κύδιλλα φύλλα ἐπὶ τετρῶσι κλίβανον ἐψήσας, hoc est, *urticæ folia cum hordeacea farina & aceto* exhibet?

χρονίσαι ἐπὶ] Non tantùm testudinis vtriusque tam marinæ quàm terrestris ous, sed & carnes ipsas Nicander commendat, coctas cum suum præpinguium carnibus seu visceribus. Vox enim κρέα, qua ille vtitur, modò *carnes*, modò *viscera*, interdum etiam *artus* ipsos significat. In EVporistis Dioscorides galbanum & marinæ testudinis sanguinẽ simul diligenter coquit & exhibet.

ἐρυγγίου ῥίζης] Ranis & eryngij radici Scammoniæ portiũculam addit Nicander, idque fortasis vt corpus vniuersum à putridis humoribus fœliciùs expurgetur, itáque venenum paulatim expellatur.

Cap. V. πτερυγίοι καθ' ὅλου πέσσειν] Scribonius Largus non quidem, πέσσειν, sed, πίσσειν, videtur legisse. Sic enim ille, cap. 61. *Ephemerum*, inquit, *potum prorsus quidem os prurire facit, velut sale tactum, postea etiam aduritur, quasi pipere mandatum.*

φάρμακα αἱμαίνουσι] Ephemerum haustum non tantùm sequitur cruentus alui fluxus, sed & ve-

mitur, teſte Nicandro, per quos liquida vacuantur, aquæ in qua recèns mactatæ carnes ablutæ fuerint ſimilia: quæ quidem ſummam hepatis imbecillitatē arguunt, ex ſententia Gal. lib. 5. de locis affect. Scribonius, loco modo citato, ſanguinem Ephemero poto vndecunque manare teſtatur: *Qui Ephemerum*, inquit, *biberint, primùm ſanguinem ab ore expuunt, deinde ex ſtomacho cruorem reijciunt, poſtea per ſellas etiam abundantius eundem deijciunt.*

ὑπὸ δὲ φύματι] Præcipuis ſymptomatis à Colchico illatis, nempe inteſtinorū læuitati ac tormínibus, tum illa, tum quæ ſequuntur propè omnia meden fit ueriſimile.

CAP. VI. φρίττει καὶ πυρέσσει] Vti in ſtirpium hiſtoria Dioſcorides Anazarbæus Doryenium & Solanum manicum diſtinxit, & ceu plantas diuerſas diuerſis deſcripſit capitibus, ita & lib. περὶ ἀντιδ. altero, vtriuſque veneni diuerſis capitibus propria & peculiaria tradit remedia: quæ tamen ferè omnia hoc loco vni Doryenio accommodantur. Atque vel hinc patet, Dioſcoridem horum librorum de venenis authorem, alium ab illo Anazarbæo extitiſſe, vti & antè monuimus.

ἐν γάλακτος ποτῷ] Velle videtur Nicander, Doryenion in ore ipſo non tantùm lactis ſaporem, ſed & colorem repræſentare, hiſce verbis:

αὐτὰρ γὰρ θρέξασα Δορυήνιον, οὐκ ἐπὶ γάλακτι
οἴκτιστ' ἀνθρώπων τὸν ἑλεῖ τεμάχισσε θύσσας.

quæ ſic vertit Gorræus:

Nunc age conſimilem Doryenio, aſpice primùm
Quàm color & guſtus ſimili ſint proxima lacti.

Annotat verò illius Interpres, Doryenion, quod alio nomine μελανόμφαλον appellari refert, ſuccũ reddere adeò tum colore, tum ſapore, tum & odore lacti ſimilem, vt vix ab ipſo lacte diſcerni poſſit.

γλαύκης ὑγρότης] Apud Paulum, in Aldino ſaltem codice, legitur, γλαύκης ξηρότης: quanuis contrà quotquot occurrerunt interpretes *humiditatem* verterunt. Sed ei tamen lectioni ſuffragari videtur Nicander, qui quidem de eo qui Doryenio hauſerit, -αἰμὶ πότιν, inquit, ξηρὸν στόμα βρίξας. Gorræus ita vertit: -*atque arentia neglige ora Colluere.* Vtra tamen lectio potior ſit, in dubio relinquimus.

ἕλκει χλιαρὸς] Apud Aëtium hoc remedium cum proximè ſequenti iungitur: ſiquidem Interpres rectè tranſtulit. Sic enim ille: *paſſum tepidum cum aniſo potum & amygdalis amaris tribus.*

CAP. VII. γλυκαίνει τὰς γλαύκας] Sic Aëtius: *Aconitum dum potatur, linguam edulcat cum quadam aſtrictione, deinde paulò poſt in lingua amaricat.* Scrib. verò Largus, cap. 36. *Aconiti guſtus eſt auſterus atque ſubamarus.* Apud eoſdem Autores, vti & apud Nicandrum, longè plura poti Aconiti ſymptomata reperias, quàm quæ hic commemorantur.

ἀκόνιτον ἐφελκύσῃ] Nicander: αἱ δ' ὑπὸ φαίδιμα νῶτα ἀπὸ κροτάφων λείβονται ἱδρῶτες: hoc eſt, vti vertit Gorræus: *Derpunt ex oculis madidas delabitur humor.* id quod plerique ita interpretantur, quaſi hauſtum Aconitum lacrymas cieat. Aëtius humores in oculis ebundè prolicere, ſcribit. At Scribonius, hauſto Aconito ſudorem multum ac frigidum maximè circa oculos & frontem apparere voluit.

ἀκόνιτου] Sic & apud Dioſc. 2. περὶ ἀντιδ. legitur, ad hauſtũ Aconitum priuatim iuuare ſedi maioris flores cum vino. Attamen Paulus & Aëtius pro, ἀκονίτου, habẽt, ἀζώου. Ita & Cataeuz. exemplar: & rectè quidem. Aptiùs enim eruca, quàm ſemperuiui temperamẽtum, reliquorũ hîc commemoratorũ ſimplicium temperamẽto reſpondet: quæ quidem omnia eſſe calida & ſicca nemo non videt, ex quo etiam (ſed nimis leuiter) infert Gorræus, Aconitum frigidum eſſe atque humidum: cùm tamen id è putrefacientium eſſe genere fateatur, quę quidem omnia Galenus calida ſimul & humida eſſe, 5. ſimpl. apertiſſimè docuit.

σὺν μάλτῃ ἢ κριθῇ] Paulus, σὺν οἴνῳ. Sunt qui legãt, σὺν μάλτᾳ ἢ γαλακτὶ μετὰ κατανείου, &c. quo quidem modo legit Marcellus. Nicãdri opobalſamum lacte vel aqua diluit. In Dioſc. ἀντιδ. pro aconiti antidoto habetur inter cætera ἐμβάλλομεν μετὰ γάλακτος, opobalſamum cum lacte: rurſúmque eodem cap. ἐμβάλλομεν σὺν γάλακτι γυναικείῳ ἢ ὕδατι. id eſt, opobalſamum cum lacte mulebri aut aqua: idque citrà aliorum ſimplicium additionem. Et certè quidem ab hoc remedio diſtinguendum eſt id quod proximè ſequitur, ex caſtoreo pipere & ruta: ſiue illa ſingula ſeorſim, ſiue ſimul omnia vſurpentur ex vino. Iccircò legendum hîc coniicio: σὺν μάλτῃ ἢ γάλακτι· καὶ κυπρίου καὶ πεφέως καὶ πηγάνου ἴσα ἑλὼν σὺν οἴνῳ.

ὁ οἶνος ἁλισθήτω] Dioſc. 2. περὶ ἀντιδ. ferri quidem recrementum oxymelite reſtinguit: ferrum verò, aurum & argentum, melle. Scribonius in aceto melli mixto ferri ſtercus vſtum priùs inferueſcere ſæpiùs, & ita dari voluit.

καὶ ὄρνιθι καθεψήσῃσιν] Iſta ſic ſonant, quaſi voluerit Autor, lixiuiam cum vino & gallina decoqui. Paulus & Aëtius, rectiùs: κριθὰς σὺν οἴνῳ, καὶ ὄρνιθος καθέψου, ἢ κρεῶν λιπαρῶν ζωμὸς λαμβανέσθω σὺν οἴνῳ. Dioſcoridi quoque, 2. περὶ ἀντιδ. inter alia Aconiti alexipharmaca recenſentur, ὄρνιθος καθεψήσεως εὐζωμοτάτης ζωμὸς, κρέας λιπαρὸν ἐσθίειν. Scribonius iure gallinæ pinguis vel bubulæ adiuuari ſcribit qui Aconitum ſumpſerunt. Iccircò & nos hoc loco legendum cenſemus, καὶ ὄρνιθος καθεψήσεως, ἢ κρεῶν λιπαρῶν βοείων ζωμὸς λαμβανέσθω σὺν οἴνῳ.

ὁ οἶνος ἡδυσμένος] Iſta nos ſuo loco reſtituimus, quæ librariorum errore in proximum caput perperàm tranſlata fuerant. Porrò & Dioſc. lib. 3. de Chamæpity agens, qua perinde atque antidoto contra Aconitum Heraclios vti ſolitos ſcribit, has ipſas ei tribuit appellationes. Χαμαίπιτυς, inquit, ὑφ' οἷς ἐν Πόντῳ ἀλέουσι τὰ ἀκόνιτα, ἡδύσματος ἰσχύει, ὑπὸ ἩΡΑΚΛΕΙΔΩΝ, καθαίρει. Eaſdem habet & Paulus, lib. 5. cap. 45. ſed pro ἀλέουσι, legit, ἀλέαινον.

CAP. IX. μετὰ τὸ ἀκονιτῶδες] Paulus rectiùs, ἀκονιτώδους, quam etiam lectionẽ ſequitur Cornarius: ἀκόνιτον enim, idem quod κυνόκτονον, ſignificat. Sic inferiùs, cap. de pharico, μετὰ τὸ ἀκόνιτον κύνας.

ἕλκειν τὸν ἀφρόν] Iuxta aliorum etiam Interpretum ſententiam σὺν τῷ, ἕλκειν, ex Paulo, Aëtio, itémque Dioſc. ipſo, περὶ ἀντιδ. ἕλκειν ἄκρατος reſtituimus.

CAP. XI. διδόντες μεμιγμένον ἄρτημα] Annotat Goupylus hæc verba ita legi in antiquo codice: διδόντες μεμιγμένου ἄρτημα, ὡς οἷς δίδωσι πίειν γάλα βόειον, &c. At rectiùs legas cum Paulo, μεμιγμένα ἄρτιμα. Sic enim ille: διδόντες μεμιγμένου ἄρτιμα, ὡς οἷς δίδοται γάλα βόειον ἢ ὄνειον &c.

καὶ κυπείρου] Pauli lectionem præculi, καὶ κυπείρου καὶ σίγγου καὶ νάρδου καὶ οἴνου, ita vt ista remedia à præcedentibus seiũgãtur. Cęterùm apud Aëtium vti plura symptomata hausta Cicutæ reperias, quàm hîc à Dioscoride recensentur, ita & plura remedia, quæ inde repetere vnicuiq; licet.

ἢ καρδαμώμου] Addunt nonnulli, ἢ ἀμώμου σὺν. ά. pro quo legendum, ἢ ἀμώμου ⊲. ά. sicuti legitur apud Aëtium, qui tamen cardamomum prætermittit. Dioscorides in Ὑσ. post factam mentionem cardamomi, addit, κυπαμώμου ⊲ ά. σὺν οἴνῳ. Paulò pòst, αὖθι δὲ, ἢ πιθήκου, lego, ἢ πίσσης.

σὺν λαίῳ ἢ γλυκεῖ.] Sic Dioscorides, in EVporistis. Paulus verò legit, ἀλφίου ἢ σὺν ἐλαίῳ, σὺν οἴνῳ ἢ γλυκεῖ. quomodo legit Corn. Aëtius σὺν οἴνῳ γλυκεῖ. Cornel. Celsus laser dat ex vino. At Nicãder, cum vino aut oleo silphij liquorem videtur exhibere, nisi fortè, quod voluit eius Græcus Interpres, silphij quidem liquorẽ cum vino, ipsam verò radicem tritam cum oleo exhibet. Sic verò ille: ἀ, ῳ πλέον ἐπὶ ὑμενιαίῳ χρείας. Gorręus: Et unũ sextũ [miscebis] quem Cyrenaïcæ nuncupãt. Ac rursum paulò pòst. ἀλφία δ' ὕδατος δίκην μετ' ὀρχάνου πλείω, -Et cum claro calidum aere laser dato.

Cap. xiiii. πρὸς ὄνομα] Cur infausti nominis sit hoc Adagium, rationem subdit Aëtius: Est enim, inquit, eiusmodi amentiæ accessio grauis omnino, quippe quæ falso risus præsentis & insperatum mœrorem moliat.

Cap. xv. ὑοσκυάμου πῶς μεθύουσι] Aëtius aliquantò fusiùs symptomata Hyoscyamo sumpto superuenientia prosequitur, vti & Auicennas. At Nicander ne vnius quidem meminit.

μελικράτῳ πινομ.] Celsus, lib. 5. non mulsæ, sed mulsi meminit. Si, inquit ille, Hyoscyamum aliquis ebibit, feruens mulsum bibendum est, &c.

καὶ γλυκεῖ σὺν ὕδατι] Istud, σὺν ὕδατι, non habetur apud Paulum, neque id agnoscunt Marcellus & Cornarius: ac nos quoque redundare iudicauimus.

νίδος σπέρμα] Hîc vrticæ semen æquè ac nitrum videtur ex aqua exhiberi: at apud Dioscor. in EVpor. ex vino: sic enim ille, νίδος σπέρμα σὺν οἴνῳ, ἢ καὶ φύλλα, vrticæ semen cum vino aut folia.

ὥσπερ οἱ νῦν οἶνον] Legimus cum Aldineta, ὥσπερ οἱ νῦν οἶνον πίνοντες ὑπὸ πλήρωσιν.

Cap. xvi. κυκλάμινος ῥίζα] Longè plura epotæ Mandragoræ radicis, ac pomi etiam ipsius symptomata simul & remedia legas apud Aëtium.

Ὑπνωτικοῦ] Teste Lacuna, legitur in vetusto exemplari, καὶ ὑποχὴν. quam lectionem, ceu vsui accommodatiorem, cum Cornario secuti sumus. Neutrius meminit Paulus. Aëtius verò odoraminis loco recenset pulegium cum ruta & castorio ex aceto.

Cap. xvii. ὧν σάρκες ἐσθίονται] Opij assumpti longè plura tum signa tum symptomata ex Nicandro & Aëtio repetere licebit.

καὶ πανίας] Addunt nonnulli, ἢ γλυκεῖ. Dioscor. in EVpor. καὶ γλυκεῖ. Sed neque Paulus neq; Aëtius tale quid habent.

Cap. xix. φαλαινίδων φαγεῖν] Quid esset Pharicum minimè expressit Dioscorides, vti neque Paulus, nec Aëtius. Pharicum certè quidem fuit Scribonius) dicitur ex amplioribus compositis, gustuique habere nardi. Inter simplicia tamẽ ipsum Autor cap. 1. recensuit. Quod ad etymon spectat. Nicandri Scholiastes Praxagoram citat, qui à Pharico quodam veneficio Cretensi, ceu inuentore, sic vocatum scribit: iuxta alios verò, vel à Pharide Laconum, vel à Pheris Thessaliæ, vel à Pharis Arcadiæ oppido, vbi fortassè veneni genus id primùm repertum fuerit, ita dictum asserit. Athenæus, 3. Δειπν. nõ quidem φάρικον, sed φαρικὸν nominat, ibidémque innuit, mala cotonea eiusce veneni vires infringere: id quod experientia compertum tradit.

ναρδίνῳ αἰγείᾳ] Marcellus delet, αἰγείᾳ: & certè quidem Nicander & Scribonius Largus non nardo syluestri, sed nardo simpliciter assimilant. Nardum autem syluestre & asarum pro eodem accipi Dioscorides admonuit, 1. de mat. med. ca. de asaro. Scribonius verò nardum syluestre idem cum Celtico esse innuit.

Κελτικῷ, ἢ ὅτου περίου] Apud Paulum, ἰσάτου, nõ minùs falsò, quàm hîc, περίου, legitur. Sic enim ille ναρδίνῳ Κελτικῷ, ἢ ὅτου ἰσάτου, &c. Sed vtrobique ἀκανάγκας reponẽdũ videtur. Nã & Nardũ Celticã ἀκανάγκας appellari testatus est antè Dioscor. lib. 1. de mat. med. Itémq; Scribonius Largus Pharici remedia commemorans, cap. 195 Adiuuantur, inquit, læsi ab eo salsuram, id est, nardo syluestri, quã plurima ex uino sæpiùs data. Nicander in Alexiph. & Dioscin Ὑακινθίνῳ, nardi non quidem Celticæ, sed Ciliciæ radicem ad Pharicum probant: ideóque & hoc loco Marcellus pro, ναρδίνῳ Κελτικῷ, ναρδίνῳ Κιλικίῳ, restituẽdum suspicatur. quo modo & apud Paulum legi iam antè monuimus.

σμύρνης β'. ὀβολ.] Pro eo quod habet hoc loco Dioscorides, myrrhæ obolos duos, apud Nicandrum legitur, σμυρνίου ἀνοβόλοις, hoc est, syrnium probè tritum: nisi fortè σμυρνίου, non pro smyrnio planta, sed pro myrrha ipsa accipi debet.

Cap. xx. Τὸ δὲ ὄξινον] Quale fuerit olim Toxicum, non est facile conijcere. Esse tamen plãtæ genus Autor iam antè in procemio innuere visus est: ac ipse quoque Galenus, lib. 2. de Antidot. ex Asclepiadis sententia, inter venena simplicia ipsum annumerat. Non esse tamẽ cicutam certum est: sed neque Napellum esse contendit Mathiolus, at potiùs Tusom Auicennæ. Qualecunque verò id sit, constat fuisse certi quoddam generis venenum, quod à quotidiano frequentioréque apud Barbaros in tingendis sagittis vsu Antiquitas sic appellauerit. Nicandri Scholiastes iccircò & alio nomine Σκυθικὸν appellari scribit, & ὄξινον ex eo dictum annotat, quod sagittæ instar, id est, aleriter, in cibo sumptum potùr ve interimat. Scribonius tamen ὄξινου nominis & aliam videtur afferre rationem, nempe quòd Toxicum potum dolorẽ excat omnium murænarum, uelut ὀξὺ, id est, uelox, traiectorum. Sed quod Plinius Toxicum à taxo arbore venenata dictum existimauit, longè absurdius esse videtur.

αἵματα τράγου] Dioscor. in Ὑσ. præter sanguinem hirci aut caprę, sanguinis etiam meminit hœdi, anseris & canis, seu fortè anseris, χηνὸς, inquàm, nõ, τανὸς: quãquam & Dioscor. lib. 2. de mat. med. nõ anserinum modò sanguinem, sed & caninum contra toxicum epotum commendauerit.

ἀφεψήσας φλοιὸν] Dioscor. in Ὑσ. non quidem corticem ilicis aut fagi, sed earundem arborum folia in hunc vsum desiderat.

Cap. xxi. Ἰξιὰς δρῦς] Aëtius post Iuliam de

vtroque Chamæleone tam albo quàm nigro agit, quibus alias quàm Ixiæ notas, alia itidem remedia assignat. Paulus & Ixiæ & Chamæleonis tantummodò nigri mentionem facit. Hic verò noster Autor in venenorum quidem cæsu & Ixiæ & Chamæleonis separatim meminit: at deinceps Chamæleonem vtrunque, ceu fortassè sub Ixia comprehensum, prætermisit, haud secus ac Nicander: qui de Ixia solùm, de neutro verò Chamæleone nominatim egit. Vtrunque certè quidem Chamæleontem Dioscorides Anazarb. lib. 3. de mat. med. Ixiam appellari prodidit: at in ἄκρ. Ixiam conceptis verbis Chamæleonem nigrum interpretatur, eiúsque solius mentionem facit. Scribonius citra distinctionem, Ixiæ, inquit, *quam quidam Chamæleonta nocant*, &c. Hæc tanta opinionum varietas in causa est, vt quod plantæ genus sit ἰξίας seu χαμαίφυτον, vix affirmare ausim: quod & antè in libri 3. caput 10. admonuimus.

ἢ ἐξυμάλιν] Vetus codex itémque AEgineta addunt, ἢ ἔξω, aut acetum, quam lectionem recipit Cornarius. Nicāder ποτιστέον ὕσσῳ γλάυκι, hoc est, *cum mulso seu mero nouo.*

πηγάνου κλείου σπέρμα] Nicander ipsa rutæ germina commendat, vti & polij florem.

ἢ πρόσθεν ῥητίνην] Nicander resinæ meminit, non modò terebinthinæ, sed & pineæ ac piceæ.

ἢ παράδου] Aldinus codex hoc loco valde deprauatus est. Notato certè quidem puncto post σκορπιόφονον, habet, ἀλκίην ῥητίνην μὲν ὄπην, hoc est, *resinæ abiegnæ cū mero.* &c. Aëtius, ἢ ῥητίνης πρεμνοῦ ἢ παράδου πεύκης, &c. Cornarius verò legit, ἢ ῥητίνης πρεμνοῦς ἢ παράδου, ἢ κεδρείου, &c. Quam lectionem cæteris ego prætulerim, ex mea versione videre facile fuerit.

ἀψινθίου χυλοῦ] Addunt alij, ἢ ἀψίθου, quam lectionem secutus est Ruellius: qui tamen etiam succi absinthij meminit. Paulus post, ἀψινθίου χυλῷ, ἀψίθου χυλῷ reponit, móxque subdit, & ὄξος θερμὸν πινόμενον, quasi acetum etiam calidum per se potum prosit. Marcellus & Cornarius illā Pauli lectionem sequūtur: sed hoc drachmarum duarum pondus ceu nimium suspectum habent, & meritò quidem: maximè cùm thapsia vsu nimio inter venena censeatur, & Dioscorides lib. 4. mat. med. disertè scripserit, thapsiæ obolos tātummodò quatuor dari. succi obolos tres, & liquoris obolum vnum. Quid quòd & idem chamelææ pondus modum omnem superat? quandoquidem, Serapione teste, chamelææ drachma vnica interimit. Quare tum hîc tum illic oboli pro drachmis reponendi videntur.

CAP. XXII. ἢ Περσικοῦ ξὺν ἐλαίῳ] Ista quæ sequūtur, ceu planè corrupta, sic restituenda ex Paulo: ἢ Περσικοῦ ξὺν ὄξει σωὸν κεγχρῖδι ἀφεψήσας, ἢ πολυπόδιον πίνων, ἢ πλατίας &c. Hos verò Persicorū nucleos Nicander tritos ex oleo desiderat: sic enim ille: πλὴν ἐπὶ Περσίης πίνοις κεγχρηέντα δυοῖν μετ' ἀμύγδαλα χυτά. Sic & Dioscorides in EVpo. quo loco habet, Περσίνου ξὺν ἐλαίῳ. At Scribonius Largus, c. 51. *Prosunt*, inquit, *ex nucleorum Persicorum mortuorum ex vino tritis atque potis quamplurima.* Cæterùm Asclepiades apud Gal. 2 de Antid. pro his Persicorum nucleis nuces regias exhibet, quas contra venena quoq; pollere nemo dubitat, quāsq; Dioscorides lib. 1. etiam Persicas appellari testatus est.

ἢ ὅ τι ἂν τῆς φύσεως] Legendum hauddubiè, ἢ ὅ τι ἂν τῆς φύσεως τῆς πλατίας ἔχῃ, non, ὅ τι ἂν τῆς φύσεως. Paulus habet, ὅ τι πλατίας ἐν τῇ δυλακίνῃ ἔχει. Sed & huiusce humoris intra vlmi folliculos contenti mentionem faciens Dioscorides, lib. 1. cap. de vlmo, ὅ τι ἐν τῇ φύσει διειλημμένον ἔχει nominat, φύσεως appellans, quæ ille, δυλακίνην.

CAP. XXIII. ἀλικεβείδου οἰνάνθης] Sic Paulus: ἀφεψᾶ δὲ αὐτῆς καὶ ἀλικεβείδου οἰνάνθης ἀφεψήματι καὶ ἐν ἐξυμέλιτι πινόμενα. At Cornarius αὐτὴ τὴ ὠὰ, ἀφεψήματι, aut certè quid simile reponit: & rectè quidem, siquid ego rectè iudico. Nam & Dioscantè, lib. 4. ca. 83. aduersus Fungos inutiles ὀρόβινον ἄλευρον μετ' ὄξους, itémque in EVpor. ἀλικεβείδου ἄφεψον σὺν ὀξυμέλιτι commendat. πίδιον τροφὴν καὶ ὑπάδας, pro eodem dixit Nicander. Aëtius quoque certissimo Philagrij experimēto aduersum Fungos cōprobatum scribit gallinaceum stercus albū, tritū ex posca aut aceto mulsō. Sed & ipse Paulus, lib. 7. cap. de stercore, idem gallinaceum stercus ad Fungos præstanti remedio valere tradidit: dum scilicet ex oxymelite, aceto mulsóve vomitione Fungos educit.

μιᾶς ἀριστολοχ.] Aristolochię drachmam vnam simpliciter ac per se vsurpat Dioscorides, in EVpor. & quod proxime sequitur absinthium, non quidem cum vino, sed cum aceto, exhibet, tū eo loco, tū etiam 3. de mat. med. ita vt fortassè post illud, πιοῦσα, hîc etiam legendum sit, ἀριστολοχίας ἢ ἀψινθίου ὀλκὰς, σὺν ὄξει.

καὶ μέλιτι τόσῳ] Lego cum Lacuna, ἢ μέλιτι, quo modo etiā habetur apud Dioscor. in EVpor. itémque apud Paulum. Sic enim vterque, καὶ μέλιτι ἢ ὀξυμέλιτι καὶ πινόμενον. Quin & Isaacus inter Arabes mel simpliciter commendat in hunc eundem vsum.

μαλιαφυλλίου τι σπέρματος] Restituo ex Paulo & Aëtio, σπέρματος, maximè cùm Dioscorides in EVpor. tum etiam 3. de mat. med. melissophyllon cum nitro contra Fungos bibi scripsisse constet. Huc accedit & illud, quod Galenus, 9. simpl. nitrum aduersus Fungorum strangulationes eximiè commendat. Quod verò sequitur ex panace remedium, Dioscorides in EVpor. ad panaces Asclepium nominatim restringit.

πρὸς πόσιν] Dioscorides in EVpor. fæcem vini non vstam modo, sed & crudam commēdat ex aqua.

χαλκάνθου] Cataeua. exemplar habet, χαλκοῦ ἄνθος, itidémque Paulus & Dioscorides lib. ἄκρ. Nicāder χαλκὸς πάλαι μεμυγμένος αὖθις desiderat. Quin & Scrib. Largus cap. 166. inter Fungorum remedia pro atramento sutorio æris florem reponit. Neque dubito quin flos æris aliquo modo iuuare possit, quum, teste Dioscorides, quaternūm obolorum pondere crassos humores extrahat, quales scilicet Fungorum vsus gignere consueuit. Attamen quoniam 5. de mat. med. lib. de chalcanthō agēs Dioscorides, totidem verbis, καὶ μόνον (inquit) καθαίρει βουβῶνας σὺν ὕδατι πίνει, hoc est, *aduersus hausta fungorum venena ex aqua potum auxiliatur*: & hîc quoque chalcanthum æris flori prætulerim.

ἢ καρδάμωμον] καρδάμωμον hauddubiè legendum ex Paulo & Aëtio. Nam & folia καρδαμώμου in eū vsum prædicat Nicander. καρδαμώμιον nominat Dioscorides in EVpor. nisi fortè, καρδάμωμον legi præstat. Cæterùm apud Paulum & Aëtium adduntur ad-

uersus Fungos à serpentibus aliisve bestiis venenatis arrosos, aut prope bestiarum eiusmodi latibula natos, alióve quouis modo infectos nõnulla remedia, quæ ex ipsis Autoribus repetere vnicuique facile fuerit.

CAP. XXV. *οὐρικὸς διαφθόρου*] Paulus legit, *διαφθόρου*. Aëtij verò Interpres legisse videtur, *καὶ οὐλα διαφθόρα*. Sed potior hauddubiè Dioscoridis lectio: siquidem vix quisquam crediderit, tam repentè dentes aut gingiuas erodi posse. Porrò Dioscor. in *Ἄιμ.* inter Taurini sanguinis epoti signa, vocis interceptionem, stomachi dolorem, prætereáque retentionem vrinæ numerat. Aëtius, oris ventriculi compressionem frequentésque conuulsiones.

τὸν ταῦρον παραλ.] Contrà verò Galenus, 2. de antid. eos qui Taurinum sanguinem recentem hauserint, aceto sæpiùs poto & vomitionibus rejecto adiuuari scribit: quod ipsum repetit Oribasius. Verùm tùm demùm intelligendum conferre vomitum, cùm aceti ope coagulatus sanguis incisus, attenuatus ac dissolutus fuerit: priùs verò minimè tentandum esse vomitum, ac potissimùm vulgaribus *ἐμπνοῖς*, præter Dioscor. Pauli & Aëtij autoritatem, ratio etiam ipsa per se dictat.

διδόναι ἅλας] Malim equidem, vt ne sequentes casus immutare sit opus; *διδόναι ἅλα ἅλα* &c. vel *διδοὺς ἅλα ἅλα* &c.

καὶ ὀξυκράτῳ] Dioscor. in EVpor. *καὶ ὄξει*. Porrò quæ hîc diuisim leguntur, apud alios coniũctim scripta reperies. Sic enim Paulus & Aëtius, *ἁλωτὸν καὶ ὀξυκράτῳ καὶ νίτρῳ δότεον*. Noster Autor nitro per se vtitur. Galenus nitri obolos duos in vino dissoluit: nitrum cum lacte dari scribit Plinius: itémque Dioscor. in *Ἄιμ.* *σὺν γάλακτι καὶ ἁλφίτοις*. Cæterùm Aëtius non tantùm grossos caprifici, sed & fici succum lacteum, aut rãmulos fici tritos ex nitro & posca exhibet.

πυτία ἔμπυα] Dioscor. in *Ἄιμ.* Coagulum hœdi vel leporis è vino: Nicander coagulum capreæ, damæ, hœdi aut leporis vsurpat. Paulus, *πυτία καὶ πυτία ἔμπυα καὶ ὄξει, καὶ ἁλφίτου ῥίζα καὶ ψιμυθίου*, quam quidem lectionem & ego secutus sum. Aëtius coaguli quidem non meminit, at silphij radicem ex aceto sanguini Taurino resistere palàm asserit.

ἀγρίας σπέρμα] Plinius, lib. 20. cap. 9. *brassicæ syluestris semen potum contra Taurorum venena auxiliari* scribit. Nicander verò, simpliciter brassicæ semen cum aceto commendat.

κονύζης σπέρμα] Lego, *ῥόας*. Nã & apud Dioscor. in *Ἄιμ.* itémque apud Paulũ & Aëtium, pro conyzæ semine, conyzæ folia leguntur. At Nicander tamen conyzæ radicem expetit.

βατου χλόης] Nicander rubi germinum tantùmodò meminit: sed vérisimile est ex iis quoque succum exprimi voluisse.

καὶ ῥοιᾶς] Paulus, *καὶ ῥοιᾶς ξηρᾶς καὶ βοτρύος*. Ruellius legisse videtur, *καὶ ῥοιᾶς ξηρᾶς καὶ βοτρύος*, siquidem *siccatas & floridas*, vertit. At Cornarius legẽdum cẽsset, *καὶ ῥοιᾶς ξηρᾶς καὶ βοτρύος*. Ego verò *αἱμάτου, καὶ ῥοιᾶς*, immutatis paucis, *ἀκροδρύων* legendum esse suspicor. Nam & Albucasis, secũda parte Azarauij, Taurino sanguine poto egestiones quales croci diluti salutem promittere scribit.

κεχρῶ] Cæteri etiam ferè omnes qui de venenorum remediis scripsére, farinam hordeaceã in hunc vsum desiderant, vno excepto Galeno; qui quidem non, *κεχρῶ*, sed *λέπυρου ἄλφιτα*, hoc est, *lupinorum farinam*, addito nitro in oxymelite decoquit.

CAP. XXVI. *ἐμπυετώδη γάλα*] Coagulatum lac intelligi par est, quod etsi liquidum adhuc est, recèns tamen admixti coaguli ratione intra ventriculum coire ac densari paratum est. Alioqui enim foris coagulatum lac, nisi fortè largiore copia ingestum fuerit, innoxium esse quotidiana docet experientia. Potest tamen & citra coaguli mixturam lac copiosiùs & aceruatim haustum in ventriculo cogi, & eadem quæ admixto coagulo inferre symptomata: maximè si crassius illud sit, ventriculi autem & hepatis intemperies calidior siccióque fuerit.

πυτίου σὺν ὄξει] Dioscor. in *Ἄιμ.* coagulum commendat leporis, aut hinnuli, aut hœdi, aut agni, aut capreæ, aut bubali, aut vituli, itidem ex aceto. Lib. verò 2. de mat. med. post enumerata illorum animalium prætereáque aliorum quorundã nomina, coagulum omne promiscuè coagulato lacti ex aceto resistere prodidit. At Gal. 2. de antid. coagulum ex aqua propinat, vel laserpitij & thymi æquas partes ex aceto mulsa. Scribonius itidem coagulum agninum, leporinum, porcinũ ex aqua desiderat. Leporinum verò cæteris anteponit Gal. 10. simpl. Sic & Aëtius. *Hu*, inquit, *maxime habetur magnum omne, maximè verò leporinum, tum aceto potum. Etenim coagulum recentiter lacti iniectum, ipsum cogit atq; densat: id verò quod tam multum est, simpliciter mistum dissoluit.*

μελαμπόδιος πὶ] Menthæ meminit Nicander: a mentham quoque cum aceto exhibet Dioscor. in *Ἄιμ.* alios verò subdit mentham cum vrina propinare. Attamen quam ille *μίνθαν*, hic *ἡδύοσμον* citra discrimen nominat: quanuis inter vtranque vocem discrimen agnoscere videtur Plutarchus in Sympos.

δίδου πὶ καὶ ὄξει] Paulus, *δίδου πὶ καὶ οἴνῳ*. quam lectionem secutus est Ruellius. Potrò præter hoc loco recensita remedia, Dioscor. in *Ἄιμ.* vt & 5. de mat. med. passum copiosum commemorat. Vtrobique etiam acetum tepidum. Nicander aceti partem vnã & passi partes duas propinat.

πλὴν πλυντηριλιὼ ὑείου] Paulus, *πλὴν ὑείλιὼ*. quasi *fæminam* aut *luto traiectum lixiuium*. Sed tum hic, tum illic legendum hauddubiè, *πλὴν πλυντηριλιὼ*, per *υ* non per *ι*, vt intelligatur lixiuia, qua *πλυντηριλιὼ*, hoc est, *pueorum crustas* & cæteri coactiliarij expurgandis lanis vtuntur: *lixiuium unde operantur mathiarij* nominat Marcellus, cap. 14. Id genus autem lixiuij cæteris præfertur, siue quia ex cremata vini fæce paratur, adeóque acrius & maiore incidendi detergendique vi præditum est, siue quia ex lana succida, quæ in eo madet, quæque eo abluitur, partium tenuitatem adeóque insigniorem vim medicamentosam asciscit. Eapropter & Gal. 6. Meth. ad neruum punctum alterius medicamenti penuria eo se fœliciter vsum prodidit. Idem porrò lixiuiũ ab aliis etiam *ὕδωρ πλυντηριακὸν ἢ πλυντήριον*, seu *ὕδωρ πλυντῆρι*, ab Aëtio verò, *πλυτὸν ἢ πλυντήριον*, appellatur.

CAP. XXVII. *καὶ ὑπνῳ ἢ ὠδῇ*] Præter hæc symptomata Lithargyri veneno superuenientia, alia etiam commemorantur ab Aëtio & Auicenna, quæ ab Autoribus ipsis repetere facile

cuique fuerit.

ἐρμίνου ἀγρίου] Cùm in vulgatis exempl. haberetur, ἐρμίνου ἀγρίου σπέρμα ἢ πόαν, Goupylus hunc locum ita legendum cẽsuit ex vtroque antiquo codice, Paulo, ac ipsis etiam interpretibus: ἐρμίνου ἀγρίου σπέρμα, ἀμύρης < ἢ καὶ ψίδιον, ὕσσωπον ἄλλο σπέρμα, &c. quem quidẽ secutus est Ruellius. Aldinus codex pro, ἐρμίνου, habet, πέρμνος, seu potiùs περμήνου, hoc est, ervi bitabi, quæ lectio Manardo placuisse videtur. Hermini simpliciter, & & sine addito ἀγρίου, mentionem fecêre Nicander & Dioscor. in Ἀντιδ. Apium verò syluestre desiderat hic idem Autor, in Ἀντιδ. cùm tamen Nicãder, Paulus & Aëtius σελίνου simpliciter meminerint. Porrò prꝛter ista remedia Nicãder & Dioscor. in Ἀντιδ. οὔρους ὑπερικὸν, hoc est, hypericum montanum cõmendant: & hîc quidem prætereà, limonium. Quòd ad myrrhæ dosin spectat, nimia certè videtur. Quamobrem pro drachmis, obolos potiùs vel duos ex Nicandro, & Dioscor. in Ἀντιδ. vel tres ex Aëtio reponẽdos esse suspicor cum Cornario viro doctiss. Scribonius piper, myrrham & apij semen pondere pari in vnum miscet, ex eóque medicamento denarij vnius pondus dat in vini cyathis tribus quatuór ve quotidie potis. Cæterùm cùm citra controuersiam duo sint in curando Lithargyri veneno scopi, rosionem, inquàm, impedire, & corporis tumorem discutere, illa modò remedia ab Autore vt & à Nicandro proponuntur, quæ flatus discutiant, vrinas retentas prouocent, sudores promoueant, adeóque corporis tumorem siccando resoluant: rosionem verò inhibentia ideo fortasse prætermittuntur, quòd alibi iam ad nauseam vsque repetita fuêre, nimirum lac & quæcunque, ceu pinguia viscidaque, exasperata leuẽdi ac velut oblinendi vim habent.

μετὰ ταύρου] Columbinum stercus laudat Aëtius cum vino & oleo, aut cœnomelite & oleo. Dioscor. verò in Ἀντιμελίοις ἀκτῆρα τὸν ἀπὸ περιστερῶν μετὰ ταύρου.

CAP. XXVIII. γάλα πόαλον] Aëtius: *Lac asininum recens mulctum bibitum & vomitione reddendum.* Addit potrò Dioscor. in EVpor. mirificè muari qui ex auro lamellam perexiguam rotundam deuorarint. Huic enim Argentum vinum propter cognationem circunfusum & adhærescens, vnà cum auro per sedem prolabitur.

CAP. XXIX. καὶ ἀφροῦσαι] In prætatione horum Alexipharmacon Dioscoridis itémq; Paulus, inter metallica venena adarcen & plumbum recensuerunt. Adarcen tamen vterquè hîc omisit. Vnus Paulus plumbi meminit.

πλάτωνος] Ald. cod. habet, ἀμάρας, atq; ita quoque legitur apud Paulum: sed quicquid voluerit Manardus, lectio nostra potior est.

καὶ ὑπὸ τῆς πράσου] Placet Pauli lectio, λειχανίσμου ἢ πράσου: reliquæ voces redũdant, & à sciolo quodam contextui insertæ videntur, qui quod de tragio frumentaceo intelligi debuit, ad tragi herbæ semen perperàm transtulit: sed neque patitur syntaxis, vt ista in nominatiuo casu efferantur. Apud Aëtium αὐτῷ πράσου, χόρτου legitur, non ita magno discrimine. Addit verò idem, decocta huiusmodi, protinùs vt assumpta sunt, vomitione reddi oportere.

CAP. XXX. φθὶ λαγῳοῦ] Cornarius tum hoc caput, tum & duo proximè sequentia cõmodiore loco reponit post cætera ex animalibus venena, exemplo Pauli & Aëtij: qui vna eádémque serie venenata animalia persequuntur.

ἔμετος χαλεπὸς] Vomitum frequentem & variis coloribus permixtum consequi refert Dioscor. in Ἀντιμ. Gal. in lib. de Theriaca ad Pis. à Lepore marino priuatim vlcerari pulmonem scribit, sicuti vesicam à cantharidibus: id quod tamen inter alia signa omisêre Dioscorides, Paulus & Aëtius. Verùm istam vlcerationem pulmonis fortasse consultò prætermisêre, quia tardiùs sese patefaciat: ea verò duntaxat signa & symptomata commemorare contenti fuêre, ex quibus illico veneni genus deprehendi posset.

ὕπνος, ἴλιγγοι] Rectiùs fortasse legas, ἢ ἴλιγγοι, quemadmodũ habetur in EVpor. Huc adde quòd & Plinius, Auicennaq; itémque Rasis cõtra Leporem marinum lac muliebre commendarunt. Neque verò solum lac muliebre aut asininum, sed & caprinum atque bubulum pleriq; Medicinæ proceres in eum vsum prædicant.

μαλάχης ῥίζης] Maluæ non quidem radicis, sed caulis meminit Dioscor. in Ἀντιμ. Rasis aquam decoctionis maluæ, itémque succum foliorum althææ commendat.

ἢ κυκλαμίνου] apud Paulum malè pro cyclamino legitur, peucedanum. Aëtius cyclamini radici pondus adiicit drachmarum quatuor, fortasse minùs rectè. Auicenna obolis octo, hoc est, scrupulis iiij. contentus est.

ἢ σκαμβρίου] Addunt alij, ἢ < ἀ. σκαμβρίου, quo modo etiam legitur apud Paulũ: Aëtius habet, veratri nigri drachm. j. aut Scammoniæ scrup. ij. cum bubulo lacte aut aqua mulsa. Cæterùm vtique huic medicamento purganti Auicenna, Rasis & Albucasis addunt agaricum, succum glycyrrhizæ & gummi tragacanthæ, atque ex his simul mixtis pilulas conficiunt, quas altero tantùm die, postquam symptomata sese patefecerunt, exhibendas esse monent.

ῥοᾶν τῶν κυρηναίων] Cornarius, ῥοᾶν τῶν κυρηναίων ἢ ἐρυθρίδων λίθων, restituit ex Actio. Scribonius Largus Punicorum acinos in hunc vsum assiduè edi iubet. Nicander tum ipsos acinos, tum & succum iis expressum commendat. Plinius, lib. 23. cap. 6. *Ex acerbo*, inquit, *Punico fit medicamentum contra Leporem marinum, hoc modo: Acinus detracto cortice tusis succóque decocto ad crassitudinem cum croco & alumine saissi, myrrhæ, melli Attici feliciis, &c.* Quòd ad Cedri baccas spectat, eas aduersus Leporis marini potum assumi præter Aëtium testatus est Dioscor. lib. 1. de mat. med. cap. de cedro, itidémque Plinius, lib. 23. cap. 5. Sed & ũdem omnes, locis ũsdem, contra venenum Leporis marini Cedri succum seu potiùs Cedriam prædicant in passo bibitam. Sic quoque tum cedriæ, tum & cedri baccarum meminit Dioscorides in EVpor. ex passo aut vino. Quare siue κεδρίας λίθου, siue κεδρίδος λίθου hoc loco legas, parum refert. Cæterùm Nicãder Cedriæ obolum exhibet: Asclepiades apud Gal. 2. de Antid. eandem oboli vnius aut dimidij põdere passo maceratam propinat. Scribonius duo aut tria dãtcius cochlearia per se, vel ex passi cyathis duobus tribúsve. Mirum porrò picem Cedriã Lepori marino aduersari, cùm eam inter ἀντιπάθειαν medicamentorum genera haud postrè-

mam esse constet.

καὶ χλωὸς αἷμα] Plin. lib. 29. cap. 5. *sanguinem anserinum* scribit *contra lepores marinos valere cum aqua dei portione.* Aëtius, eundem adhuc calentem cum passo propinat.

καὶ πίνειν] Dioscor. in Ὕστ. καὶ πόνος μέτος πίνειν. Ego legendum iudico, quemadmodum in veteribus libris reperisse se Goupylus annotat, & πίνειν ὠφελεῖ μᾶλλον, nisi præterea addere placet, πίνοντος οἶνον μαλακώτερον ἐπ' οὐρῆσι, quasi voluerit Dioscorides, eiusmodi cancris dilutum vinum superbibi oportere.

Cap. xxxi. φρυνὸς ὁ βάτραχος ὁ λεπτὸς] Sic etiã legitur apud Paulum cum disiunctiua particula, ἢ, vnde plerique existi maucrunt φρυνὸν καὶ λεπτὸν βάτραχον vnum & idem esse ranarum genus: cùm tamen illa in sicco, hæc in aquis degat. Apertiùs autem has distinguit Aëtius: qui quidem & Rubetæ & Ranæ palustris venena diuersis capitibus persequitur, ac versusque diuersam, quanuis haud ita dissimilem, tradit curationem, præterea Rubetã duplicem cõstituit, φρυνὸν inquàm seu ἄφωνον, hoc est, *mutam*, quam quidem in arundinetis potissimùm roris tactu victum quæritare scribit, & φωνητικὸν, hoc est, *vocalem*: atque illam duntaxat exitiosam esse censet. Nos eandẽ cum Vergilij bufone & Luciani φυσαλῳ esse existimamus, ita dicto ἀπὸ τῆ φυσᾶν, quòd ira percitus adeò sese inflat ac intumescat, vt sæpe crepet ac rumpatur: ideò etiam vulgo nobis *Crapaud* appellatur. Ad eundem quoque modum e Ranis aquaticis quædam sunt venenatæ, reliquas veneni penitus expertes esse quotidiana docet experientia.

οἷον δὲ καὶ συμπτώματος] Eorum symptomatum quæ in commune vtriusque Ranæ veneno supervenire refert Dioscorides, priuatim alia Rubetę, alia palustri Ranæ tribuuntur à Nicandro. Aëtius verò quotquot hic recensentur symptomata omnia, ranę Rubetę ascribit: peculiariter autẽ Ranę palustri alia tribuit, stuporem, appetitus dejectionem, oris humectationem, nauseam, vomitum & leuiorem καταψυξιν.

βοηθήματα] Aduersus harum Ranarum venena, plura reperies remedia apud Nicandrum & Aëtium, itémque Dioscor. ἐν παρ. quæ tamen ipsa variis etiam locis habentur in lib. Dioscor. de mat. med. itémque apud Plinium.

καλάμου ῥίζης] Praxagoras, teste altero Nicãdri Scholiaste, non quidem radicem, sed viridem arundinum partem commendat. Cæterùm Aëtius radicem arundinum earum deligit, in quibus ipsæ Ranæ pascuntur, aut cyperi ibidem enatæ, vtranque ex vino, quemadmodum etiam habetur apud Dioscor. in EVpor.

Cap. xxxii. περιχύσεις] Inter notas haustæ (seu epotæ) Hirudinis addit Paulus, floridi sanguinis excreationem.

διαχαραλίζουσι] Lege, διαχαραλιζίσου δὲ νίτρου σμύρνης, καὶ χαλκάνθου σμύρνης ἴσον αὐτῶν. Alioqui si αὐτῶν legere magis placet, σμύρνης αὐτῶν, vertendũ fuerit, *cum aceto myrrhæ*, cuius scilicet vis sit remissior aut languidior.

καὶ δὲ τῷ ὑφ' ὕδατος] Vel hìc legẽdum, καὶ δὲ τῷ ὑπὸ τῆς &c. vel post, καὶ δὲ τῷ ὑφ' ὕδατος περιούσας, addendum, οἷον ἐκ χαλκῆς, aut ἐλαίας. alioqui sensus non constaret.

ἕως ἄχρι στραγγάλου] ἄχρι στραγγάλου, hoc est, *ad collum usq;*, addit Aëtius: pro quo perperàm apud Paulum legitur, ἕως μέσου ἀλδοῦ. Hæc arte verò quomodo excutiantur Hirudines declarat Aëtius: *Dum enim Hirudines, quarum natura frigidas amat aquas, balnei calorem refugiunt, sursum ad os irrepũt, quo fruantur aquæ in ore contentæ, quamque suorum de permutari oportet, refrigerio. hinc verò tum demum facilè expui possunt.* In eundem vsum videtur nix non quidem absorbenda, seu ex aceto, vti voluit Aëtius, seu ex posca, vti Paulus, sed potiùs ore aliquantisper continenda: attamen & ipsam bibendam exhibet Galen. ex Asclepiadis sentẽtia, 2. de Antid.

ἐλλείποντες] Coniectanea seu nostra, seu aliorum Dioscoridis Interpretum, quantumuis probabilia, hactenus ad hęc nostra Scholia perpetuò reiiceramus: quia semper fuit religio citra certam veterum & manuscriptorum exemplarium fidem in recepto contextu quicquam immutare. Attamen ista quæ sequũtur a 32. capite audacter distinguere, & ab iis, grauissimorum Authorum Pauli & Aëtij exemplo, caput alterum auspicari visum est. Quin & ex iisdem Autoribus quę priùs nimiùm corrupta, imò planè deprauata videbantur, in integrum restituere simul & semel coacti fuimus.

Cap. xxxiii. πάσσει ὕδῃ] Ista & penitùs deprauata & perperàm hactenus in vulgatis exemplaribus a præcedentibus seiuncta fuisse, nemo non videt: quæ sic hauddubiè ex Paulo restituenda veniunt: καὶ οἱ παροι πάσσει κάκτου. ὕδῃ δὲ βάτου καὶ ὕδῃς τῆς καλουμένης κάκτου. Quæ verò qualisque sit planta in carduorum genere κάκτος appellata, docet Theophr. 6. de plantis, itémque Plinius. lib. 26. c. 16. quibus locis scribitur, auferenda cacti lanuginosa semina, si quis fructum citra noxam esse voluerit: vnde palàm fit, pappos castanõ verè flores esse, vti voluit Autor. quanquã pandente sese cono tandem in flores erumpũt: sed illa potiùs lanuginosa semina. Quid quod Athenæus, 2. dipnosoph. post commemorata ipsa Theophr. sti verba, Cacton eam esse pronũtiat, quæ Romanis duabus duntaxat immutatis literis *Cardus*, seu potiùs *Cardum*, dicta est, & Græcis κινάρα appellatur. Illud si ita est, quæ partes in Cinara hodie vulgari planta papporum nomen mereantur, non amplius in dubio relinquitur. Nempe in edulibus cinaris lanugines eæ sunt, quibus illud subiacet quod cerebro palmæ teneritate simile est, quódque Theophr. ψαλιὸν nominat, Plinius ascaliam, Athenæus σπαλιάδα.

Cap. xxxiiii. κατάσσεται] Paulus, κάτωμα, pro κατάσσεται: quam quidem lectionem dum sequitur Cornarius, κάτωμα non incpte hoc loco interpretatur, *enematis factum vacuationem*, quemadmodũ & anteà cap. de Cicuta. Illum ego eò lubentiùs sum imitatus, quòd & Aëtius, dum hæc ipsa profert remedia, clystere factam vacuationem apertè designat his verbis: *In his statim nemem secare oportet, & per clysterem vacuare.*

IN LIBRVM ΘΗΡΙΑΚΩΝ.

ἢ ἀφεδρωτικὸν πάνυ] Quanquam etiam πάνυ lectionem tolerari posse minimè negauerim, attamen laudo cum Manardo Marcelli castigationem, qui ex vetusto quodam codice, ἀφεδρωτικὸν ὄντα, restituit: quo modo & ipse Cornarius legendu cẽsuit. Pollet &, ἀφεδρωτικὸν ὄντα, legi, quemadmodum habetur in extrema libri clausula.

δεῖ τοίνυν] Lego, δεῖ δοκεῖν. Reliqua, quæ proximè sequuntur, vsqueadeo deprauata sunt, vt mihi fat fuerit ex iis qualencunque sensum elicere: maxime cùm Interpretum, qui ad manum fuerunt, nullus mihi satisfaceret. Sed & plenq; alij huius præfationis loci adeò corrupti sunt, vt citra probatioris exemplaris fidem restitui vix possint; siquidem plerunque Autor aliud omnino voluisse videtur, quàm quod ipsa verba sonãt. Iccircò & difficillima quæque loca ad marginẽ asterisco signare fui contentus, quò liberius torer vniuscuiusque iudicium.

CAP. 1. τῆς ἔξωθεν καταστάσεως] Rabiosorum canũ indicia præter hæc alia tradit Paulus, lib. 3. hisce verbis: ἡ δὲ διάθεσις αὐτῶν ἐστιν, οἱ μὲν ὅλον τὸν χρόνον ἐπὶ τῶν ἀφροδισίων ὀρέγονται, καὶ ἐπ' ἄκρον ἐκτείνουσι. Rursumque paulò post: καὶ ἀφροδισιακοὶ μὲν εἰσι καὶ οὐκ ἀφορεῖς, ὡς ἐπὶ τῶν ἄλλων γίνεσθαι. hoc est, *ac libidinosi quidem sunt, nunquã tamẽ pauent, præcipuèque anhelant vt plurimum & aures mouent: planè quoque muti sunt ac velut insani, vt ne domesticos quidem agnoscant.* Hæc eadẽ totidẽ penè verbis repetit Achmeth lib. 7. ca. 14. Autor minimè contemnendus, cuius codicem Græcum manuscriptum habemus, quémq; haud ita pridem Latinæ consuetudini tradendũ Ioanni Saraceno Charitensi amico non vulgari commodauimus. Sed & alia sunt Rabidi canis indicia, ab Autore libri de theriaca ad Pisonem reconsita, siue Galenus is fuerit, siue quis alius, nẽpe corporis gracilitas & siccitas, oculi rubentes, cauda demissa, linguæ exerta & tãquam bile colorata, &c. quæ paulò aliter additis etiam nonnullis repetit Aëtius, serm. 6. c. 24.

καὶ ποτὲ μὲν φοβοῦνται] Pro his legitur apud Paulum: καὶ τὸ ὕδωρ φοβοῦνται ὁρῶντες καὶ ἀποστρέφονται, ποτὲ δὲ καὶ πίνουσι. hoc est, *ac nonnulli quidem conspectum oblatam ne aquam refugiunt, aliqui etiam liquorem quemuis auersantur.* Idem Autor huius ὑδροφοβίας, id est, *aquæ pauoris*, causas paulò pòst indagare nititur. Sed & ex Oribasio, quibus indiciis Rabiosi canis morsus à cæterorum canum morsibus distingui internoscive possit, edocet.

διάκρισιν ἔσεσθαι] Sit legitur in Ald. Dioscoridice, itémque apud Paulum: at rectiùs Achmeth noster, apud quem isthæc omnia totidem verbis exscripta reperiuntur, διάκρισιν δὲ ἔσεσθαι. Cætera, quæ in hoc capite occurrebant scripturę menda, ex ipso Paulo corrigere facile fuit, vti & supplere nonnulla quæ desiderabantur.

μανίαν ἢ ἀδημονίαν] Huc spectat illud Celsi, lib. 5. ca. 27. *aquæ timore oppressis in angusto spem esse.* Itémque illud Ouid. 1. de Pont. eleg. 4.

Soluere nodosam nescit medicina podagram,
Nec formidatis ulla medetur aquis.

At Plinius lib. 25. ca. 2. Rabidi canis morsum, qui pauorem aquæ potúsque omnis iam attulisset odium, insanabilem quidem ad sua tempora fuisse testatur, verùm oraculo demùm quodam vnicum remedium repertum, radicem rutę syluestris quam Cynorrhodon vocat, & ab eius potu primum seruatum militem quẽdam Prætorianum, incipiẽtem aquam expauescere, postea quisquis auxilium simile tentauit.

CAP. 11. περὶ τῶν πόντων] Multis modis tũ in medicamẽtorum, quæ hanc è cancris antidotum ingrediuntur, numero & proportione, tum etiam in cancrorum præparatione, tum denique in ipsius antidoti dosi & vtendi modo variant Dioscorides, Galenus, Paulus, Aëtius & Actuarius. Enimuerò in Mithręę compositione, quæ quidem extat apud Gal. 2. de antid. nisi, quod ego suspicor, mendum subest, terebinthina adiicitur pari cum gentiana pondere. Galen. simpl. ibus addit ex sententia AEschrionis Empirici. Paulus verò, ex aliorum sententia verùs quàm sua, perdicis sanguinẽ adiecit. Præterea in illa Mithręę compositione gentiana ad cancrorum cinerem dupla est, vti & apud Actuarium, cõtrà quàm apud Dioscoridem hoc loco, & 2. de mat. med. & Damocratem in senariis Iambicis, qui à Gal. 2. de Antid. recitantur. At ipse Gal. 11. simpl. itémque Aëtius cineris cancrorum in patella æris rubri crematorum partes 10. desiderat, gentianæ 5. & thuris vnam. Rursum cancros hoc loco Dioscorides itémque Mithreas & Damocrates vrunt ex vitis albę sarmentis, & cinerem cancrorum sarmentorúmque simul & semel vsurpare videntur. Dioscorides lib. περὶ ἄμπ. conceptis verbis cineris vitis albæ, tanquam seorsim excepti, meminit. Idem 2. de mat. med. nulla facta cinerum sarmentitiorum mentione, solius cancrorum cineris meminit. Gal. ex sententia AEschrionis cancros viuos in patella æris rubri exurit. Paulus in eadem, subiecto attamen igne è sarmentis vitis albæ. Adhæc idem ipse Paulus Cancros censet crescente Luna sumendos ante Solis ortum. AEschrion eos vrere solitus erat æstate post Canis ortum, quando Sol in Leonem transisset, nec nisi decimaoctaua Luna. Aëtius huiusmodi obseruationem, ceu curiosiorem & superstitiosam nimiùm negligere videtur. Auicennas cinerem etiam gentianæ desiderat, ita vt gentianam æquè atque cancros cremari velit ac in cinerem redigi. Porrò ex iisdem modò commemoratis Autoribus sunt, qui aquæ pauore periclitantibus id medicamentum tantummodò per tres dies propinari velint: quo in numero sunt Dioscorides 2. de mat. med. & lib. περὶ ἄμπ. itémque Mithreas: quanquam iste deinde sex etiam dierũ meminit. Paulus & Autor hic noster ad quatuor dies eius vsum continuare videtur. At Gal. 11. simpl. itidémque Aëtius singula quotidie cochlearia ex aqua propinant ad diem vsque quadragesimum: attamen si serùs instituatur curatio, huius medicamenti pondus ingeminant. Actuarius hanc antidotum bis térve aut sæpius è vino albo exhibendam censet: at oborto iam aquæ metu, etiam frequentiùs. Denique alij ex vino largiore parcioréve, alij ex aqua medicamentum propinant, velut & antè monuimus. Tanta cùm sit in hac Antidoto describenda Autorum varietas, quis-

quis ea vti voluerit, rectè penſitatis (vti prudentem Medicum decet) circunſtantiis ſuum interponat iudicium.

τριπλάσιον δὲ] Ex locis Galeni, quantumuis depravatis, quibus hæc ipſa *ἀδὲ τριφάρμακον* Antidotum tum ex ſententia Mithreæ, tum ex ipſo Damocrate recitatur, facile eſt colligere, qua doſi & quot ſpatio dierum ea exhibenda ſit. Scilicet per triduum ſtatim ab illato morſu, diebus inquàm ſingulis ſingula antidoti cochlearia ex ternis vini cyathis propinanda. Quòd ſi quis ſecundo demùm die ab inflicto vulnere eadem vti incipiat, eo die cochlearia duo ſumi ex cyathis vini tribus: reliquis diebus vno cochleari contentum eſſe volunt cum pari vini menſura. *ὁ γὰρ οἶνος αὐξάνει*, vti Gal. loco citato ſemel aut iterum inculcat. Sin tertio tantùm die vti cœperit, cochlearia tria ſumi oportebit, reliquis verò diebus quotidie ſingula. Hac ratione tantundem pulueris hauriet qui triduo ab inflicto vulnere, atque qui prima ſtatim die bibere cœperit. Verùm Autor hoc loco, quantùm quidem ex ipſius verbis colligere licet, tria pulueris cochlearia quatuor vini cyathis diluit, atque totum id in quatuor doſes æquales partiri videtur: at ſi altero tantùm die ab inflicto vulnere exhibeatur, æquè ac illi doſin duplicat: ſin tertiò, triplicat. Iccircò etiam legendum iudico, vt præcedentibus conſequentia rectè reſpondeant, *δυσὶν ἢ τρισὶν ἡμέραις δοτέον*. Lib. verò 2. de mat. med. cap. de cancris, hoc idem remedium triduo propinatur ex vino, non addito vini modo. Sed in lib. *Δυν.* cineris cancrorum crematorum drach. j. vel iij. (quanquam ſic, ni fallor, mendosè legitur) gentianæ drach. j. cineris vitis albæ drachm. ij. miſcetur, & ad dies tres ex vino albo potui dantur. Paulus cinerem cancrorum ac gentianæ, eadem qua noſter hic Autor doſi, addito vino ſubigit, ſed vini duos tantùm cyathos deſiderat, vt dimidia vini parte contentus eſſe videatur: attamen totum id ad dies quatuor propinat.

πλὴν τῆς ἀφορισθείσης] Huius *ἀφορισθείσης* ſeu præfinitionis ſemel aut iterum meminit hoc capite Dioſc. ſed quodnam eſſet tempus illud præfinitum, nondum docuit: docebit verò capite proximè ſequenti, vbi vt plurimùm die ab illato morſu quadrageſimo horrendum illud *ὑδροφοβίας* ſymptoma ſolitum ſuperuenire tradit. Iccircò & vbi habetur inferiùs, *ἐὰν μὴ ἡμερῶν*, velim addi, *ἐὰν μὴ μ' ἡμερῶν*. At Paulus non ita magno diſcrimine inhibendam cicatricem monet ad diem vt minimùm ſecundum ſupra quadrageſimum.

CAP. III. *καὶ γλυκέων καὶ γάλακτος*] Paulus eúmque ſecutus Achmeth noſter, cuius & antè meminimus, *οἴνου γλυκέος ἀκράτου καὶ παλαιοῦ ζωμοῦ*, hoc eſt, *meraci pariteris dulcis ac veteris* meminerunt, non item paſſi: at Auicenna vtriuſque tum paſſi, tum etiam meraci mentionem facit. Cæterùm hæc de qualitate ciborum & potuum *ἀναλήψεως* conuenientium ab Autore noſtro tradita, etiam ab aliis qui ipſum ſecuti ſunt, totidem penè verbis recitantur: ſed quòd ad illorum eorundem quantitatem ſpectat, vnus addidit Aëtius: nempe vitandam in victu intemperantiam & parcitatem nimiam: hanc verò multò magis, quòd humorum malignitatem adaugeat, id quod vlceri iam ſuapte natura maligno peripcommodum eſſe conſtat, &c.

Ἡ δὲ θηριακὴ λεγομένη] Huius Theriacæ EVpatoriæ meminit Galenus, 6. de comp. med. *κατὰ γένη*: ac eadem, niſi fallor, eſſe videtur cum ea quam idem ipſe, 2. de Antid. antidoton inſcribit Mithridatis EVpatoris, *ἀφ' οὗ καὶ τοῦτο* cognominatam: vnde facile conſtat ita dictam à Mithridate EVpatore ceu inuentore, non item quòd eupatorio herba temperaretur, vti viſum eſt Ruellio: maximè cùm in illius deſcriptione nulla penitùs fiat eupatorij mentio.

μικρὰ ἐπιπάσσειν] Paulus habet, *μικρὰ τοῦτο*, ſimpliciter, vt ex præcedentibus; *μίσυος*, ſupplendum videatur: noſter Achmeth, qui ex Paulo videtur exſcripſiſſe, *ἐπιπάσσειν δὲ τοῦ μίσυος τοῦτο*. Sed vtrobique vel, *τοῦτο τοῦ*, vel *τούτου*, ex hoc noſtro Autore reſtituendum nemo non videt. Aut certè poſt illud, *καὶ δὲ καὶ μικρὰ ἐξ μύρου*, interſerendum, *καὶ μετ' ὀλίγον*. tùm ſequitur illud *καὶ μικρὰ τούτου*, vt ſubaudiamus, *ἐπιπάσσειν*.

ἀφεψήματος δὲ κυάθου] Paulus & Achmeth, *ἐφεψήσας*, addunt, quaſi etiam poſt principia cucurbitulæ inutiles forent: cùm tamen Cucurbitulæ ſubinde repetitæ *ἀναπληρώσεις* quæ deinceps commemorant remedus minimè cedant.

ἀφεψήσαντος] Paulus, *μὴ ἀφεψηθέντος*, quod eodem recidit. Aldinus verò codex perperàm habet, *ἀφεψηθέντος*, citra negatiuam particulam. Sed quæ proximè ſequuntur planè depravata, ſic reſtituenda videntur: *ἢ γὰρ ἰσχὰς ἢ σὺν τῷ βαλάνῳ τραγακάνθης μικρόν τι διδόασιν*.

ἰδρώσιος] Vnus Achmeth noſter *αὐτὸν τὸν ἰδρῶτα*, *ἰδρώσεως*, videtur legiſſe. Et certè quidem aquæ chalybeatæ potum in hoc affectu plerique Medicinæ proceres valdè commendant.

CAP. IIII. *ἀφορισμὸν δὲ*] Paulus multò plures morſus Phalangiorum notas tradit, quæ quidem Autori noſtro fortaſsis exciderunt. Rurſum longè plures quàm hic ipſe refert Aëtius: qui quidem præter tetragnathos Phalangiorum ſex genera recenſet, ſingulíque deſcribit, nempe *ῥάγιον*, *λύκον*, *μυρμήκιον*, *κεφαλοτριφάλαγγον*, ſeu *τριφαλαγγίτην*, *μελανίππιον* & *σκυτάλην*. At Nicander eorundem genera nouem enumerare videtur, quæ tamen ſingula rectè depingit, nempe *ῥάγιον*, quem ille *ῥάγιον*, AElianus *ῥᾶγα* nominat, *ἀράχνιον*, *κυνάγχην*, *ἀκρίδιον*, qui *λύκος* eſt Aëtij, *δίκτυον* ſiue *ἀρανέαν*, id quod inter legumina Cantharidi ſimile reperitur, quod phalænam ſeu papilionem ita dictum refert, denique & illud quod in Perſea arbore educatur, quanquam hoc poſtremum priori modò recenſito haud ita eſt diſsimile. Varia quoque Plinius, lib. 29. cap. 4 Phalangiorum genera commemorat, ſed eorum nonnulla inter ſe confundere videtur. Porrò Nicander propria morſus ſingulorum ſigna ſigillatim perſequitur: Aëtius verò cæterorum quidem omnium morſus ſigna communia vno contextu complectitur, at vnius cranocolaptæ morſus aliquot peculiaria ſigna deinde ſubiicit.

ἐκ τοῦ ὑγροῦ σύμπτωμα] In Aldino codice legitur, *σύπτωμα*, quam vocem Hermolaus *contractionem*, Ruellius *collectionem*, Marcellus *aſtrictionem*, Lacuna *grauitatem* vertit. Cornarius, *σύντηγμα*, potiùs, hoc eſt, *compunctionem*, legendum ſuſpicatur. At ego paucis immutatis, *ἄλγημα*, reſtituo, idque eò lubentiùs, quòd & Actuarius, inter alia morſus

fus Phalangiorum signa, doloris circa lumbos meminit.

CAP. V. γίνεται κινυμιάδος] Vtriusque Scolopendræ tum terrestris, tum etiam marinæ meminit Paulus, quippe cùm vtriusque morsus xenenatus deprehendatur: & ab huius quidem morsu tumorem aquosum atque pellucidum, ab illa verò rubentem excitari scribit. AElianus, lib. 7. de animal. marinam tradit illicò pruritum ac dolorem excitare, qualem vrtica, quod ipsum cecinit Oppianus.

CAP. VI. καὶ σκοπιὸς] Pro, σκοπιὸς, rectè Marcellus & Cornarius ex Paulo, σκορπιὸς, restituerunt. Ex eodem verò paulò pòst illud, οἱ ἐλαφὸς ἡμιόφθορος, legendum censeo, καὶ ἀναπαξ ἐπὶ μὴ πίωσιν, &c. Porrò Nicander, in Ther. Scorpionum genera octo enumerat, quorum nonnulla innocentiorem habent aculeum, ex cæteris alia aliis sæuiora infligunt vulnera. Sunt verò hæc Scorpionum genera, album, rufum, fuscum, viride, liuidum, cancro simile, pagurum referens, & μελίχλωρον. At AElianus, 6. lib. de Anim. nouem constituit eorundem genera, cãdidum, inquàm, rufum, fumosum (quod enim ille ξανθὸς, hic πυρρὸς appellat) viride, nigrum (quod liuidum Nicander appellarat) ventricosum (quod tamen ex sententia Nicandri vnum & idem cum liuido esse videtur,) πυρρὸν ἐλαφὸν, φλογοειδὲς seu flammeum, (quod cum Nicandri melichloro, nisi fallor, vnum & idem est) præteréque alatum: hic enim à flammeo alatum distinguit, quamuis etiam melichloro Nicander alas tribuisset. Cæterùm vt varia sunt Scorpionum genera, ita & varia symptomata ictum consequentia, quæ omnia Nicander sigillatim persequitur. Reliqui in genere Scorpionis ictum consequentia symptomata simul & semel omnia tradiderunt.

ἐνίοτε ἴσμους] Eadem Paulus & Actuarius, nisi quod Paulus μείζω ἕλκωσιν, hoc est, *penis tumefactionem seu arrechionem* adùcit. Sed Aëtius longè plura signa recenset, & inter alia huius ipsius ἐνίοτε ἰσμοὺς mentionem faciens, hanc distinctionem adhibet, vt quibus circa partes supernas inflictum est vulnus, iis locus sub alis: quibus verò circa infernas, inguina ipsa intumescant. Scripserunt itidem Arabes Medici, si in partibus infernis à Scorpione acceptum vulnus est, bubonas excitari, penem intendi & ventrem flatu tumescere: si verò in partibus superis, tumores sub alis fieri, & crebros è ventriculo ructus.

φύματα δὲ καὶ τὰ ἕδρας] Cornarius & Marcellus pro, φύματα, ὠδύματα, restituunt ex Paulo, qui sic habet, ὠδύναις δὲ καὶ ὠδυμάτων μετὰ ῥίγους δὲ καὶ τὰ ἕδρας ἔχουσι. Ego, φύματα, eodem planè sensu legere nihil dubito. Aëtius non erumpentium è sede flatuum crepitumve, sed ani procidentiæ meminit cum egerendi cupiditate.

CAP. VII. δικαντίνων.] Scribit AElianus, lib. 1. de animal. Pastinacæ radium, qui quidem è media cauda prosilit, esse ἀκανθώδεα, seu *inexpugnabilem*: eundem alio loco ait esse δικεντρώτην, & *acutissimè hominem perimere*. Sed & eodem teste, lib. 2. & 8. cætera quoque necat animantia, & arboribus etiamnum ἄκανθαν conciliat, dum eas protinùs arefacit. Iccircò etiam Nicander Pastinacæ κέντρον i. *aculeum*, ὀλεθρίην, hoc est, *pernicialem*, aut *maleficum* cognominat. Plin. lib. 9. cap. 48. *Nihil usquam*, inquit, *execrabilius, quàm radicis super eundem eminens Trygonis, quam nostri Pastinacam appellant.*

CAP. VIII. γίνεται φλεγμονὴ] Paulus morsus quem Mus araneus infligit eadem planè signa & symptomata recensèt. Nam πόνοι σφυγματίδες καὶ ἐρυθήματα, hoc est, *dolores pulsatiles ac rubores*, ipsam phlegmonem repræsentant, cuius hîc fit mentio. Aëtius paulò plura commemorat, præteréque Murem araneum egregiè describit.

CAP. IX. αἰδὼ καὶ ὄφις ἰταλὸν] Vipera πατ' ἐξοχὴν ὄφις, seu ἔχις nomine plerunque intelligitur. Vtranque verò, marem inquàm & fœminam (hanc ἔχιδναν, illam verò ἔχιν nomine Græci appellant) egregiè describit Aëtius, docétque quomodo hæc ab illa rectè discerni possit: præteréque vtriusque morsum, ex vulneris ipsius vestigiis apertè distinguit. Porrò longè plura quàm hoc loco morsus viperarum signa & symptomata non ab Aëtio tantùm, sed & à Nicãdro, in Theriacis, itémque à Galeno, in lib. de Ther. ad Pis. necnon etiam à Paulo & Auicenna commemorantur. Verùm quod inter cætera scribit Auicennas, marium quàm fœminarum morsum pernicioſiorem esse, mihi non mediocriter suspectum est: quippe cùm ipse Nicander & Paulus contrarium asseruerint.

καὶ χροιὰ δὲ ἐστὶν ἀλλοία ἔχθ] Aëtius pallorem & plumbeum colorem inter symptomata recensèt. Paulus ἄχροιαν καὶ πέλιον, hoc est, *corporis seu cutis decolorationem*. Quotquot verò sunt, non aliud quàm viuidi coloris, vt ita dicam, deperditionem designare voluerunt.

τὸ μὲν αἷμα ἰσχναίνεται] Aëtius primùm quidem sanguinem externi scribit, deinde verò saniem sanguinolentam & oleosam. At Paulus primùm quidem effluere sanguinem liquoremque sanioſum, postmodùm oleosum, tandem verò etiam ἰώδη, hoc est, *aruginosum*, quem *nonnulli*, inquit ille, *viperarum virus esse pronunciarunt.*

αἱμοῦς ἴσμους] Cornarius & Marcellus καὶ τὰ, ἴσμους, ἕλκους ex Paulo reponunt: & rectè quidem: quum in proximè præcedenti linea vomituum mentio iam facta fuerit.

CAP. X. σκυθίαις ἀμφισβαίναις.] Videtur Dioscorides Scytalen cum Amphisbæna confundere, quasi vna eadémque foret. Sed inter vtranque tamen discrimen esse satis testatur Lucanus, lib. 9. qui seorsùm vtriusque meminit, itidémque Nicander, Paulus, Aëtius, & Solinus: qui quidem hanc ab illa palàm distinxerunt. Fortassè verò non quidem figura, sed crassitudine tantùm inter sese differunt, quanquam Aetius ex eo etiam distinguit, quòd ἀμφισβαίνα vtrinque serpat *in geminum vergens caput*, vt Lucani verbis vtar: quam ob causam etiam à Nicandro ἀμφιπόλους, ab AEliano διφάλους cognominata est. Nihilominùs & Aëtius ipse vtriusque morsus noxas simul & semel proponit: sed, cõtrà quàm Dioscorides & Paulus, non multò grauiora ipsarum morsus agnoscit symptomata, quàm quæ muscarum, apum vesparúmve ictus comitari solent. Vnam verò Scytalen Chalcidicam, ceu longè nocentiorem, excipere videtur: quippe quam viperarum morsum imitari fatentur.

CAP. XI. αἷς] ὑπὸ δράκοντος] Quẽ δράκοντα Galenus, AElianus & plerique alij nominant, Nicander

ὑφίτης prima inflexione appellat, itémque χέρυδρος, quia sit φαγέδαινα, necnon etiam simpliciter ὕδρος quanquam ὕδρος veriùs ex Dioſc. ſententia is eſt, quem alio nomine χέρυδρος, Latini Natricem appellant: attamen iſta nomina manifeſtò confudit AElianus. Cæterùm ὑφίτης ſic dictum, quòd in quercuum radicibus victum quæritet, rectè deſcribit Aëtius, ac longè plura quàm noſter hic Autor eiuſdem morſus tradit indicia, ſer. 1. Tetr. 4. cap. 29. Sed quanta quámque dira ſit eius pethicies, ante ipſum expreſsit Gal. lib. de Ther. ad Piſonem Apollodorus, AEliano teſte. Paulus ipſiſſima Galeni verba recitat.

καὶ δύσις] Paulus αἵματι ὦν, δύσις, κρᾶσις habet, quod magis placuit Cornario. Sed Marcellum miror vocem hanc in Pauli codice minimè deprehendiſſe, aut certè negligentiùs percurriſſe: ſiquidem ſeſe negat in vllo Græcorum legiſſe, cuiúſnam partis δύσις hoc loco intelligi debuerit.

CAP. XII. βραχὺ δὲ καὶ] Galenus & Aëtius αἱμόῤῥοον ἀπὸ τῆς αἱμοῤῥοΐδος, ceu marē à fœmina diſtinguunt: & Aëtius quidē poſteaquàm eiuſmodi ſerpentem depinxit, in principio ex Hæmorrhoi morſu nihil effluere ſcribit, præter paucū quiddā idémque aquoſum: deinde verò ſanguinem è naribus ac ipſis etiam morſus foraminibus emanare: quin & quaſcunque corporis cicatrices, etiamſi conſanuerint, recrudeſcere ac rumpi, ſanguinémque profundere: his præterea accedere ſtomachi dolorem atque ſpirandi difficultatem. At ab Hæmorrhoidis morſu præter antedicta, etiam longè grauiora conſequi ſymptomata: oculorum ſcil. angulos ſanguine manare, itidémque gingiuas & vnguium radices, deindéque per vniuerſum corpus ſanguinem efferri, inſupérque dentes elidi, ac ipſas quoque gingiuas computreſcere. Idipſum de Hæmorrhoide prodidēre Nicander in Ther. & AElianus lib. 14. cap. 13. quo quidem loco addit, etiam ex auribus & cervice (fauces neſcio qua ratione vertit Interpres) ſanguinem cum bilioſa ſanie profluere. De hac ipſa Solinus in hæc verba: *Hæmorrhois morſu ſanguinem eluit, & diſſolutis venarum commercijs quicquid animæ eſt euocat per cruorem.* Sed & illud ipſum perbellè Lucanus, lib. 9. carmine expreſsit. Cæterùm varia menda quibus hoc Dioſc. caput ſcatere compertum eſt, facile fuerit ex ipſo Pauli codice reſtituere.

CAP. XIII. ἄσηπος ὅλως] Rectè Marcellus & Cornarius ex Paulo reſtituerunt, ἄνυπνοι ὁ καῦσος γίνεται, quos & ipſe ſecutus ſum. Teſte tamen Solino, *Preſter* (qui cum dipſade idem eſt) *quem peramaſſeris diſtenditur, enormique corpulentia mentis exuberatur.*

καὶ τὸ ὑπὸ τοῦ ὠτὸς.] Cornarius legit in hunc modum: εἰς τὸ αἷμα ὃ καθίσταται τὸ μετὰ τοῦ πόνου ἐπὶ τὸν ὦτον. Ego verò nihil muto: tantummodò αἵματι ὦν, τὸ δὲ ὠτὸς, legendum cenſeo, τὸ μετὰ, &c.

ἐξαγανάκτησιν] Cornarius ex Aëtij lib. 13. cap. 22. locum hunc ita reſtituit: ἐξαγανάκτησιν τῆς ὅλου σαγηνείας ἕξις ἐξαγανακτοῦσα τῷ δὲ ὑφιστανόν. quam quidem ſententiam & ipſe exprimendam duxi, quum alioqui vix vllus ſat commodus ſenſus ex Autoris noſtri verbis elici poſſet. *Sic paruò*, inquit Aëtius, *duobus pereunte modis à Dipſade peramaſſi: dum aut ob nullum ſitim excutiuntur, ſiquidem potum non ſi-mant, aut ob multum expletionem iis diſtentus rumpitur venter, vel inferné aeris inguina, vel aeris vnum ventrem, quemadmodum hyaropias accidere conſueuit.* De eiuſdem morſu vide Lucanum, lib. 9.

ὅλου τοῦ σαγηνείας] ἕξιν, inquit Aëtius, *neque per vrinas, neque per vomitum, neque per ſudores quoquam excluditur.*

ἐξαγανάκτησιν καὶ πόνους] Preſterem tamen Lucanus, lib. 9. toties citato, à Dipſade manifeſtò diſtinguit: quanuis vtrunque *horridum* cognominat. AElianus, verò, lib. 6. poſteaquàm Dipſadem ex Soſtrato accuratè depinxit, præter iſta Preſteris & Cauſonis nomina, alia etiam huic eidem tribuit, nempe μανιώδη, ἀμφιβαίνων καὶ πτερώδες. Eſt porrò Dipſas, ex ſententia Gal. & Aëtij, viperæ ſpecies, maritimis aut alioqui ſalſuginoſis in locis reperiri ſolita. At eandem Solinus & Iſidorus inter aſpidis ſpecies numerarunt.

CAP. XIIII. πᾶς ὃ καὶ ὕδρου] ὕδρος, nomine compoſito etiam χέρυδρος appellari, ſcribit Aëtius. Vtrunque verò hoc nomen iccircò obtinuit id ſerpentis genus, quòd ſit αἱμοβόον, ac, ipſo etiam teſte Nicandro in Ther. itémque Vergilio in 3. Georg. hyeme ac verè ſtagna colat, inareſcentibus autem paludibus in aridam exiliat. Latini Natricem appellant, quanquam natricem à cherſydro Lucanus, lib. 9. apertè diſtinguit. *Hoc genus anguium pulcherrimum nullo ſerpentium infernius eſſe veneno* aſſerit Plin. lib. 29. cap. 4.

καὶ πομφὸς ἀκαρέστατος] Nicander inter cæteras notas refert, æſtus magnos ardoréſque per vniuerſum corpus diſcurrētes. Addit verò Aëtius, oculorum vertiginem, exolutionem, vomitus bilioſos & fœtidos, ac motum totius corporis inordinatum, &c.

CAP. XV. πᾶς δὲ ὁ καὶ πίγχου] πίγχον, quem Dioſcorides inferiùs μίγχιδα appellat. Nicander & Paulus πιγχλοῦν nominant. Aëtio πιγχίας ſeu πιγχίνας, Lucano & Plinio Cenchris appellatur. Iſta verò nomina omnia ἀπὸ τῆς πίγχου, hoc eſt, *à milio* deducta ſortitum eſt hoc genus ſerpentis, ſiue quia ex Aëtij ſententia colore ſit circa aluum viridi, qualis in milij planta cernitur, ſiue quia varietā tingitur aluum pluribus iiſq; exiguis maculis milij ſemini ſimilibus: (quanquam Nicander non aluo tantùm, ſed & vniuerſo corpore variis eiuſmodi notis reſperſum eſſe teſtatur:) ſiue denique quia ferocius euadat florente milio, vti ſcribit Aëtius. Ab ea qua præditum eſt feritate ac ſæuitia, λύσσα quoque Nicander appellat. Eundem Aëtius etiam ἀκοντίαν nominat, quòd veluti iaculum vibratum corporibus inuolet. Verùm Nicander ἀκοντίαν ἀπὸ τῆς πιγχλοῦνος palàm videtur diſtinxiſſe, cùm ſeorſim vtriuſque meminerit.

πλὴν τοῦτο] Paulus & Actuarius habent, πλὴν κἀνταῦθα, quam lectionem, ceu potiorem, cum Cornario & Marcello ſequi placuit.

πανὸς δὲ μᾶλλον] Apud Paulum deeſt illud, πανὸς· & certè quidem αἵματι ὦν, πανὸς, legendum cenſuerim, πάνυ, ſeu πάνδ. Neque enim veriſimile eſt voluiſſe Eraſiſtratum partes corporis omnes corruptas reperiri, quippe qui nominatim iecoris tantùm, veſicæ & coli meminerit.

CAP. XVI. Ἔχις δὲ καὶ κεγχίνη] Κεγχίνη viperæ ſpecies eſt, ſic dicta ab eminentiis iuxta Nicandrum aliàs binis, aliàs quaternis, & iuxta Soli-

num, Plinium & Arabas, quadrigeminis, quæ quidem in ipsius capite cornicula præ se ferunt.

μαλὶ σκληρίας] Aëtius *capitis clausi frustulum nonnunquam assurgere* scribit; id quod perperàm videtur Auicennas intellexisse: quippe qui morsum sentiri tradiderit; quasi claui infixi. Porrò Nicander inter Ceraſtæ morsus symptomata commemorat, inguinum ac popliteum dolores, & cutis liuiditatem ex nativi caloris extinctione.

ἰχὼρ πυὶ μὲν μέλας] Sanies, inquit Aëtius, *profluit tum colore, aut nigriore, maximè per ambitum, velut in cruentatis & fugillatis aliàs fieri consuevit.*

κἀπισπόδιος ἢ χλωρὸς] Vulgatam Dioscoridis & Actuarij lectionem retinuimus: quanquam malim plurali numero ista hæc efferre, κἀπισπόδιος ἢ χλωρός. Cæteri propè omnes Interpretes ex Paulo, κἀπισπόδιος, restituunt: quasi voluerit Dioscorides ex Ceraſtæ morsu totum corpus non quidem fuluescere, sed varicum modo intumescere.

λευκότητα σποδώδης] Malim ex Paulo, λευκότητα σποδώδη, vt præcedentibus ista respondeant. Alioqui in ipso capitis principio legendum immutato numero, τοῦ ἢ ὑπὸ κεφαλὴν ἀγχόντα.

CAP. XVII. πρὸς ἢ ὑπὸ ἀσπίδος] Galenus, in lib. de Ther. ad Pis. tres constituit Aspidum species: vnam, χερσαίαν, ex eo cognominatam, quòd in mediterraneis locis semper degat, alteram δύιπλα, nomen ex eo sortitam, quòd virus suum in hominum oculos solita sit expuere, tertiam denique χελιδονίαν, sic dictam, quòd hirundinis instar per dorsum nigricet, & circa ventrem candida conspiciatur. Totidem species Galenum secuti agnouêre Paulus & Aëtius. At AEgyptios AElianus Aspidum genus in sedecim species diuidere asserit, lib. x. cap. xxxj.

μικρὸν παντὸς φαί.] AElianus, lib. 9. cap. 61. morsus Aspidis vestigia ita esse obscura scribit, quia ipsius venenum ἐξώτατόν τε καὶ διαφανὲς ἄνευ, ideóque facilè cutem subiens ad intima vsq; penetrat ocyssimè.

καὶ πλειόνων ἢ] Aëtius vulnera in demorso loco scribit inueniri, bina quidem ex masculi morsu, ex fœmellæ verò, quaterna, eáque citra dolorem: at ab iis planè nihil effluere, nisi violentum sit animal, quod morsum inflixerit. Idem Aspidis ictuum longè plures notas recenset, &, quoniam veluti diuersæ sunt Aspidis species, ita & dispares sunt ad nocendum effectus, propria singularum morsus symptomata sigillatim persequitur.

ὑπνώδεις ὕπνῳ] Iccircò etiam fortasse Lucanus, lib. 9. *Aspidem somniferam cognominat.* Neque desunt qui certam aliquam eius speciem Hypnalen nominent, quasi ὑπναλέαν, quòd somno enecet.

CAP. XVIII. πληγὴ ὑπὸ ἐχένεως] Nicander & Aëtius alia præterea recensent morsus Basilisci symptomata, nempe totius corporis ardorem, luorem, capillorum defluuium & mortem repentinam. Sed Gal. x. simpl. iis quæ de Basilisci vi adeò malefica referuntur, vt vel appropinquatione sola noceat, ceu fabulosis videtur fidem derogato.

CAP. XIX. περὶ θερμῆς τῶν ἰοβόλ.] Theriacum hunc Dioscoridis tractatum varij variè distinguunt. Quidam enim caput quintum de Phalangus, alij verò caput hoc de communi vulnerum à virulentis animalibus inflictorum curatione, libri alterius principium constituunt. Neque verò desunt, qui à capite de curatione à vespis apibúsque demorsorum tertium præterea librum exordiantur. Mihi totum hunc Theriacum tractatum, ceu non adeò prolixum, vna eademque serie comprehendere visum est. Quanquam si qui malunt in partes quatuor subdiuidere, nihil equidem impedio. Prima certe quidem præfationem continebit. Altera, canis rabiosi morsuum signa curationemque complectetur. Tertia, ictuum morsuúmve à cæteris venenatis animantibus inflictorum signa sigillatim prosequitur. Quarta, priore quidem loco horum eorundem vniuersalia remedia describit; posteriore verò, particularia, eo tamen ordine vt posterioris huiusce particulæ capitula ferè singula tertiæ partis capitibus aptè respondeant. Quin & lubenter, sicuti Autor in proximè præcedenti Alexipharmaco tractatu isdem capitibus hausti veneni simul signa & ipsa quoque remedia complexus est, ita & ego in hoc Theriaco capita ictuum morsuúmve à singulis animantibus inflictorum signis dicata cum eorundem particularibus remediis, Aëtij & Actuarij exemplo, coniunxissem, ni subueritus fuissem malè feriatorum quorundam notam subire Censoriam.

CAP. XX. ἐπιμελὴς ἑλκῶν] Idem præcipit Celsus, lib. v. his verbis: *Si cucurbita non est, quod tamen uix incidere potest, tum quodlibet simile uas quod idem possit. Si nec id quidem est, bonus adhibendus, qui multum exugat* &c. Sed hoc loco minimè negligenda cautio, quam adhibendam censet Actius, lib. 13. c. 10. videlicet, vt ne qui fugit os vspiam vlceratum habeat. Sic & ibidem Celsus: *ante*, inquit, *debet attendere, ne quod in gingiuis palatíue, aliue parte oris ulcus habeat.*

συναναζέουσι] Docet Paulus præter scarificationem adhibendas cucurbitulas, nec tantùm genus illud remedij ictæ parti, sed & toti viciniæ adhibendum. Quinetiam, præter istiusmodi alia à Dioscor. commemorata remedia, venæ sectionem commendat, siquidem virus in corpus distributum videatur, maxime verò si plethoricum illud extiterit: itidem & vomitum, cuius etiam Celsus ipse meminit.

αἴροντες ἐκ τοῦ τόπου] Dum virus è loco tollitur, accedit & altera vtilitas, quod vicinæ partes à labe vindicantur, id quod minimè prætermisit Actuarius.

καυλοῦ ἢ κισσίνου] Loco ficulnei aut sarmentitij cineris Laurinum Aëtius substituit, nec malè: quandoquidem laurus suapte natura pollet aduersùm venena. Paulus brassicæ cineris simul & ficulnei meminit: aceto verò, lixiuio aut garo subigit.

τοῦτο διχαθὲν] Super vulnus hunc in modum impositi pulli per medium diuisi, aliáve id genus animalcula discissa & sic adhibita, vt partes interiores corpori iungantur, non modò, testibus Paulo & Aëtio, venenum in sese transferunt, sed & ipsos dolores mitigant.

κέδρου καὶ κέδρος] Non est de Cedri foliis lignóve locus hic intelligendus, sed de Cedria, quam & ipse Dioscor. lib. i. cap. 106. ceraſtæ morsibus impositam cum sale conferre testatus est. Quare non κέδρος, sed κέδρια potiùs seu κέδριον, legendum hoc loco censuerim.

καὶ ἀστράγαλος] Paulus non quidem astragali, sed astragalitidis mentionem facit. Innuit autem eam Iridis speciem, cuius meminêre Gal. lib. 2. περὶ ἀντ. cap. 1. & Aëtius in describendo emplastro venatorum, quæque testante Gal. loco modò citato cum iride Illyrica vna & eadem est. Fortasse verò etiam hoc loco Astragali nomine eadem illa Iris astragalitis debet intelligi: quanquam nolim penitus Cornario assentiri, qui præter Iridem modò dictam non alium agnoscit Astragalum.

σίσυμπος δὲ ἄγριος] Meritò dubitauerit aliquis, num ἀσφάλτου, seu bituminis, loco legendum sit, ἀσφάλτου, nempe *trifolium illud bituminatum*, quod à bituminis odore ἀσφαλείου nomen obtinuit? quippe cùm huiusce seminis meminerit Aëtius in censu remediorum contra serpentium morsus, insuperque eiusdem folia trita & ex aceto mulso pota contra serpentium ictus præsidio esse scripserit Dioscor. lib. 3. cap. 123. Attamen Paulus, lib. 5. cap. 2. vtriusque meminit aduersus serpentium ictus, nimirum & bituminis, & seminis illius trifolij.

πίπερι δὲ μελίκρατον] Piper cum aceto & meconio laudatur à Dioscor. in Ἀνθρ. quo loco & alia contra virulentorum animalium ictus morsusve habentur simplicia, quorum hîc nulla fit mentio. Sic & apud Paulum & Aëtium, dum de iisdem agunt remediis, tam in admouendorum quàm in ore sumendorum censu alia præter ista commemorantur auxilia, quæ ex eorundem ipsorum contextu facile fuerit vnicuique repetere.

πυτία δὲ λαγῴου] Præter leporinum, etiam hinnuli coagulum laudat Dioscor. in Ἀνθρ. itidémque Aëtius, loco iam sæpe citato.

τετρεῖον νόμ.] Nimium est procul dubiò istud Castorij pondus. Et certè quidem Paulus vnam tantummodò drachmam exhibet: at Dioscor. lib. 2. de mat. med. duarum drachmarum meminit. Quare & hoc loco pro vncias drachmas reponendas existimauerim.

ἐπὶ βεκοντιδίων] Lego, ἐπὶ δεκαδίων: maximè cùm apud Paulum habeatur eodem planè sensu, ἐπὶ δεκαδύο ἢ τρία. Totum verò hunc locum Cornarius rectè ita restituit: ἔνιοι δὲ καὶ ὑγρὰ ἐκλεπτύνουσι ἐπὶ δεκαδίων διείσματα. κατέπιον δὲ πάντα χρεῖόν ἐστι ἐπὶ ὀκτὼ ἢ ἐννέα ἡμέρας ἐκλείχειν, & alia: πάντες δὲ ὑδροχόοι καὶ ἐλατῆρι πίνειν, &c.

ὕδρα πολλὴ ἔκκενσις] Celsus, lib. 5. cap. de communibus curationibus aduersus omnes morsus serpentium, *Omnes*, inquit, *vrinam mouentia, quia maxima exempta sunt, nulla sunt.*

Cap. xx. πρὸς δὲ τοὺς πληγάς] Paulus & Aëtius Apum Vesparúmque ictus notas ab Authore prætermissas, ceu vulgo satis cognitas, accuratè tradiderunt, ac præterea quæ hîc recitantur remedia, alia etiam non pauca tam interna quàm externa, quæ ab ipsis Autoribus repetere vnusquisque poterit.

Cap. xxi. αἱ δρυόπτ᾽ ὠὰ σκόρπια] Tranferipta hæc eadem leguntur apud Paulum. At Aëtius aduersus Phalangiorum morsum multò plura quàm illorum vterque tum simplicia, tum etiam composita remedia commemorat. Sic & Celsus, lib v. nonnulla in eundem vsum præscribit, quorum hîc nulla fit mentio.

σισύμπου & χαμαιπίτυος] In hoc simplicium censu chamæpityos apud Paulum intercidit. Aëtius verò chamæpityos vsum & per se, & cum ruta ac pipere, ex vino bibendæ commendat.

Cap. xxii. ἐὰν δὲ ὑπὸ σκόλοπος] Paulus aduersum Scolopendræ morsum quædam adiicit tum assumenda tum admouenda remedia. Aëtius ab illa demorsis eadem scribit auxilia conuenire, quæ & ad muris aranei morsum faciunt: ac nihilominùs, præter illa, nonnulla etiam alia tam interna quàm externa subiicit.

Cap. xxiii. μετὰ δὲ τὸν σκορπίου λόγον] Ista apud Aëtium & Actuarium desiderantur. At Paulus sic habet: μετὰ δὲ τὸν λόγον ἄλας ἐπιβλητέον μετὰ λεπτομύρου, & τῆς ἀλθαίας σπέρμα: quasi velit, post remotum Scorpionem, nulla Scorpionis alterius facta mentione, solum salem tritum cum lini semine, aut althææ semen ipsum vulneri adhiberi: id quod certè magis mihi placet. Attamen tam multa in vno eodémque capite citra vllius exemplaris fidem immutare mihi religio fuit.

τὸ ἀλθαίας δυνατόν] Quod inter admouenda hoc loco, itémque lib. 3. de mat. med. cap. de althæa, ipsi herbæ tribuitur, illud ipsum Paulus eiusdem semini tribuere videtur. Attamen & loco citato Dioscorides seminis althææ decoctum, verùm assumptum, ad istiusmodi ictus commendat. Aëtius verò & Autor lib. περὶ Ἀνθρ. in eundem vsum althææ radicis epotæ meminerunt.

γλυκὺν ὀθόνιον μέλι] Rectè Cornarius & Marcellus ex Paulo restituunt αὐτὸ τὸ, ὀθόνιον μέλι, ἢ ἐκπιὼν τὸ ὀθόνιον μέλι, itémque inferiùs pro, ἀκόλουθος θεσπεσίῳ, ἀκόλουθος ἦν, quos ego lubenter sum imitatus.

καὶ κυπαίρου μετ᾽ ὄξους] Cum Cornario & Marcello lego ex Paulo, καὶ κύπειρος μετ᾽ ὄξους, καὶ πίσσαν ἐσπόγγους. Cyperi enim radicem, quæ priuatim cyperis dicitur, à Scorpione ictis opitulari & antè retulerat Dioscor. 1. de mat. med. cap. 4. vt & Plin. lib. 21. ca. 1. De cupresso verò seu foliis seu pilulis tale nihil auditum est. Sic & pro, μυρσίνου χυτρίου ὀπῦ, ex eodem illo Pauli contextu lego, Παρθικοῦ χυτρίου ὀπῦ. Nam & superiùs lib. præcedentis cap. 3. ita legebatur: ἔνιοι μὲν οὖν μᾶλλον ὁ Κυρηναῖος, ἢ ὁ παρθικὸς Μηδικὸς ἢ Περσικός. Est autem Parthia Asiæ regio vicina Persidi ac Mediæ, cuius regionis æquè ac Parthiæ indigenam Laser Dioscor. eo loco commendat, siquidem Cyrenaicum desideretur. Cæterùm multò plura quàm hîc habentur ad Scorpionum ictus remedia legas apud Aëtium, capite proprio, si videbitur.

Cap. xxiiii. ἔστι δὲ ἀσπίδων] Nicander ac etiamnum recentiores Græci Paulus, Aëtius & Actuarius, præter remedia morsui viperarum communia, & alia non pauca ictui Pastinacæ peculiaria commemorant.

Cap. xxv. ἀμυξῇ δὲ] Sic omnino legitur apud Actuarium, vt in vulgato nostro exemplari. Attamen hoc caput diuidere, codicúmque veterum lectionem, quam etiam Interpretes cæteri expressêrunt, in integrum restituere visum est.

καὶ κύνα δὲ αἰσθάνεσθαι] Hoc pleriquerad Pastinacam marinam referunt: huiusce tamen remedij neque Paulus neque Aëtius vsquam meminêre. Vnus Plinius, lib. 32. cap. 5. Pastinacam quidem contra suum ictum remedio esse prodidit, verùm cinere ex aceto illito & sæpe alterato.

Quamobrem Cornarius, ex sententia Pauli & Aëtij, istam capitis postremam periodum ita restituit: καὶ πίνειν δὲ αἰσθυχλίου καὶ ὀθονίου τῆς τριμμάτου, τῆς αὐτῆς ἰάσεως γίνεσθαι πυρῶν. Ac certè quidem Dioscor. lib. 2. de mat. med. cap. de mullo, mullum crudum dissectum impositúmque prodidit marini Draconis & Scorpij, itémque aranei ictibus mederi: id quod Paulus totidem verbis repetit, lib. 7. Quin & illud ipsum remediũ habet Dioscor. lib. 2. περὶ ἴλυος. Marcellus verò hũc ipsum locum sic potiùs videtur emendasse: ἢ πίνει δὲ αἰσθυχλίου καὶ ὀθονίου τῆς τριμμάτου, καὶ ἰδίας ἰάσεως γίνεσθαι. quoniam voluit tum Draconem tũ etiam Scorpionem dissectos adhibitósq; fuisse ipsorum ictibus mederi. Cæterùm vtra lectio sit potior, non magnoperè laborandum videtur: quoniam vtraque sententia veritate nititur. Siquidem & Paulus, cap. de Dracone marino ista sic habet: ἢ πρόσθεν αὐτοῦ αἰσθυχθέντι (supplẽdum ex præcedentibus) καὶ πιεῖν. Sic & Dioscor. lib. 2. περὶ ἴλυος. ἐσθίει δὲ ὁ δράκων ἰσχαδίων πυρόν, οὗτος ὁ δράκων αἰσθυχθεὶς καὶ ὀθονισθείς. Idem, lib. 2. de mat. med. cap. 15. δράκων θαλάσσιος αἰσθυχθεὶς ἢ ὀθονισθείς, ἰᾶται δὲ καὶ αὐτὸς τοὺς ἀπὸ τῆς αὐτοῦ ἰοβολήσαντας πυρόν. Quin & Galenus, 11. simpl. Draconis ictui mederi tradit ipsum Draconem impositum æquè ac mullam: & eo loco multa deinceps alia recenset remedia, quæ totius substantiæ proprietate venenatis ictibus opitulantur.

CAP. XXVI. χαλβάνη καθαίνει] Ista Cornarius restituit ex Paulo hunc in modum: χαλβάνης καθαίνει ὀθονίσαι πρὸ αὐτοῦ &c. Sed ità malim paucis immutatis: χαλβάνη δὲ καθαίνει ὀθονίσαι πρὸ αὐτοῦ, ἢ καὶ μετ' ὄξους λειοτριβηθέν. Sic inferiùs cũ eodem Cornario & Marcello ἀπὸ τῶ, ἰατρία, ex Paulo & Aëtio, ἀσία, emendauimus.

καὶ ἐπὶ τοῦτο δὲ ὁ διαιτῶν] Aëtius ex Stratone priùs scarificari locum affectum voluit, mox Araneum murem vstum cum aceto cataplasmatis vice imponi, aut sinapi tritum itidem ex aceto.

ἐξ ἧς τῆς θηλῆς καθάπτονται] Et hîc quoque ex Pauli contextu, ἅλμας, adiecimus, vt sit ἐξ ἧς τῆς θηλῆς ἅλμας καθάπτονται. Alioqui ἡ θηλῆς vox nullo modo constaret, ac potiùs, ἡ θηλυῦ, legẽdum foret, subaudita voce, ὑδατος.

χαμαιπίτυος τῆς βοτάνης] Remedia contra Muris aranei morsum tam interna quàm externa lõgè plura recentiores Græci Medici tradiderunt, quæ quoniam ab ipsis Autoribus facilè repeti possunt, hîc transcribere visum non est.

μεῖξε τὸ ἕλκος πυρῶν] Addit Paulus, μετ' ὄξους. Sed & apud Dioscor. 2. περὶ ἴλυος. potus Muris aranei in vino triti commendatur.

αἱ μὴ ἔκπυοι] Cum Cornario, ex Aëtio & Oribasio, restituimus, αἱ μὴ ἔγκυοι. Scribit enim Aëtius, bullas quę ex Muris aranei morsu excitantur minimè rumpi, adeóque non exulcerari locum, nisi prægnans fuerit Mus araneus qui morsum inflixerit: quod ipsum iisdem penè verbis legitur apud Oribasium. Eodem spectat & illud Plinij, lib. 29. cap. 4. quo loco, *ipse Mus araneus*, inquit, *contra se remedio est dimulsus & impositus. Nã si prægnans memordit, protinus dissilit. Optimum, si is imponatur qui memorderit*, &c.

CAP. XXVII. αἰγὸς δὲ σπέρματος μετ' ὄξους] Dioscor. 2. de mat. med. cap. de simo, αἰγὸς σπέρματος ἐμπλάσσειν μετ' ὄξους ἢ οἴνου, hoc est, *simum caprinum in aceto aut vino decoctum* desiderat. Idem verò, 2. περὶ ἴλυος. capite de Viperæ morsu, πίνειν αἰγὸς σπέρματος ἐν ὄξει, hoc est, *simum caprinum in aceto decoctũ* commẽdat. Cæterùm pro, ἀσανθίου, rectiùs fortasse legas, ἀκανθίου. Paulus habet, καθαπτομένου. At inferiùs pró, ἀνθίου, legendum proculdubiò ex Paulo, λαυρίνου.

λαύρινα φύλλα] Laurum simpliciter Autor desiderat. At Paulus, δαφνης ἐρυθρᾶ φύλλα μετ' ἐλαίου ἢ δαφνίδες, hoc est, *lauri folia rubra cum oleo aut lauri baccas* imponi iubet: Dioscor. 2. περὶ ἴλυος. itémque Aëtius, lauri foliorũ in oleo coctorum & tritorum tantummodò meminerunt.

ῥοφεῖν φλοιὸς] καὶ μέλιτι, hoc est, *cum melle* addit Dioscor. 2. περὶ ἴλυος.

σκίλλα τοστή] Hîc Scilla tosta & tusa contra Viperæ morsus prædicatur. At Paulus eiusdem non meminit, sed ἐρυθρᾶς. Sic & apud Dioscor. 2. περὶ ἴλυος. legitur, σκίλλα ἐμπλάσσειν ἢ ὄξει, hoc est, *scilla in aceto decocta*.

πεπτικῶ θαλάσσου ὕδατι] Paulus non calida aqua simpliciter; quemádmodum ego hunc Autoris locum accipiendum puto, neque aceto mulso, vti Interpretes voluêre, sed trifolij pulegiive decocto, aut acida muria locum fouet. Dioscor. 2. περὶ ἴλυος. de omni genere virulẽtorum morsuum verba faciens, καταπλάττει δὲ, inquit, ὅσα τῶν ἰοβόλων τετρωμένοις ἐπιζήμια. hoc est, *virulentorum ictus trifolij decocto fouentur*. Aëtius, post scarificationem & gallinaceorum impositionem, vult plagam trifolij bituminosi decocto calente diu multúmque foueri: sin paruo tempore id fiat, peius affici ægrotantem asserit.

ἄλχουσα τῶν λιθύρων.] Nonnullos etiam scribit Paulus anchusam hanè tenui constãtem folio ex collo suspendere in eundem vsum.

ἴσον κονύλιον ἐν ἀκρατῳ] Ita & Actuarius. At Paulus, ἴσον ἐμπυρεύματον ἐν μελικράτῳ. Κονύλιον autem αἰνὰ τῆς κονύλης vsquam repetiri vix crediderim: quare hîc saltem, ἐμπυρεύματον, reponẽdum censuerim.

εἰς τὰ μάλιστα σπουδαῖος] Paulus in morsu Viperæ αἰσθάνεται, hoc est, *efficacissimum* asserit esse remedium ἐκπτύσαι ἀγχόνας καὶ ἀκροσπασίας, *allii succum*, inquàm, *esum & mixto meraci potum*, adeò vt si quis multum eorum vsum adhibeat, nullum prætereà auxilium sit desideraturus. Idem Aëtius refert ex Archigene, & Dioscor. in περὶ ἴλυος.

αἱ ἀφύκτους αὐτοὺς καὶ σπέρματος] Paulus ex Lyco sic habet: σπόδιον ἀπὸ ϰ δ. αἰπόλου σπέρματος ἐξόβαθον. Arabes Auicenna, Serapio & Albucasis, in curatione Viperini morsus, huius eiusdem antidoti meminerunt, eámque non quidem Lyco, sed (nisi fallũtur Interpretes) Lucę tribuunt, ac auripigmenti etiam rubri, quæ Græcorum est sandaracha, mentionem faciũt: quod tamen rarò admodũ in remedia interna recipitur, quippe cùm venenũ sit causticum & erodens. Quare suspicor equidem lubricum fuisse scripturę lapsum, & loco αἰφύκτους, aut etiam σπόδιον, legẽdum, ἀφρολέχιος. quam etiam Serapio huic eidem medicamento præter auripigmẽtum admiscet. Fortassis etiam pro, αἰπόλου σπέρματος, restituẽdum fuerit, ἀγρίου σπέρματος, hoc est, *feminis rutæ*: nam & hoc in eiusmodi medicamentis theriacis vix vnquam omittitur, ceu contra virulentarum bestiarum ictus excellenti remedio præditum. In Oribasij antidoto, quæ habetur apud Paulum,

legitur *aniſi acetabulum, piperis drachm. iij. ariſtolochiæ cortices, opij, caſtorij, myrrhæ an. drachm. j.* &c. Attamen citra vetuſtorum codicum certiorem fidem quicquam immutare minimè auſim: illud tantùm obiter admonere viſum eſt. Cæterùm nonnulla ex commemoratis hoc capite remediis paulò aliter præparant recentiores Græci, Paulus, Oribaſius & Aëtius: ac præter hæc complura alia tam ſimplicia quàm compoſita, partim interna, partim externa recenſuerunt, quæ ſtudioſus Lector ab Autoribus ipſis facilè repetet.

CAP. XXX. *καὶ ἄλλως πῶσις*] Otioſæ repetitionis vitandę gratia, placuit cum Cornario quę ſequuntur in contextu ad calcem vſque capitis vna litura expungere: eorum verò loco hæc ex Paulo tranſcribere, quæ quidem hîc deſiderari meritò videbantur: *πινέτω δὲ διείτησαν ἀφυχχαμμένα ἐς ἡμέρας τέσσαρας, ὅτι μὲν τῆς δυσάδος, καὶ ἀρίζης φύλλα λεῖα σὺν ὄξει καὶ ἀλφίτοις, καὶ βαλάνου φύλλα λελειοκεβαμμένα μετὰ μέλιτος. ἀντίγλυκον, ὑσσωπον, σατύρου λεπτὸν, [fortè, λεῖον.] ἀκόνιτον, πήγανον, νάρδον. ἔτι δὲ τῆ αἱμόῤῥοῦ, καὶ θύμου, καὶ ἀκόνιτος ὁμοίως φύλλα τρῖψαι σὺν μέλιτι λελειωμένα. ἢ ἐλαίῳ δὲ αὐτὰ τῷ ἰσχίῳ ἢ ὑφάλλῃ καταθεῖναι* [Dioſc. in *ἄλφ.* καθεῖναι] πολλάκις, *ἢ σατύρου μετὰ ἰσχίου, ἢ ἀκόνιτον δὲ ἢ σατύρου.* Hæc potrò remedia, quæ priuatim tum ad dipſadis ſeu Preſteris, tum & ad Hæmorrhoi morſum conferre totidē verbis prodidit Paulus, apud Dioſcoridem in *ἄλφ.* confundi videtur: ibidémque nonnulla etiam alia inſuper adiiciūtur. Pro eo autem quod habet Paulus, *σατύρου μετὰ ἰσχίου*, rectiùs illic legitur, *σατύρου λεῖον σὺν οἴνῳ.* Et certè quidem Dioſc. 2. de mat. med. iis quos vipera aut Hæmorrhous momorderit allium ita commendat, vt præſentiſſimum cenſeat eſſe remedium, *ſi modò*, inquit ille, *continuò pòſt minum ſuperbibatur, aut ipſum ex vino teratur, ac in potione ſumatur.* Sic caput ſerpentis quod vſtum potui datur apud Paulum, Dioſcorides in *ἄλφ.* vulneri tantummodò imponēdum exiſtimauit. Vnum verò admonendum ſupereſt, apud Aëtium portulacę folia cum polenta permiſceri, cùm tamen Paulus portulacæ folia trita cum aceto, ac polentam ſeorſim ac per ſe admoueat. Cæterùm hanc venena Hæmorrhoidum Preſterúmque reſtinguendi vim non omni quidem portulacæ tribuit Plinius, lib. 20. cap. 20. ſed ſyluęſtri tantùm, quam peplium vocari ſcribit.

CAP. XXXI. *κονία ἢ ἀσβέστου*] Paulus, *ἢ κονία ἀμφὶς ἁλφίτου διαλῦσαι.* Sic & Actuarius. Hanc iccircò ſcripturam & nos ſecuti ſumus. Sed cùm illorum Interpretes *conias, lixiuiam* verterint, nos *cinerem* interpretari maluimus. Dubitauit & Cornarius, an *conias* vt aliàs ita & hoc loco *calcem* vertere debuerit, quoniam vocem *ἀμφὶς* minimè agnoſcit, & apud Aëtiū inter peculiaria contra Cherſydrum remedia calx viua oleo permixta recenſetur.

ἢ ἰσχία ἀμφὶς] Actuarius hoc loco vocem, *ἀμφὶς*, omiſit: & certè quidem nos quoque ex proximè præcedente linea perperàm huc tranſlatam exiſtimauimus, ita vt nō quidem quercus, ſed ipſius ariſtolochiæ radix deſideretur. Sed quod proximè ſequitur de hordeacea farina, aliter quàm habeatur apud Paulum & Actuarium diſtingui oportere iudicauimus. Viſum eſt enim illud, *πλίζειν*, vtrobique, veluti & apud Dioſcoridem, rectiùs cum ſequentibus coniungi poſſe, vt ſit alterius periodi principium.

ὁ κεγχρος ἐξυκρατου] Paulus nō multò rectiùs, *ἢ ὁ κεγχρος ἐξυκρατου πινέτω δυσὶν.* Nos verò ita reſtituimus, *ὁ κεγχρος ἢ ὀξυκρατου πινέτω δυσὶν.*

ἢ ὑσσωπου χυλὸς] Marrubij ſuccum etiam deſiderant Paulus, Actuarius & Auicenna. Attamen Herm. Barbarus *πρασίου*, hoc eſt, *porri*, legiſſe videtur. Et certè quidem ipſe quoque Cellus contra Cherſydri ictum porri ſuccum cum hemina vini commendat, lib. 5. cap. 27. quo loco & alia nonnulla proponit remedia, quorum hîc nulla mentio. Recenſuit & Paulus inter Natricis remedia naſturtium agreſte, aſphodeli ſemen florémve, & cum vino fœniculi ſemen. Actius cupreſſi pilularum & myrri baccarum an. drach. j. terit, & cum melle roſaceo aut vino mulſo propinat: quod genus auxilij ipſe etiam Auicenna commemorat.

CAP. XXXII. *καὶ ὑπομιγνὺς σὺν ἀσφ.*] Nos cum Hermolao & Cornario iſta ſic ex Paulo & Actuario emendauimus: *καὶ ὑπομιγνὺς σὺν ἀσπαλάθῳ λειοτριβήσας. πολλάκις δὲ ἐξεχρῶντο κατ' ἔτος τὴν ῥίζαν ἐς β' σὺν ὀξυκράτῳ κυάθοις γ', ἢ ἀφεψήσας ῥίζα ἀσπάλου κόψας ἢ καὶ ὑφανὰς ἐξεκάστοτε.* Huius etiam ſcripturæ veſtigia in vetuſtis Dioſcoridis codicibus adhuc extare Goupylus annotat. Attamen ſiue *κόψαντα* cum Paulo, ſiue *κεκρέκαντα* cum Actuario legas, parum intereſt, quoniam vtrunque cōtra venena valere compertum eſt, vel ipſo teſte Dioſcoride, in libris de mat. med.

CAP. XXXIII. *ἢ ἐπιτιθέναι*] Paulus addit, *καὶ ἐπίμυσον ἕως βάθους μέχρις ὀστέου.* Vult enim non tantùm ſcalpello circuncidi partes ictas, ſed etiam adigi ſcalpellum altiùs, ad os vſque, ne dira contagio ſerpat in vicinas partes.

ἕως ὑπογλωσσίου αἱμορροίου] Cùm deprauatè legeretur in Ald. codice, *αἱμαπίου*, itémque in Pariſiēſi, *ὑπατίου*, neque vtrouis modo ſenſus vllus cōſtaret, reſtituimus, *αἱμορροίου*, ex Paulo & Actuario: qui quidem ſic habent, *ὅτι δὲ τὸ λεπτόφυλλον τῆς ὑπογλωσσίου αἱμορροίου.* Cæterùm præter iſta Chirurgica auxilia, medicamenta tam ſimplicia quàm compoſita partim foris vulneri Ceraſtæ imponenda, partim intra corpus ſumenda varia reperias apud Dioſc. de mat. med. itémque in *ἄλφ.* Aëtium, Celſum, Plinium & Auicennam.

CAP. XXXIIII. *καὶ πίνουσι σὺν οἴνῳ*] Lego ex Paulo, *καὶ πινέτωσαν οἴνῳ* &c. alioqui vix vllus conſtabit ſenſus. Porrò & Aſpidis morſus remedia alia legas apud Dioſc. tum ſparſim in libris de mat. med. tum etiam proprio capite in *ἄλφ.* itémque apud Galenum, Aëtium, Plinium, Celſum & Q. Serenum.

CAP. XXXV. *τῶν μάγων ὄφεων*] Vanum & ſuperfluum exiſtimauit Aëtius auxilia contra Baſiliſcum commemorare, quoniam qui vel ab eo conſpecti fuerint, aut eum ſibilātem audierint, protinus è medio tollūtur, nedum ab eo demorſi curationem recipiant. Actuarius itidem mortem auxilia quæuis anteuertere prodidit. Sed & Auicēna quoque illius morſum immedicabilem aſſerit: conferre tamen maximè, ſi quid aliud, ſemen papaueris, aut caſtorium ad drach. j. ſed eo loco ſemen pro ſucco papaueris perperàm legi crediderim.

CLARISS. vir Io. Sambucus Pannonius, Cæsareus olim Consiliarius & Historiographus, præter varias in Dioscoridem lectiones, quas ex complurium manuscriptorum exemplarium fida diligentique collatione hinc inde excerpserat, notas etiam suas & obseruationes in eundem Autorem nonnullas nobis simul & semel quàm liberalissimè communicauit: quibus te quoque defraudare neque volui neque debui: quandoquidem vt loca quædam difficilia aut alioqui sat obscura in interdum illustrantur, ita & ad alia præterea diligentiùs examinanda via tibi quasi patefit. Occurrent, fateor, haud ita pauca, quæ vt mihi ita & tibi fortasse merito suspectiora, aut veritati dudumq; receptæ Medicorum opinioni minùs consentanea videbuntur: attamen malui, qualiacunque erant, iudicio tuo subiicere, quàm temerè nimiúm ve audacter quicquam immutare. Tuum erit, quicquid id est, aquè boníque consulere, hominémque literariæ Reipub. quandiu vixit iuuandæ quàm studiosissimum pro tua prudentia excusare: quippe cui, cum Aulicam vitam ageret, quum alia quàm Medica sæpenumerò tractanda essent, ad amussim singula expendere non ita licuerit. Cæterùm hoc vnum monitum te volui, Lector, vt hisce optimi viri lucubrationibus non nisi adhibito maturiore iudicio fruaris. Interim vale.

IN DIOSCORIDEM OBSERVATIONES seu Notæ Io. Sambuci Pannonii, Cæsarei Consiliarii & Historiographi.

IN LIB. I.

CAP. I. Iridem bulbosam Recentiores vetam nondum mihi videntur ostendisse.

CAP. II. De Acoro in Nothis caput est verum Crateuæ. Cæterùm nec est gladiolus, nec galanga, minùs calamus aromaticus: id quod vtriusque dosis differens arguit. Calamum non habemus: galangâ tamen Acorus magis simulat.

CAP. VI. Tripolitana illa nardus spicea, quam vulgò vsurpamus, legitima est.

CAP. VII. Si Saliunca species sit Nardi, in Vngaria æquè visitur, vt in Istria. Matthiolus vnica radice suam apposuit.

CAP. VIII. ὑπὸ αὐτῆς φλοιὸς.] Cod. Hisp. ὑποφλοιὸς, quasi dicat, non dat sufficit: aliter qui folia & caules eryngij tribuit Dioscoridi seipso dissentit.

CAP. IX. Bacchari cum hoc asaro nihil commune, sed asaro Crateuæ, nec huic aliquid societatis cum asaro Crateuæ.

CAP. X. μείζω δὲ καὶ πυκν.] quidam legêre, ἄνθος, nec prorsus Autor narcisso assimilat. Putarim esse Pseudostœchada potiùs quàm aliud. Et rusticam illam Geo Plinij similem Caryophyllatam coniicio.

CAP. XIIII. Si Serapionis quæ ex Dioscoride transtulit expendas, deprehendes Dioscoridê hîc & in Phu & alibi mutilũ esse & cõfusum.

CAP. XV. In vetustiss. codicibus, Costus Angelicę effigie passim pingitur. Nos solam habemus amaram, non acrem nec dulcem, & radiculæ folia ignoramus. Aliqui suspicantur esse zedoariæ propaginum radices.

CAP. XVI. Iuncum odoratum esse Cyperũm nostrum, vel Celsi quadratum dubito.

CAP. XXVII. V. Codices sequens caput huic priori adiiciunt. Illud Helenium Panacen Chironium Theophrasti quidã arbitrantur. Ac Dioscoridis Chironiũ, videtur secundũ hoc Heleniũ.

CAP. LXII. Etiam Susinum istud, vt Iasminum, est Arabibus frequens.

CAP. LXXX. Si Bdellium non est Caucalis, nec erit herclè Myrrha: qua vera nos caremus. Barbari ineptè myrrham stacten coniungunt.

CAP. CI. Succinũ & Ambra Naphthæ sunt: Ambra Can cœli bonitate differt.

CAP. CIII. In multis manu transcriptis de Iunipero pauciora offenduntur verba: vt in excuso quædam aliena suspicari liceat.

CAP. CXI. De Vlmo lignorúmque carie duo capita in vetustis desiderantur: in margine tantùm Epigraphe: Κεφαλὰ ἐλείπουν.

CAP. CXXII. Quamuis dissideant Herbarij, notę huius spinę cum vulgata Berberi seu Arbsali conueniunt.

C. CXXVII. Hypocistus radê, sed rãquã subgerminãs plãta cum Cistho, quod sæpe ipse conspexi. Nec confudit Plinius Cistum & Cisum. Nam Theophrastus & Theocritus ita ipsi appellant: ac V. codex, ὑποκιστιδιον, pro hypocistho legit.

CAP. CXXXIII. In extremo quidam Cod. habebat: ἀγρεσίας δὲ φύλλα καὶ ὁ χυλὸς, πίνεται μὲν ἐν κύκνου ἢ ξηραίνεται, πίνεται δὲ διυλισμένος ἢ ψυχόμενος, ἐπιδεῖ πλυθῆναι δ' ἄνευ τῆς ὀσμῆς: quæ ex Gal. deprompta videntur.

C. CXXXV. Miror quid de nostrate vitice & Bohemica olea quidam prodãt. Sed plus miror Galenum frigidam æstimare, & cõtrà Rhodiam radicem in tertio calidorum cepisse.

C. CLXX. De altera Mespilo V. multi silent: sed Gal. in lexico suo agnouit mespila lapidosa minoráq; ferè vt sorbus torminalis. Quòd autem ait πλατυφύλλου πυθμένος, V. codex præcedentis capitis fructibus at tribuit.

C. CLXXV. De arbuto V. C. silẽt: Flor. tamen

habet qui pro, μυρσινίτης, habet, ὑπερσινίτης. Arboreſcentia ſua Arbutus ab Vnedone differt, quicquid alij arguentur.

CLXXX. In extremo Mori quidã hæc ad marginem oſtendebãt, non abſona à Sycomori dotibus. ὅτι ἡ συκάμινος ἐν τοῖς ἄκροις τὰ φύλλα ἔχει, ὥσπερ ἡ συκομορέα, ὑπολαμβάνουσι δέ τινες αὐτὴν ἐκ συκομορέας καὶ μορέας φυῆναι, καὶ ἐπικαλεῖσθαι τῆς φύσεως, μᾶλλον δὲ τοῦ ὀνόματος. φύεται δὲ παντοίως καὶ ψυχρῷ τόπῳ. Cæterùm de ficu Cypria Florentinus codex non habebat.

CLXXXVIII. De Iberide V. cod. nihil hoc loco, & halicacabo finiunt librum ſatis confuſa deſcriptione ex tribus plantis. Iberis verò ponitur in lib. 2. de Lepidio. Eadem enim cum Lepidio videtur Galeno, 7. ſimpl.

IN LIB. II.

XXIX. Qui in magno volumine & alibi pictus cõſpicitur Silurus, nõ eſt vllo modo Dioſc. imò & Vngarorũ *schule* nõ per omnia cõuenit.

I. Duo V.C iſtud caput non habent, licet vt alia huius generis ſtare poſſit.

CIX. Non eſt φῦκος Simeonis Sethi: nã ex variis confici ſolebat, licet dotes exdẽ narrentur.

CX. De Curmi quidã Cod. caput nõ habent: & cũ Zytho idẽ videretur. Sed v. cod. pro κριθῆς, ζύθου legũt, vt ferè ſit Cumanorum potus *bodza*. Huius generis fortè Oroſius meminit, lib. 5. c. 7.

CXIII. Gal. in Hipp. ream, olyram putat. Olyra eſt ſpelta potiùs, quæ certè Italorum zea nõ eſt, (dulcis eſt olyra) nec ſegala illa amara & atra, affinis arincæ Plinij.

CXVI. V.C. carent hoc cap. Byzãtinus in nothis cenſet. Aliud eius loco offeret ſe, lib. 4. p. 294. ſed Crateuæ nomine inſigne.

CXXI. Seſama hodie ignoratur, quando cum Seſamoide confunditur.

CXXV. Huic in V.C. ſubiunctũ erat caput, ſed ad orã, nõ abſonũ profectò: ἔστι δὲ ὑπερον ἄγχιστα μιμούμενον ὃ καὶ φύσιν ἴδιαν ἔχον, οὐκ ἀπὸ τοῦ ὁμοίου. καὶ οὐκ ἂν καταλάβοις ῥᾳδίως ἄλλως ἢ αἰσθανόμενος ἀφροσύνης, καὶ μαλακοῦ σαλεύοντος. Huius genẽ in Pãonijs ipſe vidi: virea tamẽ haud ſũ exptus.

CXXXI. Ego de leguminibus, præſertim Germanicis, dum meliora legero, omniũ diſputationibus & cenſuris Tragi iudiciũ haud poſtpono.

CXXXIII. V. C. aliqui carent: & Auicenna malè fabam AEgyptiam ſomniat.

CXXXVI. Buniades, opinor, Italorũ *Naoni*, napi oblongi ſolidi ſunt: quorundam ſubtilitates hîc non curo.

CXXXVII. Vtcũq; radix & quandocũq; ſumitur, flatib⁹ ructuoſis moleſtior ſit, nec dignè aurea in Delphis, rapũ verò è plũbo dicatũ fuit. Cæterũ Simeonis Sethi recẽtioris Græci cõciliatio non negligẽda. vt & allij eſſe poteſt, cũ Dioſc. & Gal. Certè q humida sũt & ad flatus parata aluo, præmittẽt: qui dura, pòſt ingerẽt: qui verò ſolido & bene coquẽte ſtomacho, ante cibũ: cõtrà, qui imbecillo. Huius ſententiæ ſunt Dioſc. & Orib. niſi fallor: dum vomituris qui plerumque duriore ſunt aluo, antè aſſumenda: Plinius ſummo cibo arbitratur, contra Dioſc. 20. cap. 4.

CXXXVIII. Hipp. 2. Mulieb. longè meminit, ſed in oleraceis cenſet. Quid ſi Perſarum eſt Turma & Vngarorum noſtrum *turretsch*; licet piperitim noſtratem & Thlaſpi Crateuæ & Sinapi Perſicum poſſis ſuſpicari.

CXLII. Si Dioſc. nobis Lapſanæ folia deſſet, pateret etiam Raphanus ſylueſtris. Plinio certè braſſicę ſylueſtris eſt ſpecies: ſi hoc eſt, non erit vnquam armoracia vulgata.

CXLVI. Gal. braſſicã cõtra Dioſc. viſui obeſſe aſſerit: fortè verũ, ſi oculi nimiũ ſint ſicci. Vulgatũ autẽ puerbiũ de Crãbe bis cocta, nõ de braſſica equidẽ accipio: ſed cũ eruditioribus, qui fabellã de Carãbe ſeu Crãbe oppido, eiúſq; caſus ad nauſeã repetitione in Schola à Ludimagiſtro quodã narrãt, acceperim: quiin declamationib. & cõmẽtationibus ſuis inepte ſemper eius rei quiddam cum ſtomacho auditorũ memorabat, velútque Cupreſſum Horatij vbique ſimulabat.

CXLVIII. Si folia ſunt ἱππίου, & ariſtolochiæ ὑπογαίου admittas, quid ſit neſcio: licet ſoldanellæ viribus congruat.

CL. Credo hûc quoq; vel Dioſc. nõ ſatis explorata: quòd eã nõ ſatis prodiderit, alioqui collatã cũ aliis toties. Etſi neſcio ꝓportulacæ memoriã generaliter ipsũ vagatũ: at certè cepęã verã, paronychiã, chamęſycẽ ſi habes, portulacã videbis.

CLVIII. Eſt alioqui herba ſtellaris. Sed Theophraſti Coronopus ferè Virgil. paſturo cõuenit. Theophr. tamẽ & Dioſc. paſtorus idem eſt, & ſi tantam acrimoniam ſanguinaria non erit.

CLXIIII. Pepo. ſi circũllãriis deſcriptionũ inſiſtas & verbis, videtur cũ *Anthem* idẽ. Anguriã ſuſpicor Auicẽnę melonẽ Indicũ, alijGręcũ, vt Vngari quoq; Plin. grãdes oblõgos, maturos, pepones vocat: minores & rotũdiores, melopepones, ad effigiẽ cydoniorũ reſpiciẽs. Si hęc nõ sũt verã, tãtũ Dioſc. de cucumeribus ſcripſiſſe aſſumabo.

CLXVII. Miror Gingidiõ à Dioſc. cõmiſſum cũ paſtinaca agreſti, niſi deſit in textu, μὴ φύεται.

CLXXVII. Quid ſi Medica eſt cytiſus prætenſis noſtra?

CLXXIV. Hipp. ſauridiõ habet ꝓ cardamo, quæ & cardamina dicitur, ob formæ ſimilitudinem.

CLXXXVI. Hoc ſi noſtrum nõ eſt Naſturtium, Crateuæ thlaſpi nullum video, foliis latis, radice inſigni. Nõ enim μαλίφρυζον ait eſſe, vt ſcrophulariam aut lunariam.

CLXXVII. Quædã manuſcripta multorũ annorũ hoc capite carẽt. Sed quia apud Oribaſ. ſub nomine Brabæ legitur, licet id Mathiol. nõ animadverterit recipiemus. Alij Arabim vocari tradũt. Videtur naſturtij genus: ſi radicis quoq; meminiſſet & vmbellam omiſiſſet, aliud iudicarem. Plinius flore, non vmbella aut foliis & ſemine, de Dryophano loquitur.

CLXXXVIII. Primam non leuiter coniicio eſſe Seſami ſpeciem in ſegetibus frequẽtem. Alteram σκιόφυτον illam Patauinã, cuius & Angli meminẽre Germanis *klain eyſen kraut*.

CXCIIII. Fuchſius cõtra Dioſc. aſaro cyclaminis folia adſcribit. Auſtriaci *hazelwurtz* vocant. Tragus verò hãc malè cũ aſaro, quã ille pedis *hazelwurtz* vocat. Nã aſarũ ꝓbè Germani *mayrabwurtz* nominant Dioſc. vtrãq; ſatis diſcernit, dũ ait rotũdiora folia quàm cyclamini aut hederæ.

CCV. Si lepidion herbula eſt, non erit naſturtium aut ſimile quid. Veruntamen Columellæ ſylueſtrem raphanum Lepidium dicas. Domeſticus verò, piperitis eſſe poteſt.

CCXII. Noſtra non exulcerat, ſed inſipida ferè: ideò malim, ἰχῶνα, quàm, ἑλκῶνα, legere.

CCXVII. Aliud hoc Telephiũ ab illo in quarto ille tebraico. Quòd ſi cũ papauetis foliis, vt ſa

ſuſpicor, contuliſſet. eſſet πολύφυλλον Theophr. Si ſcorpij foliis, eſſet prorſus Scorpioides χαμαιπίτυς Theophr. Quid ſit dubito, niſi ſit Braſſicana perfoliata, quæ paſſim ſponte prouenit, vel potiùs ſylueſtris portulaca cum Galeni onomastico, aut certè *hunerdorm*.

Huic capiti cõmodiùs ſubnectes cap. de Iberide, extremo lib. 1. poſitũ. Diceré verò Iberidẽ eãdẽ cũ Lepidio, niſi diſtinxiſſet locis, & hoc βοτάνιον eſſe dixiſſet. Cæterùm qui textũ corrigũt, καὶ addẽtes, & pro, ἐρείου, ἄνιν, reponẽtes, nõ omnino ſõmniãt. Gal. in 7. Simpl. cũ Aëtio conuenit. Blattariã quidam eſſe contẽdit: vbi binę radices? quid ſi ſit ſylueſtris φλόμος blattaria? & Mariana roſa Lychnidos ſpecies, vel cui flores μίλινοι?

IN LIB. III.

CAP. II. Hoc capite Rhabarbari & Rhapontici vires confundi videmus: neutrius enim viribus totus textus cõgruit: hinc tot lites ortæ. Aut certè cõfuſionem hanc Dioſc. peperẽrũt variorum diuerſę narrationes de vtraq; valdè ſimili radice: neutram enim ab ipſo viſam ſuſpicor.

XVIII. In margine cuiuſdã cod. de foliis hæc reperi: ὧν τὰ φύλλα ἱπποφαεστὸς μέλανος ἢ δὲ ῥάμνος. ἡ ῥίζα ξυηγεται ἢ κατάμαρις. Cæterùm quæ à doctiſſ. Mathiolo pingitur prior, albo Scolymo foliis reſpõdet, nõ nigro: altera verò, nõ κυκλάμινος, ſed κυκλάμις habet, vt ex his Arabicã quoq; ignorem.

XVIII. Acanthij veram effigiem nondũ vidi. Alterũ congruit horto Patauino. Certè carduus benedictus Cnici ſylueſtris hiſtoriæ, ſi Theophraſtum legas, conuenit: licet ille vires, vt aliorum multorum, ſileat.

XXIIII. Non hallucinabitur, qui Vegetij Eryngium, Cartamum ſylueſtre dixerit.

XXV. Vulgati codices nõ genuinam pingunt Aloën: nam bona & ſuccoſa ferè arboreſcit, & laiſcuht ita folia.

XXXI. Stœchas Arabum differt ab illa odora, quæ helichryſo aſſimilatur. Nam altera artemiſię tenuifoliæ ſpecies videtur, apta ſcopis.

XLV. Thymbram ſuſpicor noſtram hyſſopum eſſe propter foliola: quis verò ſpicas vmbelloſas gerit, poteſt maiorana quoque ſylueſtris eſſe.

XLVI. Hallucinatur Plinius, qui ſerpyllo ſatiuo tribuit proprietates ſylueſtrium.

L. ὅπου δὲ καὶ μίλιον] Si hoc eſt verum, non eſt igitur ocymum caryophyllatum.

LIIII. Si moly allium quoddam eſt ſpicis nõ diuiſum, nõ erit molyza Hippocratis. Iã ſi etiam Galeno συνανοιγόμενον, neſcio cur quidam doctiſſ. vir in ſua Epiſtola, occludere, pro, aperire, dicat. ἀνοίγει certè, contrà, nõ ſignificat: ideò Paulus quoque αἵματος ἀπόφραξιν ἀνοίγειν eſſe cenſet.

LVIII. Quid ſi noſtra ſit vulgata & maiuſcula illa capraria pimpinella?

LIX. In veteri codice pictura Italorum Caroteam repræſentabat: noſtram verò paſtinacã croceam pro hortenſi pingit.

LXIX. Alterũ genus eſt κυνόσβατον, quod ipſũ αἷμα κυνὸς Theophraſti conicio, nõ fruſtrà.

LXXVII. Equidẽ Petroſelinũ Dioſc. cõmunẽ & tritam pimpinellã, non ſtypticã illã, arbitror.

LXXXVII. Cachrys non eſt ſemen thymi, ſed propiùs refert libanotidem.

XC. Quid ſi Sphondylion hoc cum illa Caroli Imperatoria conueniret: ac noſtrum Sphondylium, præcipuè viribus, ſit Oſtrutium vulgi?

XCIIII. λίγυστρον & ἐνίους] In Lotharingicis vetuſtiſs. imaginibus hoc loco Imperatoriam expreſſam cõſpexi. Porrò ſiquid cõgruit cũ Angelica & Ligustico, Silphion eſt, vel eò quoq; quòd nimiùm ὑπερικὸν ſit & veſicæ noxia Angelica. Sed in Galbano meminit Dioſc. ſphondylij, quaſi ea ſit acredine vt ſerpẽtes enecet, ideóque adducor vt credam Imperatoriam eſſe Sphondylium, niſi ſit ſecũdum genus Silphij. Nec omittẽdum hîc, ipſi Hipp. 2. de mulierib. & alibi ſemen Silphij φύλλον dici, radicem autem laſeris, λάκυιν.

CVIII. Polycnemon ὁμοίωμα eſt ad betonicã Pauli, aut certè mentaſtrum eſt ſylueſtre.

CIX. Clinopodion facilè vulgaris fuerit maiorana, ſi eam ſerpyllum eſſe conuicerimus: ſed incertum eſt, lecti pedes cuiuſmodi fuerint.

CXII. Noſtras Veronica à V. cod. pingitur.

CXVI. φασὶ δὲ ἄνες] Vetus hæc reiicit. Alludit porrò ad hemerocallida Perſicã. Sed noſtrũ liliũ cõualliũ ſi nõ eſt ſpecies τῶν. Theophr. quid erit?

CXXI. V. codices iſtud caput illegitimum cenſent, & cum hemionitide idem dicunt.

CXXVII. μετάλλου] Quidam abrotoni ſpeciem appingunt. Cùm addatur eſſe, ἀκαθίσγου τῆς μείζονος, illa autem grauiter oleat, ego tanacetum intelligerem *Rainfarn*.

CXXXII. Credo eſſe Plinij Impiam incanam.

CXXVII. Proditam nuper Hemerocallida genuinã adhuc nõ credo: nec Dioſc. cõuenit, quod idem eodẽ ferè modò lilium rubrum deſcribat.

CXLVIII. Si hęc noſtras Nymphæa veterũ eſt, miror nec vſum radicis nec ſeminis eſſe probũ, & quorũ olim nõ erat vſus florũ apud nos eſſe tãtũ.

CL. Androſacẽ V. cod. ἀδρομαλλὶς quoq; appellat. Cæterùm ſi eſt λεπτόκαυλος, & adeò ἀφαγρὸς, herclè nec erit caſſutha nec epithymus.

CLIII. Fortè eſt quod Dodonæus pro peplo pingit: alioqui quid ſit neſcio.

CLV. Matricariæ vulgari conuenit Partheniũm, itidémque Pliniano amaraco.

CLVI. Quando notũ eſt ὄμφακος magnitudinis eſſe notã, Buphthalmus non bouilli, ſed oculi magni effigiẽ refert. Quidã ſub capite Elleborinæ deſcribit. Sed βουφθάλμου, nõ χρυσανθέμου Hipp. confundit.

CLXIIII. Alcea nõ abſimilis eſt cannabi ſylueſtri, qua multi tumores diſcutiunt & eupatorij loco abutũtur: vel eſt chryſogonõ. Profectò nec pictura vetus, nec verba pro Mathiolo faciunt.

CLXV. Mathiolus cannabin λεπτόφυλλον pingit, cuius non ſit mentio apud Dioſcoridem.

CLXVIII. Quidã in margine ſe dixit, κυκλάμινος, ad facilem partũ alludẽs, legiſſe. Si portulaca eſſet, Dioſc. cum ea nõ contuliſſet. Quid ſit, me latet.

CLXIX. Cancalis tãta radice repugnat Aëtio. Cæterùm Damaſonion alterum eſt hoc Aliſma.

CLXXII. De Aſcyro caput codex quidã perperàm hyperico aſcribit. Cęterùm Plinius multis imponit, dum aſcyron cum androſæmo miſcet.

CLXXIIII. Corin & Hipp. & Galenus vocãt etiam hypericum: quo exẽplo colligo nõ omnes nominum varietates à Dioſcoride abſtergẽdas.

IN LIB. IIII.

CAP. I. In radice quiddam requiro: cæteroquin vulgaris noſtra conueniret.

VII. In vetuſtiſs. cod. ſunt legitima quæ in nothis leguntur: & contrà, excuſa quæ viſuntur manuſcripti aliquot nõ habent: id quod te, Lector, monere volui. Hãc autem alteram ſcitõ, & prię-

Nonnulla quæ inter relegendum immutanda deprehendimus, ita reſtitues:

Pag.1.d. *Veruntamen priſcis*, &c malim: Veruntamen priſcis, etſi pauca tradiderint, adhibitæ nihilominus in iis ipſis accuratæ ſolertiæ teſtimonium reddi par eſt. At minùs probandi recentiores (quo in numero ſunt Iulius Baſſus, Niceratus, Petronius, Niger & Diodotus, Aſclepiadæ omnes:) quippe qui vulgatam, &c. pag.2.b. *quæ quidem argumento ſunt*, &c. malim ſic: Quæ quidem argumento ſunt, ea non ex oculata fide, ſed accepta potiùs ex auditu ab aliis narratione tradita ab illo fuiſſe. Porrò etiam in ordine peccarunt: dum alij nulla facultatis cognatione iuncta medicamina conſociarunt: alij ordinem modò elementorum ſecuti, eorum tum genera tum vires a ſua cognatione ita diſiunxerunt, vt, &c. pag 3 a. *vt qui toti ſis arti*, &c. malim: quandoquidem arti toti coniunctus eſt, eiúſque partibus omnibus incomparabile præſtat auxilium: inſuperque ars ipſa per illorum præparationes ac miſturas, eorundemque in morbis experimenta incrementum capere poteſt, plurimùm ad id conferente ſingulorum medicaminum notitia Familiarem verò vulgatámque materiam etiam complectemur, &c. pag 7.d. *Illita verò*, &c. malim: illita verò pilos quàm primùm auferit p 8 e. *quod vitium*, lege: ſed huiuſmodi vitium. p.9.d. *herba eſt ſine*, &c malim: herba eſt caulis expers & candidior, minúſque oblongis prædita foliis. Quin neque radicem habet amaram, &c. p.12.b. *hoc eſt, germen*, lege: hoc eſt, Molyleticum germen. p.17.b. *bonus ſuccus*, lege: bonus liquor. p.43.c. *oſtendimus*, lege: oſtendemus. p.49.a. *Exprimitur & ſuccus*, &c. malim: Exprimitur & ſuccus ex cortice, radice ac foliis hunc in modum: Hæc ſimul in aqua ſufficienter coquuntur: quæ quidem vbi à coctione refrigerata fuerit, abiectis foliis iterum deinde coquitur, &c p.60.c. *coarctato atque immiſſo*, ſic malim: coarctata ſi immittatur. p.62.c. *quorum decoctum*, lege: Eorum decoctum. p.74.b. *Cochlacu & dyſenteriis*, &c. lege: Tritæ & aqua aut vino inſperſæ ac bibitæ cochlacis & dyſenteriis conueniunt. *Sic in contexto Græco pro*, Θνμοκαπνίᾳ, lege, Θνμοκαπνίᾳ. p.86.c. *aluúmque molliunt*, lege: aluum quoque molliunt. ibid.g *additis abſinthio*, lege: additis abſinthio. p.87.c *carne quæ in ambo* lege: præmunita carne quæ in ambitu eſt iubacta farina. ibid g. *vitiligines alb.* &c. lege: leucæ. p.112.c. *valde confricando*, lege: validè confricando. p. 145.g *eorundem adiectiones*, malim: eorundem vlcera ſuperficiaria epicaumata dicta. p.162 a. *ore ſanguinem reiicientibus*, lege: ore vitioſos humores reiicientibus. p.161.a *Aluum autem turbat*, lege Aluum porrò turbat capparis, ſtomacho, &c. ibid *ſemen drachmarum*, &c. lege: Semen drachmarum duarum pondere ex vino potum *& paulò poſt pro*, *epotus iidem*, lege: epotum itidem *deindeque pro*, *ex aceto decoctus*, lege: ex aceto decoctum. p.169.e. *Folia ad ſenas horas*, &c malim: Folia ad ſenas horas impoſita leucen ſanant: verùm poſtea hordeaceam farinam hydrelæo ſubactam adhibere oportet. p.171.a. *citra vſum liquoris ſorbitionem*, malim: nullo liquore inſuper abſorpto. ibid.d. *alus ex aceto molſe*, malim: aluis in oxymelite. ibid.f. *icterinos affectus*, corrige: vterinos affectus. p.174. b. *magnitudinis*, lege: magnitudine. p.187.b. *atteribus*, emenda: latioribus. p 189. c. *ſaluia*, lege: ſaluia p.191.d. *ſatureia*, malim: thymbra. p 194 a. *aridíque*, lege: aridíque. p. 205.b. *radix veri*, lege: radix verò. p.213.e *obolli pondere deuorandum datur*, lege: oboli pondere cera oblitus deuorãdus datur. p.214.d. *offuſámque*, lege: & offuſam. p.216 c. pro *κατακλυσις*, lege, *κάτω κλυσις*. p.227.d *ſi eam peruxeris*, malim: illum ſi peruxeris. p.232.f *he eadem*, corrige: hæc eadem. p.234.f. *adalligata*, lege: adalligatũ. ibid. pro, *effodiendam*, lege: effodiendum. p.237 f. *Theſſermon quod*, dele: *quod*. p.248.c. *Radix ex vino bibitur*, lege: Radix ex vino aut aqua bibitur contra venenatas beſtias, dyſenteriam, vtinæ diffic. p.259.a. dele *pediculis*. ibid.f. *erumpentémque ab*, lege: & erumpentem ab. p.264.c. *vnius pondere ex vino*, lege: vnius pondere cum thuris obolis tribus ex vini. p 266.c. *ſemine nigro. Nonnullis*, lege: ſemine nigro, quod pithitis [quaſi doliare] nominatur. Nonnullis & ipſum rhoeas ex eo dicitur, quòd ab eo liquor emanet. Eſt & tertium agreſt. ibid.d. *trochiſcos oportet*, *eóſque*, lege: trochiſcos oportet híque ſiccati ad vſum recondendi. p.267.g. *multum opio*, dele: *multum*. p.269.d. *pingue*, *molle*, lege: pingue eſt, molle. p.283.a. *teſtiſque ad mare*, lege: teſtiſque piſcium ad mare. p 284.f. *decoctum ruptis*, lege: Eius decoctum ruptis. p.301 c. *ad colorandum*, malim: ad compagem pharmaco inducendam. p.358. f. *addito ære*, lege: addito chalcantho aut, &c. p.374.c. *offendunt*, lege: offundunt. p.375.c. *inſperſum fronti cochlearu*, lege: inſperſum aquæ cochlearis. *In medio pag.* 17. *Schol.b. ante τὸ εἰς αὐτὸ*, add. c.cxiii. *Item pag.* 19. *b. circa medium ante ὁ τρόχος* add. c.cxxx. Item pag.61.a. poſt prunam annotationem, lege: *τὸ ὑποκύστιν*) Plinius de Ruta, lib.20.cap.13. *Si vrinam mouet, vt Hippocrati videtur, mirum eſt quoſdam dare velle inhibentem potui, contra incontinentiam vrinæ.*

ΠΕΔΑΚΙΟΥ

ΔΙΟΣΚΟΡΙΔΟΥ

ΤΟΥ ΑΝΑΖΑΡΒΕΩΣ

ΠΕΡΙ ΕΥΠΟΡΙΣΤΩΝ

ἁπλῶν τε καὶ συνθέτων φαρμάκων

βιβλία δύο, πρὸς

Ἀνδρόμαχον.

PEDACII

DIOSCORIDIS

ANAZARBAEI DE FACILE PARABILIBVS TAM simplicibus quàm compositis medicamentis, ad Andromachum, libri duo.

Interprete Iano Antonio Saraceno Lugdunæo, Medico.

Apud heredes Andreæ Wecheli, Claudium Marnium, & Ioannem Aubrium.

M. D. XCVIII.

EXIMIO VIRO ET AMICO INTEGERRIMO, D. IO. SAPORTÆ, REGIO APVD MONSPELIENSES MEDICINÆ PROFESSORI, IANVS ANTONIVS Saracenus, S.

DVOS hosce libros, Vir clarissime, qui quidem omnium propè morborum curationem per ἁπλᾶ remedia, eaque simplicia aut certè ex paucioribus composita, complectuntur, plerique Dioscoridi Anazarbæo ascriptos falsò fuisse suspicantur: nec immeritò. Enimuerò vix quisquam reperietur, cui vel prima inspectione non videantur partim ex illius libris de materia Medica, partim ex aliorum quorundam Autorum scriptis, non quidem ipsius Dioscoridis, sed alius potiùs cuiuspiam opera, collecti & quasi consarcinati: quippe cùm hic simplicibus nonnullis prorsus aliæ tribuantur appellationes, quàm quæ apud illum extant, ac solœcismi etiam complusculi, in quos vix alibi Autor ille impegisse deprehenditur, passim occurrant. Attamen cùm alioqui dicendi genus vnum idémque constet esse, aut certè nō ita ei dissimile, quo Dioscorides noster ἐν τοῖς ὑλικοῖς vsus est, præterea què sæpenumerò ab Actio ad hunc eundem Autorem remedia varia referantur, quæ non aliunde quàm ex his ipsis Parabilium ad Andromachum libris deprompta nemo non iudicet: vnà cũ piæ memoriæ doctissimis viris Morbano & Gesnero eò facilè adducor vt credã, & hosce libros, æquè ac priores illos, Dioscoridi Anazarbæo attribui oportere. Neque verò cùm sint fuerintque semper vnius eiusdémque stirpis diuersa synonyma, quorum essent alius alia significantiora, cuiquam alienum videri debet, vnum & eũdem Scriptorem, prout succurrit, modò hoc, modò illud nomen ad arbitrium vsurpasse. Quin & pro diuersorum temporum ratione, quibus hæc ipsa scribi potuerunt, apud vulgum, *Quem penes arbitrium est & ius & norma loquendi*, diuersa quoque nomina inualuisse mihi fit verisimile. Quòd ad solœcismos attinet, minimè dubium est, quin plerique librariorum seu incuria seu etiam insciția obrepserint. Sed & nonnullos interdum ipsi Dioscoridi per imprudentiam excidisse haudquaquá negauerim: quum & ad res magis quàm ad ipsa verba attenderet, & esset illi sermo Græcus insolitus ac inusitatus; vti vel ipse Galenus, lib. xi. simpliciũ, abundè testatus est. Nihilominùs, vt quæcunque Dioscoridis nomine circunferebantur opera vno volumine comprehenderentur, hos etiam libros prioribus adiiciendos existimauimus; præsertim cùm, præter ea remedia quæ in eius

libris de materia Medica reperiuntur, quamplurima etiam alia minimè spernenda contineant, quæ deinde à Paulo, Oribasio, Aëtio, ac ipso quoque Plinio transcripta facile est animaduertere: quæq; tutò, ceu tot grauissimorũ Medicorum authoritate cõfirmata, in pauperum maximè gratiam vsurpari possunt: vt quibus ad leuãdos sumptus paratu quàm facillima perpetuò præscribi debeant, non item operosiora illa πολυμιγῆ, quæ inanem plerunque ostentationem potius quàm certam vtilitatem præseferunt. Illa tamen ipsa ne ab omnibus quidem indiscriminatim, sed ab iis tantummodò vsurpari velim, qui firmius maturiúsque iudicium adepti, ac longo rerum vsu edocti, & singulorum medicamentorum vires pernouerint, & pro ratione causæ, magnitudinis ac temporis morborum, itémque partis affectæ aliarúmque id genus circunstantiarum, quas Dogmatici suo momento ponderare tenẽtur, remedia laborantibus accommodare didicerint. Etenim quotquot alij aut rerum imperiti aut inexercitati illis ita confident remediis, vt temerè ac citra distinctionem qualia libris hisce proponuntur ægrotantibus adhibeant, multos sæpenumerò in vitæ discrimen adducent, víxque vnquam optatum finem assequentur. Quandoquidem pleraque omnia plus ἐμπειρίας quàm Methodi aut rationis habere vel ex eo constat, quòd rectus conueniénsque illorum vsus, siue eorundem quantitatem, siue vtendi modum spectes, hîc nullatenus, aut certè perquàm rarò, traditur: id quod subinde Galenus, vt in Archigenis, Apollonij & aliorum aliquot Antiquiorum Medicorum, ita & in Dioscoridis scriptis reprehendit. Sed (quod illius pace dictum velim) non omnia simul & semel vbique aptè conuenientérque doceri possunt. Etsi porrò excellentissimi viri Io. Moibanus simul & Conradus Gesnerus hos eosdem libros iam antehac è Græcis Latinos fecerunt, atque suis doctissimis annotationibus & Galeni aliorúmque Græcorum artis Medicæ Principum symphoniis illustrarunt, necnon & quamplurima deprauatissimi exẽplaris Augustani manuscripti σφάλματα emẽdarunt; ac denique in illis edendis ita fœliciter elaborarunt, vt à nemine vix quicquam amplius sperari expectaríve debuerit: attamen & nos, ne officio nostro defuisse videremur, eosdem ipsos denuò recensendos atque recognoscendos sumpsimus: non pauca ex coniectura (quando subsidium nobis non aliunde suppetebat) restituimus: multa (nisi fallor) in meliorem ordinem redegimus: capitum quorundam seriem immutauimus: quæ perperàm disiuncta videbantur, coniunximus, adeóque numerum capitum imminuimus: quæ Dioscoride authore penitùs indigna legebantur, tanquam spuria & adulterina, ad operis calcem reiecimus: denique cùm prior illa interpretatio minimè sibi cohærens aut continuata, sed velut abrupta, imò verò pleriſque in locis manca & mutila esset, eam non reconcinnauimus modò, sed etiam renouauimus. Quòd si qua nihilominùs censura & animaduersione digna Lectores deprehenderint, vti certè multa supersunt, festinationi, quæso, nostræ, quam necessitas flagitauit, ignoscant: quandoquidem de his Parabilium libris priori tomo attexendis tùm demùm cogitare cœpimus, cùm illum Typographus penè ad vmbili-

cum

cum perduxisset. Cæterùm ex amicorum veterum numero te vnum delegi, vir clarissime, cui in his quæ mea sunt dedicarem. Nam præterquàm quòd mihi tecum summa necessitudo & familiaritas iam ab incunte adolescentia intercessit, quæ primùm ætatis studiorúmque communione contracta, mutuis deinde amicitiæ officiis confirmata constantérq; conseruata est: recentia etiamnũ extant tua in meos varia beneficia, quibus ita me profectò deuinxisti, vt nemini plus debere me lubens agnoscã. Siquidẽ è filiis meis, quos istuc ante paucos annos studiorum causa misi, natu maiorem, qui quidem hodie ciuile ius exercet, aliquoties ægrotantem diligentissimè curasti: alterius, qui adhuc istic agit, studia Medica propenso ac verè patrio animo semper adiuuisti, atque ita promouisti, vt, quod postremis tuis ad me literis consignabas, eum speres breui lauream Apollineam non sine laude communique Symmystarum applausu consecuturum: id quod faxit Deus Opt. Max. cui me meósque perpetuò commendaui. Illis vtique tantis ego beneficiis cùm essem tibi deuinctissimus, nequam ingrati animi notam subirem, mutuam animi mei erga te propensionem ac singularem beneuolentiam hoc saltem leuiusculo μνημοσύῳ numeris multis impari testatam volui. Id ergo hilari fronte vti suscipias, neque tam muneris exiguitatem, quàm offerentis gratam voluntatem spectes, ac denique, quantuluncunque illud est, æqui bonique vti consulas, te etiam atque etiam rogo. Interea vale, artis Medicæ Antistes præstantissime, & me meósque; sicuti facis, amare perge. Datum Kal. Mart. anno supra millesimum quingentesimum nonagesimo octauo.

* * *

LEMMATA LIBRI PRIORIS DIOSCORIDIS DE FACILE PARABILIBVS MEDICAMENtis, ad Andromachum.

PRÆFATIO.

¶ *Parabilia capitis affectuum remedia.*

CAP. I. Ad cephalalgias recentes & citra febrim.
II. Ad cephalæas seu cephalalgias diuturnas.
III. Sternutatoria ad eosdem capitis dolores.
IIII. Vaporationes & sicciora sternutatoria.
V. Apophlegmatismi.
VI. Perfusiones seu fotus.
VII. Ad Coryzam.
VIII. Sternutationes cientia easdémque inhibentia.
IX. Ad siriasin infantium.
X. Ad phrenitidem & lethargum.
XI. Somnifica foris adhibita.
XII. Eadem intrò sumpta.
XIII. Eadem ano subdita.
XIIII. Lethargicos excitantia remedia naribus admota.
XV. Eadem suffita & pota.
XVI. Ad vertiginem.
XVII. Ad maniam.
XVIII. Ad epilepsiam remedia.
XIX. Amuletum epilepsiæ.
XX. Epilepticos excitantia.
XXI. Eosdem prodentia.
XXII. Ad incubum.
XXIII. Ebrietatem arcentia.
XXIIII. Eandem discutientia.
XXV. Caput offendentia.
XXVI. Somnos perturbantia.

¶ *Oculorum affectorum remedia.*

XXVII. Oculos à fluxione præseruantia.
XXVIII. Eorundem fluxiones sistentia.
XXIX. Ad oculorum inflammationes.
XXX. Ad easdem imponenda fronti.
XXXI. Ad oculorum fluxiones simul & inflammationes.
XXXII. Ad eorundem epiphoras & vlcera.
XXXIII. Ad vehemētissimos oculorū dolores.
XXXIIII. Ad eorundem diuturnas fluxiones & vlcera.
XXXV. Lippitudinis amuleta.
XXXVI. Ad oculorum œdemata.
XXXVII. Ad eorundem confusiones ab ictu.
XXXVIII. Ad oculos cruore suffusos.
XXXIX. Ad oculorum procidentias.
XL. Ad staphylomata.
XLI. Ad oculorum hebetudines.
XLII. Ad oculorum cicatrices.
XLIII. Hebetibus oculis conferentia nocentiáque cibaria.
XLIIII. Ad nyctalopiam, seu nocturnam cæcitudinem.
XLV. Ad vngues oculorum.
XLVI. Ad genarum scabritiam.
XLVII. Ad callosas genas.
XLVIII. Ad milphosin & arrosas palpebras.
XLIX. Ad xerophthalmiam, seu lippitudinem aridam.
L. Ad leprosos palpebrarum affectus.
LI. Ad phthiriasin palpebrarum & superciliorum.
LII. Pungentes palpebrarum pilos renasci prohibentia.
LIII. Incommodos palpebrarum pilos replicantia.
LIIII. Ad ægilopas.
LV. Ad grandines.
LVI. Ad sugillata & liuentia.

¶ *Aurium male affectarum remedia.*

LVII. Ad aurium dolores & inflammationes.
LVIII. Ad aures fractas.
LIX. Ad aurium dolores & sibilos.
LX. Ad suppuratas vlceratásque aures.
LXI. Ad vermes aurium.
LXII. Ad carnes in iisdem excrescentes.
LXIII. Ad aurium sonitus.
LXIIII. Ad surditatem.
LXV. Ad aquam auribus intercluſam.
LXVI. Ad aurium contusiones.
LXVII. Ad animalcula in aurem illapsa.
LXVIII. Ad quæuis alia auribus illapsa.

¶ *Dentium & gingiuarum remedia.*

LXIX. Ad dentium dolores colluenda remedia.
LXX. In eundem vsum commanducanda.
LXXI. In eundem vsum dentium cauis indenda oblinendáve.
LXXII. In eundem vsum auri narive adhibenda. Amuletum.

LXXIII. Dentes citrá moleſtiam extrahentia.
LXXIIII. Ad infantium dentitionem.
LXXV. Ad dentium ſtuporem.
LXXVI. Smegmata dentes abſtergentia.
LXXVII. Ad mobiles dentes, humoréque nimio diffluentes gingiuas.
LXXVIII. Ad excreſcentes gingiuas liquida remedia.
LXXIX. Ad eoſdem ſicca.
LXXX. Ad Epulidas.
LXXXI. Ad nudatas carne gingiuas.

¶ *Ad reliquos oris fauciúmque affectus remedia.*

LXXXII. Ad oris ſerpentia depaſcentiáque vlcera.
LXXXIII. Ad putrida oris vlcera.
LXXXIIII. Ad grauem oris halitum.
LXXXV. Ad tonſillas inflammatas itémque vlceratas.
LXXXVI. Ad vuæ relaxationem.
LXXXVII. Ad anginas gargarizanda.
LXXXVIII. Ad eaſdem illinenda.
LXXXIX. Ad eaſdem in potu exhibenda.
XC. Ad extrahenda quæ inter deuorandum gulæ inhæſerint.
XCI. Vocem amiſſam reſtituentia.
XCII. Arteriam expurgantia.
XCIII. Voci ſplendorem afferentia.
XCIIII. Ad faucium aſperitatem.

¶ *Ad pilorum affectus remedia.*

XCV. Ad alopecias.
XCVI. Ad capillorum defluuium.
XCVII. Decorantia denſantiáque capillos.
XCVIII. Capillos flauos facientia.
XCIX. Eoſdem denigrantia.
C. Canitiem tardantia.
CI. Pilos extergentia.
CII. Eoſdem extenuantia.
CIII. Pſilothra ſeu pilos abolentia.
CIIII. Impuberum pilos retardantia.

¶ *Cutis in capite reliquóque corpore vitiorum remedia.*

CV. Ad capitis achoras, furfures & ſuperficiaria exanthemata.
CVI. Ad exanthemata intenſè rubentia.
CVII. Ad phthiriaſin, ſeu pediculárem morbum.
CVIII. Cutem extergentia.
CIX. Cutem faciémque erugantia.
CX. Faciem illuſtrantia.
CXI. Colorem commendantia.
CXII. Colorem mutantia.
CXIII. Alarum grauedolentiam emendantia.
CXIIII. Cicatrices nigras emaculantia.
CXV. Cicatrices corpori concolores reddentia.
CXVI. Stigmata quæ aboleant.
CXVII. Vibices cuti reliquæ concolores efficientia.
CXVIII. Vitiliginem albá & leucen exterentia.
CXIX. Ad vitiliginem nigram.
CXX. Ad lentigines ephelidas & varos.
CXXI. Ad ephelidas ſeu ſolares maculas.
CXXII. Ad varos.
CXXIII. Ad ſcabiem & pruritum.
CXXIIII. Ad pruritus pudendorum.
CXXV. Ad pruriginoſa exanthemata.
CXXVI. Ad lichenas ſeu impetigines.
CXXVII. Ad pruriginem.
CXXVIII. Ad lepram.
CXXIX. Ad recentes lepras.
CXXX. Ad vnguium ſcabritiam.
CXXXI. Scabiem tollentia.

¶ *Remedia ad mammarum affectus.*

CXXXII. Mammas cohibentia.
CXXXIII. Mammillas virginum ſuo in ſtatu cõſeruantia.
CXXXIIII. Turgentes mammas reprimentia.
CXXXV. Lac reſtinguentia poſt partum.
CXXXVI. Mammas grumoſo lacte turgentes lenientia.
CXXXVII. Lactis coagulationem inhibens auxilium.
CXXXVIII. Ad euocandum lac aſſumenda remedia.
CXXXIX. Lac attrahentia foris impoſita.
CXL. Mammarum inflammationes lenientia.

¶ *Remedia ad teſtium affectus.*

CXLI. Ad teſtium inflammationes.
CXLII. Ad eaſdem inueteratas.
CXLIII. Ad excreſcentem teſtium carnem.

¶ *Variorum tumorum præter naturam, vulnerum vlcerúmque remedia.*

CXLIIII. Ad furunculos.
CXLV. Ad partis cuiuſlibet inflammationes.
CXLVI. Ad meningis inflammationes.
CXLVII. Ad diuturna œdemata.
CXLVIII. Ad parotidas.
CXLIX. Ad tubercula diſſipanda.
CL. Ad eadem concoquenda ſeu maturanda.
CLI. Ad eadem rumpenda.
CLII. Ad rumpend s internos abſceſſus.
CLIII. Duritias emollientia.
CLIIII. Strumas diſcutientia.
CLV. Ad eaſdem amuleta.
CLVI. Ad meliceridas.
CLVII. Ad ſteatomata.
CLVIII. Ad bronchocelas.
CLIX. Ad polypos.
CLX. Ad ozænas.
CLXI. Ad vlcera in naribus, carnéſque ibidem excreſcentes.
CLXII. Ad vulnera recentia & ſinus.
CLXIII. Ad vulnera ſuperficiaria.
CLXIIII. Ad cólli veſicæ, nervorum ac menin-

gum diſſectiones.
CLXV. Ad neruorum vulnera ab inflammatione vindicanda.
CLXVI. Ad extrahenda oſſa.
CLXVII. Ad extrahenda ſpicula & aculeos.
CLXVIII. Ad eryſipelata.
CLXIX. Ad eadem.
CLXX. Ad herpetas.
CLXXI. Ad epinyctidas.
CLXXII. Ad fauos.
CLXXIII. Ad calceamentorum attritus.
CLXXIIII. Ad deſquamata.
CLXXV. Ad clauos.
CLXXVI. Ad verrucarum reliqua genera.
CLXXVII. Ad partis cuiuſuis acrochordonas.
CLXXVIII. Ad ambuſta.
CLXXIX. Ad perniones nondum vlceratos fotus.
CLXXX. Ad eoſdem illitus.
CLXXXI. A eoſdem vlceratos remedia.
CLXXXII. Vlceribus ſenilibus cicatricem obducentia.
CLXXXIII. Vetuſtis vlceribus cicatricem inducentia.
CLXXXIIII. Ad extremarum partium vlcera ſanatu difficilia.
CLXXXV. Ad putrida tibiarum vlcera.
CLXXXVI. Ad expurganda vlcera.
CLXXXVII. Vlcerum ab vſtione cruſtas circũquaque rumpentia.
CLXXXVIII. Ad vlcera carne replenda.
CLXXXIX. Ad carnes in vlceribus excreſcẽtes.
CXC. Ad pterygia.
CXCI. Ad paronychias.
CXCII. Ad aperienda callioſa & diuturna vlcera.
CXCIII. Ad rimas pudendorum.
CXCIIII. Ad vlcera pudendorum.
CXCV. Ad dolores pudendorum.
CXCVI. Ad nomas pudendorum.
CXCVII. Ad vermes vlcerum.
CXCVIII. Ad carbunculos.
CXCIX. Carbunculos ſuppurantia rumpentiáque.
CC. Ad nomas putridáque vlcera.
CCI. Ad gangrænas.
CCII. Ad fera vlcera.
CCIII. Ad maligna vlcera.
CCIIII. Ad phagedænas.
CCV. Ad elephantiaſin.
CCVI. Ad pedum rimas.
CCVII. Ad fiſtulas.
CCVIII. Ad hæmorrhagias in vulneribus.
CCIX. Ad ſanguinis per ſummam cutem eruptiones.
CCX. Ad hæmorrhagias è naribus.
CCXI. Ad grumos ſanguinis in imo corpore concretos.

¶ *Sedis affectuum remedia.*

CCXII. Ad hæmorrhoidas cohibendas.
CCXIII. Ad eaſdem aperiendas.
CCXIIII. Ad eaſdem dẽlendas.
CCXV. Ad ſedis inflammationes.
CCXVI. Ad ſedis dolores.
CCXVII. Ad reprimenda condylomata.
CCXVIII. Ad eadem tollenda, vti & ficos.
CCXIX. Ad prægrandes ficos.
CCXX. Tubercula ſedis vt ne repullulent.
CCXXI. Ad rimas ſedis.
CCXXII. Ad interna ſedis vlcera.
CCXXIII. Ad aſcaridas.
CCXXIIII. Ad ſedis procidentias.
CCXXV. Ad intertrigines.

¶ *Ad neruorum articulorúmque affectus remedia.*

CCXXVI. Ad luxata.
CCXXVII. Ad relaxatos artus.
CCXXVIII. Ad laſſitudines & intertrigines ex itinere.
CCXXIX. Ad tetanum cæteráſque conuulſiones aſſumenda.
CCXXX. Ad eoſdem affectus inungenda.
CCXXXI. Ad tremores.
CCXXXII. Ad linguæ paralyſin.
CCXXXIII. Paralyticis bibenda & inungenda.
CCXXXIIII. Ad arthritin interna remedia.
CCXXXV. Ad eandem, externa.
CCXXXVI. Ad podagricorum tophos ac nodos.
CCXXXVII. Ad iſchiadem in potu ſumenda.
CCXXXVIII. Ad iſchiadem enemata.
CCXXXIX. Sinapiſmus poſt enemata vſurpãdus.
CCXL. Iſchiadicis conuenientia cataplaſmata.
CCXLI. Ad Iſchiadem fotus.
CCXLII. Ad Iſchiadem vſtionis varia genera.

LIBRI SECVNDI LEMMATA.

PRAEFATIVNCVLA.

¶ *Ad ſtomachi & hypochondriorum affectus remedia.*

CAP. I. Ad ſtomachi diutinum ardorem ac ſitim.
II. Ad æſtuantem foris ventriculum.
III. Ad ventriculi & inteſtinorum flatus ex atra bile.
IIII. Ad ſingultum.
V. Ad ſtomachi dolores aſſumenda.
VI. Ad cardiogmon, ſeu oris ventriculi morſum.
VII. Ad ſtomachi dolores admouenda.
VIII. Ad cibi vomitum.
IX. Ad nauſeam & humida ſtomachi vitia, necnon & vomitum.
X. Ad ſtomachi fluxiones.
XI. Ad ſtomachi ſubuerſiones.
XII. Ad ſtomachi ex humiditate languorem admo-

admouenda.
XIII. Ad inflationes ventriculi.
XIIII. Ad ventriculi cruditates.
XV. Stomachum roborantia.
XVI. Ad mulierum picam seu malaciam.
XVII. Ad duritiem hypochondriorum.

¶ *Febricitantium remedia.*

XVIII. Ad linguæ asperitatem.
XIX. Ad quotidianas febres.
XX. Ad tertianas febres.
XXI. Ad quartanas febres.
XXII. Ad quarumuis febrium circuitus & rigores.
XXIII. Ad febres inordinatas.
XXIIII. Ad quosuis febrium rigores illinenda.
XXV. Ad lassitudines.
XXVI. Ad atrophiam.
XXVII. Ad sudores diaphoreticos.
XXVIII. Ad cardiacum affectum.

¶ *Pulmonis thoracisque affectuum remedia.*

XXIX. Ad sanguinis reiectiones.
XXX. Ad reiectiones diuturnas.
XXXI. Ad tusses veteres.
XXXII. Ad easdem tusses eclegmata.
XXXIII. Ad easdem suffitus.
XXXIIII. Ad rupta & conuulsa.
XXXV. Ad pleuritidem.
XXXVI. Ad peripneumoniam.
XXXVII. Ad vitiosorum è pectore reiectionem adiuuandam.
XXXVIII. Ad phthisin.
XXXIX. Ad dyspnœam, asthma & orthopnœam.

¶ *Ad intestinorum affectus remedia.*

XL. Ad tormina.
XLI. Ad intestinorum inflationes.
XLII. Ad intestinorum morsus.
XLIII. Torminosis admouenda.
XLIIII. Ad colicum affectum.
XLV. Ad ileon.
XLVI. Ad colicos paroxysmos.
XLVII. Ad alui diuturna profluuia.
XLVIII. Ad dysenteriam ore sumenda.
XLIX. Cœliacis & dysentericis in cibo vtilia.
L. Cœliacorum & dysentericorum externa remedia.
LI. Cœliacis accommodata enemata.
LII. Ad dysentericos enemata.
LIII. Morsus intestinorum ab enematis acrioribus inductos lenientia.
LIIII. Cœliacis ac dysentericis conuenientes insessus.
LV. Ad tenesmum.

¶ *Hepatis ac splenis affectuum remedia.*

LVI. Ad icterum seu morbum regium.
LVII. Ictericis accommodata errhina.
LVIII. Ad diuturnum hepaticum morbum.
LIX. Hepaticis admouenda.
LX. Splenicis salutaria.
LXI. Splenem absumentia vel imminuentia.
LXII. Splenicorum externa remedia.
LXIII. Hydropis, præsertimque ascitis, interna remedia.
LXIIII. Hydropis, quem anasarcu vocant, interna remedia.
LXV. Hydropicorum externa remedia.

¶ *Ad lumbricos remedia.*

LXVI. Ad latos lumbricos.
LXVII. Ad teretes lumbricos.
LXVIII. Ad ascaridas.

¶ *Ad vteri reliquorúmque genitalium membrorum affectus remedia.*

LXIX. Ad vuluæ procidentias.
LXX. Ad vteri inflammationes, obstructiones ac dolores, infessus atque suffitus.
LXXI. Ad eosdem vteri affectus, pessi, vnguenta & iniectiones.
LXXII. Ad eosdem assumenda.
LXXIII. Ad vteri vlcera.
LXXIIII. Ad mordaces vuluæ pruritus.
LXXV. Menstrua & à partu purgamenta moderatè cientia.
LXXVI. Eadem potentiùs mouentia.
LXXVII. Eadem potentissimè promouentia.
LXXVIII. Pessaria menses, à partu purgamenta ac fœtus quoque ipsos euocantia.
LXXIX. Ad eadem suffitus.
LXXX. Ad eadem insessus.
LXXXI. Ad eadem imo ventri adhibenda.
LXXXII. Ad fluxum muliebrem assumenda.
LXXXIII. Ad eundem subdenda vuluæ.
LXXXIIII. Ad eundem insessus.
LXXXV. Ad eundem imo ventri admouenda.
LXXXVI. Ad vteri suffocationem.
LXXXVII. Ad eundem olfactoria.
LXXXVIII. Ad eundem suffitus.
LXXXIX. Ad eundem subdenda sedi.
XC. Conceptum promouentia potu.
XCI. Idem præstantia appositu.
XCII. Masculi fœminæve sexus procreationem adiuuantia.
XCIII. Conceptum custodientia.
XCIIII. Ad partus difficultatem.
XCV. Ad conceptum impediendum.
XCVI. Venerem stimulantia.
XCVII. Venereos impetus inhibentia.
XCVIII. Ad genorrhœam, seu genituræ profluuium.
XCIX. Ad Veneris insomnia externa remedia.
C. Ad eadem, interna.

Renum ac vesicæ vitiorum remedia.

CI. Ad vrinæ incontinentiam.
CII. Ad nephritin.
CIII. Ad vlcus virgæ.
CIIII. Ad cruentam mictionem.
CV. Ad vesicæ cruciatus assumenda.
CVI. Ad eosdem admouenda.
CVII. Ad vesicæ vlcera.
CVIII. Ad vesicæ mordicationes.
CIX. Ad dysuriam seu vrinæ difficultatem.
CX. Insessus ad vesicæ affectiones.
CXI. Ad calculum.
CXII. Vrinam prolicientia.

Theriaca, hoc est, contra morsus ictúsque venenatos auxilia.

CXIII. Ad canis rabiosi morsum.
CXIIII. Ad quorumuis serpentium morsus.
CXV. Ad viperæ morsum.
CXVI. Ad cerastæ morsum.
CXVII. Vulneribus ex serpẽtium morsibus admouenda.
CXVIII. Ad hæmorrhoidis morsum.
CXIX. Ad presteris morsum.
CXX. Ad alpidis ptyadisve morsum.
CXXI. Ad scorpionum, phalangiorum, apum vesparúmque ictus assumenda.
CXXII. Ad eorundem ictus admouenda.
CXXIII. Ad scolopendræ & muris aranei morsus.
CXXIIII. Ad pastinacæ marinæ ictum.
CXXV. Ad marini draconis ictum.
CXXVI. Ad marini scorpionis ictum.
CXXVII. Ad stellionis morsum.
CXXVIII. Serpentes aliásque bestias venenatas substratu fugantia.
CXXIX. Easdem appositu necantia.
CXXX. Easdem illitu arcentia.
CXXXI. A serpentium morsibus præseruantia.
CXXXII. Amuleta quadam antipathia scorpio & venenatis bestiis aduersantia.
CXXXIII. Culices arcentia & abigentia.
CXXXIIII. Ad deuoratas hirudines.

Alexipharmaca, hoc est, venenorum assumptorum remedia.

CXXXV. Venenis in genere resistentia.
CXXXVI. Venenorum vim & efficaciam obtundentia.
CXXXVII. Aduersus aconitum.
CXXXVIII. Contra mel Ponticum.
CXXXIX. Contra toxicum.
CXL. Ad venena quæ telis gladiisve illinuntur.
CXLI. Ad ixiam.
CXLII. Contra cicutæ venenum.
CXLIII. Contra potum coriandrum.
CXLIIII. Contra taxi venenum.
CXLV. Contra potum psyllium.
CXLVI. Contra pharicum.
CXLVII. Contra opium, vel meconium.
CXLVIII. Contra ephemerum seu Colchicum.
CXLIX. Contra doryenium.
CL. Contra solanum manicum.
CLI. Ad hyoscyamum.
CLII. Ad cantharidas.
CLIII. Aduersus bupresti.
CLIIII. Contra pityocampas, seu pinorũ erucas.
CLV. Ad potam salamandram.
CLVI. Ad leporis marini venenum.
CLVII. Contra rubetæ & ranæ mutæ venena.
CLVIII. Contra haustum sanguinem taurinum.
CLIX. Ad lac intus coagulatum.
CLX. Aduersum fungos.
CLXI. Contra gypsi potum.
CLXII. Contra lithargyri potum.
CLXIII. Contra cerussam.
CLXIIII. Aduersus hydrargyron seu argentum viuum.

Epilogus.

PLINIVS HIST. NAT.

Lib. xxii. cap. 24.

NON fecit cerata, malagmata, emplastra, collyria, antidota parens illa ac diuina rerum artifex: officinarum hæc, imo verius auaritiæ commenta sunt. Natura quidem opera absoluta atque perfecta gignuntur: paucis ex causa, non ex contectura rebus assumptis, vt succo aliquo sicca temperentur admeatus, aut corpore alio humentia ad nexus. Scrupulatim quidem colligere ac miscere vires, non contectura humana opus, sed impudentia est. Nos nec Indicarum Arabicarúmque mercium, aut externi orbis attingimus medicinas. Non placent remedia tam longe nascentia: non nobis gignuntur, imo ne illis quidem: alioquin non venderent. Odorum causa, vnguentorúmque & deliciarum, si placet, etiam superstitionis causa emantur, quoniam thure supplicamus & costo. Salutem quidem sine his posse constare vel ob id probabimus, vt tanto magis sua delicias pudeat.

Idem lib. xxiiii. cap. i.

SOla Natura placuerat esse remedia parata vulgo, inuentu facilia ac sine impedio, ex quibus viuimus. Postea fraudes hominum & ingentorum captura officinas inuenere istas, in quibus sua cuique homini venalis promittitur vita. Statim compositiones & mistura inexplicabiles decantantur: Arabia atque India in medendo æstimantur, vlceríque paruo medicina à Rubro mari importatur, cum remedia vera quotidie pauperrimus quisque cœnet. Nam si ex horto petantur, aut herba vel frutex quæratur, nulla artium vilior fiat. Ita est profecto: magnitudo populi Romani perdidit ritus, vnicendoque victi sumus. Paremus externis, & vna artium Imperatoribus quoque imperat.

Idem lib. xxix. cap. i.

INuehi peregrinas merces, cõciliaríque extremo pretio, displicuisse maioribus crediderim equidem, non tamen hoc Catonem prouidisse, cum damnaret artem. Theriace vocatur excogitata compositio luxuria. Fit ex rebus externis, cùm tot remedia dederit Natura, quæ singula sufficerent. Mithridaticum antidotum ex rebus lxv. componitur, inter nullas pondere æquali, & quarundam rerum parte sexagesima denarij vnius imperata. Quo Deorum per fidem ista monstrante? Hominum enim subtilitas tanta esse non potuit. Ostentatio artis & portentosa scientiæ venditatio manifesta est. Ac ne ipsi quidem illam nouêre, &c.

PEDACII DIOSCORIDIS ANAzarbæi, de facilè parabilibus tam simplicibus quàm compositis medicamentis, ad Andromachum, Liber prior.

ΠΕΔΑΚΙΟΥ ΔΙΟΣΚΟΡΙΔΟΥ ΑΝΑζαρβέως περὶ εὐπορίστων ἁπλῶν τε καὶ συνθέτων φαρμάκων βιβλίον πρῶτον, πρὸς Ἀνδρόμαχον.

IANO ANTONIO SARACENO LVGDVNÆO INTERPRETE.

PRÆFATIO.

DOCTRINAM de simplicibus medicamẽtis, spectatissime Andromache, cã quæ de variè cõpositis agit gratiorem acceptioremque esse constat: quia non modò intellectu facilior est, sed & expeditior. Adde quòd singulorum quæ exhibentur vis & facultas, tãquam sincera, soluta & impermixta, vtentibus ipsis conspicuam sese præbet, ex eáque facilè deprehenditur id quod peculiaribus affectibus curandis aptè conuenientérque congruit: at in iis medicamentis, quæ maiore varietate prędita sunt, haud ita fieri animaduertitur. In iis enim facultas nõ ad singulares eorũ quę simul misceãtur actiones, sed ad ineffabilẽ quãdam ipsius mixtionis compagem refertur. Hos autem libellos tibi dedicamus, tũ quia pro rerũ vsu, quo ipse vales, de laboribus nostris iudiciũ facere potes, tum quia viro nostri studioso talis etiam gratia meritò debetur. Porrò à capitis affectibus ordiemur, si priùs monuerimus, remedia quæ ad interna vitia potionum forma vsurpamus, ea nos non nisi in diuturnis, quique iam veluti callum contraxerint, affectibus admittere: quippe qui haud ignoremus mala recentia communi ac minùs operosa curatione sanari.

ΤΩΝ ἁπλῶν φαρμάκων πρόδοσις, μιμώτατε Ἀνδρόμαχε, τῆς τῶν ποικίλων ἀποδεκτοτέρα πέφυκεν, οὐ μόνον διὰ τὸ εὐπαρακολούθητον, ἀλλὰ καὶ διὰ τὸ εὐπόριστον· ἐν διὰ τὸ αὐτῶν τὰ προσφερομένων ἑκάστου τὴν δύναμιν φανερὰν ὑπάρχειν τοῖς προσφερομένοις ἐν καθαρῷ, λελυμένην καὶ ἀμιγῆ πάντων ἑτέρων ὕλης ὑπαρχούσαν, λαμβάνεσθαί τε ῥᾴδιος ἐξ αὐτῆς τὸ ὡς πρὸς τὰ πάθη κατάλληλον· ὅθεν ὅτι τῶν ποικιλωτέρων ὑποκειμένων φαρμάκων διαφέρει γὰρ ἐν ἐκείνοις, οὐκ ὅτι τὰς κεκραμένας τῶν μιγνυμένων ἐνεργείας ἢ δυνάμεις ὅτι ἐν τῇ συγκράσει ἀνεκλάλητον ἀγνοοῦμεν διαφοράν. Ἀναπεπταμένην δέ, σοι τὰ βιβλία ταῦτα δυναμένῳ ὀλιγοπραγίᾳ δι' ἧς ἔχεις ἐμπειρίας τῶν ἡμετέρων πόνων, ἐν ᾧτινι ὀφείλεται ἀνδρὶ ἀποδεχομένῳ ἡμᾶς οὕτω χάρις. Ποιησόμεθα δὲ τὴν ἀρχὴν ἀπὸ τῶν περὶ κεφαλὴν συνισταμένων παθῶν, προδιαλαμβάνομεν ὅτι ὅσα ἐν τοῖς μέρεσι τοῦ καταλαμβάνομεν ὅτι τῶν ἐντοσθίων, ταῦτα ὡς ὅτι τὸ πολὺ ὅτι τῶν κεχρονισμένων ἤδη καὶ τύλον ἐχόντων ἐγχρίνομεν διαθέσεων. Οὐκ ἀγνοοῦντες μὲν, ὅτι σωθέντα πάθη διὰ τῆς καπνῆς καὶ ἀπειρήτου θεραπείας ἀγωγῆς.

Parabilia capitis affectuum remedia.

Ad Cephalæas recentes & citra febrim.

CAPITIS doloribus recentibus citra febrim ortis auxilio sunt infusa hæc olea: syluestris oliuæ,

Εὐπόρισα βοηθήματα πρὸς τὰ περὶ τὴν κεφαλὴν πάθη.

CAP. I. Πρὸς κεφαλαλγίας προσφάτους δίχα πυρετῶν γινομένας ὠφελοῦσι πίφουσι, ἔλαιον ἐμβρεχόμενοι τὸ ἐκ τῆς ἀγριάδος ἐλαίας,

ῥόδινον, μύρσινον, ἀμυγδάλινον, μήλινον, οἰναν-
θινον. πινεῖ δὲ ταῦτα καὶ μετ' ὄξους, καὶ
μετὰ χυλοῦ ἐρίνου πεπεμμενομένου αὐ-
δράχνης, ἀειζώου, ἑλξίνης, σρύχνου, πεπλό-
λυ χλωρᾶ, μυώπου. Ποιεῖ δὲ καὶ τὸ ψύλλιον
σὺν ὄξει βεβραχὲν καὶ ῥοδίνῳ· καὶ τῆλις βεβ-
ρεχεῖσα τῷ ὕδατι, καὶ ἐφεψηθεῖσα ὅτι ὀλίγον,
ἕως γλισχρώδης μαλθακὸς παντὸς μᾶλλον μετὰ ῥοδίνου καὶ
ὄξους ἐπιχριόμενος. Καταπλασμα κεφα-
λῆς, μετώπου καὶ κροτάφων. ἄρτον μετ' ὀξυ-
κράτου καὶ ῥοδίνου λειώσας ἐπιτίθει.

II. Πρὸς δὲ ταῖς χρονίαις κεφαλαλγίαις,
ὀίνιπον ἐμβρεχόμενα σὺν ὄξει καὶ ῥοδίνῳ
ταῦτα· σπονδύλιον, πεύκεδανον, ἄγνου σπέρ
μα σὺν ὄξει καὶ ῥοδίνῳ γλεικοπαθὲν, ὤκιμον,
ἄμωμον, δαφνίδες, ἔρπυλλον, καλαμίνθη,
κόνυζα ἢ λεπτόφυλλος, πήγανον, ἀμύγδα-
λαι πικραί. καὶ τὰ ἀποζέματα δὲ ταύτων,
μιγνύμενα τῷ ὄξει καὶ ῥοδίνῳ, ποιεῖ. πρὸς δὲ
ταύταις σκαμμωνία τε καὶ συκαμίνου ὀπὸς,
καταπλασσομένου τοῦ μετώπου καὶ κροτά-
φων· σίνηται δὲ εἰ ἐπιτύχοι, καὶ ὅλης τῆς κεφα-
λῆς. Ἁρμόζει δὲ μετὰ ἀλφίτου, ἤγουν ἀλεύ-
ρου κριθίνου ἢ ἄρτου, ταῦτα· ἠδύοσμον ὑγρὸν
καὶ ξηρὸν, ἀνδράχνη, ὑοσκυάμου φύλλα, σρύ-
χνου, κώειον, σικυοῦ, πολυγόνου, ἀειζώου, σι-
συμβρίου τε καλουμένης κερδαμώνος. μετὰ
ὄξους δὲ καὶ ῥοδίνου μυρσίνης καταπλάσ-
σεται ἄγνου φύλλα, ἀλόη, ἀμύγδαλαι πι-
κραὶ, μελίλωτον, μύρτα, ὀξυμυρσίνης κερ-
πὸς, οἰνάνθινον, ῥόδα, ῥίζα ἴριδος ξηρᾶς, ἀ-
γριελαίας ἄνθη, μελάνθιον, σαφὶς ἀγρία
μετὰ δαφνίδων, μάλιστα δ' ὅταν τῶν χρονίων·
σήσαμον ὁμοίως, ἄλευρον ὄλυρας μετὰ σέα-
τος χοιρείου. καὶ τὸ αὐτὸ ὅτι τῶν καταχρισμέ-
νων ἤδη· ἢ κερδαμον φώξας λεῖον, ἁναλάμ
βανε ὄξει καὶ ῥοδίνῳ, καὶ ἔμπλασον ὅταν τῷ
μετώπου. ἢ κέρυα Γοντικὰ καὶ πήγανον ὁ-
λίγον, λεῖα σὺν ῥοδίνῳ· ἢ σέλινον λεῖον σὺν
ὄξει καὶ ῥοδίνῳ φυρήσας, ἢ σικύου ἀγρίου ῥί-
ζαν ξηρὰν λείαν σὺν οἴνῳ· καπνιαίῳ· ἢ ἰ-
ρεως λείας ὀξύβαφον, πυρέως κύκλους ἑ-
πτὰ, σὺν ὄξει καὶ ῥοδίνῳ.

III. Παρμικὰ ἐγχρίσματα τῆς ῥινὸς
σὺν μέλιτι, καθαίρει καὶ ἀφ' ὑγιοῦς ὠφελίμως. χρώμεθα δὲ αὐτοῖς ὅτι τῶν
κεχρονισμένων κεφαλαλγιῶν, καὶ πρὸς μυδὶ τῶν ἄλλων βοηθημάτων ὑπακουσῶν.

A rosaceum, myrtinum, amygdalinũ, melinũ & œnanthinum: cáq; cum aceto, admixto interdũ succo portulacę, semperuiui, helxines, solani, tribuli virétis aut myosotidis. Est & efficax psyllium maceratũ in aceto cum rosaceo: necnõ & è fœnogræco in aqua macerato & leuiter cocto extracta mucilago, cum rosaceo
B & aceto itidem irrigata. Capiti verò, fronti ac temporibus cataplasmatis in modum adhibeto panem, cum posca & rosaceo tritum.

Ad Cephalæam ex inueteratis dolores. Doloribꝰ capitis inueteratis hęc cum aceto & rosaceo vtiliter irrigãtur: Spondylium, peucedanum, ocimũ, amomum, lauri baccæ, serpyllum, calamẽtum, conyza tenuifolia, ruta & amygdalæ amaræ. Idẽ
C præstãt eorũdẽ decocta, ámixtis aceto & rosaceo: necnõ & viticjs semẽ, cum aceto itidẽ & rosaceo ad strigmenti consistentiã redactum: adhæc scamoniæ & sycamini lacteus succus frõti ac tẽporibꝰ adhibitus: interdũ etiã, si dolor vrgeat, tori capiti. At cum polẽta farináve
D hordeacea aut pane cõueniunt isthæc: mẽta seu recens seu arida, portulaca, hyoscyami folia, solanũ, coriádrũ, intybi folia, itẽq; polygoni semperuiui, & sisymbrij qđ cardamine dicitur. Aceto verò & rosaceo mixta hæc imponũtur: viticis folia, aloë, melilotus, myrti baccæ, ruscifructus, œnanthe, rosæ, radix iridis ficca, oleastri flores, melanthiũ, staphis agria cũ lauri baccis, pſertim in diutinis doloribꝰ: sesamũ similiter, loliacea farina cũ adipe suillo, idq; in affectibꝰ iã inueteratis. Aut nasturtiũ tostũ & tritũ excipe aceto & rosaceo, frõtiq; alline. Aut: nucibus auellanis & pauca ruta tritis
F cũ rosaceo eodẽ modo vtitor. Aut: origanũ tritũ cũ aceto & rosaceo subigito, aut cucumeris syluestris radicẽ tritã cũ vino Aminæo: aut deniq; iridis tritę acetabulũ, additis pipis granis septẽ cũ aceto & rosaceo.

Sternutatoria ad eosdem capitis dolores. Sternutatoria quę naribus infunduntur cum melle, vtiliter etiam per os euacuant. Iis autem vtimur in antiquis capitis doloribus, quíque aliis nullis cedunt auxiliis.

Ἀμπάψ. ἢ πάφιον, μόλυβδαινα.

Sũr aũt ſucci anagallidis, marrubij, radicũ cyclamini & anemones, itẽq; cucumeris agreſtis & chelidonij minoris. Itidẽ foliorũ hederę & braſſicæ, necnõn & radicis betę albæ: præterea q; irinũ vnguẽtũ. Sicca verò tritáq; cũ melle infunduntur, ſtruthiũ, daphnoidis ſemẽ, iris ſicca, veratrum albũ, caſtoriũ, nitrum, ſampſuchũ, piper & ſtaphis agria: itémque melanthium cum irino vnguento, & elaterium ex aqua.

Vaporationes & fricura ſternutatoria.

Erit & vtile ſuffire excitare, quorũ vapores narib⁹ excipiátur, vti ex anſo. Iuuát & cõueniẽtib⁹ adhibita tẽporib⁹ ſternutatoria: qualia ſũt, veratrũ, caſtoriũ, pip, ſtruthiũ, ſinapi, & ęrugo raſilis: trichomanes itidẽ tritũ narib⁹ inditũ, vti & ptarmica herba, ab effectu nomen ſortita.

Apophlegmatiſmi.

Quin & apophlegmatiſmi haud inefficacitèr vſurpantur, in his qui diuturno capitis dolore infeſtátur. In eũ verò vſum cõmodè cõmáducátur, daphnoidis ſemẽ, capparis agreſtis fructus, crethmi & naſturtii ſemina, maſtiche, ſinapi, pip rotũdũ æquè ac longũ, pyrethrũ & ſtaphis agria cum nitro & pipere: (ſed hęc fauces adurunt:) anemones radix, vua paſſa extractis vinaceis cũ pipere, thymus, hyſſopus, ſtruthiũ. Eſt & vtilis vaporatio ex aqua marina calente in aceto cocta.

Perfuſiones.

Sin doloris acerbitas nos ad alia magis cõpoſita tranſire cogat auxilia, poſt antè memorata abraſo pri⁹ capite pfuſionibus vtemur, è decocto cupreſſi, lauri, capitulorũ papaueris ſiccorũ, viticis foliorũ & ſeminis qđ papaueris erratici capitulis cõtinetur. Sed his vtimur etiá in curádis phreniticis: ſũt enim ſõnifera.

Ad coryzam.

Catarrhos q in nares ferũtur inhibẽt, bitumẽ ſuffitũ, myrrha narib. illita, & farina fabarum cũ allio abſorpta. Cõfert & nigella plurimùm olfactu, itẽq; cupreſſi pilularũ ſemẽ cũ vino tritũ & in nares attractum.

Sternutamenta excitantur, ſi digitis firmiter prehendantur nares ſimul & venæ ad oculorũ angulos ſitæ. Cõtrà ſiſtuntur ſternutationes continuę, herbęocimi aut ſeminis eiuſdem contriti odore.

Sternutationes cientia, cohibentia, inhibentia.

VIII. Παρμικὴ χυθὲν πρὸς ἀκρατηθεῖσα τοῖς δακτύλοις αἱ ἐξικνοῦδες φλέβες, καὶ ῥῖνες. παύει δὲ παρμικὴ συνεχῆς, ὠκίμου σπέρμα λεῖον, καὶ ἡ πόα ἀποσφεσμένη.

A Ἀναγαλλίδος χυλὸς, σφασίου, κυκλαμίνου ῥίζης, ἀνεμώνης ῥίζης, σικύου ἀγρίου ῥίζης, χελιδονίου τῆς μικρᾶς τὴν ῥίζαν, κυνοσβάτου φύλλων, κράμβης φύλλων, τευτλίου λευκοῦ τῆς ῥίζης· ἴριος μῦρον· Ξηρὰ δὲ λεῖα ἀγχεῖται σὺν μέλιτι, ἕρπυλλον, δαφνοειδοῦς σπέρμα, ἴρις ξηρὰ, ἑλλέβορος λευκὸς, καστόριον, νίτρον, σάμψυχον, πίπερι, σταφὶς ἀγρία, μελάνθιον σὺν ἴρινῳ, ἐλατήριον σὺν ὕδατι.

B IIII. Ὑποθυμιῶνται δὲ ταῖς ῥισὶ δι' ἧς τῆς τὰ τμῆσι αἰσθάνεται, ὠφελεῖ αἴσιον. Ὠφελεῖ δὲ καὶ σὺν οἰκείοις καθάρσεσι προλαμβανόμενα καὶ τὰ παρμικά. ἔστι δὲ ἑλλέβορος καὶ καστόριον, πίπερι, ἕρπυλλον, σήπια, ἰὸς ξυσὸς, τετριμμένος λεῖον σὺν ῥίμνοις τῶν ῥισὶν, καὶ ἡ λεγομένη παρμικὴ πόα.

C V. Καὶ οἱ ἀποφλεγματισμοὶ δὲ οὐκ ἀνωφελῶς δοκοῦσι τῶν χρονίως κεφαλαλγούντων παραλαμβάνεσθαι. Ἐπιτηδεύονται δὲ διὰ μακρῶν τούτων, δαφνοειδοῦς σπέρματος, καὶ πάρεως τοῦ ἐν τῷ ἀγρίου καρπου, κρήθμου, καρδάμου καρποῦ, μαστίχης, νάπυος, πάρεως τροχίσκοι ἐν μακρῷ, πυρέθρου, ἐν ταφίδος ἀγρίας, μετὰ νίτρου καὶ πεπέρεως· (χρῶνται δὲ ἀρτηρίαις) ἀνεμώνης ῥίζα, ταφὶς ἐν λεγαρπισμένη μετὰ πεπέρεως, θύμον, ὕσσωπον, ἕρπυλλον. ὑπαλειφόμενα δὲ πρὸς ὠφελείας καθίστανται θάλασσα θερμὴ σὺν ὄξει ἐψομένη.

D E VI. Εἰ δέ ποτε ἀναγκαζόμεθα δι' ὑπερβολὴν ἀλγημάτων ἐπὶ ποικιλωτέρας ἐρχεσθαι βοηθείας, χρησόμεθα ἐν τοῖς προειρημένοις καὶ καταπλήσμασιν, ἐψιλωμένης τε κεφαλῆς· ἀποζέματι κυπρίου, δάφνης, μήκωνος κωδίων ξηρῶν, ἄγνου φύλλων, καὶ καρπου μήκωνος τῆς ῥοιάδος τῶν κεφαλῶν. χρώμεθα δὲ τούτοις καὶ διὰ τῶν φρενιτικῶν· ἰσχνωτικὰ γὰρ ἅπαντα καθίστησι.

F VII. Καταῤῥοῖς δὲ ἐν μυκτῆρσιν ἐφίεσιν, ἀσφάλτου ὑποθυμιωμένη, σμύρνα δι' ἀχειομένων τῶν μυκτήρων, κυάμινον ἄλευρον σὺν σικυηρόδῳ ῥοφούμενον. μελάνθιον ὀσφραινόμενον ὠφελεῖ μεγάλως. κυπαρίσσου σφαιρίου σπέρμα, τετριμμένον μετ' οἴνου καὶ ἀναῤῥοφηθὲν τῶν μυξωτήρων.

IX. Τοῖς δὲ στιεμῶσι παιδίοις ὠφελίμως κατὰ τῶν βρεγμάτων ἐπιτίθεται ἡλιοτρόπιου τὸ σκορπιούρου καλουμένου φύλλα, κολοκυνθης ξύσματα, σικύου τὸ πέπονος τὸ ἐπικείμενον τῇ σαρκὶ δέρμα, τρύχου κηπαίου τῶν φύλλων χυλὸς μετὰ ῥοδίνου.

Ad vlcera in fronte.

X. Ἐπὶ δὲ τῶν μετὰ πυρετοῦ πλεῖω κεφαλαίων πεπονθότων, ὡς ἐπὶ φρενιτικῶν καὶ ληθαργικῶν, ἁρμόζει ἰδίως ἅπασι σπέρμα μετ' ἐλαίου ἐφριφθὲν ἐπὶ βρεχόμενον· ἀμύγδαλαι πικραὶ σὺν ὄξει καὶ ῥοδίνῳ, πήγανον σὺν ὄξει καὶ ῥοδίνῳ, καὶ ἔρπυλλον ὁμοίως, χυλὸς τῶν φύλλων κισσήρου, ἢ πευκέδανον, ἢ ἄσαρον δόλιον μετὰ ῥοδίνου καὶ ὄξους, πήγανον καὶ λίνου σπέρμα πεφωγμένον ἰσοχῆ, αἰσθητὰ κηρωτῇ ἐπιτιθέντα ἐπὶ τὸ κεφαλαῖον καὶ τὸ μέτωπον.

Ad phrenitic. & lethargum.

XI. Ὑπνοποιεῖ δὲ καὶ ἥσυχον καὶ ἀπλασσόμενα κατὰ τῶν μετώπων ἢ μυκτῆρσι προσαγόμενα, καρπὸς ὠχίμου, ἀτραπυλίδος, μήκωνος ὀπὸς, ὑοσκυάμου καρπὸς καὶ φύλλα, ἀλικακκάβου ὁμοίως· ἢ τὰ μανδραγόρου φύλλα. εἶδος δέ ἐστι μανδραγόρου τρύχου ῥίζης τὸ ὑπνωτικόν· φλοιὸς, βακχαρίδος φύλλα· ἔστι δὲ βώδιον· μελαθρῶν φύλλα ἐφθέντα ὀξυφῶ, τῶν μυξωτήρων διαχωρήματα, κρόκινον, μετώπιον, κύπερος. αὐτὴ μανδραγόρου, ὀπὸς καὶ ῥίζα, καὶ καρπός· ἢ μήκωνος ὁμοίως, κισσήρινον, σμύρνα.

Somnifica foris adhibita.

Radices inuol sumptæ.

XII. Γ πόμα δὲ ὕπνον ποιεῖ μήκωνος ἀ. μετὰ κύαθος καὶ σμύρνας ἴσον, δίδου δραχμὰς γ'. ἢ μανδραγόρου ὀβολοὺς δύο μετὰ προγεγραμμένων ἴσων, ἢ τῆς ῥιζῶν τὸ ἀπόβρεγμα, κυάθων δύο λαμβανομένων ἢ ὀπὸς μήκωνος ὅσον ὄρεβος καταπινόμενος. ἢ τὰ φύλλα δὲ μήκωνος αὐτὰ λαμβανόμενα, ἐσθιόμενα· θρίδακος ἀγρίας ὀπὸς καὶ ἡμέρας πινόμενος, καὶ αὐταὶ δὲ ἐσθιόμεναι. Χρώμεθα δὲ τοῖς ὑπνωτικοῖς καὶ ἐφ' ὧν ἔστι χρόνια τὰ πάθη, ὅταν τεμνόμενός τις ἢ καιόμενος, αἰσθανόμενος ἐθελήσῃ τῶν ἀλγηδόνων γίνεσθαι.

Contra lethargicos excitare scripsit Dioscor. 2. de Mat. med. c 26.

Ad lethargicos excitandos.

XIII. Δακτυλίῳ δὲ προσαγόμενα ὕπνον ποιεῖ, μανδραγόρου ἢ μήκωνος ὀπὸς αἰθρὶς, καὶ σὺν ἐλαίῳ προσθεὶς.

Lethargicos excitare valent hęc admota narib⁹: acetú, veratrú albú, sinapi, piper, castorium, struthium,

XIIII. Εγκρατικὰ ἔχει δύναμιν ὅτι ληθαργικῶν τὰ ῥισὶ προσαγόμενα, ὄξος, ἑλλέβορος λευκὸς, σίνηπι, πίπερι, καστόριον, στρούθιον,

Sirijsi laborãtibus pueruliś ex vsu sũt hæc sincipiti imposita: heliotropij, quem scorpiurum vocãt, folia, cucurbitæ ramenta, cucumeris, qui Pepon dicitur, cutis carni incumbens, solani hortensis è foliis succus cum rosaceo.

His quibus cũ febre caput malè affectum est, veluti phreniticis atq; lethargicis, priuatim ista cõueniũt: lini semen cum oleo coctum & instillatum, amygdalæ amaræ cum aceto & rosaceo, ruta itidem cum aceto & rosaceo, similitérq; serpyllum, hederaceorum foliorũ succus, castorium aut peucedanũ, aut spõdylium cum aceto & rosaceo: ruta deniq; & lini semẽ leuiter tostum, si cerato excipiantur & capiti frontíque adhibeantur.

Somni porrò conciliãdi vim habent hæc imposita fronti cataplasmatum more, vel naribus admota: semen ocymi & atractylidis, papaueris liquor, semẽ ac folia hyoscyami, similitérque halicacabi, morij, quæ species est mandragoræ, folia, solani somnifera è radice cortex, baccharis folia, quæ quidẽ odorata sunt, fœniculi folia in vino decocta & naribus affricta, crocinũ vnguẽtum, metopium, cyprus, mandragoræ similitérque papaueris flores, liquor, radix & semen, castorium, myrrha.

Hæc verò sũpta somnos alliciũt: Meconij drach. j. cũ styracis ac myrrhę pari põdere misceto: dosis quãta est triũ cerui granulorũ magnitudo. Aut mandragoræ obolos duos cum antè memoratorum pari pondere exhibeto. Aut diluti quod ex eiusdẽ radicibus paratur cyathos duos. Aut papaueris liquor cerui magnitudine deglutiatur: aut papaueris folia in cibo sumantur. Idẽ præstãt lactucæ syluestris æquè ac satiuæ liquor haustus, ac ipsæ quoq; lactucæ esitatæ. Cæterùm vtimur & somnificis in diuturnis affectibus, cùm quis sectionẽ vstionémve admissurus cruciatuum sensum cupit euitare ac subterfugere.

Radix assa data.

Accersit & somnum mandragoræ aut papaueris liquor, si dilutus lana excipiatur anóque subdatur.

ſpondylium,peucedanũ,vituli marini coagulum,cedria, pix liquida, ruta,abrotonũ, vſtus lucernæ funiculus,naſturtiũ, pix cruda, laſerpitij liquor, cepa, allium, galbanum, bitumẽ, vrtica cruribus & frõti admota,frigidę copioſę aut aceti perfuſio,tritũ ſinapi ex aceto cruribus & manibus extremis illitũ. Aliud: aſininæ auris. ſordibus ægri frõtem illine. Aliud, quod non quidem excitat,ſed ſomnũ potiùs allicit: Thuris, myrrhæ ana drachmas ij. radicis ſiccæ nigri mandragoræ ana drachmas ij. opij drachmá j. terito & cum roſaceo miſceto, tandémq; panniculo lineo excepta olfacito.

Aliũ ſuffitus. Suffitu verò excitãt hęc: lapis qui intra Samiam terram reperitur, loti arboris ramentorum dilutũ, caſtorium, balſami ſemen ex aqua (quod vertiginoſos itidẽ irrigatũ adiuuat) lapis gagates, peucedanũ, bitumẽ, ſulphur, galbanum, ſpondylium, ſagapenum, lichen equorum, muli & elephãtis vngula, eboris ramentũ, cornu ceruinũ: vituli marini, itẽq; hœdi coagulum, hirci ſordes, adeps crocodili, abrotonũ & laſerpitium.

Eadem pręc. Excitãt & hęc in potu ſumpta, lapis qui in Samia terra reperitur, loti arboris ramentorũ dilutum, caſtorium, ſeménque balſami ex aqua.

Ad vertiginoſ. Vertiginoſis vtiles ſunt irrigationes, quas anteà caput dolẽtibus cõuenire diximus. Eoſdẽ etiã excitãt quæcũq; lethargicos exp̃gefaciũt.

Ad maniam. Furioſos itidẽ iuuabunt irrigationes, quarũ vſum in capitis doloribꝰ eſſe diximus. Iiſdem porrò in potu conferunt, hippomarathri radix & ſemẽ ex aqua, bryonię radicis itidẽ drach. j. ex aqua aut melicrato quotidie ſũpta, necnõ & lapis qui in Samia terra reperitur, ac reſinæ itidẽ Africanæ drach. j. ex aqua pota. His prætereà ſuffitus iidem adhibẽtur, quos lethargicis aſcripſimus.

Ad epilepſiã remedia. Comitiales iuuãtur, ſi [eorũ ſcrophulę ad collũ vſq;] muſtelę ſãguine perungãtur. Sed & ipſa muſtela cõfert abiectis capite ac pedibꝰ cocta, & in cibo ſumpta: veluti & iecur eiuſdẽ ex aqua potũ, itẽq; iecur aſininũ eſitatũ, idq; ieiuno vẽtricu-

Cõtrà ſentire videtur ipſe Dioſcorides lib. 2. de Mat. med. c. 28.

μὶ ὑγιεινοῖς, ἀλλὰ ἐναντίοις

Lapis vtilis ad vertigin.

Ἀσκανδύλιον, πλυκέδανον, φώκης πίτυα, κεδρία, πίσσα ὑγρά, πήγανον, ἀβρότονον, ἐλλυχνίου κεκαυμένου, κάρδαμον, πίτυα ὠμή, σιλφίου ὀπός, κρόμμυον, σκόροδον, χαλβάνη, ἄσφαλτος, κηδίη τραγείου μὴ σκέλεσι καὶ μετώπῳ ὕδατος πολλοῦ καὶ ψυχροῦ, ἢ ὄξους κατὰ τὰ αὐτὰ πλύσις· σίνηπι λεῖον σὺν ὄξει καταχριόμενον τῶν σκελῶν καὶ χειρῶν ἄκρων. ἢν δ' ῥίπτῃ τὸ ὠτὸς τὸ ὄνου ἀλίφε τὸ μέτωπον τὸ ἔχοντος. Ἄλλο· διεγερτικὸν καὶ ὑπνωτικὴν λύσιν, σμύρνης αἶα < .ϛ'. μυδαλαίης μέλανος τὸ ῥίζης ξηρᾶς Γο. ϛ'. ὀπίου μήκωνος Γο. ά. τείλφας, μίξας μετὰ ῥοδίνου ἐλαίου, καὶ ὄμφακος ἐῶν εἰς ῥάκος λινοῦν φραίνου.

Lapis vtilis ad vertigin.

XV. Ὑποθυμιάματα δὲ ἐγείρει, λίθος καὶ τῶν ἐν τῇ Σαμίᾳ γῇ βιοσκόμενος, λωτοῦ τὸ δένδρου τρισμάτων τὸ ἀπόβρεγμα, καστόριον βαλσάμου καρπὸς μὲθ' ὕδατος, ὃς καὶ τοὺς σπερματικοὺς ὠφελεῖ· ἢ ἐμβρέγματα· λίθος γαγάτης, πλυκέδανον, ἄσφαλτος, ἠῖον, χαλβάνη, ἀσκανδύλιον, σαγαπηνὸν, λειχὼν ἵππων, ἡμιόνου, ἐλέφαντος ὄνυξ, καὶ ξύσμα ὀδόντων, κέρας ἐλάφου, φώκης πίτυα καὶ ἐείφου, πάγος ῥύπος χρεοδίλου σίαρ, ἄβρότονον σίλφιον. Γ πόσμα δὲ ἐγείρει λίθος ὁ ἐν τῇ Σαμίᾳ γῇ βιοσκόμενος, λωτοῦ τὸ δένδρου τρισμάτων τὸ ἀπόβρεγμα, καστόριον, βαλσάμου καρπὸς μὲθ' ὕδατος.

XVI. Καὶ τοὺς σπερματικοὺς δὲ ὠφελεῖ ἐμβρέγματα τὰ προγεγραμμένα· ὅτι τὴν κεφαλαλγείαν. διεγείρει δὲ αὐτοὺς ὅσα καὶ τοὺς λιθαργικούς.

XVII. Χρῆσθαι δὲ χὴ ὅτι τ μανιώδεσιν, ὅτι βρέγμασι τοῖς εἰρημένοις ὅτι κεφαλαγίας. Ποτήμασι δὲ ὠφελεῖ ἱππομαράθρ ῥίζα καὶ τὸ σπέρμα σὺν ὕδατι, ἕρυσιμου ῥίζας < .ά. μὲθ' ὕδατος καθημερινὸ σὺν μελικράτῳ· καὶ λίθος ὁ ἐν τῇ Σαμίᾳ γῇ βιοσκόμενος, ῥητίνης Λιβυκῆς < ά. μὲθ' ὕδατος πινόμενον. θυμιᾶ δὲ ὅτ' αὐτ ὠφελίμως ὅσα ὅτι λιθαργικῶν ἱσόρροπα.

XVIII. Ἐπιληπτικοὶ δὲ ὠφελεῖσθαι, ἐὰν τὰς χεῖρας αὐτῶν μέχρι τ πρακτίου γαλῆς αἵματι καταχρίσῃ. ὠφελεῖ δὲ καὶ ἐ-

Verba quidam haud dubiè ex malè intellectis iis quæ leguntur apud Dioſc. lib. de Mat. med. 2. cap. de muſtela hùc locũ deprauaſſe videntur.

φθὴ ἐαθιομένη γαλὴ, χωρὶς τῶν ποδῶν αὐτῆς καὶ κεφαλῆς· καὶ τὸ ἧπαρ δὲ αὐτῆς μὲθ' ὕδατος πινόμενον ὠφελεῖ· καὶ ἧπαρ ὄνειον ἐαθόμενον· πίσσης δὲ λαμβανόμενον σὺν

ἢ λέοντος χολὴ μίξας μέλιτι ἀπόθου, καὶ δίδου ἐστιόθην κοχλιάριον ἓν μὲθ' ὕδατος ὑπὲρ ἡμέρας ἑπτά, καθαρσίου προκαθαίρων τὸ σῶμα. κρόκης ὀβ. γ'. νάρδου ὀβ. β'. ἑλλεβόρου μέλανος ὀβ. α'. σκαμμωνίας < δ'. πέπερι < β'. μέλιτι ἀναλαμβάνειν ἐν δίδου < β'. μετὰ μελικράτου. πόσει δὲ καὶ πελαργοῦ κόπρος μὲθ' ὕδατος, ἢ μετ' ὀξυμέλιτος. ἕλκει δὲ ἀγαρικοῦ ὀβ. γ'. πόλιον ὁμοίως τὸ αὐτό. ἕλκει φώκης πτυὰς ὀβ. α'. σὺν ἐλαφρίνῃ λεῖα. ἢ ὀνώνιδος ῥίζας εἰς ὀξυμέλιτι εἰς τὸ ἥμισυ ἕψαι. Πίνεται ὠφελίμως σὺν ὀξυκράτῳ αἰγίειον κρέας. ἀμμωνιακοῦ θυμιάματος, < α'. αἷμα δὲ ἄγει πηλοῦ ἀγρίου σπέρμα· ἀκάνθης Ναξίας τὸ ἀπότεμμα, ἢ τὸ πρὸς αὐτῷ ἀκανθῶντος σὺν ἐλαίῳ σιδήρου· πτυὰ λαγωοῦ ἢ περδικοῦ. σπονδύλιον σὺν ὕδατι. βρυωνίας ῥίζης < α. καθ' ἡμέραν εἰς ἑαυτὸν λαμβανομένη· ἕρυχνος τῷ τὸ καρπὸν ἔχοντος πυρὸν ῥίζα ξηρά. θαλασσίου κάρπου < ς'. ἢ φώκης πτυὰ μετ' ἴσπανου λειχάνων. καὶ αὐγὴ δὲ καθ' ἑαυτὴν λειχῆνες. ἴον ἀγρίου ἄνθος. λίθος Ἄσιος μετὰ μέλιτος, ὅτι παιδίων. καρδαμώμου < α'. λωτοῦ τοῦ δένδρου τὸ ὡρισμένον ἀπόβρεγμα· πετροφύλλου φύλλα λ'. καθ' ἑκάστην ἡμέραν ὅτι ἡμέρας λ'. πινόμενα καθ' ἑαυτά. πίνεται δὲ καὶ χελώνης χερσαίας καὶ θαλασσίας αἷμα. ποιεῖ δὲ καὶ ἐφθεῖσα καὶ ὠμὴ λειχομένη. ἐρίου λαοῦ ἐσθιόμενον. ὄξος σκιλλιτικὸν καταρροφούμενον· ὀπὸς φύλλου, ἢ πὸς σὺν ὄξει λαμβανόμενος, ὑπερροφεῖ δὲ ὑδρόμελι. Ποιεῖ καὶ τάδε· χαλκῆς κονίας χοᾶς πληρώσας ξήρανον, καὶ δίδου ἐξ αὐτῆς μεθ' ὕδατος, ἢ ὄξους. ἢ λίθον σταλαϊτίδα ἀπόξεσον δίδου. ἢ μήκωνος ἀφρώδους κάρπου, ὀξυβάφου πλῆθος. ὄνυχος ὀνείου κεκαυμένου κοχλιαρίου β'. πλῆθος. ὠφελεῖ δὲ καὶ ὁ ὑπὸ τὴν γλῶσσαν φλέψ· ἐκτεμηθεῖσα τὴν τὸ δεξιὸν μέρος ὡς ὅτι δάκτυλοι· κρίθη λεία καταπλασθεῖσα. καὶ ταῖς ῥισὶ δὲ ἐστάλαται ὠφελίμως, χολὴ χελώνης θαλασσίας.

ΧΙΧ. Πεσσαπόμενον δὲ ἰκανῶς ὠφελεῖ τοῦτο τοὺς ὑπολιπικούς. χελιδόνων νεοσοὺς ἀναξήρας ἐκ τῆς πρώτης νεοσιᾶς, εὑρήσεις λίθους ἐν τῇ γαστρὶ δύο, ποικίλους. Aliud: fel leoninũ melli admixtum ſerua, & de eo exhibe cochlear vnum ex aqua ad dies ſeptẽ, purgato tamen priùs corpore ſequenti medicamento: Cnici obolos tres, nardi ob. ij. veratri nigri ob. j. ſcammoniæ drach. iiij. nitri drach. ij. melle excipito, & drachmas duas ex aquæ mulſa potui dato. Prodeſt & ciconiæ ſimum ex aqua vel aceto mulſo. Itidem agarici ob. iij. peucedani tantundem & coaguli phocæ obolus vnus terantur, ſimúlque miſceãtur. Aut: radices ononidis in aceto mulſo coquito ad medias. Vtiliter quoque bibitur ex poſca populi nigræ fructus, necnon ammoniaci thymiamatis drach. j. (ſed ſanguinem educit:) rutę ſylueſtris ſemẽ, quod è corte Naxia ferro exacuendo deteritur cum oleo, leporis aut hinnuli coagulum, ſpondylium ex aqua: radix bryoniæ drach. j. põdere ſumpta quotidie ad annũ integrũ: ſolani quod fuluũ gerit fructũ radix ſicca, balſami ſemen pondere drach. vj. Sic & phocæ coagulum cũ lichenibus equorum, ac ipſi quoque lichenes per ſe, flos violæ agreſtis, lapis Aſius cum melle, in puerulis: cardamomi drach. j. loti arboris ramẽtorũ dilutũ. Conueniũt & quinquefolij folia tricena diebus triginta per ſe pota. Bibitur & ſanguis teſtudinis tã marinæ quàm terreſtris: eadem etiã cocta & delincta proficit: plantago eſitata prodeſt, acetũ ſcilliticum abſorptum, laſerpitij ſemẽ aut ipſe liquor in cibis ſumptus, dummodò aqua mulſa ſuperbibatur. Efficaciter etiã auxiliatur muſtelæ ventriculus coriãdro refertus & exiccatus, ſi de eo bibẽdum detur ex aqua vel aceto. Aliud: lapidis ſelenitis deraſum puluerẽ exhibeto, aut papaueris ſpumei ſemẽ acetabuli menſura, aut vngulæ aſininæ vſtæ cochlearia duo. Iuuat & venã quæ linguæ parti dextræ ſubiacet ad digiti fermè ſpatium incidere. Valet & vrtica trita & adhibita. Naribus verò fel teſtudinis marinæ vtiliter inditur.

Inter amuleta comitiales hoc potẽter adiuuat: Hirundinum pullos primæ fœturæ diffinditos: in eorum ventre duos inuenies lapillos,

vnum qui dem colore varium, alterum purũ & vnicolorẽ. Hos priuſquàm terrá attigerint, pelli muſtelæ aut cerui platycerotis illigato, & è collo brachióve ſuſpendito cõtinenter geſtãdos, ita vt nunquam humi deponãtur. Sunt porrò hi lapilli intereadum Luna creſcit inquirendi. Hoc eodem amuleto quẽ acceſsio comitialis inuaſerit ſi contigeris, excitabitur.

Epilepſiæ remedia. Excitãt & comitiales ſinapi cum aceto olfactũ & ſuffumigatum galbanum. Quinetiam cõfeſtim reuocabitur æger, ſi quancumq; libuerit illius corporis partem compunxeris, manantéque inde ſanguine os ipſius perunxeris.

Reſtim præſentia. Suffitu verò comitiales arguũt, bitumẽ, lapis gagates & cornu caprinum: iecoris itidẽ caprini aſſati nidor, & ipſum quoque iecur in cibo ſumptum.

Ad incubum. Iis quos incubus frequẽter quaſi prętocat, remedio ſunt pęonię grana nigra xv. ex aqua ſæpenumero pota.

Ebrietatẽ arcent. Ebrietatem arcent, amygdalarũ amararũ cremor cyathi vnius mẽſura potus, ceruina caro ſale condita, ſi aſſata præſumatur, vinũ abſinthites præbibitum, ac myrtites etiá ſimiliter ſumptum, myrti quoque baccæ eſitatæ, & rutæ decoctum hauſtum.

Eandem diſcutiunt. Ebrietatem verò iam cõtractam diſcutiũt, centaurij tenuis decoctũ, verbenacæ ſupinæ ſemen ex aqua potum: ſic & braſſica & raphanus, ſi ſuperedantur.

Capitis offendicula. Porrò in capitis affectibus cauẽda quæ idipſum tentare apta nata ſunt, adeóque affectus ipſos plerúque renouant aut exacerbant. Sunt autem huius generis quæ bibuntur iſta: viticis ſemen, abſinthij ſuccus & lac dulce. In cibis verò ſumuntur, glandes quernæ, oliuæ nigræ, fructus arbuti, quos memæcyla vocant: eruum, quod quidem frequẽtiùs eſitatum etiá articulos reſoluit. Ampliùs verò caput offendit, adeò vt leuem etiam ſoporẽ inducat, myrrha epota: thus, quod & inſaniam parit: hederæ corymbi, qui mentẽ etiá permouent: holoſchœni ſemẽ, ſoporiferũ adeò vt mentẽ etiam ſæpe lædat: crocus, peuceda-

A λει ἕνα ἢ τ καθαρὸν ἕνα· τοῦτο δὲ σφιγξαμένῃ πτῆναι, ὕδατι εἰς δίμα χαλκῆς, ἢ πλατυκέρωτος ἐλάφου, ἢ σκέλος πραχέλφ ἢ βεγχίου. διυτικῶς δὲ ἐχέτω τοῦτο, χαμαὶ μηδέποτε πλείς. λαμβάνε δὲ μεταξὺ αὐξομήνης ἢ σελήνης τοὺς λίθους. τοῦτο αἱ παρουσίας ἐπιληφθέντι, διεγερθήσεται.

B XX. Ἀνακαλεῖται ἢ τοὺς ὑπολήπτους σίνηπι μετ' ὄξους ὀσφραινόμενον· χαλβάνη τιθυμιαθῆσα. Καὶ δίελης δὲ ἐξ οὐδενὸς μέρους τὸ σῶμα ἀπ' αὐτῆς, καὶ τῷ ἀπορρέοντι αἵματι δεχρίσης τὸ σῆμα, βλάβας διεγίεται.

XXI. Ἐλέγχει δὲ ὑπολήπτους θυμίαμα, ἄσφαλτος, γαλάτης λίθος, κέρας αἴγιον. Εὐθύμημα ἢ, ὥσπερ πάλαι, ἢ ὀσμή τι ἀπ' αὐτοῦ ὑπολαμβάνουσα φερομένη.

C XXII. Πρὸς δὲ τοὺς ὑπὸ τῆς ἐφιάλτου σπαστικῶς πνιγομένους, ἰῶνται γλυκυσίδης οἱ μέλανες χάκκοι ιδ'. πολύποδος μὲν ὕδατος πολλάκις.

D XXIII. Ἀμέθυστα δὲ ἔστιν, ἀμυγδάλων πικρῶν ἀποβρέγματος κύαθος εἷς πινόμενος, ἢ λάφου ταρίχους ἐπὶ ὀνομένου, ἢ οἴνου ἀψινθίτου τοσοῦτον πινόμενον, ἢ μυρτίτης ὁμοίως λαμβανόμενος, καὶ τὰ μύρτα ἐσθιόμενα, καὶ πηγανίου ἀπόζεμα πινόμενον.

E XXIIII. Ἐπιπινόμενα ἢ μέθην σβεννύει, κενταυρείου τοῦ λεπτοῦ ἀπόζεμα· ἱερᾶς βοτάνης τὸ σπέρμα μετ' ὕδατος πολύ, καὶ χράμβη ἐπιθυμόμενα, καὶ ῥάφανος. Λέγ. ἀκολουθήσαντα ἐμοὶ δοκεῖ.

XXV. Δεῖ δὲ προφυλάττεσθαι ὅτι τοῦτο τὸ κεφαλαιῶδες παθῶν, τὰ ἀπόνοια ποιοῦντες, καὶ πολλάκις εἰς ὑπομνήσεις καὶ πρόξυσμοὺς ἄγοντα καὶ διαθέσεις. ἔστι δὲ πινόμενα μὲν, ἄγνου σπέρμα, ἀψινθίου χύλισμα, γάλα γλυκύ· ἐσθιόμενα δὲ βάλανοι δρύϊνοι, ἐλαῖαι μέλαιναι, ὁ καρπὸς τῆς κομάρου, ἔστι δὲ μεμηκωλογ· ὄσχοι, οὗτοι δὲ καὶ ἄρθρα προφυλάττει πολλάκις βρωθείς. ὅτι πλείων ἢ ἄπεπτα, ὥστε καὶ ἰσχναίνειν, σμύρνα πιομένη· λίβανος, ὃς καὶ μανίαν ποιεῖ χλωρὸς χόρυμβοι, οἳ καὶ παραφόνους ποιοῦσι διαθέσεις. ὀλοχρίου καρπὸς χρηστὸς ὥστε καὶ παίζειν πολλάκις ποιεῖ διαθέσεις. κρόκος, πευκέδα- Ἴσως κρομμύου λεγόμενον σέριον.

Mosb. ex Gal. & Aëtio addit, τὰ ἐκχύδια ὄντως, quippe cum styrax iisdem autoribus ofis largioribus somnos turbulentos efficiat.

ρου, κυκλάμινος ξηρὰ σὺν οἴνῳ πωθεῖσα. στύραξ δὲ ὀλίγος μὲν πωθεὶς λύει σκυθρωπότητα, πολὺς δὲ καὶ καταστρέφει.

A nũ, cyclaminus ſicca in vino pota: ſtyrax denique, qui quidem parcè bibitus, triſtitiam ſoluit, liberaliùs verò hauſtus, eandem affert.

Somnos turbulẽtos efficiunt hęc in vino pota: pycnocomi ſemen, itidémq; leõtopodij, necnon & faba freſa copioſior in cibo ſumpta. Somnos perturbantia.

XXVI. Τὰ ἐκχύδια δὲ ὕπνους ποιεῖ πολλοὺς σὺν οἴνῳ, πυκνοκόμου καρπὸς, λεοντοπεδίου ὁμοίως, ἐρεγμὸς πολὺς βρωθείς.

Τὰ πρὸς ὀφθαλμῶν βοηθήματα.

Oculorum affectorum remedia.

B

Quominus oculi fluxionib⁹ reddantur opportuni, prohibet largioris frigidæ affuſio, admixto etiã interdum aceto, præſertim æſtatis tempore. Oculos à fluxione præſeruantia.

XXVII. Ὀφθαλμοῖν δὲ μελλόντων ῥυματίζεσθαι, ἐφίστησι πολλοῦ ψυχροῦ κατάντλησις, ὀξέος ἐνίοτε καὶ ὄξους μιγέντος, καὶ μάλιστα θέρους.

Ipſas verò fluxiones ſiſtunt adhibita fronti anacollemata, ex oui cãdido, farinæ polline & thure ſimul mixtis & linteolo inductis. Iuuat & coquinariam fuliginem ſaliua ſubactam illinere. Eaſdem fluxiones ſiſtũt. al. è populo nigra collectum.

XXVIII. Ἰσχουσι δὲ τὰ ῥύματα ἐπὶ τοῦ μετώπου ἐπιπλήσματα ἀνακολλήματα, ὠοῦ τὸ λευκὸν, γύψος, λίβανος, μιγέντα καὶ ἐπιχριόμενα ὀξυνίῳ, ἢ ἀπὸ τῆς * μεγίστης αἰθάλη πτυέλῳ μαλαχθεῖσα ἐπιχρίεται.

XXIX. Πρὸς δὲ φλεγμονὰς τῶν ὀφθαλμῶν καταπλάσματα ἁρμόζει, ἄλφιτα μὲν ἀνθρωλώπου καταπλασσόμενα, βάτου φύλλα ἢ ἀνθρωλώπου, ἢ μυὸς ὠτίδος, ἢ περιβόλου χλωρὰ, αἰσθράχης, ἀειζώου, ἀμμώμου, ἡμεροκάλλους, ἴου, χρίστωνος· φύλλα ἐλάτης, φύλλα πολυγόνου, στρείδος, στελίνου, κορίου, κυπαρίσσου φύλλα λεῖα, κολοκύνθης ξύσματα, πέπονος σάρξ, ῥοΐνου φύλλα καὶ ἄπαλά, ὑοσκυάμου φύλλα, κυδωνίων αὖγος, μήκωνος κωδίων ἀφέψημα προσαντλούμενον, καὶ αὐταὶ αἱ κωδίαι λεῖαι καταπλασσόμεναι, βούτυρον νεαρὸν μὲν ἐρείου ἐπιπλήσμενον, χράμβης φύλλα θερμὰ ἐπιπλήσματα, χρόκος σὺν μελιλώτῳ καὶ γλυκεῖ, φλόμου φύλλα ἑφθὰ σὺν οἴνῳ μετὰ παλῆς ἀλφίτου, ἀβρόβοτον σὺν μήλῃ κυδωνίῳ ἑφθῷ, τυρὸς νεαρὸς λεῖος. Ad oculorum inflammationes.

Fronti verò impoſita iuuant, beta cum exiguo alumine trito, malabathri folia in vino feruefacta, fabacea farina cum aqua, cucumeris Peponis dicti caro, & rutæ folia in vino decocta. Imponenda fronti.

μυὸς ὠτίδος.

XXX. Καλὰ δὲ καὶ πρόσωπα καταπλασσόμενα ὠφελεῖ, στύπλοι σὺν ζυμῇ καὶ ὀλίγῃ λεία, μαλαβάθρου φύλλα εἰς οἶνον ἀπεψεσμένα, κυάμινον ἄλευρον σὺν ὕδατι, σικύου πέπονος σάρξ, πηγάνου φύλλα ἐν οἴνῳ ἑφθά. Ad oculorũ fluxiones ſimul & inflammationes.

Ad inflammationes ſimul & fluxiones oculorum valet ſequens remediũ: ſucci radicis aſphodeli, croci, myrrhæ an. drach. j. cum paſſi veteris ſextariis duobus coquito, dũ vnita probè linimenti craſſitudinẽ adipiſcãtur. In idipſum faciũt, glaucium ex aqua, crocus cum lacte, dẽſatus cicutę ſuccus: Lyciũ, ac denique coctus roſarum ſuccus.

XXXI. Πρὸς δὲ φλεγμονὰς καὶ τὰ ῥύματα, τοῦ ἀσφοδέλου ῥίζης χυλοῦ < .ά. κρόκου < .ά. σμύρνης < .ά. γλυκίωνος παλαιοῦ ξέ. β. ἕψει ἕως ἐνωθῇ καὶ σχῇ ὑπόχρισιν πάχος. ποιεῖ καὶ τὸ γλαύκιον σὺν ὕδατι, κρόκος σὺν γάλακτι, κωνείου χύλισμα, λύκιον, ῥόδων χυλὸς ἐψηθείς.

Ad eorundem epiphoras & vlcera.

Quæ verò sequúntur simplicia neque adeò operosa remedia, ipsis adhibita oculis, valent tum ad sistendas cõfestim oculorum epiphoras, tum ad eorundem vlcera & expurganda & carne implenda: spodium & laser paribus mista portionibus & in pastillos conformata, semperuiui ac portulacæ succi cum gummi & spodij dimidia parte in trochiscos cõformati, ac in recenti malo seu instillati seu etiam illiti: itidem portulacæ succus, & ocimum cum vino.

A XXXII. Ἐγχυματιζόμενα δὲ ὠφελεῖ ἀνθρακῶδη καὶ ἀσβέστεργα οἶδα, καὶ ἄγρυπνα παχέως ἐπιφορεῖς, ἕλκη πλησιοῦντα καὶ ἀποκαθαίροντα· ἀποδίδωσι καὶ ὅπως, ἴσα μιγνύμενα αὐτῆς εἰς ἀναπλασιν ἀμυζῶν χυλὸς, καὶ ἀνθράκων τὸ πορφυροῦν ἐγχυματιζόμενοι μετὰ κόμμεως ἢ ἀποσίου ἡμίσους. (ἄνευ τὸ ἀποσίου ἡμίσους) ἀναπλαθέντες καὶ ἀναξηράνθεντες καὶ ἀρνογλώσσου χυλὸς, ὄξυμελι σὺν οἴνῳ.

Fortè sinarum.

Parithesi inclusa abūdare videntur: & subaudiendum ἦ

Ad vehementes oculorum dolores.

Vehementes oculorum dolores mitigat, crocus cum lacte, spodium cum dẽfato cicutæ succo, opium similiter, æs vstum, lapis [illegible] cum lacte muliebri, maximè infantibus, instillatus. Eximiam verò opem affert & iste illitus: Sume succi gramis Parnassij & meliloti partes æquales, myrrhæ dimidium, piperis ac thuris tertiam partẽ, vini ac mellis quantum sat est: coquito in æneo vase, ac vtitor.

B XXXIII. Τὰς αἐκωδυνίας δὲ παύει κρόκος σὺν γάλακτι, ἀποδίδωσι σὺν κωνείου χυλίσματι, ὄπιον ὁμοίως, χαλκὸς κεκαυμένος, λίθος μετὰ γάλακτος γυναικείου, καὶ μάλιστα ὅταν παιδίου σπαζομένους. Ποιεῖ δὲ ἄκρως καὶ τοῦτο τὸ ἔγχρισμα· ἀγρώστεως χυλοῦ τὸ ἐν Παρνασσῷ, καὶ μελίλωτος, ἴσα, σμύρνης ἥμισυ, πεπέρεως καὶ λιβανωτοῦ τὸ τέταρτον, οἴνου καὶ μέλιτος σύμμετρον ἑψῆσαι ἐν χαλκοῖς καὶ χρῆσθαι.

Galactitem aut Melitē lapidē supplet ex cretis Mohamis de eate accipiendū censet, cui lac ipsum instilletur.

Ad eorundem diuturnas fluxiones & vlcera.

Inueteratis vlceribus atque fluxionibus cõuenit trita & ex aqua illita, lapis galactites ac thyites itidẽ ductus: lapis sapphirus cum lacte, syluestris lactucæ liquor cum lacte muliebri: ipsa quoque lactuca facit ad vlcera & epicaumata. Sumptum verò in potu cuminum ex vino & aqua, diuturnas fluxiones sistit.

C XXXIIII. Πρὸς δὲ τὰ κατάρροια ἕλκη καὶ ῥύματα ἁρμόζει σὺν ὕδατι λεῖα ἐγχριόμενα, λίθος γαλακτίτης, λίθος θυίτης καλούμενος, λίθος σάπφειρος σὺν γάλακτι, χαλκὸς κεκαυμένος σὺν γάλακτι, φύλλαι ἀγρίας ὄπος σὺν γυναικείῳ γάλακτι· αὐτὴ δὲ πιεῖσα πρὸς ἕλκη καὶ πρὸς ὀπτικὰ μαλάσσει. Πτόλεμον δὲ ἔσπον ῥύματα χρόνια κύμινον, σὺν οἴνῳ καὶ ὕδατι λαμβανόμενον.

Lippitudini cumulata.

Lippitudiné arcet perpetuò appensa collo tribuli radix similitérque polygoni. Credũtur & anno toto a lippitudine incolumes cõseruari, qui Punicę arboris cytinos exiguos necdũ hiantes deuorauerint.

D XXXV. Περικαθομένη δὲ τὴν κατάχυσιν διαφυγὼν κωλύει ὀφθαλμίαν, τερβόλου ῥίζα, πολυγόνου ὁμοίως. δοκοῦσι δὲ τηρεῖν ὅλον τὸν ἐνιαυτὸν ἀνοφθαλμιάτους κύπτινοι ῥοιᾶς μικροὶ καὶ μεμυκότες καταπινόμενοι.

Ad oculorum ædemata.

Oculorum œdemata mitigant, ammi cum lini semine, anethi radix in puluerem redacta cum aqua, fabacea farina cum puluere thuris, itémque oui candidum.

E XXXVI. Οἰδήματα δὲ παύσει, ἄμμι σὺν λινοσπέρμῳ, ἀνήθου ῥίζα μὲν ὕδατος λείᾳ, κυάμινον ἄλευρον σὺν λιβανωτοῦ λείῳ, καὶ ᾠοῦ τὸ λευκόν.

Ad ecchymoses ab ictu.

Oculorum ab ictu confusionibus & inflammationibus priuatim opitulatur storbes fructus in vino coctus, deindéq; tritus & impositus.

Ad oculos cruore suffusos.

Oculis cruore suffusis medetur sanguis recẽs detractus è columba, turture, perdice, palúbo: lac itẽ muliebre cum thure, granum tinctile cum lacte similiter, hæmatites lapis cum lacte muliebri, hyssopi puluis

F XXXVII. Πρὸς δὲ τὰς ἐκ πληγῆς συγχύσεις καὶ φλεγμονὰς ἰδίως ποιεῖ, σικύας καρπὸς σὺν οἴνῳ ἐψηθεὶς καὶ λεῖος ὀπτικὸς.

G XXXVIII. Ὑποδρομὰς δὲ αἵματος θεραπεύει ἐγχριόμενον αἷμα τετραπόδων φρόσφαιον, πτηνοῦ, πέρδικος, φάττης. γάλακτι γυναικεῖον σὺν λιβανωτοῦ, κόκκος βαφικὸς σὺν γάλακτι ὁμοίως, αἱματίτης λίθος σὺν γάλακτι γυναικείῳ, ὕσσωπον λεῖον σὺν δι-

ἐπιφοινίσσω. ἢν εἰς ὀθόνιον, καὶ ἀλόπα πόμφολυξ εἰς ὕδωρ θερμὸν, ὑπερκαθήμενον τοῦ ὀφθαλμοῦ ἀσφαλῶς καὶ λίβανος ἴσα τῷ θυμιάματι. A linteolo inuolutus in calentẽ aquã demersus, & oculo prototu adhibitus. Suffumigatur & oculi bituminis ac thuris paribus portionibus.

XXXIX. Περιπώσεις ὀφθαλμῶν γέλλει καταπλασμάτιον, εἰ μὲν ἀλγήματα εἴη, λινόσπερμον καὶ τῆλις σὺν ὑδρομέλιτι ὀφθ. εἰ δὲ παρήκμακε τὰ ἀλγήματα, ἢ μηδὲ ἐλθόντα, βύθιος ὅπου τὰ σύφεα καὶ ψύχειν δυνάμενα προσφέρεσθαι δεῖ, οἷά ἐστι βάτου φύλλα, μελίλωτον σὺν γλυκεῖ καὶ ὠῷ ἐφθοῦ λεκύθοις καὶ κρόκῳ, κυάμινον ἄλευρον σὺν ῥόδοις, λινόσπερμον σὺν ὕδατι καὶ λιβανωτῷ καὶ σμύρνῃ, μελάνθιον σὺν ἀλφίτῳ λείῳ, μηκώνιον σὺν λεκύθῳ ὠοῦ ὀπτοῦ καὶ κηρωτῇ, πήγανον σὺν ἀλφίτῳ. B C

Procidentes oculos reprimũt, si quidem dolores infestant, impolita hæc: lini semen & fœnumgræcum cum aqua mulsa cocta. Sin dolores remiserint, aut nulli prorsus adfuerint, statim ad ea quę adstringendi refrigerandiq; facultate pollent accedendum: qualia sunt rubi folia, melilotus cum passo, ouorum coctorum vitellis & croco: lomentum fabarum cum rosis, lini semen cum aqua, thure & myrrha: melanthium cum polenta tritum, meconium cum assati oui vitello & cerato, ruta cum polenta. Ad procidentia.

XL. Σταφυλώματα δὲ αἴρει, καθαρείδος τραγοφάτου θλασθείσης ἐγχριόμενον τὸ ὑγρὸν, ἢ αὐτή. καθαίρει δὲ τὰ ὕπτια σκοτώματα τῆς κόρης, ἄργεμα καὶ νεφέλια καὶ ἀχλῦς ποιεῖ δὲ καὶ ὀξυδορκίαν. Staphylomata tollit contusæ recèns cantharidis humor illitus: ac ea ipsa quoque. Purgat & quæcunque pupillis tenebras offundunt, vti argema, nubeculas & caligines, oculorúmque aciem exacuit. Ad staphylomata.

XLI. Ἐπὶ δὲ τὴν ἀμβλυωπιῶν ἐγχρίσματα, ἀκόρεω χύλισμα, λιβανωτίδος σπέρμα λεῖον μετὰ γάλακτος. μήκωνος κεφαλῆς τὸ φύλλον ἢ τὸ ἐπ' αὐτῶν ὁ χυλὸς ἐσταζόμενος, καὶ ὅτι κτενῶν ἄργεμον ἀποκαθαίρει. ἀλικακαβοῦ ῥίζης τὸ φλοιοῦ καρπὸς χυλὸς ὁμοίως, ἢ καὶ ὁπὸς αὐτοῦ σὺν μέλιτι· πόκης δὲ ὁπὸς ὁμοίως, σαγαπηνοῦ ὁμοίως, ἀσεμωνίου χυλὸς ὁμοίως, ὁρμίνου ἀγρίου σπέρμα ὁμοίως, καὶ χελιδονίου ἄφοδος ὁμοίως, ἐλαίας Αἰθιοπικῆς τὸ δάκρυον, ἐλλεβόρου λευκοῦ, ἕλκη οἰσυπηρὰ καθαιρόμενα, εὐφορβίου χυλὸς, ἰοῦ κατεὶς, κισσοῦ, κινάμωμον, ἰτέας χυλὸς καὶ ὁπὸς, κεντορείου τοῦ λεπτοῦ χυλὸς, κισσήρεως ὀπὸς λεῖα, κεφαλληνίου χυλὸς, κυκλαμίνου τῆς ῥίζης χυλὸς, μαραθίου τῆς ῥίζης χυλὸς, μελάνθιον, ἢ μυλιοσφόλλου χυλὸς, ἡμερήρουος χυλὸς, ὀμφάκιον, ὁπὸς σιλφίου, ὁποπάνακος, πηγανίου ἀγρίου χυλὸς, δρακοντίου ῥίζης χυλὸς, θρίδακος ἀγρίας χυλὸς, ἀψίνθιον, λεῖον, λευκοῦ τῆς πόας χυλὸς, χαμαίδρυος χυλὸς, ὠκίμου χυλὸς, τραγασίου χυλὸς, ὑέγειν, ζογγίβερι, τρουλλίου, κυπρίας ἢ κεκαυμένη, αἱματίτης λίθος, κοχλίου, κοχλίας χερσαίας κεκαυμένος, χελιδόνων νεοττῶν κεκαυμένων εἰς τίφρα· τούτων ἕκαστον σὺν μέλιτι E F G

Ad oculorum hebetudinem.

Oculorum hebetudini medẽtur hæc illita: densatus acori succus, libanotidis semen cum lacte tritum, è corniculati papaueris folio aut etiã flore succus instillatus, qui quidem & argema iumẽtorum expurgat: halicacabi è radicis cortice & semine succus eodem modo, ac liquor etiam eiusdem cum melle. Similiter & peucedani liquor, sagapenum, anemones succus, hormini syluestris semen, fimum cenchridum, oliuæ Æthiopicę lacryma, veratrum album, lanæ succidæ vstæ, euphorbij succus, ęrugo vsta, hedera, cinnamomum, salicis succus & liquor, cẽtaurij minoris succus, pumicis vsti puluis, cepę succus, cyclamini è radice succus, vti & è radice fœniculi: succi melãthij, apiastri & senecionis: omphacium, laser, opopanax, rutæ syluestris succus, dracunculi è radice succus, agrestis lactucæ succus, absinthium tritum; succi loti herbæ, chamædryos, ocimi & marrubij: nitrum, zingiber, struthium, alumen vstum, hæmatites lapis, corallium, terrestris cochlea cremata, vstorum hirundinis pullorum ceu cinis: horum inquam vnumquodlibet cum melle

Attico probè contritum. Scobs ebeni cum vino, vrina pueri impubis in æneo vase cocta cum melle, vrinæ humanæ sedimentum cum cyprino oleo, æris flos tritus & cum æquali portione olei subactus, oleũ antiquum, balsami liquor cum olei cyprini pari portione, picis oleum, saccharum, adeps fluuiatilium piscium in iole eliquatus & melli ammixtus: fella denique perdicis syluestris, callionymi piscis, scorpij piscis, testudinis marinæ, hyænæ & capræ agrestis, horum inquam singula cum melle.

Ad oculorum cicatrices.

Priuatim oculorũ cicatrices illita exterunt, alcyonium Milesium cũ melle, & ammoniacum cũ vino ac melle tritũ, anemones rotundæ radix itidem cum melle: similiter & anagallidis puniceæ succus, necnon & rutæ agrestis.

Hebetudini oculis in cibis aduersãtia.

Porrò laborãtibus oculorum hebetudine in cibis ista conueniunt, viperæ caro cocta, thymus, crudi brassicæ caules, raphanus, fœniculum, cepa, nasturtium, acetum scilliticũ, & in vniuersum acria omnia. In itidẽ verò cibis ea cauere oportet quæ hebetudinem augent, vti anethum cum suo semine, lenticulam, nigricates olivas, lactucam, porrum capitatum, apiũ & ocimũ.

Nyctalopiã seu nictalopiã curantia.

Nyctalopas iuuant iuncta hæc: sanguis turturis, palumbis, colũbæ, perdicis aut capræ syluestris & hirci, sanies è caprino iecore dũ inassatur extillãs inũcta, ac ipsum quoque iecur in cibo sumptum, necnõ & ex eodem dum coquitur vapor in apertos oculos attractus. Cõfert & elaterũ tritũ cũ melle inũctum.

Ad vngues oculorum.

Vngues oculorum absumũt hæc adhibita: pumex crematus & tritus, sepiæ testa trita, sal & cadmia, trita omnia æquali pondere.

Ad genarũ scabritiem.

Scabras genas extenuant quæ sequuntur trita & cum melle illita, ita tamen vt haud ita multò post aqua locus foueatur, dum morsu excitatus dolor desinat. Sunt autem isthæc: ærugo, ferrique scoria vsta, atramentum sutorium crematum, misy vstum, chalcitis cremata, omphacium, squama æris & ferri, cadmia tertio vsta vinóque restincta,

Ἀπὶχᾶ λελφωμένον καλῶς· ἐξέτου ῥίπμα σὺν οἴνῳ, οὖρον ἀφόρου παιδὸς ἐν χαλκώματι ἑψηθὲν μετὰ μέλιτος, οὖρου ἀνθρωπίου ὑποσταθμὴ σὺν κυπρίνῳ ἐλαίῳ· χαλκὸς ἄνθος λεῖον σὺν ὁμοσταθμοῦντι ἐλαίῳ, ἴσα μιγέντα· ἔλαιον παλαιόν· βαλσάμου ὑπόπος, κύπριον ἔλαιον, ἴσα μιγέντα· πισσέλαιον, σάκχαρις, στέαρ ποταμίου ἰχθύος σὺν ἁλίῳ ἀποπακὲν καὶ μικρὸν μέλιτι. χολὴ δὲ πέρδικος ἀγρίου, ἰχθύος τοῦ καλλιωνύμου, σκορπίου ἰχθύος, χελώνης θαλασσίας, ὑαίνης, αἰγὸς ἀγρίας, σὺν μέλιτι πᾶσαι.

σμῆν seu σμῆς, τὸ σμηγμὸν significat Mirabilis est Aëtio restituta lectio.

XLII. Ὀλκὰς δὲ σμῆν ἐγχριόμενα ἰδίως, ἀλκυόνιον μελίσιον σὺν μέλιτι, ἀμμωνιακὸν λελασμένον σὺν οἴνῳ καὶ μέλιτι, ἀνεμώνης ῥίζα τῆς στρογγύλης σὺν μέλιτι, καταγαλλίδος φοινικοῦς χυλὸς ὁμοίως, πηγάνου ἀγρίου χυλὸς ἐγχριόμενος.

Melitem, vide ἀμβλυωπίαι.

XLIII. Ἁρμόζει δὲ ἐσθιόμενα ἀμβλυωπίαις ταῦτα, ἐχίδνης κρέας ἑφθόν, θύμον, κράμβης καυλοὶ ὠμοί, ῥάφανος, μάραθρον, κρόμμυον, καρδαμον καὶ πόα καρδαμου πα δριμέα, ὄξος σκιλλιτικόν. Φυλάσσεσθαι δὲ δεῖ καὶ τὰ ὀπτιτίνοντα ταῖς ἀμβλυωπίαις, ἀλφιτόμελα. ἔστι δὲ αὐτῆς καὶ τὸ σπέρμα αὐτῆς, φακός, ἐλαῖαι μέλαιναι, θρίδαξ, τραγίσιον κεφαλωτόν, σέλινα, ὤκιμον.

Nyctalopiã seu nictalopiã curantia.

XLIIII. Νυκτάλωπας δὲ ἐγχριόμενα ὠφελεῖ, αἷμα τυγόνος, φάσσης, τρυγγὸς, πέρδικος, ἢ αἰγὸς ἀγρίας καὶ τράγου, ὕπατος αἰγείου ἐν τῇ ὀπτήσει ἰχὼρ ἀπορρέων ἐγχριόμενος, καὶ αὐτὸ τὸ ἥπαρ ἐσθιόμενον, καὶ ἡ ἀτμὶς ἀπ' αὐτοῦ ἑψομένου ἑλκομένη ἀνεωγόσι τοῖς ὀφθαλμοῖς· ὠφελεῖ δὲ καὶ ἐλατήριον λεῖον σὺν μέλιτι ἐγχριόμενον.

XLV. Πτερύγια δὲ τοῖς ἐν ὀφθαλμοῖς τίλλει τρωσαγόμενα, κίσσηρις ὀπτὴ λεία, σηπίας ὄστρακον λεῖον, ἢ ἄλες καὶ καδμία λεῖα, ἄπτιστα ἴσα.

XLVI. Τὰ δὲ παχέα λεπίδας λεπύνει ἐγχριόμενα σὺν μέλιτι λεῖα. (δεῖ δὲ πυείαν ὕδατι μετὰ τὸ ἔγχρισιν, μέχρι παύσωνται δακνόμενα·) ἰὸς χαλκοῦ καὶ σιδήρου, σποδὸς κεκαυμένη, χάλκανθος κεκαυμένη, μίσυ κεκαυμένον, χαλκῖτις κεκαυμένη, ὀμφάκιον, λεπὶς χαλκοῦ καὶ σιδήρου, καδμία κεῦστα τρίτον ἐν ὄξει σκιλλιτικῷ οἴνῳ,

σπλήνεια πᾶσαι κεῖσαι, καὶ μάλιστα ὀχρὴ, ὕ- A λûminis genus ômne vſtum, maximéque ſciſſile, œſypum vſtum, ac denique vrinæ virilis ſedimentum cum vnguento cyprino.

XLVII. Ξύειν δὲ δεῖ τὰ πεπυλωμένα, ἐκτρέφοντα βλέφαρα· ἰοῦ φύλλοις τραχέσιν, ἢ * σμιλίῳ, ἢ ὀστράκῳ ὀστρακίνου ἐστραμμένῳ χρωμένους· καὶ ἰῷ ἀναληφθῆναι κόμμει εἰς κολλύριον.

Callosas verò palpebras, euersas radere oportet fici foliis asperis, aut scalpello, aut sepiæ testa in collyrium conformata, aut denique collyrio ex æruginc excepta gûmi.

Ad callosas palpebras.

XLVIII. Μίλφους δὲ καὶ τὰ βεβρωμένα βλέφαρα ὠφελεῖ, ἀμόργη ἐψημένη, καὶ ἐγχεομένη· ἢ λύκιον, ἀμμωνιακὸν σὺν ὕδατι ἐγχεόμενον, ὃ καὶ τὰς τρίχας αὔξει· θαλλίας χυλὸς· ἰὸς σὺν ὄξει δεῖ πολλὰς ἡμέρας τὸν ἥλιον τρῖβειν, μὴ οἴνου καὶ σμύρνης εἰς κολλύριον ἀναπλασθέντες· χρομμύου χυλὸς σὺν ὄξει ἀναληφθεὶς, λεπὶς χαλκοῦ· ἢ καδμία λεπὶς ἀναληφθεῖσα μέλιτι καὶ κεῖσα ὀστράκῳ χυτρείδι καινῷ, πηλῷ τε κεραμικῷ περιπλασθείσα· ἔπειτα ἐσταληθεῖσα ἐπ' ἀνθράκωμα τοῦ αὐτοῦ χαλκοῦ κεκαυμένου ἴσου ᾧ γίμμεως δὲ ἡμίσους μέρεσι.

μίλφωσιν ex Actio Medic. restituit, & recte Nã & in colide vſus Armenio Dioscoride 5 de Mat. med. & Gal. 9. simpl. vſurpatur.

Milphosi arrosisq; palpebris prosunt, amurca cocta & illita, lycium, armenium quoque cum aqua inûctum, (quod & pilorum incrementum promouet,) succus recentium oleæ germinum, rubigo ferri multis diebus in sole trita & cum vino ac myrrha in collyrium redacta, spodium cepæ succo exceptum, squama æris, aut cadmia tenuis, melle excepta vſtáque in ollula noua, quæ argilla figlina operculata sit: deinde tosta super prunis cũ æquali portione æris vſti, ac ſtibij parte dimidia.

Ad milphosin & arrosionem palpebras.

XLIX. Ξηροφθαλμίαι δὲ καὶ κνησμοὶ ἰάσιν ψωρικῷ λείῳ τεθεσπαλάμενος, ἢ λεπίδι λείᾳ πεπλυμένῃ καὶ πεπίρει, ἢ καὶ τῷ σὺν πεπίρει, ἢ σὺν ἰῷ ξηρῷ, ἢ ὀμφακίῳ ξηρῷ λείῳ ὁμοίως.

Lippitudinẽ aridá & pruritũ oculorũ sanabis, si leuiter attingas psorico cõtrito, aut squama trita lotáq; & pipere, aut alio quopiá cũ pipere, aut rubigine ferri ſicca, aut omphacio ſicco tritóque ſimiliter.

Ad xerophthalmias & pruritus.

L. Τὰ δὲ λεπρώδη πάθη τῶν βλεφάρων ὑγιάζει συκῆς ὀπὸς καταχριόμενος.

Leprosos verò palpebrarum affectus ſanat, ficulneus liquor illitus.

Ad lepras palpebrarum affectus.

LI. Φθειριάσεις δὲ τὰς ἐν τοῖς βλεφάροις καὶ ὀφρύσι θεραπεύει σὺν μέλιτι ὕδατι ἐγχριόμενα σανδαράχη, σαφὶς ἀγρία.

Pediculare vitiũ in palpebris & supercilijs curatur ſandaracha & ſtaphide agria cũ melle & aqua illitis.

Ad phthiriasin palpebrarũ & ſupercilium.

LII. Τὰς δὲ ἐντὸς οὔσας θριξὶ ῥυσμοὶ σὺν μέλιτι καὶ ὀπὸς συκῆς καὶ ἐκπλείσεις τρίχας ὅτι τῶν βλεφάρων, ὡς τὸ πολὺ σὺν ἐᾷ φύεσθαι, μετὰ τὸ ἐκπλῆσαι θύλακος καταχριόμενα, αἷμα βατράχων τῷ χλωρῷ τεθὲν φάτνῃ καθ' ἑαυτὸ, ἢ μιγὲν χαμαιλέοντι κεκαυμένῳ λευκῷ ἄχρις αἵματος, ἢ αἷμα χοίρειον καθ' ἑαυτὸ, ἢ κριθῆς φυομένου ὁ χυλὸς σὺν κόμμει, ἢ τιλλίαι τεθεῖσαι κεκαυμέναι λεῖαι μετὰ κεδρίας, λευκῇ κεκαυμένῃ ἡ τέφρα, ἢ σπληνεία φοίνικος.

Euulſos verò pilos, qui citra diuturnam fluxionem oculos pungebant, vt plurimùm renaſci prohibent ea quæ ſequuntur, ſiquidem illinantur cùm primùm illi euulſi fuerint: nempe ſanguis ranarũ viridium recens per ſe, vel miſtus albo chamæleonti vſto dum in carbones redactus fuerit: aut ſanguis cimicis per ſe, aut fumariæ naſcentis inter hordea ſuccus addito gûmi, aut tellinæ ſalſæ vſtæ tritæque cum cedria, loti combuſti cinis, denique alumẽ liquidum, quod phorimon dicitur.

Pungẽtes palpebrarũ pilos renaſci prohibentia.

LIII. Ἀνακολλήματα * δὲ τοῖς εἰσκλωμένοις ἢ παραφυομένοις τρίχας ὑπὸ τοῖς βλεφάροις, μαστίχῃ μιλτώσας δὲ θερμῇ τεθεσπαλωμένῃ αὐτῆς, καὶ οὕτως ἀνακολλωμένου ὅτι τὸ ἰδίαν τάξιν τῶν τριχῶν.

Introrſum reflexos aut tranſuerſo tramite natos palpebrarum pilos ita replicat glutinátque, vt in ſuum redigantur ordinem, per ſpecillum calens admota maſtiche: ſimiliter

Introrſum reflexos palpebrarum pilos replicãtes.

similiter & bitumen, atque lithocolla, necnõ & cochleę viscidus lẽtor acu exceptus, denique & chondrillæ gummi ad eundem modum. Arundine tenui ad duorum digitorum longitudinem fissa, cutem quæ supra palpebras est prehendito, arctéque stringito, neque priùs soluto quam sponte per se excidat: atque sanabitur.

A ἢ ἀσφάλτος ὁμοίως, ἢ λιθόκολλα. ὁμοίως καχλίου τὸ κολλῶδες βελόνῃ ἀναλαμβανόμενον, * χονδρίλλη, ἢ κόμμι ὁμοίως. Κάλαμον λεπτὸν ἕλσας τὸ μῆκος δακτύλων β'. καὶ τὸ δέρμα τὸ ἐπάνω τῶν βλεφάρων λαβόντας, δεῖσαι ἰσχυρῶς, ἕως οὗ πίσῃ ἀφ' ἑαυτῆς μὴ λύσῃς, καὶ ἔσται ὑγιής.

Ad ægilopas. Ægilopas, in quibus nondum ima parte corruptum os est, sanant, chamæmeli folia commanducata & imposita: succus ægilopis qui inter frumenta nascitur cum sitanij seu trimestris tritici farina adhibitus, plantaginis folia commanducata & imposita, maluæ folia trita cum felle taurino, ita vt hoc remedio madentia splenia linteolâve imponantur: hæc si resiccantur, denuo bis térve quotidie humectari par est. Idem præstabunt maluæ contrita folia cum sale: sed post apertũ ægilopem ipsa malua trita vtere, dum cicatrix inducta fuerit. Similiter & nucis iuglándis partem interiorem commanducatam imponito, aut myrti baccas, aut œnanthen. Ad eundem quoque modum auriculæ muris foliis cum sale vti licebit. Id ipsum præstat solanum hortense, maximè verò quod halicacabum dicitur, quódque intra folliculum rubentem fructum in terram pronum continet. Itidem thus & fimum columbinum trita simúlque mixta: quæ lapidescunt inhærẽntque, dum cicatrix inducta fuerit. Semperuiuum quoque seu per se seu cum melle: alumen scissile copiosa terebinthina exceptũ: propolis terebinthinę & chondri pares portiones splenio inductæ: sal cum mastiche: mána cũ stacte subacta, aut sonchi lacteo succo excepta. Facit & glans querna cremata cum aceto: itémque cinis vitium similiter: necnon & eruum cum melle, itidémque caricæ pingues cum picis Brutiæ pari portione subactæ.

B LIIII. Αἰγίλωπας δὲ διαφθείρει, ἐφ' ὧν μὴ πάνυ βαθὺς ἥφθαρται τὸ ὀστέον, ἀνθέμιδος φύλλα μασηθέντα καὶ ἐπιτεθέντα, αἰγίλωπος τὸ ἐν τοῖς σίτοις χυλὸς σὺν ἀλεύρῳ σιτηρίῳ κατάπλασσόμενος, ἀρνογλώσσου φύλλα μασηθέντα καὶ ἐπιτεθέντα, ἢ μαλάχης φύλλα λεῖα σὺν χολῇ ταυρείᾳ, * ὡς μὴ ὑγρῷ εἶ βρέχων ἀσληναία ἢ ὄγκια ἐπιτίθῃ, ἕως ἂν χρήσῃ τῷ φαρμάκῳ. ξηραινόμενα δὲ ἄλλαις δὶς ἢ τρὶς τ' ἡμέρας· ἢ αὐτὰ μασησάμενος τὰ φύλλα τῆς μαλάχης μετὰ ἁλὸς· μετὰ δὲ τὸ ἀναστομωθῆναι αὐτό, τῇ μαλάχῃ λεία χρῶ μέχρι καθυλώσεως. ἢ καρύων βασιλικῶν τὸ ἐντὸς μασησάμενον ἐπιτίθει, ἢ μύρτα ὡσαύτως, ἢ οἰναίθιον ὁμοίως· μυῖς ὦτων τοῖς φύλλοις ὁμοίως μετὰ ἁλῶν. ποιεῖ δὲ καὶ χρύσος καπνοῦ, καὶ μάλιστα ὁ καλούμενος ἀλικάκκαβος, χαμαίζηλον ἔχων τὸ φύσει ἐν ἐρυθρῷ κάρπιον ἢ λίβανος καὶ ῥοιᾶς ἐκ κόκκους, λεῖα μιγέντα. λιθοῦται δὲ καὶ παρεμβύσει μέχρι ἀπυλώσεως. ἢ ἀείζωον καὶ ἑαυτὸ, καὶ μετὰ μέλιτος. συμφυΐα χαὶ ὡς ἔπι πλείστη τερμινθίνῃ ἀναληφθεῖσα· πρόπολις καὶ τερμινθίνη καὶ χόνδρος, ἴσα ἐν ἀσκωλίῳ· ἢ ἅλες μαστίχας, μάννα μετὰ σικύου ἀναμαλαχθεῖσα, ἢ μάννα σὺν χυλῷ γαλακτίζοντι ἀναληφθεῖσα. πιτυεῖ καὶ βάλανος ῥυπὶ καιομένη, σὺν ὄξει. καὶ κόνδυλος ἀμπελίνη ὁμοίως, ἢ ὄρυγος μετὰ μέλιτος· ἢ σῦκα ξηρὰ λιπαρά, σὺν πίσσῃ Βρυττίᾳ ἀναμαλαχθέντα ἴσα.

Ad grandines. Grandines palpebrarum dissipat grossi cocti & impositi, aut ficulnea folia.

LV. Χαλάζια δ' διαφορεῖται ὅλως τοῖς ἐφθοῖς ἐπιπλασθέντες, ἢ τὰ τῆς συκῆς φύλλα.

Ad suffusiones & lumina. Sugillata liuẽtiáq; emẽdant hæc imposita: anisum cũ melle Attico, similiter & origanum, raphani cortex, sampsuchum, hæc inquàm cum melle:

LVI. Ὑπώπια δ' αἴρει καὶ πελιώματα κατάπλασσόμενα, ἄνισον σὺν μέλιτι Ἀττικῷ, ὁμοίως ὀρίγανον· ῥαφάνου φλοιός, σάμψυχον, ταῦτα σὺν μέλιτι.

σὺν δόσει κεκαυμένοι σὺν μέλιτι, βρυωνίας ῥίζα σὺν οἴνῳ ἐπιχειομένη, βολβὸς μετὰ λεκίθων ὠοῦ κατάπλασσόμενος, ἀψίνθιον ὁμοίως· ἄλθεσι κυάμινον, ἢ αἴειον· κυμίνου σπέρμα, μετὰ ἀλῶν καὶ ἐλαίου, θάλασσα πυελουμένη, θαψίας χυλὸς ἐπιχειόμενος πρὸς ὥραν, καὶ ἡ ῥίζα σὺν κηρωτῇ, θέρμινον ἄλθεσι σὺν ἀλφίτῳ, καὶ λασμίνθη ἐν οἴνῳ ἑφθή, καρύα βασιλικὴ τὸ ἐντὸς λεῖον, κύμινον ἄγλειον μασηθὲν σὺν ὄξει καὶ μέλιτι ἢ σταφίδι, μαραθρου σπέρμα σὺν κηρωτῇ, νάπυ σὺν κηρωτῇ ἢ μέλιτι, σιλφίου ῥίζα σὺν ἐλαίῳ· ἢ ὑσσωπον καταπλασθὲν καὶ ὀδὼν εἰς ὄξαιον ἀποβαπτομένου τοῦ ὀδόμου εἰς θερμὸν ὕδωρ, καὶ πυελουμένου τοῦ ὠτίου. ὅτι πρώτων δὲ τῶν καταχρισμάτων, πυελᾶν δεῖ μετὰ τὴν ἀφαίρεσιν αὐτῶν. ἅμα γὰρ τὰ οἰδήματα καὶ τὰ πελιώματα διαφορεῖ. ἔπι δὲ καὶ τυρὸς ἁλμυρὸς καταπλασσόμενος· αἴρει γὰρ τὸ βάρος τῆς ἕλκωσιν. ἁρμόττει δὲ καὶ ἄλευρα ῥίζης ἐρυθρᾶς· ἢ σπόγγος ὄξους ἐνυδρος, καὶ μετ' ὄξους καταχριόμενος, ἢ νάπυ αἰαληφθὲν σὺν κηρωτῇ.

scordium vstum cũ melle, bryoniæ radix cum vino illita, bulbus cum vitellis ouorum impositus, absinthium eodem modo, farina fabacea aut loliacea, cumini semẽ cum sale & oleo, fotus ex aqua marina, thapsiæ succus ad breue tempus inunctus, eiusdem radix cum cerato, farina lupinorum cum polenta, calamintha in vino cocta, nucis iuglandis pars interior trita, syluestre cuminum commanducatum cum aceto & melle aut vua passa, fœniculi semen cum cerato, sinapi cum cerato aut melle, laserpitij radix cum oleo. Aliud: hyssopum in cataplasmatis formam redactũ nodulo illigato, hócque in calentem aquam demerso sugillata foueto. Sed & post quemuis illitum statim vt auferatur fomentum adhiberi oportet: simul enim & œdemata & liuores discutit. Insuper & caseus salsus vtiliter imponitur: confestim enim sugillata tollit: quòd si perseuerent, etiam allij succum admisceri oportet. Eadem quoque tollit ari radix impositi, itémque testæ sepiæ ramẽtum cum aceto illitum, necnon & sinapi cerato exceptum.

Τῶν περὶ τὰ ὦτα παθῶν βοηθήματα.

Aurium malè affectarum remedia.

Ad aurũ dolores & inflammationes.

LVII. Τοὺς δὲ περὶ τὰ ὦτα ἀλγηδόνας καὶ φλεγμονὰς καταμυδῶσι ταῦτα, ὀσφραίνομενα χλιαρά· παρθενίου χυλός, μυοσωτίδος ὁμοίως, ἀχιλλείου, ἡδυόσμου χυλὸς σὺν μελικράτῳ, δρακοντίου χυλὸς ὀ ἐλαίῳ διεθείς, ἑλξίνης χυλὸς σὺν ῥοδίνῳ εἰς τὸ ἀντικείμενον οὖς ἐγχεόμενος, κολοκύνθης ξυσμάτων ἑ χυλὸς ὁμοίως· λεύκης φύλλων χυλὸς ὁμοίως σὺν ῥοδίνῳ· νεφρίτιδος φύλλων χυλὸς ὁμοίως, ἢ τῆς ῥίζης· ἐρυσίμου χλωρὸς χυλὸς σὺν γάλακτι γυναικείῳ· πτελέας χυλός, ἢ πολυγόνου ὀ σιδίῳ ῥιζᾶς θερμανθείς· περσέας τῶν φύλλων χυλὸς σὺν ῥοδίνῳ καὶ μυκωνίῳ, ἰτέας τῶν φύλλων χυλός, ἀλώπεκος σίαρ χλιαρὸν ὀσφραίνομενον, ἄλες ὀρυκτοὶ λεῖοι σὺν μέλιτι· ἀμυγδάλινον, ἴρινον, δάφνινον, κίκινον, κρόκινον, σησάμινον, ὑοσκυάμινον· τὸ δὲ ἀμυγδάλινον μετὰ ἀλόης ὀλίγης καὶ κρόκου·

LVII. Auriũ dolores & inflãmationes mitigant hæc, si tepida instillentur: parthenij succus & auriculæ muris similiter, achilleæ & mentæ succus cum aqua mulsa, dracunculi succus oleo solutus, helxines succus cum rosaceo in aurem contrariam infusus, & cucurbitæ ramentorum succus ad eundem modum: itidem foliorum populi albæ succus cum rosaceo, narcissi è foliis aut radice succus simili modo, origani virentis succus cum lacte muliebri, rutæ aut polygoni succus in cortice mali Punici calfactus, porri foliorum succus cum rosaceo & meconio, foliorum salicis succus, vulpinus adeps tepidè instillatus, sal fossile tritum cum melle: amygdalinum oleum, irinum, laurinum, cicinum, crocinum, sesaminum & hyoscyaminum: amygdalinũ cum aloë pauca & croco:

σέσημον ex Archigene Moibanus legẽdum suspicatur.

cachrys cum amygdalino, simili modo: fabæ Ægyptiæ interior pars amara cum rosaceo, thus cum vino, æs vitum tritum cum aceto & rosaceo: meconium cum myrrha, rosaceo, croco & lacte muliebri: vrina asini, tauri, apri & capræ cum rosaceo: oleum picis, cedria cum vnguento rosaceo: alumen polygoni aut mali Punici succo solutum: nardum etiam cochlea Africana excepeum, vtiliter vbi coctum fuerit infunditur: sic & pingue animalis quod Latini glirem, Græci myoxum seu lagonirum appellant. Sed & blattarum domesticarum interanea, trita cum rosaceo instillatur: sic & millepedæ cũ rosaceo aut oleo simplici contritæ & tepefactæ: anguis senecta cocta in oleo aut vnguento cum capite papaueris: araneus, animalculum, cõtritus cum rosaceo & aceto: galla trita inditáque linteolo & cocta in vino, dolorem eximit. Iuuat & frigidam aquam auri oppositæ infundere: ipsi vero dolenti, serosum humorem qui ex assata carne bubula extillat. Denique confert & cedria nardino mixta oleo, interdum æquali, alias dupla portione.

Ad aurium fractiones.

Fractis auribus commodè instillantur, anisum cum rosaceo, succi aparines, plantaginis, solani: cedria cum resina terebinthina liquata, sonchi succus, eiusdémque radix cum oleo & malicorio cocta: fel bubulum cũ lacte aut porri succo, ocimi succus cũ anserino adipe.

Ad aurium dolores & sibilo.

Auribus dolore ac sibilo affectis per calamum vapor imittitur, instillato in silices ignitos aceto, cui incocta sint absinthium & hyssopum, aut lauri baccæ aut abrotonum. Excipitur & vapor aquæ marinæ calentis, itémque sulphuris ignem minimè experti suffitus. Sed ollulæ operculatæ lutóque oblitæ operculum in medio perforandum, quò vapor in aurium cauitatem suscipiatur. Conuenit & ad aurium dolores fomentum huiusmodi: Acetum, cui oleum & ceparum succum infuderis, calfacito: eique calenti lanam obuolutam specillo intingito, demittitóque penitius in aurem, quatenus æger sustinebit.

A κάχρυ σὺν ἀμυγδαλίνῳ ὁμοίως· κὺ ἄμυ
Αἰγυπτίᾳ τὸ ἐντὸς πικρὸν σὺν ῥοδίνῳ· λιβα-
νώτου σὺν οἴνῳ· χαλκὸς κεκαυμένος λῖος σὺν
ὄξει ᾗ ῥοδίνῳ· μηκώνιον σὺν σμύρνῃ ᾗ ῥοδίνῳ
ᾗ κρόκῳ, ᾗ γάλακτι γυναικείῳ· οὖρον ὄνου,
ταύρου, συὸς ἀγρίου, αἰγὸς, σὺν ῥοδίνῳ· πισσέ-
λαιον· κεδρία σὺν ῥοδίνῳ μύρῳ· στυπτηρία
B πολυγόνου ἢ ῥοιᾶς χυλῷ αἰθρίσας· νάρδος ἐν
κοχλίᾳ Λιβυκῷ ἀναληφθεῖσα, ᾗ μετὰ τὸ
ἐφθῆναι ἐγχυθεῖσα, ὠφελεῖ· καὶ τὸ ἐκ τῶν
λείπους ἔλαιον, ὃς καλεῖται γλίης. ᾗ γὰρ ὁ
ἀπόμυοσσκιώσεις λέγεται, ἐγχόλιον. καὶ
σὺν ἀφῶν τὴν καλουκιδίων τὸ ἔντος λεῖον, σὺν
ῥοδίνῳ ἐνστάζομεν ἢ οἱ καλουκίδιοι ὅλοι μετ'
C ῥοδίνου ἢ ἐλαίου λεῖοι χλιαινόμενοι· ἢ γῆ-
ρεως ὄφεως τὸ ἔλαιῳ ἐφθὸν, ἢ μύρῳ μετὰ
κωδίας μήκωνος· ἀράχνη τὸ ζῶον λεῖον
μετὰ ῥοδίνου καὶ ὄξους. κεκὶς λεία ἐντεθεῖ-
σα ὀθονίῳ καὶ ἐφθεῖσα τὸ οἴνῳ, ἀνωδυνίους
ποιεῖ· ὠφελεῖ καὶ ψυχρὸν ὕδωρ, εἰς τὸ ἠμι-
κείμενον οὖς ἐγχόμενον· καὶ ὀρνίθων βοείων
D ὀπισθιόων ἰχὼρ, ἐγχεόμενος τῶν ἡγρευτῶν·
ἡ κεδρία μιγεῖσα νάρδῳ, ποτὲ μὲν ἴσοις
ἴσοι, ποτὲ δὲ τρισὶ διπλοῦν.

LVIII. Πρὸς δὲ τὰς μυομήκας ῥήξεις
τῶν ὤτων ἁρμόζει ἐγχυματισθὲν τοῦτο, ἄνι-
σον σὺν ῥοδίνῳ, ἀκρίδος χυλὸς, ὀροσχώ-
λου χυλὸς, τρύχου χυλὸς ὁμοίως, κεδρία
E σὺν ῥητίνῃ τερμινθίνῃ σωτακεῖσα, σόγχου
χυλὸς καὶ ἡ ῥίζα σὺν ἐλαίῳ καὶ σιδίῳ ἐφθεῖ-
σα, χολὴ βοεία μετὰ γάλακτος, ἢ ὀρέου
χυλὸς· ὠχίμου χυλὸς σὺν χηνείῳ στέατι.

LIX. Ὑπατμίζεται δὲ ᾗ καλαμοῦ
πρὸς ὠπλγίας καὶ ἤχους, ἀψινθίου ἀποζέ-
ματι, ὑσσώπου, ἢ δαφνίδων· ἢ ἀβρότονον
F δι' ὄξους, ἢ ᾗ κοχλιάκων πεπυρωμένων
ἐφθὸν· ἢ θαλάσσατι θερμῷ, θεῖον ἄπυρον ὑ-
ποθυμιώμενον. δεῖ δὲ περιάσσμα τὸ χύ-
τραν καὶ ἐπιπλάσσμα πηλῷ πυράνας
τὸ μέσον τὸ πῶμα, καὶ οὕτω διέχεσθαι εἰς
τὸ· θεῖαι τε ὠτὸς ἀτμόν. ᾗ πυελία ᾗ Μυθίσκοι, ἐμπλαστρα, ἀμυγδαλίνα, κολλήματα.
G θερμόζει φρὸς τὰ ἀλγήματα τοιαῦτα. ἐγ-
χέας εἰς ὄξος ἔλαιον κεχρωμένον χάρτῃ, ἐ
ἐπιθεὶς ἔριον μαλακόν, ᾗ θερμαίνων, κα-
θεὶς τὸ ἔριον μέχρις αἰσθήσεως, ἐπίβαπτε ᾗ
θερμῷ τοῦ ὄξους.

LX. Πρὸς δὲ τὰ πυώρροια καὶ ἑλκώσεις ἀρμόζει ὀσταζόμενα ἢ σὺν εἰρίῳ ἀπαλῷ ὀπὸς μύρτα τοῦπα, ἀγρελαίας χυλὸς, ἀπαρίνης χυλὸς ὁμοίως, ἀμόργη ὀ ἐλαίῳ ἐφθμένη, λύκιον μάλιστα τὸ Ἰνδικὸν, ἀσφοδέλου χυλὸς καθ' ἑαυτὸν, καὶ σὺν λιβανωτῷ καὶ μέλιτι καὶ σμύρνῃ καὶ οἴνῳ χλιαρᾷ· ἀψίνθιον λεῖον σὺν μέλιτι· γῆς ἔντερα ἐφθὰ σὺν τέλτι χαρείῳ ἢ ἐλαίῳ· ἢ βάτου φύλλων χυλὸς ὀ ἐλαίῳ· γῆρας ὄφεως ἐφθὸν ὀ οἴνῳ, διφρυγὶς σὺν μέλιτι, ἐλαίας χυλὸς, σμύρνα σὺν κασσείῳ καὶ μηκωνίῳ σὺν' γλυκεῖ, κισσοῦ λευκοῦ χυλὸς σὺν ἐλαίῳ, χρομμύων ὁμοίως, μίσυ σὺν ῥοδίνῳ, ἀπαρίνης χυλὸς καὶ ἀφέψημα, ὀμφάκιον σὺν μέλιτι, οὖρον ἀφθέσυ παιδὸς ὀ ῥοιᾶς σιδίῳ ἐφθὸν, κονία συκίνη συγκλυζομένη· πίσσα ὑγρὰ ὁμοίως, καὶ αὐτὴ σὺν ῥοδίνῳ ὀλίγῳ ὀ κελύφει ῥοιᾶς ἐφθεῖσα· καὶ σίδης καρπὸς ἐφθεὶς ὀ οἴνῳ, κυπείρου πόσις σὺν πολυγόνου χυλῷ, χάλκανθον ἐφθὸν σὺν μέλιτι, καὶ χολὴ βοεία μετὰ μέλιτος.

LXI. Τοὺς δὲ γινομένους σκώληκας ὀ ταῖς χρονίαις ὠσὶ ὦτα ἑλκώσεσιν ἀποκτείνει, ἀμυγδάλινον ἔλαιον ἐγχεόμενον, καὶ καλαμίνθης χυλὸς, ἢ τὸ καρποῦ χλωροῦ· κεδρία, οὖρον ἀνθρώπειον παλαιὸν, ἑλλέβορος λευκὸς λεῖος μετὰ μέλιτος. καὶ τοῖς πρὸς τὰ ἑλκώσεις ἀναγραμμένοις χρηστέον.

LXII. Ταῖς δὲ ὑπερσαρκώσεσι τὰ ὀ τῶν ὠτὶ γινομένας καθαιρεῖ, μέλας ἑλλέβορος ξηρὸς λεῖος ὅτι παχύμυλος. Ἀφαιρεῖ δὲ αὐτὰς ταχέως, πύξ σακτὴς λεῖα γλουκίδης μ' ἰείου καὶ μιλτώδης πρὸς τεθεῖσα.

LXIII. Ἤχους δὲ τοῖς πρὸς τὰ ὦτα ὠφελεῖ, σὺν κίσι λεῖον αἰαληφθὲν σὺν σταφίδι καὶ νίτρῳ, καὶ ὀπὸς καὶ ἁλὸς ὅτι ἡμέρας, ἑλλέβορος μέλας ξυόμενος ἢ ὀπὸς ἑκάστης ἡμέρας νεαρὸς· ἢ δαφνίδου καὶ ἀμυγδαλίνου ἑκάτου ἴσον, κασσείᾳ ὀλίγῃ, ὄξους σταγμοῦ πρὸς τρεῖς. ὀ ὦτα, καὶ χλιαίας ἐγχεῖν. ὕφλοιῦ ῥαφανίδος χυλὸν ὅτι τρεῖς ἡμέρας ἐγχεῖν.

Pure manantibus & vlceratis auribus conueniunt inſtillata aut cum molli lana indita, hæc: oleæ ſyluestris ſuccus, vti & aparines, amurca in oleo cocta, lycium præſertim Indicum, aſphodeli ſuccus per ſe & cum thure, melle, myrrha & vino tepefactus: abſinthium tritum cum melle, lumbrici terreſtres cocti cum adipe ſuillo vel oleo: rubi foliorum ſuccus cum oleo, anguium ſenecta in vino cocta, diphryges cum melle, oleæ ſuccus: myrrha cum caſtorio, meconio & glaucio: hederæ albæ ſuccus cum oleo, ac ceparum ſimiliter, miſy cum roſaceo, aparines decoctum, omphacium cum melle, vrina pueri incorrupti cocta in malicorio, lixiuium è cineribus ficulneis infuſum auribus: ſic & pix liquida, ac ipſa quoque cum pauco roſaceo in cortice mali Punici cocta, ſtœbes fructus in vino coctus, alumen omne cum ſucco polygoni, chalcanthum cum melle coctum, & fel bubulum vnà cum melle.

Ad vermes auriũ.

Vermes in diuturnis aurium vlceribus genitos hæc interimunt: oleum amygdalinum infuſum, calaminthæ ſuccus vel ſeminis eiuſdem virentis: cedria, vrina humana antiqua, veratrum album tritum cum melle. Vtendum & illis quæ ad vlcerationes iam præſcripta ſunt.

Ad carnes in auribus excreſcentes.

Carnes immodicè in auribus excreſcentes leniter erodit & imminuit, veratrum nigrum ſiccum in puluerem redactum atque inſperſum. Ipſas verò celeriter aufert & abſumit, fæx cum calce viua & lixiuio ſtillatitio ad ſtigmenti craſſitiem redacta, per lanam & ſpecillum indita.

Ad auriũ ſonitus.

Contra ſonitus qui auribus obſtrepunt, iſta proſunt: ficus trita excepta ſinapi ac nitro, & intra aurem relicta diei vnius ſpatio: veratrum nigrum deraſum & quotidie recens inditum. Aut: olei laurini & amygdalini æquas partes ſumito, caſtorij parum & guttas aceti tres: hæc ſimul trita & tepefacta inſtillato. Aut: corticis raphani ſuccum tribus diebus infundito:

χλωσῷ legendũ ſuſpicatur Moibanus, quoniam ita legitur apud Dioſcoridem de Mat. med. ca. d. myrrha quo loco idẽ remedium ad aures puruléntas reperiatur.

Hæc mẽdoſa & mutila ſic reſtituit Moibanus, ex Orib. 4 ad Eun. ca 41. πύξ μικτὴ ἀσβέστου ἢ νιτρίας σταγὼν ἡμέρας ἕνὸς, δ' ἰείου καὶ μιλτώδη ἐφεστέον.

Vel legendũ σῦκον, hoc eſt, ficus, vti videtur voluiſſe Moibanus. vel σικυὸν, hoc eſt, cucumis: ſed illud magis placet.

quarto demum die eodem effuso, in aurem demittito arundinem vtrinque pertusam, quæ superiore sui parte accensum habeat ellychnium: eiusmodi siquidem fotus stremue iuuat: eluitur verò statim auris aqua & nitro. Conferunt & garum melli & rosaceo æqualiter mixtum, amygdalinum cum melle, oleum balaninum cum adipe suillo, lauri baccis expressus succus cum vino & rosaceo instillatus, cedria cum hyssopo, cepæ succus, cuminum agreste cum medulla vitulina, & rutæ succus: vnguenta cyprinū, irinum & susinum cum aceto, ruta & amygdalis amaris: nitrū spumáq; nitri cū aceto & thure: sporri succus, mel Atticū cum aceto, persicæ quod interius est tepidum cum rosaceo instillatum.

Ad surditatem.

Aurium grauitati diuturnæ medentur: fios æris contritus per cannulam insufflatus, oleum in quo radix asphodeli decocta fuerit instillatum, cepę succus, cucumeris agrestis foliorum succus in aceto, vrina caprę calens frequenter infusa: denique indictum collyrium quod è sinapi nitro & ficu concinnatur.

Ad aquā auribus concluſam.

Si aqua auribus intercluſa fuerit, instillatus cepæ succus flatuum molestiam dissipabit: sed calamo vtrinque perforato in aurem immisso aquam exugi par est.

Ad sanū ſuppurans.

Contusas aures suppurare non sinunt, ac si suppurauerint, pus ipsum dissipādo sanant bulbi, cum polenta cataplasmatis in modum adhibiti; myrrha cum cochleæ carne, sulphur ignem minimè expertum cum myrrha, vino, thure ac pice illitum. Quòd si rubor & magna inflammatio adfuerit, sesamum tritum aut alicam in aceto decoctam more cataplasmatis imponito.

Ad animalcula in aurem illapſa.

Illapsum in aurem animalculum hæc instillata educunt: maluæ succus, centaurij decoctum cum aceto, peucedani liquor, absinthij succus, nitrum inunctum, sulphur viuum cum aceto: fel muris, vti & ranæ, aceto dilutum: porri succus cum melle; sulphur denique vrina pueri venerē non experti solutum.

Lexic. Moib. τὰ κατὰ τὰ ὦτα.

τῇ δὲ τετάρτῃ ἐκχέας τὸ ξύλον, καὶ λαμίδα ἁρμοπάξ τρημάτων καθεὶς εἰς τὸ ὠτίον δι' οὗ τὸ ὑγρὸν εἰώθει μέσος, καὶ λαμὶς ἐγχείτω ἐλλύχνιον καιόμενον· οὕτω γὰρ πυκνούμενον ὠφελεῖ λίαν· κλύζεται δὲ τὸ φάρμακον ἁλὶ νίτρῳ καὶ ὕδατος. ποιεῖ καὶ χάρειν, μέλι, ῥόδινον, ἴσα· ἢ ἀμυγδάλινον σὺν μέλιτι, ἢ ἔλαιον βαλάνινον μετὰ στέατος χοιρείου, δάφνιδων πίσσα σὺν οἴνῳ καὶ ῥοδίνῳ ἑψαζόμενον, καθεῖα σὺν ὀξυκράτῳ, κρομμύου χυλός, κύμινον ἄγριον σὺν μυελῷ μοσχείῳ, καὶ πηγάνου χυλός, κύπριον, ἴριον, σέλινον σὺν ὄξει καὶ πηγάνῳ ἢ ἀμυγδάλοις πικροῖς, νίτρον, ἀφρόνιτρον σὺν ὄξει ἢ λιβανωτῷ, σκόροδου χυλός, μέλι Attikòn σὺν ὄξει. πρασίας τὸ ἐντὸς μετὰ ῥοδίνου χλιαρὸν ἑψαζόμενον.

Moibanum vtendum est sui ex repentino aut vocis subitò prætermittendæ consensu.

LXIIII. Δυσκωφίας ἢ πρεσβυτικὴ χρονίας, χαλκοῦ αἴθρης λεῖον ἐμφυσώμενον εἰς τρόπον ὀχῆ σωληνίου· ἀσφοδέλου ῥίζα εὐ ἐλαίῳ ἐψομένη, τῷ ἐλαίου ἑψαζομένου κρομμύου χυλός· ἀκόνιου ἀγρίου τῶν φύλλων χυλὸς εὐ ὄξει, οὖρον αἰγὸς ἐγκλυζόμενον σεσηγὸς θερμὸν, καὶ τὸ ἁλὶ σινήπεως καὶ νίτρου καὶ σίκου ἐντιθέμενον.

LXV. Πρὸς ὑγρὰς τῶν ὠδάτων ἐκπτώσεις, κρομμύου χυλὸς ἑψαζόμενος ἁλοιπεῖ τὴν τοῦ πυώματος ἔκρασιν· ἐκμύξαι δὲ τὸ ὕδωρ, καὶ λαμίδα ἁρμοπάξ τετρημένην εἰσθεῖναι τῷ ὠτίῳ.

LXVI. Τὰ δὲ πληγώματα τῶν ὠτίων ἰῶνται, μύες ἐώντες ἁλοπυήσαι καὶ ὀξοπυήσαι· σάμυξα ἁλφοειδῶντες, κολλᾶν σὺν ἀλφίτου καταπλάσματι, σμύρνα σὺν κοχλίου σαρκὶ, λεῖον ἄπυρον σὺν σμύρνῃ καὶ οἴνῳ καὶ λιβανῳ καὶ πίσσῃ καταχριόμενον. ἐὰν δὲ ἐρυθήματα ᾖ καὶ φλεγμονὴ μεγάλη, σπερμῷ λείῳ καταπλάσαι, ἢ χόνδρῳ εὐ ὄξει ἑφθῷ.

LXVII. Ζώου δὲ ἐμπεσόντος εἰς τοὺς ὠτα ἑψαζόμενα ἀναβιβάζει ταῦτα, μαλάχης χυλός, κενταυρείου ἀφέψημα μετὰ ὄξους, πολυκνήμου ὀπὸς, ἀψινθίου χυλός, νίτρον, ἀλειφθὲν, λεῖον ἄπυρον σὺν ὄξει, χελιδόνιος καὶ βατράχου δειμθὰς ὄξει, σφάσου χυλὸς σὺν μέλιτι, λεῖον διεθὲν σὺν ἀφρῷ ἀνδρείου οὔρου.

LXVIII. Λιθαρίου δὲ ἢ κυάμου, ἢ ἄλ- A λου τινος ἐμπεσόντος, εἰλήσας ἔριον τῷ μιλτώδι, καὶ βρέξας ῥητίνῃ, ἢ τερεβινθίνῃ, καθεὶς τερμίως ἄπιου.

Sin lapillus, faba, aliúdve quidam in aure mincíderit, obuolutá ſpecillo lanam reſinæ aut glutini taurino immergito, eáq; leniter in aurem demiſſa quidquid illud fuerit contingito, quò faciliùs ſimul & ſemel extrahas.

Ad quoſcũ que alia ſimpliciter ſit ipſa.

Τὰ τῶν ὀδόντων καὶ οὔλων βοηθήματα.

Dentium & gingiuarum remedia.

LXIX. Πρὸς δὲ ὀδοντalγίας ἁρμόζει ἐφόδματα τοιάδε· ὄξει ἐξ ἁναποχυλιζόμενα· διὶ δὲ θερμοῖς αὐτοῖς χρᾶσθαι, ἐφ' ὅσον δύναταί τις χρόνον ἀνέχεσθαι τῷ στόματι· τὴν ἀλημμύριον ὀδόντα· ὑοσκυάμου ῥίζα, πενταφύλλου ῥίζα, ἀλθαίας ῥίζα, πύρεθρον, ὀνώνιδος ῥίζα, ἀριογλώσσου ὁμοίως, δαδία καὶ μελαίνιον, σταφὶς ἀγρία, ἢ ἐλλέβορος μέλας· καππάρεως ῥίζα, καὶ ὁ ἐπὶ τῷ ἀπίῳ αὐτῆς καρπὸς· ἐλάφου κέρας ὠμὸν· κεκαυμένον, ἰῶν ἄπυρον· ὀλίγον σὺν ὀξυγλώσσῳ καὶ δαδίῳ, μελισσόφυλλον, γλήχων, μύρρινον φύλλα καὶ ῥίζα, σίλφιον, ὑπόφυλλον μετ' ὑοσκύαμου καὶ σύκου, πίτυος καὶ λεύκης φύλλα, σικύου ἀγρίου ῥίζα, σχοινόδουρᾶτες σὺν λιβανωτῷ, πτύμαλλος, μῆλων Περσικῶν ὀστᾶ, κηκὶς μετὰ ἁλὸς καὶ κεδρίας· ἕκαστον τούτων μετ' ὄξους· ἢ κολοκυνθίδα κενώσας καὶ ἐναποζέσας αὐτῇ ὄξος, δίδου ἀναλύζεσθαι· ἀποβάλλει γὰρ τούτων ἐξ ἕως σαφῶς αὐτό· ὠφελεῖ δὲ καὶ ἀγρώστεως τὸ ἐν Γαριασσῷ γεννώμενον ὁ χυλὸς σὺν ὀξάλμῃ, ἀριογλώσσου τῶν φύλλων ὁ χυλός. Σὺν οἴνῳ δὲ ἐφθὸν πρὸς τὰ αὐτὰ χρῆσθαι, φλόμου ῥίζα, ἀλικακκάβου ἀγρίου ῥίζα, ἀσπαραγίου ῥίζα, ἰτέας σὺν πεπέρει ἐξ πηγάνου, πλατυόφθου σφαιρία, ὀξυμυρσίνης ῥίζα, ὀπὸς σιλφίου, ῥόδα ξηρὰ οἷς ἐφθὸν ἄχρι πέπονος. Ὅτι δὲ πρὸς χρείας, δίδου ἀναλύζεσθαι.

Dentiũ dolori cõueniunt hæc in aceto decocta & gargarizata, ſi modò actu calida ea oris parte q̃ dutiſſimè fieri poterit cõtineátur, quá dens affectus occupat: hyoſcyami radix, itémque pentaphylli & althææ, pyrethrum, radix ononidis, ſimilitérque plantaginis, tædæ & nigellæ, ſtaphis agria, veratrum nigrum: capparis radix, eiuſdémque fructus, cornu ceruinum ſeu crudum ſeu vſtum, ſulphuris viui tantillum cũ origano & tæda, apiaſtrũ, pulegium, mori folia & radix, laſerpitium eiuſque ſemen cum hyſſopo & ficu, pinus & populi albæ folia, cucumeris agreſtis radix, alli nuclei cum thure, tithymallus, malorum Perſicorum oſſa, galla cum ſale & cedria. Aliud: Acetum, quod in excauata colocynthide efferbuerit, colluendũ exhibeto: hoc genus remedij putridos etiam carioſósve dẽtes extrahit. Confert & Parnaſſij graminis ſuccus cum acida muria, vti & plantaginis foliorum ſuccus. Vino autem incoquuntur in eundem vſum hæc: verbaſci radix & halicacabi agreſtis, itémque aſparagi, nitrum cum pipere & ruta, platani pilulæ, ruſci radix, laſer, roſæ ſiccæ in vino coctæ. Iſta, cum poſtulabit vſus, colluenda exhibeantur.

Ad dentiũ dolorẽ cõtra cũlia remedia.

Commanducata & commoriã dẽte affecto, illius dolorem leuare ſolent: albæ ſpinæ radix, gallæ pars interior, pyrethri radix. Porrò dentium dolori efficaciter auxiliabitur, qui paſtinacæ piſcis aculeo ſummo dentem dolentem affricuerit: ſic enim pars dentis affecta corrumpitur. Nec deſunt qui eodem vtantur aculeo intra cannam occultato, exiſtimantes hoc ipſum etiam ad dolorem leuandum conferre.

In commanducatu vſum commanducanda.

Hoc ſigno intercepta Moib. pertinet ceu ſuperflua.

Moib. addit ſ.

μυρίας

τοὺς πεπονθότας ὀδόντας.

Moib. ἀριόδους ἀλθαίας.

Τὰ δὲ πεπονθότα ὀδόντα ἐπιπλάσσειν τῷ πεπονθότι μέρει τοῦ ὀδόντος, ἔνιοι δὲ ὅτι καλαμίδι ἐγκρύπτοντες αὐτὸ οὕτως χρῶνται, ὡς τοῦ λαμβάνοντος συμβάλλεσθαι καὶ τοῦτο πρὸς ὠφελίαν.

In eundem vsum dentium cauis inditæ obliuiscuntur.

Eorum dentium cauis indita oblitáve, dolori remedio sunt hæc, quorum nonnulla eosdem etiam comminuunt aut putrefaciunt: amurca cũ oleo omphacino ad mellis crassitudinẽ decocta: (hęc etiam circumlita dentem excutit) radunculi radix eodem modo præparata etiam frangit: vitis lacryma cum liquore panacis & laserpitij: bitumẽ liquidum nitro subactũ: pyrethrũ aceto cõditum diebus quadraginta: oleæ Æthiopicæ lacryma, rhois coriariorum lacryma, ficus tã domesticæ quàm syluestris liquor, tithymalli liquor: supernè verò imposita cera cauernam dentis obturato. Galbanum etiam denti circundatur: cedria dentem quoque frangit, gallæ pars media, mori è radice collectus liquor: laser cum vuæ passæ carne circumlinitur, aut cum resina & cera: cum sulphure autem ac thure, linteolo inductum circumponitur: opoponax eodem adhibetur modo cũ sandaracha: sory Ægyptium resina excipitur. Prodest & lacertę iecur inditũ: itẽ peucedani liquor, sulphur aut gallę puluis cũ passo, denti priùs expurgato circundata: piper & crocum, resina terebinthina excepta. Aliud: anguium exuuias vstas tritásque cum oleo circumline, exsculptis priùs circumquaq; viscidis sordib⁹, si quæ dẽtibus inhæserint. Aut: nasturtiũm & sinapi illinito. Aut: alumine liquido, quod phorimõ dicitur, cum melle decocto dentes infricato: aut senectam serpentis imponito: aut gallæ puluerem & myrrham cum melle coctam inferito: aut bitumẽ, picem, cedriam & alumen scissile eodẽ modo: galbanum itidẽ, piper & granũ Cnidium: aut ranæ iecur & rhoẽ coriariorũ in aqua decoque ad iustã crassitudinẽ: deinde reiectis ab expressione crassamẽtis, id quod expresseris ad emplastri formam coquito, dentique imponito: aut, remollitam propolin circumlinito.

Vel potiùs, circumline frigmenti crassitudine, loco priùs circumscripto.

In eundem vsum aurium vulnera adhibenda.

In aurem verò denti dolenti oppositam instillantur, succus asphodeli, nasturtij virentis succus, hederæ quæ aureis est corymbis acini quindecim contusi, & cum rosaceo in cortice mali Punici calfacti: betæ succus cum cumino: an-

A LXXI. Εἰς δὲ ὃ βρῶμα ἐλυθήμενα, ἢ ἐξεπλασόμενα τῷ ὀδόντι, ὠφελεῖ· ὁ δὲ ὀδόντα λυγρεῶντας· ἔνια δὲ θρύπτει, ἢ σπεῖ· ἀμόργη ἐψηθὲν μετ' ἐλαίου ὀμφακίνου, ἄλγεις αὖ ἡμῶνται μελιτώδης· αὖτη καὶ ἐξελκομένη ὀδόντα ἐκλυάνει· βατραχίου ῥίζα ὁμοίως σκυαλεθεῖσα θραύει· ἀμπέλου

B δάκρυον ἐλυθήμενον μετ' ὀποπάνακος καὶ σιλφίου· ἄσφαλτος ὑγρὰ σὺν ὄξει πλασθεῖσα· πύρεθρον περιχυθὲν σὺν ὄξει ὀδύνας παραιρεῖται· ἐλαίας Αἰθιοπικῆς δάκρυον, ῥοῦ τοῦ βυρσοδεψικοῦ δάκρυον· ὀπὸς συκῆς ἀγρίας & ἡμέρου, πηγανίου ὀπός· αἴωρον δὲ ἐνεὸν ὀδόντι πρὸς τὸ φράσσον

Suspicatur Molbanus legendum ἀναιρεῖ, ex Oribas. lib 4 ad Eunap. cap 61.

C αὖθις τὸ βρῶμα· χαλβάνη, & ἐξεπλάσαι πάντα· κεδρία, καὶ φαιὰ ὀδόντα· κηκίδος δὲ μέσον μόριον τῆς ῥίζης ὀπός. ὀπὸς σιλφίου σὺν σμύρνῃ σαφίδος, καὶ ἐξεπλάσαι), ἢ σὺν ῥητίνῃ ἢ σεύκῃ κηρῷ· σεύκῃ δὲ λίβανος καὶ λιβανωτίς, ἐν ὀθονίῳ ἔγχρισιν ἐξεπλάσαι). ὀποπάναξ ὁμοίως ὀδοντοδόχῃσι σεύκῃ σὺν δαφνοδαράχῃ, σῶ-

Cõmodè, Molbanus.

D ρυ Αἰγύπτιον ῥητίνῃ ἀναλαφθὲν, σαύρας ἢ πρὸς ὀδύνην πολυκλάστου ὀπὸς ἢ ἔλαιον, ἢ κηκίδος λεῖα μὲν γλυκέως, ἐξεπλασόμενα μετὰ πίσσης καθαρᾶς· ἢ πίπτει ἢ χρόνος σὺν ῥητίνῃ τερμινθίνῃ ἀναλαφθέντα. ἢ ὄφεως γῆρας καυσὰς καὶ πίσσας μετ' ἐλαίου ἐξέχρισε, γλοιώδη ἐξεχρᾶξας πρότερον· ἢ

E κάρδαμον & ναπυ ἔμπλασαι, ἢ συντηρίαν μετὰ μέλιτος φρύγματα ἐψήσας λιβάνεις & ὀδόντα. ἢ ὄφεως ἐπιπτίδα. ἢ κηκίδα λείαν ἢ σμύρνην ἐψήσας μετὰ μέλιτος, ἐντρίβειν ἢ ἄσφαλτον, πίσσαν, κηρίον, συντηρίαν· χίαν ὁμοίως· χαλβάνη, πίπτει, κόκκον Κνίδιον. ἢ βατράχου ἧπαρ ἢ ῥοῦ βυρσοδεψικὴν ἐψήσας ἐν ὕδατι μέχρι ἓν πάχος ἔχῃ, εἶτα ἐκαπορρίψας τὸ σκυβαλῶδες, τὸ ἀπόθλιμμα ἕψει, ἕως ἐμπλαστρώδες γένηται), & ἐνίει. ἢ πρόπολιν μαλάξας ἐξέπλασε.

γῆρας addit Molbanus.

σαφὶς Molbanus.

χίον forte. Molbanus legit χρῖσον, aut legendũ censet μαστίχην Χίαν Molbanus inserit μαλάττει. Gesn. mauult ὀδοντάσας aut χαμαίπιτυς.

F LXXII. Εἰς ἃ τὸ ἀνθρακεύμενον οἷς τῶν ἀλγεινῶν ὀδόντων ἐκπάζεται· ἀσφοδέλου χυλὸς· καρδάμου χλωροῦ χυλὸς·

G κισσοῦ τοῦ χρυσοκόμου σφάγεια ἑπτὰ ἀνθρακώσας, ἢ σὺν ῥοδίνῳ ἐν σιδίῳ ῥοιᾶς ἁρμασθέντα. σίτινος χυλὸς μὲν κυμῖνον· κόκ-

Molbanus hanc distinctionem suppositam suspicatur: forte, Alterum vel, tempore suppleuit.

κου, ὄφεως γῦρας θλασθέν, καὶ μετὰ ῥοδίνου A guis ſenecta tuſa & cũ roſaceo co-
ἐψηθέν. Εἰς δὲ ⓐ αὐτικείμενοι μυζωτῆ- cta. Oppoſitę quoq; nari vtiliter in-
ρα ἐκτάζει παὶ ὀφελίμως, ἀναγαλλίδος χό- funditur expreſſus anagallidæ ſuc-
λισμα. Πεπαπωμένη ὀδόντος πόνον ἰσο- cus. Sed & è collo ſuſpẽſa lepidij ra- Anodynum.
ῤῥαπαύει λεπιδίου ῥίζα. dix, dentium dolorẽ lenire fertur.

LXXIII. Ἀρεῖς δὲ ἀπόνως, αὐ τρίχα- Sine vexatione dentes eximes, Dentes citra molestiam extrahendi.
ρέξας τρίπλάσης θείῳ, ἢ μολυβδαί- ſi circũſcarificatos ſulphure obdu-
νῳ πολλῷ κηρῷ ἀναληφθεῖσαν τρί- xeris, aut plumbaginem tritam ce- B
πλάσης, ἢ πύρεθρον ὄξει παρεψύσας ὅλας ra exceptá circumleueris, aut etiá
ἡμέρας μ'. τρίπλάσης, κηρῷ τοὺς ἄλλους pyrethrum aceto conditũ diebus
ἀσφαλισάμενος. ἢ σῶρυ μετ' ὄξους λεῴ- XL. dentibus reliquis cera præmu-
σας, ἢ σώρεως ⊲ δ'. μολυβδαίνης ⊲ ϛ'. nitis. Aliud: ſory ex aceto tritũ ad-
κεδρίας τῷ αὐτάρκει ἀναλάμβανε. hibeto. Aut: Soreos drachma iij.
plumbaginis drach. vj. cedria quan-
ta ſat erit excipito.

LXXIIII. Ταῖς δ' ὑπὸ τῶν παιδίων ὀδον- Infantium dentitiones gingiua- Ad infantium dentitiones.
τιάσεις καὶ κνησμοὺς παύει, βούτυρον ἀφ- rúmque pruritus ſedant, butyrum C
χριόμενον καθ' ἑαυτὸ ἢ μετὰ μέλιτος, λα- per ſe & cum melle peructum, ce-
γῶς ἐγκέφαλος ὀπτὸς τραγιβόμενος ἢ rebrum leporis aſſum, ſeu attrictum
ἐσθιόμενος, μῦς ⓐ καπνισθεὶς ἐσθιόμενος ſeu in cibo ſumptum: mures etiam
ἢ πολὺν δι' σίελον χωλύουσι ὑπὸ τῶν παι- domeſtici eſitati: qui quidem co-
δίων, ζώντες προσαγόμενοι τοῖς στόμασιν αὐτῶν. pioſam infantium ſaliuam arcent,
ſi viui ipſorum admoueantur ori.

LXXV. Ἀλιμοδίας δὲ ῥίζα ὑπὸ τῶν ὀδόν- Dentium ſtuporem demulcent, Ad dentium stuporem.
των παύει, ἀνδράχνη σὺν μαστιχῇ, ἅλας portulaca commãducata & ipſum D
λαμπρὸν τραγιβόμενον. etiam oleum affrictum.

LXXVI. Σμήχει δὲ τοὺς ὀδόντας, ἀστε- Dentes abſtergunt, ariſtolo- Smegmata dentes abſtergentia.
ρολοχίας ῥίζα, ἐλάφου κέρας κεκαυμένον, chiæ radix, cornu ceruinum v-
μιγνυμένης ὀλίγης μαστίχης· ἅλες λευ- ſtum, exigua maſtiche admixta:
κοὶ, φυραθέντες μέλιτι καὶ καέντες ἐν χύ- ſal candidum melle ſubactum &
τρᾳ ἄχρις ἀνθρακωθῶσι· κήρυκες πληρω- in olla crematũ vſquedum in car-
θέντες ἁλὶ καὶ καέντες, κόχλοι χερσαῖοι καεὶς E bones redigatur, buccina ſale re-
σὺν μέλιτι, λίθος Ἀραβικὸς καεὶς σὺν μέλιτι, ferta & combuſta: pumex torrefa-
μύακες συγκεκαυμένοι, ἢ σηπίας ὄστρα- ctus vino reſtinctus: cochlea ter-
κον καεὶς σὺν μέλιτι, μύες συγκεκαυμένοι, ἢ σηπίας ὄστρα- reſtris cremata cum melle: lapis
κον καεὶς σὺν μέλιτι. τούτων ἕκαστον ἢ βιωφελίας Arabicus vſtus cum melle: my-
χάριν μίγνυται νάρδου στάχυος ὀλίγον, ἢ tuli combuſti, ſepiæ denique te-
μύρου ἄνθος. ἢ ἔλεα οἰσυπηρὰ κεκαυμέ- ſta cremata: quorum ſingulis o-
να λεῖα, ὀλίγου ἁλὸς ἀνθοῖς μιγνυμένου. doris gratia aut ſpicæ nardi, aut
floris iunci nonnihil adijcitur. Pro-
ſunt & lanæ ſuccidæ crematæ &
in puluerem tritæ, addito pauco
ſale.

LXXVII. Σφομβίους δὲ ὀδόντας κρα- Mobiles dentes ſimul & gingi- Ad mobiles dentes, humoremque nimio fluentes gingivas.
τύνει ὕλη πλατάνου, δρὰξ λυζόμενα ἢ uas præ nimia humiditate flacci- F
ἀφαιρεπούμενα ἐφ' ἱκανὸν ἐν στόματι, ἐ- das firmant roborántque hæc col-
λαίας τὸ φύλλων ἀφέψημα, γάλα ὄνειον, luta & in ore diutinè retenta: olex
χλυμβάδος ἐλαίας χυλὸς, σμύρνα σὺν foliorum decoctum, lac aſininum,
οἴνῳ καὶ ἐλαίῳ δρασσομένη, γαγάτης oliuarum muria conditarum ſuc-
λίθος σὺν οἴνῳ ἐψηθείς, πλατάνου φύλλα cus, myrrha cum vino & oleo, ga-
σὺν ὄξει ἐψηθέντα, ὄξος σκιλλητικὸν, βάτου gates lapis cum vino coctus, plata-
δρασσόμενος, μαλάχης ῥίζα ὁμοίως, ni folia in aceto cocta, acetũ ſcilli- G
ὡς σιδήρου τρυγοπώμενος ξηρὸς, κύπρος ὁμοίως, συπήρια μετὰ μιγεῖσα σμύρνη,

aut citra myrrham cum aceto vel melle: sory combustum ad eundem modum: styrax cũ sale impositus: myrrha, pompholyx, amylum, quis partibus cõtrita in puluerem. Mali quoq; Punici cortices, galla & atramentum sutorium si aceto irrigaueris, collutione proderunt. Aliud: Ranas x. aceti sextarios tres, chalcanthi drach. iij. radicis mandragoræ drachm. vj. coquito ad tertias pro collutione: facit & hoc ad dentiũ dolores. Aliud: aloës drach. iiij. thuris drachmã j. aluminis scissilis drach. iij. melli admisceto, & affricato.

A ἢ δίχα τῆς σμύρνης σὺν ὄξει ἢ μέλιτι, σῦρον κεκαυμένον ὁμοίως, σύριγξ σὺν ἀλόη ὀπτὴ πόμφολυξ, ἄμυλον ἴσα, λεῖα. ξηρά. ἢ ῥοᾶς λεπίσχοινα, κηκὶς, χαλκάνθου, σὺν ὄξει δαψιλῶς, ἀφρὸν χυλόμενα. ἢ βάτραχοι ι'. ἢ ὄξους ἡμίχοα. χαλκάνθου < . δ'. μανδραγόρου ῥίζης < . ς'. ἑψόμενα μέχρι τετάρτου καὶ διηθούμενα. πιεῖν ἢ τοῖς ἀλγηδόνας τῶν. Ἀλόης < . δ'. λιβανωτοῦ < ά. θυείης < δ'. μέλιτι μιγνύειν καὶ ἀφιστᾶν βόμβα.

Ad tumentes gingiuas luxuriantes putrescentésve gingiuas, vtile fuerit ista colluere ac in ore detinere: portulacæ succum, astragali radicis decoctum è vino, oliuarum cõditarum muriam: olea, omphacinum quod ex immaturis oliuis exprimitur, melinum & lentiscinum: myrrham cum vino & oleo: cedriam cum aceto aut amurca: gallę decoctum, mori corticis & foliorum decoctum, acetum denique scilliticum.

LXXVIII. Πρὸς δὲ τὰ οἰδοῦντα τῶν οὐλων καὶ ὑπερκοιλοῦντα ἢ σπομβα ἀφ' μόζει, ἀφαχλυζόμβα καὶ ἀφαχρατύμβα, ὑδράχνης χυλὸς, ἀστραγάλου ῥίζης ἀπόζεμα ἐν οἴνῳ, ἐλαίας κολυμβάδος ἅλμη, ἔλαιον ὠμοτριβὲς, καὶ μήλινον, καὶ σχῖνον, ἀφαχρατύμβα· σμύρνα σὺν οἴνῳ καὶ ἐλαίῳ, κεδρία σὺν ὄξει ἢ ἀμόργῃ, καὶ κηκίδος ἀπόζεμα, μόρων φλοιοῦ καὶ φύλλων ἀπόζεμα, ὄξος σκίλλινον.

Ad tumentes ac præter modum luxuriantes putrescentésve gingiuas, vtile fuerit ista colluere ac in ore detinere: portulacæ succum, astragali radicis decoctum è vino, oliuarum cõditarum muriam: olea, omphacinum quod ex immaturis oliuis exprimitur, melinum & lentiscinum: myrrham cum vino & oleo: cedriam cum aceto aut amurca: gallę decoctum, mori corticis & foliorum decoctum, acetum denique scilliticum.

Ad siccas ferè.

Sicca verò & in puluerem redacta hæc vtiliter adhibentur: aristolochiæ radix, plantaginis semen, aspalathum, fœniculi radix vsta, diphryges rubigo, æris ac ferri, chalcanthum tostum, galla, cyperus, cytini, rosarum flos, lycium, mastiche trita, misy cum aceto, æs vstum cũ arsenici momento. Prodest & virentes lentisci surculos medijs dẽtium spatijs affricare. Cõuenit præterea, excrescentibus potissimùm carne gingiuis, fotus ex feruente oleo. Oportebit autem obuolutam specillo lanam oleo immergere, tandiúq; gingiuis admouere donec albescant: sic enim cohibetur fluxio, ipsæque reficcantur.

LXXIX. Ξηρὰ δὲ λεῖα τοιαῦτα πόμβα ὠφελεῖ· ἀριστολοχίας ῥίζα, ψυλλίου γλώσσου σπέρμα ξηρὸν, ἀσπάλαθος ξηρὸν, μαράθου ῥίζα κεκαυμένη, διφρυγὲς, ἰὸς χαλκοῦ καὶ σιδήρου, χάλκανθος ὀπτὴ, κηκὶς, κύπειρος, κίτινοι, ῥόδων ἄνθος. λύκιον, μαστίχη ξηρά, μίσυ σὺν ὄξει, χάλκανθος κεκαυμένος σὺν ἀρσενικῷ ὀλίγῳ. χάνυ ξυλάρια χλωρὰ τῶν τετριβόμβα τοῖς μεταξὺ τῶν ὀδόντων ἁρμοζειν ἢ ἐν μάλιστα ὅτι τὴν ἐπιῤῥοὴν τῶν, ἀφ' τοῦ ζεστοῦ ἐλαίου πυκιοῦν. δεινὸν ἢ ἔριον μαλακὸν δι' αὐτοῦ περιπήξαντα, καὶ ἀποβάπτοντα εἰς τὸ ἔλαιον τοσοῦτον, ἄχρις ἂν λευκὰ γένηται τὰ οὖλα. τίλλεται γὰρ ὑρθῶς μαπισμὸς αὐτῶν καὶ ἀναξηραίνεται.

Ad siccas ferè.

Sicca verò & in puluerem redacta hæc vtiliter adhibentur: aristolochiæ radix, plantaginis semen, aspalathum, fœniculi radix vsta, diphryges rubigo, æris ac ferri, chalcanthum tostum, galla, cyperus, cytini, rosarum flos, lycium, mastiche trita, misy cum aceto, æs vstum cũ arsenici momento. Prodest & virentes lentisci surculos medijs dẽtium spatijs affricare. Cõuenit præterea, excrescentibus potissimùm carne gingiuis, fotus ex feruente oleo. Oportebit autem obuolutam specillo lanam oleo immergere, tandiúq; gingiuis admouere donec albescant: sic enim cohibetur fluxio, ipsæque reficcantur.

Ad epulidas.

Epulidas reprimunt, probè contrita & adhibita aluminis genera omnia vsta, itémque sory.

LXXX. Τὰς δὲ ἐπουλίδας τίλλει, συμπλεία πᾶσα κεκαυμένη, ἢ ὅ τι σὺν, ξηρὰ λεῖα τοιαῦτα πόμβα.

Ad nudatas carne gingiuas.

Nudatas carne gingiuas explet, adhibitum medicamentum ex floris rosarum partibus duabus & calami aromatici parte vna.

LXXXI. Τὰ δὲ γεγυμνωμένα οὖλα σπεῖ, ῥόδων ἄνθους μέρη β', καλάμου ἀρωματικοῦ μέρος ἓν, τοιοῦτον πόμβα.

Ad reliquos oris fauciúmque affectus remedia.

Τῶν λοιπῶν περὶ τὸ στόμα καὶ τὴν φάρυγα παθῶν βοηθήματα.

Ad vuæ relaxationem.

Vuas relaxatas gargarizatione comprimũt: mel, vrticæ ſuccus, poſca, pruni foliorum decoctum in vino, origani itidem decoctum cũ vino. Ad eaſdem conducunt perunda cum melle: ſal, omphacium, laſer, alumen: galla cum ſale, pipere ac melle. Iiſdem ſicca vtiliter adhibentur, balauſtiũ, flos æris, chalcitis trita, alumen ſciſſile, miſy, galla, liquor Parthicus, oleę Æthiopicæ lacryma, fuligo è carbonibus, & ſal.

Ad anginas gargarizanda.

Angina laborantes adiuuãt, quęcunque humiditatẽ reuellere poſſunt: ſic enim inducta ſiccitate, partium denſitas relaxatur. Gargarizantur vero, hyſſopum cum ficu in aqua decoctum: thus cum paſſo & melle, vel aceto mulſo: raphani ſemen tritum cum aceto mulſo, ſinapeos eſculenti cyathi xij. cum melle calentis cyatho vno.

Ad eaſdem illinienda.

Inunguntur autem, crematarum hirũdinum cinis cum melle, & fel bubulũ cũ melle. Priuatim vero cõfert teſtudinis marinæ fel, & chryſocolla cũ melle, (hæc verò vomitũ etiã cõcitat:) ſal ammixtum aceto, melli ac nitro, elaterium cũ vetere oleo melléve aut felle taurino, cepæ ſuccus cum oleo, cẽtaurij ſuccus cum melle, aſelli qui ſub hydriis degunt cum melle, pix itidem cum melle. Vtiliter verò ſal cum pice tritus in linteolo rumicis partive gutturis ſub mento eminenti, ac ipſi collo imponitur.

Ad eaſdem in potu exhibenda.

Prodeſt quoque angina laborantibus, potui data hirundinum exiccatarum drachma vna ex aqua: itidémque vermis quem erucam nominant, ſiccus tuſus ac bibitus cum aqua mulſa.

Ad extrahẽda quæ inter deglutiendũ gulæ inhæſerint.

vel potiùs, lardum.

Spinas oſſáve deuorata gulæque inhærentia extrahes, ſi adipem ſemicrudum filo alligatũ traiectúmve deglutire coẽgeris, móxque per appenſum filum violenter ac ſubito retraxeris: ſic enim quidquid hęret, infixúmve eſt ſimul & ſemel extrahitur. Idem deglutitis ex aqua ſpongia molli lanáve, aut inciſis carnibus perfici poterit. Aut: medullæ panis recentis buccellam deuorã dá, vel caricas [leuiter] maſas itidem deglutiendas exhibeto.

A ΛΧΧΧVI. Ταὶς δὶ κεχαλασομέναις φαρυγγὸς συρίττει αἰγαγαργαλίζομεν· μέλι, κηρίδης χυλός, ὀξύκρατον, κοκκυμηλέας φύλλα ἀφέψημα σὺν οἴνῳ, ἐλεγάνου ἀφέψημα σὺν οἴνῳ. Διαχειρίσματα δὶ ὠφελεῖ σὺν μέλιτι, ἄλες, ὀμφάκιον, ὀπὸς σιλφίου, συπήρεια, κηκὶς μετὰ ἁλὸς καὶ πιπέ-

B ρεως καὶ μέλιτος. Περισπερίσματα ξηρὰ ὠφελεῖ, χαλαύστιον, χαλκοῦ ἄνθος, χαλκίτις λεία, συπήρια ψιλά, μίσυ, κηκὶς, ὀπὸς πηγανικῆς, ἐλαίας Αἰθιοπικῆς δάκρυον, αἰθάλη ἀπὸ τῶν ἀνθράκων, ἄλες.

Paſſum forte.

ΛΧΧΧVII. Σωαγχικοὶς δὶ ὠφελεῖ, ὅσα δυνάται ἀποσταῖς ὑγρασίαις· χαλᾶται γὰρ οὕτως ἡ ξηρασία καὶ ἡ πύκνωσις τῶν μερῶν. Ἔστι δὲ τὰ αἰγαλαργαλιζόμενα· ὕσσωπον μετὰ σίκου σὺν ὕδατι ἑψητόν· λιβανωτὸς

C σὺν γλυκεῖ καὶ μέλιτι, ἢ ὀξυμέλιτι· ῥαφάνου σπέρμα λεῖον σὺν ὀξυμέλιτι· σινήπεως ἑδωδίμου κύαθοι ιϛ'. σὺν μέλιτος θερμοῦ κυάθῳ ἑνί.

ΛΧΧΧVIII. Διαχειρίσματα δὶ, χελιδόνων κεκαυμένων ἀποδεχὰ σὺν μέλιτι, χολὴ βοεία σὺν μέλιτι· ἰδίως δὶ πρὸς τὰ θαλασσίας χελώνης χολὴ, χρυσόκολλα μετὰ

D μέλιτος. Κνεῖδες καὶ ἔμετον, ἄλες μιγέντες ὄξει καὶ μέλιτι καὶ νίτρῳ· ἐλατήριον μετὰ ἐλαίου παλαιοῦ ἢ μέλιτος, ἢ χολῆς ταυρείας· κρομμύου χυλὸς μετὰ ἐλαίου, καὶ

E ταυρείου χυλὸς μετὰ μέλιτος. Οἱ δὶ τοῦ τὰ ὑδρείας σὺν μέλιτι, πίσσα σὺν μέλιτι. Ἐμπλαστὲν δὲ ὑπὸ τὰ ἀνθρακεῖα καὶ ὑπὸ τὰ πάχιλα ὠφελίμως, ἄλες μετὰ πίσσης λεῖοι σὺν ὄξυνίῳ.

ΛΧΧΧIX. Ὠφελεῖ δὶ τὸν σωαγχικὸν ὁ πεπαλ διδυμῶν, χελιδόνων ἐσκελετευμένων < .ά. σὺν ὕδατι· κάμπτει ξηρὰ

F κοπεῖσα καὶ πολεῖσα σὺν μελικράτῳ.

XC. Τὰ δὶ καταπινόμενα ὀστία, ἢ ἀκάνθας, καὶ πεπηγότα τοῦ στόματος, κόμιση, σαρῶμεν ὑπὸ τὰς λίτρῳ, καταπτίσας, αἰαλκάσας τι καταπεῖν, ὡς μὴ τοῦτο αἰασπάσας ῥᾴδιον ἀπὸ τοῦ ἀπηρτημένου λίνου. εἰώθασι γὰρ συνεφέλκεσθαι τὰ ἐρπετικὸς ἢ πτη-

G νὰς. δύναται δὶ ἀπὸ σπογγίου ἁπαλοῦ, ἢ ἐρίου, ἢ χρεῶν ἐσπιτμηδίων τὸ αὐτὸ ἐμβάλλεσθαι· δεῖ δὶ σὺν ὕδατι καταπίνειν, ἢ ἄρτου ἁπαλοῦ τὸ ὡς τὸς διδύμας καταπίνειν, ἢ σῦκα ξηρὰ μεμασημένα.

ἀναβλαβῆ. Mosbenus.

Addit Actius de κόσμῳ, circa mãducationem.

Easdem caricas eidem deſiderat quas dixerat maſſas, non tamen penitus diſſolutas.

XCI. Τοὺς δ' ἀποκεκμηκότας τὴν φω- A
νὴν ὠφελεῖ, πρασσου χυλὸς καταῤῥοφούμενος· κράμβη ὠμὴ δεφθεῖσα καὶ ἀνωθεῖσα, ὁ δὲ
χυλὸς ὑπορροφούμενος σὺν μέλιτι· ῥοφήματα δι' ἀλφίτων ἑφθῶν· πράσου τὸ ἀλθόμενον λαμ-
βανόμενα· χαλβάνης μέγεθος κύαμος, μιγὲν ὑπομέλιτι καὶ κατεπόμενον.

XCII. *Ηχοῦ δὲ ἀποκαθαίρει ὄξος B
σκιλλητικὸν αἰσαργαιζόμενον, σίνηπι τοῖς
βρώμασι σκευαζόμενον αἰσαργαιζόμενον.
δεῖ δὲ μετὰ ταῦτα αἰσαργαίζεσθαι μελικράτῳ. τοῦτο δὲ τοὺς τύλους τοὺς ἐπὶ τῆν
ἀρτηρίαν καὶ παρειλκόμενα θεραπεύει.

XCIII. Λαμπρύνει δὲ φωνὴν σκόρ-
δοι ἑφθοί τε καὶ ὠμοὶ ἐσθιόμενοι. πρασσου C
καρπὸς κεφαλαιωτῆς, συεραξ καταπιόμε-
νος, σίλυεργος παρεσθιόμενος ἐσθιόμενος.

XCIIII. Ἰᾶται δὲ ταῖς μὴ χρονίας τρα-
χύτητας αἰθιοπίδος ῥίζα σὺν οἴνῳ πινομένη,
γλυκύῤῥιζα ἀποχυλιζομένη, σμύρνα ἀπο-
χυλιζομένη, ὠὸν ὠμὸν ἀκροχολίᾳ ἐφθὸν, σύμφυτον σὺν μελικράτῳ πινόμενον, D
πτερὶς φύλλου ῥίζης ἀφέψημα αἰσαργαι-
ζόμενον.

Τῶν κατὰ τὰς τρίχας παθῶν βοηθήματα.

XCV. Ἀλωπεκίας δ' ἴασαι καὶ ἐπὶ ταῖς κεφα-
λαῖς καὶ τῶν γενείων ἴασαι ταῦτα κατὰ χειρὸς B
ἔμπλασμα, τρηχυνθέντων τῶν τόπων καὶ ἀποτε-
θλιμμένων τῶν ἐμπλασμάτων ὀστοῦ σὺν ὄξει· ἀκάνθης Ναξίας τὸ ἀπότριμμα τῷ σαρκὶ
αὐτοῦ σιδήρου μετὰ ἐλαίου ἀκονηθέντος,
ἀλκυονίου πεπυρωμένου λεῖον σὺν ὄξει ἢ οἴνῳ ἢ ἐλαίῳ, ἀπόπατος αἰγὸς ὁμοίως· μυό-
χοδον, ἢ αἰλούρου ἀφόδευμα μετὰ κάπνου F
καὶ πιπέρεως ἐπ' ὄξους· ἀδιάντου κατάπλα-
σις ἐπ' ὀθονίου, ἀρσενικὸν ἢ σανδαράχη ἀ-
ναληφθεῖσα τερμινθίνῃ, ὡς ἀλλοῖον ἀσ-
φοδέλου ῥίζης καῦσις ἢ τέφρα, προπαρασκευασθείσης τῆς ἀλωπεκίας· βατράχου
λεῖον μετὰ ὀλίγου κατάπλασθεν, λε-
πίδιον ὁμοίως, ἔλαιον κίκινον μετὰ κηρί- G
νων κεκαυμένων, ἐχίνου χερσαίου δὲ μέρος κεκαυμένον καὶ ἐσθεσθὲν πίσῃ ὑγρᾷ,
ἢ βατράχου κεκαυμένου τέφρα ὁμοίως,

Quibus ſuppreſſa vox eſt, prodeſt porri ſuccus abſorptus, item braſſica cruda commanducata: inſupérque ſuccus eiuſdem cũ melle ſorbitione ſumptus. Conferunt & ſorbitiones è cumino, porro & farina ſumptæ, itémque galbanum fabæ magnitudine melli accuratè mixtum atque deuoratum. Vocem & ſam reſtituunt.

Fauces expurgat acetum ſcilliticum gargarizatum, itémque ſinapi quod ad eſcas præparatur, eodem modo, ſed poſtea gargarizandum ex aqua multa. Hoc idem etiam callos arteriæ tõſillarúmque ſanat. Arteriam expurgantia.

Vocem limpidam canorámque reddunt, allium ſeu coctum ſeu etiam crudum in cibo ſumptũ, porri capitati ſemen, ſtyrax deuoratus, ſilurus denique ſale conditus in cibis ſumptus. Vocem limpidam reddunt.

Diuturnis faucium aſperitatibus medentur, æthiopidis radix in vino pota, glycyrrhiza dum manditur ſenſim eliqueſcens, ac myrrha ſimiliter, ouum crudum quod exiguo calore tepeat, abſorptum, ſymphytum cum aqua multa potum, ac denique quinque folij è radice decoctum gargarizatum. Ad faucũ aſperitatem.

Ad pilorum affectus remedia.

Alopecias, quæ capiti & mento accidunt, emendant hæc inuncta, ſi modo loca pilis nudata nitro antè præparata, linteolóque aceto madente perfricta fuerint: quod adiecto oleo è cote Naxia exacuendo ferro deteritur: alcyonium vſtum tritúmque cum aceto vinóve aut oleo: fimus caprinus ſimiliter, muſcerda, aut felis ſtercus cum ſinapi, pipere & aceto: adiantum ex linteolo illitum, auripigmentum aut ſandaracha, ſi terebinthina excipiatur: aſplenum, aſphodeli radicis exuſtæ cinis, prius tamen ſcarificata cute: ranunculus tritus exiguóque tempore impoſitus, itémque lepidium eodem modo: oleum cicinum cum buccinis crematis, erinacei terreſtris corium cõbuſtum, picéque liquida extinctum: ſimilitérque ranarum combuſtarum cinis, hippocampi eodẽ modo exuſti, Ad alopecias.

Molbanum legit. Galenus.

thapſiæ

thapsiæ succus illitus, ferrugo cum aceto & adipe vrsino vel axungia, calami Cyprij cortex vstus cum aceto, iuglandis putamen vstum cum vino: nuces auellanæ totæ combustæ eodem modo adhibitæ, vel cum axungia aut adipe vrsino: cepa contrita illita aut cataplasmatis modo impositа; cyclamini radix ad eundem modum, sinapi cum aceto: laser cum croco, vino ac pipere: vngulæ caprinæ vstæ cum aceto: pieris oleum cum farina hordeacea adhibitū, raphani cortex affrictus, allium vstum cū nardino vnguento pro cataplasmate impositum; beta eodem modo affricta muscarum capita, vel ipsæ integræ, loco priùs nitro præparato: solex denique veteres crematæ tritęque cum aceto.

A ἢ θαψίας χυλὸς ὀπτηχειόμενος, ἢ ἰὸς σὺν ὄξει, ἢ σὺν ὄξει, ἢ σὺν ἀρκείῳ σιαπ· ἢ κεδρίᾳ, ἢ ἀξουγγίῳ· ἢ κηλάμου Κυπρίου χυλοῦ κεκαυμένου σὺν ὄξει, καρύου βασιλικοῦ λέπυρα κεκαυμένα σὺν οἴνῳ· καὶ ὁ Ποντικὸς δὲ ὅλος καὶ ὁμοίως, ἢ σὺν ἀξουγγίῳ, ἢ ἀρκείῳ σιαπ· ἢ κράμβου λῶτου καταχριόμενον ἢ καταπλασσόμενον, κυ- B κλαμίνου ῥίζα ὁμοίως, σίνηπι μὲν ὄξους, ὁ πρὸς σιλφίου μὲν κρόκου καὶ οἴνου καὶ πυπέρεως, ὀπλαὶ αἰγὸς καυσαι σὺν ὄξει, πίσσα, σταφὶς σὺν ἀλθίνῳ κεδρίνῳ καταπλασσόμενον, ῥαφανίδος τὸ ἐκτὸς περιτειόμενον, σκόρδον καυμένον σὺν νάρδινῳ μύρῳ καταπλασθέν, σκύπλιον ὁμοίως· μυῶν κεφαλαὶ C περιστειόμεναι, & αὐταὶ ὅλαι περικνησωλίνας τῷ πύρῳ, κάσυμα καυμένον λῶτον σὺν ὄξει.

φασὶς κτησιφῶν. lib. 1. de mat.

σταφὶς καυμένη σὺν ἀλθίνῳ. Mesue.

Ad capillũ defluuium.

Defluentes capillos continent, adiantum tritum cum ladano, vino, cœsypo & myrtino oleo inunctum: similiter & callitrichum, aloë cum vino nigro austero, purpurarum opercula in oleo cocta, myrtinum oleum & quod ex olea syluestri exprimitur, myrrha cum vino, ladano & myrtino. Aliud: Polytrichum in vino nigro diutinè coquito: huius decocto admisceto calami aromatici separatim igni è salignis lignis succenso combusti & cum aqua pluuia probè subacti expressionem, ac vtitor. Aut, fimo caprino in testa combusto tritóque cum oleo caput priùs abrasum inungito. Vt ne capilli defluant, melathium vstum & cum aqua tritum ei parti adhibeto in qua pilum nasci volueris, maximè verò supercilijs. Aliud: Apes crematas tritásque cum oleo perungito.

Ad capillũ defluuium.

XCVI. Τὰς δὲ ῥεούσας τρίχας ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ἴσχειν, ἀδίαντον λῶτον σὺν λαδάνῳ καὶ οἴνῳ καὶ * ὑοσώτῳ & μυρσίνῳ περιχριόμενον· & ὁ καλλίτριχον ὁμοίως· ἀ- D λὴν σὺν οἴνῳ μέλανι αὐστηρῷ, πορφύρας πώματα ἐν ἐλαίῳ ἑψηθέντα, ἔλαιον μυρσινινον, & τὸ ἐξ ἀγρίας ἐλαίας, σμύρνα σὺν οἴνῳ καὶ λαδάνῳ καὶ μυρσίνῳ, κάρδαμον λῶτον σὺν μυρσίνῳ, ἢ πολύτριχον ἑψήσας ἐν οἴνῳ μέλανι ἐφ' ἱκανὸν, καὶ καύσας ἰδίᾳ κάλαμον ἀρωματικὸν μὲν ξύλων ἰτεΐνων, B μίξον ὕδωρ ὄμβριον, & αἰαλθίσας ὕλισον καὶ μίξον ταῦ ἀφεψήματι τοῦ πολυτρίχου, καὶ χρῶ. ἢ κόπρον αἰγὸς κατακαύσας ἐν ὀστρείῳ λείαν σὺν ἐλαίῳ ἄλφος, ἐφαλωμένης τῆς κεφαλῆς. Περὶ τρίχας ἵνα μὴ ἀποῤῥέωσιν. καῦσαι μελαίθιον, καὶ μὲν ὕδατος τρίψας, κατάπλαττε, ἵνθα ἂν βού- F λῃ τρίχας φύεσθαι, μάλιστα ὀφρύων. Αλλο. Μελίσσας καῦσαι καὶ τρίψας, μετ' ἐλαίου καταχρίειν.

Pueris venustos densósque capillos hæc efficiunt, iuglandis putamen vstum tritúmque in vino & illitum, adeps suillus inunctus, brassica cruda adhibita, lòti arboris folia, spondylij radix loco priùs absterso circumlita, cameli fimus crematus & cum oleo cataplasmatis in modum ritè adhibitus.

Pueris dẽsas & formosas capillos.

XCVII. Επὶ δὲ τῆς παιδίων ποιῆσαι καλὰς καὶ πυκνὰς τρίχας τάδε· καρύου λέπυρον καὶ & τρίβειν σὺν οἴνῳ καταχριόμενον, σίαρ ὕειον καταχριόμενον, κράμβου G ἀμὴ καταπλασθεῖσα, λωτοῦ δένδρου φύλλα, σπονδυλίου ῥίζα μὲν ὁ ἀποσμῆξαι περιχριόμενον, ἀπόπατος καμήλου καυσα σὺν ἐλαίῳ & καταπλασθεῖσα καλῶς.

Capilli flauos facientia.

Flauum faciunt capillum lupinorum cortices, nitro præmacerá-

XCVIII. Ξανθὰς ἡ ποιῆσαι τρίχας, θέρμων λεπίσματα ἀποβρεχόντα σὺν νίτρῳ ὑπὸ

ἡμέρας δέκα, εἶτ μετ' ταῦτα σμώμενα κύπρου φύλλα λεῖα σὺν γρυτῷ χυλῷ ἐπίπλασμα, λυκίου χυλὸς ἐν ὕδατι σύμμιγῶς σμώμενος, λωτίνου δ' δίνδρου ἀφέψημα τῶν ριζωμάτων, ξαίθιον καταπλασάμενον τοῦ χειμῶνος. εἶτα καταπλασάμενον εἰς σφαίρας, ὅπερ δεῖ τῆς χρήσεως λυόμενον ὕδατι καὶ ἐγχριόμενον ἐν ἡλίῳ. ἢ πύξου ὄξους * κεκαυμένη μετ' * ὠμοῦ, καὶ μετ' ἐλαίου δι' ὅλης * νυκτὸς καταχριεθεῖσα.

Cypri folia trita cum ſtruthij ſucco impoſita, lycij ſuccus aqua ſolutus, & crebro infricatus, loti arboris ramentorum decoctum, xanthium impoſitum pilis antea nitro præparatis. Confert & adipem bubulum cum lixiuio è quernis faginiſve lignis coctum cogere in globulos, qui quidem vſus tempore aqua diſſoluantur, & ad ſolem illinantur. Rurſat & capillum fæx aceti vſta cum lentiſcino balanuióve oleo, tota nocte illita.

Ad ſtillum deſluxum pertinet.

Denigrant verò capillos hæc affricta: gallę dilutum, itémque chalcanthi & malicorij: acaciæ ſuccus, tum qui ex ſiliquis ſimul & ipſius ſpinæ foliis, tum qui è maturo eiuſdem ſemine exprimitur illitus, rubi folia decocta & infricata, eiuſdémque fructus maturus in oleo omphacino coctus, vinum myrtites cum ſapa, ſaluiæ decoctum affrictũ: ſimiliter & elates, [hoc eſt, palmarum inuolucri:] myrrha cum acacia, aceto & galla: hederæ corymbi, capparis radices cũ fabarũ corticibus decoctæ: nigræ tum fici, tum vitis folia cum aqua cæleſti: ladanum cum myrtino vnguento, baccarum myrti nigrarum ſuccus, earundémque dilutum: rhus coriariorum decocta, lentiſci decoctum cũ ſory: verbaſci quod aureo floret colore, tum flores, tum folia impoſita: ilignex radicis cortex in aqua coctus, & per totam noctem adhibitus, ac deinde mane ſcalpendo deraſus.

Ne tam citò canęſcant capilli cauſſimus retardantia.

Ne tam citò canęſcant capilli, præſtat oleum ſylueſtris oliuę quotidie inunctum, eóque magis, ſi quis myrtum in eo macerauerit: ſic & myrtinũ oleũ ladano admixtũ.

Pilos extergent nitrum vſtum, Pilos extergentia.

fæx vſta, calx, fœnumgræcum, ſpuma nitri, terra Melia, itémque Ægyptia, cornu ceruini decoctum, pumex tritus cum oui candido.

Pilos attenuant trita & affricta Pilos attenuantia.

hæc: cinis tum ſarmentitius tum & è vinaceis, pumex toſtus tritúſque, veratrum album, ſepiæ teſta, galla, nitrum, argenti ſpuma, ſciſſile alumen, & caninum ſtercus aridum.

ξανθίου φύλλα καταπλασάμενον τοῦ χειμῶνος

Moib. ἀλάβου.

Moibanus.

Moib. Μαλὰ τεροπὸν. σὺν δὲ τῷ τεροπῷ, Moibanus coniungens præcedenti.

ΚΘ. Μελάνας δὲ ποιῆ τρίχας σμύρνα· κηκίδος ἀπόβρεγμα, καὶ χαλκάνθου καὶ σιδίου· καὶ ἀκακίας χύλισμα, * καὶ τὰ κεφάλια αὐτῆς, καὶ ἄκανθα· καὶ ἐν τῷ πιπέρεως ἀπύρηνος χυλὸς, ἐλχριόμενος· βάτου φύλλα ἐψηθέντα ἐν σμύρνῃ, ὁ καρπὸς ἢ πίπερις ἐψηθεὶς σὺν ἐλαίῳ ὀμφακίνῳ· οἶνος μυρτίτης σὺν ἐψήματι, ἐλελισφάκου ἔψημα σμύρνῃνον, ἐλάτης ὁμοίως, σμύρνα σὺν ἀκακίᾳ ἐν ὄξει ἐν κηκίδι· κισσοῦ κόρυμβοι· ἐκ * κηπαίας ῥίζαι, μετ' κυάμων λεπίρων ἐψηθεῖσαι· ἐν φύλλα μελάνης συκῆς ἐν ἀμπέλου σὺν ὁμφακίῳ ὕδατι· λάδανον μετὰ μυρσίνης * ἀλείμματος· μύρτων μελάνων χυλὸς, ἐν τὸ ἀπόβρεγμα· ῥοιᾶς βυρσοδεψικὴ ἐψηθεῖσα, σχίνου ἀφέψημα μετὰ σώρεως, φλόμου τῆς χρυσοκόμου τὰ ἄνθη καὶ τὰ φύλλα καταπλασθέντα, τρίνου φλοιὸς τῆς ῥίζης * ἀφεψηθεὶσης ἐν ὕδατι καὶ δι' ὅλης νυκτὸς καταπλασθείσης, τρωὶ * ἀφανιζόμενος.

IX. Nigrant capillos myrra: ſepiæ teſtæ decoctum, chalcanthi & malicorij: acaciæ ſuccus, tum qui ex ſiliquis ſimul & ipſius ſpinæ foliis, tum qui è maturo eiuſdem ſemine exprimitur illitus, rubi folia decocta & infricata, eiuſdémque fructus maturus in oleo omphacino coctus, vinum myrtites cum ſapa, ſaluiæ decoctum affrictũ: ſimiliter & elates, [hoc eſt, palmarum inuolucri:] myrrha cum acacia, aceto & galla: hederæ corymbi, capparis radices cũ fabarũ corticibus decoctæ: nigræ tum fici, tum vitis folia cum aqua cæleſti: ladanum cum myrtino vnguento, baccarum myrti nigrarum ſuccus, earundémque dilutum: rhus coriariorum decocta, lentiſci decoctum cũ ſory: verbaſci quod aureo floret colore, tum flores, tum folia impoſita: ilignex radicis cortex in aqua coctus, & per totam noctem adhibitus, ac deinde mane ſcalpendo deraſus.

Ne tam citò canęſcant capilli cauſſimus retardantia.

Ne tam citò canęſcant capilli, præſtat oleum ſylueſtris oliuę quotidie inunctum, eóque magis, ſi quis myrtum in eo macerauerit: ſic & myrtinũ oleũ ladano admixtũ.

Pilos extergent nitrum vſtum, Pilos extergentia.

fæx vſta, calx, fœnumgræcum, ſpuma nitri, terra Melia, itémque Ægyptia, cornu ceruini decoctum, pumex tritus cum oui candido.

Pilos attenuant trita & affricta Pilos attenuantia.

hæc: cinis tum ſarmentitius tum & è vinaceis, pumex toſtus tritúſque, veratrum album, ſepiæ teſta, galla, nitrum, argenti ſpuma, ſciſſile alumen, & caninum ſtercus aridum.

Μ. Βέλτιον δ' πολιοῖ δὲ ὀξὶ ἀγρίας ἐλάας καθ' ἡμέραν ἀλιφόμενον· μᾶλλον δ' εἰ μυρσίνῳ τις αὐτῷ ἐναποβρέξῃ· καὶ τὸ μυρσινοῦν δ' μιγὲν τῷ λαδάνῳ.

Moibanus.

LI. Σμήχει δ' τείχας νίτρου κεκαυμένου, πύξου κεκαυμένη, ἀσβέστου, τῆλις, ἀφρὸς ἵππου, γῆ Μηλησία, γῆ Αἰγυπτία, κέρατος ἐλαφείου ἀφέψημα, κίσσηρις λεία, ὠὸν τὸ λευκόν.

Moib. Μαλὰ repoſit. σὺν δὲ τῷ τεροπῷ, Moibanus coniungens præcedenti.

LII. Λεπύνει δ' τείχας τὰ δηκτικὰ σώματα λῆα, τίφρα κλήματίνη, καὶ ἡ ἀπὸ τῶν μαράτων· κίσσηρις ὀπὴν λεία, ἑλλέβορος λευκὸς, σηπίας ὀστέον, κηκὶς, νίτρον, λιθάργυρος, σκυτάλεια ἀχὴ, ἄφοδος κυνία ξηρά.

Ad ſtillum deſluxum pertinet.

Denigrant verò capillos hæc affricta: gallę dilutum, itémque chalcanthi & malicorij: acaciæ ſuccus, tum qui ex ſiliquis ſimul & ipſius ſpinæ foliis, tum qui è maturo eiuſdem ſemine exprimitur illitus, rubi folia decocta & infricata, eiuſdémque fructus maturus in oleo omphacino coctus, vinum myrtites cum ſapa, ſaluiæ decoctum affrictũ: ſimiliter & elates, [hoc eſt, palmarum inuolucri:] myrrha cum acacia, aceto & galla: hederæ corymbi, capparis radices cũ fabarũ corticibus decoctæ: nigræ tum fici, tum vitis folia cum aqua cæleſti: ladanum cum myrtino vnguento, baccarum myrti nigrarum ſuccus, earundémque dilutum: rhus coriariorum decocta, lentiſci decoctum cũ ſory: verbaſci quod aureo floret colore, tum flores, tum folia impoſita: ilignex radicis cortex in aqua coctus, & per totam noctem adhibitus, ac deinde mane ſcalpendo deraſus.

Ne tam citò canęſcant capilli cauſſimus retardantia.

Ne tam citò canęſcant capilli, præſtat oleum ſylueſtris oliuę quotidie inunctum, eóque magis, ſi quis myrtum in eo macerauerit: ſic & myrtinũ oleũ ladano admixtũ.

Pilos extergent nitrum vſtum, Pilos extergentia.

fæx vſta, calx, fœnumgræcum, ſpuma nitri, terra Melia, itémque Ægyptia, cornu ceruini decoctum, pumex tritus cum oui candido.

Pilos attenuant trita & affricta Pilos attenuantia.

hæc: cinis tum ſarmentitius tum & è vinaceis, pumex toſtus tritúſque, veratrum album, ſepiæ teſta, galla, nitrum, argenti ſpuma, ſciſſile alumen, & caninum ſtercus aridum.

Pilos abra, & pilos abolentia

Auferunt verò pilos illita hæc: calx viua & ſandaracha in aqua coctæ, addita terra Cimolia: rubetæ ſanguis, lacteus tithymalli characiæ ſuccus: dryopteris cum foliis & radice adhibita, frequenter iterato renouatóque quandiu renaſcentur pili eodem cataplaſmate: hederæ folia impoſita: cyperidis Indicæ radix, quæ quamprimùm pilos abolet: lepus marinus tritus atque impoſitus, ſalamandra quæ oleo intabuerit, erucæ pinorum pauliſper exiccatæ poſteáque peructæ, fabarum cortices impoſiti, itidémque ſcolopendra marina in oleo elixata.

A CIII. Ψιλοῖ δ' τείχας καταχειόμθα, ἄσβεστος καὶ σανδαράχη μὲθ' ὕδατος ἑψηθέντα· μιγνυμένης Κιμωλίας, φρύνου αἷμα, τιθυμάλλου χαρακίου ὀπός, δρυόπτεριν σὺν τοῖς φύλλοις καὶ ῥίζῃ καταπλασσόμενον, ἄχρις αὖ ἐξιδρύσωσι, συνεχῶς ἀλλασσόμενα τὸ καταπλάσματος· κισσοῦ φύλλα κα-
B ταπλασσόμθα· κυπείρου Ἰνδικῆς ῥίζα, (αὕτη δ' καὶ ἀδιάχρηστα φιλοῖ·) λαγωὸς θαλάσσιος λεῖος καταπλασθείς, σαλαμάνδρα ἐν ἐλαίῳ ἐφθεῖσα· πίτυος κάμπαι ψυχθεῖσαι ἐπ' ὀλίγον, καὶ μετ' μέλιτος καταχειωθεῖσαι· κυάμου λέπυρα καταπλασσόμθα, καὶ σκολόπενδρα θαλασσία ἐ-
C λαίῳ ἑφθεῖσα.

Impuberum pilos retardantia.

Impuberibus vt ſerius excreſcant pili, præſtant, lacryma vitis illita ex oleo, itémque liquor qui ex accenſis viridibus ſarmentis exudat, farina fabarum impoſita, hyacinthi radix cum paſſo aut vino albo cataplaſmatis inſtar adhibita.

CIIII. Βράδιον δ' ποιεῖ αὔξεσθαι τοὺς ὅπου τ' αἰνέων τείχας, καταχειόμθοι ἀμπέλου δάφνου σὺν ἐλαίῳ, καὶ τὸ ἀπὸ τοῦ χλωροῦ κλήματος καιομθέου ἱδρούμθου ὑγρόν, κυάμου ἄλευρα καταπλασσόμενον, ἁκάνθου ῥίζα μετ' γλυκέος ἢ οἴνου λευ-
D κοῦ καταπλασθεῖσα.

Cutis in capite reliquóque corpore vitiorum remedia.

Τῶν κατ' ὄλμα τῆς τε κεφαλῆς καὶ τοῦ λοιποῦ σώματος παθῶν βοηθήματα.

Ad capitis achoras furfures & exanthemata.

Ad achoras furfures & exanthemata in ſumma capitis cute hærentia faciunt hæc: adianti decoctum infricatum, aut cum vino & roſaceo tritum & applicitum: amygdalæ amaræ cum melle illitæ, portulacæ ſuccus cum vino illitus, itémque rubi ſuccus cum oleo, bulbi cum nitro affricti, ſimiliter & fœnigræci decoctum, plantago impoſita, oleæ agreſtis ſuccus affricatus, malua trita cum lolio adhibita, melilotus cum fœnogræco & vino impoſita, vinum myrtites infricatum: ſimiliter & humana vrina vetus, rutæ ſuccus peructus, ſcilla in oleo cocta & adhibita, allium cum aqua affrictum, ſimiliter & betæ ſuccus, ſal cum adipe vitulino inunctus. fici folia cum aceto trita, cicerum decoctum ac ipſi quoque elixi pro cataplaſmate impoſiti, lupinorum decoctum affrictum, ſalicis flores & folia trita &

CV. Πρὸς ἀχῶρας δ' ἢ πίτυρα ἐξαιθήσοις ὅτι παλαίας σὺν τῇ κεφαλῇ, ἀδιάντου ἀφέψημα σμήχθμοι, ἢ σκιλλούμθου οἴνῳ ἐν ῥοδίνῳ, καταπλασσόμθον· ἀμύγδαλα πικρὰ ἐγχειρόμθα μετ' μέλιτος, ἀνδράχνης χυλὸς σὺν οἴνῳ ἐγχειρόμθος βάπτου χυλὸς σὺν ἐλαίῳ, βολβοὶ σὺν νίτρῳ σμήχθμοι, τίλεως ἀφέψημα ὁμοίως, ἀγριελαίας
F χυλὸς σμηχόμθος, μαλάχη λεία μετ' αἴγειος καταπλασθεῖσα, μελίλωτος σὺν τήλει ἐν οἴνῳ καταπλασσόμθον, οἶνος μυρτίτης σμήχθμος, οὖρον παλαιὸν ὁμοίως, πηγάνου χυλὸς καταχειόμθος, σκίλλα σὺν ἐλαίῳ ἑφθεῖσα καὶ καταχειο-
G μθεῖσα, σκόροδα σὺν ὕδατι σμήχθμοι, σίκυου χυλὸς ὁμοίως, ἅλας σὺν σίκυῳ καταχειόμθοι, συκῆ σὺν ὄξει λεία· ἀρεβίνθων ἄπεπτον, καὶ αὐτοὶ ἑφθοὶ καταπλασθέντες, ἰτέας ἄνθη καὶ φύλλα καταπλασσόμθα

ἐλαίῳ. Alexand. & Actius.

Dioſc. 2. de mat. med. μετ' οἴνου, cum vrina.

σὺν μέλιτι, cum melle Dioſc. lib. cap. 182.

σὺν ξὺν φύλλα σὺν ξὺν λεῖα. Aët.

λεῖα, κάλαμος ἀρωματίτης μὲ ὕδατος καὶ σμύρνης ἐψηθεὶς σμιγμένος, πεύκου ῥίζα σμιγμένη, λάδανον σὺν οἴνῳ καταχριόμενον, λιβανωτὸς σὺν νίτρῳ & ὕδατι ὁμοίως, χαμαιδάφνης χυλός.

A adhibita, calamus aromaticus cum aqua & myrrha coctus & affrictus, lilij radix affricta, ladanum cum vino illitum, thus cum nitro & aqua eodē modo, ebuli denique succus.

CVI. Πρὸς δὲ τὰ ἐξέρυθρα ἐξανθήματα, ψιμμύθιον σὺν δαφνίνῳ ἐλαίῳ καὶ θείῳ καταχριόμενον, πίτυος φλοιὸς σὺν κηρωτῇ, χαλκῖτις μὲ ὄξους, κιννάβαρις μὲ κηρωτῆς, ὀστρακον ἐξ ἵππου μετ' ὄξους, σῦκλον ἐφθὸν. ἐπαλείφειν δὲ δεῖ μὲ τοὺς μίξαντας αὐτῶν τηλίνῳ ἐλαίῳ, ἢ μυρσίνῳ, ἢ ῥοδίνῳ, ἢ οἰναν θίνῳ.

B Ad exanthemata rubentia.

Methodum mihi videtur legisse. χρίειν for ut legendum.

CVII. Τοὺς δὲ τῆς κεφαλῆς ὅλου τοῦ σώματος φθειρίασις γινομένας τούτοις θεραπευτέον συγχρίοντας, ἀφρῷ δηλαδὴ ἀγελαίᾳ ἢ σμυδαλοειδεῖ σὺν ἐλαίῳ, ἢ κισσοῦ χυλῷ σὺν μέλιτι, σινάπεως σὺν ὄξει, κεδρίᾳ καθ' ἑαυτὴν, ὑγρᾷ πίσῃ μὲ σπονδυλείας, δαφνίδων πίσσῃ, ἐλαίῳ ῥαφανίνῳ, ἢ νίτρῳ μὲ Σαμίας γῆς καὶ ἐλαίου, ἑλξίνης χυλῷ δι' ὅλης τῆς νυκτὸς καταχριόμενον· μυελίνης ἀφεψήματι, ἢ θαλασσίῳ θερμῷ λούοντας. ὠφελοῦσι δὲ πίνοντες κύμινον λεῖον σὺν ὀρεγανίτῃ καὶ οἴνῳ.

C Ad phthiriasin seu pediculare morbū.

CVIII. Σμήχει δὲ χρῶτα, ὀπὸς συκῆς καὶ χυλὸς μὲ ἀλθαίου ἐρεσμίνης, ἀμυγδάλαι πικραὶ μὲ μέλιτος, τέφρα κληματίνη, ἢ ἡ ἐκ τῆς φηγίνου ξύλου σὺν ὕδατι βάλανος δὲ ἡ ἐξ αὐτῶν γινομένη κονία. μυελοβαλάνου πίσσα, ἄρου ῥίζα, γῆ Χία σὺν νίτρῳ, ἀριστολοχία μὲ νίτρου, γογγύλης ἀγρίας σπέρμα μὲ ἐρεσμοῦ ἢ ὠοῦ τοῦ λευκοῦ, καὶ καθ' ἑαυτὸ τὸ λευκὸν τοῦ ὠοῦ, ἐρέσμιον ἄλθεον, ὀρόβινον, θέρμινον, πέπονος σάρξ, σικύου χυλὸς σὺν τῷ σπέρματι μὲ ἀλθαίου σπερμίου, ἢ νίτρου ξηροῦ δὲ τῷ ἁλίῳ ὀπὸ τοῖς ἀπὸ κύνα καύμασι λῆον, σικύου ἀγρίου ῥίζα μὲ ἐρεσμοῦ, βρυωνίας ῥίζα ὁμοίως.

D Cutem extergunt, ficulneus liquor & succus cum farina fabę fresæ, amygdalæ amaræ cum melle, cinis sarmentitius aut è fagi nis lignis cum aqua, sed potentiùs quod ex iisdem cineribus paratur lixiuium: myrobalani expressus succus, ari radix: terra Chia, loco nitri vsurpari solita: aristolochia cum nitro, rapi agrestis semen cum faba fresa & oui candido, ipsum etiam per se oui candidum: fabæ fresæ farina, itémque eruina & lupinorum: peponis caro, cucumeris succus cum semine & trimestris tritici farina: nitrum siccatum in sole per æstum Caniculæ, deindéque tritum: cucumeris agrestis radix cum faba fresa, & bryoniæ radix eodem modo.

E Cutem exterguntur.

CIX. Τετήκοῦσι δὲ χρῶτα καὶ τρέφουσιν, βρυωνίας ῥίζα λευκὴ ἢ μέλαινα, ἐψηθεῖσα σὺν ἐλαίῳ, καταχριόμενον τοῦ ἐλαίου. τοῖς καὶ μὲ σύκου πίονος, καὶ ὀρόβου καταλελασιασμένου ὅσον σάβδον διελθεῖν, ψυχρῷ δὲ τροχοπλύζεσθαι μὲ τῇ ἄρσει αὐτῆς, χρανοδείλου χερσαίου ἄφοδος λεῖα

F Cutis fœditatem quæ exoritur.

Cutem faciémque erugat oleum, in quo bryoniæ seu albæ seu nigræ radix decocta fuerit, inunctum: idem facit & ipsa radix, si cum ficu pingui & eruo tanto tempore imponatur, quanto quis stadium conficiat: sed postquam amota fuerit, frigida cutis eluenda est. Conuenit etiamnū terrestris crocodili stercus

G

ex aqua: terra Chia, itémque Selinuſia eodem modo, acacalidis grana trita cum cerato illita, lilij radix in ſmegmate vſurpata, ſimiliterq; cyclaminus cum maſtiche.

Faciem illustrant.

Faciei verò nitorem inducunt illita: terra Chia, itémque Selinuſia, maſtiche, vnguentum telinum, paritérque roſaceum, quod inſolatione dealbatum fuerit: humor qui in folliculis vlmi reperitur, ac denique oleum Sicyonium.

Colorem commendantia.

Venuſtum colorem inducunt, cicer coctum in cibo ſumptum, gummi ſpinæ Ægyptiæ aut amygdali aut ceraſi prunive, pondere trium obolorum ex vino potum.

Colorem mutantia.

Colorem mutant [pallorémque inducunt] ſeu bibita ſeu etiam illita, ammi cum aqua, ſimilitérque cyminum, acus tritici, ſmyrnium peruńctum, & cytini mali Punicæ ad eundem modum.

Alarum grauiolentiam commendantia.

Ad hircoſam alarum graueolentiam inſpergendi pulueres, agallochi, radicis baccharidis, itémque roſarum, idque a balneo. Illinenda vero, myrrha cum alumine, crocomagma, ſimilitérque cupreſſi ramenta cum alumine & vino odorato, terra Chia vſta & vino reſtincta, & irinum vnguentum. Tollit & id vitium cardui radix cocta, etiam potâ.

Cicatrices nigras commutantia.

Cicatrices nigras delent hæc illita: oleum in quo radix bryoniæ tum alba tum etiam nigra incocta fuerit, vſquedum ſuccum reddat: glans vnguentaria trita cum vino albo, bulbi cremati & cum alcyonio permixti ex vino, calamintha in vino cocta, argenti ſpuma lota cum roſaceo candido, cucumeris ſylueſtris radix affricta iuuât & erui ſemina cum argenti ſpuma contrita ad læuorem, & felle caprino excepta ad cerati vſque craſſitudinem, atque illita.

Cicatrices cum peritonæorum reddentia.

Tum ab impetiginibus relictas cicatrices, tum & alias quaſcunque reliquæ cuti concolores reddent, aſininus adeps illitus, itémque erucæ ſemen tritum cum felle caprino aut bubulo, & peruńctum, ſi modò, poſtquam inaruerit, defricando extergeatur: eiuſdé erucæ ſuccus cum argéti ſpuma inuńctus, idé præſtat. Aut: Cucumeris ſyluoſtris radicem

A ὕδατος, γῆ Χία ὁμοίως, γῆ Σελινουσία ὁμοίως, ἀκακαλίδος οἱ κόκκοι μετ' κηρωτῆς λεῖοι καταχριόμενοι, κρίνου ῥίζα ἐν σμήγματι, κυκλάμινος ὁμοίως σὺν μαστίχῃ.

B ΕΥ. Σπλῆνα δ' ἂν ποιήσοιτο ὑποχριόμενα γῆ Χία· Σελινουσία ὁμοίως, μαστίχη, τήλινον, ἄλθεσιν, ῥόδινον· τὸ λεπαινόμενον ὑπὸ τῷ ἡλίῳ ὁμοίως, φελέας τὸ ἐν τοῖς φυλλικίοις ὑγρόν, ἔλαιον Σικυώνιον.

Moibanus addit crocodili ſtercus, adeoque legiſſe videtur, σῦ γονοκόπαλον ἀγρίου.

C ΕΥ. Ἐυχροΐαν δ' ποιεῖ ἑρέβινθος ἐσθιόμενος ἑφθός· ἢ κύμινος ἀχνώδινος, ἢ τῶν ἐξ ἀμυγδάλων ἢ κερασίων, ἢ κοκκυμήλων, ὀλκὴ τριωβόλου μετὰ κράματος πινόμενη.

D ΕΥ. Χρόαν δ' πρὸς πολύποδα ὑποχριόμενα, ἄμμι μὲν ὕδατος, καὶ κύμινον ὁμοίως, ἄχνη πύρινα, σμύρνιον καταχριόμενον, κύπρινοι ῥοιᾶς ὁμοίως.

E ΕΥ. Τὰς δ' ὑπὸ τῶν μασχάλων δυσωδίας καὶ τὰς τῶν τριχῶν κατάπαυσιν ἀλλείοις τούτοις· ἀγαλλόχῳ, βακχαρίδος ῥίζῃ, ῥοδίνοις, ἀπὸ τοῦ βαλανείου λείοις. Διαλείφει δ', σμύρνη μετὰ στυπτηρίας, ἢ κροκομάγματι, ἢ ὁμοίως κυπαρίσσου ῥίσμασι μετὰ στυπτηρίας καὶ οἴνου βύσσους, γῆ Χία κεῖσα καὶ ὀδοδείσῃ, ἰρίνῳ. σκολύμου ῥίζα ἐψηθεῖσα ἢ πινομένη.

Moibanus addit mirti ſi quæ.

F ΕΥ. Οὐλὰς δ' μυγαίνας αἱρεῖ ὑποχριόμενα, βρυωνίας ῥίζης λευκῆς καὶ μυγαίνης ἑφθῆς σὺν ἐλαίῳ ἀχρι χυλώσεως τὸ ἔλαιον ὑποχριόμενον, βάλανος μυρεψικὴ λεία σὺν οἴνῳ λευκῷ, βολβοὶ κεκαυμένοι μετ' ὀξυκονίου σὺν οἴνῳ, καὶ καλαμίνθη σὺν οἴνῳ ἑφθὴ, λιθάργυρος πεπλυμένη σὺν ῥοδίνῳ λευκῷ, σικύου ἀγρίου ῥίζα σμηχομένη· βίζώμου κόρμα μετὰ λιθαργύρου λεωθὲν καὶ χολῇ αἰγείᾳ ἀναληφθὲν τὶς κηρωτῆς πάχος, ὑποχριόμενα ὠφελεῖ.

Dioſc. 4. de mat. med. c. 160. ſuæ interpretis ſimo.

G ΕΥ. Τὰς δ' ἐκ λεχήνων ὕλας, καὶ τὰς ἄλλας δ', ὁμοχρόους ποιεῖ, ὅσον χάρ καταχριόμενον· βίζώμου κόρμα λεῖον μετὰ χολῆς αἰγείας ἢ τερεβινθείας ἢ βοείας καταχριόμενον· εἶθ' ὅταν ξηρανθῇ ἀποτριβόμενον· καὶ ἐκ τοῦ λεχήνου δ' τὸ βίζώμου χυλὸς ὑποχριόμενος σὺν λιθαργύρῳ· ἢ σικύου ἀγρίου ῥίζαν ἐψήσας ἐν μυρεψικῷ

καὶ λιβανωτοῦ ὡς κηρωτὴν, ἐπίχριε ὁμοίως. A
ὕ λιθαργύρου μέρη ϛ', ἡλίου ἀπύρου μέρος
ἀφρολιβάνου βίζώμου χυλῷ, ἐπίχριε·
εἶτα ἀποτρίβε εἰς βαλανείῳ. ἢν μὴ λύσασθαι, ἐπίχριε λιθάργυρον σὺν βίζώμου χυλῷ.

CXVI. Στίγματα δι' ἄφρῳ, βατράχιον καταπλασθὲν, καὶ πάρεως φύλλων χυλὸς B
Dioſc. 4. de mat. med cap. 76 Vid. ἡμέρας ὁ ἐ σ'. ὁμοίως, μανδράγορας ἐπὶ ἡμέρας λ'. παρατριβόμενος. ἢ τὰ φύλλα μεμυραγόρου ταριχευθέντα εἰς ἅλμην ἢ ἐπιχριόμενα, ἐπὶ ἡμέρας μ'. ἢ ν'. ὁμοίως πόα καλουμένη
Moſch. καλπὰ, quamuis & flatices meiotonem ſect: Plin. lib. 26 cap. 8. σαπωνὴ καταπλασθεῖσα, ἢ σικύου ἀγρίου ῥίζα ἑφθεῖσα σὺν μελικράτῳ λείᾳ ἢ ἐπιχριομένη, ἢ ψιμμύθιον σὺν ὄξει καταχριόμενοι· χρωτίσματα ἢ ἄφρῳ τοῦτο. C

CXVII. Μώλωπας ἢ ταχέως ὁμοιοχρόους ποιεῖ, μέλινον ἄλειφον ἐπαλειφόμενοι συνεχῶς.

CXVIII. Ἀλφοὺς ἢ λεύκας ἢ λέπρας ἄφρῳ σὺν ἡλίῳ καταχριόμενα, ἢ σκώληκα σὺν βαλανείῳ, δράκοντίου χυλὸς, ἄφυ D
σκώληκες, πτερίσεις καὶ κίνδυνοι Dioſc. 3 de m. m. med. cap. 52. Moſch. κρόκος ἢ ἐλάφου κέρας ἀνάλυσις ῥίζα σὺν ὄξει ἢ ἀλθίρῳ κεκμένῳ, καὶ πάπρεως χυλὸς ὁμοίως, πήγανον σὺν κηρωτῇ καὶ πεπέρει, συκῆς μυελίνης καρδίαι χρίμονες παλαιαὶ λάβας καταπλασθεῖσαι. καὶ τὰ φύλλα ἢ ὁμοίως. σέλινου φύλλα καὶ ἡ ῥίζα καταπλασθεῖσα, τιλεφίου φύλλα ὁμοίως καταπλασόμενα· ἐπὶ ἡμέρας ϛ'. E
ἑκάστης ἡμέρας ἐπὶ ὥρας ϛ'. ἀφαιρῶν ἢ ὠμῇ λυσῇ καπάπλασον· ἄγνου σπέρμα λάβε, μὴ ἀφεψήσῃς ἢ ὄξει· ἀγλαίας σπέρμα ὁμοίως, ἀλκυόνιον σὺν ὄξει, βρυωνίας ῥίζα λευκὴν ἢ μυελίνης ἑφθεῖσα σὺν ἐλαίῳ μέσχει χυλώσεως, ἀσφοδέλου ῥίζης χυλὸς, βάλανος μυρεψικὴ καταχριομένη, βολβοὶ F
Hanc vim nigro tribuit Dioſc. 4. de mater. medic. Ca 6 ſimpl. v. trique tam albo quàm nigro. λάβε σὺν ὀπῷ νίτρῳ σμωμένοι καὶ καθ' ἑαυτοὺς καταπλασσόμενοι, ἑλλέβορος λευκὸς ἑφθεὶς σὺν ὄξει ἢ σμηχόμενος, καὶ ξηρὸς καταπλασσόμενος μίσχει ἀνιδρώτως· εἶτα καταχρίειν δάφνῃ ἢ σανδαράχῃ ἢ γῇ Μηλιάδι· χαμαιλέοντος μέλανος ῥίζα μὴ ἡλίου ἢ νίτρου ἢ ὄξους· δάφνῃ ὡσαύτως ἐπιτριβόμενα σὺν τόποις. ἢ λιθαργύρου μέρη β', ἡλίου μέρος α'. μίξας ἀπάτει σὺν βαλανείῳ, ἢ μὴ λούσασθαι, καταχρίειν λιθαργύρῳ μὴ βίζώμου χυλοῦ. G

coctam in aqua mulſa & contritam, donec cerati formam aſſequatur, eodem modo illine. Aut, ſpumæ argenti partes duas, ſulphuris viui partem vnam erucæ ſucco excipito, atque illinito: deinde in balneo deterito, & poſtquam laueris, argenti ſpumam cum erucę ſucco illinito.

Stigmata delent, ranunculus illitus, ſimilitérque capparis foliorum ſuccus, mandragoras diebus xxx affrictus, eiuſdémque folia muria condita inunctáque diebus xl aut l. pariter & herba Statice dicta ſi affricetur: ſylueſtris itidem cucumeris radix cocta in aqua mulſa, deindéque trita & illita: cerußa denique cum aceto perunćta, quæ quidem etiam inueterata ſtigmata delet. Stigmata quæ abolcant.

Vibices autem breui reliquæ cuti concolores efficit, lilıaceum vnguentum frequenter inunctum. Vibices cutí reliquæ concolores efficiunt.

Vitiligines albam & leucen abolent hæc in ſole perunćta aut in balneo affricta: dracunculi ſuccus, ari radix cum aceto & farina hordeacea, capparis ſuccus eodem modo, ruta cum cerato & pipere, fici nigræ ramuli tenellive ſurculi triti & impoſiti: ſimiliter & eiuſdem folia, betæ folia & radix impoſita, telephij folia ſimili modo adhubita diebus xxx. ad ſenas horas quotidie, ita tamen vt his amotis hordeacea farina pro cataplaſmate imponatur: viticis ſemen tritum cum ſpuma nitri & aceto, althææ ſemen ſimili modo, alcyonium cum aceto, bryoniæ tam albæ quàm nigræ radix in oleo cocta quouſque ſuccum reddat, aſphodeli è radice ſuccus, glans vnguentaria inuncta: bulbi triti cum nitro torrefacto affricti, ac ipſi etiam per ſe impoſiti: veratrum album in aceto coctum & confricatum, eiuſdem puluis affrictus dum ſudor erumpat: ſed pòſt illinenda ſandarachà terráque Melia: nigri chamæleonis radix cum ſulphure, nitro & aceto, locis prius affricto nitro præparatis. Aliud: Spumæ argenti partes ij. ſulphuris partem vnam miſceto, hiſque laborantem in balneo perfricato, ac poſt lotionem inungito argenti ſpuma cum erucæ ſucco. Vitiligines ad bamęs leucen euertunt.

Ad vitiligines nigram.

Vitiliginem nigram reliquæ cuti concolorem reddunt, terra Melia perunda, veratrum tam album quàm nigrum in aceto decoctum & affrictum: cochlea terrestris cremata, cum melle illita & affricta: cepæ succus cũ aceto, lilij radix infricata, similiter & fabacea farina, cuminum cum aceto, paritérque cachry, glans vnguentaria in vino, narcissi radix cum vrticæ semine & aceto, sepiæ testa cum aceto, cucumeris agrestis radix affricta, telephium cum aceto illitum, chondrillæ radix cum nitro tusa in smegmate: denique argenti spuma, arsenicum & sulphur æquis portionibus cum oleo mixta & in balneo affricta.

A CXIX. Τοὺς δὲ μέλανας λέπρους ἢ ὁμόχρους ποιεῖ γῆ Μιλησία καταχεομένη, ἐλλέβορος λευκὸς καὶ μέλας ἐφθεὶς μετ' ὄξους καὶ σμύρνης, κοχλίας χερσαῖος καιεὶς σὺν μέλιτι καταχριόμενος & σμηχόμενος, χρόμμυον χυλὸς σὺν ὄξει, κρίνου ῥίζα σμυρνίῳ, καὶ ἄμυλον ἄλευρον ὁμοίως, κύμινον σὺν B ὄξει, κάχρυς ὁμοίως, μυελοβάλανος σὺν οἴνῳ, ἢ ναρκίσσου ῥίζα σὺν κοίδης σπέρματι & ὄξει, σπλὴν ὄστρακος σὺν ὄξει, ἢ σικύου ἀγρίου ῥίζα σμυρνίῳ, τηλέφιον σὺν ὄξει καταχριόμενον, χονδρίλλης ῥίζα σὺν νίτρῳ κοπεῖσα εἰς σμῆγμα· λιθάργυρος, ἀφρόνιτρον, θεῖον, ἴσα μετ' ἐλαίου εἰς βαλανεῖον σμήχεται. C

Ad lentigines, ephelidas & varos.

Lentigines, maculas solares & varos tollunt hæc illita: adarces ex aqua, acorus cum melle, costus cũ aqua & melle, alysson cum melle, tithymalli liquor ex melle, (attamen cauendum, ne, si diutius relinquatur, altiùs exulceret.) alcyonium cum aceto, vitis syluestris fructus maturus, tritus: bryoniæ tam albę quàm nigræ radix decocta cum oleo, vsquedum succum reddat. Exterit & varos oleum amygdalinum cum cerato & lilij radice.

CXX. Φακοὺς δὲ καὶ ἐφηλίδας καὶ ἰόνθους ἄφρῳ ὀπτεχεόμενα, ἀδάρκης μεθ' ὕδατος, ἄκορος σὺν μέλιτι, κόστος σὺν ὕδατι & μέλιτι, ἄλυσσον σὺν μέλιτι, γάλα μαλλοῦ ὀπὸς σὺν μέλιτι. (προσέχειν δὲ δεῖ, μὴ χρονίσαν γὰρ ἕλκη δύναται βαθέα.) ἀλκυόνιον σὺν ὄξει, ἀμπέλου ἀγρίας καρπὸς πεπανθεὶς, λάσιος βρυωνίας ῥίζα λευκὴ καὶ μέλαινα ἐφθεῖσα μετὰ ἐλαίου ἄχρι χυλώσεως. ἄφρῳ δὲ ἰόνθους ἀμυγδάλινον σὺν κηρωτῇ καὶ κεδρίνου ῥίζῃ. D

Ad ephelidas seu solares maculas.

Vitia cutis à Solis ardore contracta emendant: ari radix cum melle, glans vnguentaria illita cum vino: bulbi crudi per se, & cum oui luteo aceto aut melle, vel cum alcyonio combusti, maculas solares egregiè repurgant: galbanum cum aceto & nitro lentigines potissimùm abolet, vti & gummi cum nitro & melle. Peculiarius verò maculas solares emendant, ellebori albi partes duæ cum melle, elaterium inunctum, cassia cum melle, & cinnamomum eodem modo, brassicæ semen cum aceto, crui farina, raphani cortex cum lolij farina. Aliud: nasturtium totis sex noctibus imponatur, & mane eluatur. Eadem vitia corrigunt thapsiæ radix cum melle, hederæ folia in vino cocta, ricini denique grana per triduum imposita.

CXXI. Ἄφρῳ δὲ ἐφηλίδας ἄγριον ῥίζα μετὰ μέλιτος, μυελοβάλανος καταχριόμενον σὺν οἴνῳ· βολβοὶ ὠμοὶ καθ' ἑαυτούς, ἢ σὺν ᾠῷ λεκίθῳ & σὺν ὄξει ἢ μέλιτι, ἢ καπνισθέντες μετὰ ἀλκυονίου, μάλιστα ἐφηλὶν ἀποκαθαίρουσι· χάλβανον σὺν ὄξει καὶ νίτρῳ μάλιστα φακοὺς ἄφρῳ. κόμμι σὺν νίτρῳ καὶ μέλιτι· & ἰδίως δὲ μᾶλλον ἐφηλίδας ἄφρῳ ἐλλεβόρου λευκοῦ μέρη β'. μετὰ μέλιτος, ἐλατήριον κατακριόμενον, κασία σὺν μέλιτι, κιννάμωμον ὁμοίως, κράμβης σπέρμα σὺν ὄξει, ὀρύζινον, ῥαφάνου φλοιὸς σὺν αἰείρῳ ἀλεύρῳ. ἢ κάρδαμον κατατριβόμενον δ' ὅλης νυκτὸς ὅτι ἡμέρας ε'· ἔωθεν δὲ ἀποπλυέντα τὰ κλύσματα. θαψίας ῥίζα σὺν μέλιτι, κισσοῦ φύλλα σὺν οἴνῳ ἑφθά, κρότωνος καρπὸς κατατριβεὶς ὅτι ἡμέρας γ'. E F G

Ad varos.

Priuatim autem varos tollunt, lilij radix cũ sapone, cyclamini radix

CXXII. Ἰδίως δὲ ἰόνθους ἄφρῳ, κρίνου ῥίζα σὺν σμήγματι, κυκλαμίνου ῥίζα σὺν

μέλιτι, ναρκίσσου ῥίζα ὁμοίως. σπόδιος ὀ- A
ὁμοίως, videtur secundarie Mesuæ. Mesuæus. γράκου· ὁμοίως κεκαυμένου μέρη β'. βα-
λάνου μυρεψικοῦ μέρος ἕν, λέα σὺν ὕδατι
καταχρίσματα· καὶ καταξηραινόμενα δὶς
νότιζε. μετὰ ἓξ ἡμέρας, πυέλα. ἄλθεσι
σὺν ἐξυμένῳ φασὶν εἶναι Dioscor. 2. de mat. med. cap 107. σπόδιον μετ' ἐλαίου καταπλασθὲν λεπ-
χων χειρωτῇ αἱαλεφθεῖσα, σμύρνα μετὰ
al. χρυσίου. σὺν ὄξει Dioscor. 2. de mat. med. c. 181. καὶ ἄλευρα Dioscor. l. 5 de mat. med. c. 118. B
κασίας καὶ μέλιτος, κεκμηκὼς χυλὸς σὺν
κονδύλῳ, μολύβδαινα σὺν ὄξει, καὶ σῶρυ σὺν
ὄξει κεκαυμένον.

CXXIII. Τοὺς δὶ ψωρώδεις καθ' ὅλου
τοῦ σώματος ἢ τοὺς μέρος κνησμοὺς θερα-
πεύει καταχρίσματα, σαφὶς ἀγρία μετὰ
σανδαράχης καὶ ἐλαίου καὶ ὄξους τεθειμ-
μένα καὶ λεπτοτεθειμένα, σύμπηγμα ὑγρὰ C
μετὰ μέλιτος ἐφεθὲν ἢ σμύρνης κα-
σμύρνα, Moibanique remedium hoc ex myrrha à præcedentibus separat. ταχρίσματα, ἄλες σὺν ὄξει ἢ ἐλαίῳ συγ-
κεχυμένοι ἄχεις αἱ ὀξιδρώσωσι, νάπυ μετ'
ὄξους, μυρσίνου λαπάθου ἀγρίου τὸ ἀφέψη-
μα, τῆς ῥίζης τῷ λαντεῷ μιγνυμένης· καὶ
ὄξος θερμὸν καταπλούμενον. ὀρόβου ἀφέ- D
ψημα, ἢ ὀρίγανου, ἢ γλήχωνος καταπλυ-
μένου, λέα χιὼν πινόμενον.

CXXIIII. Τοὺς δὶ περὶ τὰ αἰδοῖα, κνησμοὺς θερα-
θάλασσα * πινομένη, ἢ ἐν βλητικῷ, νί-
τρον σὺν ἐλαίῳ καὶ ὄξει καὶ σταφίδι ἀγρίᾳ ἢ
σὺν ὑδρομέλιτι. Moib. σύμπηγμα ἐπιθεμένη· μάλιστα δὲ τοῖς διδύμοις E
καὶ πόᾳ ὄξους ξηρὰ τεθέντα σὺν οἴνῳ κα-
ταχρίσματι διδύμοις. ἐγκαθέχειν δὲ μετὰ
ταῦτα καὶ ὠὸν τὸ λευκὸν μετὰ μέλιτος.

CXXV. Πρὸς δὲ τὰ κνησμώδη ἐξαν-
θήματα ἁρμόζει καταχρίσματα, διφρυ-
γὲς σὺν ὄξει, συκαμίνου ῥίζα σὺν ὄξει, μύ-
σου σὺν ῥοδίνῳ, μολύβδαινα σὺν ὄξει. ὁπλαὶ
αἰγῶν κεκαυμέναι σὺν ὄξει, σύμπηγμα πᾶσι F
σὺν μέλιτι ἐφεθὲν, πήγανον σὺν ἁλσὶ
καὶ ἐλαίῳ, ἢ πήγανον σὺν χειρωτῇ μυρσίνῃ
τετριμμένῃ, ψιμύθιον καὶ λιθάργυρος σὺν
ὄξει, μυρσίνινον ἔλαιον, δαφνίδων πίεσμα
προσκλυζόμενον, μύρτα σὺν χειρωτῇ μυρ-
σίνῃ ἐν ὀστρείῳ βεβλημένα, κισσάβεως με-
τὰ χειρωτῆς, σμύρνη, νίτρον σὺν ὑείῳ στέατι,
κισσοῦ φύλλα ἐφθὰ σὺν οἴνῳ καταπλα-
σθέντα, κεῖται κεκαυμένα λέα καται-
πλασθέντα, νίτρον σὺν θείῳ ἀπύρῳ, καὶ πεύξης σὺν μέλιτι.

cum melle, narcissi radix eodem modo. Testæ sepiæ crematæ partes ij. & glandis vnguentariæ pars vna terantur, & inungantur ex aqua. Cùm exaruerint, humectato: sex verò transactis diebus, fomentum adhibeto. Repurgát & varos trimestris tritici farina cum oleo imposita, pulegium cerato exceptum, myrrha cum casia & melle, ceparum succus cum spodio, plumbago cum aceto, & sory vstú cum aceto.

Totius corporis scabiem aut partis cuiuspiam pruritum sanant hæc illita: staphisagria cocta, deindéq; cum sandaracha, oleo & aceto tenuiter contrita: alumen liquidum cum melle coctum, & addita myrrha inunctum: sal cum aceto & oleo illitus, donec sudor erumpat: sinapi cum aceto: quod ex vnguentaria glande tusa expressáque reliquum est quasi retrimentum seu magma, cum aceto & pauco oleo: radicum lapathi agrestis decoctum lauacro mixtum, acetum calens affusum: decoctum erui, aut origani, aut pulegij itidem affusum: lac denique scissile in potu sumptum. *Ad scabiem & prurigines.*

Genitalium pruritus sanant, aqua marina pro fotu adhibita, sulphur inspersum, sic & nitrum cum oleo, aceto & staphide agria: alumen ex aqua mulsa in balneo illitum, præsertim circa testes: fæx etiam aceti arida tritáque cum vino testibus illita: sed postea candidum oui cum melle inungendum est. *Ad pruritus pudendorum.*

Ad pruriginosas papulas hæc peruncta conueniunt: diphryges cum aceto, mori radix ex aceto, misy cum rosaceo, plumbago cum aceto, vngulæ caprarum vstæ cum aceto, quodvis genus aluminis cum melle coctum, ruta cum sale & oleo, ruta cum cerato myrtino quadruplo, cerussa & argenti spuma cum aceto, myrtinum oleum, expressus baccarum lauri succus affusus, myrti baccæ cum cerato myrtino in linteolo impositæ, myrrha, nitrum cum adipe suillo, hederæ folia cum vino cocta & imposita: hordeum vstum tritúmque, cataplasmatis in modum adhibitum: nitrum cum sulphure viuo, fæx denique affricta. *Ad pruriginosas papulas & exulcerationes.*

Ad lichenas seu impetigines.

Ad lichenas ſeu impetigines ac A lepræ ſcabieíque vitia faciunt hæc illita: viticis ſemen cum ſpuma nitri & aceto, ſanies quam ſylueſtris oleæ ligna viridia dum vruntur exudant, ſimiliter & quæ ex corni lignis accenſis extillat, anchuſæ radix trita cum aceto impoſita, adarces cum aqua, rubiæ ſemen cum aceto, loliacea farina cum aceto cataplaſmatis modo impoſita. Feras autem impetigines tollunt, furfures in aceto coĉti & calentes impoſiti: ſimiliter & chondrus.

Ad prurigi-nem.

Ad priginem, lupini farina in balneo cum oleo chamæmelino & pauco aceto cõuenienter illinitur.

Ad lepram.

Lepram verò ſanant, loliꝝ farina cum ſulphure & aceto illita, bryo- C niæ fructus cum aceto more cataplaſmatis impoſitus, bitumen cum ſulphure & aceto: (ſunt qui pro bitumine picem vſurpent,) glans vnguentaria cum aceto illita: tollit & ranunculus impoſitus, cucumeris agreſtis radix cum aceto, ſimiliter & ſory vitum: oleæ Æthiopicæ lacryma cum aceto, (ſic porrò ſylueſtrem oleam nominant.) veratrum tam album quàm nigrum cum aceto impoſitum, myrrha cum aceto, ac thus eodem modo, paritérgue ammoniacum, ſici liquor illitus, cicer coctum ex aceto impoſitum, amygdalæ amaræ cum aceto, taurinum gluten eodem modo, thapſiæ ſuccus & radix cum aceto: ſulphur viuum cum aceto, aut ſubactum cum reſina terebinthina: lupinorũ decoctũ affuſum: æruginis partes duæ exceptæ reſinæ terebinthinæ parte vna: (at efficacius redditur hoc remedium addito nitri aut chalcanthi momento.) cardamomum aut naſturtium cum aceto. Clematis vſta & cum aceto impoſita, lepras exterit. Idem præſtant cantharides, bupreſtes & pinorum erucæ, reſina & pice admixta: gummi radicis thapſiæ, amygdali amaræ, ceraſi, pruni aut vitis cum aceto: cochlea terreſtris cremata cum aceto & melle illita: lapathi ſylueſtris radix, ſeu cruda, ſeu in aceto G coĉta tritáque & impoſita: lichen qui petris inna ſcitur inunctus, aut

cxxvi. Πρὸς δὲ τοὺς λιχῆνας, καὶ τὰ λεπρώδη καὶ ψωρώδη, καταχρίοντα ἁρμόζει· ἄγνου σπέρμα σὺν ἀφρονίτρῳ καὶ ὄξει, ἰχὼρ ὁ ἀπορρέων ἐκ ξύλων ἀγρελαίας ὑγρᾶς καιομένων· ὁμοίως καὶ ἐκ τῶν κεραίνων ξύλων. ἀγχούσης ῥίζα λεία σὺν ὄξει καταπλασσομένη, ἀδάρκη σὺν ὕδατι, ἐρυθροδάνου καρπὸς σὺν ὄξει, αἶγιλον ἄλθεσι σὺν ὄξει καταπλασσόμενον. ἀφίσιοι ἀγρίους λιχῆνας πίτυρα σὺν ὄξει ἐφθιβίζα, καὶ θερμὰ καὶ καταπλασθέντα· καὶ χόνδρος ὁμοίως.

cxxvii. Πρὸς κνησμονὴν, ἐν λυτρῷ θέρμοντι ἄλθεσι μετὰ χαμαιμηλίνου ἐλαίου καὶ ὀλίγου ὄξους καταχριέσθω ὁ πάσχων.

cxxviii. Λέπρας δὲ θεραπεύει, αἶγιλον ἄλθεσι σὺν θείῳ καὶ ὄξει καταχριόμενον, βρυωνίας καρπὸς σὺν ὄξει καταπλασσόμενος· ἄσφαλτος μετὰ θείου καὶ ὄξους· ἡ νὴ Δία ἀσφάλτου, πίσσης. μυρσίνης καταχριόμενον σὺν ὄξει· βατράχιον ἐπιπλασθὲν ἀφίσιοι· σικύου ἀγρίου ῥίζα σὺν ὄξει, σὺν κεκαυμένη ὁμοίως, ἐλαίας Αἰθιοπικῆς δάκρυον σὺν ὄξει. καλεῖται δὲ Αἰθιοπικὴ ἐλαία, ἡ ἀγρία ἐλαία. ἐλλέβορος λευκὸς καὶ μέλας σὺν ὄξει καταπλασσόμενος, σμύρνα σὺν ὄξει, καὶ λίβανος ὁμοίως, ἀμμωνιακὸν ὁμοίως, ὁπὸς συκῆς ὑπιχριόμενος, ἐρέβινθος ἐφθὸς σὺν ὄξει ὑπιπλασσόμενος, ἀμύγδαλαι πικραὶ σὺν ὄξει, θυμέλαια ὁμοίως, θαψίας χυλὸς καὶ ἡ ῥίζα σὺν ὄξει. θεῖον ἄπυρον σὺν ὄξει, ἢ τερεβινθίνῃ ῥητίνῃ αἰαλιφθὲν· φάρμακον ἀφέλκυμα κατεμπλούμενον, ἰοῦ διπλοῦς αἰαλιφθεὶς ῥητίνῃ τερμινθίνῃ ἁπλῇ· βιαιότερον δ' γίνεται τὸ φάρμακον, πίτυος ἢ χαλκάνθου μικροῦ ὀλίγου. καρδάμωμον ἢ κάρδαμον σὺν ὄξει, κλήματις σὺν ὄξει καυσα καὶ καταπλασθεῖσα ἀφίσιοι. καὶ κονδυλεὶς, βύσαρσις, πίτυος κάμπη αἰαλιφθεῖσα ῥητίνῃ, καὶ πίσσης μικρόν· θαψίας ῥίζης κόμμι, ἀμυγδάλης πικρᾶς ἢ κερασίας, κεκαυμένας, ἢ ἀμπέλου σὺν ὄξει· κοχλίας χερσαῖος σὺν ὄξει κεκαυμένος καὶ σὺν μέλιτι καταχριόμενος, λαπάθου ἀγρίου ῥίζα ὠμὴ καὶ μετ' ὄξους ἐφθὴ λεία καταπλασσομένη, λιχῆνα ὁ ὅτι ταῖς πίτυσι καθαιρεθεὶς, ἢ

σὺν ὄξει καταπλάσθεὶς, χαμαιλέοντος μέλανος ῥίζα ἑφθεῖσα σὺν ὄξει, μυελὸς πεὶ ἀφεψήματι θείου καὶ ἀσφάλτου ἐγχριομένη, ἢ δίχα τούτων σὺν φώκης ἢ χάλκανθος καὶ κέδρινον ἔλαιον μυελὸς, μελάνθιον μετὰ θείου ἀπύρου καὶ ζωογαλλης καὶ ὄξους, ὁποῖς σιλφίου σὺν ὄξει. A cum aceto impositus, chamæleonis nigri radix in aceto cocta sola per se, aut additis sulphure & bitumine inuncta: vituli marini adeps, admixtis chalcantho & oleo cedrino: melanthium cum sulphure viuo, glutine taurino & aceto: laserpitij denique liquor cum aceto.

CXXIX. Τὰς τραχώσεις δὲ λεπρώδη, τριφύλλου ῥίζα σὺν ὄξει καταπλασσομένη, ἢ πήγανον σὺν μέλιτι καὶ συκαμίνεια ὁμοίως, πίσσα ὑγρὰ σὺν ἴσῳ κηρῷ καὶ ῥητίνῃ καὶ θείῳ πασσομένη ὡς ἔμπλαστρος, τραχείου φύλλα ἑφθὰ σὺν ὄξει καὶ καταπλασθέντα, πέλεκας φύλλα ἢ κλάδια ὁμοίως, ῥοιὰ σὺν ὄξει καταχριομένη, σκαμμωνίας ὁποῖς ἑφθεῖς σὺν ὄξει ἄχρις αὖ μελιτώδους ἕλκεται καταχριόμενος, σκόροδον σὺν μίλτῳ ὁμοίως, τρυφίου ῥίζα σὺν ἀλφίτῳ καὶ ὄξει καταπλασσομένη, συκαμίνεια κεκαυμένα σὺν κεράτινης χυλῷ, ἢ ὑγρὰ ἑφθεῖσα σὺν μέλιτι καταχριομένη· πτυελλοῦ ὁποῖς καταχριόμενος, τρὺξ οἴνου κεκαυμένη μετὰ συκῆς ἀφεψήματος καταχριομένη, χελιδονίου τοῦ μικροῦ ῥίζα καταπλασθεῖσα, γλήχωνι λεία ὀπτηθεῖσα, ἰτέας φύλλα κεκαυμένα καὶ μετ' ὕδατος ὀπτῶ λασσόμενα, ἄλχουσα ἀναλιφθεῖσα βουτύρῳ, θείου ἄπυρον, μελάνθιον, ζωογάλλα σὺν ὄξει καταχριομένη, ἀμμωνιακὸν σὺν ὄξει ὁμοίως, ἀμύγδαλα πικρὰ σὺν ὄξει ὀπτηθέντα, χαλκῖτις ὠμὴ μετὰ κυπρείνης κηρωτῆς, μελίας φλοιὸς καὶ σὺν ἰσίνῳ ἢ κεδρίᾳ, ἢ προπόλεως ὀπτηθεῖσα ὡς ἔμπλαστρος. B dant: trifolij radix cum aceto imposita, similiter & ruta cum melle & alumine: pix liquida cum æquali portione ceræ, resinæ ac sulphuris ad emplastri formam redacta: marrubij folia cum aceto cocta & imposita, vlmi folia & ramuli eodem modo. malum Punicum cum aceto illitum, scammoniæ liquor ad mellis crassitudinem in aceto coctus & illitus: pariter & allium cum melle, struthij radix cum polenta & aceto loco cataplasmatis impositæ: alumen vstum cum brassicæ succo, aut ipsum liquidum cum melle coctum & inunctum: tithymalli liquor illitus, fæx vini vsta & cum fici decocto adhibita, chelidonij minoris radix impositæ, similiter & rapum contritum, salis folia cremata & ex aqua illita, anchusa butyro excepta, sulphur viuum, melanthium, taurinum gluten cum aceto inunctum, simili modo & ammoniacum cum aceto, amygdalæ amaræ cum aceto impositæ, chalcitis eruda cum cerato cyprino, fraxini cortex vstus cum irino aut cedria, propolis denique ceu emplastrum impositæ. C D E

Ad rectandas lepras.

Moib. σὺν μίλτῳ, vti legitur apud Dioſc. lib. de mat. med. 2. cap. 182. aut σὺν Μαίῃ, quoniam etiã ideo lib. 5. cetera Meles lepras exercendi vim habuit.

CXXX. Ὄνυχας δὲ ἀφίστησι λειοτριοῦ ὀπτηθέντα· ἀσφοδέλου ῥίζα λεία, ἄγρου ῥίζα ὁμοίως, βατράχιον καταπλασθέν, κυνδαλεὶς, ἢ βάτραχος, πιτυοκάμπη ἀναλιφθεῖσα ῥητίνῃ τερμινθίνῃ, ἢ πίσσης ὑγρᾶς μιγείσης· ἢ θαψίας ῥίζα ἑφθὴ σὺν ὄξει, ἢ ἀγρελαίας πυρῆνων τὸ ἐντὸς ἀναλιφθὲν σὺν θείῳ ἄπυρον σὺν κηρῷ καὶ ῥητίνῃ, ὑπολαπάθου ἢ ἀγρίου λαπάθου ῥίζα ὠμὴ καὶ ἑφθὴ σὺν ὄξει, κάρδαμον σὺν ὄξει· κυπαρίσσου σφαγεῖα χλωρὰ καταφθέντα σὺν ὄξει καὶ λεπιδώτα σὺν θέρμοις πυκνοῖς. F G Vngues autem scabros detrahunt hæc imposita: asphodeli radix trita, similiter & ari, ranunculus illitus: cantharis aut bupresti vel pityocampe exempta resina terebinthina, vel admixta pice liquida: thapsiæ radix & sinapi cum aceto, nucleorũ oliuæ: agrestis pars interior exempta adipe, sulphur viuum cum cera & resina: hippolapathi aut lapathi syluestris radix, seu cruda, seu cocta cum aceto: nasturtium cum aceto, cupressi virentes pilulæ decoctæ cum aceto tritæque cum lupinis amaris, lini semen cum nasturtio & melle, pix in

Ad vngues scabros.

καὶ σὺν ἰσίνῳ, ſ. ſ. rina, addit Dioſcor. lib. 2. de mat. med. c. 138

λιπάρμου σὺν καρδάμῳ καὶ μέλιτι, πίσσα

aceto cocta & imposita, pix liquida cum cera, sanderacha, calx viua, fæx vitis cum pice aut visco, alumen ex aqua, arsenicum cum aceto, aut viscum cum calce.

Scabiem tollunt

Scabiem tollunt, nitrum, spuma nitri, fel bubulum cum nitro, terra Melia, cochlea terrestris cremata cum melle, lolij radix sicca trita, glans vnguentaria eodem modo, & succus qui ex ea expelmitur.

A ὁ ὄξει ἐφθεῖσα καὶ ὀπτηθεῖσα, πίσσα ὑγρὰ σὺν κηρῷ, σανδαράχη, ἄσβεστος, ἡ πύξ κεκαυμένη σὺν πίσσῃ ἢ ἰξῷ, ψιμμύθιον σὺν ὕδατι, ἀρσενικὸν σὺν ὄξει, ἢ ἰξὸς σὺν κονίᾳ.

Dioscor. de mat. med. c 132. σὺν ῥητίνῃ, cum resina.

ΚΧΧΧΙ. Σμήγει δὲ φύσεως, νίτρου, ἀφρὸς νίτρου, χολὴ βοεία σὺν νίτρῳ καὶ Κιμωλία, γῆ Μηλία, κοχλίας χερσαῖος κεκαυμένος σὺν μέλιτι· ῥίζα ὀσπρίου λειοτριβηθεῖσα μετὰ λάπαθου ὁμοίως, ἢ τὸ πίεσμα αὐτῆς.

Remedia ad mammarum affectus.

Τῶν κατὰ τοὺς μαθοὺς παθῶν βοηθήματα.

Mammas cohibebis

Mammas cohibebis quominus in magnitudinem excrescant, si herbam Creticam dictam, quam nonnulli Erigeronta vocant, ex frigida contriueris, & mammas illeueris. Probatio autem huius remedij hæc est: Hœdi tenelli cornicula inungito, & non amplius crescent.

C ΚΧΧΧΙΙ. Πρὸς μαθοὺς, ὥστε μὴ γίνεσθαι μεγάλους. Βοτάνην τὴν λεγομένην Κρητικὴν, ἣν τινες καλέουσιν ἐριγέροντα, τρίψας μετὰ ψυχροῦ ὕδατος, καταχεῖν τοὺς μαθούς. Δοκιμασία τοῦ φαρμάκου· ὠτίδιον μικροῦ καταχέαντα τὰ κέρατα, ἢ οὐκ αὔξουσι.

Mammillas virginum sic in statu continuabis.

Mammillarum, in virginibus potissimùm, incrementum inhibent imposita hæc: Cicutæ semen, dum succo plenum est, contritum, supposito prius linteolo. Idem & ipsa herba præstat, eodem modo: alumen liquidum cum melle, epimelidis folia similiter imposita: denique quod è core Naxia exacuendo ferro deteritur, ex aceto illitum.

D ΚΧΧΧΙΙΙ. Μαθοὺς δὲ οὐκ ἐᾷ αὔξεσθαι, τοὺς παρθένων μάλιστα, καὶ παπλάσσειν· κώνειον σπέρμα ἐγχυλόν λεῖον, ὀθονίου παρεμπεθὲν μικροῦ· καὶ ἡ πόα δὲ ὁμοίως· ψιμμύθιον ὑγρὰ σὺν μέλιτι· χωεὶς χαλῆς ὀπιμηλίδος φύλλα καταπλάσσειν ὁμοίως· ἀκόνης Ναξίας τὸ πρὸς αὐτῇ ἀκονηθὲν σιδήρου τὸ ἀπότριμμα, μετ' ὄξους καταχρίειν.

Hæc verba, χωεὶς χαλῆς, lacuna esse videntur Moibanio.

Turgentia mammas reprimunt.

Turgentia lacteque distenta vbera compescunt, lens in aqua marina cocta & more cataplasmatis imposita, menta cum polenta, & vinacea cum sale trito: muria denique pro fomento adhibita.

Lac reprimunt etiam post partum.

Lac extinguunt etiam post partum, farina fabacea, tum per se tum addita polenta imposita: Cimolia cum aceto aut aqua & rosaceo illita: alumen liquidum cum aqua & aceto, addito rosaceo: terræ Samiæ aster, terra Melia eodem modo, lac muliebre cum cicutæ succo impositum, fæx aceti aut vini adhibita cum polenta, similiter & hyoscyami semen cum vino tritum, marinæ aquæ perfusio, cicutæ folia imposita, muriæ fomentum, nuces denique iuglandes impositæ.

E ΚΧΧΧΙΙΙΙ. Ταῖς δὲ ἀναργούσαις τῶν μαθῶν ἀποκαθίστησι, φακὸς ἐφθὴ ἐν θαλάσσῃ καὶ καταπλάσσουσι, πόλυοσμον σὺν ἀλφίτῳ, σίμφυτα μετ' ἀλόης λείου, ἄλμη πεπυρωμένη.

ΚΧΧΧΥ. Σβέννυσι δὲ γάλα καὶ μετὰ τοὺς τόκους, ἄλευρον κυάμινον καθ' ἑαυτὸ ἢ σὺν ἀλφίτῳ καταπλασθέν, Κιμωλία σὺν ὄξει καταχριομένη ἢ ὕδατι καὶ ῥοδίνῳ· ψιμμύθιον ὑγρὰ σὺν ὕδατι, ὄξει, ῥοδίνου μικροῦ, γῆς Σαμίας ἀστὴρ, γῆ Μήλαινα ὁμοίως, γάλα γυναικεῖον μετὰ κωνείου χυλοῦ καταπλάσσουσι, πρὸς ὄζους ἢ οἴνου· μετ' ἀλφίτου καταπλασθεῖσα ὑοσκυάμου σπέρμα μετ' οἴνου· λέπη ὁμοίως θαλάσσια καταπλασθέντα, κωνείου φύλλα καταπλασσόμενα.

Videtur Moibanus legisse ἐφηβολίου Μαλίου

Mammas grumoso lacte turgentes lenimus.

Grumoso lacte turgentes mammas compescunt, furfures in aceto ra, ἄλμη πεπυρωμένη, καρύα βασιλικὰ καταπλασσόμενα.

ΚΧΧΧΥΙ. Τοὺς δὲ χονδριοῦντας μαθοὺς παύει, πίτυρα σὺν ὄξει καὶ πηγάνου

ἀφεψήματι ξηδίνῃ ἢ καταπλασθέντα, ἡδύοσμον σὺν ἀλφίτῳ, ἡμερακάλλος φύλλα καταπλασσόμενα, ἄλμη πυρωθεῖσα, κέρατα βασιλικὰ σὺν μέλιτι ἢ πηγάνῳ, κεφτανος φύλλα λεῖα, κέγχος σὺν γάλακτι καταχριόμενος, κεφαλώγιον καταπλασσόμενον, ἄλθεσι χυάμοις καθ' ἑαυτὰ, ἢ σὺν ἀλφίτῳ· λίθος γεώδης σὺν ὕδατι, λίθος ὀστρακίτης σὺν μέλιτι, κυδώνια ἑφθὰ σὺν μέλιτι καταπλασθέντα· σίλινον καταπλασθέν. ὠφελεῖ δὲ καὶ τὰ τιθηνούμενα μαθούς.

Moibanus ἀλήθειαν legisse videtur.

& rutæ decocto fomentatis & impositi, menta cum polenta, hemerocallis folia imposita; fotus ex muria, nuces iuglandes cum melle & ruta, ricini folia trita, crocus cum lacte illitus, cratæogonum more cataplasmatis impositum, farina fabarum per se & cum polenta, lapis geodes ex aqua, ostracites cum melle, cotonea mala cocta cum melle & in modum cataplasmatis impositi, apium denique pari modo adhibitum.

Lactis congelationem inhibent anethum.

Distentis grumoso lacte mammillis prodest, præterea que lac nutricum in caseum cogi densarive prohibet cera candida, si eius grana decem miliari magnitudine pilularum instar quotidie deglutiantur.

CXXXVII. Οὐκ ἐᾷ δὲ ὅλως τὴν πηγνυμένων γάλα τυρωθῆναι, κηρίον λευκὸν δίκαιον τὸν ἀριθμὸν κεχειραμένον μεγέθη καθ' ἑκάστην ἡμέραν ἅμα καταποτίων διδόμενον.

παχὺ λευκὸν λέγει τὸν ἀριθμὸν καὶ χειρὰ μεγέθη, Moibanus. Aetius certi candidam cerei unciam cui granorū magnitudine defuerat.

CXXXVIII. Καταπαῖ δὲ γάλα πλεῖον, ἱππομαραθρου ἢ μαραθρου ἀφέψημα μὴ οἴνου πινόμενον· κέγχρος, ἐρέβινθος, ὤκιμον, μαλάχη, ἄνηθον, πτισθέντα ῥοφήματι· κιχορίας καρπὸς ὁμοίως· μελάνθιον ὀλίγον πινόμενον ἐφ' ἡμέρας ἡμέρας, ἢ σὺν ῥοφήματι δὲ λαμβανόμενον· ὀνωνίδος ῥίζα σὺν ῥοφήματι ἑψηθεῖσα καὶ λαμβανομένη· γλαυκίου τῆς βοτάνης τοὺς κλάδους ἢ τὰ φύλλα ἢ τὰ αὐτὰ ἑψήσας ἐν ῥοφήματι δίδου· ἁλίμου χυλίσματος ἢ σύγχου, ἢ βουγλώσσου, ἢ θριδακίνης δίδου κυάθους β'. ἢ ὑδρομέλιτος κύαθον ἕνα ἐπὶ ἡμέρας ζ'. ἢ ἀφεψηθέντα δὲ τὰ λάχανα· κυμίνῳ ἀλθίρῳ ἢ λαμβανόμενα, ποιεῖ. πολύγαλον πινόμενον, ἢ τὸ τετραφύλλου πόας τὰ φύλλα ἐσθιόμενα.

Ad eadem lac assumendum remedia.

λάμιον, vel probe corrige Moibanus.

σὺν κυμίνῳ (vel κριθίνῳ, aut forte ἀναμίγνυ) ἀλεύρῳ. Hoc è marrubio auxilium Moibano suspectū est, quia nusquam alibi eius fit mentio.

Lac attrahunt mammis imposita.

CXXXIX. Κάπτα πλασσόμενα δὲ γάλα καταπαῖ σὺν ἀλθίρῳ κριθίνῳ, μάραθρον, μελάνθιον, κεντῶν βεβρεγμένων· σὺν ἁμυράχνῃ κηρὸς ἢ σμύρνα, ἢ στέαρ χηνὸς ἢ ἰσχίον ἢ ἧπαρ μιγνύτα· τοῦ λείας φύλλα, σαύρας χολὴ ἢ ἧπαρ· πλεῖον οἴνου σὺν ὄξει.

χυλὸς, addit Aëtius Tetr. 1 ser. 3. cap. 142. & mox ἢ αἱράχου χυλός. τετραφύλλου, Aët.

σὺν ἁμυράχνῃ, Moibanus. idē enim remedium Plinius & Sextus commendarunt, sed ex aqua.

Mammarum inflammationes mitigant.

CXL. Τὰς δὲ φλεγμονὰς τῶν μαθῶν πτισσηρᾶς, ἀσφοδίλου ῥίζα ἢ τὰ φύλλα σὺν οἴνῳ ἑφθὰ καταπλασσόμενα· βακχάριδος φύλλα καταπλασσόμενα. Γυναικὸς ἐὰν οἱ μαθοὶ ὀγκωθῶσιν, αἰγὸς ἀφόδυμα ξηρὸν ἑψήσας μετ' ὀξέτου κατοξύλιπον, ἢ λύει τὴν φλεγμονήν.

Remedia

Remedia ad teſtium affectus.

Ad tſtis inflammationes. Teſtium autem inflammationibus medentur, fæx vini cum ſale in modum cataplaſmatis impoſita, hyoſcyami ſemen tritum cum vino: Cimolia terra cum aceto & roſaceo ad ſtrigmenti craſſitudinem redacta & illita: after Samius ſimili modo illitus, geodes lapis ex aqua, ciceris farina in mero cocta, aut cicer ipſum coctum cataplaſmatis inſtar impoſitum: ſenecionis flos cum paſſo, & ipſa quoque herba impoſita, necnon & eiuſdem pappi ſimiliter: coriandri folia cum vua paſſa, lilij radix cum hyoſcyami ſolius & farina triticea: fabacea farina cocta in vino cum cumino & vua paſſa aut fauo, aut cerato cyprino: lini ſemen in vino mulſo coctum, melilotus in paſſo coctus, myrti folia cum cerato: vua paſſa alba cum nitro aut ſpuma nitri, ruta cum lauri tenellæ ramulo, ſabinæ folia ex aqua impoſita: ſplanchnon, quod muſcus dicitur, eodem modo, aut etiam muſcus marinus: viticis ſemen cum butyro & ſolius vitigineis, ſambuci folia ſimili modo, aſphodeli denique folia cum radice in vino decocta.

Ad eaſdem inflammationes. Diututinas porro teſtium inflammationes hæc ſoluunt: Aſius lapis appenſus in lana ſicca, althææ radix cocta & cataplaſmatis modo impoſita, eryſimon coctum tritumque, nitrum torrefactum oleo ſolutum, oui oleoſus humor in ſplenio impoſitus, farina hordeacea cum pice liquida. Vtiliter etiam teſtes cypreſſi decocto fouentur.

Ad teſtiũ excreſcentiũ carnoſitates. Teſtium excreſcenti carni medetur cinis ſarmentitius cum nitro & aqua ſubactus & more cataplaſmatis impoſitus.

Variorum tumorum præter naturam, vulnerum vlcerumq; remedia.

Ad furunculos. Furunculos celeriter maturant & rumpunt, hormini ſemen aut folia impoſita cum polenta; narciſſi radix trita cum farina & oleo,

Τῶν κατὰ τοὺς διδύμους παθῶν βοηθήματα.

CXLI. Ταὶς δὲ τῶν διδύμων φλεγμοναὶς ἰᾶται πρὸς οἴνου μέλι ἀλφὶ καταπλασθεῖσα, ὑοσκυάμου χαρπὸς μετ' οἴνου λεῖος. ἢ Κίμωλία σὺν ὄξει καὶ ῥοδίνῳ γλοιώδης καταχρίσμα. ὁμοίως δὲ καὶ Σάμιος καὶ παχρισμὸς, ἢ λίθος γεώδης σὺν ὕδατι, ἢ ἐρεβίνθου ἄλευρον σὺν ἀκεστῷ ἑφθὸν, ἐρεβίνθοι ἑφθοὶ καταπλασσόμενοι, ἠρίγερον τὸ ἄνθος σὺν γλυκεῖ, καὶ ἡ ὅλη καταπλασσομένη, ὡσαύτως ὁμοίως, κορίου φύλλα σὺν σταφίδι, χρίνου ῥίζα σὺν ὑοσκυάμου φύλλοις ἐν ἀλεύρῳ πυρίνῳ, κυάμινοι ἄλευρον ἑφθὸν σὺν οἴνῳ σὺν κυμίνῳ καὶ σταφίδι ἢ κηρίῳ, ἢ κηρωτῇ κυπρίνῃ, ἢ λινόσπερμον σὺν οἰνομέλιτι ἑφθῷ, ἢ μελίλωτον σὺν γλυκεῖ ἑφθὸν, μυρσίνου φύλλα σὺν κηρωτῇ, σταφὶς λευκὴ σὺν νίτρῳ ἢ ἀφρονίτρῳ, πήγανον σὺν χλάδι δάφνης ἀπαλῆς, βεχίου φύλλα σὺν ὕδατι καὶ ἁπλασσόμενα, σολάγχου τὸ καλούμενον βρύον ὁμοίως, ἢ τὸ θαλάσσιον βρύον ἄγριον σπέρμα μετὰ βουτύρου καὶ ἀμπέλου φύλλων, ἀκτῆς φύλλα ὁμοίως, ἀσφοδέλου ῥίζα καὶ φύλλα ἑφθέντα σὺν οἴνῳ.

CXLII. Ταὶς δὲ χρονίας φλεγμοναὶς τῶν διδύμων λύει Ἄσιος λίθος ἐξαπτόμενος σὺν ἐρίῳ ξηρῷ, ἀλθαίας ῥίζα ἑφθὴ καταπλασσομένη, ἐρύσιμον ἑφθὸν λεῖον, νίτρον ὀπτὸν διειλημένον σὺν ἐλαίῳ, ὠοῦ ἔλαιώδης ὑγρὸς ἐπιτιθέμενος σὺν σολλυρίῳ, ἄλευρον κριθῆνον σὺν πίσσῃ ὑγρᾷ. Πυελοῦται δὲ ὠφελίμως κυπρίσσου ἀφεψήμασι.

CXLIII. Ταὶς δὲ σκληρίαις τῶν ὄρχεων τῶν διδύμων τίφρα κεκμηκυῖα σὺν νίτρῳ φυραθεῖσα καὶ ὕδατι ἰᾶται καταπλασσομένη.

Τὰ ποικίλων παρὰ φύσιν ὄγκων, τραυμάτων καὶ ἑλκῶν βοηθήματα.

CXLIIII. Διαλυόμενα δὲ συναπόσεις πηχέως καὶ ῥόας ὀρμίνου σπέρμα, ἢ τὰ φύλλα καταπλασθέντα μετ' ἀλφίτου, ναρκίσσου ῥίζα λεία μετ' ἀλεύρου καὶ ἐλαίου,

D. j.

Dosce. 3. de mat. med. c 126 suo graeco, & sicca ficus, & mentha, cum vua passa, aut adipe sulillo aut pelle.

ἄλλως σὺν ἰσχάσι βοείῳ καὶ σαφίδι, ὀρίγανον σὺν ζύμῃ καὶ ἅλατι, καὶ ἴξος σὺν ῥητίνῃ καὶ κηρῷ ἴσως πεπυκὶς, καρδάμωμον σὺν ἅλμῃ, χαλβάνη καθ' ἑαυτὴν, τερμινθίνη ὁμοίως, λάδδανον ὁμοίως, προπολις ὁμοίως, λεοντοπεδίου ὁμοίως φύλλα σὺν ἀλφίτῳ, λιπόσπερμον σὺν σικύου ἀγρίου ῥίζα, Ἄσιος λίθος σὺν κηρωτῇ, νίτρον ἢ ἀφρὸς νίτρου σὺν ῥητίνῃ ἢ στέατι, συκῆς φύλλα ἢ κεφάλαι ἀπαλαὶ σὺν κηρωτῇ, πυκνοκόμου φύλλα σὺν ἀλφίτοις συλλεκόμενα, ἢ σὺν νίτρῳ· ζύμη μὲθ' ἁλὸς ἢ νίτρου, σαφὶς μεθ' ἁλὸς, θεῖον καὶ πήγανον σὺν κηρωτῇ, ὑοσκυάμου φύλλα μετὰ βουτύρου.

A sal cum seuo bubulo & vua passa, origanum cum fermento & sale, viscum cum resina & cera æquali mensura liquatum, nasturtium cum muria, galbanum per se, similitérque resina terebinthina, ladanum eodem modo, sic & propolis, leontopodij folia cum polenta, lini semen cum cucumeris agrestis radice, lapis Asius cum cerato, nitrum seu spuma nitri cum resina vel adipe, fici folia aut tenelli furculi cum cerato, pycnocomi folia cum polenta contusa, vel cum nitro, fermentum cum sale aut nitro, vua passa cum sale, sulphur & ruta cum cerato, hyoscyami denique folia cum butyro.

Ad inflammationes partis cuiuslibet.

CXLV. Πρὸς ἅπαν τὸ ἀρχὴν φλεγμονῆς πάντας μέρους ἁρμόζει μετ' ἀλφίτου λάπαθον καταπλασσόμενα, ἀείζωον, ἀνδρόσαχη, ἀμπέλου φύλλα καὶ φύλλα, ἃ ὁ ἀπὸ τῆς πλατάνου φασὶν, κύαμον, κεγχρὸν μετ' ἄρτου, καὶ ἰφθὶ μετ' ἀλφίτου· ἴου φύλλα, σρύχνου, καλάμου φύλλα χλωρὰ, κεδρίδες λάπαθον, καὶ ἀσπάραγοι, ἐλξίνη, κύδωνιον, λάπαθον ἄλυσον, κονύζης φύλλα, κολόκυνθα ὠμὴ, κοτυληδὼν, κεφαλώγρου, κυπαρίσσου φύλλα ἢ σφαῖρα χλωρὰ, μανδραγόρου ῥίζα, ξανθίου καρπὸς, πυκνοκόμου φύλλα σὺν ὀξυμέλιτι, ἄλυσον κρίθινον ἢ ζύμιον· ὁ ὀξὺς ἐφθὸς, ἢ κυδωνίου ἀποζέματα· στύγνος καταπλασθεὶς· σπόγγος ἐφθὸς, ἢ πᾶσα, σὺν μήκωνι· ἐρεβίνθου τὰ ἄπαθα φύλλα καταπλασθέντα.

B Incipientibus cuiusuis partis inflammationibus conueniunt hæc trita & cum polenta impositæ: semperuiuum, portulaca, vitium cápreoli & folia, lens palustris, córiandrum, brassica cum pane & cóctus cum polenta, violæ folia, solánum, arundinis folia viridia, cedri fructus contriti, plantago, helxine, menta, lupinorum farina, conyzæ folia, citrurbita cruda, vmbilicus Veneris, cratæogonum, viridia cupressi folia & pilulæ, mandragoræ radix, xanthij fructus, pycnocomi folia cum aceto mulso, farina hordei aut zeæ cocta in aceto aut cydonij decocto, sonchus impositus, alumen scissile omnéque aliud cum melle, ciceris denique tenera folia cataplasmatis instar imposita.

Ad meningis inflammationes.

CXLVI. Τὰς δὲ τοῦ μηνίγγος φλεγμονὰς ἰδίως φιλεῖ ἀκτὶς τῆς φύλλων ὀχυρὸς βεβρεγμένος, βούτυρον παλαιὸν θερμανθὲν σὺν ῥοδίνῳ.

C Meningis inflammationes peculiariter inhibet sambuci foliorum succus illitus, necnon & butyrum recens cum rosaceo impositum.

Ad diuturnas ædematis.

CXLVII. Τὰ δὲ χρόνια οἰδήματα ἰᾶται καταπλασθέντα, ἀκάνθης λευκῆς ῥίζα λεία σὺν ὕδατι, καὶ τῆς Ἀραβικῆς ἀκάνθης τελίνου φύλλα καὶ σπέρμα μετ' ἀλφίτου, ἀπόπατος τράγου ἢ αἰγὸς ὀξῇ θερμῷ, βηχίου φύλλα καθ' ἑαυτὰ, ναρκίσσου ῥίζα λεία μετ' ἀλεύρου καὶ ἐλαίου, παρθενίου φύλλα, δαμασωνίου ὁμοίως, ἀλικακκάβου ῥίζα ἐφθὴ, ἄρου φύλλα σὺν ἀλφίτῳ, ἁρπυλλίδες λάπαθον ἱστίου φύλλα ἀγρίου καὶ ἡμέρου, ἰτέας φύλλα, κα-

D Diuturnis tumoribus seu œdematis hæc medentur more cataplasmatum impositæ: spinæ albæ, seu etiam Arabicæ radix trita ex aqua, apij folia & semen cum polenta, fimus hirci aut capræ cum aceto calente, tussilaginis folia per se, radix narcissi trita cum farina & oleo, parthenij folia similitérque damasonij, halicacabi radix cocta, arú folia cum polenta, iunipeti bacçæ tritæ, isatidis folia tam satiuæ quam syluestris, salicis folia, ca-

lamus aromaticus tritus cum polenta, laur baccę cum polentæ polline, dictamnus cum polenta, rubiæ radices tum coctæ tum etiam crudæ, erysimum cum aqua aut melle, smyrnij radices, fermentum cum sale, viscum cum æquis cerę resinæq; portionibus, fomentum ex aqua marina, nasturtium tritum, hordeacea farina cum polenta, libanotidis radix & folia, lini semen cum melle & seuo caprino, melanthium cum aceto, ciceris radix cocta, stratiotes aquaticus cum thure, tragoriganum cum polenta, fœx vini cum poléta farináve hordeacea aut manna in vino cocta, verbasci folia cocta, psyllij semen tritum, caricæ cum nitro aut calce viua aut iride, quinquefolij radix in vino cocta, scilla tosta, (sed hæc quarto pòst die soluto vinculo remouenda.) cucumeris radix cocta & imposita, muris auricula cum cerato rosaceo, helxine eodem modo, lens denique palustris trita.

Ad parotidas. Parotidas soluunt, butyrum inter initia impositum in lana, lini semen cum melle ac seuo caprino, vrticæ folia cum sale, plantago eodem modo, marrubium nigrum cum adipe suillo vetere & aceto, erysimon ex aqua, fotus ex aqua marina: viscum cum resina & cera, fabarum farina cum fœnigræci farina & melle, lapathi radix in vino cocta, solani folia cum sale, ruta trita cerato rosaceo excepta, sulphur viuum ad eundem modum: resinæ partes duæ, galbani pars vna cum nitro quamplurimo subactæ: pyrethrum cerussáve aut chalcáthum, si cum ficu & vino subigatur: calx viua cum melle, mustelæ quæ viua cremata sit cinis cum cerato irino, noctuæ cerebrum illitum: grossi denique è caprifico in vino decocti, deindéque triti & pro cataplasmate impositi.

Ad tubercula disposita. Tubercula, quæ phymata Græcis dicuntur, discutiuntur impositis hisce: adianto, atriplice, taurino sanguine cum polenta, sambuci radice, similiter & helxines, althææ radice in vino cocta, hyoscyami foliis cum sale tritis, bryoniæ tum albæ tũ nigræ radice cum

A λαμος ἀρωματίτης λεῖος σὺν ἀλφίτῳ, δαφνίδες σὺν πάλῃ ἀλφίτου, δίκταμνον σὺν ἀλφίτῳ, ἐρυθροδάνου ῥίζαι ἑφθαὶ καὶ ὠμαί, ἐρύσιμον σὺν ὕδατι ἢ μέλιτι, σμυρνίου ῥίζαι, ζύμη μετ' ἀλῶν, ἰξὸς σὺν ῥητίνῃ καὶ κηρῷ ἴσοις, πυεία ἢ δι' ὀξαλάσης, καύδαμον λᾶσον, κρίθινον μετ' ἀλφίτου, λιβανωτίδος ῥίζα καὶ φύλλα, λινόσπερμα σὺν μέλιτι B καὶ σταφὶ αἰγείῳ, μελάνθιον σὺν ὄξει, ἐρεβίνθου ῥίζα ἑφθή, στρατιώτης ὁ ἀπὸ τοῦ ὑδάτων σὺν λιβανωτῷ, τραγορίγανον σὺν ἀλφίτῳ, τρὺξ οἴνου μετ' ἀλφίτου ἢ κρίθινον καὶ μόνως ἐν οἴνῳ ἐψηθεῖσα, φλόμου φύλλα ἑφθά, ψυλλίου σπέρμα λᾶον, σῦκα ξηρὰ σὺν νίτρῳ ἢ ἀσβέστῳ, ἢ ἴριδι, σκίλλα ὀπτὴ· δι' ἡμέρας τέτταρας· δι' ἡμέρας τὸν ἑλικτῆρα σικύου ῥίζα ἑφθὴ καὶ κα- Al. δι' ἡμέρας. πλασθεῖσα, μυοσωτὶς μετὰ κηρωτῆς ῥοδίνης, ἑλξίνη ὁμοίως καὶ ὁ ἔνδον τοῦ τιλμάτων φακὸς λᾶος.

CXLVIII. Παρωτίδας δὲ λύει, ἐν ἀρχῇ μὲν βούτυρον ἐν ἐρίῳ ἐπιτεθὲν, λινόσπερμον σὺν μέλιτι καὶ σταφὶ αἰγείῳ, κόνδυος φύλλα σὺν ἁλσὶν, ἀρνόγλωσσον λᾶον D ὁμοίως, βαλλωτὸν σὺν σταφὶ χειρείῳ παλαιῷ μετ' ὄξους, ἐρύσιμον σὺν ὕδατι. πυεία δ' ἐξ ὀξαλάσης· ἰξὸς σὺν ῥητίνῃ καὶ κηρῷ, κυάμειον ἄλθεσι σὺν τηλίνῳ ἀλθίρῳ καὶ μέλιτι, λαπαθοῦ ῥίζα ἐν οἴνῳ ἑφθὴ, στρύχνου φύλλα μετ' ἀλῶν, πήγανον λᾶον ἀναληφθὲν E κηρωτῇ ῥοδίνῃ, θεῖον ἄπυρον ὁμοίως· ἢ ῥητίνης ὁμοίως μέρη β'. χαλβάνης μέρος α', νίτρῳ ὡς ὅτι πλείστῳ συμμαλαχθέντα· ἢ πύρεθρον, ἢ ψιμύθιον, ἢ χάλκανθον σὺν ἀναληφθὲν τῷ οἴνῳ, ἀσβέστου μετὰ μέλιτος, γαλῆς ζώσης κατέσης τέφρα μετὰ κηρωτῆς ἐλαίνης, γλαυκὸς τοῦ ὀρείου ἐγκέφαλος καταχειόμενος· ὀλισθοὶ δὲ ἀπὸ αἰγείας συκῆς ἑφθέντες, ἧπαρ ὀπτὸν ἐν οἴνῳ, λᾶοι καταπλασθέντες.

CXLIX. Διαφορὰς δὲ φύματα καταπλασθέντα, δίαστον, ἀπάφαξις, θύμου ἄμμα σὺν ἀλφίτῳ, ἀκτῆς ῥίζα, ἑλξίνης ὁμοίως, ἀλθαίας ῥίζα ἐν οἴνῳ ἑψηθεῖσα, ὑοσκυάμου φύλλα σὺν ἁλὶ λᾶα, βρυωνίας ῥίζα λευκῆς καὶ μελαίνης μετ'

πάλης ἀλφίτου, σικύου ἀγρίου ῥίζα ὁμοίως, ἀμμωνιακὸν μετὰ μέλιτος μαλαχθὲν ἐν ὄξει τρυῒνῳ, ἀσπάραγος βοὸς ἐν ὄξει θερμῷ θλιβεὶς ἐν ὄξει θλιβείς, ἀρύγγλωσσον μετ' ἀλῶν λείων, ἀσφοδέλου ῥίζα ἢ τὰ φύλλα ἑφθὰ ἐν οἴνου τρυγὶ, θύμος ἢ θρύμμα μετὰ πάλης ἀλφίτου, Κιμωλία μετ' ὄξους ὀπτὴ χειρομάκτρῳ, ἠρυγγίου ῥίζα καταπλασσομένη, ἢ ἰξὸς σὺν ῥητίνῃ καὶ κηρῷ, ἰτέας τὰ φύλλα ἀναληφθέντα κηρωτῇ, κονύζης φύλλα, σιλφίου ῥίζα σὺν κηρωτῇ, σκαμμωνίου ὑπὸς σὺν μέλιτι, στρουθίου ῥίζα λεία σὺν ἀλθίρῳ χριθίνῳ ἐφθῷ, τέρμινθος σὺν μαίῃ· τέρμινθος παλαιὸν, πλυθὲν οἴνῳ, καὶ ἀναληφθὲν τίφρᾳ ἢ ἀσβέστῳ· συκαμίνου ὑπὸς μετὰ κηρωτῆς, θέρμινοι ἄλθεσι καταπλασθέντες εἰς μέλι ζέον ἀσβέστου μεγίστης ἐπιθέμενον κεφάλῳ μετὰ ἀλφίτου, κισσηρίου σφαγεῖα μετὰ ὠοῦ κεπέντα.

Διόσκορος Μοιβαστ.

Ἀλλοσμίνθη

C L. Ἐκπίπτη φύματα, ἀδέφινον ἐφθὸν σὺν ὠμῇ λόσῃ, ἄγρου σπέρμα ὁμοίως, σῦκα ξηρὰ μετὰ νίτρου, καὶ σῦκον ἐφθὸν μόνον ἐσθίειν ὁμοίως. Ἐν πόσει καὶ ζέσει, λινόσπερμον, ἄγριον, καὶ σὺν σκίσει κύπρου ἐφθὸν πίνειν καὶ νίτρῳ· λινόσπερμον μετὰ ὀξυμέλιτος ἐφθὸν· ζύμη μετὰ πίσσης καὶ ἐλαίου, καὶ ὕδατος ἢ ὄξους ἐφθὸν ἐπιτίθεσθαι· ζύμη μετὰ ἁλῶν, θέρμοι δὲ ὀξὺ ἑφθοὶ καταπλασθέντες· χαλκάνθῳ καθ' ἑαυτὸ, λινόσπερμον μετὰ θείου καὶ ἴριος· Ἄσιος λίθος σὺν κηρωτῇ, ἢ ὀξυμελίτῃ ἢ ὑποσώπια.

Θέρμοι ἀλευρον &c. Moib.

Ἀσιμελίτη ἢ καὶ ὑποσώπια. Moib.

C L I. Ῥήγματα δὲ φύματα θηλείας χυλὸς μετὰ θείου καταχριόμενος, ναρκίσσου ῥίζα σὺν μέλιτι καὶ αἰγείῳ ἀλθίρῳ καταπλασθεῖσα, τερέβινθος, θέρμοι μετὰ ὄξους ἑφθοὶ καταπλασθέντες, σικύου ἀγρίου ῥίζα ἀναληφθεῖσα ῥητίνῃ τερμινθίνῃ, κάππαρις ῥίζα ὁμοίως, νίτρον μετὰ ζύμης ἢ σύκου, ἅλες ὁμοίως, χαλκάνθου εἰς ἀναληφθεῖσα ῥητίνῃ.

C L I I. Ταῖς δὲ ἔντος ἀποστάσεις ῥήγνυσι θάλασσα πολῖται μετὰ μόσχου.

C L I I I. Καὶ σκληρίας μαλάσσει λίθος πυρίτης κεκαυμένος ἀναληφθεὶς ῥητίνῃ τερεβινθίνῃ, ἢ διφρυγὲς ὁμοίως, Ἄσιος λίθος ὁμοίως, λύκιον ὁμοίως, μόρου τὸ ξύλον χυλὸς, ἐξικπάται δὲ ἰχμυρὸς ἡ ῥίζα, καὶ τῇ ὑσπαφῇ

A polline polentæ, cucumeris agreſtis radice eodem modo, ammoniaco cum melle ſubacto fimo bubulo in aceto calfacto, plantagine cum ſale trito, aſphodeli radice foliiſve in vini fæce coctis, thymo vel thymbra cum polentæ polline, Cimolia terra cum aceto illita, eryngij radice appoſita, aut viſco B cum reſina & cera, ſalicis foliis ceraro exceptis, conyzæ folus, laſerpitij radice cum cerato, ſcammoniæ liquore cum melle, ſtruthij radice trita & cum farina hordeacea cocta, ſeuo taurino cum manna, ſuillo adipe antiquo, vino eloto & cum cinere aut calce viua ſubacto: moti liquore cum cerato: lupinorum farina cum feruenti melle in C cataplaſmatis formam tedacta, addita etiam calce viua: braſſica cruda cum polenta, cupreſſi denique pilulis cum ouo tuſis.

Ad eadem vtil coquenda ſem naturanda.

Tubercula cõcoquunt: abrotonũ cũ hordeacea farina, hydrelæo ſoluta, coctũ, viticis ſemen eodẽ modo, caricæ cum nitro, eædẽ in aqua D mulſa coctæ: tritici, zeæ, lolij ac ſeminis lini farinæ cum fimo columbino & nitro coctæ: lini ſemẽ cum vino mulſo coctum: pollen cum pice, oleo & aqua aut aceto coctus: fermentum cum ſale, lupini in aceto cocti & impoſiti, galbanum per ſe, lini ſemen cum ſulphure & iride: lapis denique Aſius cum cerato, qui quidem hypopya etiam E exiccat.

Ad eadem vtilia ponda.

Tubercula verò rumpunt thapſiæ ſuccus cum ſulphure illitus, narciſſi radix cum melle farináque loliacea impoſita, propolis, lupini in aceto cocti & more cataplaſmatis impoſiti, cucumeris agreſtis radix excepta reſina terebinthina, F capparis radix eodem modo, nitrum cum fermento aut ficubus, ſimiliter & ſal: cantharis denique cum reſina ſubacta.

Ad rumpenda interna abſceſſus.

Internos autem abſceſſus rumpit, aqua marina cum mulſa epota.

Duritias emolliunt: pyrites lapis Duritias emol lientia. G uſtus: reſina terebinthina exceptus: diphryges eodem modo, ſic & lapis Aſius, itémque lyci um: moti arboris liquor, qui quidem alius incuſa radice poſtridiè con-

eretus reperitur: gladioli radix cũ aceto mulso, onobrychis imposita, fotus ex aceto calente, spongia aceto madens, (sed huius potissimùm est vsus in apostematis à sanguine.) origanum cum melle: similiter & polij radix, pix liquida liquata cum cera, platani cortex coctus, itidémque folia: resina terebinthina cum adipe, sesamoidis semen, verbasci folia, quinquefolij radix: carica denique pinguis cocta in aqua marina & contrita.

Strumas discutiunt: calx viua excepta melle, aut strigmento, oleóve aut axungia, & imposita: bitumen cum strigmento, fimus caprinus in aceto aut vino coctus, calénsque similiter impositus: plantago cum sale imposita, pariter & adiantum, althæa in vino cocta: hordei farina in vrina pueri Venerem haud experti macerata, exceptáque pice, oleo & cera liquatis: lolij farina cum stercore columbino liníque semine in vino cocta: similiter & mandragoræ radix, necnon & apiastrum cum sale. Collo linum circumligato, quo præligata vipera pependerit, donec exanimata fuerit. Dissipat & strumas ammoniacum vino dilutum & impositum: ballote, quam nonnulli marrubium nigrum nominant, cum sale: simili modo & aparine, itémque helxine, vngulæ bubulæ asininæ aut equinæ vstæ, & cum oleo subactę, testa fornacum cerato excepta. Similiter quinquefolij radix trita cum thure & exiguo sale, piper cum pice, laserpitij radix cum cerato, scilla tosta cum cerato, sed quarto pòst die resoluenda. Grossi tam syluestres quàm domestici cocti, triti & impositi, etiam qualencunque collectionem dissipant: styrax remollitus atque impositus, aparine cum axungia, iris cocta & imposita, erysimum cum aqua aut melle, vipera cocta in cibis sumpta, fotus ex aqua marina, lupini cocti tritique, viscum cum resina & cera, capparis radix foliaq; virentia trita cũ polline polentæ, cancri fluuiatiles cremati cũ melle, coriandri folia cũ faba fresa: fabarũ Græcarũ cortices cũ alumine scissili, oleo & polentæ polline: agrestis lapathi

Strumas discutiunt.

Scissili, etiã.

A διείρηκε πρὸς ὀπίσω. ξιφίου ῥίζα σὺν ἐξυμέλιτι, ὀνόβρυχος καταπλασθεὶς, ὄξος θερμὸν καταμυλούμενον, σπογγος ὄξει διερὸς μάλιστα ὅτι τῷ αἵματι ἀποσημαίνων, ὀ- ἀείρων
εἴχανον σὺν μέλιτι, πολίου ῥίζα ὁμοίως, πίσσα ὑγρὰ σὺν κηρῷ τακεῖσα, πλατάνου φλοιὸς ἐφθὸς καὶ τὰ φύλλα, ῥιπίνη τερμι-
B θίνη σὺν ῥητίνῃ. σησαμοειδὲς, φλόμου, πτε- σησαμοειδὲς σπέρμα, φλόμου φύλλα, Matth.
ριφύλλου ῥίζα. σῦκα ξηρὰ λιπαρὰ, ὀξυ θαλάσσιον ἐφθὸν, λῆδον.

CLIIII. Χοιρεάδας ἀφαιρεῖ ἄσβεστος μίλτῳ ἢ γλοιῷ ἁλισθεῖσα, ἢ ἐλαίῳ, ἢ ἀξουγγίῳ, καὶ ὑποτιθεῖσα. ἄσφαλτος μετὰ γλοιοῦ, ἀπίου τὰ φύλλα ὀξυ ἢ οἴνῳ
C ἐφθεῖσα θερμὰ ὑποτιθεμένη ὁμοίως, ἀρτέμισιον μετὰ ἁλὸς καταπλασσόμενον, ἀδίαντον ὁμοίως, ἀλθαία ἐν οἴνῳ ἑφθή. χρίθινον ἄλευρον ἐν πίσσῃ καὶ οὔρῳ παιδὸς ἀφθέγγου καὶ ἐλαίῳ καὶ κηρῷ ἐφαρμόττα· αἶγειον ἄλευρον μετ' ὄξους ἐξυσμένης, καὶ λινόσπερμον ἐν οἴνῳ ἐφθόν· μανδραγόρου
D ῥίζα ὁμοίως, μελιλωτόφυλλον σὺν ἁλσίν. ἔχει ἀποδήσας λίνῳ χρίμασιν, ὅπως ἀποθλίβῃ· εἶτα λύσας τὸν λίνον ἐκβάλλου τὸν θαλλόν. ἄμμωνιακὸν οἴνῳ διεθὲν καὶ ὑποτεθὲν· βαλλωτὴ, ἥτινες μέλαν ἐρυθρὸν καλοῦσι, σὺν ἁλσίν. ἀπαρίνη ὁμοίως, ἑλξίνη ὁμοίως· ὄνυχες βοὸς, ὄνου ἢ
E ἵππου κεκαυμένοι, ἐλαίῳ φυραθέντες· ὑστρακίνη ἵππου κηρωτῇ αἰθαλωθεὶς, πτερὶς φύλλου ῥίζα ὁμοίως λεία σὺν λιβανωτῷ καὶ ἁλσὶν ὀλίγοις, πίσσει σὺν πίσῃ, σιλφίου ῥίζα σὺν κηρωτῇ, σκίλλα ὀπτὴ σὺν κηρωτῇ ἡμέρᾳ τετάρτῃ διαλύει. ὄλισθοι ἄγχουσι καὶ ἥμυσι ἐφθοὶ λῆδοι καταπλασσόμενοι, καὶ
F πᾶσαν συστροφὴν διαφορεῖσι. σύριγξ μαλακτικὴ καὶ ὑποτιθεῖσα, ἀπαρίνη μετ' ἐξυγγίου, ἶρις ἐφθὴ καταπλασθεῖσα, ἐρύσιμον σὺν ὕδατι ἢ μέλιτι, ἰχθὺς ἐφθὸς ἐσθιόμενος, πυεία διὰ θαλάσσης, λύπιοι ἐφθοὶ λῆδοι, ἰξὸς σὺν ῥητίνῃ καὶ κηρῷ, κισσοῦ πέρας ῥίζα
G καὶ τὰ φύλλα χλωρὰ λῆδα σὺν πάλῃ ἁλφίτου, καρύου πέπλυται κεκαυμένοι σὺν μέλιτι, κοκκύμηλα φύλλα σὺν ἐρεμίῳ, κυάμων Ἑλληνικῶν λέπυρα μετὰ χαλκοῦ καὶ ἐλαίου καὶ πάλης ἁλφίτου, λαπάθου ἀγρίου

Paul. lib. 4. cap. 33. ἐγχίθινον, hoc est, cum farina: coque loco remedium hoc clarius propo-

ρίζα μετ' οἴνου ἑφθή, λιβανωτίδος φύλλα, λινόσπερμον μετὰ νίτρου, ἢ ἁλὸς, ἢ κονίας· λίθος πυρίτης κεκαυμένος καὶ ληφθεὶς ῥητίνη τερμινθίνη, Ἄσιος λίθος ὁμοίως, φακὸς ἐν ὄξει ἑφθείς. καταχείονται δὲ ὠφελίμως χοιράδες καὶ ἄμυγδαλαὶ. Ἄλλο. Γ' ἐς χοιράδας καὶ παρωτίδας καὶ σκληρίας πάσας. ὑ

λίτρου vel μετὰ legendum videtur. Moib.

λῃ ὄξους εἰργασμένη ῥ'. α'. ῥητίνης φρυκτῆς ῥ. α'. κηροῦ πυρροῦ ῥ'. α'. χαλβάνης ϛ. γ'. τῆξον ὁμοῦ πρῶτα, καὶ μαλάξας χρῶ. Ἄλλο. Κρόμβης φύλλα μετὰ χοιρείου στέατος κόψας, ὥστε γλυφθῆναι ὡς μύελον, καὶ εἰς ῥάκος λινοῦν ἐμπλάσσων ὑπὸ τὸ πάθος.

κατατίνους

Ἰτέας φλοιὸν καύσας, καὶ πλὴν τέφραν κοσμήσας, καὶ μετ' ὕδατος φυράσας, καὶ ποιήσας κολλούριον, ὑπόθες ὑπὸ τῆς κορυφῆς τῷ πάθει, ἐπ' ὀπὶ πυτίσῃ, ὑπόθες λινόσπερμον πεφρυγμένον καὶ κεκοπτομένον.

Gesnerus lilium convallium hic describi autumat.

Ἄλλο δόκιμον. Χαμαικέρασος πόα ἐστὶ μικρὰ, φυομένη ἔνθα τὰ βλήχωνα γίνεται, καὶ κατ' ὀπὸν ὅτε καὶ ὁ καρπὸς τοῦ δένδρου. καρποὶ δὲ ποιεῖ β ἢ γ' ὁμοίους κερασίῳ.

Λιβάνωτις

κρόμβη

Ψωρίας &c.

ὀδώδη δὲ λίαν ὥσπερ μύρον. ταύτης δίσμη, ἄλφι γ'. ῥιζῶν, φύλλων, καὶ καρπὸς, σὺν οἴνῳ ἔνομμα καὶ ἀποτετυμμένα, ἀπαράβατον ἐστί.

CLV. Πεῤῥιαπτέον δὲ πρὸς χοιράδας, ἀγριολώπου ῥίζα τῇ ἀριστερᾷ χειρὶ λαμβανομένη καὶ συνδεσμουμένη κυνὸς λαπάθου ἀγρίου ῥίζα ὁμοίως· ἀσφοδέλου ῥίζα ὁμοίως, ἠρυγίου ῥίζα. προσλεγέτω δὲ εἰς ὃν λαμβάνεται, ἀφ' ἑσπέρας, καὶ σιλλούρου ἀπὸ ὀκτωκαιδεκάτης ἕως ἑπτακαιδεκάτου, καὶ ὅτε θεραπεύῃ.

CLVI. Μελικηρίδας δὲ διαφορᾷ μυελίνῳ καταπλασσόμενον σὺν ἀλεύρῳ τηλίνῳ ἢ πτισάνῃ, λαπάθου ἀγρίου ῥίζα λεία καὶ τὰ φύλλα, ἀγριολώπου φύλλα ὁμοίως.

CLVII. Σπατώματα δὲ διαφορᾷ, βουφθάλμου ἄνθη λεῖα σὺν κηρωτῇ, κυκλάμινος λεία καταπλασσομένη.

CLVIII. Βρογχοκήλας δὲ διαφορᾷ, βδέλλιον σὺν ἁλὶ τῷ πάσχοντος νηστικοῦ μαλαχθὲν καὶ ὑποτεθὲν· ἄσβεστος μετ' ἀξυγίου διαφορᾷ, ἢ σαύρα προσβληθεῖσα τῇ βρογ-

A radix cum vino cocta, libanotidis folia, lini semen cum nitro aut sale aut lixiuio, pyrites lapis vstus & resina terebinthina exceptus: Alius lapis eodem modo: lens denique in aceto cocta. Sed & vtiliter strumæ sanguine mustelæ perunguntur. Aliud: Ad strumas, parotidas & duritiam quamuis valet quod præparatur medicamentum, ex aceti, resinæ frixæ, ceræ suluæ an. lib. 1. galbani vnc. iij. omnibus simul liquatis & in malagma redactis, vtitor. Aliud: Brassicæ folia cum adipe suillo tundito, vsquedum euadat mixtura medullæ. similis: quam panno lineo inductam instar emplastri adhibe loco affecto. Aliud: Cinerem è cremato salicis cortice cribratum cum aqua subigito, formatóque collyrium, quod summæ parti affectæ impones: hanc vbi perfoderit, lini semen frixum pistillóque tusum adhibeto. Aliud probatum: Chamæcerasus herbula est quæ inter filices nascitur, ac eodem tempore quo & fructus cerasi arboris. Fructus duos tréve producit cerasio simules, éstque perquàm odorata moschi instar. Huius manipulus è radicibus tribus, foliis ac fructu in vino coquitur ad tertias, estq; certissimum exploratissimúmque remedium.

Ad strumas amuleti ratione alligantur: plantaginis radix sinistra manu eruta & pelli illigata, lapathi agrestis radix eodem modo, vti & asphodeli radix, itémque eryngij. Pronuntiato verò prius eiusce nomine, cuius gratia exquiritur, erui debet sub vesperum, à vicesima octaua luna vsque ad tricesimam, itáque adalligari.

Ad strumas amuleti.

Meliceridas autẽ discutiunt: melilotus impositus cum farina fœnigræci aut tritici, lapathi agrestis radix foliáque trita, similitérque folia plantaginis.

Ad melicerides.

At steatomata discutiunt, buphthalmi flores triti cum cerato, & cyclaminus trita & pro cataplasmate imposita.

Ad steatomata.

Bronchocelas hæc dissipãt: bdellium laborantis ieiuni saliua emollitum & impositum, calx viua cum axungia, lacerta bronchocelæ ad-

Ad bronchoceles.

mota, aut mantis, quæ Indicæ locustæ similis est: suspendatur verò posteà in eo quo æger decumbit loco.

Ad polypus. Polypos priùs exulceratos excedit dracontij radix illita, itémque succus eiusdem munctus. Sic & saluia imposita: cupressi pilulæ tusæ & carne ficus exceptæ, tum impositæ, tum etiam inditæ: laserpitij liquor cum ærugine aut chalcantho. Caninum denique stercus album cum aceto tritum & inunctum, aut etiam infusum, eximiè confert.

Ad ozænas. Ozænas mitigant: aristolochiæ radix cum cyperide, hederaceorum corymborum succus infusus, qui putrida etiam vlcera expurgat: cinnamomum cum veratro albo & struthio, id quod simul etiam sternutatorium est: similiter & veratrum cum cardamomo. Sternutatorium diebus adhibeto x: pòst Polyidæ dicta sphragide oblinito, donec vlcera maturentur: aut calaminthæ succum infundito, aut aridam ipsam tritam insufflato per fistulam: aut ranunculi succo & alumine, aceto addito, inungito: aut chalcantho vel psorico cum melle.

Ad vlcera in naribus carnósque ibidem excrescentes. Vlceribus narium conferunt: amurca olei cocta & illita, lycium simili modo, Indicum vino solutum & illitum, sandaracha cum rosaceo ad strigmenti crassitiem redacta: argenti spumæ, thuris, aluminis scissilis & cerussæ pares portiones cum vino & rosaceo. Carnes verò in naribus excrescentes reprimunt minuúntque admota: arsenicum, sandaracha, radix aspalathi trita, laserpitij liquor cum ouo, chalcanthum denique vstum cum vino ad visci crassitudinem redactum.

Ad vulnera recentia & sinus. Vulnera recentia hiantiáque, necnon & sinus glutinant hæc trita & imposita: semperuiuum, lonchitis, chamæpitys, Heraclea, saluia, vitium capreoli, anagallis, androsæmon, plantago, tubi folia, aloë ex aceto cum linamentis aut per se, amurca cocta linamentis excepta, althææ radix in vino cocta, oleæ agrestis folia cum melle, sambuci folia trita, aristolochiæ radix cum aceto, glycyrrhiza

A χεκίλη, ἢ μέλιτι. ἔστι δ' ὅμοιος ἀκρίδι Ἰνδικῇ. εἶτα κρεμαθεῖσα ἐν ᾧ κοιμᾶται τόπῳ.

CLIX. Πολύποις ἢ ἐξεσθιόντι σκληρωθέντας, δρακοντίου ῥίζα καταχεισθεῖσα, ἢ ὁ χυλὸς αὐτῆς ἀμαξιόμυθος, ἐλελίσφακον καταπλασσόμενον· κυπαρίσσου σφαιρία κοπέντα, καὶ σύκου σαρκὶ αἰμαλοφθέντα, καὶ καταπλασσόμενα, ἢ σκῶλημα· ὀπὸς σιλφίου μετ' ἰοῦ, ἢ χαλκάνθου. κυνέα λευκὴ ὀξεῖ λεπτοτριφθεῖσα ἢ ἀμαξιόμυθον, ἢ ἐξυμαπτόμενον ποιεῖ ἀκρίδας. *Nouus nonus.*

CLX. Ὀζαίνας σκεύει, ἀριστολοχίας ῥίζα σὺν κυπείρῳ, κισσοῦ κορύμβων χυλὸς ἐγκλυζόμενος, ἢ ἐπὶ σπιδόνας ἐγκαθαιρόμενος. κινάμωμον μετ' ἐλλεβόρου λευκοῦ καὶ στρουθίου, αἵματι τραγείῳ σκευασάμενον ἐλλέβορος μετὰ καρδαμώμου ὁμοίως. Γ πταρμικὸν ὅτι ἡμέρας. ι'. σκεύασμα. εἶτα τῇ Πολυείδου λεγομένῃ σφραγῖδι ἀλείφειν, ἄχρις οὗ πεπανθῶσιν. ἢ καλαμίνθης χυλὸν ἐγχρίμπτειν, ἢ ξηρὰν καλαμίνθην λείαν ἐμφύσα διὰ σιφωνος, ἢ βατραχίου χολῇ σὺν φυσηλείᾳ ἀλείφειν μετ' ὄξους ἢ χαλκάνθῳ, ἢ ψωρικῷ μετὰ μέλιτος. *Gelenius. Mendosa. Medendum. Item remedium inter Archigenica legitur apud Gal. 3. καπνί. quo loco habetur κύφωμα, hoc est, nasturtium, pro cardamomo.*

CLXI. Γρὸς δὲ τὰ ἐν μυκτῆρσιν ἕλκη ποιεῖ, ἀμόργη ἐλαίου ἐφθὴ διὰ σιφωνομένη, λύκιον ὁμοίως, ἢ τὸ Ἰνδικὸν οἴνῳ ἀνεθὲν ἢ διαξεόμενον, σμύρναν σὺν ῥοδίνῳ γλοιοποιηθεῖσα. Λιθάργυρος, λεπιδωτὸς, ψιμύθιον, ἴσα σὺν οἴνῳ ἢ ῥοδίνῳ. Τὰ δὲ ἐν αὐτοῖς σαρκώματα σίλλει καὶ ἐλαφροῖ προσαγόμενα, ἀρσενικὸν καὶ σμύρνα σὺν, ἢ ἄσπαλαθου ῥίζα λεία, ὀπὸς σιλφίου μετ' ὠοῦ, χάλκανθον κεκαυμένον μετ' οἴνου γλοιώδη.

CLXII. Τραύματα δὲ προσφάτα ἢ ἀφεστῶτα κολλᾷ ἢ κάλπους καταπλασσόμενα λεῖα, ἀείζωον, λονχῖτις, χαμαιπίτυς, ἡράκλεια, ἐλελίσφακος, ἴλιξ ἀμπέλου, ἀναγαλλὶς, αἰδρόσαιμον, ἀρνόγλωσσον, βάτου φύλλα· ἀλόη σὺν ὄξει μετὰ μοτῶν, καὶ καθ' ἑαυτό. ἀμόργη ἐψωμένη μετὰ μίστων, ἀλθαίας ῥίζα σὺν οἴνῳ ἑψηθεῖσα, ἀγελαίας· σὺν μέλιτι, ἀκτῆς φύλλα λεῖα, σαμβύκου φύλλα λεῖα, ἀριστολοχίας ῥίζα σὺν ὄξει, γλυκύῤῥιζα *φύλλα addit Mōllerus.*

προσφατος κοπεισα και καταπλασθεισα, A recens contusa & imposita, aut in
ἡ ἐφθεισα ἐν ὕδατι· ἐλαφοβόσκου ῥίζα aqua cocta: elaphoboſci radix trita, myrrha ex aqua illita, itémque
λεία· σμύρνα σὺν ὕδατι καταχριθεισα ſicca inſperſa: thus eodem modo,
Moibanus, Καταπλασθεισα. ἐπὶ καταπλασματος ξηρά· λίβανος ὁμοίως, ſmyrnij radix pro cataplaſmate
σμυρνίου ῥίζα καταπλασσομένη, ἡ ληθη impoſita, ſenecionis radix cum a-
ceto, ferrugo cum myrrha diutiùs
in ſole trita, equiſeti folia trita, iſatidis tum ſatiuæ tum ſylueſtris fo-
B lia, centaurij maioris è radice ſuccus, centaurij minoris folia viridia
trita, conyzæ folia. Terreſtres lumbrici etiam præciſos neruos glutinant, ſi triti imponantur: cyclaminus cum aceto & melle, cupreſſi folia trita, libanotidis folia viridia, Lyſimachia herba, milleſolium impoſitum, orcheos Serapiadis radix, folia quinquefolij cum melle, C columbæ denique ſanguis.

Ad vulnera verò ſuperficiaria valent, polycnemon tritum, humor qui intra folliculos vlmi reperitur, quin & vlmi cortex faſcię loco vulneribus ſuperilligatus, (ſunt enim illi tenues tunicæ φιλυρῶν inſtar) ea glutinat & ab inflammatione vindicat: ilicis contritæ ſuccus, rha tritum cum vino, ſymphytum tritum, allia vſta & impoſita. Sed præ cæteris anchuſa impoſita, neruorum præſectiones recentiáque vulnera mirabiliter agglutinat.

Ad vulnera ſuperficiaria.

Ad colli veſicæ, neruorum ac meningum diuiſiones, earundémque partium inflammationes conuenit, butyrum impoſitum in linamento. Sed poſt calculoſorum inciſionem muriam acidam quam primùm affundere oportet.

Ad veſicæ colli, neruorũ ac meningũ diſſectiones.

Neruorum autem vulnera tuentur ab inflammatione impoſita hæc: granum tinctile tritum cum aceto & melle, cratægonum contritum, lilij radix in vino cocta tritáque, narciſſi itidem radix eodem modo: laſerpitij liquor cum aliquo calfacientium decoctorum impoſitus: neuradis, quam & poterium vocant, radix: anchuſa denique cataplaſmatis more impoſita.

Ad neruorum vulnera ab inflammatione vindicanda.

Oſſa infracta extrahunt ac remouent, inditi pulueres radicis panacis & ariſtolochiæ, itémq; bryoniæ ſeu albæ, ſeu etiam nigræ, necnon & iridis, erui quoque farina, fici folia tenellique ramuli cum

Ad extrahenda oſſa.

σέλινα hic inſerit Moibanus.

φλεγμονὴν ὑπὸ μέλιτος, verbenacæ ſimiliter, mauult Moibanus.

CLXIII. Γεγὸς δὲ καὶ ὑπὸ πέλαγα τραύματα, πολύκνημον λεῖον, τὸ ἐν τῇς φυλακίνης τῆς πτελέας ὑγρόν. καὶ ὁ φλοιὸς δὲ αὐτῆς ὑπὸ διόμβος, (ἔστι γὰρ ὡς φίλυρα,) κολλᾷ, καὶ ἀφλέγμαντα ποιῇ. πρίνου χυλὸς λεῖος, ῥᾳ̃ λεῖον σὺν οἴνῳ, σύμφυτον λεῖον, σὺν ὀδὰξ καὶ ἕπτα καὶ καταπλασσόμενα. Γαργαδόξους δὲ καὶ ἀφαιρεσεις τῶν νεύρων ἐν τοῖς προσφατα τραύματα τῶν μυῶν κολλᾷ, ἄλγουσα καταπλασθεῖσα.

Pro his Moibanus reſtituit: ἐν ᾗ καὶ τὰ φύλλα, inſuperq; folia.

λεῖος videtur abundare.

Suſpicatur Moibanus reponendum καὶ ἀφαιρέσεις, &c.

CLXIIII. Πρὸς δὲ τοὺς τῆς παχείλου τῆς κύστεως διαιρέσεις, καὶ νεύρων καὶ μηνίγγων, καὶ τοὺς φλεγμονὰς, ἁρμόζει βούτυρον ὑπὸ πθέμενον ἐν μοτῷ. ὑπὸ δὲ τὴν λιθοτομιὰν δεῖ ὀξάλμη τῶν ἀχρῆτα καταπλάσσειν.

E

CLXV. Τοὺς δὲ κατὰ νεύρων τρώσεις ἀφλεγμάντους τηρεῖ καταπλασσόμενα, κόκκος βαφικὴ λεία σὺν ὄξει καὶ μύρτῳ, κραπιόμενον λεῖον, κρίνου ῥίζα ἑφθὴ ἐν οἴνῳ λεαθεῖσα, ἢ ναρδὴ ὁμοίως, ὁπὸς σιλφίου μετά τινος τῶν θερμαντικῶν ἀποζεμάτων ὑπὸ πθέμενος, νευρὰς δος· ἰὼ δὲ ποτήριον καλοῦσι, ῥίζα· ἄλγουσα καταπλασθεῖσα.

νάρδινον, Moib.

F

CLXVI. Ἀναγὰ δὲ ὀστέα καὶ ἀφίξιν πολύακος ῥίζα ξηρὰ ὑπὸ πθεμένη, καὶ ἀριστολοχίας ὁμοίως, βρυωνίας λευκῆς ἢ μελαίνης ῥίζα ὁμοίως, ἴρεως ξηρᾶ, ὀφθαλμὸν ἄλευρον συκῆς φύλλα καὶ κράδας ἁπαλὰς, σὺν

G

agrestis papaueris foliis impositi, lini semen cum aniso, iris cum chalcantho & centauno, peucedani radix, chalcanthum cum hyoscyami semine; chamæleon niger.

Ad extrahendas spicula & aculeos.

Infixa corpori spicula & aculeos extrahunt hæc cataplasmatum instar imposita: hormini folia & semen cum polenta, gladioli radix cum aqua, aut etiam ipsa per se, vel cum thure ac vino: iridis radix, leontopetali semen & folia cum polenta, ammoniacum cum melle; orchis herba imposita; similiter & anagallis, itémque aristolochiæ radix: arundinis phragmitis radix; & grandioris folia trita: cochleæ cum sua carne, narcissi radix aut bulbus cum melle, sinapi cum fermento, acutæ spinæ radix: dictamnum, cuius quidem pastu aiunt etiam in Creta capras tela quibus ictæ sunt excutere: propolis imposita, pycnocomi semen tritum, lacertæ caput tritum, siluri salsi caro; hinnuli coagulum, tragium denique in potu sumptum.

Ad erysipelata.

Erysipelata sanant illita hæc, admixtis aceto & rosaceo: cerussa, argenti spuma, terra Cimolia, vel Chia, vel Selinusia. Additur autem succus plantaginis, aut intybi, aut polygoni, aut oleæ agrestis, aut portulacæ, aut semperuiui, aut solani, aut hyoscyami; aut coriandri, aut rutæ, aut apij, aut helxines, aut mentæ. Confert & argenti spuma cum rosaceo trita: eadem cum rutæ succo, aceto & rosaceo: ochra cum aceto: rubigo ferri cum aceto, cerussa, sulphure & argenti spuma: meconium cum aceto: acacia, diphryges tostum & alumen scissile paribus portionibus cum aceto: & hoc quidem remedium eximiè iuuat.

Ad eadem.

Faciunt verò hæc ad erysipelata cum polline polentæ more cataplasmatum imposita: plantago, coriandrum, apium, portulaca, semperuiuum, auricula muris, solanum, hyoscyami folia, itémque helxines: calycis seu anchusæ, quá onocleam vocant, radix, vmbilicus Veneris, brassicæ folia, cypri folia, similitérque cupressi, lycopsis folia, itémque ocimi, arundinis cortex viridis cótritus, ricini folia trita

A μήκωνος ἀγρίας φύλλοις καταπλασσόμενα· λινόσπερμον σὺν ἀνίσῳ, ἶρις σὺν χαλκάνθῳ καὶ κενταυρείῳ, πλατυκέδιον ῥίζα, χαλκάνθης ῥίζα σὺν ὑοσκυάμου σπέρματι, χαμαιλέων μέλας.

Mendosus, Moibanus ex coniectura.

CLXVII. Ἀχίδας δὲ καὶ σκόλοπας ἕλκη καταπλασθέντα· ὁρμίνου φύλλα, ἢ τὸ σπέρμα μετ' ἀλφίτου· ξιφίου ῥίζα σὺν ὕδατι ἢ καθ' ἑαυτό, ἢ σὺν λιβανωτῷ ἢ οἴνῳ· ἴριος ῥίζα· λεοντοπετάλου καρπὸς ἢ φύλλα μετ' ἀλφίτου· ἀμμωνιακὸν σὺν μέλιτι· ὄρχις ἡ βοτάνη καταπλασσομένη· ἀναγαλλὶς ὁμοίως· ἀριστολοχίας ῥίζα ὡσαύτως· κοχλίου φαγμένου ῥίζα, ἢ τὸ μετὰ τοῦ φύλλα λεῖα· κοχλίαι σὺν τῇ ἑαυτῶν σαρκὶ· ναρκίσσου ῥίζα, ἢ βολβὸς σὺν μέλιτι· σίναπι μετὰ ζύμης· ὀξυακάνθου ῥίζα· δίκταμνον· τοῦτο δέ φασι τὸ Κρήτῃ πεμπηθίσας, ἐκτὸς πίων τοξευθείσας αἶγας, ἐκβάλλειν τὰ βέλη. κηρὸς πόλις ἐπιπλασθεῖσα, κυνοκόμου καρπὸς λεῖος, σπέρμα κεφαλῆς λεῖα, σιλούρου ταριχηροῦ ὀφις, νεβροῦ πίτυα, τράγιον πυρίδιον.

CLXVIII. Ἐρυσιπέλατα ἰᾶται καταπλασθέντα τάδε, ὄξος καὶ ῥοδίνου μιγνύμενον· ψιμύθιον, λιθάργυρος· ἢ γῆ Κιμωλία, ἢ Χία, ἢ Σελινουσία. Μίγνυται δὲ χυλὸς ἀρνογλώσσου ἢ σιδὸς, ἢ πολυγόνου, ἢ ἀγριελαίας, ἢ αἰθράχνης, ἢ ἀγζόου, ἢ γρύχου, ἢ ὑοσκυάμου, ἢ κορίου, ἢ πηγάνου, ἢ σκαλίου, ἢ ἑλξίνης, ἢ ἡδυόσμου. Ποιεῖ καὶ λιθάργυρος μετὰ ῥοδίνου λεῖος· ὤχρα μετὰ ὄξους εἰς σιδήριον· χυλὸς ἢ ὄξος, καὶ ψιμύθιον ἢ ἡλίῳ ἢ λιθαργύρῳ· λιθάργυρος μετὰ πηγάνου χυλοῦ ἢ ὄξους, ἢ ῥοδίνου μικρόν· σὺν ἀξὶ· ἢ ἀκακία, διφρυγὲς ὀπτὸν, χαλκὸς, ἴσα μετ' ὄξους ἄκρατος ἢ παιδὸς οὕτως.

εἰς σιδήριον καὶ ξὺν ψιμυθίῳ &c. Mendos. vertit.

σὺν ὕδατι. Gelen.

CLXIX. Καταπλασσόμενα δὲ μετ' ἀλφίτου πάλης παιδὸς πρὸς ἐρυσίπελας ταῦτα· ἀρνόγλωσσον, κόρειον, σίλινον, αἰθράχνη, ἀγρίζοον, μυὸς οὖτα, γρύχον, ὑοσκυάμου φύλλα, ἑλξίνης, καὶ λύκιον τῆς καλουμένης ἀγριελαίας ῥίζα, κοτυληδὼν, κράμβης φύλλα, κύπρου φύλλα, κυπαρίσσου ὁμοίως, λυκάψου φύλλα, ὠκίμου φύλλα, καλάμης φλοιὸς χλωρὸς λεῖος, κρότωνος φύλλα λεῖα

ἰγγάνει

καθ' ἑαυτὰ ἢ μεθ' ὄξους· κρίνου αὐτὸς ἡ φύλλα σὺν οἴνῳ· κύπιρου ἑφθοὶ σὺν οἴνῳ λφοι σὺν φακοῖς καὶ ῥόδοις ξηροῖς· κώνωπος χλωρὸν λφον, μανδραγόρου ῥίζα σὺν ὄξει λεία, μαλάχης φύλλα ἑφθὰ μιγέντα ἐλαίῳ, λθυκνήμου φύλλα καθ' ἑαυτά, φακὸς ὁ ὀπτὸς τὴν πλμάτων λφος, ἀκάνου φύλλα λεῖα σὺν πολυγρεσθοῦς φύλλοις λείοις σὺν ὄξει, σπαρτίου ὁ ὀπτὸς τὴν ὑδάτων, ἰσχάνου φύλλα, σέσελι ἑφθὸν σὺν οἴνῳ καὶ ἐλαίῳ λφον μελάμφυλλοι, ὃ δὴ καὶ παιδίρωτα, οἱ δὲ ἄκανθον καλοῦσι, καθ' ἑαυτὸ χλωρὸν λφον, καὶ σὺν ὄξει καὶ ῥοδίνῳ καὶ σεμιδάλει ἄρτῳ, ποιᾷ ἀκρῶς. ποδὸς μετὰ κράμβης χυλοῦ καταπλοκὴ ὠμός.

CLXX. Ἑρπητικὰς δὲ ὠφελήσει καὶ ἑλκώσεις ἐρυσιπέλατα αἰγιλωπιζόμενα, καὶ μάλιστα ὅσα ὀπτικῶς μένοις σύφει καὶ χαλκίτει καὶ κατάπλασμα· ἰσάτιδος φύλλα λφα σὺν ὕδατι καταπλασθέντα, βάτου φύλλα ὁμοίως. ἀνάπαλος αὐτὸς σὺν ὄξει ὀπτὸν καταπλασθείς, ἢ βηχίου φύλλα σὺν ὕδατι, μυρσίνης φύλλα σὺν ἀλφίτῳ, πενταφύλλου ῥίζα σὺν ἀλφίτῳ. σπονδύλιον λφοι σὺν πτισάνῃ καὶ ὄξει. καταχρίεται δὲ ὠφελίμως, ἀσβέστου σὺν ὄξει ὀπτὸν τὴν αἰγιλωπιζόντων ἢ ἀλκυονίδων ὠῶν, σὺν κηρωτῇ, διφρυγὲς σὺν ὄξει. ἢ γῆ Κιμωλία ὁμοίως, λύμοι, πίτυος φλοιὸς λιπαλφεὶς κηρωτῇ κυπρίνῃ. πίτυος φλοιοῦ < β'. μετὰ χαλκάνθου < α'. σὺν κηρωτῇ ἢ σπιδνὸν ξύλου λεπίας, καὶ μίξας αὐτοῖς λφοι ἴσοι, καὶ ἔλαιον, φίερα, καὶ ὀνδύσας ὀξυπόρῳ, καὶ οὕτως καταπλάσσει. Τοὺς δὲ σῦρον κεκαυμένοι σὺν ὄξει, μίσυ σὺν ὕδατι, μέλαν γραφικὸν σὺν ὄξει ὀπτὸν τὴν αὐτὴν, κράμβης φύλλα. ἢ ἀφρὸς Γ'. α'. λιθαργύρου Γ'. β'. μετ' οἴνου λφα καταχρίει. ἢ σκορόδων < α'. καρύων πικρῶν < β'. κρόκου < ς'. συλλεάσας καταχρίει. καταπότιον δὲ ὄξει ψωχρόν.

CLXXI. Τοὺς δὲ ὀπτικοὺς ἀγριελαίας αὐτοῖς καταπλάσσει, ἢ ῥάμνου, ἢ ἄγρου φύλλοις σὺν μέλιτι, ἀμυγδάλοις πικροῖς. αὐτὸν οἶνον, σκορόδου κεφαλὴν καθ' ἑαυτὴν, ὀξυγλύκασμα καθ' ἑαυτὸ, σαφίδι μετὰ πτισάνου, ἀνθεμίδι σὺν ὕδατι,

per se vel cum aceto, illij flores & folia cum vino, cytini cocti cum vino & triti cum lentibus & rosis siccis, cicuta viridis trita, mandragoræ radix cum aceto contrita, maluę folia cocta oleo addito, lycanthemi folia per se, lens palustris trita, acini folia trita cum foliis verbenacæ & aceto: stratiotes aquaticus, lentisci folia, beta cocta in vino & oleo, tritáque: melamphyllum, quod alij pæderota, alij acanthum vocant per se virens tritum & cum aceto rosaceo & pane strenuè iuuat: itémque spodium cum brassicæ succo affusum.

Ad Herpetas prosunt, tum quæ ad erysipelata præscripta sunt, tum verò maximè quæ intensè astringunt seu illita, seu etiam cataplasmatis in modum imposita, nempe isatidis folia trita ex aqua adhibita, similitérque rubi folia, fimus caprarum cum aceto impositus, tussilaginis folia ex aqua, myrti folia cum polenta, quinquefolij radix cum polenta, spondylium tritum cum ruta & aceto. Vtiliter autè illinitur talx viua, in his qui minimè sunt exulcerati, cum aceto: si verò exulcerati fuerint cum cerato: diphryges cum aceto, similitérque terra Cimolia, lycium, pini cortex cerato cyprino exceptus, pini corticis drach. ij. cũ chalcanthi drach. j. cerato exceptæ. Aliud: Tritá lignorũ cariem cum pari aniso addito oleo subigito: hæc illigata linteolo vrito, rursúmque terito, itáque inspergito. Confert & sory vstum cum aceto, misy ex aqua, atramentum scriptorium cum aceto parte superiore adhibitum, brassicæ folia. Aliud: Sulphuris vncia j. argenti spumæ vnc. ij. cum vino tere & illine: Aut: Allij drach. j. amygdalarum amararũ drach. ij. croci drach. semis, simul contento & illinito: frigido verò aceto perfundito.

Epinyctidibus agrestis oleæ flores imponito, aut rhamni viticisve folia cum melle, amygdalas amaras cum vino, fimum ouillum per se, plantaginem per se, vuam passam cum ruta, absinthium ex aqua,

Moib. χρίου

ποδὸς

Ἀνάπαλος alijma fœdino genere proferunt.

Moib. καταπότια.

Moibano pendet hoc ceu nimium est suspectissimum. Gesnerus τ notam reponit, quæ vi ὠμοῦ illigaret.

Ἀδηριγλίδες.

coriandrum viride tritum, sampſuchum ex aqua, folia denique cucumeris eodem modo.

Ad fauos. Fauis autem ista conueniunt: vua paſſa cum ruta, ſici tenellæ folia cum melle, naſturtium cum melle & lini ſemine, cucumeris ſatiui radix cum melle, ſulphur viuum cum cerato exiguo aut reſina terebinthina.

Ad calceamentorũ attritus. Calceamentorum attritus dolorem inferentes à dolore ſimul & inflammatione vindicant hæc: pulmo fuillus aut agninus impoſitus, cepa trita cum adipe gallinaceo aut polenta, calceamentorum veterum ſoleæ vſtæ & inſperſæ.

Ad deſquamata. Deſquamata tuentur ab inflammatione, rhus ruber cum melle impoſitus, ſideritidis, quæ & Heraclea dicitur, folia itidem impoſita, ſcordium, iunci coma cremata cum melle & impoſita, ſtratiotes aquaticus cum aceto.

Ad clauos. Clauos extrahit ranunculus impoſitus, ipſo tamen clauo paulò antè derato: eſt autem cautè adhibendus, vicinis partibus ſubacta farina ceráue prætunitis: alioqui ſanas etiá partes exederet. Tollit & ad breue tempus impoſitus ranunculus thymos & acrochordonas. Valent & marathis ſalitæ crematum caput, recens ſalicis cortex tuſus & ex aceto impoſitus, ladanum cum pauco caſtorio, nigella cum vrina: laſerpitium cum citrio etiam callos eximit, ſimiliter & laſer ipſum cum reſina: lacertæ caput tritum & illitum, aut liquor ficus reſinæ, lacertæ ſanguis recens inſtillatus & ex lana, quæ eodem imbuta ſit, impoſitus. Ammoniacum ieiuni ſaliua emollitum clauo aliquantulum derato imponatur. Bdellium itidem aut vimi corticem cataplaſmatis more impoſito.

Ad verrucas tum reliqua genera. Myrmecia, penſiles verrucas thymóſque tollunt hæc: caix viua cum cerato, dipſaci radix trita & impoſita, elaterium cum ſale tritum etiam leuiter adhibitum, cicer coctum tritúmque, & pro cataplaſmate impoſitum. Aiunt & ſi quis prima luna ſingulas verrucarum eminentias ſingulis ciceribus granis contingat, hæcque in linteo

A κοείῳ χλωρῷ λείῳ, σὺν ψύχῳ σικυῶ ὕδατι, σικύου φύλλοις ὁμοίως.

CLXXII. Πρὸς δὲ τὰ κύεια ἁρμόζει, σὺν ἰσχάδι μετὰ πηγάνου, συκῆς φύλλα ἁπαλῆς σὺν μέλιτι, καὶ ῥάφανον σὺν μέλιτι καὶ λινοσπέρμῳ, σικύου ἡμέρου ῥίζα σὺν μέλιτι, θῆλυ ἄπυρον σὺν κηρωτῇ ὀλίγῃ ἢ ῥητίνῃ τερμινθίνῃ.

B

CLXXIII. Τὰ δὲ ἐκ τῶν ὑποδημάτων τραυματίσματα ἐπώδυνα ὄντα ἔμπλαστρα τοιαῦτα καὶ ἀφλέγμαντα, πνεύμων χοίρειος ἢ ἄρνειος θερμὸς, κρόμμυον σὺν ὀρνιθείῳ στέατι λεῖον, ἢ ἀλφίτων καταύσαντα παλαιὰ ὑποδήματα καὶ θερμὰ ἐπιπλασάντα. Ὑποδημάτων, Moib.

C

CLXXIIII. Ἀφλέγμαντα δὲ τηρεῖ τὰ ἀποσύρματα, ῥοιᾶς ἐρυθρᾶς καταπλασάντα μετὰ μέλιτος σὺν μίλτῳ σφενδόνης, τῆς δὲ ἡμέρου κλείας καὶ λευκοΐου, τὰ φύλλα καταπλασάντα· σκόρδιον, ἀχιὸς κόμη καῦσαι σὺν μέλιτι καὶ θερμὰ ἐπιπλάσαι, τραπέστης ὁ ἐν τοῖς ὕδασι σὺν ὄξει. χίνου, vel portulacæ χίνου, Moib.

D

CLXXV. Ἥλους δὲ ἀίρει, βατράχου θερμὰ ἐπιπλασθὲν πρὸ ἁπτυξάντος θερμοῦ τοῦ ἥλου. Ἀκριβῶς δὲ θερμὸν δεῖ τὰ κύκλῳ ἰσχνὰ εἶναι καὶ ἡπαρῷ καταπλασθέντα. διαθὴ γὰρ καὶ τὰ ἀπαθῆ. αἴρει δὲ πρὸς ὀλίγον καταπλασθὲν τὸ βατράχου καὶ θύμα, καὶ ἀκροχορδόνας. σμαρίδος ἁλιτικοῦς κεφαλὴ καῦσαι, ἰτέας φλοιὸς πρόσφατος κλεὶς καὶ μετ' ὄξους θερμὸν, καὶ λάδανον σὺν ὀλίγῳ καστορίῳ, μελάνθιον σὺν οὔρῳ· ἀλφὶ μετὰ κιττείου καὶ τὸλος αἴρει, ἢ ὀπὸς τοῦ σιλφίου σὺν ῥητίνῃ ὁμοίως· σκώληκας κεφαλὴ λεία θερμὸν ἐπιπλασθεῖσα, ἢ ὀπὸς ξηροῦ ῥητίνης· σὺν ὄξει αἷμα πρόσφατον θερμὸν ζωμὸν, καὶ ἐρίῳ ἠθουργὸν θερμὸν ἐπιθέμενον. Ἀμμωνιακὸν νήστεως ἁλὶ ἁπαλυνθὲν λάξας, καὶ ἀποξυσθέντος θερμοῦ ποιεῖ θερμὸν βάλανον, ἤγουν φλοιὸν πτελέας, καταπλασθέν. ἐνίοις ἐνίοις, Moib. ἐνίοις ἐνίοις, Moib. fortè μετὰ κηροῦ cum cer. Moib. μετὰ κηρωτῆς, cum cerato, legẽdum ſuſpicatur. Suſpecta eſt dictio ἰσχνὰ. reſina cum ſebo dici non ſolet. Gelen.

E

F

CLXXVI. Μυρμηκίας καὶ ἀκροχορδόνας τὰ θύμους αἴρει μετὰ κηρωτῆς ἀσβέστου λίθος, διφάκου ῥίζα καταπλασθεῖσα λεία, ἐλατήριον μετ' ἀλὸς λίθον τρεφομένους, ἐρεβίνθεις λίθοι ἐφθοὶ καταπλασθέντες. Φασὶ δὲ ἐπὶ τῷ κυκλῳ σεσημασμένας ἐκάστης ἡμέρας φαίνειν ἐπὶ ἐρεβίνθῳ, καὶ τῶν ἀδένων

G

συμβάντων ὄψεις, εἰς τὸ τρίτον ῥίπτῃ, ἀποπίπτει αὐτὰ αὐτομάτως ἢ ἀφαιρεῖς γίνεται. Ποιεῖ δὲ ἡλιοτροπίου μεγάλου ὁ καρπὸς ἐν οἴνῳ καταπλασθείς, κλινοπόδιον μετ' ὕδατος ἑψηθὲν δὲ καὶ ἐπιτεθὲν, πήγανον σὺν νίτρῳ περικαταπλασθὲν, λέπραν τὴν σὺν ὀξυμέλιτι ὁμοίως, ἄλωπι ὁμοίως· μετὰ κηροῦ δὲ ἀλθόμενον, τὸ ὀπὸς ἢ τῆς συκῆς καταχρίμενος, σαύρας κεφαλὴ λεία ἐπιτεθεῖσα, σμαρίδος παρεγχρισθεῖς κεφαλὴ καυθεῖσα μετὰ ἐπιτεθεῖσα. Θύμου θρύμμα ἐπικαθέντα, ἰὸς σὺν μίσυι καταχριόμενος, πτυσμάλλου ὀπὸς καταχριόμενος, ὠκίμου φύλλα μετὰ χαλκάνθου καταπλασσόμενα, ἀμπέλου κλημάτων χλωρῶν τὸ ἀφιδρούμενον ὑπὸ τοῦ καίεσθαι ἐπιχριόμενον, τραχήλου ἀπόπατος μετ' ὄξους, χαμαιπίτυος λέπη καταπλασθέντα, αἰγὸς ἀγρίας χολὴ ἢ πάνου καταχριόμενον.

Diosc. c. 183 l. de mal. med. συὸς νίτρῳ καὶ ἀλεύρῳ, cum nitro & farina.

Θύμου & θύμβρα, Molbanus. Sed supra quoque c. 140 legitur θύμου & θρύμμα.

CLXXVII. Ἀκροχορδόνας δὲ ὁ πόντος τόπῳ αἵρει ἰχὼρ πυθόμενος ὀπώμενον καταχριόμενος, λῆσις, λέπρας, συκῆς φύλλα ἴσα τείνας ἐπιθὲν, τραχηλοτομήσας πυρὸν ἀφεψήματι· ἢ πηλῷ, ὅπου ἐὰν κύων μέλας οὐρήσῃ, καταχρεῖ, ἢ χαμαιπίτυος λέπη.

Molbanus, χαμαιπίτυος, Legendum fuisse ait χαμαιπίτυος.

CLXXVIII. Πυρίκαυσα δὲ ὁ ἄρχῃ ὠφελεῖ, ὥστε εἰ καὶ ἐπιχρῆσαι τις χρίσαιτο μηδὲ φλυκταινοῦσθαι. Κιμωλία μετ' ὕδατος καταχριεῖσα, μέλαν χαλκοῦ ὁ ὕδατι καταχριόμενον, σπήλεια ὑγρά, σπήλεια πᾶσα σὺν ὕδατι, μύρτου φύλλα σὺν ἐλαίῳ· καρκίνου ῥίζα σὺν μέλιτι, ἀκτῆς φύλλα λεῖα· ἀγκιστρίου φύλλα καὶ ὁ καυλὸς, καὶ αἱ ῥίζαι σὺν οἴνῳ ἑψηθέντα· φλόμου ῥίζαι δὲ φύλλα ἑψηθέντα ὁμοίως, ἐλαίας φύλλα ἑφθὰ, ἄλες σὺν ἐλαίῳ καταπλασθέντες, ἀνδρόσαιμον λεῖον, ἀριστολοχίου φύλλα, ὑοσκυάμου φύλλα τραγίσκου, μαλάχης λεία ἑφθὴ καὶ ὠμὴ καταπλασθεῖσα· ἐλαίας λῶπαι ἐξ ἅλμης λεῖαι καταπλασθεῖσαι, καὶ μόγιαι ὁμοίως· καὶ ἐλξίνη καταπλασθεῖσα, ἢ βάτος, ἢ ῥοιᾶς, ἢ μυρσίνη, ἢ ῥόδα, ἢ κύπρος ὁμοίως, ἢ φύλλα σβύτου σὺν οἴνῳ τοῦ ὀλίγου ἑφθὰ, μυρσάλαθος μετ' ὕδατος. Ἐριγέρου φύλλα σὺν μέλιτι ἢ οἴνῳ, σμύρνα σὺν οἴνῳ καταχριόμενη· κήρυκες πληρωθέντες ἁλὸς καὶ κάπρου, καὶ καταπλασθέντες ἀπο-

Molbanus addit. ἢ μυρσίνου φύλλα πρίνου ἢ ἀκρυφοῦς, aut myrti folia cremata cum cerato. ἐν κηρώτῃ

deligata post se abiiciat; fore vepres verrucæ sponte decidant aut euanescant. Proficit & heliotropij maioris semen cum vino impositum, clinopodium ex aqua coctum & impositum, ruta cum nitro circumlita, similiter & thus cum aceto, grossi eodem modo cum farina & cera, necnon & lacteus fici liquor illitus, lacertæ caput tritum & impositum, smaridis salsæ caput crematum & impositum, thymus thymbráve imposita, ærugo vitæ cum misy, tithymalli liquor illitus, ocimi folia cum chalcantho imposita, id quod è vitium sarmentis viridibus accensis exudat illitum, fimus ouillus cum aceto, chamæsyce trita & imposita, syluestris denique capræ hircíve fel illitum.

Verrucas pensiles quauis in parte extuberátes tollit, pulmonis inassati sanies illita. Sulphur, thus & fici folia æquis partibus contrita impone, tritici decocto priùs affuso. Aut: luto quod canis niger perminxerit illinito, vel ebulo.

Ad prunia reprimenda autore Dioscoride.

Ambustis in principio prosunt hæc, adeò vt, si citra moram adhibeantur, etiam bullarum eruptionem arceant: terra Cimolia ex aqua illita, atramentum scriptorium cum aqua illitum, alumen liquidum, aluminis omne genus ex aqua, mori folia cum oleo, narcissi radix cum melle, sambuci folia trita, arctij folia cum caule ac radicibus in vino cocta, verbasci radices foliáque similiter cocta, oleæ folia cocta, sal cum oleo illitus, androsæmon tritum, plantaginis folia, hyperici folia recentia, malua trita seu cocta seu etiam cruda more cataplasmatis imposita: oliuæ conditaneæ tritæ & impositæ seu albæ, seu etiam nigræ: helxinè cataplasmatis instar imposita, similiter & rubus, iuncus, myrtus, rosæ aut cytini, betæ folia paulisper in vino cocta, glans vnguentaria cum aqua, elichrysi folia cum melle aut vino, myrrha cum vino illita, buccina sale expleta cremataque imposita:

siquidem testæ in modum indurantur, dum sit obducta cicatrix: veteres solex vstæ & insperſæ, oui candidum, gummi cum ouorũ albumine illitum, gluten taurinum aqua calida solutum, lilij folia in vino cocta, eiusdémque radix cocta tritáque cum rosaceo. Similiter & folia limonij, thus ex aqua illitum, stibium cum recẽti adipe inunctum, vlmi lacryma quæ in folliculis reperitur: foliorũ etiam decoctum affusum benefacit: lichen qui petris innascitur tritus & impositus, mororum immaturorum succus: denique amurca, mel & argẽti spuma, ęquis portionibus contrita & ad mellis crassitiem cocta. Inuncta verò iuuant, plumbum in oleo coctum ad mellis crassitudinem, cinis ficulneus cũ melle, pix liquida cum linamentis. Cicatricem verò ambustis inducunt, anchusæ radix cũ cerato rosaceo aut myrtino cocta, fimus ouillus cum cerato rosaceo mixtus, fimus columbinus in linteolo vstus & cum oleo tritus. Spumæ argẽti drach. j. in olei veteris cotyla vna coquitur igne claro vsquedum igneſcat, & illinitur: hederæ verò folia superimponuntur. Cinnabaris, ceruſſę & hordei vsti ęquę portiones cum cerato myrtino: lithargyrus cum adipe caprino conformata ad emplastri compagem: cyclamini radix, cui incauatæ oleum cum cera incoctum sit: maluæ folia cocta cum oleo, myrti folia vsta cum cerato, pini seu piceæ cortex cum cerato myrtino, idem quoque tritus per se impositus, & earundem folia in vino cocta: beta cocta & imposita, calx viua oleo soluta, quæ quidem & bullarum eruptionem arcet & vlceratas partes ad cicatricem perducit.

Ad perniones eundem vſum habent folia.

Perniones sanant hæc fotuum vice affusa: cyclamini radicis decoctum, similiter & asphodeli radicum: rapum in aqua marina vel muria decoctum, ranunculus ex aqua coctus, arctij folia, caulis & radix simili modo in vino cocta, & ipsamet imposita: depilatorium quo vtuntur coriarij affusum, laserpitij decoctum itémque erui, ac ipſa quoque aqua marina per se.

A ἀποστρακοῦται γὰρ ἄχρι ἐπουλώσεως· καὶ οὖλα καὶ ἐκ τῶν καλαπλασμάτων, ὡς τὸ λευκὸν, κόμμι μετὰ τοῦ λευκοῦ τοῦ ὠοῦ καταχριόμενον, ζωμοκόλλα ὕδατι αἰθόμενα θερμῷ· καὶ κρίνου φύλλα σὺν οἴνῳ ἑφθὰ, καὶ ῥίζα ἑφθὴ λεία σὺν ῥοδίνῳ· λάμψεις φύλλα ὁμοίως, λιβανωτὸς ὀπτὸς χριόμενος σὺν ὕδατι, σίμμι σὺν τέρμινθίνῃ νεαρᾷ καταχριόμενον. Mοιβὴ κρίνου καὶ ἀσφοδέλου.

B πελεκὰς τὸ ἐν τοῖς ξυλακίοις δάκρυον, ἐν ὄξει ἀφέψημα τῶν φύλλων καλὸς ποιεῖ καταπλασσόμενον, λέχλιν ὁ ἐν τῷ πίτυϊ λέπυρος ὀπτηθεὶς, συκαμίνου ἀώρου ὁ χυλὸς· ἢ ἀμόργη καὶ μέλι, καὶ λιθάργυρος ἴσα περιβέντα καὶ ἐφηδύνοντα ἕως μέλιτος πάχους.

C Καταχριόμενα δὲ, μολιβδὸς ἐν ἐλαίῳ ἑφθὸς ἄχρι μέλιτος πάχους· κονδὺς συκίνη μετὰ μύρτου, πίσσα ὑγρὰ μετὰ μετώπου. Μόλυβδος ἑφθὸς.

Ἀπουλεῖ δὲ τὰ πυρίκαυστα ἀλφούσης ῥίζα, μετὰ κηρωτῆς ῥοδίνης ἢ μυρσινίνης ἐφηδεῖσα, λέπαστος σὺν ῥοδίνῳ κηρωτῇ κυδωνιατίᾳ μιγεῖσα· ἀβεστιρᾶς χόνδρος καῦσα σὺν ὄξυνίῳ καὶ σὺν ἐλαίῳ λευκῷ λεανθεῖσα. λιθαργύρου < ι'. καὶ ἐλαίου παλαιοῦ κ.α'. ἕψεται ἀναδόσεως πυρὶ λαμπρῷ ἕως αὐ πυροειδὲς γένῃ), καὶ καταχρίεται. ἐπιτίθεται δὲ κισσοῦ φύλλα ἐπιπλάττει. ἢ κινάβαρι μετὰ ψιμυθίου καὶ κριθῶν κεκαυμένων ἴσα μετὰ κηρωτῆς μυρσινίνης, λιθάργυρος μετὰ στέατος αἰγείου ἀναπλασθεῖσα ἕως ἐμπλαστρώδες γένῃ)· κυκλαμίνου ῥίζα ἐγλυφεῖσα ἐν κηρωτῇ ἐνιεμένη, μαλάχης φύλλα ἑφθὰ σὺν ἐλαίῳ, μυρσίνης φύλλα καυθέντα σὺν κηρωτῇ. πίτυος φλοιὸς ἢ πεύκης σὺν κηρωτῇ μυρσινίνῃ καὶ λέπυρος ὁ καθ' ἑαυτὸν ἐμπλασσόμενος, καὶ τὰ φύλλα σὺν οἴνῳ ἑφθὰ ἐπιτίθεται. στρύχνου ἑφθοῦ καταπλασσόμενον. ἀσβέστου λεπυρὸν σὺν ἐλαίῳ· τῶν δὲ ἐκ φλυκτιδῶν θαι, καὶ τὰ ἑλκωδιὰ ἀπουλεῖ.

E

F

CLXXIX. Χύσεσι δὲ ἰάσιμα καταπλάσματα, συκαμίνου ῥίζης ἀφέψημα, ἀσφοδέλου ῥιζῶν ὁμοίως, λεχλιν ἐν θαλάσσῃ ἢ ἐν ἅλμῃ ἀφεψημένη, βατράχιοι σὺν ὕδατι, λάχανα φύλλα καὶ καυλὸς καὶ ῥίζα ὁμοίως ἐν οἴνῳ ἀφεψημένα καὶ αὐτὰ καταπλασσόμενα, μαλάς· ἀπὸ βυρσοδεψῶν καταπλασσόμενος, σιλφίου ἀποζέσμα, ἀφέψημα, θαλάσσια καθ' ἑαυτά. μοιβὴ τῶν βυρσοδεψῶν.

G

CLXXX. Καὶ αχρείμενα ὑ ὠφελῆ πρὸ ἕ ἑλκωθῆναι τὰ χίμετλα, ἀκακία, σφασίου χυλὸς, ῥοὸς δυρσοδεψικῆς χυλὸς, λύκιον, ἀμόργη ἐψητὴ, κηρῷ πλατύσμαλτα θερμὰ πρὸ μέρος ὅπτα ἀλφιτα ὡς πυρία, συπήρια μετὰ ψιμυθίου καὶ κηρωτῆς· ἢ βάτου κεκαυμένης τέφρα μὴ κηρωτῆς καταπλάσαι ὑ πρὸ ῥηχώσεως χολυλιᾶ ἐφθὴ ἐν ὄξυμι.

Pernionibus verò, priusquàm exulcerentur, hæc illita conueniunt: acacia, marrubij succus, rhois coriarij succus, lycium, amurca cocta, ceræ laminulæ calidæ alternatim impositæ pro fotu, alumé cum cerussa & cerato, rubi cremati cinis cũ cerato: adhibetur & ante vlcerationẽ rapum in muria coctũ. A

CLXXXI. Πρὸς δὲ τὰ ἡλκωμένα τῶν χιμέτλων ποιεῖ, κηρωτὴ ἐν χολυλιᾶ ὠμῇ ἐγχυφείσῃ ὅπτι θερμοτάτοδι ἐφηδεῖσα, ἢ ἐν κυκλαμίνου ῥίζῃ ὁμοίως ἐγχυφείσῃ, δρακοντίου φύλλα ἑφθὰ, καρκίνοι ποτάμιοι κεκαυμένοι μετὰ μέλιτος, κοτυληδὼν λεῖα, λιβανωτὸς σὺν σίαπι ἠρκείῳ, λιθάργυρος σὺν κηρωτῇ μυρσινίνῃ, ἢ μολίβδαινα ὁμοίως, ἢ ὄνυχες ὄνου ὅπτι πλασσόμενοι, πτύσμη θαλάσσιος λεῖος καταπλασσόμενος· σῦκα ξηρὰ μετὰ κηρωτῆς, ἢ ὠμὰ μὲν ἐλαίῳ θερμῷ λεῖα· φακὸς ὁ ἐπὶ τῶ τηλίφῳ, ἢ φακὸς ἑφθὸς μετ' ἐλαίου θερμοῦ λεῖος, κρίνου ῥίζα ἑφθὴ λεία καταπλασσομένη μετὰ σίαπος χειρείου ἁλμυροῦ, σίδια δὲ οἰνωμένα, σίλφιον μὲν ἐλαίου λεῖον. σίαρ δὲ κηρὸς, μύρσινος, μὲν ἐλαίῳ θερμῷ λεῖος. B

Exulceratis autem pernionibus ista conueniunt: ceratum in rapo crudo incauato super feruenti cinere coctum, aut in radice cyclamini similiter incauata: dracunculi folia cocta, cancri fluuiatiles vsti cum melle, cotyledon trita, thus cum adipe vrfino, argenti spuma cum cerato myrtino, plumbago simili modo: vngulę asininæ inspersæ, pulmo marinus tritus & pro cataplasmate impositus, similiter & marrubium tritum impositum, ficus siccæ cum cerato, aut eædem trudæ cum oleo calido tritæ, lens palustris, lens item è leguminum genere cocta cum oleo calido trita, lilij radix cocta tritáque cum adipe suillo insulso impositæ, melicorium in vino coctũ, laserpitiũ cum oleo tritum: adeps denique & cera cum oleo myrteo feruente teruntur. C D

CLXXXII. Προσβυλικὰ δὲ ἀπυλεῖ ἕλκη, ἀναγαλλὶς μετὰ κηρωτῆς, ἄχις φύλλα ἑφθὰ ἐν οἴνῳ ὅπτι πτισθέντα, χρῖσαι καθ-σαι, ἢ ψιμύθιον μὴ κηρωτῆς μυρσινίνης καταπλασίονος· ὠὸν λέκυθοι καὶ λιθάργυρος ὁμοίως κηρωτῇ ἀναληφθέντα, κηρῶδη μὴ μολίβδῳ κεκαυμένῳ, μυρσίνη, πίτυος φλοιὸς ὁμοίως.

Senum vlceribus cicatricẽ obducunt, anagallis cum cerato, arí folia in vino cocta impositæ, hordeum vstum, cerussa cum triplo cerato myrtino, ouorum vitelli & lithargyrus eodem modo cerato excepta, ceratum cũ plumbo vsto, myrtus, similitérque pini cortex. E

CLXXXIII. Τὰ δὲ παλαιὰ ἑπυλεῖ, πίτυος φλοιὸς σὺν κηρωτῇ μυρσινίνῃ, ἢ διφρυγὲς λεῖον· καταπλασσόμενοι, ὕπτα πτελείου φύλλα λεῖα σὺν ἀξουγγίῳ, πτερεώδος ῥίζα λεία, ἰξὸς σὺν λιβανωτῷ, ἰὶς μετὰ διφρυγὸς ἴσου καὶ μετὰ κηρωτῆς μυρσινίνης, καδμία μετὰ κηρωτῆς, κενταύριον χλωρὸν λεῖον, χιόνου ἄνθη μετὰ κηρωτῆς, κρίνου ῥίζα λεία σὺν ῥοδίνῳ, ἢ τῶ φύλλων ἢ αὐτὸς ὁ χυλὸς ἐφθεὶς σὺν χαλκῷ ἀλοιφῇ σὺν μέλιτι καὶ ὄξει, ἔμπλαστος καλλίστη ὑγρὰ γίνεται. λάδανον καὶ σμύρνα καὶ μέλι σὺν κηρωτῇ μυρσινίνῃ, ἢ ἐλαίου παλαιοῦ σὺν μέλιτι. F G

Vlcera vetera hæc ad cicatricem perducunt: pini cortex cum cerato myrtino, diphryges tritum & insperfum, eupatorij folia trita cum axungia, filicis radix trita, viscus cum thure, æruginis cum æqua diphrygis portione cerato myrteo excepta, cadmia cum cerato, centaurium viride tritum, hederacei flores cum cerato, lilij radix trita cum rosaceo: quin & eiusdẽ foliorũ succus in æneo vase cũ aceto & melle coctus, præstantissimum euadit medicamẽtum liquidũ, quo imbuta concerpta linamẽta vlceribus induntur: ladanũ myrrha & mel cum cerato myrteo: oleũ denique vetus linamento exceptum.

Ad eosdem vlcera.

Ad eosdem vlcerata remedia.

Similibus vlceribus cicatricem obducentia.

Vetustis vlceribus cicatricem inducentia.

Ad extremarum partium vlcera sanata difficilia.

Vlcera extremarum partium ægrè ſanabilia melioré in ſtatum reducunt impoſita hæc: propolis, myrti baccæ, ſerapiadis radix, ligni caries inſperſa, arctij folia pro cataplaſmate impoſita, radix aſphodeli cum polenta, ſimiliter & aſtragali radix, itémque ballotes & ſabinæ folia, braſſicæ folia cum farina fœnigræci & aceto, libanotidis folia, totáque etiam herba, apiaſtrum impoſitum, itémq; peucedanú, chamædrys cum melle, verbenaca tecta eodẽ modo, Heracleę demiq; ſideritidis folia cum melle.

Ad putrida tibiarum vlcera.

Putridis tibiarum vlceribus medentur, capparis radix more cataplaſmatum impoſita, centaurium minus tritum, erui farina cum melle, orcheos ſeu teſticuli radix cum melle, ſimilitérque radix peucedani, pix liquida, ſimiliter & potamogeton, ſaccharum linamento exceptum, caries lignorum ſicca puluerata paſtinacæ radix ſicca: tritáque cum melle ac polenta, & in linteolo vſta dum in carbones redigatur: caricæ cum chalcantho, ramulorum fici tenellorum ramenta cocta in aqua cum farina triticea, vſquedum emplaſtri compagem aſſequantur, ac impoſita ſplenij in modum, relictáque triduo.

vel: splenio impoſita

Ad expurganda vlcera

Vlcera verò expurgant, marrubium cum melle, vrticæ folia cum ſale, ariſtolochia cum melle, gentiana, iris cum melle, oliuæ conditaneæ more cataplaſmatum impoſitæ, ſaluia trita, erui ceci marini tecta cremata, narciſſi radix cum eruo & melle. Aliud: nitri ſpumam melli immixtam in olla noua combuſto, additáque prout videbitur iride vtitor. Aut: ſumito chartæ cõbuſtæ drach. viij. arſenici drach. iiij miſceto cum roſaceo aut melle, vel ſiccis vtitor.

Vlcera ab vſtione cruſtas emargmant impoſita hæc: iris, eruum coctum, lupini, plantaginis folia, anethum, porri capitati folia cum ſale & aceto: verbenaca ſupina, oleæ germina, papaueris corniculati folia & flores, ſory vſtum, lacteus tithymalli liquor, ſimiliterque radix ari contrita.

Ad vlcera carne replenda.

Vlcera carne replent, butyrum,

A CLXXXIIII. Τὰ ἕλκη τὰ ἐν τοῖς ἄκρα τῶν μορίων δυσκαθαίρετα εἰς πάχη ἀγαθὴ κατάπλασμα, πρόπολις, βάτου καρπὸς, μύρτα σὺν οἴνῳ, στραπιάδος ῥίζα καὶ κατάπλασμα μετὰ σπεδοῦ· καὶ κατάπλασμα ξύλου, ἀρκεύθου φύλλα καὶ κατάπλασμα, ἀσφοδέλου ῥίζα σὺν ἀλφίτοις, ἀστραγάλου ῥίζα ὁμοίως, βάλλωτὶς B φύλλα ὁμοίως, βραβύλου φύλλα ὁμοίως, κράμβης φύλλα μετὰ τηλίνου ἀλθύρου καὶ ὄξους, λιβανωτίδος φύλλα καὶ ἡ πόα, μελισσόφυλλον βάτου κατάπλασμα, καὶ πάνακες σὺν μέλιτι, πεταστρείου ὁμοίως, σπεδοῦ τὸ Ἡρακλείας φύλλα σὺν μέλιτι.

extremarum partium ſunt.

CLXXXV. Σαπρουχήμους δὲ ἰᾶται, C καππάρεως ῥίζα κατάπλασμα, κεντταύριον τὸ λεπτὸν λεῖον, ὀρόβινον σὺν μέλιτι, ὄρχεως ῥίζα σὺν μέλιτι, πτυκεδάνου ῥίζα ὁμοίως, πίσσα ὑγρά, ποταμογείτων ὡσαύτως, σάκχαρον σὺν μύρῳ, σπεδοῦ ξύλων χοανὶς ξηρά· σαφυλίνου ῥίζα ξηρὰ λεία σὺν μέλιτι καὶ ἀλφίτῳ, καίοντες δὲ ὀρυΐνῳ κοπάνῳ D μίσγειν ἀνθρακώσαντα· σῦκα ξηρὰ μετὰ χαλκάνθου ἰὸς, λεπὶς, σμιλάνθη, κηρὸς, ἴσα· συκῆς δὲ ἀπαλῶν κλάδων τὰ ἀποξύσματα ἕφθα σὺν ὕδατι μέλι· ἀλθίρου πυείτις ἄλες αἱ ἐμπλασσῶδες ἥκιστα, βάτου καρπὸς ἡμέρας γ'.

vel splenio impoſita

CLXXXVI. Καθαίρει δὲ ἕλκη, πάσσον μετὰ μέλιτος, κολλᾶς φύλλα μὲν ἁλῶν, E ἀριστολοχία σὺν μέλιτι, ἡμιόνιον, ἶρις σὺν μέλιτι, κολυμβάδες καταπλασθῆσαι, ἐλελίσφακος λῖπος, ἐχίνου θαλάσσιον κεκαυμένα ὄστρακα, ναρκίσσου ῥίζα σὺν ὀρόβῳ καὶ μέλιτι· ἢ νίτρου ἀφρὸν μέλιτι μίξας καῦσον ἐν χύτρᾳ καινῇ, καὶ μίξας ἕως τραχασμῷ, χρῶ· ἢ χαλκάνθου κεκαυμένου ℥ ἡ. ἀρσενικοῦ ℥ δ'. σὺν ῥοδίνῳ, ἢ μέλιτι, ἢ ξηρῷ.

vel: splenio impoſita

CLXXXVII. Ἐκφέρας διαῤῥήσσει καὶ ἀπὸ καύσεως βατώδεις, ἕλκη, ὀνώνιδος φύλλα, ὄρεβοι ἕφθοι, θέρμοι, ἀγριογλώσσου φύλλα καὶ ἄνηθον, τραγίου κεφαλῆς φύλλα μὲν ἁλῶν καὶ ὄξους, ἰσχὰς βοτρύπι, θαλλεία, μήκωνος καρδίπιδος φύλλα καὶ ἄνηθον, σῶρυ κεκαυμένου, πηγανάλλου ὀπὸς, ἄγριον ῥίζα λεία ὁμοίως.

Scabiem vel ſcurfum.

adde vti 4. de mat. med. c. 66.

CLXXXVIII. Πληροῖ δὲ καὶ ἕλκη, ἐλ-

τυρον, κηρὸς τὸ ῥητίνη, ῥόδινον, βουνίου ῥίζα καὶ A cera & resina, rosaceum vnguentum, buntij radix & folia, aristolochia per se & cum iride, panacis denique radix cum melle.

CLXXXIX. Στελλῆ δὲ ἕλκη, ἄσβεστος, μίλτος, λεπὶς, ἶσα· ἔχινος κεκαυμένος, σμάριδος παρίχρας κεφαλὴ καιομένη, κέδρια, κηκὶς, κήρυκες κεκαυμένοι, λίθος σαπφειρος. μόλιβδος κεκαυμένος, καττίτερος, ψυπτηρία, B πᾶσα καδμία, σῶρυ, ὁ δὲ τὰ πλατέα ἀποτίθησι σκώριον λέγον. χαλκῖτις, χάλκανθος, μίσυ, διφρυγὲς, ὀθόνιον κεκαυμένον.

Excrescentes vlcerum carnes compescunt calx viua, manna & squama æris paribus mixta portionibus: erinaceus crematus, smaridis sale conditæ caput vstum, cedria, galla, buccina cremata, saphirus lapis, plumbum vstum, spodium, aluminis omne genus vstum, sory, (quod & carnes humore nimio flauescentes absumit,) scordium tritum, chalcitis, chalcanthum, misy, diphryges, linteolum vstum.

Ad carnes in vlceribus excrescentes.

CXC. Πτερύγια δὲ θεραπεύει, ἀκακίας χύλισμα καταχριόμενον, ἀλόη ξηρὰ ὑπὸ πλατομήν, ἰὸς διπλασίων μετὰ λιθαργύρου ἁπλῆς, πεντα φύλλου ῥίζα· καὶ C καταπλασσομένη, θυμάλλη ὀπὸς ὑπαχριόμενος, γλυκυῤῥίζα ξηρὰ ὑπὸ πασσομένη, ἰὸς σιδήρου σὺν ὄξει, ῥίνισμα ἐλέφαντος ὀστέου ὁμοίως, παρέχεται σὺν μέλιτι, ψυπτηρία σὺν ὕδατι· σῦκα ξηρὰ μετὰ σιδίου ῥοιᾶς ἐφθὰ καὶ μέλιτος, χαλκίτιδος καὶ λεπίδος μιγέντων καὶ ὡς ἔμπλαστρος ὑποτιθέμενον ἢ ψυπτηρίαν ἕξιν, σμυρναΐχλιον, ἄσβεστον, διφρυγὲς, ἴσα μίξας καταπλάσσου. Ἀναξηραίνει δὲ τὰ πτερύγια λεπὶς Κυπρία λεία ὑποπλασσομένη ἡμέρας ὠ.

Ad pterygia.

CXCI. Παρωνυχίας θεραπεύει, λίβανωτὸς σὺν μέλιτι, μυρσίνη κεκαυμένη σὺν κηρωτῇ, ἢ ταῖς φύλλοις ὁμοίως καταπλάσσει, ἢ D ταφίδι μετὰ μέλιτος.

Ad paronychias.

Paronychias sanant, thus cum melle, & myrtus vsta cum cerato: huius eiusdem folia similiter adhibe, aut vuam passam cum manna.

CXCII. Ἀναστομοῖ δὲ τὰ μύσταπα τῶν τιτυλωμάτων καὶ χειρίων ἕλκη, σχίλλης ὄξος σὺν μέλιτι.

Astricta labia callosorum diuturnorúmque vlcerum aperit, scillæ pars interna cum melle.

Ad aperienda callosa vlcerum labia.

CXCIII. Ῥαγάδας ποιεῖ ὁ αὐθὶς ἀφέλης ῥητίνη φρυκτὴ σὺν ῥοδίνῳ λειωθεῖσα ἀχρι γλοιωθῇ, μιγνυμένης δὲ ὠοῦ λευκοῦ E ὀπτοῦ, χιονοῦ φύλλων ξηρῶν καὶ κεκαυμένων ὑπόφορα ποιοῦσα ὁ ἐλαίῳ ὁ μολιβδῇ θύρᾳ. Ῥινῶν καὶ ὀπὶ τῶν ὠῶν ὁ δακτύλιος συνείληται σὺν πυρίᾳ ὁ ὑπὸ μύρτου.

Rimis pudendorum confert resina cum rosaceo, frixa tritáque ad strigmentitiam crassitudinem, addito eriamnum oui luteo tosto. Iuuat & aridorum hederæ foliorum vstorum cinis cum oleo in mortario plumbeo tritus. Proficit idem & ad ani fistulas, cum lana inditus.

Ad rimas pudendorum.

CXCIIII. Τὰ δὲ ἕλκη τὰ ὁ αὐθὶς θεραπεύει, βαλάνιον καταπλασσόμενον, ἀλόη, πίτυος φλοιὸς σὺν λιβανωτῷ, ἀσπαλάθου ξύλα, ἀκακίας χύλισμα, ἢ ροᾶς ἀγρίας χυλός. F

Vlcera pudendorũ sanant: balaustium impositum, aloë, pini cortex cum thure, aspalathi lignum, expressus acaciæ succus, mali denique Punici syluestris succus.

Ad vlcera pudendorum.

CXCV. Τὰ δὲ ἀλγήματα παύει, οἶνος

Dolores autẽ pudendorũ sedat

Ad dolores pudendorum.

vinum aquæ marinæ expers calens affusum, itémque fel caprinum peruunctum.

Ad nomas pudendorum. Pudendi nomis seu depascentibus vlceribus confert, misy cum aceto infusum: necnon & ea quæ deinceps capite de nomis tradentur.

Ad vermes vlcerum. Vermes in vlceribus genitos eiicit plantago trita & inspersa, similitérque caprifici vsti cinis.

Ad carbunculos. Ad carbunculos. Tribuli fólia virentia in sartagine frixa cum adipe suillo crudo terito, ac vbi priùs vlcus ipsum leniueris, impónito. Carbunculis præterea medétur hæc impósita: oleæ agrestis folia cum melle, fructus eiusdem fricti & cum melle triti, sempernium per se, plantago similiter, loliacea farina cum raphano & sale, bryoniæ radix trita cum vino, similiter & ari radix, fimus suillus siccus adhibitus, fimus columbinus cum lini semine ac melle, aspalathus tritus & impositus, vua passa cum ruta & laserc, sabinæ folia trita cum melle, lupini cocti tritique, nasturtium virens eiusdémque semen.

Carbunculos suppurantia rumpentiaque. Carbunculos verò ad suppurationem perducunt rumpúntque, suglandis seu veteris seu etiam récentis nucleus, strobili pars interna eodem modo, coriandri folia cum vua passa, papaueris corniculati folia & flores, laserpitij liquor cum ruta nitro & melle, aut etiam per se: (sed insuper pars ita obtegenda est sempernio vt adhærescat.) eruum tritum cum vino, pix liquida cum vua passa & adipe, brassicæ deniq; folia trita ex aqua.

Ad nomas putridáque vlcera. Nomis putridisque vlceribus supernenientibus ista medentur: arseni cum & calx viua cum sandaracha & charta combusta, nitrum cum calce viua & fæce vini, aut aceto vel aqua, aluminis genus omne vstum cum duplo sale, sory vstum, squamæ æris pumicisque vsti pares portiones, sal quamplurimus pice liquida exceptus, aristolochiæ radix cum resina, plantago cataplasmatis instar impósita, loliacea farina cũ raphano & sale, amygdalæ amaræ cũ melle, vua passa cũ ruta, galiopsis cũ sale, oleę germina cum

A ἀθάλασσος θερμὸς καταπλάσμενος, καὶ χολὴ αἰγεία καταχριόμενη.

CXCVI. Νομαὶ δὲ ἕλκεσι τὸ αἰδοίου ὠφελοῦσι ἔγκλυσθέντα, μίσυ σὺν ὄξει, καὶ τὰ ἑξῆς ἐπιθυσόμενα ὑπὸ νομῶν. Sufficabatur Moib legendum duabus morsied in vno adhuc nomis est acrimonia, qua ratione conueniens est.

CXCVII. Σκώληκας δὲ ἐκβάλλει τοῦ ἕλκεσι σὺν τοῖς ἕλκεσι ψηλοειδέσι, ἀρίογλωσσον λεῖον καταπλασθέν, ἢ ἐρινέου κεκαυμένου τέφρα, καταπλασσομένη. κεκαυμένου.

B CXCVIII. Πρὸς ἄνθρακας τρίβολον φύλλα χλωρὰ, καὶ τετραμμένος, καὶ σὰρξ χοίρου λειωσας ὠμὴ, τοσοῦτον μαλάξας ὅλκης, ὑπίθει. Ἄνθρακας δὲ θερμαπτόμενα καὶ καταπλασσόμενα, ἀγρελαίας φύλλα μετὰ μέλιτος, καὶ ὁ καρπὸς τριφθεὶς μετὰ ἁλὸς ἐπιτιθέμενος σὺν μέλιτι. ἀείζωον καθ' ἑαυτὸ, ἀρίογλωσσον ὁμοίως, αἷμον ἄλθορον σὺν ῥαφανίῳ καὶ ὄξει, βρυωνίας ῥίζα λεία μετ' οἴνου, ἄρου ῥίζα ὁμοίως, ὑὸς ἄφοδος ξηρὰ πλαθεῖσα, τρυγὸς ἄφοδος μετὰ λινοσπόρου καὶ μέλιτος, ἀσπάλαθος λεῖος καταπλασσόμενος, σαφὶς σὺν πηγάνῳ ἢ ὀπῷ βραθυος φύλλα λεῖα σὺν μέλιτι, θέρμοι ἑφθοὶ λῶτοι, πέρδαμοι χλωρὸν ἐπ' ἀσπάρμα. τετραμμένος, de mat. lib. 1. τρυγὸς legendũ cum Matthæolo.

C CXCIX. Πυοποιοῦσι δὲ ἐν τοῖς ἐπιπυήσεσι τοὺς ἄνθρακας, καρύου βασιλικοῦ παλαιοῦ καὶ στρεψάπου ὁ σῶλος, στροβίλου τὸ ἔσω μέρος, κορίου φύλλα μετὰ σαφίδος, μήκωνος κεφαλίδος φύλλα ἢ τὰ αὐτὰ ὀπὸς σιλφίου μετὰ πηγάνου καὶ μέλιτος καὶ μέλιτος, ἢ καθ' ἑαυτὸν (χρῶ δὲ) αἴγειον ἀφέψημα καθ' ὃ λαμβανόμενον ἔστι τοσοῦτον, ὄρμος λῶτος σὺν οἴνῳ, πάστα ὄγχα σὺν σαφίδι καὶ ὀξάλιδι, κράμβης φύλλα λῶτα ζωὰ ὀθόνῃ.

D CC. Τὰς δὲ ὑπερνομοῦσας νομὰς ἐν σηπεδόσι θεραπεύει, ἀφρόνιτρον καὶ ἄσβεστος μετὰ σανδαράχης καὶ χάρτου κεκαυμένου· νίτρον σὺν ἀσβέστῳ καὶ πίσσῃ, ἢ ὄξει, ἢ ὕδατι. τὰ δὲ σύμπαντα εἴδη πάντα κεκαυμένα ζωὰ ὁπλασίονα ὀθόνῃ, σῶρυ κεκαυμένου, λεπὶς καὶ κίσσηρις κεκαυμένη ἴσα, ἄλες ὡς ὅπου πλεῖστοι ἁλιφλόγιστοι πίσσης ὑγρᾶς, ἀριστολοχίας ῥίζα σὺν ῥητίνῃ, τρύγος ἄλευρον σὺν ῥαφάνῳ καὶ ἁλοῖν, ἀμύγδαλαι πικραὶ σὺν μέλιτι, σαφὶς μετὰ πηγάνου, γαλέα μετ' ἄλῶν, θαλία σὺν μέλιτι, γάλαν legẽdũ cum Matthæolo.

λιπι, σμαερίδος ταριχρᾶς κεφαλὴ κεκαυμένη, ἰὸς στυπτηρίας κεκαυμένης, κηκὶς καῦσα καὶ ὀξυθεῖσα, κήρυκες κεκαυμένοι· κύπρου αὐθη καυθέντα καθ' ἑαυτὰ, καὶ σὺν μέλιτι καταπλασθέντα· ἢ κυπρίας καθ' ἑαυτὴν ἢ σὺν ὑδρελαίῳ, μόλιβδος κεκαυμένος λεπὶς σιδήρου σὺν ἐλαίῳ, ἄχυ φύλλα καὶ καταπλασθέντα· στύπλοι ἐφθοὶ καὶ καταπλασθέντες. σκεπτηρίου σὺν μέλιτι, πτυσμάλλιον ὀπὸς, χαλκὸς κεκαυμένος, φακὸς κεκαυμένος, φακὸς ἐφθὸς σὺν σισύροις, θαλία σὺν ὑδρομέλιτι ἢ μᾶζα ἁλὸς λεία, ἢ σισύρα ἢ ὄξος. Κατάπλασμα δὲ ἀφεψήματα κυδωνίου, σχίνου, κυπρίσσου, μυρσίνης, χάρτου τοῦ ἐν σιλφίου ἢ ἰξύων.

CCI. Γαγγραίνας ἢ σκληρύνεις, αἶγειον ἄλφιτον σὺν ῥαφάνῳ καὶ ὄξει καταπλασσόμενον, βεβρυος φύλλα, σταφὶς σὺν ῥαφάνου φλοιῷ, ἢ ῥαφάνου φλοιὸς σὺν μέλιτι, κάρυον βασιλικὸν παλαιὸν ὃ ἐστὶν, ἢ κύπριοι ἐφθοὶ μετὰ σισύρων, λίθος ὀσφρακίτης σὺν μύρτῳ, μυρίκης φύλλα ἐφθὰ ἐν οἴνῳ λεῖα μετὰ μέλιτος, ὄρεβος σὺν μύρτῳ· ῥαφάνου σπέρμα μεῖον ὄξους καταπλασθὲν ἐξαίρει ὠτίου ῥήσιν· φάσιον σὺν μέλιτι, ὃ καὶ αἷμα θαιρᾷ· πτυσμάλλου ὀπὸς, ὃν καταχάσας ἐπιθεὶς ἐξαιρήσεις· ἢ ὀπὸς σιλφίου ὁμοίως. κατάπλασμα ἢ ἕρμιον ἀπόζεμα μετὰ συκῆς, ἢ οὖρῳ ἀνθρωπίνῳ, ἢ ὄξει.

CCII. Τὰ δὲ πεφαγεδαινώμενα ἕλκη ἰδίως τίλλει, χαμαιλέων λεῖος, ὤχρα Ἀττικὴ κεκαυμένη. Ἀρσενικὸν καὶ ἄσβεστος ἴσα πλυθέντα σὺν ὕδατι ὁμοίως ὅτι ἡμέρας λ'. ἀποχεομένου τοῦ ὅτι καθ' ἡμέραν.

CCIII. Πεπρυσμένα ἕλκη καὶ σκληρίας κακοήθεις θεραπεύει, βαλάνων δρυΐνων ῥίζα λεία σὺν ἀξουγγίῳ ὅτι τριβεῖσα· δρακοντίου ῥίζης χυλὸς, καὶ τοῖς πεπληγόσι, καὶ ἡ ῥίζα ὅτι καταπλασθεῖσα· ἄχυ ῥίζης ὁμοίως, γαλλίου φύλλα καὶ χυλὸς σὺν ὄξει, βρυωνίας λευκῆς καὶ δρακοντίου ῥίζα σὺν μέλιτι, ἐρέβινθοι ἢ ὄρεβος σὺν μύρτῳ. ἰξὸς στυπτηριωθεὶς, καρκίνων ποταμίων ἢ τέφρα σὺν μέλιτι, κιττοῦ λέπος καταπλασσόμενος· Ἄσιος λίθος, ἢ ὃ αἶγος αὐτοῦ καταπλασσόμενον, ἐπουλεῖ· σὺν μέλιτι δὲ, ἀποκαθαίρει καὶ ὄνυξ δὲ ὁ ἀπὸ τῆς πορφύρας καθυλεῖ τὰ

A melle, ſmaridis ſalitę caput vſtum, æruginem cum miſy vſto, calx vſta & aceto extincta, buccina vſta, cypri flores cremati per ſe & cum melle impoſiti, cupreſſus per ſe & cum polenta, plumbum vſtum tritum, ſquama ferri cum oleo, arı folia cataplaſmatis inſtar impoſita, itidémque beta cocta, verbenaca recta cum melle, tithymalli lacteus B liquor, æs vſtum: lens vſta, eadem cum malicorio: oleæ tenellum germen cum muria, & cum ſale tritum: malicorium cum ſale. Perfunde autem decocto lentiſci aut cupreſſi vel myrti, aut garo è ſiluris aliiſve piſcibus.

Gangrænas emarginant, loliacea farina cum raphano & ſale impoſita, ſabinæ folia, vua paſſa cum raphani cortice, aut raphani cortex cum melle, iuglandis veteſtæ nucleus, cytini cocti cum malicotio, lapis oſtracites cum melle, myrti folia in vino cocta trita cum melle, eruum cum melle, raphani ſemẽ cum aceto adhibitum, (quod D cruſtas etiam ad os vſque rumpit,) marrubium cum melle: (hoc etiam expurgat:) tithymalli lacteus liquor, quem ſcalpello factis inter ſcarifi candum vulneribus indi par eſt: laſerpitij liquor, qui eodem etiã modo vſurpabitur. Frequenter autem perfunde lupinorum decocto aut vrina humana vel aceto.

Ad gangræn. nas.

Efferata vlcera priuatim inhibent, chamæleon tritus & ochra Attica vſta: ſimiliter & arſenicũ & calx viua, ſi æquis portionib. ex aqua lauẽtur diebus triginta, effuſo quotidie quod in ſummo concreuerit.

E Ad fera vlcera.

Fraudulentis vlceribus duritiiſque malignis medentur iſta: glandium quernarum caro trita, impoſita cum axungia: dracunculi radicis ſuccus, ipſáque radix per ſe impoſita: ſimiliter & arı radicis ſuccus, ipſáque radix: galiopſis folia & ſuccus cum aceto, bryonię albę & dracunculi radix cum melle, cicer aut eruum cum melle, viſcum cũ thure, cancrorũ fluuiatilium cinis cum melle, hedera trita & caraplaſmatis inſtar impoſita: Aſius lapis aut eiuſdẽ flos inſperſus ad cicatricem deducit, & cũ melle expurgat. Sed & onyx, ſeu tegumẽtum, purpurarũ

F Ad maligna vlcera.

Concluſa Mo. bæus omittit.

Forte, καταπλασσόμενον & ſic deinc. pro ad finem vſque carpit.

insperſus, maligna vlcera perducit ad cicatricẽ: tritici ſylueſtris, quod chelidonium minus appellatur, radix ſicca & inſperſa, itidémque philetærij radix verbenaca recta cum melle, denique fotus frequés è lupinorum decocto.

Ad phagedænas.

Ad phagedænas faciunt quidem quęcunque ad maligna fraudulentáque vlcera modò cõſcripta ſunt, ſed & iſta conueniunt: aſphodeli radix cum oleo cocta & in modum cataplaſmatis impoſita, vrticæ folia cum ſale: ſal cum melle & polenta in linteolo crematum, vſque dum in carbones redigatur: bryoniæ tam albæ quàm nigræ caules & folia cum ſale adhibita, fici folia trita in vino, iſatis agreſtis & domeſticæ folia, naſturtium cum melle. Repurgant verò Aſius lapis cum cerato, rhoïs coriarij folia cum melle, paſtinacæ ſylueſtris radix ſicca adhibita, aluminis genus quoduis vſtum cum galla & aceti fæce: proficit & acetum frequenter affuſum.

¶ Ad elephantiaſin.

Elephanticos iuuat plantago cum melle partibus tumentibus impoſita, ſimiliter & verbenaca ſupina: prodeſt & ſylueſtris capræ aut hirci fel illitum: lac ſchiſton in potu ſumptum multùm iuuat elephanticos: ſic & calamintha in cibis ſumpta, eiuſdémve ſuccus epotus, lactis ſero ſuperbibito: cedria in eclegmate ſumpta. Mirè verò proficit adeps equinus, tumidis partibus illitus. In principio autem cùm primùm ſeſe patefacit Elephas, hominem in balneo triduo lauato, & in balnei exitu eius lumbos ac genas ſale ac nitro valenter cõfricato. Triduo exacto in promptu ſit oleum è ſemine peponum, quo ſimiliter ipſum affrices atque perfundas.

Ad pedum rimas.

Rimis pedum hæc indita medentur: ſcillæ medulla in oleo feruefacta tritáque cum reſina terebinthina, cãcri fluuiatiles vſti triti cum melle, polypodij radix cataplaſmatis inſtar impoſita, cornu caprinum vſtum ſeuõque caprino exceptum. Aut, mellis librá vnam, olei & ceræ ſimul liquatorum ſana tãmndẽ, lithargyri vncias quatuor

A κακοήθη ἕλκη καὶ σαπλασταῖς. πυρὸς ἀγρίου τῆς χελιδονίου λεγομένης ῥίζα ξηρὰ καὶ σὺν πλαστοῖς. φιλεταιρείου ῥίζα καὶ πλαστοῖς. σέσελι ἑφθὸν σὺν μέλιτι. Ἕρπυλλον ἀσπάζεται σὺν ἰσχάδι καὶ σὺν πλαστοῖς.

CCIIII. Πρὸς δὲ φαγεδαίνας, ποιεῖ μὲν ὅσα καὶ τοὺς κακοήθη καὶ συνηθρισμένα

B ἕλκη ἀναγέγραπται· ἁρμίζει δ' καὶ ταῦτα· ἀσφοδέλου ῥίζα μετ' ἐλαίου ἑφθεῖσα καὶ καταπλασθεῖσα, κράδης φύλλα μετ' ἀλῶν, ἄλες σὺν μέλιτι καὶ ἀλφίτοις καίεται εἰς ὀστρίου μύκητος ἀνθρακωθῆναι, βρυωνίας λευκῆς καὶ μελαίνης φύλλα καὶ ⓐ καυλοὶ μετ' ἀλῶν καὶ πλαστοῖς, συκῆς φύλλα λεῖα

C ἐν οἴνῳ, ἰσάτιος φύλλα ἀγρίας καὶ ἡμέρας. κάρδαμον σὺν μέλιτι. Ἀναπλάττει δὲ Ἄσιος λίθος σὺν κηρωτῇ, ῥοὸς βυρσοδεψικῆς φύλλα σὺν μέλιτι, παστινάκης ἀγρίας ῥίζα ξηρὰ καταπλασθεῖσα, στυπτηρία πᾶσα κεκαυμένη μετὰ κηκίδος καὶ πτυελὸς ὄξους· ποιεῖ δὲ καὶ ὄξος συνεχῶς καταπλάσμενον.

D CCV. Ἐλεφαντιάσεις δὲ ὠφελεῖ ἀρνόγλωσσος καὶ μέλι ἐπὶ τὰ ἐξωδιωμένα μέρη, καὶ βοτάνη ὁμοίως· χελιδονίας αἶγός ἢ παρδάλεως καταχριαθεῖσα ὠφελεῖ· καὶ γάλα χίου πινόμενον, ἰσχυρῶς δὲ ἐλεφαντιῶντας ὠφελεῖ· καὶ καλαμίνθη ἐσθιομένη, ἢ ὁ χυλὸς αὐτῆς πινόμενος, ὀρροῦ

E γάλακτος ὕστατα πινομένου· καὶ κεδρία σὺν λιπαρῷ πολὺ ἢ θαυμαστῶς ἐπιφέρει χάριν ἐπιχριόμενον τοῖς οἰδήμασι μέρεσι. Ἐν ἀρχῇ δ' ὅτι δῆλον ἐλεφὰς, πρόπαν ὕδατος λοῦσον αὐτὸν εἰς λουτρὸν ἡμέρας γ'. καὶ καθὼς ἐξέρχεται ἐκ τοῦ λουτροῦ, τρίβε λευκὸν ὀσφύας αὐτοῦ καὶ τὰς πλευρὰς ἄλατι πικρῷ θύ-

F ποντος καὶ μετὰ τὰς γ'. ἡμέρας ἔχε ἕτοιμον ἔλαιον ἐκ πεπόνων σπέρματος, καὶ χρῖε τὸν ὅλον ὁμοίως, καὶ ἐγχρίματίζε.

CCVI. Ῥαγάδας δὲ τὰς ἐν ποσὶ θεραπεύει σόλιδημα· σκίλλης τὸ ἔσω σὺν ἐλαίῳ ζεσθέν, καὶ ῥητίνη τερμινθίνη συλλεανθέν. καρχήσιοι ποτάμιοι κέντρις λῳοὶ σὺν μέλιτι, πολυποδίου ῥίζα καταπλασθεῖσα, κέρας αἰγὸς κεκαυμένον αἰθαλωθὲν σὺν αἰγείῳ· ἢ μέλιτος λίτρα, κηρὸς καὶ ἔλαιον συμμιγέντα ἴσα, λιθαργύρου δ'. ὀύγ-

ιλύος.

ἰσάτιος.

Ροιᾶς, ὡς οἱ πυρῆνες, σὺν ροιᾶς ἀκάνθης πόσις.

ἥπατος ἕλκεσι λεπρον. δεῖ δὲ προεκκαθαίρειν τοὺς τύλους, καὶ χρῆσθαι τοῖς φαρμάκοις.

CCVII. Συρίγγας δὲ ἐκτίλει καὶ καθαίρει ἰῷ ʃ ιϐ'. ἀμμωνιακοῦ θυμιάματος ʃ β'. κολλυριοποιήσας καὶ ἐντιθεὶς σὺν ὄξει ἢ ὕδατι, ἀμύργη ἐφαρμόσας ἐγκλυζόμενον ἐπὶ ῥίζης ἀσπάγου ἐγκλυζόμενον ἐπὶ τρὸς κάλαμος παιδ. ἄρτι ῥίζα. ἅλιμος ἐντιθέμενος. ἐπὶ ῥίζα ἢ αὐτὴ καὶ φύλλα ὡς κολλύρια ἀναπλασσόμενα παιδὶ ἢ γυναικὶ ῥαδίως ἀπαλὰν ἐνλειμένον, χύλισμα μετὰ μέλιτος ἐλαφρῶς ἐντιθεῖσα, ἡλιδμῆς χύλισμα, διὰ λάχου ῥίζα χυλισθεῖσα καὶ ἐντεθεῖσα, πύγμαι λίθου ὀπὸς, χαλκῖτις κεκαυμένη ἀναλειφθεῖσα ἀμμωνιακῷ ὡς κολλύριον, ἐλλέβορος μέλας ἐντιθεὶς καὶ μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἐξαιρεθείς. κυπαρίσσου σφαιρία λεῖα μετὰ συκίνου λείου ἐγκλυζόμενα σὺν ὄξει, ὠχρὰ ὁμοίως μετ' ὀλίγου χρώματος καὶ μίλτος ἐγκλυζομένη, σῶρι ὠμοῦ ἢ κεκαυμένου, καὶ ἔρικοι ὀμφάκινον ἐγκλυζόμενον, πεύκης φύλλα φύλλα σὺν ἁλὶ καὶ μέλιτι, κονία συκίνη ἐγκλυζομένη, τηλεφίου φύλλα ἐμπλασσόμενα λεῖα, σανδυκίου ῥίζα ξυσθεῖσα καὶ ἐντεθεῖσα. δεῖ δὲ προανατέμνειν καὶ συρίγγας σπογγιᾷ ἢ παπύρῳ ἐπισταλτικωτέρους, καὶ ὅταν καθαίρεσθαι βούλῃ τοὺς ἀνθρώπους.

CCVIII. Αἱμορραγίας δὲ ἵστησι καὶ σὺν ὄξει πραμεῖα, αἰθιοπίδος ῥίζα λεία καταπλασθεῖσα σὺν ὄξει, λυσιμάχου ποᾶ ὁμοίως, ἀλόη λεία καταπλασθεῖσα, θλασπίου ἀμπέλου λῶτος καὶ τὰ φύλλα ξηρὰ λεῖα, ἀμύγδαλα, ἀνδρόσαιμον ὑπερπλασθέν, ἀπειρίνης φύλλα ὁμοίως, ὀνείατος αἰγὸς, ὑπερον, ἢ ὄνου ἀκεύτου ὡς ἄφιπα ὑπερπλασσόμενος, μετὰ ὄξους βραχύπτερα καὶ ὑπερπλασθέντων. ποιοῦσι δὲ κεκαυμένοι καθ' ἑαυτοὺς καὶ ὄξει ἀναλειφθέντες. ἀγριόγλαυκον λῶτος, ἀράχνης ἔφος.

CCIX. Τὰς ῥήξεις τοῦ ὑπερπλαίους ἕλκους ἀστραγάλου ῥίζα καταπλασθεῖσα, ἀσφάλτος ξηρά, Ἀχιλλείου τῆς ἀνθρίνης φύλλα καταπλασσόμενα, βατράχων κάρτων ἢ πέφυκα καταπλασσόμενα, ὄνυξ καθ-

coquito ad emplastri consistentiam. Sed callos priùs repurgare oportet, sicque medicamentis vti.

Fistularum callos exedunt eas- Ad fistulas.
démque purgant quæ sequuntur: Ærugimis drach. xij. ammoniaci thymiamatis drach. ij. conformatæ in collyrium, inditæq; fistulis cum aceto vel aqua: amurca decocta & infusa: iridis radicis decoctum infusum etiam ad sinus proficit, ari radix, halimus immissus, quin & eiusdem radix foliáque in collyria conformata. Facit & tenellum marrubij virgultum inditum, vmbilicus Veneris cum medulla ceruina impositus, expressus è gentiana succus, dipsaci radix in succum soluta inditáque, liquor tithymalli lacteus, chalcitis vsta ammoniaco excepta in modum collyrij: veratrum nigrum immissum & post triduum exemptum, cupressi pilulæ tritæ cum ficu trita infusę ex aceto, ochra simili modo cum pauco vino diluto ac melle infusa, sory crudum vstúmve, omphacium infusum etiam carne explet: quinquefolij folia cum sale & melle, lixiuium ficulneum infusum, telephij folia trita illita, spondylij radix circumrasa & indita: sed prius laxandæ aperiendæque fistulæ spongia aut papyro exiccata, túmque vrendum antedictis.

Profluentem è vulneribus san- Ad hæmorrhagias ex vulneribus.
guinem sistunt hæc: æthiopidis radix trita imposita cum aceto, lysimachia herba simili modo, aloë trita inspersa, viris cortex tritus, & eiusdem folia ficca tritáque, amygdala, androsæmon impositu, similiter & aparines folia: fimus caprę aut equi velasini citravstionem instar polentæ impositus, linamentis ex aceto madentibus superimpositis: faciunt & iidem fimi vsti per se & aceto excepti, plantago trita, aranei tela.

Sanguinis per summam cutem e- Ad sanguinis per summam cutem eruptiones.
ruptiones inhibent, astragali radix more cataplasmatum impositа, bitumen aridum, Achilleæ sideritidis folia impositа, ranarum vitarum cinis inspersus, lutea cremati

Ia vino cocta & impositа, l. simili lib. 27.

Morb. ἰμπεπλασσόμενα, legendum suspicamur.

κατάπλασσε.

erus, aut diphrygis ad eundem modum inspersus, tenellum oleæ germen tritum, similitérque saluia, sulphur viuum, Idæa radix, ferri rubigo & squama, isatis tum agrestis tum satiuæ folia, cadmia trita, galla trita, cyperus, cupressi pilulæ cum aceto, thus, eiusdem manna, lichen petris innascens, myrtus tum virens tum sicca, quinquefolij radix, quoduis genus aluminis, & liquidum quidem vstum: spongia rara imbuta pice, deindéque vsta, trita & inspersa.

Ad hæmorrhagias è naribus.

Profluentem è naribus sanguinem supprimunt ista: iuncus acutus tritus naribus inditus, vrticæ foliorum succus linamentis exceptus & inditus, ac ipsa quoque folia trita fronti adhibita, chalcitis, chalcanthum vstum, flos phlei seu stœbes vstus pulueratúsque & in nares immissus, similitérque verbascum quo ad lucernarum ellychnia, vtuntur, & saluiæ folia trita, bulbi triti frontique cataplasmatis instar impositi cum porri succo vel aceto: stercus asininum simili modo, gypsum ex aqua aut oui candido toti capiti pilis nudato frontíque inductum, equiseti succus aut clymeni linamento exceptus: cochlearum caro ex aceto trita, eædem integræ cum suis testis tusæ & cataplasmatis modo toti fronti naribúsq; impositæ, cuminum tritum cum aceto inditum, ferulæ medulla cum aceto, ruta trita indita, cepa decorticata siccáque indita, coagulum tritum & illitum. Cohibetur & sanguinis è naribus profluuium, si cera mollissima aures diligenter obthurentur, occipitio cucurbitulæ adhibeantur & præputiũ filo deligetur. Vtiliter etiam frigida in aurem instillatur. Aiunt & cohiberi sanguinis è naribus eruptiones, si mororũ flos clausus nec dum apertus, priusquá decidat, folliculo ex aluta illigetur & è collo suspendatur: sed eum florem sumi oportet, qui primùm ea ætate inuentus conspectúsque fuerit.

Ad grumos sanguinis in imo corpore cõcretos.

Dissoluũt verò sanguinis ex vulneribus grumos in imo, seu in ventre, seu in vesica concretos: lixiuiũ ficulneum ex aqua bibitum, thymbra aut thymus in oxycrato, elichrysi decoctum in vino mulso: lasarpitij denique liquor tritus, ex posca aquáve potus.

A τος ὁμοίως, ἢ διφρυγὸς καὶ ἁπλασθέντος, χαμαιπιτ. ἁλλία λεία, ἐλελίσφακον ὁμοίως. θεῖον ἄπυρον, Ἰδαία ῥίζα, ἰὸς σιδήρου καὶ λεπὶς, ἰσάτεως φύλλα ἀγρίας καὶ ἡμέρου, καδμία λεία, κηκὶς λεία, κύπειρος, κυπαρίσσου σφαῖρα σὺν ὄξει, λίβανος, μάννα, λιχὴν ὁ ἐπὶ πέτρῃ πίτσῃ, μυρσίνη ξηρὰ καὶ ὑγρά, πεν- Fortè μύρσης.
B ταφύλλου ῥίζα· σμῆκτρα πᾶσα, ἢ ὑγρὰ καῦσα· καὶ σπόγγος δρασὺς πίσσῃ βεβυσμὶς καὶ καπὶς λῖπος καταπλασθέν.

CCX. Ταῖς δὲ ἐκ μυκτήρων αἱμορραγίας σίλφι, ὀξυχρόνου σὺν θυμάμιδι λεία, κόνδυς φύλλων χυλὸς σὺν μοτοῖς σὺν θύμβρα, ἢ αὐτὰ τὰ φύλλα λῶα καὶ τὸ μετώπου σὺν Huiusce lunæ semen desiderat Paul. lib. 4. cap. 53.
C θύμβρα, χαλκῖτις, χάλκανθον καυθὲν μύρσινον ἢ ἄμπελον καυθὲν σὺν ξηρᾷ, ἐν μοτοῖς σὺν θύμβρᾳ ὁμοίως, φλόμος ὁ εἰς τὰ ἐλλύχνια, καὶ ἐλελίσφακου φύλλα λῶα, βολβοὶ λῶοι καὶ τὸ μετώπου καταπλασθέντες σὺν τραγείου χυλῷ ἢ ὄξει, ὠὰ ὁμοίως, γύψος σὺν ὕδατι, ἢ ὠὰ τὸ λευκὸν καὶ ἀχριάδι καθ' ὅλης τῆς κε- ὁμοίως fortè ad ea, quæ, quod sequitur, referri debet.
D φαλῆς ψιλωθείσης καὶ μετώπου. ἱππουρίδος χυλὸς, ἢ ἀσκαυκλομύου σὺν μοτοῖς ἀναληφθεὶς· κοχλίου σὰρξ σὺν ὄξει, ἢ ὅλοι κοπέντες σὺν τῷ ὀστράκῳ καταπλασθέντες καθ' ὅλης τῆς μετώπου ἢ τῆς μυκτῆρος χύμενον σὺν ὄξει σὺν θύμβρᾳ λῶον, παρθένος δὲ μέσον σὺν ὄξει, πτηνοῦ σάρξ ἐδέδεν λῶον, κρόμμυον ἀσκαυκλομύου, Mambanus. ut herbula, pars sanguinaria. Actius.
E λεπιδὶ καὶ σὺν τηλίνῳ ξηρὸν, πίτυα λελυθεῖσα καὶ ἐμπλασθεῖσα· ἐπίχυσις καὶ τὸ αὐτὸ κηρῷ ἅπαξ λειωθὲν ἔμπλασμα· ὀπὸς μήλης, καὶ τῷ σὺν βαδυσίῳ ἑλκύσθαι αὐτοὺς ἢ ἢ πόδα ἐπιδεδεμένῳ ῥάμμασι σώζεται ἢ ὠφελίμως καὶ εἰς ὃ οὖς ὕδωρ ψυχρόν· φασὶ δὲ ἐπίχυσθαι ταῖς ἐκ μυκτήρων αἱμορραγίας, μόρων αὖγος μεμυκότος τοῦ τῶν πισσῶν σὺν διαυλοῦ· κυλικὶ καὶ ἀσκαπλο- Fortè, auriculæ, vel potiùs auriculæ
F μένου πλαχίλῳ. δεῖ δὲ λαμβάνειν τὸ φερόμενον ἐκ ἐκείνῳ τῷ ἡμέρᾳ βύρσῃ ἢ ὀρεινῇ.

CCXI. Διαχεῖ δὲ θρόμβους τοὺς ἐκ πνεύμονος τὸ βαθὴ γινομένους, ἢ κυλίκια, ἢ κύστεως κοιλίαν σὺν ὕδατος πολλοῦ, θύμβρα ἢ θύμος σὺν ὀξυκράτῳ, ἐλιχρύσου ἀπόζεμα σὺν οἰνομέλιτι, ἢ ὀπὸς σιλφίου λεῖος σὺν ὄξους κράτῳ ἢ ὕδατι πινόμενος.
G

Τῶν περὶ τὴν ἕδραν παθῶν βοηθήματα.

Sedis affectuum remedia.

CCXII. Ἐφίστησι δὲ πλεοναζούσας αἱμορῤῥοΐδας· ἀλόη καταπλασσομένη, λεπὶς σιδήρου, λιβανωτίδος φύλλα, λίθος Ἀραβικός. (ἔστι δὲ ὅμοιος ἐλέφαντι.) μάλιβδος κεκαυμένος, ὀξυκράτου ἀποσβεννύμενος καὶ τῶν λοιπῶν σμιγμάτων. Ἐπιχριεῖ δὲ αἱμορῤῥοΐδας τοῦτο χρῖμα· ἀκακίας κιρρᾶς ⊲ .δ'. μαλιβδαίνης ⊲ .δ'. πραγαχάνθης ⊲ .ϛ'. χυθ' ἓν λεανθέντα ἕκαστον, εἶτα μίξας καὶ δύσας ὕδατι ἔμπλασον εἰς μοτὸν ἢ ἔριον, καὶ ὑπόπιθι. Προσκλύσματι δὲ χρῶ, χαλκάνθῳ, ἢ κηκίδι καὶ συμφυτείᾳ, ἴσους λείους, διηθημένους θέρμῳ ὀξυκράτῳ καὶ ὕδατι, καὶ τοῖς προσκλυζομένοις.

Moib. ἢ videtur legendū.

Hæmorrhoidum abundantiam sistunt, aloë impositа, squama ferri, libanotidis folia, lapis Arabicus, qui quidem ebori similis est, plumbum vstum, fotus è posca cæterisque spissamentis. Hoc verò statim cohibet hæmorrhoidas: Acaciæ fuluæ, plumbaginis, an. drach. iiij. tragacanthæ drach. ij. seorsim tritas misceto & aqua irrigato, tandémque linamento aut lanæ illinito atque imponito. Proluito autem chalcanthi aut gallę & aluminis æquis partibus tritis, dilutisque calido oxycrato & aqua.

Ad hæmorrhoidas cohibendas.

CCXIII. Ἀνασυρεῖ δὲ αἱμορῤῥοΐδας· μυῤῥωτὸν ἐσθιόμενον, ἁμαρᾴκινον ἢ ἴελινον τριβόμενον. ἐρεθίζει αὐτὰς δὲ χολὴ βοεία ὡς βάλανος τρωγομένη· καὶ πρὸ τῆς χειρουργίας ἢ τριβομένη, κατέχει καὶ οὐκ ἐᾷ ἐκπίπτειν αὐτάς. ὁμοίως κυκλαμίνου χυλός.

Hæmorrhoides intritum ex allio, quod myrtotum vocant, in cibis sumptum, & amaracinum aut irinum circumlitum. Prouocat & ipsas fel bubulum, glandis instar subditum: quin & ante chirurgicā operationem circūlitū, eas cohibet, nec sinit inuerti. Idē præstat & cyclamini succus.

Ad sistendas euacuationes.

CCXIIII. Αἱμορῤῥοΐδας αἴρει θαυμαστῶς τόδε· κωνείου ξηροῦ ⊲ .β'. ὑοσκυάμου χυλίσματος ⊲ .δ'. συμφυτείας ῥιζῆς ⊲ .ϛ'. χαλκάνθου κεκαυμένου ⊲ .β'. σανδύκων ⊲ .ά. ψιμυθίου ⊲ ά.κηρωτείῳ ῥοδίνῳ ἀναληφθέντα καὶ ὑπιτιθέντα. ῥοιᾶς ὀξείας λεπὶς λεία σὺν ὄξει ὑπιτιθεμένη· αἱ δὲ ἐσώτερον ὦσιν, ὡς μάζιον κοιήσας ἐσιέναι. ποιεῖ δὲ καὶ τοῦτο θαυμαστῶς· σανδαράχης ⊲ .ά. ἀρσενικοῦ χρ. ⊲ .ά. ὑπιχρίσας πυρίσκῳ, ἀποτεχρῶν ἀποπίπτει τὸ ἡμιώλιον, ἀποξηραινόμενον αὐτῶν καὶ ἐν τῇ βάσει ἀποκυλιόμενον. αἱνεῖ δὲ καὶ τῇ κύκλῳ χρίεται κηρωθέν. γίνεται δὲ τὸ πλῖον ἐν ἡμέραις πέντε.

Ad easdem sistendas.

Hæmorrhoides mirabiliter hoc tolluntur remedio: Cicutæ aridæ drach. ij. succi hyoscyamo expressi drach. iiij. aluminis scissilis, chalcanthi vsti, an. drach. ij rubricæ Sinopicæ & ceruſſæ, an. drach. j. cerato rosaceo excipiantur & imponātur. Aliud: Mali Punici acidi cortex tritus cum ſacero imponatur. Quòd ſi delitescant interiùs hæmorrhoides, ex eodem medicamento cōformatam massulam indito. Præclarè facit & hoc: sandarachæ, auripigmenti, an. drach. viij. his lixiuio stillatitio dilutis ægrum priùs aptè compositum locatúmque oblinito. Sic intra semihoram hęmorrhois arefacta & à radice sua quasi deuoluta deperit excidítque. Interim verò circa hęmorrhoida in orbem ceratum illinatur, fiátque id in sole vel ad ignem.

Ad sedis inflammationes.

Sedis inflammationibus ista cōferunt: panis ex melicrato impositus, sonchi succus in vellere appositus, malua seu cocta seu cruda adhibita, similiter & althææ, quam hibiscum Latini vocant, radix in melicrato decocta, amaracinum circumlitum, melilotus cum œsy-

po & butyro, laserpitium cum aceto, magydaris cocta, pix liquida cum æquali ceræ portione, rubigo ferri cum cerato.

Ad fœdas dolores.

Doloribus sedis subueniunt, peucedani liquor illitus, myrrha cum melle, senecionis flos cum vino albo, hederæ flos eodem modo, helxine denique per se & cum pane.

Ad reprimenda condylomata.

Condylomata verò reprimunt, oleæ flores ex aqua impositi, aloë cum dulci vino peruncta, ballotes folia imposita, rubi folia & succus illitus atque cum cerato rosaceo impositus, quinquefolij radix adhibita, cypri folia eodem modo: similiter & cupressi folia cum polenta, & ex eorundem decocto fotus: libanotidis folia simili modo: melilotus cum vino dulci coctus, ammixto oui vitello: melilotus & flos iuncí odorati cum butyro, aut lini semine, aut seride aut fœnogræco, aut capitibus papaueris: cotonea mala cocta cum pane aut polenta, myrti folia vsta cum cerato, lycium confricatú, amurca decocta simili modo, fomentum è muria. Illinitur & spuma quæ efferuescenti melli supernatat. Confert & melilotus aut iuncus odoratus cum butyro subactus, itémque plantaginis folia cum sale imposita, lanæ succidæ crematæ & exceptæ rosaceo & adipe anserino, impositæ denique propolis priùs emollita.

Ad eadem vel lenda, vt & ficus.

Condylomata ficósque auferunt, arsenicum illitum, bulbi in calidis cineribus torrefacti tritique, & cum vstis mænarum capitibus impositi, calx viua & fæx visco exceptæ spleniique modo impositæ.

Ad prægrandes ficus.

Tollunt & ista prægrandes ficos: suffitus è thure sex diebus adhibitus, rubigo ferri cum dulci vino illita, anethi seminis vsti cinis insperſus, atramentum sutorium & malicoria ex aceto trita: alumen liquidum aut sciſſile vstum, itidem ex aceto tritú: melanteria cum sale, alumen denique liquidum cum pane, vino & apio.

A ὑσσώπῳ καὶ βουτύρῳ, σίλφιον σὺν ὄξει, καὶ ὕδωρ ἐψηθὲν, πίσσα ὑγρὰ σὺν κηρῷ ἴσα, σιδήρου ἰὸς σὺν κηρωτῇ. *oleóru potius vi & cap. 220. Mesb. μαγνησίαι ἰφ. Mesb.*

CCXVI. Τὰ δὲ ἀλγήματα ὠφελεῖ πάχεσθαι ὀπὸς θριδακίνου, σμύρνα σὺν μέλιτι, ἑλιχέρσιος αἶδος σὺν οἴνῳ λευκῷ, κισσοῦ αἶδος ὁμοίως, ἐλξὶν καθ' ἑαυτὸν καὶ σὺν ἄρτῳ.

B

CCXVII. Τὰ δὲ κονδυλώματα φίλλει, ἐλαίας ἄνθη μὲθ' ὕδατος καταπλασθέντα, ἀλόη σὺν γλυκεῖ καταχριόμενον, βαλλωτῆς φύλλα καταπλασθέντα, βάτου φύλλα καὶ ὁ χυλὸς καταχριόμενος, καὶ σὺν ῥοδίνῳ κηρωτῇ ὄφεως πῆμα· πενταφύλλου ῥίζα καταπλασθεῖσα· κυπαρίσσου φύλλα ὁμοίως· κυπαρίσσου φύλλα ὁμοίως σὺν ἀλφίτῳ, καὶ τὰ ἀφεψήματα δὲ αὐτῶν πυρία· λιβανωτίδος φύλλα ὁμοίως· μελίλωτος σὺν οἴνῳ γλυκεῖ ἐφθὸν, μιγνύσας αὐτῷ λεκιθου ὠοῦ· ἢ μελίλωτος καὶ σχοίνου ἄνθος μὲ βουτύρου, ἢ λινοσπέρμου, ἢ σέριδος, ἢ τήλεως, ἢ κυδώνια. ἢ κυδώνια ἑφθὰ σὺν ἄρτῳ ἢ ἀλφίτῳ, σμύρνης φύλλα κεκαυμένα σὺν κηρωτῇ, λύκιον δεχθὲν ἀμόργῃ ἐψηθὲν ὁμοίως, ἄλμη πυριωθὲν. καταχρῆται δὲ καὶ τῷ ἀφρῷ τοῦ ἐψηθέντος μέλιτος. πρὸς δὲ μελίλωτον, σχοῖνος ἀναπλασθεὶς σὺν βουτύρῳ. καὶ ἀρνογλώσσου φύλλα σὺν ἀλοὶ καταπλασθέντα, ἕρια οἰσυπηρὰ κεκαυμένα καὶ αἰγαλῆφθέντα ῥοδίνῳ & σίαπι χλιαίνοντα, τοῦ πόλις τοῦ μαλαχθεῖσα καὶ θριπηθεῖσα. *μυῶν ἢ καὶ μελίλωτος καὶ σχοίνου. μυρσίνης.*

C D E

CCXVIII. Αἱρεῖ δὲ κονδυλώματα & τὰς σύκης· ἀρσενικὸν θριπλασθὲν· βολβοὶ ἐν θερμῇ κονδιᾷ ὑπεπνεύσαντες, καὶ λεῖοι καταπλασθέντες, μὲ μυρίδων κεφαλῶν κεκαυμένων. ἄσβεστος καὶ πὺξ ἐξῆς αἰγαλῆφθέντα, καὶ ὡς κατλιώσιν θριπτεύεται.

F

CCXIX. Τὰς δὲ ὑπερμεγέθεις σύκης ἀναιρεῖ· λιθάργυρος πισσοῦ ἡμέρας ς'. ἐπιθυμᾷ, ἰὸς σιδήρου σὺν οἴνῳ γλυκεῖ θριπτευθεὶς, ἀνθος σπέρματος κεκαυμένου ἢ πέφεως καταπλασσόμενον, χρήσιμος καὶ σίδια σὺν ὄξει λεῖα, συπαρία ὑγρὰ· χρὴ κεκαυμένη ὁμοίως σὺν ὄξει λεία, ἐλατήριον σὺν ἀλοὶ, συπαρία ὑγρὰ μὲ ἄρτου καὶ οἴνου καὶ σελίνων.

G *Malua, κατασκευάζεται abundat, vel addendum l. Mesb. μελανηρία, Mesbæum.*

CCXX. Σύκης δὲ ἀφαιρεθείσας καὶ θύ- A
μους καὶ κονδυλώματα θεραπεύει, καὶ σὺν
ἁλὶ πάλιν αὔξεσθαι τίφρα κλημάτων, ἢ καὶ
αἱ ἐκ τῶν μεγάρων ῥίπτα, σὺν ὄξει καὶ ζε-
στῷ λεαινόμεν.

CCXXI. Τὰς δὲ ῥαγάδας θεραπεύ- Ad rimas fe-
ει διφρυγὲς σὺν ῥοδίνῳ, ἀλόη σὺν γλυκεῖ κα- dis.
τεγχριομένη, διφάκου ῥίζα λεία σὺν ἐρυθρᾷ B
σὺν κηρωτῇ, καρκίνων ποταμίων καέντων ἡ
τίφρα σὺν κηρωτῇ ῥοδίνῃ ὑποτεθεῖσα, ὕ- ὕνεως potius.
αιμα σὺν μέλιτι καὶ βουτύρῳ, πίσσα Moib.
ὑγρὰ καθ' ἑαυτήν, σίριδες χυλὸς σὺν μαί-
νῃ· πορφύρας ὄστρακον καὶ κύαμος, ἴσα
κηρωτῇ ἀναληφθέντα ὑγρᾷ. μελάνθιον Huc ista refert
μὲν ῥοδίνου τεθὲν ἐλαίου ὑποτιθέν. C Mo banus, quæ
in manuscripto
codice habétur
in principio ca-
pitis sequentis.

CCXXII. Ταῖς δὲ σήψεσι τῶν ἕδρας ὠ- Ad internas se-
φελεῖ ἐλκώσεις, ἀμόργη ἐνθεῖσα ἢ ἐγχυ- dis vlcera.
θεῖσα, ἄκανθοι τὸ δυσώδες ἄχρι ποιεῖ ἄκους
ἐπιθέμενον.

CCXXIII. Σκώληκας δὲ καὶ ἀσκα- Cum medica-
ρίδας φθείρει κέδρια τεθέντα, ἀξούγγιον παλαιὸν ὡς βάλανος ἐπιθέμενον. D mento aliquo o-
mari qui a'natis
experte: quasi le-
gerit τὸν ἄνισον
ἄνους. Moiba-
nus mauult Ge-
nerus dic igitur
βάλανος.

CCXXIIII. Ταῖς δὲ προπτώσεις τοῦ Ad sedis pro-
δακτυλίου φίλυρα κεδρία τεθεῖσα θεραπεύει, lapsum.
ἀκακίας χύλισμα, βάτου χυλὸς καὶ τὰ φύλλα κα-
τάπλασμα. ἀναγαλλὶς ἢ ὁ κυνόσβατος
αἷμος ἔχουσα καταπλασθεῖσα. ἢ σὺν ἐρυ-
θρᾷ, ἐρεθίζει δὲ ἐκπίπτοντα κισσίδος ἀφέψημα
ἢ κυδωνίου ἢ μυρρίνης, ἢ σίδιον ἐγκαθιζό- E
μενον, ἢ ὀξύκεστον. λιβανωτίδος φύλλα
καταπλασθέντα, κυδώνια ἐφθὰ λεῖα ἐπι-
τεθέντα, μυρσίνη ὁμοίως καταπλασθεῖσα,
ἢ καρκινθαλασσία τεθεῖσα ἐπιθέμενα, σίκυος
ἀπὸ τῆς ἀγρίας ἀμπέλου ἢ κύπρου φύλ-
λα καταπλασθέντα.

CCXXV. Παραπείσματα δὲ ἢ διαλυ- F
κωμένα χαλκῖτις μετ' ὕδατος τεθεῖσα καὶ
ἐπιχριομένη πρὸς ἕλκη ὠφελεῖ, μολίβδαινα σὺν ὄξει καὶ ῥοδίνῳ λείᾳ, ἢ λιθάργυρος ὁμοίως.

Τῶν περὶ τὰ νεῦρα καὶ τὰ ἄρθρα παθῶν βοηθήματα.

CCXXVI. Σκέπασματα δὲ ἐπὶ τῶν καλα- G
πλασμάτων ἄγκα σκόρδα σὺν ἀλφίτοις καὶ ὄξει καὶ κηρωτῇ, ἀγρίου τε παιδίρωος φύλλα, κρίδης φύλλα

Ablatos ficos, thymos & condylomata sanat, neque rursum pullulare sinit, cinis sarmentorum aut etiam vinaceorum ex aceto illitus. Tubercula fe-dis vi ne re-pullulent.

Rimas sedis sanant, diphryges cum rosaceo, aloë cum passo illita, dipsaci radix trita cerato excepta, cancrorum fluuiatilium vstorum cinis cum cerato rosaceo impositus, œsypus cum melliloto & butyro, pix liquida per se, seridis succus cum manna, purpuræ testa cum æquali portione myrrhæ cerato excepta liquidioue, melanthium cum rosaceo tritum & impositum. Ad rimas fe-dis.

Internis sedis exulcerationibus opitulantur, anurca cocta & infusa, acopum fœtidum ex lana pannóve impositum. Ad internas se-dis vlcera.

Vermes & ascaridas necant: cedria subdita, & axungia vetus glandis instar indita. Ad ascarides.

Procidentem sedem reprimunt illita hæc: expressus acacia succus, rubi succus & folia imposita, anagallis prædita cæruleo flore adhibita: (nam quæ puniceo est flore, sedem proritat euertitque:) decoctum gallæ aut cotoneorum, aut myrti, aut malicorij ad infestus vsurparum, lyti & oxycratum: libanotidis folia imposita, cotonea cocta tritáque & adhibita, myrtus simili modo imposita, torpedo marina appositа, flos vitis syluestris, cypri denique folia imposita. Ad sedis procidentem.

Intertrigines aut exulcerationes confestim iuuantur, chalcitide trita ex aqua illitáque: similiter & plumbagine aut lithargyro ex aceto & rosaceo trita. Ad intertrigines.

Ad neruorum articulorúmque affectus remedia.

Luxatis medentur hæc more catapla smatum impositа: viticis semen cum sale, nitro & cerato, anchusæ folia cum melle ac polenta, acanthi pæderotis folia, vrticæ Ad luxata.

folia

folia cum plurimo ſale, ſal cum farina & melle, amurca decocta cum lana ſuccida, cinis ſarmentitius & è vinaceis cum aceto, ſimũ ſuillum aridũ cum cerato, arcij radix, calx viua cum pice aut axungia veteré: bulbi cum melle, interdũ etiá admixto pane, in iis præſertim quibus eſt tenella cutis: farina ex aceto cocta, cum ſtercore ſuillo trita, helioropiũ maius, arundinis quę phragmites dicitur radix cũ aceto, nuces iuglãdes cũ ruta & melle, lilij radix cocta in vino aut trita cũ melle, fœnigręci farina cũ hordeacea farina ſoluta hydreleo, narciſſi radix trita cũ melle, nitrũ cũ cerato, oxyacãthæ radix cocta, ſimiliterq; polypodij radix, ſymphytũ cũ cerato, cinis ſarmentitius cũ axũgia aut oleo. Vehemẽtibus porro luxationibus medetur ſtercus calẽs impoſitũ, itémq; cypri decoctũ affuſum.

Ad relaxatos artus.

Ad relaxatos artus proſunt, acaciæ ſuccus aqua dilutus & affuſus, ſpinæ Ægyptiæ decoctum, aut rubi, aut myrti, aut lentiſci, aut fagi, aut radicum vlmi vel corticis: elate palmarum trita cum cerato, oleum myrtinum aut lẽtiſcinum frequenter circumlitum, malicorium impoſitum, myrti denique folia cum cerato myrtino impoſita.

Ad laſſitudines & intertrigines ex itinere.

Laſſitudines diſſoluit impoſitum ammoniacum cum aceto & cyprino oleo exiguóque nitro: ſic & herbæ quam apion Græci vocant ſemen cum oleo, laurinum oleum, crocinum vnguentum, ſampſuchinum, ſpuma nitri, nitrũ cum oleo vino & aceto. Virgam porrò viticis aut artemiſiam qui ſecum habeant manibúſve geſtẽt viatores, negantur intertrigines inguinum feminúmve ſentire.

Ad tetanum curandum, quæ conuulſiones aſſumenda.

Tetano laborantibus aliiſq; conuulſis conueniunt hęc in potu ſumpta: pulegiũ cum ſale & melicrato, iridis drach. ij. cũ melicrato, erinacei affricata caro eodem modo, cyprinũ caſtoriũ, braſſica cocta in cibis ſumpta, oxalidis radix in vino, laſer cera obuolutũ inſtar catapotij deuoratũ, ſeſeli, ſyluęſtris paſtinacę radix & ſemẽ: ſpinę albę ſemẽ pueris qui conuelluntur auxilio eſt. Confert & damaſonij foliorum drach. j. cũ melicrato, itémque ra-

A φύλλα σὺν ἁλὶ πολλοῖς, ἅλες σὺν ἁλὶ ὑρῷ
ἢ μέλιτι, ἀμόργη ἐφτὴ σὺν ἴσῳ οἴνου πη-
ρῷ ὑπτιάσιος· πέφρα κλήματίνη, τὴ ὀπ
γιάρτων, μετ' ὄξους. ὗος ἄφοδος ξηρὰ με-
τὰ κηρωτῆς, ἀρκεύθου ῥίζα, ἄσβεστος σὺν πί-
σῃ ἢ ἀξυγγίῳ παλαιῷ. βολβοὶ μετ' μέλι
τος, οὕτοι καὶ ἄρτου μεγαρικοῦ, μάλιστα δ'
B ὅτι τῷ πυφερο χρῶται, ἄλευρον μετ' ὄξους
ἐφθὸν μεῖ ἀφόδου ὑὸς λῷον, ἡλιοσκόπιον δ'
μέσα, καλάμου φραγμίτου ῥίζα συν ὄξ.
κώρυα βασιλικὰ σὺν πηγάνῳ καὶ μέλιτι,
κρίνου ῥίζα ἐφθεῖσα ὸ οἴνῳ ἢ λειοθεῖσα ἐν
μέλιτι, τίλινον ἄλευρον σὺν ὠμῇ λύσῃ, ναρ-
κίσσου ῥίζα λεία σὺν μέλιτι, νίτρον σὺν κη-
C ρωτῇ. ὀξυακάνθου ῥίζα ἐφθὴ, πολυποδίου ῥί-
ζα ὁμοίως, συμφύτου σὺν κηρωτῇ, πέφρα κλη-
ματίνη σὺν ἀξυγγίῳ ἢ ἐλαίῳ. Ταὼ λίθῳ
γράμματα ἰᾶται ἀπόπατος θερμὴ κατα-
πλασθεῖσα, κύπρου ἀφεψήματα κατάπ-
λευμα.

CCXXVII. Κεφαλαγκόμενα δ' ἄρθρα,
D ἀκακίας χυλὸς αἰγύπτιος ὕδατι καὶ κατάπ-
λευμα· ἀκάνθης ἀφέψημα ἢ βάτου ἢ
μυρσίνης, ἢ φοίνικος, ἢ σφένδυλου, ἢ πτελέας· τῆς
ῥιζῆς ἢ τῆς φλοιοῦ· ἐλατίνεια μετ' κηρωτῆς,
ξύλον μυρσίνινον ἢ φοίνικος περιχριόμενον συνε-
χῶς, σιδία καταπλασθέντα, μυρσίνης φύλ-
λα σὺν κηρωτῇ μυρσινίνῃ ὑπόπλασμα.

E CCXXVIII. Κόπους λυσ· ὑπόπλασμα
τοῦ ἀμμωνιακὸν μετ' ὄξους καὶ κυπαρίσσου ἐ-
λαίου, καὶ ἐλαίου νίτρου, ἀνήθου σπέρμα μετ'
ἐλαίου, δάφνινον ἔλαιον, κρόκινον, σαμψύχι-
νον, ἀφεψίζειν, νίτρον σὺν ἐλαίῳ καὶ οἴνῳ καὶ
ὄξ. Φασὶ δ' ὸ ταῖς ὁδοιπορείαις μὴ πρα-
πεύεσθαι τοὺς βυβῶνας, ἄρχου ῥάδου ἢ τῆς
F θαλασσίας κραπυμάδος.

CCXXIX. Τετανικοῖς δὲ καὶ τοῖς ἄγ-
λοις ἑλκομένοις ἁρμόζει ἐν ποτῷ· γλήχων μὲν
ἁλὸς ὲ μελικράτου, ἕρπος < ὲ. σὺν μελικρά-
τῳ, ἔχις ἐχῖνος ἑστιζετυμένη ὁμοίως, κύπρινον,
ἢ καστόριον. κράμβη ἐφθὴ ἐσθιομένη, ὀξαλί-
δος ῥίζα σὺν οἴνῳ, ὀπὸς σιλφίου ἐμπλασθεὶς
κηρῷ αὐτὸ καθαπτέον, σίσυλι, σταφυλῖνος ἀ-
κρεῖς ῥίζα ὲ σπέρμα· ἀκάνθης λευκῆς σπέρ-
μα παιδίοις σπωμένοις βοηθεῖ· δαμασωνίου
< ἀπ' φύλλων ἐν μελικράτῳ. καρδάμου ζω-

Galeno.

Aprugnum ſimũ cum cerato refacto commendatur, a de mat. med cap. 98. Galeno, lib 4. de mat. med. cap. 107.

Scorpiurum dictum lamiat Actius 4 Tetrab. ſerm 2. cap. 78.

Forte, vulnerati. veteri, vt ap Actium loco citato.

ουχὶ legit Molbanus. Paulus lib 4. c. 56. & Oribaſ. 5. ad Eunap. cap. 40 τὸν ἰὸν τῆς ῥίζης τῶ φλοιοῦ, corticis radicum vlmi. Idem ſcribit, Molbanus ex lib. 2. de mat. med. cap. 150.

Locus obſcurus. Forte ἀχίου ἰδίου.

κατηφίας.

Melim ipsum. μὰς ἁλοὶ καὶ ἐλαίῳ· ἠρτημένος δὲ ἐσθιόμενος, καὶ αὐτοὶ δὲ βάπτοντες, καρκίνου ζωμὸς ὁμοίως, ξυλοβαλσάμου τεμάχιον σὺν οἴνῳ. τοὺς δὲ προσφάτους σπασμοὺς θεραπεύει, σίσελι μετὰ μελικράτου πινόμενον.

A narum ius sale & oleo conditum in cibis sumptum, ac ipsæ quoque ranæ: cancri iusculum eodem modo, xylobalsamum denique ternûm obolorum pondere in vino. Sed recentes conuulsiones sanat seseli cum melicrato potum.

CCXXX. Συντρίμματα δὲ ὄφεως τετμήμου καὶ σπασμωδῶν θύμων ἁρμόζει, κασόριον σὺν ἐλαίῳ, ὑσσώπιον ὁμοίως, πευκεδάνου ὀπὸς, πισσέλαιον, σάμψυχον σὺν ὠμῇ λύσῃ, χνία συκίνη σὺν ἐλαίῳ. ἁρμόζει καὶ ἔλαιον συνεχῶς καταχριόμενον ἐπὶ τῶν αὐχένων, καὶ εἰς πλεῖον ἔμβασιν τοῦ ἐλαίου κατάβασις ἐπιμένουσα ἐπὶ τῆς ἕξεως ὀπίσω χρόνον ἱκανὸν, ὠφεληθῶσι καταβρεχθέντες τὸ κατὰ τὸν τένοντος δέρμα.

B tur: castorium cum oleo, simili modo & hypericũ, peucedani liquor, picinum oleum, sampsuchum cum farina hordeacea, lixiuium ficulneum cum oleo. Conuenit & frequens ceruicis illitus ex oleo, & in ipsius olei solium descensus. Quòd si tensio longiore tempore perseuerarit, cutis iuxta tendinem vsti o inuabit.

Ista vero in tetano & conuulsiuis tremoribus conueniẽter inunguntur: castorium cum oleo, simili modo & hyperici, peucedani liquor, picinum oleum, sampsuchum cum farina hordeacea, lixiuium ficulneum cum oleo. Conuenit & frequens ceruicis illitus ex oleo, & in ipsius olei solium descensus. Quòd si tensio longiore tempore perseuerarit, cutis iuxta tendinem vstio inuabit.

Ad conuulsiones affectus. Ad tetanos.

CCXXXI. Τρεμώδεσι δὲ ἁρμόζει πόμα, κασόριον μὲν μελικράτου, λαγωοῦ ἐγκέφαλος ἑφθὸς ἐσθιόμενος. κράμβη ἑφθὴ ἐσθιομένη, ἀλθαίας ῥίζας ἀφέψημα. δαμασωνίου φύλλων < ά. μὲν μελικράτου. θριδακίνιον σὺν ὕδατι πολὺ πινόμενον.

Tremulis hæc assumpta prosunt: castorium ex melicrato bibitum, coctum leporis cerebrum in cibo sumptum, brassica cocta esitata, althææ radicis decoctum, foliorum damasonij drachma vna cum melicrato, cupatorium denique ex aqua largiùs haustum.

Ad tremores.

CCXXXII. Γλώσσης λύσεσι, D ἁρμόζει ὄπος, ᾧ ὀποφύλλου μὲν ῥοφήματος λαμβανομένου, καὶ σαφὶς ἀγρίας καὶ πέπερι καὶ σίνηπι λῆμμα ἀσώματα.

Linguæ resolutæ confert laser, itémque laserpitij semẽ in sorbitione sumptum: sic & staphisagria, piper & sinapi, cõmanducata.

Ad linguæ paralysin.

CCXXXIII. Παραλυτικοῖς δὲ πιεῖν πολλὰ, καρδαμώμου < ά. σὺν ὕδατι ἢ οἴνῳ. καππάριος τῆς ἐκ τοῦ ἀπίου καρποῦ < ϛ'. σὺν οἴνῳ· τῆς ῥίζης ὁμοίως· καὶ ἐπὶ πλεῖον ἐν ὕδατι ἢ μελικράτῳ ἢ οἴνῳ· πενταφύλλου ῥίζης χυλὸς· καὶ ἀρθριτικοῖς ἁρμόζοντα συντρίμματα· ὑπτιτηδείως δὲ καταμασᾶσθαι ὑπὸ σφαλυσσοῦς, κόστος σὺν ἐλαίῳ, καὶ τὰ θερμαντικὰ τῆς ἀκόπου.

E Paralyticis hæc assumpta subuenient: cardamomi drachmi vna ex aqua aut vino, radicis aut seminis capparis quod pericarpiis pyri forma referẽtibus cõtinetur, drachmij. in vino, castoriũ ex aqua aut melicrato, aut etiã vino: denique quinque foliij è radice succus. Porrò quæ arthriticis cõueniunt inunctiones, etiam in resolutione rectè adhibentur. Benefacit & costus cum oleo, quæque ex acopis calfaciendi vi pollent.

Paralyticis bibenda & inungenda.

CCXXXIIII. Ποδαγρικοῖς δὲ ἀρθριτικοῖς πινόμενα ὠφελεῖ ἀμώμου ἀφέψημα, ἀνδρόσακες μὲν ὕδατος, καὶ χυμὸς ἐκ κενταυρείου λεπτοῦ χύλισμα, μύσου ἀπόζεμα, πήγανον ἄγριον σὺν ἀνήθῳ ἀπεψημένον· ὀποφύλλου καὶ ὄπος σὺν ἕψῃ λαμβανόμενος· χαμαίδρυος ἀπόζεμα, βετονίκης πόα μετ' οἴνου πινομένη. ὠφελεῖ καὶ ὑγιεινοφαγία.

F Podagricis & arthriticis hæc assumpta subuenient: amomi decoctum, androsaces cum aqua, succus è centaurio minore, mei decoctum, ruta sylvestris cum aneth o feruefacta, laserpitij semen cum cibis sumptum, vti & eiusdem liquor, chamædryos decoctum, betonica herba in vino pota. Iuuat & esus viperarum.

Ad arthriticos cæterum remedia.

CCXXXV. Κάεα χειρόμακτα ὑπὸ ποδάγρας καὶ ἀρθρίτιδας ὠφελεῖ, (ἃ καταπλάσματα ὅτι ἐπὶ τέλει τῆς κεφαλῆς·) καὶ καταπλασμάτων ἐπιτιθέμενα, ἢ καὶ ἐπιχεόμενα, ἃ καὶ ἐπὶ τέλει τῆς κεφαλῆς·

G Podagras & arthritidas iuuant quæ sequuntur, partim illinenda, partim cataplasmatum more imponenda, partim etiam affundenda, vti quæ sub finem capitis com-

Ad eadem, quæ sequuntur.

memorantur: Calx viua trita acéto ſubacta & impoſita: inungi verò oportet oleo aut cerato, vitandæ exulcerationis gratia: calx viua & teſta æquis portionibus aceto & roſaceo exceptæ aut axungia: liquor papaueris cum aceto & roſaceo inunctus, dolores quidé quam primùm ſedat, ſed pedes & graues & ad motum ineptos reddit: verba ſci tenerrima folia cum bulbo, polenta & aqua impoſita: capparis qua veſcimur in aqua macerata tri táque, dein cũ oleo ad cerati conſiſtentia redacta & ex linteolo impoſita: ægilops aut ſemperuiuum cum hordeacea farina impoſitum, marrubium cum ſale, bulbi cum melle; populi nigræ folia in aceto cocta, ſanguis menſtruus inunctus: ſambuci caules cum foliis triti, additis marrubio & adipe: hyoſcyami folia, ſal cum oleo: amurca olei recens caléns que affuſa, aut cocta illitáque: ammoniacum cum pice arida emollitum, androſaces adhibitum, ſtercus bubulum calens impoſitum, ſtercus caprinum tritum cum axungia aut veteri caprillo adipe, ſpuma nitri & thus cum axúgia: myrrha & peucedanũ, ſtyrax; opium & hyoſcyamus æquis partibus cũ cerato: ari radix cũ fimo bubulo & aceto, Perſicæ mali folia cũ axungia, aſphodeli radix cũ poléta; roſaceo & aqua, cicutę ſemẽ cum lithargyro, leucoij radix cũ aceto cocta, libanotidis folia cũ aceto & loliacea farina, Aſius lapis tritus cũ farina freſa: papaueris liquor cũ lacte muliebri, croco & cerato roſaceo mixtus & impoſitus: folia etiá papaueris, itémq; capita cũ polẽta impoſita, etiá additis hyoſcyami foliis: hęc eadẽ excepta hordeacea farina redigenda in paſtillos, qui exiccandi ſunt, &, cùm vſus poſtulauerit, aceto diluendi; opopanax cum vua paſſa cibaria: chelidonij, quod ſyluestre triticũ appellatur, radix cõtrita: ſagapenũ cũ oleo inúctũ, ſeris cũ pollíne polétæ, aut apiũ, aut cichorium, aut portulaca, aut ſolanũ, aut perdiciũ: ſeſaminũ oleũ cucumeris ſyluestris radix in aceto cocta: rubigo ferri cũ aceto & roſaceo: ſcoria ferri in aceto feruefacta & affuſa:

A νη ἀδίκους λεία ὄξει φυσᾶλίσαι ἢ ὑπτιάζῃσαι. ὑπηρείδῃ δὲ ἐλαίῳ ἢ κηρωτῇ πρὸς ὃ μὴ ἀκούσθαι. ἢ ἄδετον καὶ ὄσπραχυ ἴσα μετ' ὄξους ἢ ῥοδίνου ἀναλημμένα, ἢ ἀξουγγίου ὀπὸς μικτοῦ μὲν ὄξους καὶ ῥοδίνου καταχρίεσθαι· παύει δὲ δυσκινήτους καὶ βαρεῖς τοὺς πόδας. ἐπίθεμα δὲ πόας ἀπίνους ὑ-

B πὸ. φλόμου τὰ ἁπαλώτατα τῶ φύλλα, μετὰ βολβῶν καὶ ἀλφίτου καὶ ὕδατος καταπλασσόμενα. καὶ κάπριος ἰὼ ἐσθιόμου βεβρεχὼς τὸ ὕδατι καὶ τεθρυμμένος, εἶτα ἐγκλυσθεὶς μετ' ἐλαίου ὡς κηρωτῇ, καὶ τὸ ὀδόντιον ὑπτιάζῃσα. αἰγίλωψ, ἢ ἀείζωον σὺν ἀλφίτῳ ἀμύρῃ καταπλασθὲν, τὸ ἄσιον μὲν ἀ-

C λοᾶ, βολβοὶ μετὰ μέλιτος, αἰγίλωψ φύλλα ἐν ὄξει ἑφθά, αἷμα καταμήνιον καταχριόμενον, ἀκίδες καυλοὶ σὺν τοῖς φύλλοις λεῖοι μετὰ ῥασίνης καὶ σίαπος, ὄσπυάμου φύλλα, ἀζὲς σὺν ἐλαίῳ, ἀμύρῃ ἢ αἶγος πρόσφατος· θερμὸς κατὰ πλευρὰν ὃς ἢ ἔφιππος καταχριόμενος, ἀμμωνιακὸν σὺν πίσσῃ ξηρᾷ μαλαχθὲν, ἀμφό-

D τερα καταπλασσόμενον, ἀπόπατος βοὸς θερμὴ καταπλασσομένη· αἶγος ἀπόπατος λῆος σὺν ἀξουγγίῳ, ἢ αἰγίλωπι παλαιῷ σίαπι· ἀφρόνιτρον καὶ λιβανωτὶς σὺν ἀξουγγίῳ· σμύρνα ἢ πάνακες, σύραξ, ὄπιον, ὑοσκύαμος, ἴσα σὺν ἀμύρῃ ἢ κηρωτῇ· ἀσαροῦ ῥίζα σὺν βολβίτῃ ἢ ὄξει, Περσικῆς φύλλα σὺν ἀξουγγίῳ, ἀσφοδίλου

E ῥίζα σὺν ἀλφίτῳ καὶ ῥοδίνῳ καὶ ὕδατι, κωνείου σπέρμα σὺν λιθαργύρῳ, λευκοΐου ῥίζα σὺν ὄξει ἑφθή, λιβανωτίδος φύλλα σὺν ὄξει καὶ αἰγείῳ ἀλθάρῃ, λίθος Ἄσιος λᾶος ὃν ἐρεγμῷ· μήκωνος ὀπὸς σὺν γυναικείῳ γάλακτι καὶ κρόκῳ ἢ κηρωτῇ ῥοδίνῃ, μυρρίνῃ καὶ ὑπτιάζῃσα. Καὶ τὰ φύλλα δὲ καὶ αἱ κεφαλαὶ σὺν ἀλφίτῳ καταπλασσόμεναι, μιγνυμένων καὶ ὀσπυάμου φύλλων. δεῖ δὲ αὐτὰ καὶ ἀλεύρῳ κριθίνῳ αἰγαλαμβανόντα ξηραίνεσθαι ὡς ἐγχίσκους· ὅτι δὲ τῆς χειρὸς ὄξει σμηκτέον. Ὀποπάνακος μετὰ σαφίδος ἐδωδίμου. χελιδονίου, τοῦ καλουμένου πυρροῦ ἀγρίου, ῥίζα λεία, σκαάφιον σὺν ἐλαίῳ καταχριεῖν. Σίελος μετὰ πάλης ἀλφίτου, ἢ σίλφιον, ἢ κισσηρίου, ἢ αἰδράχνη, ἢ τρύχνου, ἢ πηγάνου. ἢ σπόδιον ἔλαιον, σὺν ἀγρίας ῥίζα ὃν

Haec verba Moibanus praecedēti remedio adiungit, cùm videantur ad ſequens potiùs referri.

oleo excepta, Moibanus. Videtur autem in χελιδονίου legendum Geſnero. Malim κοινὸν, aut quid ſimile.

ἐ ἀνθέμου καὶ σπονδύλου πόα καὶ ἀνθέμου ἐ σπονδύλου πόα καταχριόμενα, ἐ ἀνθέμου ἀφροῦ καταχριόμενα, ex lib. 1. de mat. med vbi tamen poſterius remedium non ad pocagricos & arthriticos commendatur, vt primus, ſed ad tumentorum ſcabiem. Geſn.

ὄξει ἑφθῇ, σιδήρου ἰὸς σὺν ὄξει καὶ ῥοδίνῳ, σιδήρου σκωρία ὄξει ζεσθεῖσα ἢ καθυπτιαζομένη,

σκόρδιον μετ' ὄξους δριμέως καταχριόμενον ἢ καταπλασσόμενον σὺν ὕδατι, σίαρ αἴγλοι σὺν αἰγὸς σπερμάτοις ἢ πράσῳ ἢ σύρακι, ἢ σὺν χιονῦ φύλλοις λείοις ἢ κισσηρίου, συκῆς ὀπὸς μετ' σπόδιος ἀθήρας ἢ ὄξους, σαρκίδες ἐκλειχμαρισμέναι μετ' ἀλφίτων, ἀσφάλτος πεσσομένη μετ' ἀμύλης λύσεως ἐφ' ὑπ', τυρὸς ἁπαλὸς καταπλασσόμενος, A B

σικυωνίου Μοίβαιος.

χράμβης πυρωτάτης τὰ φύλλα καυλίνια ἐναλιφθέντα κηρωτῇ χωρὶς ἰῦ. πανὶ λευκῷ ἐλαίῳ χυλὸς κατάπλασμα, καὶ αἱ λεπταὶ ἐλάαι καταπλασσόμεναι, ἰσχύλης ἐγχρυσείσης πυρὶ καὶ ὀπὴ ἱσάνθη ἐσώθη καταπλασσομένη λῆρον, μυελὸς ἀλκίων καταπλασσομένη σὺν ἀλεύρῳ αἰγείῳ καὶ μελικράτῳ. φύκης, ἢ βρύον θαλάσιον, μελισσόφυλλον, μανδραγόρου ῥίζα σὺν ἀλφίτῳ καταπλασσομένη, ἢ πήγανον, σίναπι σὺν μέλιτι, βάλανος μυρεψικὴ σὺν πάλῃ ἀλφίτου, γάλα γυναικὸς μετὰ κυπείου, χαλᾶς καιόμενος ἢ τέφρα μετ' ὄξους, γλήχων μετ' ἀλφίτου, ἑλξίνη σὺν τραγίῳ σίαπι ἢ κηρωτῇ, ἡλιοτρόπιον τὸ μεγάλου τὰ φύλλα σὺν τοῖς καυλοῖς· θαψίας χυλὸς καταχριόμενος ὠφελεῖ ὀλίγον, ἐφ' ὧν τὴν ὀπτοφαίδη βούλῃ ῥευματίσαι· θεῖον ἄπυρον σὺν ὕδατι καὶ νίτρῳ ὁμοίως, καστόριον σὺν ἐλαίῳ συγχριόμενον, κολλύρια ξύσματα λῆα καταπλασσόμενα, χράμβης ὠμῆς χυλὸς μετὰ τηλίνου ἢ φακίνου ἀλεύρου ἢ ὄξους, ἢ ἀχράδων ἄλευρον σὺν χρίθινῳ ἢ ὀξῒ, αἴρινοι ἀθήρινοι φυραθὲν ἀφεψήματι κωδίων. Καταπλάσσεται ὠφελίμως ἐπ' αὐτῶν, ἰσχυλίδιον σὺν ἄλμῃ ἐψηθὲν τὸ ἀφέψημα, θαλάσσατα θερμά, ἰτέας φύλλων καὶ φλοιοῦ ἀφέψημα.

Ροπὴ χὴ ἴδιον ἀχράδος σὺν ἀλεύρῳ κριθ. Modo.

CCXXXVI. Πόσεις δὲ πρὸς ὀπτὴν καὶ σκληρὰν καὶ διαστροφὰς τῶν νεύρων λύουσιν ἀμμωνιακὸν σὺν πίσῃ ξηρᾷ ὀπτηθὲν, βδέλλιον σίλφῳ ἀσίτου μαλαχθὲν, κάνναβις ἀγρία καταπλασθεῖσα, σύραξ μαλαχθεῖσα σὺν σίλφῳ, σησαμοῦν καταπλασθέν. C D E F

CCXXXVII. Ἰσχιαδικοὺς ὠφελεῖ πότιμα· ἐλιχρύσου ἀφέψημα, ἐρυθρόδανον σὺν οἴνῳ (ἄγχει δὲ αἷμα διʼ ὕρων. λύει δὲ διὰ καθ' ἡμέραν καὶ πίνοντα.) ῥύσμου σὺν οἴνῳ. σμυρνίου σπέρμα ἐμέσαι, καρδάμου καὶ ἀ- G

Dioscor. vide Anacard. cap 188. σὺν μέλιτι

ad podagricorum tophos ac nodos.

ad ischiadicos potui commoda.

scordium cum acri aceto illitum, aut cum aqua cataplasmatis more impositum: seuum caprillũ cum baccis caprę, croco & styrace, aut cum hederæ perdicinę foliis tritis: fici liquor cum trimestris tritici farina & aceto, vuæ passæ quibus exempta sint vinacea cum lacte, bitumẽ cum cruda farina hordeacea hydrelæo subacta coctũ & illitum; caseus mollis pro cataplasmate impositus, brassicæ amarissimæ folia vsta exceptáq; cerato cyprino: benefacit & oliuarũ albarũ succus affusus, ac ipsæ quoque oliuæ albæ pro cataplasmate appositæ, rapi sub cineribus cocti pars interior trita & imposita, glans vnguentaria cum farina lolij & melicrato adhibita, fucus muscúsve marinus, apiastrum, mandragoræ radix imposita cum polenta, ruta, sinapi cum melle, glans vnguentaria cum polline polentæ, lac muliebre cum cicuta, mustelæ crematæ cinis cum aceto, pulegium cum polenta, helxine cum hircino adipe vel cerato, heliotropij maioris folia cum caulibus: thapsiæ succus iis paulisper illitus, in quibus fluxionẽ ad summam cutem euocare placeat: sulphur viuum cum aqua & nitro similiter, castorium cum oleo illitum, cucurbitæ ramenta trita & adhibita, brassicæ crudæ succus cum fœnigræci lentiúmve farina & aceto: farina è molitis pyris syluestribus cum hordeacea & aceto, lolij farina subacta cum decocto capitum papaueris. Ista etiam vtiliter fotus vice affunduntur: raporum in muria elixorum decoctum, aqua marina calens, salicis foliorum & corticis decoctum.

Tophos podagricorũ neruorúmque collectiones seu nodos dissoluunt hæc: ammoniacum cum arida pice impositum, bdellium ieiuni saliua emollitum, cannabis syluestris imposita, styrax saliua emollitus, sesamũ denique adhibitum.

Ischiadicis auxilio sunt hæc in potu sumpta: chrysi decoctum itémque rubiæ cum vino: (sed hoc sanguinem per vrinas educit: bibẽtem verò quotidie lauari oportet,) eryfimõ cũ vino, smyrnij semen eodẽ modo, nasturtij seminis drach. j.

cum vino, hypericum, ſeminis capparis quod pericarpiis pyri formá referentibus continetur drach. ij. (ducunt vero ſanguinem:) cortex radicis capparis drach. j. pondere ſimili modo: papaueris cornuti radix herbáve acetabuli menſura decocta in aquæ heminis quatuor ad dimidias: iridis radix cum paſſo, rutæ ſylueſtris & domeſticæ drach.j.cum anethi decocto aut vino: ſuccus è ſpartij ramulis ſimul & foliis pluſculis diebus in aceto maceratis móxque tuſis expreſſus, cyathi vnius menſura bibitus: ſymphytum petræum coctum in aqua mulſa, quinqueſolij è radice ſuccus: abrotoni decoctum, eiuſdémque ſeminis drach.j.cum vino: agarici drach. j. cum vino, æthiopidis decoctum in vino, polemonium cum vino: arctij radix cum vino, ac eius decoctum: cétaurij decoctum, itidémque althææ radicis: ammoniaci drach.j. cum melicrato vel aqua: (ſanguinem verò per vrinas educit:) hyperici aut androſæmi drach.ij. cum heminis aquæ mulſæ tribus, (copioſum ſtercus ac pituitam educunt:) iuniperi baccæ cum vino, aſparagi radicis decoctum ac ſemen ipſum, bitumen inſtar catapotij deuoratum, balſami fructus cum melicrato, hederę terreſtris folia terna diebus quadragenis ſumpta, chamæpeuces drach.ij. cum vino, ſagapeni binæ drachmæ ternis diebus ſumptæ cum aqua.

Ad iſchiadem curanda.

Iſchiadicis etiam iſta commodè clyſteribus infunduntur: garum è piſcibus ſalitis, item è ſiluris: decocta iridis, centaurij minoris, colocynthidis, ſimilitérque radicis ariſtolochiæ ex aqua: thlaſpios ſemen tritum inditum, aut etiam in aqua decoctum: leontopetali radix decocta ex aqua, ſal ſeu nitrú cum melicrato, ſal cum ptiſſanæ cremore, ſuccus è ſparto pluribus diebus aqua marina macerato deindéque tuſo expreſſus iniectúſque, qui quidem ſanguinem ducit: colocynthidis medullæ in furfurum decocto maceratæ. Plurimùm etiam iuuantur iſchiadici, ſi quis infuſo priùs enemate ex vino, eorum ſedi expreſſum ſylueſtrium cucumerum ſuccum immittat: ſiquidem ſanguinem etiam ducunt.

A σιὼ οἴνῳ, ἰσχιακόν. καὶ πάρεως τῶ ἐκ τῶν ἀπίων καρποῦ < ϛ'. αἷμα ὑ ἄγειση· ἢ τῆς ῥίζης τῶ φλοιοῦ < α'. ὁμοίως. μήκωνος κεφαλῖδος τῆς ῥίζης, ἢ τῆς πίας ὀξυβαφον ἑψηθὲν σὺν ὕδατι κό.δ'. εἰς τὸ ἥμισυ· ἴριος ῥίζα σιὼ γλυκεῖ. πήγανον ἄγριον καὶ ἡμέρι σιὼ ἀνήθου ἀφεψήματι < α'. σιὼ οἴ-

Rutæ domeſt. & ſyl. drachmæ cũ decocto anethi aut cum vino. Moſchion.

B νῳ. ἀσπαρτίου ῥαὰ ῥάβδους σιὼ τοῖς φύλλοις ἐν ὄξει βρέχων πλείονας ἡμέρας, ἔπειτα κόψας ἐ ἀφυδίσας, ἢ πιφύτινα κύαθον. σύμφυτον πέτραιον ἑψηθὲν σιὼ ὑδρομέλιτι, πεντα φύλλου ῥίζης ὁ χυλός. ἀδιανοῖνον ἀφέψημα, καὶ τῶ καρποῦ < α'. μετ' οἴνου. ἀγαρικοῦ ξέ. α'. μετ' οἴνου, αἰθιοπίδος ἀφέψημα

χυλίσας, ὕδει.

Actius, ὑπομίλλατι.

Moſchion < α'. Dioſc. j. de mat. med. cap. 1. ternis obolis contritum ell ex aceto mulſo. Forte, πεντα φύλλου ῥίζης ὁ χυλός. Moſchion: quæquam & Plinius montanum quendam polygonon agnoſcit ſchiadicis peculiare, lib. 27. cap. 11.

C μετ' οἴνου, πολύγονον μετ' οἴνου, ἄρκευθου ῥίζα μετ' οἴνου καὶ τὸ ἀφέψημα, κενταυρείου ἀποζεσμα, ἀγγαίας ῥίζης ἀφέψημα. ἀμμωνιακοῦ < α'. σιὼ μελικράτῳ ἢ ὕδατι. ἄγει ὑ αἷμα δι' ὕρων. ὑπερικοῦ ἢ ἀνδροσαίμου < ϛ'. σὺν μελικράτῳ κό.γ'. ἄγουσι δὲ κόπρον πολλὴν καὶ φλέγμα. ἀρκευθίδες μετ' οἴνου,

αὐτοῦ, ὑσοῦ. Moſchion legit κεφαλαῖς ſeddãdas.

D ἀσπαράγου ῥίζης ἀφέψημα καὶ ὁ καρπὸς, ἄσφαλτος αὐτὴ καταπότιον λαμβανομένη, βαλσάμου καρποῦ ἓξ σιὼ μελικράτῳ, χαμαιπίτυος φύλλα τρεῖς ὀβολοὶ ἡμέρας μ'. χαμαιπίτυος < β'. μετ' οἴνου. σαγαπήνου < ϛ'. μὲ ὕδατος ὀβολοὶ ἡμέρας γ'. λαμβανόμενα.

Τρία, Moſchion. Dioſc. 4. de mat. med. ὅσον τριῶβολος ὁ ὕδατι κυάθοις τρισὶ. tribus obolis in aquæ cyathis tribus.

ἐν ὑδρομέλιτος, cum aqua mulſa, Dioſc. j. de mat. med. cap. 171.

E CCXXXVIII. Κλυσμοὶ δὲ ἁρμόζουσιν ἐπ' ἰσχιαδικῶν· γάρος ἐξ ἰχθύων ταριχηρῶν καὶ σιλλύραν, ἴριος ἀποζεσμα, κενταυρείου τῶ λεπτοῦ, κολοκυνθίδος, ἀριστολοχίας ῥίζης ὁμοίως σιὼ ὕδατι, θλάσπιος σπέρμα λῦσον ἐσθὲν ἢ καὶ ἑψηθὲν ἐν ὕδατι, λεοντοπετάλου ῥίζα ἀφεψηθεῖσα ἐν ὕδατι, ἅλες ἢ

F νίτρον σιὼ μελικράτῳ, ἅλες σιὼ πτισάνης χυλῷ, κόπρος θαλάσσης βρέξας ἐφ' ἡμέρας εἶτα ἐγκέψας ἢ χυλίσας, ἔνιες. αἷμα ὑ ἄγει. κολοκυνθίδος ἐντερίων τὸ πιτύρων ἀφεψήματι ἀποβραχεῖσαι. ὠφελοῦσι ὑ λίαν εἰ προενκλύσας τις αὐτοὺς· τὸ οἴνῳ κλύσματι, σικύους ἀγρίους ἐναποθλίψῃ τῷ

ἐν οἴνῳ

G δακτυλίῳ, αἷμα ϛδ ἄγουσι.

CCXXXIX. Μετὰ δὲ κλῦσαι πυῖς τοῦ νάπυος μέχρι πυρώσεως ἐπιθήμωνι μὲ χηρωίνης ζωιώτης κηρῷ λίτρ. ά. χυπαρίττ λίτρ. γ. ὀποπάνακος γό. β'. ἰσ ἄλλῳ γό. ά.

Post infusa enemata præclarè faciet sinapi quousque feruorem excitet adhibitũ cũ eiusmodi cerato, è ceræ lib. j. cyprini lib. ij. opopanacis vnc. ij. [in alio exemplari vnc. j.]

CCXL. Καταπλάσσειν δὲ ἐπ' ἰσχιαδικῶν, πύρινον ἢ κρίθινον ἄλευρον ἐψήσαντα μὲ ὄξυκράτου καὶ πίσσης, αἴειν ἄλευρον ἐφθὸν μὲ μελικράτου καὶ λινοσπέρμου, καὶ νίτρου, καὶ συκῆς ἐφθῶν. ἢ στεμφύτερον σπέρμα, κολοκυνθίδος ἴσα. μυροβάλανος σὺν μήκωνος χυμῷ καὶ αἰείνῳ ἀλφίτοις, τῆλις μὲ ἀρίνης ἀλεύρου, καὶ ὀπὸς συκῆς μὲ ὄξους, πίσσα σὺν ὄξει ὀθονίῳ, καὶ γύψος ἐφθὴ, καλάμου ῥαγμίτου ῥίζα μετ' ὄξους. καλαμίνθη μετ' οἴνου. ὑπερφαίνων. λεπίδιον ὁμοίως, ὡς τέταρτον ὥρας ὑπτιάζεσθαι. δεῖ δὲ θερμῷ ὑποκλύζειν αὐτούς. πυῖς δὲ καὶ κάρδαμον σὺν ὄξει καὶ ἁλσὶν ἴσοις, στελίνου φύλλα σὺν οἴνῳ ἐφθέντα. θέρμινον ἄλευρον σὺν ὄξει. Τοὺς δὲ ἐρχομένους ἰσχιάδας παρθησμὸς θραπτικὴ ἄγει ἀπαλλαγῆς. καὶ τὸ σύγχυσμα τῶν σμύρνης, ἀφρονίτρου, πεπέρεως, ἰσχύος ὑποστάθμης, ὄξους αὐτάρκως· ἢ σῦκον, νάπυ, νίτρον, κολοκυνθὶς, ἴσα ἀφεψήσαντα καὶ στυπτηρίζειν. ἢ θύμον, ἢ θύμβρον μετ' οἴνου καὶ ἀλφίτου, ἢ κολοκυνθίδος χλωρᾶς· ὁ χυλὸς αἱαμισγόμενος. σίλφιον λεῖον, ἢ πελτίδιον σὺν ἐλαίῳ ἀναβρύβεσθαι. σκαμμωνίας ῥίζα σὺν ἀλθύρῳ κριθίνῳ κατάπλασσειν. ἀσπάρτου δὲ ὄξει βρέχειν ἐφ' ἡμέρας ἡμέρας, καὶ κοπὶν, καὶ χυλιεῖν, καὶ μικρὸν νίτρου καὶ σύναλφον φέρειν, πυῖς καὶ πρὸς τὰ σύντριμμα τῶν πόρων. πυῖ καὶ ὁ τῶν σωματιμπόρων δρόπαξ, συνεχῶς πρὸς ὑπόλυσιν· ἔστι δὲ πίσσα ὑγρὰ μὲ ξηρᾶς πίσσης ἐψηθεῖσα, ἢ πρὸς ἔσω. μήκωνος ἀγρίας φύλλα καὶ κωδεῖαι σὺν ἀλφίτῳ κατάπλασσειν. δεῖ δὲ καὶ ξηραίνειν αὐτὰ μίσγοντα ἄλευρον, καὶ πανσπέρμια ἐρχόμενα, ὑπερφαίνειν καὶ ἀποφαίνειν· ὅτι δὲ τὰς χρείας, ὄξει ἀναλύειν. πυῖ δὲ καὶ κρίθινον ἄλευρον μετ' ἀφεψήματος κωδείων ἢ μελικράτου.

Iſchiadicis cataplaſmatum more imponuntur iſta: triticea hordeacéave farina cocta cum poſca & pice: loliacea farina cocta cum aqua mulſa, lini ſemine, nitro & ficubus coctis: ſiſymbrij ſeminis & colocynthidis pares portiones: glans vnguentaria cum aqua mulſa & lolij farina, fœnumgræcum cum farina loliacea, fici lacteus liquor cum aceto, pix cum aceto inducta linteolo, pollis decoctus, arundinis phragmitis radix cum aceto: calamintha cum vino, (ſummam cutem adurit:) lepidium ſimiliter ad horæ quartam partem impoſitum, (ſed ægros deinde aquæ calidæ balneo immergi oportet.) Facit & naſturtium cum aceti & polentæ pari quantitate, apij folia in vino decocta, lupinorum farina cum aceto. Incipientes iſchiadas ſanant ad liberationem vſque ferulis inflicta verbera, itémque hoc linimentum, è myrrha, ſpuma nitri, pipere, vnguenti irini ſedimento & aceti modo ſufficienti. Aut: ficus, ſinapi, nitrum, colocynthis æquis partibus decoquantur, fiátque medicamentum. Aut: thymus thymbráve cum vino & polenta, aut admixto colocynthidis virentis ſucco vſurpentur. Confert etiam laſerpitium tritum aut peucedanum cum oleo affrictum, ſcammoniæ radix impoſita cum farina hordeacea, expreſſus ſpartio in aceto pluribus diebus macerato tuſóque ſuccus addito nitro inunctus, (hic etiam facit ad neruorum diſtentionem.) Prodeſt & dropax mangonum frequenter adhibitus, qui quidem conſtat è liquidæ ſimul & aridæ picis æquis partibus coctis: ſyluestris papaueris folia ſimul & capitula impoſita cum polenta: eadem etiam admixta farina ſiccanda & in paſtillos redigenda, qui reponantur, vſúque poſtulante aceto diſſoluantur. Facit & hordeacea farina cum decocto capitum papaueris aut aqua mulſa.

CCXLI. Γυείαν δὲ ἰσχιάδος καὶ τῶν ἄλλων ἀλγημάτων ἱκανῶς συνεργοῦσαν

Fomenta quæ tũ in iſchiade, tũ in doloribus aliis auxilij plurimũ afferunt:

Post eadem fomentum.
Iſchiadicis ad eadem cataplaſmata.
ſtaphiſagriæ legendum coniicit Mouſſonus.
ἀφρονίτρου Dioſc. lib. 5. de mat. med. cap. 85 & Plin. lib. 20. cap. 23.
Forte, τῆς χαμαιαίγειρου. Mouſſ.
Ad iſchiadem ſomenta.

armentalis bouis fimum foliis inuolutum, & cinere feruenti calfactum inducito linteolo, atque imponito. Fotus etiam vicem præstant sal torrefactus saccellis inditus & milium, seu per se, seu etiam simul mixta adhibeantur: similiter & panicũ. Sunt & vsui furfures cũ lauri foliis & muria aquáve marina vel aqua mulsa cocti, saccis è densiore panno paratis similiter inditi.

Ad omnium vstionum varia genera.

Conferunt & ischiadicis vstionis huiusmodi: Fimi caprini ferventes pilulas imponito ei cauo quod est inter pollicem & indicem, infuso tamen prius oleo, aut substrata priùs lana oleo imbuta: atque sic vrito, donec vstionis sensus per brachium ad coxendicem perueniat. Aut: è luto formatum orbiculum assis magnitudine, digiti vero crassitie, dolenti loco imponito, huicque bacillum candentem apprimito, quoad æger vstionem amplius tolerare vix possit. Aut, protensam protractámve longius cutim loco affecto vicinam ignito stylo diuidito, interiecto duorum digitorum interuallo. Afri incensam pyramidem è loti ramentis, sulphure viuo & elaterio conflatam dolenti parti applicant, substrato prius duplici linteo fasciáve, aut tenui testa. Marmaridæ vstionem administrant circumpositis parti humentibus liguis oleaginis, quæ non quidem incendunt, sed ita calfaciunt, vt humorem exudent, qui deinde in partem affectam guttatim extillet. Parthi verò plumbeum tubulum vtrinque per tusum & ansarum dolentibus locis imponunt, obducta priùs ipsius tubuli basi subacta farina, vt ne oleum, quod tubulo indendum est, præterfluat: vestibus vero ipsum diligenter circuntegunt, vt ne guttis destillantibus partes vicinæ lædantur. Tùm postea feruentia cauteria quadraginta aut quinquaginta subinde, immittunt, dum circa partem mediocrem æger sensum vstionem: sed & interim frigida faciem illius abstergunt, ob sudores ex feruore superuenientes. Porrò & iccircò circumiectis vestibus probè muniendæ vicinæ partes, neque nimiùm implendus oleo tubulus, vt ne id effervescens parte superna refundatur, illáque adurat. Et de his quidem hactenus: reliqua proximè sequenti libro prosequemur.

A βοὸς νομάδος περίσφατον ἀπόπατον εἰσυλήσας φύλλοις, καὶ θερμάνας ἐν θερμοσποδιᾷ, ἐμπλάσας εἰς ὀχίνιον δέπας. ἄλες φρυκτοὶ ἐν σακκῳ, ἢ κέγχρος, ἢ ἀμφότερα μιχθέντα, ἢ ἔλυμος ὁμοίως. ἢ πίτυρα ἐφθὰ ζέοντα δάφνης φύλλοις καὶ ἅλμῃ, ἢ θαλάσσῃ, ἢ μελικράτῳ, ὁμοίως εἰς σάκκους καὶ ἐπιθέμενα. *Barbadum.*

B να ἐκ πυκροῦ πεποιημένου ῥάκους.

CCXLIII. Καύσεις ἰσχιαδικὰς ὠφελοῦσιν αὗται. σπουδάζουσι αἱγὸς παρείσας δέπας ἐπὶ ὃ μέσον τῆς ὑρωὴ τὸ αὐτίκα χεὸς χοῖλον, ἔλαιον περιυπέχασα, ἢ ὄριον ἐλαίᾳ βρέξας καὶ ὑπόζωσις, πυρώσαι ἕως αἱ ὃ ὀφθαλμοὶ τοῦ βραχίονος αἴσθησις δέπας τῷ ἰσχίῳ ἕλκῃ. ἢ πηλίνοι κυκλίσκοι ποιήσας μέγεθος ἀσσαρίου, βάθος δὲ δακτύλου, δέπας δέπας ἀλγοῦντα τρῶσι. ἔρει δὲ κατ' αὐτὰ πεπυρακτωμένοι βακτηρίοι, ἄχρις αἰσθήσεως δυσαναχέτου. ἢ ἀποτείνας τὸ δέρμα κατὰ ἀλγοῦντα πόροι, διαίρει χαραφίᾳ πεπυρωμένῃ ἐν διδακτύλιαίου διαστήματος. C Λίβυες δὲ πυραμίδα ποιησάμενοι ἐν λωτοῦ ῥισμάτων καὶ θείου ἀπύρου καὶ ἐλατηρίου, δέπας θάσιν δέπας τὸ ἀλγοῦν μέρος, περιπτύξαντες διπλοῦν ὀθόνιον, ἢ ταινίδιον, ἢ λεπτὸν ὀστράκιον, ἐφ' ὧν δέπας θάσιν ἡμμένῃ τῇ πυραμίδι. Μαρμαρίδες ὑγροῖς ξύλοις ἐλαίοις περιχυθεῖσι παίουσι φλόγα μηνοειδῆ αὐτὰ ὥστε μὴ καίεσθαι, θερμαίνει δὲ καὶ ἔνικμα γίνεται. Πάρθοι δὲ μολιβδῶν σωλῆνα ποιησάμενοι ἀπυθμένιον, ἔχοντα σώματα, δέπας τὰ ἀγγεῖα δέπας θάσιν, περιτρίψαντες τῇ βάσει τῆς σωλῆνος ὀστράκῳ, πρὸς μὲν τὸ μὴ διεκρυῆναι τὸ ἔλαιον. περιβάλλουσιν ἱματίοις δέπας μὴ βλάπτεσθαι τὰ ἐπιῤῥέοντα μόρια. ἔπειτα καθάπερ ζεστὰ καυτήρια μὴ ἐᾷ. ἄχρις αἱ ὃ αἰσθήσεις τῆς τοῦ τόπου λήγῃ. περιμάσσουσι δὲ καὶ τὸ περίσσιον ψυχρῷ ὕδατι, ἀφ' οὗ ἐν τῇ θερμασίᾳ δέπας ἡμένους ἱδρῶτας. Ἐπ' ἀφ' ὅτου περιβεβλῆσθαι δεῖ, καὶ μὴ λίθῳ πληροῦν τὸν σωλῆνα· ὑπερχεῖται γὰρ ἐν τῇ ζέσει. Καὶ περὶ μὲν τούτων δέπας ποιητέον. Τὰ δὲ λοιπὰ οἷς ἐξῆς διελθοῦμεν.

In parte quæ cauo est in humbus pollicis, Marbanus, qui pro duplo vsurpatur apud regii Lat. v. de orat. rect. legitimo, ἀνὰ μέσον τοῦ ἀντίχειρος &c. Gesnerus vtrobique legendum censet, διὰ τοῦ μέσου τοῦ χειρὸς καὶ τοῦ αἰτιᾶ λεγομένου.

Forte, χρωλὸν Gesn. χειρὸς ποιησάμενος

Malli. Ispanus

Μαμαίρου, vel Βαλλαγραι, Malbanus. Μαμαίρεα. Ad legit Gesn.

Forte, σφαῖ

ff. iiij.

ΠΕΔΑΚΙΟΥ ΔΙΟΣΚΟΡΙΔΟΥ ΑΝΑΖΑΡΒΕΩΣ ΒΙΒΛΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΤΩΝ ΕΥΠΟΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ.

Ζαρβέως εὐπορίστων καὶ ἁπλῶν φαρμάκων, βιβλίον δεύτερον.

PEDACII DIOSCORIDIS ANAZARBÆI, DE FACILÈ PARABILIBUS SIMPLICIBÚSQUE MEDICAMENTIS, LIBER POSTERIOR.

IANO ANTONIO SARACENO LVGDVNÆO, INTERPRETE.

ΤΗΝ τῶν ἁπλῶν φαρμάκων ἐπέρχλιν ἐν δυσὶ καταχωρήσαντες βιβλίοις, ὑμιν τὸν τε Ἀνδρόμαχε, καὶ ἀμφοτέρω σοὶ ἀφιέντες, ἐπιλειπόντος τι ἐν τῷ τοιούτῳ βοηθήματα ἁρμόζοντα τοῖς περὶ κεφαλὴν καὶ ὀφθαλμοὺς καὶ ἀκρωτηρίας καὶ τὰ λοιπὰ ἐπιφανῆ συνισταμένοις πάθεσιν, ἐν τούτῳ τῷ λήμματι διευκρινήσομεν· ἀρξάμενοι ἀπὸ τῶν περὶ τὸν στόμαχον συνισταμένων παθῶν, προειπόντες, ὅτι ἐπὶ τῶν πινομένων, ἐφ' ὧν ἂν ποσότητας ὑποτάσσωμεν, ἢ μὴ ἐλαχίστη πόσις ἔστω τριῶν ὀβολῶν ἡ δὲ μέση, δραχμὴ μία· ἡ δὲ πλείστη, δραχμαὶ δύο.

OVONIAM, spectatissime Andromache, morborum curationes per simplicia medicamenta duobus libris distinximus, quorum vtrunque tibi dedicauimus, & priore quidem auxilia capitis, oculorum, faucium, ac summę cutis extremarúmque partium affectibus conferentia complexi sumus: iam supereſt, vt in hoc posteriore de reliquis agamus, à stomachi vitijs facto initio. Sed priùs Lectorem monitum velim, quotiescunque iis quæ ore sunt assumenda certam definitámve quantitatem minimè ascribimus, minimam quidem eorum dosin esse debere trium obolorum, maximá drachmarum duarum, mediam verò drachmę vnius.

Τὰ πρὸς τὸν στόμαχον καὶ τὰ ὑποχόνδρια συνισταμένων παθῶν βοηθήματα.

Ad Stomachi & hypochondriorum affectus remedia.

ΚΕΦ. Α. Τοὺς χρονίως καυσουμένους τὸν στόμαχον ὠφελεῖ ἅμα καὶ δίψαν παύει γλυκυρρίζης χυλὸς πινόμενος, καὶ ἡ ῥίζα σὺν ὕδατι. ἐλίκων ἀμπέλου ἀπόβρεγμα, αἱ δράκης χυλὸς καὶ αὐτὴ ἐσθιομένη, σικύδος χυλὸς καταῤῥοφούμενος. πολυγόνου χυλὸς ὁμοίως. Ἐπὶ δὲ τῶν ἐκ ἀσθενείας ἀναλαμβανόντων δίψαν παύει, κράμβη ἐσθιομένη ἐνόμως, σῦκα ἁπαλά, στρόβιλοι ἐσθιόμενοι, σύμφυτον πετραῖον ἀφομαστόμενον. Καταπλασσόμενα δὲ ὠφελεῖ στόμαχος καυσουμένους καθ' ἑαυτὰ καὶ σὺν ἀλφίτῳ· ἀφζόου ῥίζα, κοτυληδόνος φύλλα, κύπρου φύλλα, πολύγονον, σέρις, σόγχος, σέλινον, σπόγγος κεπαῖος, ἕλικες ἀμπέλου καὶ τὰ

Stomachi diutino ardore confligatis prosunt simul & sitim pellunt, glycyrrhizæ succus epotus, & radix ipsa ex aqua bibita, capreolorum vitis dilutum: portulacæ succus, ac ipsa etiam in cibis sumpta: seridis succus absorptus, similitérque polygoni succus. Eorum verò qui conualescunt ex morbo sitim compescunt, brassica cruda esitata, ficus recentes, strobili in cibis sumpti, symphytũ petræum commanducatum. At impositа seu per se, seu cum polenta stomachos æstuantes hæc iuuant: semperuiui radix, Veneris vmbilicus, cypri folia, polygonum, seris, sonchus, apium, solanum hortense, vitium capreoli & folia, por-

tulaca cum polenta vel pane, vitiú folia per ſe ex aqua frigida, elate palmarum trita cum polenta: braſſicæ denique folia cruda tritáque cum melle imponuntur.

Ad ſaburram ventriculum.

His quibus ſtruat ventriculi ſuperficies, opitulatur ſuccus è cucurbitæ ramentis cum roſaceo, itidémque vuæ acerbæ ſuccus cum roſaceo. Abſinthij foliorum decocti poculum manè hauſtú, epithymum cum ſero lactis potum quinque ſéxve vicibus per menſem.

Ad ventriculi ac inteſtinorú flatus ex atra bile.

Iis qui bilem atram gignunt, quique ſtomachi ac inteſtinorum inflatione diuexantur, auxilio ſunt hæc: pulegij decoctum dilutúmve bibitum, & aqua in qua candens ferrum extinctum ſit. Spõgiæ quoque ex aceto impoſitę conueniunt, maximè in inflatione inteſtinorú & mentis alienatione. Sin perſeueret affectus, alúmen liquidum cum chalcantho, aloë ac melle impoſito, cerato admixto. Aut, hederæ folia cõcta in vino cataplaſmatis inſtar impone: aut plantaginem tritam cum ſale: aut fimum bouis armentariæ ſiccum in vino coctum, aut marrubium cum pane ac roſaceo, aut denique bulbos cũ alumine tritos.

Ad ſingultum.

In ſingultu conueniunt hæc in potu ſumpta: alyſſi herbæ decoctum, aut ipſa etiam herba manibus detenta, anethi ſemen potum & olfactum, ariſtolochiæ radix ex aqua, aſplenum herba cum poſca, mentæ ſtimuli cum acidi Punici ſucco, caſtorium cum aceto, cuminum cum aceto, ſtha cum aqua, ſiſymbrij, quod cardamine dicitur, ſuccus & ſemé, ſternutatorium denique ad hibitú. Ortus verò à frigore ſingultus ſoluitur ſummis manibus in calentem aquam demiſſis, aqua calida abſorpta, ſpongia ex aqua feruenti ſtomacho adhibita, extremis denique partibus oleo Sicyonio confricatis.

Ad ſtomachi dolores ſternendos.

Ad ſtomachi dolores faciunt: lac muliebre, bubulum aut aſininum ẽ papilla ſuctum; aut bibitum vbi per ignitos filices fuerit decoctum: gentianæ drach. j. cum aqua, maſtiches cochlear vnum quotidie bibitum, aut ſuccus ex eodem commanducato deglutitus, trium men-

φύλλα, αἴδραχυ μετ' ἀλφίτου ἢ ἄρτου, φύλλ' ἀμπέλου καθ' ἑαυτὰ ἐξ ὕδατος ψυχροῦ, ἐλάτη λεῖα σὺν ἀλφίτοις. ἢ φύλλα κεφάλης ὠμὰ πεῖσαι μετὰ μέλιτος, ὑπτιάζει.

II. Τοὺς δὲ καυσυλβοὺς πλεῖ ὑπερφάτην ὠφελεῖ κολοκύνθης ξυόμενα τὰ χύλας μετὰ ῥοδίνου, ἢ ὄμφακες χυλὸς σὺν ῥοδίνῳ. ἀψιθίου φύλλων ἀποζέματος ποτήριον ἐν χυ σὺν μέλιτι, ἢ ὑπέθυμον μετὰ γάλακτος ὄρρου πίνειν ἡμ. φορὰς ιε. μιλῦα.

Quæ hic ſequuntur, ad ſequentis caput referenda eenſet Geſnerus.

III. Χολὴν ἡμιῶντος μέλανος, καὶ ἐμφυσωμένους στόμαχον καὶ ἔντερα ὠφελεῖ γλήχωνος ἀπόζεμα ἢ ἀπόβρεγμα πινόμενον, ἢ ὕδωρ ὃ ἀπὸ τοῦ πεπυρωμένου σιδήρου ἐν ᾧ σίδηρος σβέννυται. ἁρμόζει δὲ καὶ κατόχοι ἐξ ὄξους ὑπτιαζόμενοι, μάλιστα μὲν σὺν πλεῖ ἐμφυσήσει τὴν ὀπίσω καὶ τοῖς ὀφθαλμοῖς πλεῖ καθέξει πάν. εἰ δὲ ὑπτιάσει, συπήρειαν ὑγρὰν μετὰ χαλκάνθου καὶ ἀλόης καὶ μέλιτος ὑπιτίθει, κηρωτῇ μίξας. ἢ κισσοῦ φύλλα ἕφθα σὺν οἴνῳ καταπλάσει, ἢ ἀρτύγλαυκον λάψαι σὺν ἁλσὶν, ἢ βοὸς ἀγελαίας βόλβιτον ξηρὸν ὑπὸ οἴνου ἑφθόν, ἢ πεπάσιον μετ' ἄρτου καὶ ῥοδίνου, καὶ βολβοὶ μετὰ στυπτηρίας λᾶσι.

Forte addi: μάλιστα αὐτὸ ἁρμόζει.

IIII. Ἐπὶ δὲ τὴν λυγμῶν ἁρμόζει πινόμενα· ἁλύσεως τῆς πόας ἀφέψημα, καὶ αὐτὴ κρατηθεῖσα. ἀνήθου σπέρμα πινόμενον ἢ ἀποσφραινόμενον, ἀριστολοχίας ῥίζα μὲν ὕδατος, ἄσπληνος πόα μετ' ὀξυκράτου, ἡδύοσμος κλωνία σὺν βοείῳ ὀξείας χυλῷ, καὶ σάτυρον σὺν ὄξει, κύμινον σὺν ὄξει, ῥᾶ σὺν ὕδατι, σισυμβρίου τῆς καρδαμίνης λεγομένης χυλὸς καὶ τὸ σπέρμα, πλαρμικῇ προσαγωγῇ. Τὸν δὲ ἀπὸ ψύχους λυγμὸν λύουσιν ἄκραι χεῖρες εἰς θερμὸν ὕδωρ καθιέμεναι, ὕδατος θερμοῦ καθιάρροφησις, σπόγγος ἐκ ζεστοῦ ὕδατος προσαγόμενος τῷ στομάχῳ, ἔλαιον Σικυώνιον, αἰατεινομένων τὰ ἄκρα.

V. Πρὸς δὲ τὰ ἀλγήματα τῆς στομάχου παῖ· γάλακτος γυναικεῖον ἢ βόειον ἢ ὄνειον θηλάζοντα, ἢ πινόμενον. ἢ κόχλακες σταφυλόμενοι. θηλαστὸς ἀπὸ μὲν ὕδατος μυστὶς κοχλιάριον ἓν καθ' ἡμέραν πινόμενον, ἢ δηγματούμενον τὸ χυλοῦ καθαπινόμενον.

Abunde.

ῥοδύσμου κλωνίων τενῶν φύλλα σὺν ὀξείας ῥοιᾶς χυλῷ καταῤῥοφούμενα, γλήχωνι μετ' ὄξυκρόκου.

A tæ ramulorum folia cum acidi Punici succo absorpta, itemque pulegium ex posca bibitum.

VI. Πρὸς δὲ τοὺς δηγμοὺς τῦ στομάχου τερμίνθου φύλλα ἀφεψήματα, ὁμοίως σκορδίου χύλισμα· σύγχυ χυλὸς μετὰ τροβίλων καὶ καρύων πικρῶν καὶ σικύου σπέρματος, κώνωπι ἐσθιόμενοι καλῶς ἐκβυσί.

Ad oris ventriculi morsus valent, terebinthi folia decocta: similiter & succus è scordio: sonchi succus cum nucleis pineis, amygdalis amaris & semine cucumeris: pinei etiam nuclei per se in cibis sumpti. Ad cardiogmos.

B

VII. Καταπλασσόμενα δὲ ὠφελεῖ ἀδηγήματα στομάχου, μελίλωτος ἐν οἴνῳ ἑφθὸν μετ' ὀλίνου ἀλφίτου ἢ γύρεως, καὶ δάπιον ἑφθὸν σὺν αὐγῇ, ἢ πήγανον σὺν μέλιτι.

Stomachi dolores impositа leuant, melilotus in vino coctus cum farina fœnigræci aut polline, cotoneum cum flore coctum, ruta denique cum melle. Ad stomachi dolores admixta. alinou

VIII. Πρὸς ἢ τις τῦ ζόφου ἀποδήλωσις ὅτι πλήμυρος ὠφελεῖ σπόγγος ἐξ ὄξους δριμέως ἄχρι φλυκταινώσεως, ὅτι τι τοὺς πόδας καὶ βραχίονας. ὅτι δὲ τῦ ἤπατος καὶ τοῦ στομάχους τυρὸς παλὸς μετ' ἀλφίτου, ἢ σελίνου φύλλα, ἢ σίριδος μετ' ὄξους καὶ ἀλφίτων, ἢ ἀνδράχνης ὡσαύτως, ἢ κολοκύνθης ξύσματα ὁμοίως.

Stomachi dolores impositа leuant, melilotus in vino coctus cum farina fœnigræci aut polline, cotoneum cum flore coctum, ruta denique cum melle. Cibũ reiicientibus prodest spongia acri aceto [calente] imbuta, pedibus & brachiis adhibita, quoad pustulæ excitentur. Conferunt verò adhibita pectori, caseus recens salitus cum polenta, folia apij aut seridis cum aceto & polenta, similiter & portulacæ folia aut cucurbitæ ramenta. Ad stomachi vomitiones.

C

IX. Τοὺς δὲ ναυλιῶντας καὶ πλαδῶντας ὁμοίως τὸν στόμαχον ἢ ἐξεμεῖν ποιεῖ πτόλεμα, ἄλφιτα σὺν οἴνῳ, ἀμύγδαλα γλυκέα φρόσφαπα σὺν τῷ λέπει ἐσθιόμενα, ἀγρώστεως τὸ ἐν Παρνασσῷ σπέρμα, κύμινον Αἰθιοπικὸν, ἀνήθου σπέρμα, πολυγόνου χυλὸς, καὶ χιχόρεια ἐσθιόμενα καὶ σῦκα, ἢ ὁ χυλὸς πινόμενος. σισύμβριον ἢ καρδαμώμου λεγομένη πωλομένη, θέρμοι γλυκεῖς λεῖοι σὺν ὄξει πολῶντες. θρίδακος ἄπλυτοι ἐσθιόμεναι, ἢ τὸ σπέρμα πινόμενον μεθ' ὕδατος. σέγχρου ὁμοίως, ἴου αἶθος μεθ' ὕδατος, κόστου < α. μετ' οἴνου. Κοχλίαι χερσαῖαι Λιβυκαὶ σὰρξ ὅλη καταποθεῖσα πίσει τὰ ἀλγήματα παντὸς στομάχου. προσεσθιόμενοι δὲ ἕνα μοι δύο ἢ τρεῖς ἡμέρας, τὸ αὐτὸ ποιοῦσι. ποιεῖ δὲ καὶ σὺν τῷ ὀστράκῳ ὅλαι καταποθεῖσαι, τὸ ὀστράκου τὸ ἐξωπλασθὲν Γίγαρτα φρυγέντα αἰγίλωπος ἀλφίτων ἐσθιόμενα, γλήχων καταπλασθεῖσα ἐξ ὄξυκράτου, κύμινον σὺν ὀξυκράτῳ πινόμενον ἢ σὺν ὄξει, λαπάθου σπέρμα ὁλκαῖοις δύο ἢ τρισὶν, ἀκακία μεθ' ὕδατος, λίθος ὁ ἐν τῇ Σαμίᾳ γῇ εὑρισκόμενος. μύραφα σπέρμα ἢ χύλισμα, μάλιστα τοῖς ἀποξύσασιν ἢ ἐμοῦσι τὸν ζόφον.

Naufeam, stomachi ex nimia humiditate languorem ac vomitum ista cohibent: polenta in vino bibita, amygdalæ dulces recentes cum suo putamine esitatę, graminis Parnassij semen, cuminum Æthiopicum, anethi semen, polygoni succus, cichorium in cibis sumptum, sicuti & seris, eorúmque succus epotus: sisymbrium, aut quod cardamine dicitur, potum: lupini dulces triti cum aceto bibiti, lactucæ illotæ in cibis sumptæ, earúmque semen ex aqua potum, similiter & sonchi semen & flos violæ ex aqua, costi drachm. ß. cum vino. Cochleæ terrestris Africanæ caro tota ieiuno deuorata, etiam dolores stomachi sedat. Idẽ præstant cochleæ duæ tréve quotidie ante cibos alios assumptæ: deuorata etiam tota proficit cum sua testa, hac circum aspersa: tosti acinorum nuclei polentæ vice in cibo sumpti, pulegium cum posca impositum, cyminum ex posca vel aceto potum, lapathi semen duũm triúmve obolorum pondere, acacia cum aqua, lapis qui in Samia terra reperitur, fœniculi denique semen aut expressus eo succus, ac iis maximè quibus acescit cibus, aut vomitu reiicitur. Ad nauseam & humidas stomachi vitiositates & vomitiones.

D

Dioscor. de mat. med. lib. 6. χαμαὶ, viridis seu virtutes.

alia medicina Gersa.

E

F

G

Stomachi fluxiones inhibent; Ad stomachi fluxiones.

balaustium ex aceto potum, rubi foliorum succus vel per se, vel ex aqua, aqua igniti ferri iniectione feruefacta, acetum scilliticum absorptum: (oportet autem ab exigua quantitate incipiendo bibere ad cyathũ vsque vnum.) Punicum malum cum aqua frigida, scandicis decoctum, scillæ coctæ tres oboli cũ posca, hypocisthidis drach. j. ex aqua: lens tosta polentæ loco insperſa, eiusdem decorticata grana xxx. deuorata: rosarum denique flos insperſus potui. Cæterùm tentatum fluxione ventriculum irrigare oportet rhois decocto lana succida excepto.

A βαλαύστιον μετ' ὄξους πολύ, βάτου χυλὸς φύλλων καθ' ἑαυτὸν καὶ μεθ' ὕδατος, ὕδωρ τὸ ἀπὸ σιδήρου πεπυρωμένου ἅρμενον ἐν ὄξει σκιλλητικὸν καταῤῥοφούμενον, (δεῖ δὲ ἀπ' ὀλίγου ἄρχεσθαι καὶ πίνειν ἄχρι κυάθου) ῥοιὰ μῆλα ὕδατος ψυχροῦ, σκυδικὸς ἀφέψημα, σκίλλης ἐφθῆς τετριμμένοι ἐν ὀξυκράτῳ, B ὑποκιστίδος ℥ α'. ἐν ὕδατι. φακὸς πεφωσμένος αἴτι ἀλφίτου βάτι πλατανόμυος. φακοὶ ὑπισμένοι λ'. καταπινόμενοι. ῥόδων ἄνθος βάτι πλατανόμυον ὦ πέμμα. Ἐμβρέχει δὲ δεῖ τοὺς ῥυμαλιζομένους στομάχους ἐλαίου εἰσυπηγεῖς σεσωρός.

skirrhus. Porrè, Vlcus stomachi.

XI. Ἀναξηραῖς δὲ στομάχου ἀρχαῖς, C τρυβλίων ἀγαχώρημα διδόμενον ἐν ποτῷ.

XII. Κρατεῖ δὲ τοὺς πεπλανδκότας στομάχους ὀπτηθέντα μετ' ἀκρωτῆς μυροπίνης ἢ ῥοδίνης. Βάτου φύλλα, ἀψίνθιον, κυπαρίσσου φύλλα, κόνυζον, καλάμου, φοινίκες, μηλοκυδώνιον, ἐλάτη μετὰ φοινίκων.

siquis forte. καλάμου forte, hoc est malum.

XIII. Σταμάχου δὲ ἐμπνευματώσεις ὠφελεῖ πτισμένα, καὶ τοὺς βραδυπεπεῖς τοῖς μάλιστα· ἀγαλλόχου ℥ α'. σὺν οἴνῳ, ἀριστολοχίας ℥ α'. σὺν οἴνῳ, σμυρνίου σπέρμα σὺν οἴνῳ, D ὄπος, ἢ λάβακος ῥίζα σὺν οἴνῳ. ἀγαρικὸν ἀγαμάσσητον ὑπερῥοφούμενον ἀκράτου. Γρὸς δὲ ἐμπνευματώσεις τοῦ στομάχου, ῥάμνου τῆς ἀκανθώδους φύλλα λεῖσαι, ἀναπλάσσειν τετραβολιαῖα, καὶ δίδου ἐν τοῖς E μὲν πυρέττουσι μεθ' ὑδρομέλιτος κεκραμένου κό. α'. ἀπύρετοις δ' μετ' οἴνου κεκραμένου. ποιεῖ δὲ καὶ τοὺς εἰλεώδεις καὶ τὰν ἄλγημα πνευματικὸν θαυμαστῶς γὰρ δι' ἐρυγῶν καὶ φυσῶν ὑγιεῖς γίνονται.

Subaudi, μιγέντι.

Ad inflationes stomachi.

Stomachi inflationes.

Ad stomachi ex humiditate Languenti admouenda.

Stomachi ex humiditate Languentes admouenda.

Ad inflationes stomachi.

XIIII. Πέψεις δὲ ποιεῖ ἀγαρικὸν ἀγαμάσσητον καὶ καταπινόμενον ἀπὸ δείπνου, χωρεῖ τῷ ὑπερῥοφῆσαι ἀλόης ℥ α'. σὺν ὕδατι, καὶ πρὸ ἕψεως ἀρχευθίδες λεῖαι σὺν οἴνῳ, μήλου ἀπόβρεγμα, ξυλοβαλσάμου ἀπόζεμα μετὰ σισέλεως, ἢ νάρδου Κελτικῆς μετ' ὀξυδίου λήθη, σχοίνου ἄνθος ἀπόζεμα μετὰ ῥόδων ἄνθος πινόμενοι, σίσελις πινομένη. Εὐπεψίαν δὲ ποιεῖ σέριδος χυλὸς καταῤῥοφούμενος.

καταῤῥοφεῖ τὰ Sim., Mouh. Malim ego χωρεῖ τῷ ὑπερῥοφῆσαι τὰ.

Suspicatur Gesnerus legendum μόνου, hoc est, mori.

Ad vrinam ciendam.

Coctiones promouent: agaricum à cœna commanducatum deuoratúmque, nullo liquore insuper absorpto: aloës drach. j. ante cibum ex aqua sumpta, iuniperi baccæ tritæ cum vino, cotonei mali dilutum, xylobalsami decoctum cum sesely, nardi Celticę decoctum cum aceti momento sumptum, iunci odorati decoctum cum rosarum flore haustum, sesely potum. Coctionem denique adiuuat, seridis fucus absorptus.

XV. Ῥώννυσι δὲ στόμαχον, σαφὶς, σκίλλα ἐφθὴ σὺν μέλιτι ἐπαλειφομένη.

Stomachũ roborantia.

Os ventriculi confirmat, vua passa & scilla cocta cum melle delincta.

XVI. Ταὶς γ̓ κυισώσαις ὠφελεῖ· αὐδράχνη ἐσθιομένη, ἐλίκων ἀμπέλου ἀπόβρεγμα πινόμενον, καὶ ῥόμβος ἐσθιόμενα. A

XVII. Ὑποχόνδρια δὲ ὠφελεῖ ἐκπλυσμὸν πιθέντα χρονίως, μάραθον, θρῖον πινόμενον. Καὶ καταπλασμάτων· ἀψίνθιον σὺν κυπρίνῃ κηρωτῇ ἢ φοίνικι, λευκανθέμου φύλλα, σκόρδιον σὺν κηρωτῇ, τῖλος ἢ λινόσπερμον σὺν μελικήρατῳ, ἢ σάμψυχον σὺν κηρωτῇ. B

Τὰ τῆς πυρεσσόντων βοηθήματα.

XVIII. Γλῶσσαν δὲ τραχύτητας ἐκμαλάσσει ὑδύοσμον λεῖον σὺν μέλιτι· ροιᾶς ἐρυθρὸς ὁμοίως, ῥόδινον σὺν ὕδατι, ἢ μέλιτι καθ' ἑαυτό. C

XIX. Τοὺς δὲ καθ' ἡμέραν πυρετοὺς καχεκτικοὺς θεραπεύει χαμαίδρυος φύλλα λεῖα πρὸ μιᾶς ὥρας τῆς λήψεως πινόμενα, ἐν οἷς ὅτι τεταίχθη αὐτίκα ἱστορήσομεν.

XX. Πρὸς δὲ τοὺς τριταίους ἁρμόζει πίμπτα λαμβανόμενα πρὸ μιᾶς ὥρας τῆς ἐπισπασίας, πρασσιγχιομένων καὶ ἀναπτεσσομένων τῆ ἄκρων. τρίφυλλον σπέρματος κοκκία τρία κηρῷ καταπλασθέντα ἐν καταπόσει ὅτι τρεῖς, τὰ πρῶτα εἰρήκαμεν. ἑρπυλλώδους ῥίζαι ἀδρα τρεῖς μετ' οἴνου πινόμεναι, ὥρας βοτάνης δ τρίτον γόνυ ἀπὸ τῆς γῆς ἀφαιρεθὲν, καὶ διδύμου. πεύκης καὶ σίλφιον κηρῷ καταπλασθὲν λευκῷ καὶ καταπόμενον. ὀπτηρόφυτον δὲ ὕδωρ θερμὸν ἢ οἶνον. ἡλιοτροπίου δὲ μεγάλου κόκκοι τρεῖς σὺν οἴνῳ, ἀνόβρυχις σὺν οἴνῳ, πενταφύλλου φύλλα γ'. μεθ' οἴνου ἢ ὑδρομέλιτος πολυγόνατα, πέπερι λεῖον μεθ' ὕδατος πινόμενον. Περιαφὴ δὲ ὠφελεῖ τριταίους· λειχὴν ἵππου περιαφθεὶς, ἢ ἀράχνας τὰ ζῶα τρία συναναμαλάξας ἐμπλάσσειν ὅτι δεῖ ἐν ὀθονίῳ κατὰ τοῦ μετώπου καὶ τῶν κροτάφων. D E F

XXI. Τεταρταίους δὲ ὠφελοῦσιν ἀρνογλώσσου ῥίζαι ἐν οἴνῳ πινόμεναι· ὥρας βοτάνης τέσσαρες γόνυ ἀπὸ τῆς γῆς ἀφαιρεθὲν καὶ τριβὲν λεῖον σὺν οἴνῳ καὶ δοθὲν, ἀσφάλτου < ἀ. μετὰ κατοχέως ὀβολοῦ, γλυκυῤῥίζης < β'. μεθ' ὕδατος κ. ἡμ. ἡλιοτροπίου τοῦ μεγάλου κ. δ'. σὺν G

Pica laborantibus mulieribus auxilio ſunt, portulaca in cibis ſumpta, vitis capreolorum dilutum potum, citria mala eſitata. *Ad mulieres pica laborantes.*

Hypochondriis affectu diuturno induratis auxilio eſt, fœniculum bibitum. Imponuntur verò cataplaſmatum more, abſinthium cum cerato cyprino aut palmulis, leucanthemi folia, ſcordium cum cerato, fœnumgræcum aut lini ſemen cum aqua mulſa, ſampſuchum denique cerato exceptum. *Ad diuturnum hypochondriorum.*

Febricitantium remedia.

Linguam ſcabram aſperámve emollíut ac læuigat, mẽta trita cum melle, rhus erythros dictus, quo ad obſonia vtuntur, roſaceum cum aqua, aut mel per ſe. *Ad linguæ aſperitatem.*

Diuturnas febres quæ [quotidianis] redeunt circuitibus, ſanát, chamædryos folia ante acceſſionem hora vna pota, & quæcunq; mox in curãdis tertianis cõmemorabimus. *Ad quotidianas febres.*

Tertianis febribus hæc conueniunt hora vna ante acceſſionem aſſumpta, priùs tamen vnctione frictionéque partium extremarum adhibita: trifolij ſeminis grana cera obuoluta nouem, nempe terna ternis deuorata vicibus: plantaginis radices ſucculentæ tres in vino potæ, verbenacæ ſupinæ tertium à terra geniculum decerptum & exhibitum. Confert & ſilphium cera candida obuolutum ac deuoratum, ſuperbibita tamen aqua calida aut vino: heliotropij maioris grana tria cum vino, onobrychis cum vino, quinquefolij folia trita cum vino aut aqua mulſa pota: piper denique tritum ex aqua potum. Sed & amuleta tertianis febribus auxilio ſunt, vti lichen equorum appenſus, itidémque aranei tres contriti linteolo inditi, frontíque ac temporibus adhibiti. *Ad tertianas.*

Contra quartanos circuitus auxilio ſunt, plátaginis radices quatuor in vino bibitæ: verbenacæ ſupinæ quartum à terra geniculum decerptum, cum vino tritum & exhibitum: bitumi nis drach. j. cum caſtorei obolo, glycyrrhizæ drachmæ duæ cum aquæ hemina vna, heliotropij maioris grana quatuor cum vino, *Ad quartanas.*

vino, cimices è cubilibus quatuor cauis fabarum inditi ac deuorati, quinquefolij quatuor folia ex aqua mulsa aut vino, hyperici coreos appellati semen cum vino: pota quoque vrina cuique sua cyathorum quatuor mensura, vomitu prius euacuatos iuuare traditur: sed illam in fictili vase asseruari oportet. Idē facit impubis pueri vrina quinquies hausta. Quartanas finit oxyporon aliquod ante accessiones toti corpori illitum, poto deinde generis eiusdem medicamento. Aliud: radicis libanotidis sesquidrachmam in vini dimidia hemina paulò ante febrilem accessum exhibeto: ac vt ne rigore prehendatur æger, aliquo pingui præunctum & vndique coopertum quiescere finito, dū copiosus erumpat sudor.

Ad quosdā febrium circuitus & rigores.

Ad omnes in communi circuitus ac rigores faciunt hæc sudores mouentia: smyrnij semen cum vino, laserpitij agrestis ac domestici liquor melle cocto circumlitus ac deuoratus rutæ syluestris & satiuæ semen cum vino, radicis aristolochiæ drach.j. cum vino, myrrha ad fabæ magnitudinem, piper cum vino, iridis drach.ij. cum vino, hipposelini semen drach.j. pondere cum vino: similiter & hyperici, calaminthæ decoctum cum castorio, laserpitij semina cum nasturtio & ouo, vel pipere ac ruta, opopanacis drach. ℈. vel panacis drach. ij. seselí cum panace ac pipere in vino potum, ferulæ semen simili modo, verbasci radix in vino, radicis quinquefolij succus cum vino: canini stercoris sicci quantum sat esse coniectura videbitur, ex aceto bibitum.

Ad febres inordinatas.

Diuturnis & inordinatis febribus conuenit epotum ius è vetere gallinaceo, cuius ventri sal salsamentúmve inditū incoctúmque fuerit.

Ad quosdā febrium rigores vtilissima.

Febribus cum rigore certo statóque circuitu redeuntibus ista cōferunt ex oleo trita, & ante accessiones illita, quippe quæ corpus excalfaciant sudoréque cieant: viticis semen, libanotidis semen, salis flos, lixiuium ficulneum, nitrum aut spuma nitri, baccæ lauri, pyrethrum, smyrnij quod hipposelinum dicitur semen, hypericum,

A οἶνῳ, αἵρει ⏑ τῆς χλίνης δ'. ἐστὶ δ' ὅτε εἰς πὰ τῶν κυάμων βρώματα ἢ καταπότια, πέντε φύλλου φύλλα δ'. μεθ' ὑδρομέλιτος ἢ οἴνου, ὑπερικοῦ τοῦ κόρεως λεγομένου τὸ σπέρμα μετ' οἴνου. ἱστορεῖται δὲ καὶ ὕδωρ ὠφελεῖν τὸ ἴδιον πινόμενον κυάθους δ'. τοῖς ἐμεμακόσι πλῆθος· δεῖ δὲ φυλάττειν αὐτὸ ἐν ὀστρακίνῳ. Τὸ αὐτὸ δὲ ποιεῖ καὶ παιδὸς οὖρον ἀφρῶδες μέχρι πέντε ποτῶν. Τεταρταῖον δὲ παύει τοῖς ὑπισημασίας ὀξυπορωτέρας καθ' ὅλον τὸ σῶμα, καὶ μετὰ ταῦτα ποιεῖ τοῦ αὐτοῦ φαρμάκου. ἢ λιβανωτίδος ῥίζης < ά ς'. ἐν οἴνου ἡμικοτυλίῳ μικρῷ πρότερον τῆς λήψεως. καὶ συμπεριβάλλειν ἀφεῖς ἱδρῶσαι, καὶ ὅ μὴ ῥιγῶσι προσφαλείφεσθαι λίπει, καὶ ἱδρῶτι πολύ.

Hæmitæi, Molibanus, &c. Gesnero malit μιᾶδος δ' πλῆθος προμαιεσθαι.

Ἰμιτίου. Molibanus: qui & sequentia duo verba redundare putat.

ΧΧΙΙ. Κοινῶς δὲ τοῖς πάσας περιόδους καὶ ῥίγη ποιοῦσι κινοῦντα ἱδρῶτας· σμυρνίου σπέρμα μετ' οἴνου, ὀπὸς σιλφίου ἀγρίου καὶ ἡμέρου μέλιτι ἐφθῷ περιχριόμενος ἢ καταπινόμενος, πηγάνου ἀγρίου καὶ ἡμέρου σπέρμα σὺν οἴνῳ, ἀριστολοχίας ῥίζης < ά. σὺν οἴνῳ· σμύρνης ὅσον κύαμος, πίπερι σὺν οἴνῳ, ἴριδος < ϐ'. σὺν οἴνῳ, ἱππουριδίου σπέρματος < ά. μετ' οἴνου, ὑοσκυάμου ὁμοίως, καλαμίνθης ἀφέψεμα σὺν καστορίῳ, ὄποῦ φύλλα σὺν καρδάμῳ καὶ ὠῷ, ἢ πεπέρει καὶ πηγάνῳ. ὀποπάνακος < ά. ἢ πάνακος < β'. σέσελι μετὰ πάνακος καὶ πεπέρεως σὺν οἴνῳ πολλῷ, καρδάμου σπέρμα ὁμοίως, φλόμου ῥίζα ἐν οἴνῳ, πέντε φύλλου ῥίζης χυλὸς σὺν οἴνῳ, κόπρος κυνεία ξηρὰ σὺν χασμῷ μετ' ὄξους πινομένη.

Silphii foliorum succus, Molibanus: quasi legatur, ὑπὸ φύλλων. At Gesnerus laserpitii semina hic desiderari autumat.

ΧΧΙΙΙ. Πρὸς δὲ τοὺς χρονίους καὶ ἀπύρετους πυρετοὺς θερμάζει ἀλεκτρυόνος παλαιοῦ ζωμός, ἀλῶσι δὲ τῇ γαστρὶ αὐτοῦ ὀπτηθέντων, ἢ ταρίχους, καὶ συνεφθέντων, πινόμενος.

Forte κατεψημένου, aut, ἐφθέντων.

ΧΧΙΙΙΙ. Συγχρίσμασι δὲ μετ' ἐλαίου λεῖα ὅτι πρὸ μετὰ ῥίγους περιόδου πυρετῶν ὠφελεῖ πρὸς τὰς ὑπισημασίας θάλπουσα τὸ σῶμα, καὶ ἱδρῶτας κινοῦντα· ἄνηθου σπέρμα, λιβανωτίδος σπέρμα, ἁλὸς ἄνθος, συκῆς κονία. ὑπερικὸν ἢ ἀφέψημα, δαφνίδες, πύρεθρον, σμυρνίου τοῦ ἱππουριδίου καλουμένου σπέρμα, ὑοσκύαμος,

Aët. 2. tetr. 2. c. cap. 88. Dioscoridem exscripsit, primo loco crocum, cocos & floribus & chamæmeli proponit, vius tempore oleo diluendos.

καλαμίνθη, κάχρυ ὀλίγον, καστόριον, κόνζα, κόστος, σαγάπηνον, κνίδιος κόκκος μετὰ νίτρου καὶ ἐλαίου καὶ ὄξους, λύκαψος σὺν ὕδατι θερμῷ, σαμψύχινον, ἴρινον, μετώπιον, γλαύκινον, κύπρινον, χαμαίδρις, χαμαιπίτυς, συκαμίνου ὀπὸς, σταφὶς ἀγρία. A

XXV. *Μιγνύμενα δὲ κόποις ὠφελεῖ ἄλες, νίτρον, ὀνοβρυχὶς, σισύμβριον, χαμαιλέων, ἀμμωνιακὸν, τραγόριον, ὀρίγανον, καππάρεως ῥίζα, σικύου ἀγρίου ῥίζα· τίφρα κληματίτη, ὄστρακον ἀφ' ἵππου, ἀριστολοχίας πάλη, ὀποβάλσαμον, χαλκὸς κεκαυμένος, λεπὶς χαλκοῦ καὶ τὰ θριμμένα θρύμματα, βολβοὶ λεῖοι καταχριόμενοι σὺν πεπέρει καὶ ἀμμωνιακῷ, ἢ κηρωτὴ ὑγρὰ κυπρίνη, Κομμανικὸς λίθος εἰς ἔλαιον ἀποτριβόμενος καὶ συγχριόμενος. B C

Καπνὸς, Moibanus.

XXVI. Ἀσθενέσι δὲ ὠφελεῖ, ὀρόβου φρυκτοῦ μέγεθος ὅσον κάρυον Ποντικὸν σὺν μέλιτι πρὸ τῆς τροφῆς δεδομένον.

XXVII. Ἱδρῶτας δὲ ἱδρῶτας ὅτι τῆ διαφορουμένους καταπλάσσεται· γῆ Σαμία, γύψος, λιθάργυρος, κηκὶς, χαλκὸς, μυρρίνη, θύον ἄπυρον, ἔλαιον ἐξ ἀγριελαίας, μυρσίνινον, τερμίνθινον, οἰνάνθινον, ῥόδινον, μήλινον, ῥοδόμηλινον. Καταχριόμενα δὲ ἴσπερ μύρα καὶ ἄμυλον σὺν ᾠοῦ τοῦ λευκοῦ. ἢ ᾠοῖς λείοις σὺν πεπέρει καὶ κόνδυς σπέρματι, καὶ κηρῷ ὀλίγῳ, καὶ κόμμει, καὶ ὀσύνδου σπέρματι, καὶ νίτρῳ ὀλίγῳ. D E

Βολβοὶ λευκοὶ legitur apud Aetium, bulbus candidus: nisi forte mendum subest.

XXVIII. Καρδιακοὺς δὲ ὠφελεῖ καταπλάσσοντα μετὰ τοῦ σταφίδος· βάτου φύλλα μετὰ κηρωτῆς ὀλίγης ἢ ἄρτου, μυρσίνης φύλλα ἢ μύρτα, ἢ ἕλικες ἀμπέλου, ἢ ἀρνόγλωσσον σὺν ἄρτῳ ἢ κηρωτῇ ὀλίγῃ, μῆλα κυδώνια, φοίνικες, σῦκα ἀγρία καὶ ἥμερα. Καὶ ἐνέμαλα δὲ ὠφελίμως πεπαλαμβάκῃ, πλατάνης χυλὸς καταψυχθεὶς, ἀκροκωλίων ἢ ποδῶν μετ' οἴνου, ἢ ᾠοῖς σὺν οἴνῳ. Καταχρίεται δὲ αὐτῶν τὰ ἄκρα ὠφελίμως κηρῷ ὑγρᾷ μετὰ ναπυος λείου καὶ πρὸς διαλύσεις οἴνῳ. F

Addit Moib. depsi-lagro, & mox subdit, καὶ ἐνεμ. ἔξωθεν ἐπιθεὶς σὺν οἴνῳ, Moib.

Τῶν πρὸς τὸν πνεύμονα καὶ θώρακα παθῶν βοηθήματα. G

XXIX. Αἵματος δὲ ἀναγωγὴν θεραπεύει πόμενα· ἀγαρικὸν διώβολον ἐν οἴνῳ, ἀδιάντου

Dioscor. de mat. med. cap. 2. ubi δι' ὕδατος ex aqua.

calamintha, cachryos momentum, caſtorium, conyza, coſtus, ſagapenum: granum Cnidium cum nitro, oleo & aceto: lycopſis cum aqua calida: vnguenta ſampſuchinum, irinum, metopium, glaucinum, cyprinum: chamædrys, chamæpitys, ſycomori liquor, & ſtaphiſagria.

Laſſitudinibus conferunt mixta hæc: ſal, nitrum, onobrychis, ſiſymbrium, chamelæa, ammoniacum, martubium, origanum, capparis radix, cucumeris agreſtis radix, cinis ſarmentitius, teſta fornacea, ariſtolochiæ pollen, opobalſamum, æs vſtum, ſquama æris, & aromata acria, bulbi triti illiti cum pipere & ammoniaco, ceratum cyprinum liquidius, lapis Comanicus in oleum detritus & inunctus. Ad laſſitudines.

Cibum non ſentientibus, quippe quorum corpora non aluntur, auxilio eſt, eruum toſtum in nucis auellanæ magnitudinem melle collectum, & ante cibos exhibitum. Ad ſtomachi imbecillit.

Sudores in iis qui exoluuntur cohibent inſperſa hęc: terra Samia, gypſum, argenti ſpuma, galla, ſciſſile alumen, myrtus, ſulphur viuum, oleum agreſtis oleæ, myrtinum, terebinthinum, œnanthinum, roſaceum, melinum & lentiſcinum. Eoſdem hæc illita ſiſtunt: manna & amylum cum oui candido: bulbi triti cum pipere & vrticæ ſemine, cerę momento, gummi, ononidis ſemine & pauco nitro. Ad ſudores diaphoreticos.

Cardiacos iuuant hæc ſtomacho in modum cataplaſmatis impoſita: rubi folia cum pauco cerato vel pane, myrti folia aut baccæ, vitium capreoli, plantago cum pane aut cerato modico, mala cotonea, palmulæ, intubus agreſtis & ſatiuus. Quin & vtiliter infunduntur enemata è ptiſſanæ decocta cremore, è partium extremarum pedúmve decocto in vino, aut ex ouis crudis cum vino. Sed & ægrorum extremæ partes commodè inunguntur cerato liquido cũ trito ſinapi, aut ſicco quod vino diſſoluatur. Ad cardiacorum affectus.

Pulmonis thoraciſque affectuum remedia.

Sanguinis reiectioni medentur in potu ſumpta hæc: agarici trium obolorum pondus in vino, adianti Ad ſanguinis reiectionem.

ſuccus cũ aceto cyathi vnius quantitate per interualla multa abſorptus: ſimiliter & ſucci è polygono, ſemperuiuo, plantagine, rubo, portulaca aut vitium capreolis: balauſtium cum poſca, mentæ ſuccus per ſe & cum poſca vel aqua, clymeni ſuccus trium obolorum pondere ex aqua, cupreſſi pilulæ ex aqua tritæ & potæ, lyſimachia herba eiuſdémque ſuccus, myricæ fructus tritus eiuſdémque cortex, ferulæ medulla & œnanthe ſicca.

Ad priſtinam ſanitatem.

Diuturnas autem reiectiones ſiſtunt, potri ſemen, myrti ſemen potum ex aqua, vel potiùs myrti bacearum ſucco; vitex trioboli põdere cum poſca, roſarum capita trita ex aqua, ſymphytum petræum eiuſdémque ſemen, ſpinæ albæ radix drach. j. pondere cum oxycrato pota, althæę radicis decoctum: glutinum è zea coctum, quale librarium eſt, delinctum: confert & cumenta. Aliud: farinæ hordeaceæ per linteolum in ſuccum ſolutæ dimidium cyathum, addita etiã menta, exhibeto. Valent & hypociſtidis ſuccus cum thuris momento, amygdala pota cum aqua frigida, amygdala amara cum amylo & menta ex aqua bibita, portulaca in cibis ſumpta, arctij radix trium obolorum pondere cum poſca & pineis nucleis xl. aſpalathi ſuccus cum oxycrato, rubi ſuccus, Samiæ terræ áſter ex aqua: membranaceum id quod in quercu inter caudicem & corticem medium mteriacet, ſeruefactum: aut pellicula quæ glandem proximè contegit ſimiliter ſeruefacta, cornu cerui vſtum cum poſca, caſtanearum decoctum, ſalicis fructus cum vino, centaurij maioris radix drach. ij. pondere cum vino, betonicæ folia drach. ij. pondere cum vino, corallij drach. j. ex aqua, leucographidis tãcundem ſimili modo, lapis hæmatites cũ ſucco Punici, oſtracites lapis drach. j. pondere cum aqua, deglutitus è commaſſa maſtiche ſuccus, cotoneorum flos ex poſca tritus, rubricæ Lemniæ drach. j. ex aceto, liquefcens è tragacantha linguę ſubdita ſuccus, tragij ſemen cum vino, quinquefolij è radice ſuccus cum poſca, ſubet è veteribus calcea-

A χυλὸς καταῤῥοφήσιμος ὀξ. ὅσον κύαθος ἀ. καὶν ὀκ. Διαστήματων ἢ πάλαι, ἢ πολυγόνου χυλός, ἢ ἀφίζωου, ἢ ἀριογλώσσου χυλὸς ὁμοίως, ἢ βάτου, ἢ ἀσπάραχης, ἢ ἑλίκων ἀμπέλου, ἢ βαλαύστιου σὺν ὀξυκράτῳ, ἢ ἡδυόσμου χυλὸς κεβ' ἑαυτὸν καὶ σὺν ὀξυκράτῳ ἢ ὕδατι, τὸ ἐκλυμβὺν χυλοῦ τριώβολον μεθ' ὕδατος, κυπρίσσου σφαγεῖα μεθ' ὕδατος λεῖα πιόμβια, λυσιμάχιος τὸ ἄνθος ὁ χυλὸς αὐτῆς, μυρίκης καρπὸς λεῖος ἢ φλοιὸς αὐτῆς, κάρδαμος ἐντελοῦσι, σπαθὴν ξηρά.

Diſc. j. de mat. med. cap. 102. ſemi dipſ. ex tribo.

κλυμβίου.

B

C

D

Cyathos ſex, Mobanus. Sed forte cyathum vnũ ſemis legere præſtabit. nam & aridorum menſura cyathus eſt. Geſn.

xxx. Πρὸς δὲ τοὺς πολυχρονίους ὑμαγωγὰς ἰχμή, πράσου καρπὸς, μύρτου σπέρμα μεθ' ὕδατος πολὺ, μᾶλλον δὲ μυρτέων χυλοῦ, ἄγνου τριώβολον μετ' ὀξυκράτου, ῥόδων κεφαλαὶ λεῖαι μεθ' ὕδατος, σύμφυτον πυγαῖον καὶ ὁ καρπὸς, ἀκάνθης λευκῆς ῥίζης ⊂ ἀ. μετ' ὀξυκράτου, ἀλθαίας ῥίζης ἀφέψημα. κόλλα ἀπὸ ζειᾶς ἐψηθεῖσα, ὡς εἰς βιβλίᾳ, ὀκλεχρυσῶν· ἁρμίζει καὶ σὺν ὑδυόσμῳ, ἢ ἀλεύρου κριθίνου κυαθ. ς'. χυλίσας δ' ὀξυνίου καὶ μίξας ἡδύοσμον δίδου. Ἀστακιτὶς χυλὸς μεθ' λιβανωτοῦ ὀλίγου, ἀμύγδαλαι πικρὰ μεθ' ὕδατος ψυχροῦ, ἀμύγδαλαι πικραὶ μετ' ἀμύλου καὶ ἡδυόσμου πιόμβια μεθ' ὕδατος, ἀσπάραχη ἐσθιομένη, ἄρκτίου ῥίζης τρίωβολον μετ' ὀξυκράτου καὶ τροβίλου κόκκων μ'. ἀσπαλάθου χυλὸς μεθ' ὀξυκράτου, βάτου χυλὸς, γῆς Σαμίας τὸ ἀστέριον σὺν ὕδατι. δρυὸς ὃ μεταξὺ τοῦ περίμυου καὶ τοῦ φλοιοῦ ὑμενώδες ἀποζεσθὲν· ἢ ὁ περὶ τὸν βάλανον ὑμενοειδὴς ὁμοίως ἀποζεσθείς. κέρας ἐλάφου κεκαυμένου σὺν ὀξυκράτῳ, κισσίνων ἀφέψημα, ἰτέας καρπὸς σὺν οἴνῳ, κενταυρίου τοῦ μεγάλου ῥίζης ⊂ δ'. σὺν οἴνῳ, κέρσης φύλλων ⊂ δ. σὺν οἴνῳ, κρείου δραχμὴ μεθ' ὕδατος, λιθυσπερμαφίδος ⊂ ἀ. ὁμοίως, αἱματίτης λίθος σὺν χυλῷ ῥοιᾶς, ὀστρακίτου λίθου ⊂ ἀ. μεθ' ὕδατος, μαστίχη ἀσφαλτωθεῖσα καὶ τοῦ χυλοῦ κεβ' πιόμβιον, κυδωνίων αἰδοῖα μετ' ὀξυκράτου λεῖα, μίλτου Λημνίας ⊂ ἀ. σὺν ὄξει, τραγάκανθα νέπτον χυλιζόμενον, πολίου καρπὸς μετ' οἴνου, πενταφύλλου τῆς ῥίζης ὁ χυλὸς σὺν ὀξυκράτῳ, φυλλὸς ὁ ἐκ τῶν παλαιῶν κερα-

E

F

Ita, Dioſc. j. de mat. med. ſi addas febres ſine manus, ex aqua. ασχλὰ manult Mobanus.

G

κατάπλασμα Mob.

ἀφυρτι, Mosb. μίων κεκαυμβύος καὶ ἄκατος λῆος μετ' ὀ- A
ξυκράτου πινόμβυος, κονία πινομβύη, χάλ-
βηλαζόμβυον γυναικῶν καὶ μάλιστα ὅπὶ
τῶν λιποφθινόντων. Ἐπιτίθεται δὲ ὠφελί-
μως κατὰ τῶν θωρακικῶν ὅπὶ τῶν αἱμοπτοικῶν.
σπόγγος ὁ ἐξυκράτου, εἰ πολὺς εἴη ὁ ῥυσμα-
τισμός· ἢ τὰ σύφακα, οἷον αὖ εἴη σέρις, πολύ-
γονον, ἀνδράχνη, κυδώνια, βάτος, φοίνικες, B
τοῦτο δὲ, subaudi, δεῖ, ἐπιτίθεται σίδια, μυρσίνη· ἔστω δὲ μετ' ἄρτου ἢ ἀλ-
φίτου.

XXXI. Τὰς μὲν βῆχας παλαιὰς ἀσύμφορόν ἐστι θεραπεύειν. διὰ ὑδροποσίας
γὰρ καὶ οἰκείου ἐφθῆς τῆς ἀφ' ῥοφήματος
ὑγιεῖς ἐστι θεραπεύειν. Χρονιζούσας δ' ἰά-
ται ταῦτα πινόμβυα· ἀκάνθης ῥίζης < ά. C
μεθ' ὑδρομέλιτος, ἀρκευθίδες ε. ἢ ς'. ἢ ζ. ἢ ἡ. κε-
δρίδες πινόμβυαι σὺν οἴνῳ ἢ μελικράτῳ, ἀ-
σφοδίλου ῥίζης < ά. μετ' οἴνου, ἄσφαλ-
τος ἀνὰ καταποτίου λαμβανομένη, βακ-
χάριδος ἀφέψημα σὺν ὕδατι, βαλσάμου
καρποῦ δραχμὴ σὺν οἰνομέλιτι, δαφνίδες
δύο λῆαι σὺν ὕδατι, ἑλξίνης χυλὸς καταῤ- D
ῥοφούμβυος ὅσον κύαθον, σμύρνης κυάμου
μέγεθος καταπινόμβυον, σμυρνίου ῥίζα κα-
ταπομβύη. ὑσσώπου, ἢ θύμβρας, ἢ ἰατρίου
ἀποζέμα ἢ ἀφέψημα μελὶ μέλιτος καὶ
σύκων ξηρῶν. ἱππουρίδος χυλὸς ἢ ἀφέψη-
μα, ἢ ἰσοπύρου μετὰ μελικράτου, ἢ κέρνα
Γουλικὰ πινόμβυα μετὰ μελικράτου ὑγ πι- E
περίνης, * καυκαλίδος ῥίζα μαλαττομβύη,
χαλβάνη αὐτὴ καταποτίου, κενταυρείου τῆς
μεγάλου ῥίζης < ϛ. στεῖ οἴνῳ, κόμμι ἀ-
μυγδάλῃς πικρᾶς ἢ κερασίνων ἢ κοκκυ-
μήλων μετὰ χράματος, λάδανον σὺν στύρα-
κι αὐτὴ καταποτίου, καὶ αὐτὸς ὁ στύραξ καθ'
ἑαυτὸν, λυκίου Ἰνδικῆς κυάμου ὃ μέγεθος F
ὁμοίως. μηκώνιον σὺν στύρακι καὶ σμύρνῃ ἴσοις ἀναπλαττόμβυα εἰς ὀρβιδίαν μεγέθη,
ἁλαμβανόμενα μετὰ ἕψημα γ'. ὑπερ-
ῥοφουμβύου ὕδατος εἰς κοίτην ἀβλαβῶς
δίδονται. μαστίχη λεία τριβεῖσα καταπομβύου
ὑγ χυλοῦ, οἰνάνθης τῆς πόας καρπὸς ὑγ φύλ-
λα καὶ καυλὸς σὺν οἴνῳ ἢ σὺν οἰνομέλιτι, G
Hæc vox forte redundat. ὀπόφυλλον μετὰ σελίνου καὶ ὄξους, ὀπὸς,
ἢ θρῖον ἄπυρον, ἢ σαγάπηνον, ὀπὸς σὺν ὠῷ

mentorum soleis, seu vstum seu etiam non vstum, tritum & è posca bibitum, lixiuium potum, lac denique muliebre ex ipsa mamma suctum, id quod præcipuè tabescentibus confert. Foris verò sanguinem excreantium pectoribus vtiliter imponitur spongia ex posca, siquidem vehemens est fluxio: sic & adhibentur astringentia, qualia fuerint, intubus, polygonum, portulaca, cotonea, rubus, palmulæ, cortices mali Punici, myrtus: hæc autem cum pane polentáve imponuntur.

Tusses quidem recentes curare Ἀδύνατα τὰ ἐπιπόνα. supervacaneum est, cùm & aquæ potu & conuenienti cibo qui in sorbitionibus offertur iis mederi sit facile: diuturnis autem tussibus hæc assumpta medentur: acanthi radicis drach. j. cum melle, iuniperi baccę quinque, sex, septem octóve: cedri fructus poti cum vino aut aqua mulsa, asphodeli radix drach. j. pondere cum vino, bitumen cataportij instar deuoratum, baccharidis decoctum ex aqua, balsami fructus drach. j. pondere cum vino mulso, lauri baccæ binæ tritæ cum aqua, helxines succus mensura cyathi absorptus, myrrha fabæ magnitudine deglutita, smyrnij radix deuorata: thymi, thymbræ aut hyssopi dilutum decoctúmve cum melle & caricis: equiseti succus aut decoctum, isopyri decoctum ex aqua mulsa, nuces auellanæ in aqua mulsa potæ adiecto pipere, caucalidis radix commanducata, galbanum cataportij instar assumptum, cẽtaurij maioris radix drach. ij. pondere cum vino: gummi amygdali amaræ aut cerasi aut pruni cum vino diluto: ladanum cum styrace instar cataportij sumptum, atque ipse etiam styrax per se: similiter & lycium Indicum fabæ magnitudine. Meconium cum styracis & myrrhę partibus æquis in pastillos granorum erui magnitudine conformatur, è quibus tres à cibo sub horam somni aqua superbibita turò exhibentur. Confert & mastiche trita, deglutito inde succo: item œnanthes herbæ folia, semen & caulis cum vino aut œnomelite, laserpitij semen cum porro & aceto, sulphur viuum aut sagapenum, laser in ouo

sorbili sumptum, saluia in sorbitione hausta: aut radix cocta in sorbitione, ac eadem etiam per se in cibo sumpta: simili quoque modo. dracunculi radix, vuæ passæ detractis vinaceis esitatæ, mel coctum instar catapotij deuoratum: acetum scilliticum absorptum, (sed recentes tusses acetum irritat.) panacis aut peucedani è radicibus decoctum aut eorundem liquor deuoratus: marrubij decoctum cum melle: porrum coctum in cibo sumptum, ex eodem succus expressus haustus: sandaracha cum cera instar catapotij assumpta, scseli cum vino potum, scillæ coctæ drach. j. cum aceto mulso aut vino multo, allium seu coctum seu crudum in cibo sumptum, caricæ super prunis assatę insperso pipere, chamędryos decoctum, palmulæ caryotæ in vino maceratæ, deindéque tostæ superinsperso pipere: bryoniæ radix alba in puluerem contrita & pauco melle cocto excepta, instar catapotij deuorata: est enim acris: fœnigræci decoctum ex aqua diebus quindecim cyathi mẽsura potum; erysimum aut nasturtium diei vnius spatio præmaceratum, deindéque in ptisana coctum & absorptum. Aliud ad tusticulam: pulegium præbe manducandum: aut hyssopum ex vino tepido propinato ieiuno, & superdormiat. Aliud: hederæ acinis, ligno aut foliis tussi fluxioniquo obnoxium fumigato, & sanabitur: aut resinam cum vino vetere, aut cannabis agrestis semen ex aqua propinato: aut cedriã cum vino ieiunis potui dato, aut arsenicum cum ouo sorbili exhibeto, aut sulphur viuum simili modo. Aut fœnum græcum, hyssopum aut pulegium ex posca decocquito, & ieiuno propinato. Aut: oleæ laurique folia tusa tritáque cribus matutinis ternũm cochlearium mensura potui dato. Tussos quæ cum vehemẽti sunt defluxione, iuuet, equina spuma pota cum aquæ dimidia hemina. Validas tussientium excreationes adiuuat, vinum in excauata scilla per noctem relictum & vrgente tussi exhibitum: sumatur verò per cannulam & parciore quantitate, propter acrimoniam: confert & acetum scillinum absorptum.

Α ροφητῷ λαμβανόμενος, ἐλελίσφακος ὁ ῥοφήματι λαμβανόμενος· ἄγου ῥίζα ἐφθὴ ὁ ῥοφήματι, καὶ καθ' ἑαυτὴν ἐφθὴ ἐσθιομένη· ἢ δρακοντίου ῥίζα ὁμοίως, σταφίδος ἐκλογαρισθείσης καὶ ἐσθιομένη, μέλι ἐφθὸν αὐτὴ κατὰ ποτίου λαμβανόμενον, ὄξος σκίλλινον καταῤῥοφούμενον· ταῖς δὲ τραχυφώ-
Β νοις ἐρεθίζει τὸ ὄξος. πάνακος ἢ πευκεδάνου ῥίζης ἀφέψημα, ἢ ὁποῖς ὁ ζωτὸν καταπινόμενος, τραχείου ἔκπωμα σὺν μέλιτι, τραῦσιν ἐφθὸν ἐσθιόμενον, καὶ τὸ χύλισμα αὐτοῦ καταπινόμενον. σανδαράχη σὺν κηρῷ αὐτὴ καθ' ἑαυτήν, σκίλλης ἐφθῆς < ά. σὺν ὀξυμέλιτι ἢ οἰνομέ-
C λιτι, σκόροδον ἐφθὸν ἢ ὠμὸν ἐσθιόμενον, σῦκα ξηρὰ ὀπτηθέντα ἐπ' ἀνθράκων ἐμπεπασμένα πεπέρεως, χαμαίδρυος ἀφέψημα. κάρυα τὰ βραχέντα εἰς οἶνον, ἔπειτ' ὀπτώμενα ἐπιπασθέντος πεπέρεως. βρυωνίας ῥίζα λευκὴ, ξηρὰ, λεία, καὶ ὀλίγῳ μέλιτι ἐφθῷ ἀναληφθεῖσα αὐτὴ καταπόσις. ἔστι γὰρ δριμεῖα.
D τήλεως κύαθος ἑνὸς μέτρου ὕδατος καὶ πινόμενος ὅλην ἡμέραν ἓν. ἐρύσιμον ἢ κάρδαμον πρεσβυτὴν ἡμέραν ἀ. εἶτα εἰς πτισάνην ἑφθὸν καὶ ῥοφούμενον. Ἄλλο πρὸς βηχίον. Λίνου σπέρμα ἀσπασθαι, ἴσον μέτρον οἴνου χλιαροῦ δίδου πιεῖν πρωΐ, καὶ κατάκλιν. ἢ κισσόκομα, ἢ ξύλα, ἢ φύλλα κάπνιζε ⊛ βηχικὸν καὶ συρρέοντα, καὶ ἰᾶται. ἢ
E ῥητίνην σὺν οἴνῳ παλαιῷ πότιζε, ἢ ἀγγειοκαυκάλου σπέρμα πότιζε μεθ' ὕδατος, ἢ κεδρίαν πότιζε πρωΐ μετ' οἴνου, ἢ ἀρσενικὸν καὶ μετ' ὠοῦ ῥοφητοῦ δίδου φαγεῖν, ἢ θεῖον ἄπυρον ὁμοίως, ἢ πήλιον ὑαλώπτου, γλήχωνα μετ' ὀξυκράτου ἑφθὰς δίδου πρωΐ πρωΐ, ἢ ἐ-
F λαίας φύλλα καὶ δάφνης κόψας καὶ λειώσας δὸς πιεῖν γ'. τρυφίας κοχλ. γ'. Ταῖς δὲ μετὰ ῥευματισμοῦ πολλοῦ ὠφελεῖ ἀφεψὸς ὑσσώπου μεθ' ἡμικοτυλίου ὕδατος πινόμενος. Ταῖς δὲ σφοδραὶ ὀλιγοπλώσης τὸ τοῖς βηχικοῖς ὠφελεῖ οἶνος τὸ σκίλλην γλυφείσην ἔχειν τερηδόνας, καὶ δεδόμενος κατὰ τοὺς ὀλιγοπλώσης τῆς βηχός. πίνειν δὲ λαμβανέτω, καὶ ὀλίγος ἄχρι πλὼ δριμύτητα. ὠφελεῖ καὶ ὄξος σκίλλινον καταῤῥοφούμενον.

Γλήχωνα & ποὰ pro ἕλκη, lauenda.

Κισσόκομα ἀκάνθου & mox ἐ ξύλα, ἢ φύλλα &c.

ἀγγειοκαύκαλος scribunt in Iuperstitis Galeno attributis.

καὶ videtur expungendum.

πήλιον, ὑάλωσιν ἢ γλήχωνα.

Erpetrioneã. Moibanus; quæ in codice legenter

Ἄλλο βηχικόν. Πᾶσι δὲ τοῖς βήσσουσιν ἀρ- A μάζει βούτυρον μετὰ μέλιτος καὶ κυμίνου βραχέος. ἕψεται δὲ τὸ βούτυρον ἴσον τῷ μέλιτι, τοῦ πλήθους τοῦ μέλιτος προαφριζομένου, καὶ οὕτω προσβάλλεται τὸ κύμινον. ποιεῖ δὲ τοῦτο καὶ λίαν φθισικοῖς.

Omnibus porrò tussientibus conuenit butyrum cum melle & cumini exiguo: coquitur verò butyrum æquali quantitate cum melle priùs despumato, tandémque cuminum adiicitur: hoc genus remedij etiam phthisicis seu ex pulmonum vlcere ad tabitudinem redactis opitulatur.

Ad rossil rupt fos exigenda.

ΚΧΧΙΙ. Ἐκλειχόμενα δὲ ὠφελεῖ. δρακοντίου ῥίζα ἑφθὴ μετὰ μέλιτος, ἀμύγδα- B λαι πικραὶ μετ' ἐλελισφάκου σὺν μέλιτι θρυμματόμενα. ἢ θύμβρα, ἢ ὕσσωπον, ἢ στοιχὰς σὺν μέλιτι. λινόσπερμον λεῖον σὺν ἴριδι καὶ καρύοις πικροῖς καὶ μέλιτι, κράδης ἀπύρηνον ὁμοίως. πίσσα, πισσέλαιον ὁμοίως, τερέβινθος ξηρὸν ἢ καὶ ὑγρὸν λεῖον σὺν μέλιτι· ἢ ῥητίνη πιτυίνη ὑγρά, ἢ τερμινθίνη ἐκλειχομένη, C σκόρδιον σὺν καρδάμῳ ἢ ῥητίνῃ καὶ μέλιτι. στρουθίου κοχλιάρια σὺν μέλιτι. τραγορίγανον μετὰ μέλιτος. τραγάκανθος ὑποχυλίζόμενον, φλόμου ῥίζα σὺν ῥητίνῃ, μελάνθιον λεῖον διαπεπλυμένον αἰγαληφθὲν σὺν σφίδοις ὀπτοῖς, ἢ φοινίκων, ἢ γλυκύων.

Sic Plinius, lib. 23 cap. 8. ex Dioscor. 2. de mat. med. σὺν μέλιτι καὶ γάλακτι, cum melle & lacte.

φοινίκων γλυκέων, Moib.

ΚΧΧΙΙΙ. Ὑποθυμιώμενα δὲ ὠφελεῖ D χρονίας βῆχας, καὶ ἀφ' ἁλισμένου σίφωνος καὶ ἀμβικος πεποιημένου καθ' ᾧ πυθμένα, δι' οὗ καὶ ὁ σίφων καθήμενος ἐμπέμπει εἰς τὸ στόμα ᾧ ἀτμόν· ἀφρώδικόν, σμύρναν ἐσχαρωμένην λεῖα, ὀποβάλσαμον ὕδατι καὶ σταφίδι τεθλασμένον ἀμβικι, ἐξελθόντος τοῦ πνεύματος τοῦ ἀμβικος. βηχίου φύλλα E θυμιώμενα, ὄπιον ἄπυρον, καὶ λεπὶς ἀφρομαγνήτιδος καθ' ἑαυτὸν καὶ σὺν ῥητίνῃ τερμινθίνῃ, προπόλις, σανδαράχη σὺν ῥητίνῃ ἢ τερμινθίνῃ, ἀσφάλτος, λιβανωτὸς σὺν ῥητίνῃ, σκίλλα ξηρά, ἔρσιμον, ἔλλεβορον λεῖον, κενταυρείου ῥίζα, μύρα, θεῖον καρπός.

Interserit Morbanus. At Gelinto superfluè ob.

ἐλλέβορος λεῖος, Moib.

ΚΧΧΙΙΙΙ. Ῥήγματα δὲ καὶ ἀναύσματα ἰᾶται πιόμενα· ἀβροτόνου ἀπόζεμα, καὶ τοῦ καρποῦ λείου ⊀ α. μεθ' ὕδατος. ἀγαρικὸν μεθ' ὑδρομέλιτος, ἀκάνθου τῆς παιδιρωτὸς ῥίζα. ἀκόρου ῥίζης ἀπόζεμα, καὶ αὐτὴ ἡ ῥίζα ξηρά. πολυγόνου χυλός, χαμαιδρύος ἀπόζεμα, νάρδου ἀγρίας ῥίζα ὁμοίως, κενταυρίου τοῦ μεγάλου ῥίζα, μηδίκης ῥίζα μεθ' ὕδατος. χλεονίκιον μετ' οἴνου, σεσέλεως καρπὸς καὶ ῥίζα μετ' οἴνου, αἰθαίας ῥί-

Ad rupta vel fluxa.

Ruptis & conuulsis medentur in potu sumpta hæc: abrotoni decoctum, eiúsque semen tritum ex aqua drach. j. pŏdere: agaricum cum aqua mulsa, semperuiui succus, acanthi pædĕrotis radix, acori radicis decoctum & ipsa quoque sicca, polygoni succus, chamædryos decoctum, nardi syluestris radix similiter, centaurij maioris radix, malueæ radix ex aqua, cleonicium seu elinopodium cum vino, seseleos semen & radix in vino, althææ ra-

Ita Dioscor. 3. de mat. med. febricitantibus, et ob febricitib. ex vino mulso. Moib. πεπυκασμένον legendum suspicatur.

dix, alcæa in melicrato, rutæ agrestis semen in vino, halimi radicis drach.j.in melicrato,radicis bryoniæ succus ex melle delinctus, fimus suillus aceto solutus & potus, aristolochiæ radix cum ruta, iuniperi baccæ quinque sexve ad octo vsque potę cum aqua mulsa,asphodeli radicis drach.j.cum vino, baccharidis decoctum in aqua, bulbi assati in cibo sumpti cum oleo,verbasci radix cum vino: gentianæ radicis drach.ij.aut succi drach.j.cum aqua:helenij radicis decoctum,elichrysi aut serpylli aut equiseti radices & folia cum aqua aut vino, calami aromatici oboli duo cum vino, calaminthę decoctum,galbanum instar catapotij deuoratum, ὀέταυρij radicis drach.ij. cum vino, cedri fructus eodem modo, betonicæ foliorum drach. j. cum aqua mulsa, clinopodij decoctum, costi drach.j.cum vino & absinthio, lilij radix cum melle,libanotidis radix, sapphirus lapis in potu sumptus,iridis radix cum vino passo, silphij liquor cum lixiuio colato,opopanax cum marrubij aut origani decocto; moly tritum cum pipere & exiguo myrrhæ, addito pauco vino aquáve:sagapeni drach.j.cum aqua mulsa, seseli cum vino, scordium cum resina,nasturtio & melle.

Ad pleuriticos.

Pleuriticis hæc subueniunt in potu sumpta: agallochi drach. j cum aqua mulsa, æthiopidis radix in melicrato cocta:similiter & acori radicis drach.j.cum trifolij seminis pari quantitate: centaurij radicis drach. j. simili modo, abrotoni decoctum cum aqua mulsa, sagapeni drach. j.eodem modo, vrticæ semen cum melle delinctum,bryoniæ radix cum melle simili modo, apocyni semę potum ex aqua: suillum stercus aqua solutum potúmque, etiam diuturnos admodum dolores soluit: aristolochiæ radix ex aqua pota, ari radix cocta in cibis sumpta,similitérque dracunculi,asphodeli radix cum vino. Inueterato autem affectu, balsami semę drach. j. pondere cum aqua mulsa: ὀέταυρij maioris radicum drach. ij. cum vino, leucacanthæ è radice succus cyathi vnius mensura cum aqua mulsa, radix peucedani de-

A ζα, ἀλκαία σὺ μελικράτῳ, πηγάνου ἀγρείου σπέρμα σὺ οἴνῳ. ἀλίμου ῥίζης < ά. σὺ μελικράτῳ, βρυωνίας ῥίζας χυλὸς σὺ μέλιτι ἐκ λειχόμενος,ὑὸς ἄφοδες ὀξύῳ διυθεῖσα καὶ πεθεῖσα. ἀριστολοχίας ῥίζα μετὰ πηγάνου, ἀρκευθίδες έ. ὕ ς'. μίσγει ὑ. τετράθυρα σὺν μελικράτῳ, ἀσφοδέλου ῥίζης

ὀγρίου, hoc est, sylvestris addit Dioscor. 2. de mat. med. cap. 98.

B < ά. σὺν οἴνῳ, βακχάριδος ἀφέψημα σὺ ὕδατι, βόλβοὶ ὀπτοὶ ἐσθιόμενοι σὺν ἐλαίῳ, φλόμου ῥίζα σὺν οἴνῳ, γεντιανῆς ῥίζης < ϛ'. ἢ χυλοῦ < ά. σὺν ὕδατι. ἑλενίου ῥίζης ἀπόζεμα· ἐλιχρύσου, ἢ ἑρπύλλου, ἢ ἱππουρίδος ῥίζαι καὶ φύλλα σὺν ὕδατι ἢ οἴνῳ. καλάμου ἀρωματίτου ὀβολοὶ δύο σὺν οἴνῳ,

Dioscor. 2. de mat. cap. 100 cum aceto chm.

C καλαμίνθης ἀπόζεμα, χαλβάνη αὐτὴ καθαπερ ἰόν, κεντωρίου ῥίζης < β'. σὺν οἴνῳ, κεδρίδες ὁμοίως, κέδρου φύλλων < ά. μετὰ ὑδρομέλιτος, κλινοποδίου ἀπόζεμα, κόστου < ά. μετ' οἴνου καὶ ἀψινθίου, κρίνου ῥίζα σὺν μέλιτι, λιβανωτίδος ῥίζα, λίθος σαπφείρος πινόμενος, ἴριος ῥίζα σὺν γλυκεῖ,

D κῷ, ὀπὸς σιλφίου μετὰ κονίας ὑλισθῆς. ὀποπάνακες μετὰ μαρρουβίου ἢ ὀρίγανου ἀπόζεμα, μῶλυ λεῖον σὺν πεπέρει καὶ ὀλίγῃ σμύρνῃ μετ' οἴνου ὀλίγου ἢ ὕδατος, σαγαπήνου δραχμὴ σὺν ὑδρομέλιτι. σέσελι σὺν οἴνῳ, σκόρδιον σὺν ῥητίνῃ & ναρδάμῳ καὶ μέλιτι.

B xxxv. Πλευριτικοῖς δὲ ὠφελεῖ πόμα· ἀγαλλόχου < ά. μετ' ὑδρομέλιτος, αἰθιοπίδος ῥίζα σὺ μελικράτῳ ἑφθεῖσα, ἀκόρου ῥίζης < ά. μετὰ περιφύλλου καρποῦ τὸ ἴσον ὁμοίως, κεντωρίου ῥίζης < ά. ὁμοίως, ἀβρότονου ἀπόζεμα μετ' ὑδρομέλιτος, σαγαπήνου < ά. ὁμοίως, κνίδης σπέρ-

F μα σὺν μέλιτι ἐκλειχόμενον, βρυωνίας ῥίζα σὺν μέλιτι ὁμοίως, ὄπὸ χοίρου σπέρμα πολὺ σὺν ὕδατι· ὑὸς ἄφοδες ἀμεθεῖσα ὕδατι καὶ πεθεῖσα, ἢ καὶ λίαν χρόνια ἐλεφάντιασιν λύει. ἀριστολοχίας ῥίζα πεθεῖσα μετ' ὕδατος, πέπερι ῥίζα ἐφθὴ ἐσθιομένη, δρακυλλὶς ὁμοίως, ἀσφοδέλου ῥίζα μετ' οἴνου. ὅταν δὲ τὴν πεπονομένην, ἐκλασάμενος καρπὸν < . σὺν μελικράτῳ. κεντωρίου τὸ μεγάλον < β'. τῆς ῥίζης σὺν οἴνῳ, λάπαθος ἀγρίας ῥίζης χυλοῦ κύαθ. ά. σὺν μελικράτῳ, ῥίζα πευκεδάνου ἐν-

al. ὄπιον, sicut & Plinius habet. ἀγρίου. hoc est, sylvestris addit Dioscor. cap. 98. lib. 2. de mat. med.

Dioscor. 3. de mat. med. cyathi trium cum vino.

λιχρηδὴν σὺν μέλιτι. πεζοσίλινον ὁμοίως. πηγάνου ἀπόζεμα, ἀνήθου, ἢ στοιχάδος, ἢ συμφύτου σὺν μελικράτῳ. τετραφύλλου καρπὸς καὶ τὰ φύλλα ζωὸν μελικράτῳ. τραγορίγανος ἀποβρεχθεῖσα καὶ ἐκπιθυμανικοῖς ὠφελεῖ μεθ' ὑδρομέλιτος. ψευδοβουνίου κλωνία τρία ὁμοίως, σαγαπηνοῦ < ά. μετὰ πηγάνου ἀποζέματος. Καταπλασθὲν δὲ ὠφελεῖ τοὺς πλευριτικούς. κρίθινον ἄλευρον σὺν μελιλώτῳ καὶ κυδωνίας μήκωνος ἑψηθὲν ἐν μελικράτῳ χαλβάνη ἢ ῥητίνη τερμινθίνη ὅπιτιθέμενα καθ' ἑαυτὰ αὐτὰ μαλάσσματος. ῥίζα κεφαλῆς καυθεῖσα σὺν ταῖς καυλαῖς, ἀναληφθεῖσα τῆς τίφρας ἀξουγγίῳ παλαιῷ καὶ ὀπιτιθεῖσα· κυπάρισσος σὺν πηγάνου φύλλοις. σαγάπηνον ἀναληφθὲν κηρωτῇ μυρσινίνῃ, τερμίνθινον ὁμοίως, τίφρα κλήματα σὺν ἀξουγγίῳ, κυπαρίσσου φύλλα ἁπαλά, καὶ σῦκα, καὶ ἀξουγγίον, ἴσα. ἢ θαψίας χυλῷ ⊕ θώρηκα καταχρῖσαι τοὺς ὀλίγον. μάλιστα δὲ ποιεῖ ὅτι τὴν πλευρὸν ἀναθάλπει. κώδιον τοὺς ἐν πίσῃ ὑγρᾷ, καὶ θείῳ ἀπύρῳ καταχρίσαι, καὶ ὅπιτιθέναι τῇ πίσῃ, καὶ ὅπιτιθέναι· δεῖ δὲ τὰ μέσα τοῦ κωδίου χρίειν, ἵνα μὴ διαῤῥυῇ ἡ πίσσα. καὶ ὁ τὴν σωματίτιν πόρον δὲ ῥοιᾶς ἄλφι ὠφελεῖ καταχριόμενος. καὶ κονία ἄσβεστος ὀξυγλυκισθεῖσα καὶ ἀναληφθεῖσα κηρωτῇ κυπρίνῃ. σπόγγοι αἴγλαι σὺν ὄξει, μυρτίνου ὀπτοῦ Μηδικοῦ ὀλίγου.

Μεταποιεῖν δὲν Meibomius commodius legeretur post ἐχεῖ, δεῖν ἀνοιγεῖν βάκτρῳ τὰ πίσσα. Gesn.

XXXVI. Περιπνευμονικοὺς δὲ ὠφελεῖ δρακοντίου ῥίζα ἢ ἄγριον ἐφθὴ ἐσθιομένη σὺν μέλιτι, κυδωνίας σπέρμα σὺν μέλιτι ἐκλειχόμενον. ἀμύγδαλα πικρὰ σὺν ὕδατι πινόμενα, ἢ ἐκλειχόμενα σὺν ῥητίνῃ τερμινθίνῃ. βαλσαμίου καρποῦ < ά. μεθ' ὕδατος. ἀφεψθὲν ἀπόζεμα πολὺν μῆνα ἴριος, ἢ ὑοσκύαμον ὁμοίως. κεδρὶς φύλλα μετὰ πηγάνου ἀποζέματος ἢ σὺν μέλιτι ἐκλειχόμενα. πολυγόνου χυλὸς καπῤῥοφούμενος συνεχῶς, ἢ μελίκρατον πινόμενον ἀπεζεσμένον.

XXXVII. Ἐπὶ τῶν λεγομένων ἀναφορικῶν ἄγει τὰ ἐκ θώρακος, σκίλλα ὀπτὴ σὺν μέλιτι ἐκλειχομένη. σκίροδον ἐφθὸν ἐσθιόμενον, καὶ τὸ ἐξ αὐτοῦ μυελωτόν. παιδὸς ῥίζης ὀπτὰς ἐκλειχθείς. παράσιτα καθαίρει, καὶ πορὸς ὑγιοῖ,

Μεταποιεῖν δὲν μέλιτι legitur, hoc est, σὺν μέλιτι.

linita cum melle, similiter & petroselinum: decoctum rutæ, anethi, stœchadis aut symphyti cum aqua mulsa: trifolij semen & folia cum melicrato: tragoriganum maceratum etiam peripneumonicos adiuuat cum aqua mulsa: pseudobunij ramuli tres eodem modo, sagapeni drach.j. cum rutæ decocto. Cataplasmatú vero more impolita hæc pleuriticis auxilio sunt: hordeacea farina cum meliloto & papaueris calycibus cocta in melicrato, galbanum aut resina terebinthina, impolita per se pro malagmate: brassicæ radicis vna cum caulibus exustæ cinis vetere axungia exceptus & impositus: cupressus cum rutæ foliis, sagapenum cerato myrtino exceptum, marrubium simili modo, sarmentitius cinis cum axungia: tenellorum cupressi foliorum, ficuum & axungiæ pares portiones. Aliud: thapsiæ succo thoracem ad breue tempus illinito: hoc genus remedij peculiariter confert peripneumonicis. Iuuat & ouina pellis oblita pice liquida, cui sulphur viuum insperlum fuerit, & adhibita. Pellis verò medias tantùm partes illini oportet, vt ne pix diffluat. Prodest & mangonum dropax perunctus, itidémque calx viua cum aceto ad strigmenti crassitudinem redacta & cerato excepta cyprino: baccæ denique caprinæ cum aceto, admixto etiam pauco liquore Medico.

Ad peripneumonicos.

Peripneumonicis auxilio sunt ista: dracunculi aut ari radix elixa & cum melle in cibis sumpta, vrticæ semen cum melle delinctum, amygdala amara cum aqua pota, aut delincta cum resina terebinthina, balsami fructus: drach.j. pondere cũ aqua, absinthij decoctum cum iride potum, hyssopi similiter, polygoni succus frequenter absorptus, aqua mulsa feruefacta in potu.

Ad vitiosa ꝓ pectore contenta, in his qui anaphorici dicuntur, hæc educunt: scilla tosta cum melle delincta, allium elixum tostúmque & quod ex eo paratur, intritú, peucedani è radice liquor delinctus, porrum capitatum & pedes siulli vnà

coctí in ſorbitionibus, polium eodem modo, ſtœchadis decoctum, ſymphyti petræi decoctum cum aqua mulſa, caricæ cum hyſſopo eſitatæ, earúdem decoctum cum hyſſopo, chryſocomes decoctum cum hyſſopo. Proficiunt etiam tum quę ad peripneumonicos præſcripſimus, tum & iſta: Strobilus integer ac recens cum adhærente reſina diligenter contuſus & in paſſo decoctus quotidie ſumptus: (fuerit verò ſatius paſſi vice ſcybelite vinum accipere:) pulegium cum melle, naſturtium toſtum ſimili modo: thymus, thymbra, hyſſopus, decocta in aqua: galbanum inſtar catapotij deuoratum: farina fabacea cum dracunculi radice, aut amygdalis in ſorbitione tritis aut cum melle delincta: orcheos ſerapiadis radix bibita, pix liquida cum melle delincta, ſagapenum cũ aqua mulſa, ſcordij radix ſimili modo: eiuſdémq; ſeminis drach. j. cum vino.

Ad phthiſicos.

Phthiſicis conueniunt in potu hæc: agarici oboli duo cum paſſo, acanthi pæderotis radices cum aqua mulſa: plantaginis ſuccus, atque ipſa herba in cibis ſumpta: arcij radix drach. j. pondere cum pineis nucleis xl. ex aqua pota: lac muliebre ſuctum è papilla, aut caprinum vel ouillum bubulúmve bibitum: lauri baccę tritę cum melle delinctæ: ſimiliter & eryſimi ſemina toſta cum melle aut piſſanæ cremore decocta, liquoris è thapſiæ radice oboli duo ex vino bibiti aut cum ſapa ſumpti, caneri elixi cum ſuo iure in cibis ſumpti, ſimiliter & ranæ, cratæogoni radix cum melle, myrrhidis radix cum ſorbitione, pix liquida cyathi vnius mẽſura delincta, porri ſuccus, marrúbium delinctum; rha cum aqua, ceruinus adeps recens in ſorbitione coctus, butyrum denique cum melle coctum.

Ad dyſpnœã, aſthma & orthopnœam.

Spirandi difficultati, anhelationi & orthopnœæ conferunt hæc ore ſumẽda: abrotoni ſeminis drachma cum aqua tepida, adianti decoctum ex aqua, periclymeni ſemen drachmæ pondere ad dies xl. cũ vino, vrticæ ſemẽ cũ melle, vulpini pulmonis exiccati drach. iij. cum melicrato, bryoniæ radicis

A στευοφύλλου ῥοφήματος ἢ πόλιον ὁμοίως. τριχάδος ἀφέψημα. συμφύτου πετραίου ἀφέψημα σὺν μέλιτι πρὸς πάτῳ. σῦκα ξηρὰ ὀρωβίτια σὺν ὑσσώπῳ, καὶ τὸ ἀπόζεμα αὐτῶν μεθ' ὑσσώπου. χρυσοκόλλης ἀφέψημα μεθ' ὑσσώπου. Αὐγὴ ὀπῆς τὸ πρὸς βῆχας ἐκπνευμονικοὺς ἀναγεγραμμένα, καὶ ταῦτα· στρόβιλος ὅλος νέος σὺν τῇ πρὸς αὐτῷ ῥητίνῃ θλασθεὶς ἐπιμελῶς, καὶ ἐψηθεὶς ἐν γλυκεῖ, (κάλλιον δ' ἐν τῷ κυβεμιτῇ αὐτῇ τῷ γλυκέως,) καθ' ἑκάστην ἡμέραν λαμβανόμενος· ἢ γλήχων σὺν μέλιτι, καρδαμον Φωκικὸν ὁμοίως· θύμον, θύμβρα, ὕσσωπον· ἀποζεσθὲν σὺν ὕδατι· χαλβάνη ἁλὶ καταποτιόν. ἄλευρον κυάμινον μεθ' δραχμῆς ῥίζης, ἢ ἀμυγδάλαις ἐν ῥοφήματι λείοις, ἢ σὺν μέλιτι ἐκλειχόμενον. ὄρχεως δ' σπαπιάδος ἡ ῥίζα πινομένη, πίσσα ὑγρὰ σὺν μέλιτι ἐκλειχομένη, σαγάπηνον σὺν μελικράτῳ· σκορδίου ῥίζα ὁμοίως, καὶ τὸ κεφαλ < ά. ζωμὸ οἴνῳ.

XXXVIII. Φθισικοῖς δ' ἁρμόζει πολύποδος ἀγαρικοῦ ὀβολοὶ δύο μετὰ γλυκέως, ἀκάνθου τῆς παιδέρωτος ῥίζαι μετὰ μελικράτου. ἀρνογλώσσου χυλὸς, καὶ ἡ πόα ἐναποθλιβεῖσα ἐφθή. ἄρκιου ῥίζης < ά. μεθ' ὕδατος καὶ τροβίλων μί. πτισάνης. γάλα γυναικὸς θηλαζούσης ἢ αἴγειον, ἢ προβάτειον, ἢ βόειον πινόμενον. δαφνίδες λεῖαι σὺν μέλιτι ἐκλειχόμεναι. ἔρυσιμον ὁμοίως φασκόμενον σὺν μέλιτι, ἢ πτισάνης χυλῷ καθεφθὲν. θαψίας ῥίζης ὀπὸς ὀβολοὶ β'. πτισάνῃ μετ' οἴνου· ἢ σὺν ἐψήμασιν, ἢ ἐψητοῖς λαμβανόμενος. καρπὸν σὺν τῷ ζωμῷ ἐφθοὶ ἐσθιόμενοι, βάτραχοι ὁμοίως, χραπαλώνου ῥίζα σὺν μέλιτι, μυρσίδος ῥίζα μετὰ ῥοφήματος, πίσσης ὑγρᾶς κυάθου πλῆθος ἐκλειχόμενον, τράγου χυλὸς, ἢ τράγειον ἐκλειχόμενον, ῥᾶ σὺν ὕδατι, ἐλάφου στέαρ νεαρὸν καθεφθὲν ἐν ῥοφήματι, βούτυρον σὺν μέλιτι ἐφθόν.

XXXIX. Δυσπνοίας δὲ καὶ ἁδμαλίας καὶ ὀρθοπνοίας πολὺ ἀβρωτόνου < ά. σὺν ὕδατι χλιαρῷ, ἀδιάντου ἀφέψημα σὺν ὑδατι. περικλυμένου < ά. ἐπ' ἡμέρας μ'. σὺν οἴνῳ, κυίδης καρπὸς σὺν μέλιτι, ὀμφακίνου πυθμένος ξηροῦ < γ'. σὺν μελικράτῳ, βρυωνίας ῥίζης

Subdubitat Matthiolus legendum ne ſit χρονίσμασι.

Forte, σπαλαξ ἢ σπαλαξιπιτ.

Aneſidium Matth.

Matthiolus legendum putat, ἔρυσιμον σπερμα θαψίας, σὺν μέλιτι ἐκλειχόμενον χρηστὸν ἐφ' ὑδρωπικοῖς. Matth. Cefa l. è relatum hæc Cornarius.

Myrſidis.

ὁμοίως, vox ſimile verbum hic inferendum. Non ſolum autem potus, ed & aliter ſumẽdo quædam remedia ſequuntur, &c.

χυλὸς ⊀ . μ̄ μέλιτος, ἀμμωνιακοῦ ⊀ ά. A
Dioſc 3 de mat. med. cum melle aut paſſa ſumore. σὺν ὀξυμέλιτι, ἀναγύρου φύλλων ⊀ ά. ἐν γλυκεῖ, ἀριστολοχίας ⊀ ά. τῆς ῥίζης μ̄ μέλιτος ἐκλειχομένη, ἀρτέμισιον ἐφθὸν ἐσθιόμενον, ἄσφαλτος αἱτὴ καταπότου λαμβανομένη, βαλανίου καρποῦ ⊀ ά. σὺν ὀξυμέλιτι· βότρυς, ὃν ἀμβροσίαν καλοῦσιν ἔνιοι, μετ' οἴνου στρουθίου κοχλιάριον μ̄ μελικράτου, σπονδύλιον ὁμοίως. δαφνίδες δύο λαβὰι σὺν μέλιτι, καὶ τὰ ἁπαλὰ τῶν φύλλων ὁμοίως. δρακοντίου ῥίζα ἢ ἄγρου ἐσθιόμεναι ἐφθαὶ, ῥοφούμενον καὶ τὸ ἀφέψημα τος. πνεύμονος ἐλαφείου, ἀλώπεκος ἥπατος, σκίγκος, ἴσα σὺν ὕδατι. ἢ κυνὸς ἰδία μετὰ μέλιτος. ἴριος σὺν ὑσσώπῳ καὶ μελικράτῳ ἐν καταπότῳ δεδομένη. ἐλατίου ἀπόζεμα, σμύρνης κυάμου μεγέθος ἐν καταπότῳ λαμβανόμενον, σμυρνίου ἀπόζεμα. θαψίας ὀπὸς ὀβ. ά. ἢ χυλοῦ ⊀ ά. θεῖον ἐν ᾠῷ δεδομένον. θύμου, ἢ θύμβρας, ἢ ὑσσώπου ἀπόζεμα, ἢ αὐτὰ λαβὰ μετὰ μέλιτος ἐκλειχόμενα. ἱππουρίδος χυλὸς, καλαμίνθης ἀπόζεμα, χαλβάνη αἱτὴ καταπότου, κενταυρίου μεγάλου ῥίζης ⊀ ϛ'. σὺν οἴνῳ, κέγχρου ⊀ ά. σὺν οἰνομέλιτι, φοίνικες ⊀ ά. μετ' οἰνομέλιτος, χαμαιδρύος χυλὸς ⊀ ά. μετ' οἴνου, κυπαρίσσου σφαγεῖα σὺν οἴνῳ, κλύσμων σὺν ὀξυκράτῳ. χαμαισύκη πινομένη παύει τοὺς παροξυσμούς. μελάνθιον πινόμενον μετ' ἀνήθου. ἢ μελισσοφύλλου χυλὸς ἐκλειχόμενος, ἢ κυδωνίων πεπείρων χυλός. ὀπόφυλλον μετ' ὀξυκράτου ἢ ὄξους· οὖρον παιδὸς ἀφόδευσιν καταῤῥοφούμενον, πλατυκαδμίας ῥίζης ἀπόζεμα ἐν ὄπει, καυσαλυμένου φύλλων χυλὸς, πηγάνου ἀγρίου σπέρμα μετὰ μελικράτου, πίσσα ὑγρὰ μ̄ μέλιτος ἐκλειχομένη, πισσέλαιον ὁμοίως, πρασίου ἀφέψημα, ῥαφάνου φλοιοῦ χυλὸς ἐκλειχόμενος σὺν μέλιτι, σμυδαλοειδὴς σὺν ῥητίνῃ τερμινθίνῃ ἐκλειχομένη, σκίλλης ὄπὸς ⊀ ά. μετ' ὀξυμέλιτος. πάνακος ἀφέψημα, ἀβρότονου ὁμοίως. γάλα ὄνου πινόμενον, ἐν καταπότῳ. ὄνου καταπίδιον πινόμενον ι'. μεθ' ἡμικοτυλίου ἐλαίου ἡσπ. ἢ ἐλατηρίου ⊀ ά. νίτρου ⊀ ά. ὁμοίως. σινήπεως ⊀ ά.

Dioſc. 3. de mat. med. obolorum trium pondere cum melle.

Forte νίτρου aut νίτρου, & pro eo quod præcedit σινήπεως, δλβίμου.

ſuccus drach. j. pondere cum melle, ammoniaci drach. j. cum aceto mulſo, anagyri folia drachmæ pondere in paſſo pota, radicis ariſtolochiæ drach. j. cum melle delincta, plátago elixa in cibis ſumpta, bitumé catapotij vice aſſumptum, baccharidis decoctũ ex aqua, balſami fructus drach. j. pondere cum aceto mulſo: botrys, quam ambroſiam nonnulli appellant, cum vino: ſtruthium cochlearis menſura cum melle, ſpondylium eodem modo; lauri baccæ duæ tritæ cum melle: dracunculi vel ari radices elixæ in cibis aſſumptæ, iure decocti ſimul etiam abſorpto: pulmonis ceruini, iecoris vulpini & ſtœchadis partes portiones ex aqua: caſtorium priuatim cum melle, iris cum hyſſopo & melle catapotij inſtar exhibita, helenij decoctũ, myrrha fabæ magnitudiné inſtar catapotij deglutita, ſmyrnij decoctum: liquoris thapſię obolus vnus, aut ſucci eiuſdem drach. j. ſulphur in ouo exhibitum: thymi, thymbræ aut hyſſopi decoctum, aut eadem trita cum melle delincta: equiſeti ſuccus, calaminthæ decoctum, galbanum inſtar catapotij deglutitum, cétaurij maioris radix drach. ij. pondere cum vino, betonicæ drach. j. cũ vino mulſo, palmulæ drach. j. cum vino mulſo, ciſſanthemi drach. j. cum vino, cupreſſi pilulæ cum vino, periclymenon cum poſca: chamæſycę pota ſoluit paroxyſmos: melanthium cum anetho potum, meliſſophylli ſuccus delinctus, ſimilitérque cotoneorum maturorum ſuccus, laſerpitij ſemen cum porro & aceto, vrina pueri impubis abſorpta, peucedani radicis decoctum & liquor, periclymeni è foliis ſuccus, rutæ agreſtis ſemen cum melicrato, pix liquida cum melle delincta, oleum picinum ſimili modo, marrubij decoctum, raphani è cortice ſuccus delinctus cũ melle, ſandaracha cũ reſina terebinthina delincta, ſcillæ aſſatæ drach. j. cum aceto mulſo, panacis decoctum, itidémque abrotoni, lac aſininum hauſtum, ſulphur catapotij vice ſumptum, millepedæ numero x. ieiunis potæ ex dimidia olei hemina. Aliud: ex elaterij, nitri, ſinapeos, an. drach. j.

μέλιτι ſorti.

Πεπερίδιον malum quoquo & hoc elymenum appellatur.

Dioſc 3 de mat. med. cum vino.

Plin. lib. 2. de mat.

catapotia conformato, è quibus bina exhibeantur. Valet & erucæ semen cum melle, necnon & ferri candentis in aceto extincti dilutum bibitum. Sunt & anhelatoribus vtiles iidem suffitus, quos tussi diuturna infestatis per ollulam adhibendos antea præscripsimus.

Ad intestinorum affectus remedia.

Ad tormina

Iis qui diuturnis cruciantur torminibus conueniunt in potu: agarici oboli duo ex aqua, radicis graminis Parnassij decoctum, & ipsa quoque radix sicca in vino vel melicrato, pæoniæ radix cum vino aut melicrato, chamæpityos decoctum, chelidonium cum vino, libanotidis semen cum vino, seseleos semen & radix cum vino, damasonij drachma vna cum vino, cuminum Æthiopicum & syluestre cum vino, iris delincta cum melle: oleum cum ruta coctum, cyathorum sex mensura potum, additis nitro & melicrato: serpylli decoctum, eryngij radix drach. j. pondere cum vino, calaminthæ decoctum, castoreum cum aceto, centaurij maioris radix drach. ij. pondere cum vino, betonicæ foliorum drach j. cum vino, libanotidis radix cum vino, ligusticum cum aqua, eodem modo & ipsius radix, mei dilutum, apiastrum cum vino, ferulæ semen cum vino: similiter & peucedani radix decoctúmve aut liquor: nitrum aut spuma nitri cum decocto rutæ, cumini aut absinthij, vel cum oleo, aqua & vino: laserpitij semen potum, sampsuchi decoctum, sisymbrij semen, scillæ assatæ drach. j. cum aceto mulso, chamædaphnes Alexandrinę folia in vino pota, pseudobunij ramuli quatuor ex aqua, petroselinú cum vino, piper cum lauri foliis, anethi decoctum, fœnumgræcum cum cnici semine decoctum potúmque, lauri baccæ decẽ [in alio, septem] cum duobus vini cyathis, panacis decoctum cum vino & oleo potum.

Ad inflationes intestinorum

Inflatis cum dolore quodam ac distentione ista conueniunt: ammi cum ficco anethi semine potum ex melicrato, aut eiusdem sicci de-

A κεζα πόπια ποιῆσαι, δύο δίδου. ἢ ὀίζώμου σπέρμα σὺν μέλιτι. ποιῆ καὶ σκόρδου πεπυρωμένου ἐναποσβεσθέντος ὄξει πινόμενον ὃ ἀπόβρεγμα. Ὑποθυμᾶται δ' ὠφελίμως ὡρὸς ἀδμαπνοὰς, ὅσα καὶ ὑπὸ τὴν χρονίως ἐπιόντων ἐπιτείνεται ἀφ' ἧς ἄμβιχος.

Τῶν ὠδὲ τὰ ἔσπερα παθῶν βοηθήματα.

Caput aliorsū ad spirandi difficultatem quod hoc loco legebatur tanquam illegitimum ad sedem translatissimus.

B

XL. Πρὸς δὲ τοὺς τροφουμένους χρονίως ἁρμόζει πινόμενα· ἀγαρικοῦ ὀβ. β'. μεθ' ὕδατος θερμοῦ. ἀγρώστεως τῆς ἐν Παρνασσῷ τῆς ῥίζης ἀφέψημα, καὶ αὐτὴ ἡ ῥίζα ξηρὰ ἐν οἴνῳ ἢ μελικράτῳ. γλυκυσίδης ῥίζα σὺν οἴνῳ ἢ μελικράτῳ, χαμαιπίτυος ἀπόζεμα, χελιδόνιον σὺν οἴνῳ, ἢ λιβανωτίδος σπέρμα σὺν οἴνῳ, σεσέλεως καρπὸς καὶ ῥίζα σὺν οἴνῳ, [καὶ δαμασωνίου] δαμασωνίου < ά. μετ' οἴνου, κύμινον Αἰθιοπικὸν καὶ ἄγριον μετ' οἴνου, ἶρις ἐκλειχομένη σὺν μέλιτι, ἔλαιον πινόμενον μετὰ πηγάνου ἀφεψήματος κορύμβων ἓξ σὺν νίτρῳ καὶ μελικράτῳ. ἑρπύλλου ἀπόζεμα, ἠρυγγίου ῥίζης < ά. μετ' οἴνου, κεκλημένης ἀπόζεμα, καστόριον σὺν ὄξει, κενταύριον τὸ μέγα τῆς ῥίζης < β'. σὺν οἴνῳ. κεντρομύλλων δραχμὴ ά. σὺν οἴνῳ, λιβανωτίδος ῥίζα σὺν οἴνῳ, λιγυστικὸν σὺν ὕδατι, καὶ ἡ ῥίζα αὐτοῦ ἐμείσας. μήου ἀπόβρεγμα, μελιαπόφυλλον σὺν οἴνῳ, νάρδηκος σπέρμα. σὺν οἴνῳ. πολυποδίου ῥίζα ὁμοίως, ἢ ἀπόζεμα, ἢ ὀπός. νίτρον ἢ ἀφρὸς νίτρου μετὰ πηγάνου ἢ κυμίνου, ἢ ἀψινθίου ἀποζέματος, ἢ μετ' ἐλαίου καὶ ὕδατος καὶ οἴνου. ὑπέρφυλλον πινόμενον, σαμψύχου ἀπόζεμα, ὑποσμυρίδος σπέρμα, σκίλλης ὀπὸς < ά. σὺν ὀξυμέλιτι. χαμαιδάφνης Ἀλεξανδρίνης σὺν οἴνῳ πολεῖσα. ψευδοβουνίου κλωνία δ'. μετὰ ὕδατος, πετροσέλινον σὺν οἴνῳ, πέπερι μετὰ δαφνίνων φύλλων, ἀνήθου ἀπόζεμα· τῆλις μετὰ κνίκου σπέρματος ἀφεψηθεῖσα πινομένη, δαφνίδες ἀφεψημέναι ι'. (ἐν ἄλλῳ ζ'.) ἐν οἴνου κυάθοις δυσί, πάνακος ἀπόζεμα μετὰ οἴνου καὶ ἐλαίου, καὶ πινόμενον.

Abundant hæc verba, ex frequenti nomine Damasonij, autori, corrupta.

Κνίδιον, Meibomius ex cap. 30. lib. 2. de mat. med.

Gal. 12. Simpl. cum oxycrato. κατὰ μείον τὸ μηλίνου.

οἶνον σὺν οἴνῳ Meibomius.

XLI. Πρὸς δὲ τοὺς ἐμπνευματουμένους μετὰ ἀλγήματος κοσοῦ ἢ διαλύσεως ἁρμόζει· πινόμενον ἄμμι σὺν ἀνήθου σπέρματι ξηρῷ μετὰ μελικράτου, καὶ τὸ ξύλου αὐτοῦ ὃ

Meibomius ἐκφύλλεγδα legendum videtur.

ἀπόζεμα. λαπάθου ἀπόζεμα σὺν ὕδατι, A ἀσκληπιάδος ῥίζα μετὰ οἴνου. ἀψινθίου ἀπόζεμα δοθὲν μετὰ στοίχαδος καὶ ναρδόυ Κελτικῆς, ἢ ὄξους, ἢ ὕδατος. ξυλοβαλσάμου ἀφέψημα, ἢ τῦ καρποῦ σὺν οἴνῳ. ἑλενίου ἀπόζεμα, ἠρυγγίου ῥίζης ≺ ά. μετ' οἴνου καὶ ἀψινθίου. λιγυστικὸν σὺν ὕδατι. καστόριον σὺν ὄξει, κέστρου φύλλων ≺ ά. κόστου B ≺ ά. μετ' οἴνου καὶ ἀψινθίου. ἢ τῶν πλαρμικῶν τροσαγωγή.

Potũ, ὡς ἐπὶ βάσει.

XLII. Πρὸς δὲ τὰς δήξεις τῶν ἐντέρων ἁρμόζει, αἰδράχνη ἐσθιομένη, καὶ ὁ χυλὸς πτισάνης. καὶ μαλόχη ἐσθιομένη. ἐγκλυζόμενα δὲ ὠφελεῖ τὰς δήξεις ἀφέψηται, χυλὸς ὀρύζης, ἢ χόνδρου, ἢ τραγου, C ἢ πτισάνης, ἢ μαλόχης, ἢ τήλεως, ἢ λινοσπέρμου.

Ad intestinorum morsus

XLIII. Καταπλασθὲν δὲ ὠφελεῖ τοὺς τροφυσωδεῖς, κύμινον λεῖον ἱκανὸν μιγὲν ἀλεύρῳ ἐν εὐρυχωρίᾳ ὠμηλύσεως ζωμοῦ. ὠφελεῖ δὲ καὶ τὸ, καρύων βασιλικῶν πυρωθέν σὺν τῷ κελύφει, καὶ περιελιχθὲν ἐρίῳ, ἢ ὀθονίῳ, καὶ ὀπὶ τιθὲν D τῷ ὀμφαλῷ. πίτυρα σὺν πηγάνῳ ἀπόζεμα τῷ ὄξει. τῆλις ἢ λινόσπερμον σὺν μελικράτῳ. τέφρα θερμὴ ἐληθεῖσα εἰς βυβλίον, καθεῖσα ὄξει. διὰ δὲ περιτιθέντος ὠμόλινον, διπλοῦν περικαθάπτειν τὸ βυβλίον τῷ ἀλγοῦντι μέρει.

Tormina sedat adcommodata.

βυβλίον, vt infrà de alui profluuio ad finem.

XLIIII. Κωλικοῖς δὲ ἁρμόζει πόμμα· ἄμμι μετ' οἴνου, ὀρνιθοκόπρου E πεπυρωμένη· ἀφόδος φοινικῆς μετ' οἴνου, ἀρκευθίδες ἐσθιόμεναι, καὶ πιόμεναι, ἰτέας καρπὸς καὶ τὰ φύλλα μετ' οἴνου καὶ ἐλαίου πιπέρεως, ἢ ὀξάλμης τῶν φύλλων, πετροσελίνου, ἢ πολίου ἀφέψημα μετ' ὕδατος, κοχλίαι Λιβυκαὶ σὺν τῷ ὀστράκῳ λεῖαι μετὰ μυρσίνης ὀλίγης F καὶ πεπέρεως μετὰ οἴνου πόσεις, τήλεως ἐλεσμένης κοχλιάρια β'. μετ' ὕδατος.

Ad colicum affectum.

Ponderis nota abundare videtur.

cumme reflituit Crefp. ex lib. 2. de mat. med.

XLV. Ἐλεώδεις δὲ ὠφελεῖ ἐπίθεμα· ἔλαιον, πηγάνου ἀσπὶς ὀπὸς ἀφεψήσεως ἢ ἀψινθίου. σῦκα ξηρὰ μετ' ἐλαίου καὶ πηγάνου ἐψηθέντα, κύμινον σὺν ἐλαίῳ ἐφθόν. Τοῖς δὲ χρονίοις ὠφελεῖ, κολοκυνθὶς ἀφεψηθεῖσα σὺν ὕδατι καὶ ἐγκλυσθεῖσα, ἀσφάλτου ≺ δ'. μετὰ ὕδατος ὁμοίως ἐγκλυσθεῖσα. Ὠφελοῦσι δὲ καὶ ἐλεώδεις, ἐλαίῳ μύρῳ πεπτόμενοι, ἀσφάλτῳ λίθῳ ὕδατος καὶ νίτρου. Iti-

Ad ileosos.

coctum, lapathi decoctum ex aqua, asclepiadis radix cum vino, absinthij decoctum exhibitum cum seseli & nardo Celtica, aut cum aceto vel aqua, balsami ligni fructúsve decoctum in vino, helenij decoctum, eryngij radix drach. j. pondere cum vino & absinthio, ligusticum cum aqua, castorium cum aceto, betonicæ foliorum drach. j. costi drach. j. cum vino & absinthio: ea denique admota per quæ sternutamenta euocantur.

Ad intestinorum morsus

Faciunt ad intestinorum morsus, portulaca comesta & eiusdem succus epotus, malua esitata. Per sedemverò infusus iuuat, cremor decoctę oryzæ aut chondri, aut tragi, aut ptissanæ, aut maluæ, aut fœnigræci aut seminis lini.

Torminosis adcommodata.

Torminosos hæc iuuant pro cataplasmate adhibita: cuminum sat copiosum tritum, & farinę crui ammixtum malagmatis in modum, quod è cruda farina hordeacea paratur: iuglans ignita cum suo putamine lana linteolóve obuoluta & vmbilico imposita, furfures cum rutæ decocto & aceto, fœnumgręcum aut lini semen cum aqua mulsa: cinis calens in aceto feruefactus & catino inditus, qui quidem duplici linteo circundatus ad dolentem partem accommodetur.

Ad colicum affectum.

Colicis medentur hæc assumpta: ammi cum vino, fimus gallinaceus tostus cum vino, iuniperi baccæ in cibo potúve sumptæ: salicis semen & folia cum vino & pauco pipere, aut foliorum decoctum: petroselini aut polij decoctum ex aqua: cochlea Africana cum sua testa contrita, è vino pota, addito exiguo myrrhæ & piperis: pollinis fœnigræci cochlearia duo ex aqua.

Ad ileos.

Ileosos iuuant per sedem infusa: oleum cui sit incocta ruta vel absinthium, caricæ cum oleo & ruta decoctæ, cuminum cum oleo coctum. Diuturno verò malo infestatis prosunt, colocynthidis decoctum ex aqua per clysterem infusum, bituminis drach. iiij. ex aqua similiter infusæ. Hisce porrò etiam propinatis iuuantur ileosi: vnguento irino, bitumine cum aqua & ni-

tro. Iti-

tro. Itidem panacis drach. viij. nitri vna; cumini duæ melle excipiuntur: dosis auellanę magnitudo cum aqua calida.

Ad colicos paroxysmos.

Colicis in ipsis paroxysmis exhibeto lapidis specularis vsti tritique cochlearium vnum ex aqua calida, similiter & erinaceorum marinorum vstorum cinerem, aut stercus caninum album cum nitro ex aqua calida dissolutum insperso modico pipere, aut fimum hirũdinum contritum simili modo.

Ad alui diuturna profluuia.

Alui diuturna profluuia sistunt hæc in vino pota: viticis semen drach. j. pondere, radix graminis Parnassij drach. j. pondere, anchusæ folia, adianti succus, semperuiui succus cũ thure, succi acacię drach. j. hypocisthidis drach. j. rhois succi tantundem, spinę albę tantundem, acanthi pæderotis radix, hyacinthi semen, acorum tritum, lagopus, polygoni succus cum vino, maluæ radix, rubus decoctus cum phœnicobalanis, damasonij foliorum drach. j. amomum, acinorum nuclei tosti tritique polentæ vice, anisum, anethum, fimus columbinus tostus, stercus caninum album aridum: plantaginis semen & succus: aut herbæ ipsius partes duæ cum malorum cotoneorum tostorum parte vna ex vino diluto propinentur: poteris & interdum polentam addere. Conferunt & iuniperi bacæ cum vino, aspalathi decoctum, bitumen instar catapotij deglutitum, astragali radicis drach. j. pyra sylucstria sicca tritáque inspersa potioni sorbitioníve, aut potum eorundem decoctum: quinquefolij decoctum, terræ Samiæ drach. j. cum balaustio vel croco Cilicio, pæoniæ radicis decoctum, mediani quercus corticis aut eius pelliculæ quæ glandem proximè contegit decoctum, panicum tostum loco polentæ, cornu cerui vsti drach. iij. myrrha in modum catapotij deglutita, fœniculi semen & radices, salicis foliorum succus, castanearum corticis decoctum, galla contrita inspersa aquæ aut vino austero, lixiuium è cinere ficulneo cum aceto feruefactum & absorptum, radicũ rumicis in petris nascentis decoctũ. Lixiuij cyathi duo, aceti vnus, olei dimidius misceatur, calidúmq; sorbeatur. Sic & aristolochię drach. iij. cytinorum drach. j. ex vino bibantur.

Α γλ. πόαχος ≤ ἡ. νίτρου ≤ ᾱ. κυμίνου ≤ ϛ'. μέλιτι μίξας, δίδου καρύου Ποντικοῦ τὸ μέγεθος σὺν ὕδατι θερμῷ.

Morbanus legit ᾱ. ιι. κ.

ΧΛVΙ. Κωλικοῖς ἐν αὐτοῖς τοῖς παροξυσμοῖς δίδου ὀξυφθονές, παύσας καὶ λεάνας κοχλιαρίου ἓν δι' ὕδατος θερμοῦ, ἢ ἐχίνων θαλασσίων καέντων ὁμοίως. ἢ κυνείδιον λευκὸν σὺν νίτρῳ, ὀξυλύσας δι' ὕδατος θερμοῦ, πεπέρεως ὀλίγου ὅτι πάσων. ἢ χελιδόνων κόπρον λεάνας ὁμοίως.

Β

Ad eadem addendum.

ΧΛVΙΙ. Κοιλίας ῥεούσας χρονίως ἐφίστησι πυρήνα σὺν οἴνῳ. ἄγνου σπέρματος ≤ ᾱ. ἀγρώστεως δ' ἐν Παρνασσῷ ῥίζης ≤ ᾱ. ἀδιάντου φύλλα, ἀδιάντου χύλισμα, ἀψίνθου χυλὸς σὺν λιβανωτῷ, ἀκακίας χυλίσματος ≤ ᾱ. ὑποκιστίδος ≤ ᾱ ῥοὸς χυλῷ ≤ ᾱ. ἀκάνθης λευκῆς ≤ ᾱ. ἀκάνθου παιδερωτίδος ῥίζα, ὑακίνθου σπέρμα, ἄκορον λεῖον, λαγώπους, πολυγόνου χυλὸς σὺν οἴνῳ, μηλέας ῥίζα, βάτος ἐναφεψηθὲν μὲν φοινικοβαλάνων, δάμασωνίου φύλλων ≤ ᾱ. ἄμωμον. γλάρτα φοινικοβάλανα αὐτὰ ἀφίψου λεῖα, ἄνισον, ἄνηθον, κόπρος περιστερᾶς ἄφοδος φωκικὴ, κυνὸς ἄφοδος ξηρὰ λευκή. ἀγριολίνου σπέρμα καὶ ὁ χυλὸς, ἧττον μέρη ϛ. κυδωνίων πεφωσμένων μέρος ἕν, εἰς ὕπνον πυρήνων μὲν χαρίεντος· μυγμοῖς δ' αὖ ἐπίδοσις τὰ ἄλφιτα. ἀρχευθίδες μεθ' οἴνου, ἄσπαλάθου ἀποζέμα, ἀσπάλαθον αὐτὸ καὶ τὰ ποτίου, ἀσφαλάθου ῥίζης ≤ ᾱ. ἀλφάδος ξηρᾶς ὃ ἄλφιτον. ὀπὸς πλατάνου ὀπὸς πυρήνων, ἢ πυρήνων τὸ ἀφέψημα· πτελέας φύλλα τὸ ἀφέψημα, γῆς Σαμίας ≤ ᾱ. σὺν βοληδίῳ ἢ χρόᾳ Κιλικίῳ, γλυκυσίδης ῥίζης ἀφέψημα. δρυὸς ὑμενίδιον, ἢ τῶν περὶ τὸ βάλανον ὑμενίδιον τὸ ἀφέψημα· ἔλυμον φοινικὸν ἀπὸ ἀφίψου, κέρατος ἐλαφείου κεκαυμένου ≤ γ'. σμύρνα αὐτὴ καθ' ποτίου λαμβανομένη, μαράθου σπέρμα καὶ ῥίζαι, ἰτέας φύλλων χυλὸς· καστανέας φλοιοῦ ἀποζέμα, κηκὶς λεία ὀπτὴ ἀποσβεσθεῖσα ὕδατι ἢ οἴνῳ αὐστηρῷ. κοτύλαι συκίνῃ μὲν ὄξους ξεσθεῖσα καταρροφουμένη, πεύκης λεπάδου ῥιζῶν ἀφέψημα. κοτύλαι κυ. β'. ἐλαίου ν'. ὄξους κυ. ᾱ. θερμὰ καταρροφούμενα. ἀριστολοχίας ≤ γ'. κυτίνων ≤ ᾱ. μεθ' οἴνου.

Γ Δ Ε Ζ Η Θ

Adderé, Ἀπὸ τοῦ ἀφέψημα, ex lib. j. de mat. med. cap. j.

ἀπὸ τῶν.

Morbanus suspicabatur legendũ τῶν πεπόνων ἀντὶ δυοῖν quarti lapathi. Forte κυ. ϛ'. id est, cyathus semis.

Ad dysenteriã &c. (sumpta)

ΧΛVIII. Δυσεντερικοὺς ὠφελεῖ μὴ καὶ πὸς κοιλιακοὺς ἀναγεγραμμένα. ἰδίως δὲ μετ' οἴνου λαμβανόμενα, ἢ ζύμματός τινος, ἁρμόζει· ἀγαλλόχου ℈ ά. ἑλελίσφακος. ὑπατωρίου χυλὸς καὶ ἡ πόα. πενταφύλλου χυλὸς καὶ ἡ ῥίζα ξηρά, ἑτεροκλαδὶς, σιδηρίτιδος τῆς Ἡρακλητίδος φύλλα καὶ ἡ ῥίζα, ἰτέας ῥίζα. συμφύτου ῥίζα, καὶ ὁ καρπὸς καὶ φύλλα. ὀξαλίδος ὁ καρπὸς, νυμφαίας καρπὸς, ἀλθαίας ῥίζης ἀφέψημα, Ἀχιλλείου πόας ἀφέψημα, βάτου χυλὸς καὶ ὁ ἀφέψημα τῶν καυλῶν, γάλα ἐφθὸν αἴγλου, ἀσκίας ῥίζα, γναφάλιον σὺν οἴνῳ αὐστηρῷ, ἐλάτιον μετὰ λινοσπέρμου ἑφθεῖσα καὶ πινομένη. ἐλάτης μυρσινίκης ἀποζεμα, θύπατωρίου σπέρματος ℈ ά. σὺν οἴνῳ, κέρατος ἐλαφείου ℈ ά. μετ' οἴνου καὶ μίλτος τοσαφεψημένου ὡς λειχομένη. ἱπποφαές δ' ἕψου σπέρματος ℈ . καὶ ℈ έ. αὖθι λευκοῦ χιονοῦ σὺν οἴνῳ, πινόμενα δὶς τῆς ἡμέρας· μυρσίνης καρπὸς σὺν οἴνῳ, χλυμένου χύλισμα. λωτοῦ ἀρισμάτων ἀφέψημα σὺν οἴνῳ, μίλτου Λημνίας ἢ Σινωπικῆς ℈ ά. σὺν οἴνῳ, οἰνάνθη ξηρὰ πινομένη αὐτὴ ἀλφίτου, ὀλοχοίνου καρπὸς πεφωσμένος, Φιλεταιρείου ῥίζα σὺν οἴνῳ, χονδρίλλης χυλὸς, * ἴριος μετ' οἴνου, φλόμου ῥίζης ℈ β. ψυλλίου ℈ ά. σὺν ὕδατι, κυνείας κόπρος ξηρὰ βεβρεγμένη οἴνῳ, λαγωοῦ πιτύας ℈ ά. σὺν ὕδατι.

Dysenthericis prosunt, tũ quæ ad cœliacos facientia præscripsimus, tum verò peculiariter hæc, cum vino aut astringente quopiam decocto sumpta: agallochi drach. j. saluia, eupatorij succus, & herba ipsa, quinquefolij succus, siccáque radix, hypocisthis, marrubij succus, sideritidis Heracleæ folia & radix, salicis radix: symphyti radix, semen & folia: oxalidis semen, nymphææ semen, althææ è radice decoctum, Achilleæ herbæ decoctũ, rubi succus & caulium decoctum, lac caprinum coctum, aleæ radix, gnaphalium cum vino austero, elatine cum lini semine decocta & pota, olates vnguentarię decoctum, eupatorij seminis drach. j. cum vino & melle priùs excocto delincta: hippomarathri seminis drachma vna aut altera, hederæ albæ flores cum vino bis in die poti, myrti fructus cum vino, clymeni succus, loti ramentorum decoctum in vino, rubricæ Lemniæ aut Sinopicę drach. j. in vino, œnanthe sicca [tritáque] polentæ vice pota, holoschœni semen tostum, philetærij radix cum vino, chondrillæ succus, iris cum vino, verbasci radicis drach. ij. psyllij drach. j. ex aqua, caninum stercus aridum vino insperssum, coagulj denique leporini drach. j. ex aqua.

Cœliacis & dysentericis in cibis vtiliter exhibentur, maluę sine sale oleris instar, oliuæ recentes maturæ: sanguis hirci vel caprę vel cerui aut leporis inassatus sartagine & assumptus, vuæ in vinaceis seruatæ, vuæ passæ immaturæ tusæ & cum farina in panes coactæ, panis cum vitellis ouorum subactus & tostus, vua passa cum suis nucleis esitata, amylum cum chondro cocto & lacte, plantaginis folia cocta cum aceto & oleo, galla vel rhus insperssa opsonijs, zea tosta, lens tosta & trita instar polentæ pota: similiter & vuarum nuclei aut polenta, aut milium: rubi tenelli surculi cocti, ex aceto & oleo in cibo sumpti: plantago simili modo: rubi fructus maturus esitatus, vel immaturus siccatus, vel recens, vel decoctus, vel succus expressus, vel succus decoctus, vel folia cocta, vel recentia, vel decocta, vel radix decocta, vel cortex radicis decocti, vel succus expressus, vel succus decoctus, vel semen tritum, vel semen decoctum, vel semen expressum, vel semen decoctum

rus tritúsque pro rhoë inspersus oblonus: galla omphacitis cum pulte cocta ex aqua, similiter & vuarum nuclei aut vuæ passæ, ita tamen vt cum puls editur reiiciantur: helenium coctum in cibo sumptum: puls e panico vel milio, aut zea, vel chondro tosto vel oryza: smyrnium decoctum, iuglandes, siliquæ siccæ & quæ vinaceis condiuntur, galla trita cum sorpta cum ouo tum etiam vino inspersa, coronopodis radix in cibo sumpta: faba Græca decocta in polca, vna cum cortice suo esitata: lini semen frixum & cum melle coctò sumptum, loti fructus esitatus: mel coctum vel per se deuoratum, vel cum malicorio tuso cribratóque: mespila, mala cotonea matura cocta cum melle: aut emalis cotoneis dissectis arundine & in aqua maceratis dilutum propinatum: vinum myrtites haustum, e myrti baccis extractus succus, decoctum è sorbis siccis epotum & ex isdem farina polentæ loco sumpta, vti & e pyris syluestribus, intyba cocta cum aceto, & plantago eodem modo, necnon & apij cauliculi: lens cocta cum plantagine aut portulaca, aut intubo vel cichorio, aut Punici corticibus, palmulisve Thebaïcis: adeps cerumnus recens cum caseo vel polenta coctus, hepar tostum capræ vel hirci cum melle in sartagine frixum, cerebrum simili modo: caseus recens derasus & feruefactus, posteáque cum melle in sartagine frixus: hirundinum pulli assati & pro ficedulis in cibo sumpti, viticis radix cocta cum lente, cera aut fauus si sorbitionibus incoquantur, brassica bis cocta comesta: lactucæ illotæ in cibis sumptæ, ab iis præsertim qui cibum fastidiunt: coagulum hinnuli, aut leporis aut hœdi in aqua dissolutum & potum.

Coeliacis & dysentericis vtiliter cataplasmatis instar imponuntur hæc: oleastri flos cum cruda hordei farina hydrelæo mixta eaq; tepefacta, rubi folia cũ malo cotoneo & cerato, myrti folia trita cũ vino & oleo omphacino dũ viscidũ lentorẽ cõtraxerint, & ex vellere imposita: hordeacea farina cũ vino & rubo,

Coeliacorum & Dysentericorum aliorum remedia.

A θεὶς ἀνὰ ῥοὸς λῆρος ὅπτι πάστιπα τοῖς προσοφήμασι. κηκὶς ὀμφακίνη μετ' ὀλίγου ἐψηθεῖσα σὺν τῷ ὕδατι, ἢ λίχαρβα ὁμοίως, ἢ σαρίδες, εἶτ' ἐξειρεθεῖσαι σὺν τῷ πολτῷ ἐσθιόμενον. ἔλενιον ἕψον ἐσθιόμενον. πόας ἐξ ἑλύμου, ἢ κέγχρου, ἢ ζειᾶς, ἢ χόνδρου πεφωγμένου, ἢ ὀρύζης. ἢ σμύρνιον ἕψον. κάρυα βασιλικὰ. κεφάπια ξηρὰ καὶ τὰ ἀπὸ σεμφύλων. κηκὶς λεία μετ' ὠοῦ ῥοφηθεῖσα, καὶ οἴνῳ δὲ ὅπτι πλαδεῖσα· κορωνόποδος ῥίζα ἐσθιομένη, κύαμος Ἑλληνικὸς καθεψηθεὶς σὺν ὀξυκράτῳ σὺν τῷ λέπει ἐσθιόμενος, λιβόστερμον φρυγὲν καὶ μετὰ μέλιτος ἕψον ἐσθιόμενον. λωτοῦ καρπὸς ἐσθιόμενος. μέλι

B ἕψον καταπινόμενον καθ' ἑαυτό, καὶ σὺν στδίοις κεκομμένοις καὶ σεσησαμένοις. μέσπιλα, μῆλα κυδώνια πέπερι ἑφθὰ μετὰ μέλιτος· ἢ ἁβροτόνου τὰ κυδώνια καὶ λείβων, καὶ ἐναποβρέχων ὕδατι, δίδου πίνειν ὃ ἀποβρεγμα. μυρσίτης οἶνος πινόμενος, καὶ μύρτα ξηρὰ χυλιζόμενα. ὰα ξηρὰ ἀποζεσθέντα, καὶ πινόμενα ὃ ἐξ αὐτῶν ἀλφίτων, ἢ

C ἀχράδων ὁμοίως. σίελδες ἕφθαι μετ' ὄξους, δρυόγλωσσον ὁμοίως· σελίνου καυλοὶ ὁμοίως. φακὴ μετὰ δρυογλώσσου, ἢ αὐδράχνης, ἢ σίελδος, ἢ κιχωρίων, ἢ ῥοιᾶς λεπτυσμένων, ἢ Φοίνικες Θηβαϊκοὶ ἑφθοί. φέρ ἐλάφου ἧπαρ ἑφθὸν σὺν τυρῷ ἢ ἀλφίτῳ ἑφθὸν

D μένον. ἢ παρδάλεως, ἢ τράγου, σὺν μέλιτι ὅπτι τηγανισθέν. ἐγκέφαλος ὁμοίως. τυρὸς ἁπαλὸς ἀποξανθεὶς καὶ ἀποζεσθεὶς, ἔπειτα σὺν μέλιτι τηγανισθείς. χαλιδόνων νεοσσοὶ ἑφθοὶ ἐλαιόμενοι αὐτῇ συκαλίδων. καὶ λύγου ῥίζα ἑφθὴ σὺν φακῇ. κηρὸς ἢ μελίκηρον ἐγκαταψύμενον τοῖς ῥοφήμασι.

E κράμβη δὶς ἑφθὴ ἐλαιομένη. ἀφίδακες ἁπλοῦν ἐλαιόμενοι, μάλιστα ὅπτι πρὸ αἱρέσεως. πιτύα νεβροῦ, ἢ λαγωοῦ, ἢ ἐρίφου διεθεῖσα ὕδατι καὶ πεθεῖσα.

ἐξιμπλέται fortè, vt reiteratus ad χίλιστα. Πολύπους

Legerim ἐσθιομένων Θηβαϊκῶν ἐ ἐμβρύων ex lib. 2. de mat. med. cap. de lãte. Gelnerus.

F 1. Καταπλάσσεται δὲ πρὸς χειλιακοὺς καὶ δυσεντερικοὺς ὠφελίμως, ἀγριελαίας ἄνθος σὺν ὠμῇ λύσῃ χλιαρᾷ. βάτου φύλλα σὺν μήλῳ κυδωνίῳ καὶ κηρωτῇ. μυρσίνης φύλλα λεῖα σὺν οἴνῳ καὶ ὀμφακίνῳ ἐλαίῳ γλοιώδη γλυκύμενα, καὶ σὺν ἐρίῳ ὅπτι θλιβόμενα. κρίθινον ἄλευρον σὺν οἴνῳ καὶ

βάτῳ, ἢ ἀχράδοις, ἢ σιδίοις, ἢ κυδωνίοις αἴ- A
θουσι· καὶ σὺν κηρωτῇ δὲ τὰ τῶν κυδωνίων
ἄνθη. ῥόας λέπη ἑφθὰ σὺν οἴνῳ λεῖα σὺν
κηρωτῇ. ῥοιᾶς βυρσοδεψικὴ σὺν κηρωτῇ. φοι-
νικοβάλανοι, ἢ ⓓ καρυωτὶ σὺν μέλιτι κυ-
δωνίῳ καὶ κηρωτῇ. οἰνάνθη, ἢ κυπρηρία σὺν
ἀλόῃ καὶ ἀκακίᾳ, καὶ φοίνικι σὺν ἀειζώου
σπέρματι. τῶν ἑτεραῖς κόπρος ξηρὸς σὺν B
συχῆς ἑφθοῖς σὺν οἴνῳ· ἢ μελάνθιον σὺν
κυμίνῳ καὶ θέρμοις πικροῖς καὶ νίτρῳ καὶ μέ-
λιτι. ἢ κάρδαμον σὺν σιδίοις ἑφθοῖς καὶ κη-
ρῷ καὶ ἀμύργῃ.

LI. Εἰσὶ παὶ δὲ ὅτι κοιλιακῶν συμφε-
ρόντως καὶ δίδονται δὲ ἀμπέλου φύλλοις
καὶ χυλός, αἰδράχνης, ἀκακίας, ὑοσκυ- C
κίδος, ξηρογλώσσου χυλός, βαλαύστιον,
μίλτος Σινωπικὴ μετὰ τινος τῶν φυόντων
ἀφεψήματος. λωτοῦ ἢ φηγοῦ τριμμάτων
ἀφέψημα ῥοῶν βυρσοδεψικῆς χύλι-
σμα, καὶ ὁ ἀφέψημα τῶν φύλλων. φακὴ
μετὰ ῥοδίνου ἀφεψηθεῖσα. πλατάμη σὺν
βάτου ἀφεψήματι, ἢ μυρσίνης, ἢ σφαι- D
ρείων κυπαρίσσου. καὶ καθ' ἑαυτὰ δὲ τὰ ἀ-
φεψήματα χωρὶς πλατάμης σὺν παὶ ὠφε-
λίμως.

LII. Ἐπὶ δὲ δυσεντερικῶν ἡμίζεσμον
καὶ τὰ τοῖς κοιλιακοῖς σύμματα, ἰδίως δὲ
ὅτι τῶν τοιουτοτρόπων· βούτυρον καθ'
ἑαυτὸ τοιοῦτον. ἢ μολόχης, ἢ τήλεως, E
ἢ λινοσπέρμου, ἢ χόνδρου, ἢ πλατάμης, ἢ
ὀρύζης, ἢ πεάρου ἑφθέντων καὶ τριφθέν-
των ὁ χυλός. ὅτι δὲ τῶν δίχα ἀλγηδόνος
ῥεόντων ζεσθέντων ἁρμόζει ἄλμη μετὰ οἴ-
νου, κέρας ἐλάφειον κεκαυμένον σὺν οἴνῳ
καὶ ῥοδίνῳ. ἄῤῥενικὸν σὺν χόρτῃ κεκαυμέ-
νον διπλάσιον, καὶ οἴνῳ. μολύβδου σκωρία, F
ἢ μολύβδαινα μετὰ μυρσινίνου. ἀσφαλ-
τος σὺν πλατάμῃ παχεῖσα, σοίβης ἀποζέ-
μα ζωὸ οἴνῳ. χάρις ὁ ἀπὸ τῶν ἰχθύων ἑ-
πτέμβριος ὅτι τῶν μετὰ τὸν ὁμῶν, καὶ ὁ ἀπὸ τῶν
σιλούρων. χοιρία συκῆν σαπρὴν. οὖρον πα-
λαιόν. κυάμου Ἑλληνικοῦ * τῶν λεπτοῦ ὃ
ἀφέψημα σὺν αἰγείῳ σίαπι. λισμαχὸς χυ- G
λὸς, λωτοῦ ἢ φηγοῦ τριμμάτων ἀφέψη-
μα σὺν αἰγείῳ σίαπι. μελισσοφύλλου χυ-
λὸς, μίλτος Σινωπικὴ σὺν ἀποζέματι σύφου ἢ ὀξάλμης.

aut pyris syluestribus, aut malicorio aut coroneorum floribus: itémque coroneorum flores cum cerato: Punici mali cortices in vino cocti, tritique cum cerato: rhus coriariorum cum cerato, phœnicobalani, aut caryotides cũ malo coroneo & cerato: œnanthe, aut alumen cum aloë & acacia, palmulis & sem peruiui semine: stercus columbinum aridum cum ficubus coctis in vino: nigella cum cumino, lupinis amaris, nitro ac melle: nasturtium denique cum malicorio cocto, cera & amurca.

Cœliacis per sedem vtiliter infunduntur, vitis foliorum succus, aut portulacæ, aut acaciæ, aut hypocisthidis, aut plantaginis: balaustium, rubrica Sinopica cum aliquo astringente decocto, loti aut fagi ramentorum decoctum, expressus rhoë coriaria succus, ac eisdem foliorum decoctum, lens cum rosis decocta: ptissana cum decocto rubi aut myrti vel pilularum cupressi. Ipsa etiam horum decocta per se citra ptissanam commodè infunduntur.

Cœliacis accommodata enemata.

Dysentericis eadem conueniunt enemata, quæ cœliacis: priuatim verò iis qui vehementiore dolore conflictantur, ista: butyrum recens per se: malvæ aut fœnigræci, chondri, ptissanæ, oryzæ vel tragi decoctorum tudiculáque agitatorum cremor. Iis vero qui citra dolorem fluxione infestantur, hæc infusa conueniunt: muria cum vino, cornu ceruinum vstum cum vino & rosaceo, arsenicum duplum crematum cum charta & vino, plumbi scoria aut plumbago cum myrtino oleo, bitumen cum ptissana liquatum, staœbes decoctum in vino: garum tum aliorum piscium, tum etiam silurorum iis infusum, quibus sunt depascentia vlcera: lixiuium è ficu stillatitium, vrina antiqua, fabæ Græcæ * minoris decoctum cum seuo caprino, lysimachiæ succus, loti aut fagi ramentorum decoctum cum adipe caprino, apiastri succus, rubrica Sinopica cũ decocto astringente aut acida muria.

Ad dysenteri-cos enemata.

συκῆν fortè, vel σαπρὰν. Gesn.

ὁ Sic forte, Gesn.

Gesn. legit ἀπὸ τοῦ φύλλου. μοι. ἢ κρανίας ἢ ὑπερικοῦ.

vel, cortiçis

Morsus intestinorum ab vehementioribus acrioribúsve infusis excitatos leuiunt ac mitigant

Morsus intestinorum à vehementioribus acrioribúsve infusis excitatos leuiunt ac mitigant, lac infusum, aut butyrum, aut chondri decoctum, aut sevum taurinum cum ptissanæ cremore curatum. Similiter & curatus gallinaceus adeps anserinus aut ceruinus: medulla itidem ceruina aut vitulina seu per se tepida infusa, seu etiam cum cremore ptissanę.

A LIII. Ἀπὸ τραπέλι δὲ τοῦ ἐν τῷ ὄπτα παμφύλων χυλοῦ ῥίζης, γάλα ἐγχυματιζόμενον, ἢ βούτυρον, ἢ χόνδρου ἀφέψημα. ἢ ζωύφτον σὺν τραγακανθίνῳ σὺν πτισάνης χυλῷ. ἢ ὀρνίθιον ὁμοίως, ἢ χλιεῖον, ἢ ἐλάφειον. ἢ μυελὸς ἐλάφειος, ἢ μόσχος καθ' ἑαυτὸν χλιαρὸς, ἢ σὺν χυλῷ πτισάνης.

Celiacis ac dysentericis infessus parantur huiusmodi

Celiacis ac dysentericis infessus parantur huiusmodi: è siluris aliisve piscibus garum aceto temperatum, rhois coriariæ decoctũ, malicorij decoctũ, itémque vinaceorũ & quorumuis astringentium. His porrò detoctis insidendum relaxato ano diductísque natibus, ac diutiùs immorandum.

B LIIII. Ἐγκαθίσματα δὲ τοῖς κοιλιακοῖς καὶ δυσεντερικοῖς ὅσα τῶν σιλούρων ἢ ἰχθύων μετ' ὄξους κεφαλῆς, ῥοὸς βυρσοδεψικῆς ἀφέψημα, ῥοιᾶς λεπτῆς ἀφέψημα· σεμφύλων ὁμοίως, καὶ πάντα τὰ τοῦ συφόρτων ἀφεψήματα. ἁρμόζει δὲ θερμοῦ ἐγκαθίζοντας ἐπιμένειν ἐν δαπέδῳ λίαν, καὶ ἐγχεομένους, ἐξ ἀφεστηλότας τὸν πυγμόν.

Ad tenesmum.

Porrò vt ne frequentes egerendi conatus solicitent, nodulus aliquis feruenti oleo, aquæ aut aceto immersus sedi adhibendus.

C LV. Πρὸς δὲ τὸ μὴ συνεχῶς ἐρεθίζεσθαι, διάσαρκα κατὰ δάκτυλον, βάλλοντας εἰς ἔλαιον ζέον, ἢ ὕδωρ, ἢ ὄξος τὸ ἐπιτύναι.

Vesicæ fellæ, hepatis ac splenis affectuum remedia.

Ad vesicæ fellæ morbum remedia.

Ictericis potui dáda quæ sequuntur: adianti decoctum in vino, anchusæ radicis drach. j. cum vino, atriplex, hyperici coma cum melle & vino, marrubium cum vino, peplium, spondylij radix & semen cum vino, rubiæ radicis drach. j. cum vino, aloës drach. j. ex aqua, anthemidis radix & flores cum vino, fimus caprarum, maximéque syluestrium cum vino, per se vel cum aromatibus: verbenacæ supinæ, quam sacram herbam nominant, foliorum drach. j. cum thuris obolis tribus ex vini veteris conchis duabus ieiuno ventriculo bibita quaternis senísve diebus: fœniculum cum vino: asparagi radicis decoctum, ac ipsum quoque semen similiter potum: absinthij succus expressus cum Indica aut Celtica nardo, aut cum apio vel adianto: buphtalmi folia in vino à balneo pota coloris bonitatem aliquantisper conciliát: seminis napi drach. iiij. cum vino, pæoniæ radicis drach. j. cum vino, cornu ceruini vsti drach. j. cum melle: cicer nigrum aut etiam album esitatum,

Τῶν περὶ τὴν ὑπὸ χόνδρον, ἤπαρ τε καὶ τὸν σπλῆνα παθῶν βοηθήματα.

D LVI. Ἰκτεριῶσι δὲ πίνειν, ἀδιάντου ἀποζέματι ἐν οἴνῳ, ἀγχούσης ῥίζης < ά. μετ' οἴνου, ἀτράφαξις, ὑπερικοῦ κόμη σὺν μέλιτι καὶ οἴνῳ, περάσιον μετ' οἴνου, πέπλιον, σπονδυλίου ῥίζα καὶ τὸ σπέρμα μετ' οἴνου, ἐρυθρεδάνου ῥίζης < ά. μετ' οἴνου, ἀλόης < ά. σὺν ὕδατι, ἀνθέμιδος ῥίζα καὶ τὰ ἄνθη μετ' οἴνου· κόπρος αἰγῶν, καὶ μάλιστα ἀγρίων, μετ' οἴνου, καθ' ἑαυτὰς καὶ σὺν ἀρώμασιν. ἱερᾶς βοτάνης τοῦ φύλλου < ά. μετὰ λιβανωτοῦ < ς'. σὺν οἴνου κυάθοις τρισὶ πρὸ τῆς ἐπὶ τὸ δεῖπνον ἐξόδου.

E πολυπόδιον ἐκ δρυὸς ξηρὸν, ἐκλεκτὸν, ἐν ὕδατι ἑφθὸν, καὶ πιόμενον ἐν ὕδατι ἑφθῷ, ἢ μετὰ γάλακτος ἐφθοῦ, ἢ μετὰ ὄξους ἐφθοῦ, ἢ μετὰ μέλιτος ἐφθοῦ, ἢ μετὰ οἴνου ἐφθοῦ, ἢ μετὰ ὕδατος ἐφθοῦ, ἢ μετὰ ὕδατος καὶ ὄξους ἐφθοῦ, ἢ μετὰ ὕδατος καὶ μέλιτος ἐφθοῦ, ἢ μετὰ ὕδατος καὶ οἴνου ἐφθοῦ, ἢ μετὰ ὕδατος καὶ γάλακτος ἐφθοῦ, ἢ μετὰ ὕδατος καὶ ὄξους καὶ μέλιτος ἐφθοῦ, ἢ μετὰ ὕδατος καὶ οἴνου καὶ μέλιτος ἐφθοῦ, ἢ μετὰ ὕδατος καὶ γάλακτος καὶ μέλιτος ἐφθοῦ, ἢ μετὰ ὕδατος καὶ γάλακτος καὶ οἴνου ἐφθοῦ, ἢ μετὰ ὕδατος καὶ γάλακτος καὶ ὄξους ἐφθοῦ, ἢ μετὰ ὕδατος καὶ γάλακτος καὶ ὄξους καὶ μέλιτος ἐφθοῦ, ἢ μετὰ ὕδατος καὶ γάλακτος καὶ οἴνου καὶ μέλιτος ἐφθοῦ, ἢ μετὰ ὕδατος καὶ γάλακτος καὶ ὄξους καὶ οἴνου ἐφθοῦ, ἢ μετὰ ὕδατος καὶ γάλακτος καὶ ὄξους καὶ οἴνου καὶ μέλιτος ἐφθοῦ, ἢ μετὰ ὕδατος καὶ γάλακτος καὶ ὄξους καὶ οἴνου καὶ μέλιτος καὶ ἐλαίου ἐφθοῦ, ἢ μετὰ ὕδατος καὶ γάλακτος καὶ ὄξους καὶ οἴνου καὶ μέλιτος καὶ ἐλαίου καὶ ἁλῶν ἐφθοῦ, ἢ μετὰ ὕδατος καὶ γάλακτος καὶ ὄξους καὶ οἴνου καὶ μέλιτος καὶ ἐλαίου καὶ ἁλῶν καὶ ἀρωμάτων ἐφθοῦ, ἢ μετὰ ὕδατος καὶ γάλακτος καὶ ὄξους καὶ οἴνου καὶ μέλιτος καὶ ἐλαίου καὶ ἁλῶν καὶ ἀρωμάτων καὶ ἐλαίου ἐφθοῦ, ἢ μετὰ ὕδατος καὶ γάλακτος καὶ ὄξους καὶ οἴνου καὶ μέλιτος καὶ ἐλαίου καὶ ἁλῶν καὶ ἀρωμάτων καὶ ἐλαίου καὶ ἁλῶν ἐφθοῦ, ἢ μετὰ ὕδατος καὶ γάλακτος καὶ ὄξους καὶ οἴνου καὶ μέλιτος καὶ ἐλαίου καὶ ἁλῶν καὶ ἀρωμάτων καὶ ἐλαίου καὶ ἁλῶν καὶ ἀρωμάτων ἐφθοῦ, ἢ μετὰ ὕδατος καὶ γάλακτος καὶ ὄξους καὶ οἴνου καὶ μέλιτος καὶ ἐλαίου καὶ ἁλῶν καὶ ἀρωμάτων καὶ ἐλαίου καὶ ἁλῶν καὶ ἀρωμάτων καὶ ἐλαίου ἐφθοῦ, ἢ μετὰ ὕδατος καὶ γάλακτος καὶ ὄξους καὶ οἴνου καὶ μέλιτος καὶ ἐλαίου καὶ ἁλῶν καὶ ἀρωμάτων καὶ ἐλαίου καὶ ἁλῶν καὶ ἀρωμάτων καὶ ἐλαίου καὶ ἁλῶν ἐφθοῦ, ἢ μετὰ ὕδατος καὶ γάλακτος καὶ ὄξους καὶ οἴνου καὶ μέλιτος καὶ ἐλαίου καὶ ἁλῶν καὶ ἀρωμάτων καὶ ἐλαίου καὶ ἁλῶν καὶ ἀρωμάτων καὶ ἐλαίου καὶ ἁλῶν καὶ ἀρωμάτων ἐφθοῦ, ἢ μετὰ ὕδατος καὶ γάλακτος καὶ ὄξους καὶ οἴνου καὶ μέλιτος καὶ ἐλαίου καὶ ἁλῶν καὶ ἀρωμάτων καὶ ἐλαίου καὶ ἁλῶν καὶ ἀρωμάτων καὶ ἐλαίου καὶ ἁλῶν καὶ ἀρωμάτων καὶ ἐλαίου ἐφθοῦ, ἢ μετὰ ὕδατος καὶ γάλακτος καὶ ὄξους καὶ οἴνου καὶ μέλιτος καὶ ἐλαίου καὶ ἁλῶν καὶ ἀρωμάτων

Ⓐ λευκοὶ δὲ, καὶ τὸ ἀπόζεμα πινόμε- A
νον. ἑρύσιμον σὺν μελικράτῳ. θείου ἀπύρου
χοχλιάριον ὅτι πανάριθμον ὕδατι, ἢ ῥοφῶ-
μενον. ἱππομαράθρου ῥίζα, ἢ καρπὸς πινό-
μενος. καὶ καλαμίνθης ἀπόζεμα, κέγρι ⊀ δ.
μετ' οἴνου, καὶ ζωμὸς φύλλων ⊀ δ. μετ' οἴνου,
κυκλαμίνου ⊀ γ'. μὲθ' ὕδατος πεπόκλη-
νται δὲ ἐν θερμῷ οἴκῳ, καὶ πλείοσιν ἱματίοις B
χρῶ· χολώδη γὰρ ἱδρῶτα ἐκκρίνει. λιβανωτί-
δος ἀπόζεμα μεθ' ἡδύσματος σὺν ἐρεβίν-
θοις· ἢ ῥίζα σὺν οἴνῳ. λειχὴν ὁ ἐπὶ τῆς πέ-
τρας, πρὸς χειρομύρα τε σώματος καὶ γλώτ-
της. ὀξυμυρσίνης ῥίζης ἀπόζεμα σὺν οἴνῳ,
μυρίκης ἀπόζεμα σὺν οἴνῳ, ὄνοι οἱ ὑπὸ τὰ ὑ-
δρίαις σὺν οἴνῳ, ἐξαγίδος ῥίζαι ἑφθεῖσαι σὺν C
οἴνῳ, ὀξαλίδος ῥίζαι· σέλινον σὺν ὄξει καὶ ἁλμῇ ἐ-
σθιόμενον, σεύτλου ῥίζαι ἕφθαι ἢ ὀπταὶ ἐσθιό-
μεναι· πεπανόφυλλα τε φύλλων χυλὸς πινό-
μενος παχέως ὑγιάζει· πάλιν ἐν οἴνῳ λευκῷ,
σκίλλης ἑφθῆς ⊀ ᾱ. σὺν ἐξυμήκι ἐκλιχ-
μώμενος, καὶ πινομένη μὴ μελικράτου. τρυ-
φίου ῥίζα σὺν μέλιτι ἐπιλιχμωμένη, καὶ πινο- D
μένη μετὰ μελικράτου. τρύχνου τὸ χαμαι-
ζήλου, λεγομένου ἀλικακάβου, χυλὸς πι-
νόμενος μετὰ οἴνου. ὑακίνθου καρπὸς σὺν ἀ-
βροτόνῳ πινόμενος, χαμαιπίτυος ἀφέψημα
σὺν ὕδατι, χαμαικίσσου ⊀ δ. μετὰ οἴνου
ὅτι ἡμέρας ς'. ἢ ζ'. αἷμα τράγειον πινό-
μενον σὺν ὀξυκράτῳ πινόμενον· τοῦτο δὲ καὶ ὑδρω- E
πικοὺς ὠφελεῖ, βρύον δὲ ὅτι τῶν ὑδρίων ἢ
λιθίνων καρύου βασιλικοῦ μέγεθος μετ' οἰ-
νομέλιτος, πινόμενον πλῆθος κυάθ. ς'. ὅτι
ἡμέρας γ'. Ἄλλο, καὶ τοῦτο καλῶς ποιοῦ-
ἀφρονίτρου ⊀ δ. ῥεῖας οἴνῳ Ἀμπαίῳ κυ. δ'.
καὶ πρὸ ἡμέρας ἀξιαφιάστους δίδου πίνειν,
ὅτι ἡμέρας β'. ἢ γ'. Θεραπεύει δὲ καὶ ἄρ-
κου χολῆς κυάμου Ἑλληνικοῦ τὸ μέγεθος
κατὰ πινόμενον. μελίας καρποῦ ⊀ δ.
σὺν οἴνῳ. συλλέγεται δὲ φθινοπώρου καὶ ἀ-
ποτίθεται. δαφνίδων ἢ σμύρνης ⊀ δ. σὺν
οἴνῳ. κρόκου ⊀ δ. μὲθ' μέλιτος ἐκλειχο-
μένῳ. ἐλξίνης ἀπόζεμα ἢ χυλὸς σὺν οἴνῳ.
χελιδονίου χυλὸς ἢ ἀφέψημα σὺν οἴνῳ.
λιβανωτίδος, τῆς ῥωσμαρίνου ῥωμαῖοι κα-
λοῦσιν, ἀφέψημα μὲθ' ὕδατος. G

ac eorundem etiam decoctum po-
tum, eryſimon cum aqua mulſa,
ſulphuris viui cochlearium aquæ
inſperſum aut ex ouo ſorptum, hip-
pomarathri ſemen aut radix in po-
tu, calaminthæ decoctum, betoni-
cæ drach. j. cum vino, conyzæ folia
drach. j. pondere cum vino: cycla-
mini drach. vj. ex aqua (ægrum au-
tem oportet loco calido decumbe-
re, pluribuſque ſtragulis cõtegi: fit enim ſudor colore felleus elicie-
tur:) libanotidis decoctum cum ci-
cere poſt deambulationem, eiuſ-
dem radix cum vino. Iuuat & li-
chen petris innaſcens, ori ac linguę
illitus: ruſci radicis decoctum cum
vino, myricæ decoctum cum vino;
aſelli qui ſub vaſis aquariis repe-
riuntur cum vino, oxalidis radices
in vino decoctę, ſilphij ſemen cum
ſalſamento & vino mulſo comeſ-
tum, betæ radices elixæ vel aſſæ in
cibis ſumptæ: quinquefolij è foliis
ſuccus bibitus confeſtim ſanat: po-
lium cum vino albo, ſcillæ coctæ
drachma vna cum aceto mulſo de-
linctæ, aut potæ cum aqua mulſa,
ſtruthij radix cum melle delincta
vel pota cum aqua mulſa, ſolani
humilis, quod halicacabum dici-
tur, ſucces cum vino potus: hyacin-
thi ſemen cum abrotono potum,
chamæpityos decoctum in aqua,
chamæciſſi drach. j. cum vino ad
dies ſex ſeptémve, ſanguis catelli
cum oxycrato potus, (is etiam hy-
dropicos adiuuat:) muſcus qui ce-
dris albiſve populis innaſcitur, mag-
nitudine iuglandis è vini mulſi
cyathis ſex triduo potus. Aliud
quod eximiè proficit: Spumæ nitri
drach. ij. in vini Aminæi cyathis
duobus ſub dio macerata ieiuno
ante lucem propinato ad biduum
triduúmve. Facit & præclarè vrſi-
num fel, fabæ Græcæ magnitudine
deglutitum. Itidem fraxini ſemi-
nis drach. j. cum vino: (colligitur id
autumno atque reponitur,) bacca-
rum lauri aut myrrhæ drach. j. cum
vino, croci drach. j. cum melle de-
lincta, helxines decoctum vel ſuc-
cus cum vino, chelidonij ſuccus
vel decoctum cum vino: libanoti-
dis, quam roſmarinum Latini vo-
cant, decoctum ex aqua.

Naribus infuſa ictericos purgant.

πάδο, ἀπ' ἀδ', libro 5. de plan.

Cum vino poſſo aut mulſa diluto re. Dioſc. lib. 3. de mat. med. cap. 94.

Dioſc. 2. de mat. med. trium obolorum pondere.

Dioſc. 4. de mat. med. cap. 126. ὅσον πεδ. ἀδ. ἡ. triboli pondere.

Vlmaria antidotus aduersus ueneno.

hæc: cyclamini succus retentus in sole donec bibam educat, clatorium cum lacte mistum, insidente ægro balneo soluens: marrubij succus cum melicrato naribus infusus, nigella tusa & aceto irrigata expressus succus, infusus naribus. Cæterum iecinorosorum balneis aut auidam murtam, aut origani radicis ue ostridis decoctum admiceri oportet: ipsi vero amygdalino inungendi oleribus autē interim abstineāt.

Ad diuturnā hepatis mor-bum.

Diuturna hepatis imbecillitate laborantibus auxiliantur pota hęc agarici oboli bini singulis diebus, adianti decoctū, acori decoctum, iridémque chamæpityos: spondylij radix in vino pota, epipactidis, quæ elleborine dicitur, decoctum: amomum, casia, amygdalæ amaræ cum salsa ex melicrato, anagallidis succus, chamæmeli radix & flores in potu, asarum cum aqua, gentianæ radix drach. j. pondere ex aqua, aristolochię radix eodem modo: succi glicyrrhizę drachma cum aqua, aut radicis decoctum: lauri radicum cortex drachm. j. pondere cum melicrato, elate trita & vna cum palmulis decocta, serpylli decoctum, eryngij drachma cum pastinacæ semine, siopyri semen cum melicrato, betonicæ folia cum aqua mulsa, fœniculi semen, spicæ nardi decoctum, aut vnguentum nardinum cochlearij mēsura sumptum, opopanax cum melicrato, leucanthemi aut pinus foliorum drach. j. ex aqua, rhu similiter, apij decoctum & semen, scandicis decoctum, quinquefolij è radice succus, teucrium eiusque succus cum melicrato, chrysocomes decoctum in aqua mulsa, senecionis decoctum & semen, similitérque polij picis aridæ tritæ drach. j. inspersa potui, melilloti seminis contriti drach. j. ex melicrato, costus simili modo, triphyllidis quæ oxalis dicitur decoctum eodem modo potum, viticis semen, centaurij minoris succus tum potus tum etiam foris impositus, plantaginis siccæ radices & folia, asparagi myacanthi radices & folia, strobili, cicer,

Α ὅτι ἐκπιεκθὲν καθαίρει. κυκλαμίνου χυλὸν κατεχόμενον τὸ ἡλίῳ, ὕστι χαλεπὸν ἀναφ. ἐλατήριον ἐκ κάλικος ἐν βαλανείῳ ὄντος, ἢ ἐν τῇ ἐμβατῇ τῶ πάσχοντος, ἐγχεόμενον. τοῦ θρίου χυλὸς σὺν μελικράτῳ ἐγχεόμενος ταῖς ῥισὶ μελάνθιον πεπομμένον καὶ ὄξει βεβρεγμένον, ἐκ πεσσόντος τῶ χυλοῦ, καὶ

Β εἰς τὰς ῥῖνας ἐγχεομένου. Λυτέον δὲ, ὀξάλμης, ἢ ὀξυγάρου, ἢ ὀσίτρας ῥίζης ἀποζέματος τῷ λουτρῷ μίσγοντες. ἀλφίτοις δὲ ἀμυγδαλίνοις, καὶ λαχάνοις ἀποχέεσθαι.

LVIII. Ἡπατικοὺς δὲ χρονίους ὠφελεῖ σπόδιμα μὲν ὑδρομέλιτος. ἀγαρικοῦ ὀβολοὶ δύο καθ' ἡμέραν, ἀδιάντου ἀφέψημα, ἀκόρου ἀπόζεμα, χαμαιπίτυος ὁμοίως, σπονδυλίου ῥίζα σὺν οἴνῳ πινομένη. ὑπατικὸς τῆς ἑλλεβορίτης καλουμένης ἀπόζεμα, ἄμωμον, κασία, ἀμύγδαλαι πικραὶ σὺν ἁλμυστρῷ καὶ μελικράτῳ, ἀναγαλλίδος χυλός, ἢ αἰθιοπίδος ῥίζα καὶ ἄνθη πινόμενα, ἄσαρον σὺν ὕδατι, γλυκυσίδης ῥίζης ℥ α'. σὺν ὕδατι, ἀριστολοχίας ῥίζης ὁμοίως. γλυκυῤ-

C ῥίζης χυλοῦ ℥ α'. σὺν ὕδατι, ἢ τῆς ῥίζης ἀφέψημα. δάφνης ῥίζης τῶ φλοιοῦ ℥ α'. μετὰ μελικράτου, ἐλάτη λεία σὺν φοίνιξιν ἀποζεσθεῖσα, ἐρπύλλου ἀπόζεμα. ὑπερικοῦ ℥ α'. μετὰ σταφυλίνου σπέρματος, ἰσοπύρου σπέρμα σὺν μελικράτῳ, κέδρου φύλλα

D μετὰ ὑδρομέλιτος, μαράθρου σπέρμα. νάρδου στάχυος ἀπόζεμα, ἢ μύρου νάρδινον κυκλαδείου πλῆθος καμβυσθρίνου. ὀποπάνακος σὺν μελικράτῳ, λύκιον ἢ λάμου φύλλων, ἢ πίτυος φύλλων ℥ α'. μεθ' ὕδατος. ῥᾶ ὁμοίως. σελίνου ἀπόζεμα καὶ ὁ καρπὸς, σπάνδικος ἀφέψημα, πευκεδάνου ῥίζης χυλός.

E πύκριον, καὶ ὁ χυλὸς αὐτοῦ σὺν μελικράτῳ. χρυσοκόμης ἀπόζεμα ὑδρομέλιτι. πελεκίνου ἀπόζεμα καὶ ὁ καρπὸς, πολίου ὁμοίως, πίσσης ξηρᾶς λείας ℥ α'. καθαπαθεῖσα ὁ ποτὸς. μελιλώτου καρποῦ λείου ℥ α'. μετὰ μελικράτου. κόστος ὁμοίως. τευφυλλίδος ἀφέψημα ὁμοίως πινόμενον, τῆς ὀξαλίδος καλουμένης. ἄγνου σπέρμα. πε-

F τροσελίνου χυλὸς τῆς μικρᾶς σπέρμος καὶ ἔξωθεν ἐπιτιθείς. ἀριστολοχίας ξηρᾶς ῥίζαι, καὶ τὰ φύλλα. ἀσπαράγου μυακάνθου αἱ ῥίζαι, καὶ τὰ φύλλα. στρόβιλοι, ἐρεβίνθοι, ἐρυ-

δρυδάνου, ἢ ὑπερικοείου ῥίζα. ἥπατι πι- A rubiæ aut cupatorij radix: lupinorum amarorum decoctum cum ruta & pipere potum, itémque foris impositum: iris, pistacia.

κρῶν ἀφέψημα μετὰ πηγάνου καὶ πεπέρεως πιόμενον, καὶ ἔξωθεν ὑποτιθέμενον, ἴριος, τερμινθίνου καρπός,

ἥπατι ad-mouendo.

ΛΙΧ. Καταπλασσόμενα δὲ ὠφελεῖ ἡπατικούς· χαμαιπίτυος μετ' ἀκώδων ἐφθῶν ξηρῶν κεκομμένων. κρίθινον ἄλευρον μετὰ σύκων. ἀλθαίας ῥίζα σὺν οἴνῳ ἐφθεῖσα. φοινικοβάλανος ἐφθὴ λεία σὺν κηρωτῇ. ἀψίνθιον σὺν κυπαρίσσινῃ κηρωτῇ καὶ Κελτικῇ νάρδῳ. ἀμμωνιακὸν ἀναληφθὲν ὄξει καὶ κηρωτῇ συφούσῃ. Ἐπὶ δὲ τοῦ παλαιοτέρου, τῆλις σὺν λινοσπέρμῳ καὶ γύρει, καὶ μελικράτῳ. μηλοκυδώνια μετ' ἀλεύρου κριθίνου καὶ τήλεως ἐφθά. ἰσχιά.

B bus, althææ radix in vino decocta, phœnicobalanus cocta trita cum cerato, absinthium cum cerato cyprino & nardo Celtica, ammoniacum exceptum aceto & cerato astringente. In recentiore autem affectu, fœnumgræcum cum lini semine, farinæ polline ac melicrato, mala cotonea cum farina hordei C & fœnigræci cocta.

Forte ἐπιπλήθει

ΛΧ. Σπληνικοὺς δὲ ὠφελεῖ ὀστοῦμενον ἀλφιτηροῦ ὀβ. β'. μετ' ὀξυμέλιτος. ἄγνου σπέρμα < ά. ἀγχούσης ῥίζης < ά. σὺν οἴνῳ. ἀδιάντου ἀφέψημα σὺν ὀξυμέλιτι. ἀκόρου εἶδα μετ' οἴνου ἐφθὴ καὶ ὠμὴ πινομένη. splenicis adiuuant.

Splenem absumunt.

ΛΧΙ. Τήκουσι δὲ συντόμως σπληνᾶ, D ἀσπληνίου ἢ καὶ ἡμιόνιον καλοῦσιν, ἢ πόα μετ' ὄξους [ἀποζεσθεῖσα, ὅτι ἡμέρας μ'. πίνε.] λοξίτης ὁμοίως, μετ' οἴνου. σεσηκυωμένου καρποῦ < ά. μετ' οἴνου ὅτι ἡμέρας δ'. πολυζόνιθον πίνει. χαμαίκισσος μετ' οἴνου. πελεκίνου μεθ' ὀξυμέλιτος πίνει. Νάξιος τῷ σοὶς αὐτὸν ἀκονθέντος σιδήρου ὃ ἀπότεγμα μετ' ὄξους. ἀλκυονίου Μιλησίου ὀβ. ς'. μετὰ ὕδατος. βρυωνίας ῥίζα < ά. μετ' ὄξους ὅτι ἡμέρας λ'. πίνει σπληνᾶς. ἀμμωνιακοῦ θηλυκοῦ < ά. μετ' ὀξυκράτου· αἷμα δὲ ἄγει δι' οὔρων. ἀριστολοχίας < ά. μετ' ὀξυκράτου. βαλάνου μυρεψικοῦ < ά. μετ' ὀξυκράτου· ὅστι δὲ καυστόμαχος, καὶ ἐμετική. ξυλοβαλσάμου ἀποζέσμα μετ' οἴνου. βουνίου τὰ φύλλα, καὶ ἡ ῥίζα χυλισθεῖσα σὺν ὀξυμέλιτι. ἐρυθρεδάνου καρπὸς καὶ ἡ ῥίζα σὺν οἴνῳ. ἴριος < ά. σὺν ὀξυκράτῳ. σαρξ ἐχίνου χερσαίου ἐσκελετευμένη μετ' οἴνου. σμυρνίης σπέρμα μεθ' οἴνου. θέρμον ἀποζέσμα καθ' ἑαυτό. καπνοῦ ὁ ἐκ τῶν ἀπίων καρπὸς ὅτι ἡμέρας λ'. μετ' οἴνου, ἢ τῆς ῥίζης ὁμοίως. ἄγλη ὃ ὁμοίως αἷμα ἐξάγει χυλίας καὶ οὔρων. κέδρου < ά. μετ' ὄξους. [οἱ δὲ σκολοπενδρίου.] Moib. legit obolum vnum cum dimidio. Dioscor. lib. 4. de mat. med. πεπόζεσι δυσὶ obolis. Δυσεντερικοῖς. Dioscor. 2. de mat. med. cap. 204. μετ' οἴνου ἐφθὸν. Idem 4. de mat. med. c. ἐφθὸν μέλανος, cum aceto mulso.

Splenicis adiuuant hæc pota: agarici oboli duo cum aceto mulso, viticis semen drach. j. ponderę, anchusæ radicis drach. j. cum vino, adianti decoctum in oxymelite, acori radix cum vino cocta crudáque bibita. splenicos adiuuant.

Lienem breui absumunt, asplenon herba, quam & hemionium seu scolopendrium vocant, in aceto decocta & per dies xl. pota, similiter & lonchitis in vino, seminis periclymeni drachm. j. ad dies quatuor cum vino pota, chamæcissos cum vino, peucedanum cum oxymelite: id quod è cote Naxia ferro acuendo deteritur, cum aceto: alcyonij Milesij obolus dimidius ex aqua, bryoniæ radix drach. j. pondere diebus xxx. pota: ammoniaci thymiamatis drach. j. cum posca: (sanguinem verò per vrinas educit.) aristolochiæ drach. j. cum posca, glandis vnguentariæ drach. j. cum posca: (est autem infesta stomacho & vomitus ciet:) xylobalsami decoctum è vino, bunij folia & expressus è radice succus cum oxymelite, rubiæ semen & radix cum vino, iridis drach. j. cum posca, erinacei terrestris caro assiccata cum vino, smyrnij semen cum vino, lupinorum decoctum per se: capparis semen ad dies xxx. ex vino potum: similiter & radix, quæ & ipsa æquè ac semen sanguinem per aluum & vrinas educit: betonicæ drach. j. cum aceto mulso, splenem absumunt vel attenuant.

galla immatura cum posca, origani decoctum, corallij drach. j. cum aqua, brassica cruda cum aceto esitata, crocodilij radix epota: (hæc verò sanguinē per nares pellit.) cyclaminis alterius, quę cissanthemos cognominatur, fructus maturus tritus & in pastillos digestus drach. j. pōdere lienem leuiter ad dies xl. liquat, ac per vrinas & aluum absumit. Squamæ ferri drach. j. cum aceto, lonchitidis in aceto feruefactæ decoctum, rubricæ Lemniæ drach. j. cum posca: myricæ decoctum aut semen cum vino potum: quin & vas potorium è myricæ ligno vtile fuerit, sicuti & panarium quod è myricæ virgis contextum sit. Proficit & nardus Celtica cum absinthio, nymphææ semen aut radix cū aceto, intubi seminis drach. j. cum aceto, polium cum aceto, sagapeni drach. j. cum posca, struthij drach. j. cum oxymelite, polemonij radix è vino, purpuræ operculum cum apij semine potum, aqua fabrorum in quam ferrum candens immergitur, scillæ tostæ drach. j. cum oxymelite: eandem subacta farina obiolutam assato, purgatam terito, fingitóque ex ea catapotia diebus nouem exhibenda cum melicrato. Valet & teucrij in oxycrato decoctum: rhoïs drach. iij. chamædryos decoctum cum melicrato: fiúnt & è foliis eius catapotia, quæ in splenis affectibus exhibentur, tragorigani decoctum cum sale & aceto: similiter & serpylli.

Splenicis admouenda vtiliter hæc vsurpantur: hyssopus cum ficubus, cinis sarmentorum aut etiam vinaceorum cum aceto, rosaceo vnguento & ruta, chamæcissi & vrticæ folia cum cerato, bryonię radix cum ficubus & aceto, ammoniacum cum aceto & cerato aromatibus inspissato, asplenon herba cum eruo imposita, agallochum cum vino vel aqua, absinthium in aceto coctum cum farina loliacea & ficubus, pulegium cum salis pari portione, origanum eodem modo, lupinorum farina cum pice & aceto cocta, viscum talens calce viua vel lapide Asio exceptum, isatidis

Splenicis remedia.

A κηκὶς ὀμφακίτῃ σὺν ὀξυκεφάτῳ. ὀρεγάνου ἀπόζεμα. κεραλλίδ < ά. σὺν ὑδαλ. κράμβη ὠμὴ μεῖ ὄξους ἐαθισμένη, κρεκοδίλιδ ῥίζα πινομένη. αἷμα δὲ ἀγλ ἀφ' ἡμιόνων. κυκλαμίνου τῆς ἑτεραμένου καρποῦ λειανθέντος πεπέρεως, καὶ εἰς ἐγχίσκους ἀναληφθέντος ξηροῦ < ά. μετ' οἴνου ὅτι ἡμέρας μ'. τὴ-

Gesn. hi desyderandum suspicatur.

B κὴ κοῦφος, ἐξαιρομένου καὶ κτ' κοιλίδα ἐκδιδομένου. λεπίδος σιδήρ < ά. μεθ' ὄξους. λεγχίτιδος σὺν ὄξ. ἀποζεσθείσης τὸ ἀπόζεμα. μίλτου Λημνίας < ά. σὺν ὀξυκράτῳ. μυρίκης ἀπόζεμα ἢ ὃ σπέρμα σὺν οἴνῳ πολλῷ. καὶ ποτηρίῳ ἀπὸ τοῦ μυρικίνου ξύλου ὠφελίμως χρήσαιτο αἷ τις ἐν αὐτῷ πίνων καὶ

Ex hac de mat. legenda hi ἀπόζεμα ... ἐκδιδομένου. quæque à πολλῷ ... ἐκδιδομένου, quæque à ποτηρίῳ ... ἐκδιδομένου, contumax lector, legat potest. Gesn.

C ἐν καυσῷ τῷ ἐκ ῥάβδων μυρικίνων πεπλεγμένῳ εἰς τὸν τῆς ἄρτου ἐπίθεσιν. ποιεῖ δὲ ναρδος Κελτικὴ σὺν ἀψινθίῳ. νυμφαίας σπέρμα ἢ ῥίζα σὺν ὄξ. τήκ. σέρεως καρποῦ < ά. σὺν ὄξ. πόλιον σὺν ὄξ. σαγαπηνὸν < ά. σὺν ὀξυκράτῳ, ῥοδίου < ά. σὺν ὀξυμέλιτ. πολεμωνίου ῥίζα σὺν οἴνῳ. πορφύρας πῶμα. ἢ ῥίζα σὺν σελίνου σπέρματι πινόμενον, ἢ ἡ πόα ἐφθεῖσα οἴνῳ σὺν ὀξυκράτῳ. ὕδωρ τὸ ἀπὸ τῆ χαλκείων, ὅπου τ' πεπυρωμένον σίδηρον ἀποβάπτουσι. σκίλλης ὀπῆς < ά. σὺν ὀξυμέλιτι. σκίλλαν περιπλάσας ὀπήσσοι, καὶ ἀφαιρῶν ῥίπον. ἢ ἄρας ὀξ' αὐτῆς [αὐτῆς], καὶ καταπότια δίδου ἐνθεὶς ἡμέρᾳ σὺν μελικράτῳ.

D ose 4. de mat. med. cap. 8 μετ' ὀξυκράτου cum aceto. Videtur hic aliquid deesse. *

Forte ἀπὸ ϛ. ἡμέρας. Gesn.

E λευκρίῳ ἐπιφυλλίδι ἐν ὀξυκράτῳ τὸ ἀπόζεμα. ῥᾶ < δ'. χαμαίδρυος ἀφέψημα σὺν μελικράτῳ γλυκεῖ) ἢ ἐκ τῶν φύλλων αὐτῆς καταπότια ἢ δίδου) πολυγονάτου ἀπόζεμα μετ' ἄλατος καὶ ὄξους. ἑρπύλλου ὁμοίως.

Lib. 2. de mat. addit, σταφίδι μαύῃ.

LXII. Καταπλασσόμενα δ' ἀγαλαμβάνεται ὠφελίμως ὅτι τὴν σπληνικὴν ὕδατωπον μετὰ σύκων. τίφρα κληματίνη, ἢ καὶ γλάρτων τίφρα, σὺν ὄξ. ῥοδίνῳ ἢ πηγάνῳ. χαμαιπίτεως φύλλα καὶ κηΐδης φύλλα μετὰ κηρωτῆς. βρυωνίας ῥίζα μετ' σύκου ἢ ὄξους. ἀμμωνιακὸν σὺν ὄξ. καὶ κηρωτῇ σμηρνίσῃ. ἀσπλήνου πόα μετὰ ῥόδου καταπλασσομένη. ἀγάλλοχον σὺν οἴνῳ, ἢ ὕδατι. ἀψίνθιον ἐφθὸν σὺν ὄξει σκύ-

G λθρῳ αἰείνῳ καὶ σύκοις. γλήχων σὺν ἁλὶ ἴσοις. θερίγανον ὁμοίως. λύπινοι ἄλευρον, σὺν πίσσῃ καὶ ὄξ. ἐφθόν. ἰξὸς θερμὸς ἀσβέστῳ ἀναληφθεὶς, ἢ λίθῳ Ασίῳ ἰσατίνῳ

Lib. 3 de mat. med nitrum additur, aceto commistum.

ἀγρίου φύλλα, καππάρεως ῥίζα. σκόροδον σὺν κηρωτῇ, ἢ ὠμῇ λύσῃ. κάρδαμον σὺν ὄξει. χαμαιπίτυος φύλλα ἁπαλὰ καὶ οἱ κόρυμβοι λῖνόσπερμον, ἢ τῆλις, φυεσθὲν ζέα ὀξυμελίτῳ καππάρεως ῥίζης, ἢ μυροβαλάνου, ἢ νίτρου. κυδώνια μῆλα σὺν κηρωτῇ. μυρίκης φύλλα λαπάθου ἀγρίου ῥίζα σὺν ὄξει. πόλιον σὺν ὄξει. συκῆ ἐλαία σὺν μέλιτι. κυκλάμινος μετ' ὄξους ἑφθὴ καὶ ἀλειφομένη. χρόμαγμα μετ' ὄξους ἑφθὸν καὶ ἀλειφόμενον. σποδὸς ἡ ἀπὸ χαλκείου ἀναβληθεῖσα, σὺν ὄξει ἢ ῥοδίνῳ, ἄχρις οὗ γλοιωθῇ. τῆλις δὲ νάπυ καὶ βύζωμον καὶ κάρδαμον, καὶ σμύρνα, καὶ ἄσβεστος, ἴσα μετ' ἰξοῦ. δεῖ δὲ θερμῆναι τὸν ἰξόν, καὶ οὕτως λειπὰ μιγνῦσαι. καὶ αἶνον, νίτρου ἀφρὸς καὶ ἄσβεστος, ἴσα μέλιτι ἀναλημφθέντα. ἢ τῆλις, καὶ νάπυ, καὶ βύζωμον, καὶ κάρδαμον, καὶ ἄσβεστος, ἴσα σὺν μέλιτι ἀναλημφθέντα, ἢ ὄξει, ἢ κονίᾳ. ἄσβεστος καὶ σμύρνα ἴσα μετ' ἐλαίου. θέρμαγε δὲ ὃ ἔλαιον, καὶ οὕτως τὰ λειπὰ μίσγε.

LXIII. Πρὸς ὑδρωπικοὺς δὲ ὠφελεῖ πολύ· ἀγαρικὸν τεμάχιον μετ' οἴνου. ἄγνου σπέρματος ἐξά. ἄγνου ἀφέψημα. ἀπὸ τῆς ῥίζης ἀφέψημα, ἢ τοῦ καρποῦ λείου ⊂ ά. σὺν οἴνου κυ. β'. ἀλκυόνιον Μιλήσιον μεθ' ὕδατος. ἀμπέλου ἀγρίας (τῆς καλουμένης Ῥωμαϊστὶ οὐϊτικλης) τῆς ῥίζης τοῦ ἀφεψήματος ˙ κυ. γ'. μετ' οἴνου τεθαλασσωμένου κυ. χ'. ἀναγαλλίδος χυλοῦ κυ. ά. καθ' ἑαυτόν. ἀνδροσάκης ἀφέψημα τῆς πόας, ἢ αὐτὴν κόπτοντα δίδοναι μετ' οἴνου, ἢ ὄξους, ἢ ὕδατος. οὖρα δὲ ἄγει πολλά. καὶ ὁ καρπὸς δὲ ποιεῖ ὁμοίως. λαπάθου ἄγρίου μεταὶ ὃ ξηρανθῆναι, ὀλίγον ἐπιθυόμενον καθ' ἡμέραι. μετὰ δὲ τοῦτο ἡ λοιπὴ θεραπεία. χαμαιάκτης ῥίζης τοῦ φλοιοῦ ⊂ ά. πέπλιον μετ' οἴνου πινόμενον ποιεῖ, καὶ μᾶλλον μετ' οἴνου. σχοίνου ⊂ ά. μετ' ἴσου πεπέρεως. σῦκα ξηρὰ ἐσθιόμενα. σμυρνίου σπέρμα σὺν οἴνῳ. καὶ ὑποκιστεως καρποῦ ⊂ ά. κίσηρον φύλλων ⊂ ά. μετ' οἴνου. τρίβουσι ἐφθὸν

Lib. 5. de mat. med. c 185 σὺν μέλιτι, cũ melle.

κάρδαμον forte, vt paulo antè.

ἰξάγων.

my. hoc loco abundare videtur.

Videtur aliqua dictio deesse, vnde sch. aliquis aquam detrahendo nomen.

sylueſtris folia, capparis radix, matrubium cum cerato vel hordeacea farina hydrelæo ſubacta, naſturtium cum ficubus, hederæ folia tenella & ipſi quoque corymbi triti: lapathi agreſtis radix cum aceto, lini ſemen aut fœnumgræcum cum aceto ſubactum addita radice capparis, aut myrobalano aut nitro, cotonea mala cum cerato, myricæ folia trita cum roſacco vnguento vel cerato, polium cum aceto, alumen cum melle, cyclaminus in aceto cocta & illita, crocomagnia cum aceto coctum & inunctum, cinis qui è fabrorum officinis reiicitur cum aceto aut roſaceo ad viſcidi lentoris compagem redactus. Fœnumgręcum, ſinapi, eruca, naſturtium, myrrha & calx viua, æquis partibus immixta viſco priùs calfacto: ſic & aniſum, nitri ſpuma & calx viua, æquis partibus excepta melle, Aliud: Fœnumgræcum, ſinapi, eruca, naſturtium & calx viua, æquali ſingula pondere excipiantur melle vel aceto vel liuio. Aliud: Calx viua & myrrha æquali pondere cum oleo priùs calfacto miſceantur.

ὑγιάσιμα ἐστὶ καὶ τοῖς ἔσω ἕλκεσι.

Hydropicis hæc in potu auxiliantur: agarici tres oboli cum vino, viticis ſeminis ſextula, eiuſdem decoctum, ſambuci radicis decoctum, aut ſeminis eiuſdem triti drach. j. cum vini cyathis duobus, alcyonium Mileſium cum aqua: decocti radicis vitis ſylueſtris, quæ Latinè viticula dicitur, cyathi tres cum vini aqua marina diluti cyathis tribus: ſucci anagallidis cyathus vnus per ſe. Andrοſaces herbæ decoctum, aut eadem contuſa exhibeatur è vino vel aceto vel aqua: ducit autem copioſas vrinas: ſed & ſemen eadem præſtat. Plantaginis nonnihil præſumptis ſiccioribus edulis quotidiè comedatur, inſuperque deinde cibi reliqui aſſumantur. Iuuat & cortex radicis ebuli drach. j. pondere, necnon peplium cum vino potum, eóque magis cum vino iuncti odorati drach. j. cum pari piperis quantitate, caricæ eſitatæ, ſmyrnij ſemen cum vino, ſeminis hyperici drach. j. betonicę foliorum drach. j. cum vino, ſicca coctum in cibis

ſumptum, idem conditum ſpica piperis, cymino & oleo: cepæ cum ſuis foliis coctæ, aut etiam crudæ exhibitæ: ricini grana xx. aut xxx. catapotiorum inſtar deglutita, acetum ſcilliticum abſorptum, origanum cum ficu eſitatum, rutæ decoctum cum aceto potum: cucumeris ſylueſtris radix cum vini refinati cyathis duobus: de hoc cyathos duos tréſve ſumi oportet interiectis tribus quatuórve diebus, vſquedum tumor plurimùm ſubſederit: leniter aquoſa detrahit, nec ſtomachum offendit, ac vires etiam conſeruat. Valent & cancri fluuiatiles ſiccati tritique citra forcipes denticulatos ac pedes cum exiguo opij & aqua poti, corallium cum pari alumine & ſucco calaminthæ, ſij decoctum cum vino, ſcillæ aſſatæ drach. j. cum oxymelite, intritum ex alliis in cibo ſumptum, & allium quoque coctum acrioris vice condimenti, erinacei terreſtris caro inueterata & cum vino potui data, laſerpitij ſemen in vino potum, vrina capræ cum ſpica nardi duûm cyathorum menſura quotidie à ieiunis pota: ſic copioſa fiet per vrinas euacuatio. Iuuat & apri vrina ſimili modo, itémque expreſſus è ſcilla ſuccus admixta erui farina drach. j. pondere cum vino potui datus, polium cum vino feruefactum, ſampſuchi decoctum, ruta cum ficu eſitata. Per interualla autem exhibetur decoctum radicum apij vel aſparagi, vel iunci odorati, vel ſpicæ nardi. Aut: caſſiæ, amomi, cymini, glycyrrhizę, hyperici, ſmyrnij, calami aromatici, piperis, ſeſelis, ſpondylij, omnium inquàm pari pondere mixtorum decoctum è vino propinato. Singula etiam illa per ſe ſimiliter decocta proderunt.

Hydropici qui ſanguinis vacant interna tormentis.

Iis verò qui hydrope hypoſarca dicto laborant iſta medentur: paſtinacæ erraticæ ſemen cum vino, chamædryos decoctum: ſabina ſicca trita cũ vino hydropicos per vrinas exinanit: trifolij radicis drach. ij. in aqua aut vino: radicis chamæleonis albi drach. ij. cum paſſo, radicis etiam decoctum potum extenuat: chryſocomę faſciculus, ouum tritum cum vino, pſyllij ſeminis

A ἐνθιόμβου καὶ ὀρτυσίμβοι δὶ * σὺν πιπέρεως, κύμινον, ἔλαιον. κρόμμυα ὠρμα σὺν τοῖς φύλλοις. καὶ σὺν δὲ διδόμενα. ἡμέλιον κ. κο. ὡς καταπότια. ὄξος σκίλλινον καταῤῥοφούμενον. ἐρίγανος μετὰ σύκου βεβρωσκομένη. πηγάνου ἀφέψημα σὺν ὄξει πινόμενον. σικύου ἀγρίου ῥίζα ὁ οἶνου ἐῤῥιπτωμένου κυ. β'. δὶ δὲ λαμβάνειν ἐκ τούτου κυ. γ'. ἢ δύο σαρ' ἡμέρας γ'. ἢ δ'. ἕως ἂν ἰσχνωθῇ ὁ ὄγκος * σαλῇ. μαλακῶς * ὑδαρὶς ὑποχωρῇ, καὶ οὔτε στόμαχον λυμαίνεται, καὶ τὰς δυνάμεις τηρεῖ. καρκίνοι ποτάμιοι ξηροὶ λῶοι χωρὶς τῶν χηλῶν καὶ ποδῶν, μετ' ὀλίγου ὀπίου καὶ ὕδατος πινόμενοι. κοράλλιον μετὰ στυπτηρίας ἴσης καὶ χυλοῦ καλαμίνθης, * ἴου οἴνου. ἀφέψημα σὺν οἴνῳ. σκίλλης ὀπτῆς < ά. σὺν ὀξυμέλιτι. μυγδαλοῦν ἐνθιόμβου ἢ σκόροδον ἐφθὸν αὐτὴ δριμυφαγίας. ἐχίνου χερσαίου σὰρξ σκελετευθεῖσα, καὶ διδομένη μετ' οἴνου. ὀποφύλλου πινόμενον μετ' οἴνου. οὖρον αἰγὸς μετὰ νάρδου σ' χους πινόμενον κυ. β'. πλῆθος καθ' ἡμέραν νήστιν· ἀφορμᾶσθαι δὲ, καὶ κενωθέντα πλῆθος ἱκανόν. οὖρον συὸς ἄρρενος ὁμοίως. σκίλλα χλιανθεῖσα, μυγμάτος ἐσθίοντος ἀλφίτου. δίδου δὲ < ά. σὺν οἴνῳ πίνειν. πόλιον σὺν οἴνῳ ζεσθέν. σαμψύχου ἀπόζεμα. πήγανον σὺν σύκῳ ἐνθιόμβου. ἐκ δὲ λείμματος δὲ, ἀφέψημα ῥιζῶν σελίνου, ἢ * ἀσπαραγοῦ, ἢ ἀγρίου, ἢ νάρδου σ' χους, ἢ ἀγρίου, καστίας * ὁμοῦ. καὶ κυμίνου, γλυκυῤῥίζης, * σατερικοῦ, σμυρνίου, καλάμου ἀρωματικοῦ, πιπέρεως, σισιλίδος, σπονδυλίου πάντα ἴσα μίξας, δὲ ἀφέψημα * ποτοῦ μετ' οἴνου, καὶ καθ' ἑαυτὰ δὲ ὁμοίως.

Forte, σμύρνης, ἢ ἐλαίῳ. κρίμνοις σὺν τοῖς φύλλοις. Σήμαινε ἐφθοῦ, καὶ οἷον ἢ διδόμενα, aut, κρίμνοις ἐφθοῖς σὺν τοῖς φύλλοις, &c.

β κάκτου κάκτου ἀ(ὰ λ')οὺς κραμπίνα Geſn. Diocl. j. de mat. med cap 51. ruta decocta in vino ad dimidias.

Al. σατηρῷ καὶ ὑδαρῇ

ἰσμίου: videtur autem deeſſe verbum διδόναι, vel ἀντὶου, aut ſimile. Actius Tetr. j. ſer. 2 cap. 26 cõpoſitum idẽ medicamentum deſcribens, pro radicibus ſelini, petroſelinũ habet: & inſuper daucil amomum, & carpobalſamum addit. ve ſorte pro ἰσμίου legendum ſit, ἀμώμου, &c. Geſn.

πήγανον ἄνω

LXIII. Ἐπὶ δὲ τὴν καλὰ σάρκα, σταφυλίνου ἀγρίου σπέρμα ζεσὺν οἴνῳ. χαμαίδρυος ἀφέψημα. βεσθὺ ξηρὸν λεῖον σὺν οἴνῳ διουρεῖν ποιεῖ. τριφυλλίδος ῥίζης < β'. ὸν ὕδατι, ἢ ὸν οἴνῳ. χαμαιλέοντος λευκοῦ ῥίζης < β'. μετὰ γλυκέος, καὶ ὸ ἀφέψημα δὲ τῆς ῥίζης * λουόμενον ἰσχναίνει. * χρυσοκόλλης δραχμίδιον, ὠὸν λεῖον σὺν οἴνῳ. ψυλλίου σπέρματος

κραμβαδάμνον, aut πηγάνου. Geſn. χρυσοκόμης. Gel.

< ά. μὲθ' ὕδατος κυ. γ'. πεδιόλου ῥίζης < ά. μεθ' ὑδρομέλιτος κυ. γ'. πινομένη. χριόφυτου < ά. μεθ' ἁλῶν < ά. ἡ μελικράτου. ἠρύγγιος ῥίζα ξηρὰ μεθ' οἴνου, ἡ τὸ ἀφέψημα αὐτῆς πινόμενον, οὖρα λύει. χαλκοῦ κεκαυμένου < ά. μεθ' οἴνου αὐλώπους ἄγει ὕδωρ. κρότωνος θύρεως πέψας μ'. δίδου μεθ' ὕδατος. εἰσὶ δὲ λίθοι καυστικὰ χρι. ὠφελεῖ καὶ αἷμα σκύλακος πινὸς, σὺν ὀξυκράτῳ πινόμενον. πίνεται δὲ ὠφελίμως ὑακίνθου σπέρματος < ά. σὺ περὶ ἡμικοτυλίου οἴνου λευκοῦ. ἄγει δὲ διὰ οὔρων πολλάκις ξέ. ά. σ'. δεῖ δὲ τὸ οἶνον χλιαίνειν, ἐν ᾧ ἄνθος κόπτειν ἐς ὡς ἡδύ. ἄνθος κάπτειν. ἔστι δὲ καὶ ἀνθεμὶς βάπτειν.

LXV. Καταπλασσόμενα δὲ ὑδρωπικοὺς ὠφελεῖ· βολβοὶ μὲθ' ἁλείπτου, οὖπι δ'. ἰκανῶς φλέγουσιν ἀφύθιον, ἢ ὕσσωπον μετὰ σύκου ἢ ὄξους, καὶ αἰγείου ἀλθύρου. βόλβιτα ξηρὰ θερμανθέντα σὺν ὄξυκράτῳ καὶ μέλιτι. καταπλάσσουσι δὲ βοὸς ἀπὸ ἐφ τὸ ὑπὲρ μέσης. κόπρος ἀγέλης ἐφθεῖσα ἐν ὕδατι παιδὸς ἀφόρου. θέρμινον ἄλευρον, καὶ χιονὸς φύλλα ἐφθέντα σὺν οἴνῳ, λεῖα. ἢ σύκων διπλάσιον πρὸς κυκεῶνος καὶ ἴτρυο. ἰξὸς θερμανθεὶς σὺν Ἀσίᾳ λίθῳ, ἢ ἀσβέστῳ. ἑλλέβορος μέλας μετ' οἴνου καὶ κριθίνου ἀλθύρου. φασὶ δ' ὅτι τῷ πλυμάτων ὅτι κεραμίδος θερμῆς αἰαξηρανθεὶς, καὶ οἴνῳ φυραθεὶς, ὅλος. καὶ κοχλίαι ιε'. σὺν ταῖς σαρξὶν ὠμοὶ λεῖοι οὐ πρότερον γὰρ ἀφίστανται, ἐὰν μὴ πᾶσα ἐξικμασθῇ τὸ ὑγρόν. νίτρον μετὰ σύκου ἢ ἀφθίου, ἢ ὑσσώπου. σὺν πηλία πᾶσα σὺν σίκῃ. μυρσίνης φύλλα σὺν κηρωτῇ μυρσίνῃ. σῦκα ξηρὰ ἑφθὰ σὺν οἴνῳ μετὰ ἀλθύρου κριθίνου ἢ ἀφθίου. σῦκον, νίτρον, καστόριον, σανδάριον, λῖθος. καὶ κύνειον καὶ ἀχερδικὸν ἀμόργῃ ἢ ὀπὸ πίτυος. ἀπορρῖ ὃ ποιεῖ καλαμίνθη μεθ' ὄξους ἐν πιπέρεως, κηρωτῇ καταπλασθεῖσα, ἐν ὀπὸ τὸ ὀμφαλὸν ἐπιπλασθεῖσα. ποιεῖ δ' ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἐν πρὸς ἰκτερικοὺς ἢ νεφριτικούς. ὠφελεῖ δὲ ἢ δι' ἁλῶν ἐν ἐλαίου ῥίψις πολλὴ, μιγνυμένου ποτὶ ὀξυγάρου κεκραμένου ἐν σεσησαμένου. ἐπίβρεχε δὲ καὶ καταπλάσσει δὲ τρύπις, ἔν τε ἁλὶ καὶ τῷ ὀξυγάρῳ ἴσοις, γλοιοποιηθεῖσι σὺν ἐλαίῳ παλαιῷ.

drach. j. cum aquæ cyathis tribus, tribuli radicis drach. j. cum meri cyathis tribus pota, cneori drach. j. cum pari quantitate salis & melicrato: eryngij radix ficca cum vino, vel eiusdem decoctum potum vrinas concitat. Aeris vsti drach. j. cum vino, citra molestiam aquas educit. Ricini grana xl. contrita dato ex aqua; sunt autem valdè infesta stomacho. Iuuat & sanguis catelli cum posca bibitus. Vtiliter etiam bibitur hyacinthi seminis drach. j. mvini albi sesquihemina: sæpenumerò quinque sexve sextarios per vrinas educit: oportet autem vino priùs tepefacto florem contusum polentę instar inspergere, atque ita propinare. Sunt qui hoc flore coria tingere soleant.

Hæc verò impositа hydropicis auxiliantur: bulbi cum melle illiti: (egregiè nanque tumorem reprimunt:) absinthium vel hyssopus cum ficu, aut acero & farina loliacea: bubulum stercus ficcum cum posca & melle calfactum, cui sulphuris viui quartam partem inspserseris: baccæ caprinæ in pueri impubis vrina coctæ, lupinorum farina & hederæ folia trita in vino coeta, cupressus & nitrum cum dupla parte ficuum, elleborus niger cum vino & hordeacea farina: lens palustris super testa seu regula calente exiccata & cum vino subacta, diuinum est remedium: cochleę quindecim crudę cũ suis carnibus contritæ: agglutinatæ siquidem non priùs amouentur, quàm totus exhauriatur humor: nitrum cum ficu & absinthio aut hyssopo, aluminis genus quodlibet cum adipe, myrti folia cum cerato myrteo, caricæ in vino coctæ cum farina hordeacea & absinthio: ficus, nitrum, castorium, marrubium, simul contrita: pellis ouilla inuncta amurca & impolita. Cæterùm vrinas mouet calamintha, additis aceto & pipere, cerato excepta & vmbilico impolita: atque idem præstat auxilium tum ictericis tum etiam nephriticis. Iuuat & frictio multa ex sale & oleo, addito interdum origano tuso cribratóque. Interdum & è salis & origani æquis partibus cum oleo vetere ad strigmentitiam

compa-

compagem redactis fit cataplasma, quod calens imponendum est. Est & vtile veteris inflatis & inunctis partes tumentes quotidie verberare. Aliud: Stercoris bubuli cremati, nitri, gypsi, caricarum an. vnc. ij. subigito, & ex iis fingito emplastrum linteo inducendum & superligandum.

A καὶ θέρμων καταπλασθέν. ὠφελεῖ δὲ καὶ ἡ σποδὸς τῶν πεφυσημένων καὶ ἀλιπλαδιμένων κυσίων πλῆξις καθ' ἡμέραν ὀπτηδουμένη. Ἄλλο. Βοείας κόπρου κεκαυμένης, νίτρου, γύψου, ἰχάδων, ἀνὰ ʃ ὁ. γ'. ὄξους ὃ ἀρκεῖ, φυρᾶσας, ποίησον ἔμπλαστρον μετὰ βάκους, καὶ ὑπέδησον.

Ad Lumbricos remedia.

B Τὰ πρὸς τὰς ἕλμινθας βοηθήματα.

Ad latos lumbricos. Alnaturtium.

Lumbricos latos hæc bibita pellunt: cardamomũ cum aqua, mori radicum cortex in aqua coctus, onochilis, quod & Alcibiadion dicitur, radix & folia: filicis radicis drach. j. semis cũ scãmoniæ obolis duobus & sale: verùm qui hoc remedium sumpturus est, allia prius C edat oportet. piperis & cornu ceruini vsti pares portiones cum posca: ipsum quoque cornu ceruinum cum melle delinctum, mali Punicę radicis decoctum, allium frequenter in cibis sumptum, hyssopus cum nasturtio & scammoniæ obolis duobus bibita, heliotropiũ minus potum, nuces iuglandes multæ esitatæ, coriandri seminis exiguum cum oleo & defruto potum: sed ab ipsius copiosiore frequentioréque vsu cauendum: chamæleonis albi acetabulum cum vino & origani decocto, chalcanthi drach. j. cum melle linctа. Aliud: piperis, nasturtij, nitri, scammoniæ an. drach. j. de his simul mixtis portio exhibeatur: debent vero præsumi allia per triduum, & superbibi muriæ cyathi duo.

Ἀ. ὁ. ſ. lib. 4. de mat. drachmas quatuor legimus.

Ad teretes lumbricos.

Teretes verò lumbricos expellunt: oleum potum, galla bibita ex aqua, lupini amari in cibo sumpti, aut farina ex iis cruda cum melle delincta: eadem cum aceto pota breui eos excutit, vti etiam polentæ instar inspersa: bibitur & eorundem decoctum cum ruta & pipere, sinapi cum thymbra vel menta, calamintha cum allio & melle cocta vel cruda esitata: expellit eadem ascaridas cum brassicæ crudæ succo vel aqua pluuiali absorpta: ruta oleo unicocta & pota, mentæ succus epotus, semperuiui succus, abrotoni decoctum, cuminum polentæ vice inspersum oxycrato, portulaca esitata, itémque succus eius.

Ποτὲ. καὶ σπλῆνα, ἢ αἷμα πτύοντας. Gelſ.

Lib. j. de mat. med. cum alioſ. cum ſale.

Ποτὲ, καὶ πεφυσημένους, ἢ σκωληκώδεις.

I. j.

πυόμβυος. στεῖφον ἀπόζεμα, ὕ ἴνου ἀψίνθιον θαλάσσιον καλοῦσι, σὺν ἁλὶ καὶ ἐλαίῳ καὶ πυρῶν ἢ σύκοις, ἢ μύξοις συγκαθυφημένον, ἢ ἀλφίτοις· ἢ ῥοφήματι, ἢ ξηρὸν ὑπαπασσόμενον εἰς ἅλφιτον καὶ πυόμβυον. ἢ Σαντονικὸν κοπὲν, ἢ σαφίσιν, ἢ φοινίξιν, ἢ μετὰ σύκων βρωθὲν· μελίας φλοιὸς εἰς ἅλφιτα πολύ. Πρὸς ἕλμινθας παίδων. ὑδυόσμου ἀπόζεμα πόσις νήστει. Καταπλασσόμενα δὲ ὠφελεῖ καὶ τὸ ὑπογάστριον ὑπαπλάσματα, θέρμινον ἄλφιτον σὺν μελικράτῳ, ἢ μελάνθιον, ἢ αἴγειον ἄλφιτον, ὁμοίως ἰσάτις. πρὸς ἕλμινθας, καὶ πρὸ δείου δὲ ἐν τῇ κοιλίᾳ, καταχάζης οὖτος· ἐπίγχει θέρμα περὶ, καὶ δάφνιδας μετὰ χολῆς ταυρείας λευόσας, καὶ ποιήσας ἔμπλαστρον, ὑπόθες τῷ ὀμφαλῷ τῷ πάσχοντι, καὶ φασκίωσον ὑπὲρ ἡμέρας γ'.

LXVIII. Ἀσκαρίδας κτεῖνει ἀξυγγιον παλαιὸν εἰς ἄνθρακα δακτύλιον καθιέμενον αὐτὴ βαλάνου.

A epotus, ſeriphi (quod nonnulli abſinthium marinum vocant) decoctum cum ſale oleo ac tritico, vel cum ficubus aut myxis farináve coctum, aut ficcum polentæ inſtar inſperſum ſorbitioni ac bibitum: Santonicum tuſum, cum vuis paſſis aut palmulis ficubúſve manducatum: fraxini cortex inſtar polentæ bibitus. Ad puerorum lumbricos: Mentæ decoctum ieiunis propinato. Iuuát etiam abdomini impoſita hæc: lupinorum farina cum melicrato, nigella, aut loliacea farina, ſimilitérque iſatis. Ad lumbricos omnéque animal è vẽtre deiiciendum: Lupinos amaros & lauri baccas cum felle taurino ſubigito, factúmque inde emplaſtrum ægri vmbilico adhibeto, faſcia ad triduum ſuperinducta.

Aſcaridas necat, axungia vetuſto glandis loco indita.

Ad aſcarides.

Τῶν κατὰ τὴν μήτραν καὶ τἄλλα γυναικεῖα μόρια παθῶν βοηθήματα.

Ad Vteri reliquorúmq; genitalium membrorum affectus remedia.

LXIX. Ταῖς δὲ τῆς μήτρας ἐκπτώσεις ἕλκη, ἀκακίας χύλισμα, ἢ βάτου χυλὸς, ἢ ῥοιᾶς, ἢ ῥοὸς τῆς ὑπὸ τὰ ὄψα ὁ χυλὸς ἀφελκιόμενος. κνίδης χλάδος προσαπτόμενος. ἴου φύλλα καὶ ἀπλασσόμενα. ὀπὸπανος βοὸς κομμάδος ἄρρενος ὑποθυμιώμενον. ἀριστολοχία λεία ἐν πανῷ μετά τινος τῶν συφόντων καὶ τὸ ἀπόζεμα αὐτῆς εἰς ἐγκάθισμα καὶ ὑπάλμισμον. ἀσφάλτος ὑποθυμιωμένη. χαλβάνη καταπλασσομένη. κνίδος ἀφέψημα. μυρσίνης ἢ ῥοιᾶς, ἢ σιδίου ἀφέψημα εἰς ἐγκάθισμα.

Vuluæ procidentias cohibent: acaciæ ſuccus, rubi ſuccus, aut lentiſci, rhois opſoniorum ſuccus illitus, vrticę ramulus applicitus, violę folia pro cataplaſmate impoſita, fimum bouis armẽtarij maſculi ſuffumigatum, ariſtolochia trita cum quopiam aſtringentium in peſſo ſubdita: eiuſdem etiam decoctum vſurpatum ad inſeſſionem ac ſuffitum, bituminis ſuffitus, galbanum pro cataplaſmate impoſitum, gallię decoctum: myrti denique aut lentiſci aut malicorij decoctum ad inſeſſum.

Ad vuluæ procidentias.

LXX. Ταῖς δὲ φλεγμοναῖς τῆς ὑστέρας καὶ μύσεις καὶ ἀλγήματα, ἐφίμωμα εἰς ἐγκαθίσματα ὠφελεῖ. ἄγνου κόμμι, ἀλθαίας ῥίζα, ἀρτεμισία, βακχάριδος ῥίζα, γλήχων, δάφνη, ἶρις, κασία, κάλαμος, σχοῖνος, κυπείρου δὲ μεγάλου ῥίζα, κόνυζα, κύπειρος, λευκοΐου ἄνθη ξηρά. μαλάχη, μήλωτος, κρίνων ἄνθη, λευκάνθεμον, πράσου κεφαλῆς κόμη, σῦκα ξηρὰ μὲν τέλεως ἢ πλατάνης, τίλις, λυσιμαχεῖον. ὑποθυμιώμενα δὲ

Vteri inflammationes, præcluſiones doloréſque decocta hæc inſeſſione iuuant: viticis ſemen, althææ radix, artemiſia, baccharis radix, pulegium, laurus, iris, caſſia, calamus & iuncus odorati, centaurij maioris radix, conyza, * cyperus, leucoij flores ſicci, malua, melilotus, lilij flores, leucanthemon, porri capitati coma, ficus aridæ cum fœnogræco vel ptiſſana, fœnumgræcum, lini ſemen. Suffitu ad eadem

Ad vteri inflammationes, obſtructiones, doloréſque ex meſſium ac ſeſſum.

conferunt, viticis semen, bdellium, cassia, calamus, ladanum, libanotidis semen & radix. Ad caneroſas verò veteri affectiones facit reſina terebinthina cum myrrha.

Ad veteres affectiones pilis, vt grana & tubercula.

Ad veteri autẽ inflammationes ac dolores forma pelli ſubiiciuntur: viticis ſemen tritum, althææ radix cocta in melicrato ſubactáque cum adipe ſuillo recenti ac terebinthina: anthyllidis radix trita cum roſacco, plantaginis ſuccus vellere exceptus, ſonchi ſuccus eodem modo, aſclepiadis ſuccus aut folia appoſita, ſimiliter & butyrum: ſuccus è decocto fœnograeco expreſſus, ſuillo adipi aut recenti butyro admixtus: enici radices aſſæ cum roſaceo, & flores eiuſdem cum cerato, medulla & adipe: lini ſemen coctum cum croco & ſuillo adipe, œſypus cum butyro & meliloto, vrinæ humanæ ſedimentum cum cyprino, verbenacá recta cum anſerino adipe ac terebinthina, ſimili modo: medulla ceruina cum ſuſino, ſtyrax liquatus cum cyprino. Ad eadem conueniunt inunctiones ex irino, cyprino, amaracino, itémque è pingui eius animantis quam Latini glirem appellant. Infecta verò egregiè molliunt: farinæ hordeaceæ cremor ex aqua coctus; alicæ quoque aut oryzæ aut fœnigraeci, aut ſeminis lini aut denique maluæ cremor, eodem modo.

Ad veteres affectiones fomenta.

In potu verò ſumpta veteri diutúrnas inflammationes doloréſque ſedant, æthiopidis radicis decoctum, pæoniæ grana quindecim ex aqua, panacis Aſclepij folia, acori radix, centaurij maioris radix, amomum, iuniperi baccæ, ariſtolochiæ longæ radix cum ſmyrnij ſemine, carpobalſami drach. j. cum melicrato, geranij radicis drach. j. in melicrato, betonicæ foliorum drach. iiij. ex hydromelite, trifolij ſemen ac folia ſimiliter.

Ad veteres vlcera.

Vuluæ vlcerationibus inuncta conueniunt, amurca decocta cum cerato liliaceo, lycium aut acaciæ ſuccus eodem modo.

Ad mordaces vulvæ pruritus.

Mordaces vuluæ prurigines ac ſinus muliebris pruritus leniunt,

A εὐφελές, ἄγνου σπέρμα, βδέλλιον, κασσία, κάλαμος, λήδανον, λιβανωτίδος σπέρμα καὶ ῥίζα. καὶ (τὰ) πρὸς τὰ καρκινώδη παλαιὰ ῥητίνη τερμινθίνη σὺν σμύρνῃ.

LXXI. Πρὸς παλαιὰς δὲ πρὸς τὰς φλεγμονὰς καὶ τὰ ἀλγήματα, ἄγνου σπέρμα λῆον, ἀλθαίας ῥίζα ἐφθὴ σὺ μελικράτῳ
B μαλαχθεῖσα σὺν ὕαιμι χοιρείῳ παρῷ καὶ τερμινθίνῃ. ἀνθυλλίου ῥίζα λεῖα σὺν ῥοδίνῳ. ἁρτογλώσσου χυλὸς ὁ ἐλαιῳ, σὺν ἴσχυι ὁμοίως χυλὸς, ἀσκληπιάδος χυλὸς ἢ τὰ φύλλα πρόσθετα, βούτυρον ὁμοίως. τίλεως ἀφεψηθεὶς ὁ ἀποθλιβεὶς χυλὸς, μικρὸν ὕαιμι χοιρείῳ, ἢ βουτύρῳ πρόσ-
C φατος. κρίκου ῥίζαι ὀπίαι σὺν ῥοδίνῳ, καὶ τὰ ἄνθη σὺν κηρωτῇ, καὶ μυελῷ, καὶ ὕαιμι. λινόσπερμον ἐψηθὲν σὺν κρόκῳ καὶ χοιρείῳ ὕαιμι. ὕσσωπον σὺν βουτύρῳ καὶ μελιλώτῳ. ὄφεως ἀνθρώπου κόπρος σὺν κυπρίνῳ. πτερυγίων σὺν ὕαιμι χηνείῳ καὶ τερεβινθίνῃ ὁμοίως. μυελὸς ἐλαφείου σὺν στέατι. σύραξ ἀνθηρὸς σὺν κυπρίνῳ. χρίσμασι δὲ ἁρμόζει πρὸς τὰ αὐτὰ, ἔλινον,
D κύπριον, ἁμαρακίνον. ἔλαιον τὸ ἐκ τῆς λίπους, ὃ Ῥωμαῖοι γλῆτες καλοῦσιν. ἐπὶ μὲν τὰ μαλάσσοντα καλῶς, ἀλθαίου χρίσμου χυλὸς μὲτ' ὕδατος ἑφθὸς, ἄλικος, ἢ ὄρυζης, ἢ τίλεως, ἢ λινοσπέρμου, ἢ μαλόχης χυλὸς ὁμοίως.
E

LXXII. Γινόμενα δὲ τοῖς χρονίοις φλεγμοναῖς καὶ τὰ ἀλγήματα τὰ τῆς ὑστέρας παυτὶ, αἰθιοπίδος ῥίζης ἀφέψημα τ γλυκυσιδνς κόκκοι ιϛ. μὲτ' ὕδατος, πηγάνου ἀσκληπιαδίου φύλλα, κόρου ῥίζα. καντζωνείου τῆς μεγάλου ῥίζα. ἄμωμον. ἀρκευθίδες. ἀριστολοχίας τῆς δασυλοπίδος ῥίζα μετὰ σμυρνίου σπέρματος. βαλσάμου καρποῦ ⊂ ά. μὲτ μελικράτου. γλυκέος ῥίζης ⊂ ά. σὺν μελικράτῳ. κέδρου φύλλων ⊂ δ'. μὲτ ὑδρομέλιτος. τεῦφυλλίδος καρπὸς, ἢ τὰ φύλ-
F λα ὁμοίως.

LXXIII. Πρὸς δὲ τοὺς ἑλκώσεις τῆς μήτρας ἁρμόζει, ἀμόργη ἐψηθὲν ἐξηρασμένη μὲτ κηρωτῆς σησίνης, ἢ λύκιον ὁμοίως, ἢ τραγερίνθου χυλὸς ἀκακίας.
G

LXXIIII. Ὀδαξισμοὺς δὲ μήτρας παυτὶ ἢ κνησμοὺς κάλπου, ἀνδράχνης ὁ χυλὸς

Gesn. fulpiratus legendum, vt ad hunc locum.

ὕαιμι.

ὕαιμι.

*ὕαιμι

ἐγκαυζόμενος, λπόσπερμον ἕφθὸν σὺν μελι- A
κράτῳ. τῆλις ὁμοίως, ἔλαιον σύσινον, ἢ κύ-
πριον, ἢ τραγάκανθον σὺν ὕδατι.

LXXV. Αγωγὰ ἔμμηνα καὶ λόχια διαχω-
ρεῖ πινόμενοι ἀπυρήτοις μετ' οἴνου, πυρέ-
ταισι σὺν μελικράτῳ ἢ ὕδατι· ξιφίου ῥίζα· οἰναίθης πόας καρπὸς, καὶ τὰ φύλ-
λα καὶ ὁ καυλός. σελίνου ῥίζα καὶ ὁ καυ- B
λός. σὺν οἴνῳ λυγγος. σίνηπι λεῖον καταπλα-
θὲν ὡς ἄλφιτον. πάνακος φύλλα. ἀσκλη-
πιάδος καρπὸς καὶ τὰ ἄνθη. σεσαλυμέ-
νου φύλλα, πετροσέλινον. πρασου χυλὸς,
καὶ ὃ πρασον ἐσθιόμενον. ἀμπελόπρασα-
σον, ῥάφανος ἐσθιομένη, ἄγου ῥίζα ἕφθη ὁ-
μοίως, σελίνου ἀπόζεμα ἢ ὃ σπέρμα, σκό- C
ροδον σὺν οἴνῳ πινόμενον, σταφυλίνου ἀγρίᾳ
σπέρμα μυσπωτὸν τὸ ἐκ σκορόδων ἐσθιόμε-
νον, στοιχάδος φύλλα σὺν οἴνῳ πινόμενα, στοχά-
δος ἀφέψημα ὅτι ἡμέρας γ'. πινόμενον νήσ-
τιμον.

LXXVI. Μᾶλλον δὲ ἄγει πινόμενα ὁ-
μοίως, ἀγαρικὸν, ἄγνου σπέρμα μετὰ γλή- D
χωνος, ἢ πεπέρεως, ἀδίαντον, νάρδος ἀγρία,
ἀριστολοχίας ῥίζα σὺν σμυρνίῳ. ἐλελί-
σφακος. σπονδυλίου ῥίζα καὶ σπέρμα. λι-
βανωτίδος ῥίζα, σεσέλεως ῥίζα καὶ ὁ καρ-
πὸς. τραγορειγάνου ἀφέψημα, ἱππομα-
ράθρου σπέρμα καὶ ῥίζα. κνίδης τῶν φύλ-
λων ἀφέψημα μετὰ μυρσίνης. δαμασω- E
νίου ῥίζα. ἄμωμον. ἀνθεμίδος φύλλα καὶ
ἡ ῥίζα. σπύρθοι αἰγὸς μετά τινος τῶν
ἀρωματικῶν. ἀρτεμισία. ἄσφαλτος. ἄ-
ψινθον ὠμοτριβὲς σὺν Κελτικῇ νάρδῳ.
βουνίου ῥίζα, καὶ τῶν καυλῶν ὁ χύλι-
σμα. βακχαρίδος καὶ τῆς ῥίζης ὁ ἀφέ-
ψημα σὺν ὕδατι. βεράνος φύλλα. γλή- F
χωνος ἀπόζεμα. γλυκυσίδης ῥίζα. γλυ-
κυῤῥίζης ἀπόζεμα, ἢ χυλός. δάφνης Ἀ-
λεξανδρινῆς ῥίζα. δαφνοειδὴς. ἶρις. ἑλε-
νίου ἀφέψημα. ἑλιχρύσου ὁμοίως. ἐρ-
πύλλου ὁμοίως. ὑπὸ συκῆς ὀλίγον μετὰ
ὠοῦ ῥοφητοῦ. ἐρύγγιος ἐσθιόμενος, καὶ ὃ
ἀφέψημα πινόμενον. ἡλίγης ῥίζα, θύ- G
μου, ἢ θύμβρας ἀπόζεσις ῥίζα. ἱππομαρά-
θρου ῥίζα καὶ ὁ καρπὸς, ἱππομαράθρου ὁ-
μοίως, κασσία. καρδάμωμον, ὑπερεικὸν, καυλὸς ἢ ῥίζα ὁμοίως.

portulacæ ſuccus infuſus, lini ſemen coctum in melicrato, fœnumgræcum ſimiliter, oleum ſuſinum vel cyprinum, tragacanthæ lacryma cum aqua.

Menſtrua & à partu relicta vteri purgamenta, moderatè cient hæc cum vino pota, ſi febris abſit: ſin minùs, ex melicrato vel aqua: gladioli radix, œnanthes herbæ folia, caulis & ſemen: apij radix & caulis, vrina lyncis, ſinapi tritum polentæ inſtar inſperſum, panacis folia, aſclepiadis ſemen & flores, periclymeni folia, petroſelinum, porri ſuccus, & ipſum porrum in cibo ſumptum, ampelopraſum, raphanus eſitatus, ari radix cocta ſimiliter, apij decoctum & ſemen, allium in vino potum, paſtinacæ agreſtis ſemen, intritum ex alliis comeſtum, ſtachyos folia cum vino pota: ſtœchadis decoctum, triduo ieiunis potum.

Potentiùs autem eadem illa præſtant ſimili modo pota: agaricum, vitricis ſemen cum pulegio vel pipere, adiantum, nardus agreſtis, ariſtolochiæ radix cum ſmyrnio, ſalvia, ſpondylij radix & ſemen, libanotidis radix, ſeſeleos radix & ſemen, tragorigani decoctum, hippomarathri ſemen & radix, vrticæ foliorum decoctum cum myrrha, damaſonij radix, amomum, anthemidis folia & radix, baccæ caprinæ cum aliquo ex aromaticis, artemiſia, bitumen, abſinthij ſuccus expreſſus cum Celtica nardo, bunij radix & ſuccus è caulibus, baccharis radicis decoctum in aqua, ſabinæ folia, pulegij decoctum, pæoniæ radix, glycyrrhizæ decoctum aut ſuccus, lauri Alexandrinæ radix, daphnoides, iris, helenij decoctum, elichryſi & ſerpylli ſimiliter, lactis ſiculnei modicum cum ouo ſorbili, cicer eſitatum, & decoctum eius potum, eryngij radix, thymus aut thymbra decocta, hippoſelini radix & ſemen, hippomarathri ſimiliter, caſſia, cardamomum, hypericum, ſimilitérque ſilphij caulis aut radix.

menſtrua & à partu purgamenta moderatè cient.

Radices potentiùs cient.

πινόμενα ἐλίγνει. lib. 4. de mat.

καὶ videtur abundare.

Ἀλεξανδρείας malum.

ὑπερεικὸν. Portè, καστόμομον, Gel. n. Malim ὑπερικὸν καρπὸς ὁ σύσιμος vel, ὑπερομάδος. Σιλφίου καυλὸς ἢ ῥίζα. Gelen.

Potentissimè verò menses cient, atque ita vt fœtus etiam excutiat, pota hæc è vino aut melicrato vti dictum est: marrubij succus triduò potus, vel eiusdem decoctum, periclymeni semen, rutæ syluestris semen, filicis radix, bryoniæ radix drach. ij. pondere ex aqua, sed mentem perturbat: ammoniaci drach. j. sagapenum similiter, liquor silphij aut semen similiter cum myrrha & pipere, opopanax simili modo: anagyri folia etiam emortuos fœtus pellunt: asphodeli radix, ari semen, bulbi cum tenellis lauri foliis: dictamni drach. j. cum vino enectos etiam fœtus eiicit: dracunculi radicum decoctum: huius dum floret foliorum vel ipse odor recens conceptos fœtus exanimat: filicis fœminæ radix, thlaspi, galbanum, leucoij seminis drach. ij. in aqua, sesseli cum vino quotidie potum, cardamine cum vino; ruta & semen eius similiter, castorium cum pulegij decocto, iuncus odoratus. Citra sensum prolabetur fœtus, si quum cum sua testa calfactum cedria inunxeris, iterúmque calfeceris & inunxeris, ac id ipsum tertiò repetiueris, túmque grauidæ sorbendum dederis. Aliud: Suber vetus pice oblitum in testa vrito; & tritum vino inspersum similiter propinato. Valent & ad ciendos potentissimè menses, capparis seminis aut radices drach. ij. in vino potæ: similiter & centaurij minoris succus; cedri baccæ tritæ, betonicæ foliorum drachma, ricini radix in passo macerata, cinnamomum potum, clinopodij decoctum, crithmi radix cum semine in vino cocta, cissanthemi seminis drachma in vino, cupressi ramenta, cyperus, lapathi syluestris radix, lonchitis herba in vino decocta, nasturtij semen, mandragoræ seminis drachma vna cum vino, nigellæ drachma, ruscí radix in vino cocta, sampsuchi semen, cyperi semen, sison, tordylium, tragoriganum, chamædryos decoctum, chamæpitys cum melle, lumbrici terrestres sicci poti, ficus denique foliorum decoctum.

Ἐπὶ τελείως δὲ ἄγει, ὥστε καὶ ἔμβρυα ἐκβάλλειν πινόμενα σὺν οἴνῳ, ἢ μελικράτῳ, ὥσπερ εἴρηται· τερεβίνθου χυλὸς ὑπὲρ ἡμέρας γ'. καὶ ὁ ἀπόζεμα. σεσκλυμένου καρπὸς, πηγάνου ἀγρίου σπέρμα, πέρσης ῥίζα, βρυωνίας ῥίζα < β'. μεθ' ὕδατος· ἐκβάλλει δὲ καὶ ἀσαφοίαν, ἀμμωνιακοῦ < δ. σαγάπηνον ὁμοίως. ὀπὸς, ὀπόφυλλον ὁμοίως σὺν σμύρνῃ καὶ πεπέρει, ὀποπάναξ ὁμοίως, ἀναγυρὶδος φύλλα καὶ τὰ τεθνηκότα ἄγει. ἀσφοδέλου ῥίζα. ἄρου σπέρμα. βολβοὶ σὺν ἀπαλοῖς φύλλοις δάφνης. δικταμνου < α'· καὶ τὰ τεθνηκότα δι' ἐμβρύων σὺν οἴνῳ. δρακοντίου ἀφέψημα τῆς ῥίζης· τούτου δὲ καὶ ὀσμὴ τὰ φύλλινα κατὰ τὴν ἄνησιν, ὅτι τὰ ἄρτιον λιπόντα, φθορεῖς ἐστι. θηλυπτέριδος ῥίζα. θάλπη. χαλβάνη, λευκοΐου σπέρματος < β'. εἰς ὕδατι. σίσελι σὺν οἴνῳ καθ' ἡμέραν πινόμενον. καρδαμίνη σὺν οἴνῳ. πήγανον, καὶ ὁ αὐτὸ σπέρμα αὐτῷ ὁμοίως. κάστορι μετὰ γλήχωνος ἀποζέματος, σχοῖνος. ἀναθήτως ἐλαιαδὴς ἔμβρυα, ἐὰν οὖσι σὺν τῷ ὀσράχῳ θερμάνας καὶ καταχρίσας κεδρίαν, καὶ πάλιν θερμάνας καὶ καταχρίσας, καὶ ὁ αὐτὸ τρίτον ποιήσας δῷς ῥοφῆσαι. ἢ φελλὸν πεπισωμένον παλαιὸν ἐκ κεφαλοῦ καύσας, λεῖον ὅτι ποιήσας σὺ οἴνῳ, ὁμοίως δὸς πιεῖν. ποιεῖ δὲ καὶ καππάρεως ἡ ἐκ τῆς ἀπίων καρπὸς πλῆθος < β'. σὺν οἴνῳ, ἢ τῆς ῥίζης ὁμοίως. κεντωρίου λεπτοῦ χυλὸς ὁμοίως. κεδρίδες λεῖαι. κέδρου τῆς φύλλων < α'. ἰτέας ῥίζα ἀποβρεχθεῖσα σὺ γλυκεῖ. κυπάρισσον πολύ. κλινοποδίου ἀπόζεμα: κρίθμου καρπὸς καὶ ἡ ῥίζα, ἑψηθεῖσα σὺ οἴνῳ. κισσανθέμου καρπὸς < α'. σὺ οἴνῳ. κυπαρίσσου ῥίσματα. κύπειρος. λαπάθου ἀγρίου ῥίζα. λονχῖτις πόα σὺ οἴνῳ ἑψηθεῖσα. καρδάμου σπέρμα. μανδραγόρου σπέρματος < α'. σὺν οἴνῳ. μελάνθιου < α'. ὀξυμυρσίνης ῥίζα ἑψηθεῖσα σὺ οἴνῳ. σεσελεώς σπέρμα. κύπερου σπέρμα. σίνον. τορδύλιον. τραγορίγανον. χαμαίδρυος ἀφέψημα. χαμαιπίτυος σὺν μέλιτι. γῆς ἔντερα ξηρὰ πινόμενα. σῦκα καὶ σύκων ὁ ἀφέψημα τῶν φύλλων.

Malf peruicaciſſimè promouentia.

vel, eius floribus succus.

Malim ἐπὶς ἐπιπολάσαν.

σὺν οἴνῳ, ex vino 3. de ma. med. cap. 38.

Al. ἐκβάλλειν

Portè, τὸν καρπὸν

Hæc dictio Græcis non redundat.

ἰώμενον. Galen.

nempe cyclamini alterum.

Portè, σίνου

LXXVIII. Προσθήκωμα δὲ ἔμμηνα ἄγει, καὶ τὰ ἐκ τόκων, καὶ ἔμβρυα. οἶσυπος ἐν ἐρίῳ οἰσυπηρῷ προστιθεὶς ὅλην ἡμέρας γ'. ἄκινος, καὶ τὸ σπέρμα αὐτῆς. μανδραγόρου ῥίζα ξυνθεῖσα ὡς κολλύριον, καὶ προστεθεῖσα. ἑλλέβορος μέλας καὶ λευκὸς, κισσὸς φύλλα μετὰ σμύρνης λεῖα. ἄμωμον. ἀμύγδαλα, ἢ ἀμυγδάλινον σὺν οἴνῳ. ἀνεμώνη λεία. ἀριστολοχία μετὰ σμύρνης. βδέλλιον. δαφνίδες λεῖαι. ἐλατήριον σὺν μέλιτι. ἐρυθροδάνου ῥίζα ὁμοίως. ἡμεροκάλλους ῥίζα. ἡλιοτρόπιον σκορπιούρου φύλλα. ἅρμινον ἄλευρον μετὰ σμύρνης καὶ μέλιτος. θρίδακος ἀγρίας ὁ καρπός. ἱππομαραθρου ῥίζα. κασσία σὺν μέλιτι. κάλαμος ἀρωματίτης ὁμοίως. καλαμίνθης φύλλα. χαλβάνη. κενταυρείου τοῦ μεγάλου ῥίζης ὁ χυλὸς, ἢ ῥίζα. κισσοῦ κόρυμβοι λεῖοι· καὶ ὁ μίσχος μέλιτι ἐρεθισθεὶς ἄνιει. ὠνήσιτος ἔμβρυα. κινάμωμον σὺν σμύρνῃ. κόστος ὁμοίως. κρίνου ῥίζα ἑφθὴ σὺν ῥοδίνῳ. ἀπαρεφόχως δὲ τὰ ὑποπλήσαντα ἀσάπτως. κυκλαμίνου ῥίζα σὺν μέλιτι, καὶ ὁ χυλός. φασὶ δέ τινες ὅτι, καὶ ὑπερβῇ τὴν ῥίζαν τῆς κυκλαμίνου γυνὴ ἔγκυος, ἐκτιτρώσκει. ὁμοίως καὶ τὴν καλουμένην πόαν· ὄνομα ἰσοῦσιν, ὅτι γυνὴ ἐὰν ὑπερβῇ ἔγκυος ἢ γλίσπαν, ἐκτιτρώσκει. σάμψυχος. λινόζωστις σὺν μέλιτι. πήγανον σὺν σμύρνῃ καὶ ὠῷ. κεράμβης χυλὸς μετὰ αἰείου ἀλθέως. κονύζης χυλός. ὀποπάνακος, καὶ ἡ ῥίζα ὡς κολλύριον. σιδηρίτιδος τῆς Ἡρακλείας τὰ φύλλα. σκόρδιον. στύραξ. ἀλλὰ δὲ καὶ μᾶλλον ἔμβρυα ἀγχούσης ῥίζα. ἀρτεμισία αἱ ἁλφιτῶσα ὡς κολλύριον, σὺν δαφνίσιν, ἢ σμύρνῃ, ἢ ἴριδι, ἢ σύκῳ, ἢ νίτρῳ· καὶ ὁ ἀπαλὸς δὲ βλαστὸς αὐτῆς προστεθεὶς. βρυωνίας ῥίζης ὁ χυλὸς προστεθεὶς σὺν ἐρίῳ. γεντιανῆς ῥίζα ξυνθεῖσα ὡς κολλύριον. δικταμνου < ά. μετὰ μέλιτος. δρακοντίου ῥίζα ζωὸν ἐξυκέτῳ. ἴρις. σμύρνα σὺν ἀψινθίῳ ἢ θέρμινθος ἀποβρέγματι. ἢ πηγανου χυλὸς. κρόκου αἱ ἁλφῶν σύκῳ. νίτρον ὁμοίως. κενταυρείου λεπτοῦ χυλός. κεδρία. κολοκυνθίδος ἐντριφὴν σὺν μέλιτι. κισσυμήλινου χυλὸς σὺν οἴνῳ. λιβανωτὸς καὶ ὀπὸς μανδραγόρου, καὶ

καὶ πεπέρεως & pipere 3 de mat. med. cap. 6.

ὠνήσιτος, Moib. Dioscoridis malib. 2. in hedera sic habetur, ὁ μοχὸς ἢ τὸ σύλλον μαλακτικὸς λύθρας, ὥστε τὸν ὑπὸ τὰ μάτια, ἔμμηνα ἄγει καὶ ἔμβρυα.

ἴσασι, lib. 3. de mat.

Gesn. legendum fuisse ait ἀγχ ἃ καὶ ἔμβρυα, menses autem ac fœtus euocat.

ἀλφίδιον, vt & Marcellus Virgilius leg, itlib. 2. de mat.

Subdita in pessis menses trahunt, & quæ à puerperio relinquuntur ac ipsos quoque partus euocant: œsypum cum lana succida triduo appositum, acinos & eiusdem semen, mandragoræ radix derasa in collyrij formã & indita, vterque ellebo-rus, vrticæ folia trita cum myrrha, amomum, amygdala aut ex eis oleum cum vino, anemone trita, aristolochia cum myrrha, bdellium, lauri baccæ tritæ, elaterium cum melle, similiterque rubiæ radix, hemerocallis radix, heliotropij scorpiuri folia, lupinorum farina cum myrrha & melle, lactucæ syluestris semen, hippomarathri radix, cassia cum melle, calamus aromaticus similiter, calaminthæ folia, galbanum, centaurij maioris à radice succus aut ipsa radix, hederæ corymbi triti: eiusdem ĕtiam foliorum pediculus melle irrigatus prę-clarè partus extrahit: cinnamomum cum myrrha, costus similiter: lilij radix cocta cum rosaceo sine vexatione puerperæ quæ in vtero morantur extrahit: cyclamini radix cum melle, ac ipse etiam succus: aiunt porrò nonnulli, si radicem eam prægnans mulier transgrediatur, abortum fieri. Idem quoque de herba onosmate dicta tradunt, nempe si eam prægnans supergrediatur gustétve, abortum facere: sampsuchum, mercurialis cum melle, ruta cum myrrha & ouo, brassicæ succus cum loliacea farina, conyzę succus, panacis liquor, eiusdem quoque radix in collyrij formam redacta, sideritidis Heracleæ folia, scordium, styrax: partus potissimùm euocat anchusæ radix: artemisia cum lauri baccis vel myrrha, vel iride, vel ficu nitróve in collyrij formam redacta: idem præstat tenellum etiam germen eius appositum: bryoniæ radicis succus in vellere appositus, gentianæ radix derasa in collyrij formam, dictamni drachma vna cum melle: dracunculi radix cum posca, iris, myrrha cum absinthij aut lupinorum diluto, rutæ succus, cneorum ficu exceptum, nitrum similiter, centaurij minoris succus, cedria, colocynthidis medulla cum melle, cissanthemi succus cum vino, thus cũ liquore mandragoræ &

loliacea farina ſubditum in peſſo, ſtruthij radix cum melle, polium cum vino, marrubium ſimiliter, ſcammoniæ liquor in vellere appoſitus, alumen liquidum, hyperici ſemẽ tritum cum melle, chondrillæ lacryma maſtichæ ſimilis cum myrrha, verbaſci ſuccus cum myrrha in vellere appoſitus, vrina viri peſſo excepta & ſubdita, melanthium cum myrrha tritum & melle exceptum fabæ Græcæ magnitudine.

Suffimigia menſes lochia & partus excernit.

Suffitu menſes, relicta à partu purgamenta & fœtus euocant, ammi cum reſina terebinthina, bdellij exiguum, dictamnus, cardamomum, galbanum, pinus ac piceæ cortex, purpurarum marinarum opercula, allium, ſiluri caput & caro;

Ad eadem infeſſus.

Ad eadem infeſſione proſunt hæc in aqua decocta: ageratum, ſambuci folia, artemiſia, dictamnus, laurus, conyza, coſtus, meum, leucoium, meliſſophyllum, porri capitati coma, apium.

Ad eadem intra vaginã adhibenda.

Ad pellenda puerperij purgamenta ciendóſque menſes, copioſa artemiſia hypochondriis cataplaſmatis inſtar adhibetur. Potentiùs verò vuluam purgant, ac in tantum vt fœtus etiam eiiciant, farina loliacea porri ſucco ſubacta, cyclamini ſuccus cum elaterio aut loliacea farina: item medulla ceruina, galbanum, ammoniacum & oleum, paribus mixta portionibus.

Ad fluorẽ muliebrem ſiſtendum.

Muliebrem fluorem ſiſtunt ex vino potà: pæoniæ grana fulua decem aut duodecim cum vino, hypociſtidis ſuccus, peucedani liquor, ſymphyti petræi folia & ſemen, ſtatice herba etiam pro opſonio oleris modo eſitata, rubi decoctum, expreſſus balauſtio ſuccus, vti & acacia, lentiſci radicis decoctum & ſuccus, terra Samia cum balauſtio, elates vnguentariæ decoctum, cornu ceruinum vſtum cum poſca, falicis radix aut folia, clymeni ſuccus, leucographis, lapis hæmatites cum ſucco mali Punici, lyſimachia herba eiuſdémque ſuccus, decoctum loti arboris ramẽtorũ delinctum, oſtracitę lapidis drach. j. cum vino, papaueris nigri ſemẽ cum vino aut melle, myricæ cortex tritus

A ἄλευον μιγθὲν τὸ πεσσῷ. ὀπὸς πόας τροστιδίς. γρουθίου ῥίζα σὺν μέλιτι. πάλιον σὺν οἴνῳ. τερέβινθον ἡμίσεις. σπερμωνίας ὀπὸς τὸ ἴσον τερεβινθίς. σπίνης ὑγρά. ὑσσώπου σπέρμα λῶτος σὺν μέλιτι. χονδρίλλης μασίχη μετὰ σμύρνης. φλόμου χυλὸς μετὰ σμύρνης, τὸ ἴσον τερεβινθίς. οὖρον ἀν-

B δρὸς, πεσσῷ ἐναλειμμένον μέλιτι, ἢ προσθήκην. μελάνθιον καὶ σμύρνα λῶτα, μέλιτι ἐναλειφθέντα, κυάμου Ἑλληνικοῦ μέγεθος.

LXXIX. Ὑποθυμιῶνται δὲ ἄγη ἔμμηνα, καὶ λόχια, καὶ ἔμβρυα· ἄμμι μετὰ ῥητίνης τερμινθίνης. βδέλλιον ὀβολοῦ. δίκταμνον. καρδάμωμον. χαλβάνη. πίτυος φλοιὸς

C καὶ πώλινης. πορφύρας θαλασσίας πώμαλα, σκόροδον, σιλούρου κεφαλὴ καὶ σάρξ.

LXXX. Ἐγκαθίσματα δὲ τούτων ἄγη, ἑψηθέντα μετ' ὕδατος. ἀγήρατον, ἀκτῆς φύλλα, δάφνης φύλλα. δίκταμνον. δάφνη. κόνυζα. κόστος. μᾶκων, λευκόιον. μελισσόφυλλον. πράσου κεφαλὴ σὺν κόμῃ καὶ σέλινα.

D LXXXI. Καταπλάσσεται δὲ πρὸς λόχια ἡ ἔμμηνα κινῆ, δάφνης μία πολλὴ, μετὰ τῆς ὑποχονδρίου. ἐπιτιθεμένης δὲ ἀεὶ, ὥστε καὶ ἔμβρυα ἐκβάλλεσθαι· αἴρησι δὲ ἄλλως πως τὸ ἔσω· χυλὸς θυμάλης, κυκλαμίνου χυλὸς σὺν ἐλατηρίῳ ἢ ἀλίνῳ ἀλθίνῳ. μυελὸς ἐλάφου καὶ χαλβάνη ἡ ἀμμωνιακὸν καὶ

E καὶ ἔλαιον, ἴσα.

LXXXII. Ἴσχει δὲ ῥοιῶν πυόμενα μετ' οἴνου, γλυκυσίδης κάκτου πυρὶ ἑ. ἢ ἓξ. σὺν οἴνῳ. ὑποκιστίδος χυλός. πλατυφύλλου ὀπός. συμφύτου πετραίου φύλλα καὶ ὁ καρπός. σακχαρὶς πόα· καὶ λαχανευομένη ὡς τερσόν. βάτου ἀφέψημα, καὶ χύλισμα βα-

F λαυστίου, ἢ ἀκακίας. χθονὸς τῆς ῥίζης ἀφέψημα καὶ χύλισμα. γῆ Σαμία μετὰ βαλαυστίου. ἐλάτης μυρεψικῆς ἀπόζεμα. ἐλάφου κέρας κεκαυμένον, μετ' ὄξυκράτου. ἰτέας ῥίζα, ἢ τὰ φύλλα. κλημένου χύλισμα. λιθοκολλήσεως. λίθος αἱματίτης σὺν χυλῷ ῥοιᾶς. λυσιμαχία πόα, καὶ ὁ χυλὸς αὐτῆς. λωτοῦ δὲ

G δένδρου ῥιζωμάτων ἀπόζεμα· ἐκλεχόμενον. λίθου ὀστρακίτου < δ. μετ' οἴνου. μήκωνος μελαίνης σπέρμα σὺν οἴνῳ, ἢ σὺν μέλιτι, (καὶ ὁ καρπὸς αὐτῆς.) μυρίκης φλοιὸς λῶς,

Frustrà repetitur hoc remedium.

Hic potius referas vicrũ, vt lib. 3. de mat. ſcribimus.

ἢ videntur abundare, & pro, cuſtalia, legendum cuſtaneo vel cuſtaneæ de qua Plin. lib. 26. c. 8.

πεσσόν καὶ ἐναλοιφόν, lib. 1. de mat. hoc eſt, bibitum & infuſum.

Inclusa parẽthęſi abundant.

καὶ ὁ καρπὸς αὐτῆς. ὀξυακάνθου καρπός, τὸ A
δὲ ἄνθος ἐκμαλάξας ὑπὸ μελῶν ἀποκαθαρθέντων· τραχμὴ δὲ πλεῖ ἐν τριβῷ. πολυγόνου χυλός, ἢ ἀρνογλώσσου ὁμοίως. πτελέου τῶν φλοιοῦ ἀπόζεμα, πίτυα λαγωοῦ ῥοὰς βυρσοδεψικῆς χυλός, ῥόδων ἄνθος σὺν ὀξυκράτῳ, τιμφύλων ἀπόζεμα.

ὑφιεῖ Moib.

LXXXIII. Προσλήμματα δὲ σὺν ὕδατι B
λιπαρῶν ἔριον· ὑποκιστίδος χύλισμα. ῥοὰς βυρσοδεψικῆς ὁμοίως. βαλαύστιον λεῖον. γαλλία, ἧς ὁ χυλὸς αὐτῆς. ἀκακίας χύλισμα, αἰεζώου. ἀπόπατος αἰγὸς σὺν λιβανωτῷ. δι' ὧν ἐνλαφι ἐρίῳ ἢ προσλήσεις. τίφρα κλημάτινος ὅλης προστιθεῖσι. Ἀχιλλεὺς πόα. βάλανοι δρυΐνοι λεῖαι. ἰὸς σιδήρου. λιβανωτὸς ἢ C
ὁ φλοιὸς αὐτοῦ. λευκογραφίς. λυσιμάχιος πόα. λύκιον σὺν γάλακτι. μανδραγόρου σπέρμα λεῖον μετὰ θείου ἀπύρου. μελίλωτος. πολύγονον δὲ ὁ χυλὸς αὐτοῦ. κηκίδες δὲ σὺν μετὰ λιβανωτοῦ ἢ ὕδατος. καρύου βασιλικοῦ τὸ σὺν, καὶ ἢ μετὰ σμάλτος.

ἐνιοι οὐκ ἀφιστᾶσι Διόφαντος, Διοσκουρίδης δὲ οὐ.

LXXXIIII. Ἐγκαθίσματα δὲ ῥοιῶν ἴσχει. δι' ἧς χλιαροῖς ἐγκαθίζειν. ἀχιλλείας ἀπόζεμα, χόνου, καὶ βάτου, ἀγαλλόχου, δρυὸς φύλλων καὶ φλοιοῦ, καὶ βαλάνου, καὶ ἰσχάδος ἰσ. cet. ἰσθμοῦ, μυρσίνης, τιμφύλων, ῥοὰς βυρσοδεψικῆς, σιδίων.

LXXXV. Ἐπιλήμματα δὲ ἐπὶ τῶν ὑστερικῶν, εἰς τὸ ὑστερικὸν ῥῆν· χρίνου σὺν κηκίδι λεῖα, σιδίοις, ἢ βαλαυστίῳ, ἢ βάτῳ, ἢ τυγὶ ὄξος. ἢ τερέβινθον βαλάνῳ. ἢ μυρσίνης φύλλα, ἢ χόνου, ἢ Θηβαϊκῆς.

D τερέβινθος φασὶν ἢ βάλανος. Supple, quibusdam.

LXXXVI. Πρὸς δὲ τοὺς ἐκ τῆς ὑστέρας συμβαίνοντας πνιγμοὺς, ἁρμόζει πινόμενα ἀγαρικοῦ ⊰ α. ἐν οἴνῳ, μανδραγόρου ῥίζης ὀβολοὶ δύο σὺν οἴνῳ. πετροσελίνου καρπός. ἀρνογλώσσου καρπὸς ἢ ὁ χυλὸς σὺν οἴνῳ. γλυκυσίδης μέλανες κόκκοι ιε. μετὰ μέλιτος κράτου. ὄνυξ ἐκ κογχυλίου πινόμενος. ὄξος σκίλλιτον καταῤῥοφούμενον.

LXXXVII. Ὀσφραινόμενα δὲ διεγείρει τὰς ὑστερικὰς πνιγμούς. ἀσφάλιον, καστόριον, χαλβάνη, σίνηπι σὺν ὄξει σκιλλητικῷ. πίσσα ὑγρά, κεδρία. ἔμψυχα καιόμενα ἢ ἀποσβεννύμενα. πτυχεδανοῦ φύλλα ἢ ὀπός. ῥίχνος κε-

ὑστέρας dicere solent in libris de mar.

eiusdémque fructus: oxyacanthæ fructus diligenter ab interiore lanugine repurgatus, quippe quæ arteriam exasperet: polygoni succus, similitérque plantaginis, ilicis corticis decoctum, leporinum coagulum, rhois coriariorum succus, rosarum flos cum posca, vinaceorum decoctum.

Ad eundē fluxionem sistendā valent.

Subdita cum lana fluxionem sistunt muliebrem: hypocisthidis succus, similitérque rhois coriariorum, balaustium tritum, germen oleaginum eiusdémque succus, acaciæ succus, itémque semperuiui: fimum caprinum cum thure, lana inuolutum & appositum: cinis è ligno sarmentorum appositus, Achillæa herba, glandes quernæ tritæ, rubigo ferri, thus & cortex eius, leucographis, lysimachia herba, lycium cum lacte, mandragoræ semen tritum cum sulphure viuo, melilotus, polygonum eiúsque succus, gallæ pars interior cum thure & aqua, nucis iuglandis nucleus vstus & cum vino appositus.

Ad eōdem huc pertinet insessus.

Sunt & insessus cohibendo huic profluuio accommodati, dum modò tepidis iis laborantes insideant. In eum vsum vsurpantur decocta, oleastri, lentisci, rubi, agallochi: quercus foliorum, corticis & glandis: similitérque ilicis. myrti, vinacearum, rhois coriariorum & malicorij.

Ad eadem in imo ventri admouenda.

Ad cohibenda porrò eadem fœminarum profluuia imponuntur imo ventri: hordeacea farina cum galla trita, vel malicorio, vel balaustio, vel rubo aut aceti fœce: ilicis cortex aut glandes, folia myrti, aut lentisci, aut palmæ Thebaicæ.

Ad eadem si imo ventri admouendo.

Ad vteri strangulatum hæc in potu conueniunt: agarici drach. j. è vino, mandragoræ radicis oboli duo cum vino, semen petroselini, plantaginis semen & succus cum vino, pæoniæ grana nigra numero xv ex melicrato, onyx è conchylio potus, acetum scillinum absorptum.

Ad eadem si suffocatio.

Olfactata hæc ab vtero suffocatas excitant: bitumen, castorium, galbanum, sinapi cum aceto scillitico, pix liquida, cedria, ellychnio madefactum & extinctum, peucedani folia & liquor, cremati capilli,

ſpondylium, ruta, laſerpitium, cepa, allium. Prodeſt & vrtica cruribus ac fronti admota.

Ad eandem ſuffitum.

Suffitu inſuper hæc profunt: gagates lapis, onyx, ſeu tegumentum purpuratarum, peucedanum, ſagapeni liquor, ſphondylium, bitumen, caſtorium, galbanum, lichen equinus, vituli marini coagulum, laſerpitium, cornu cerui.

Ad eandem ſubdendæ ſedi.

Subduntur verò ano in hoc affectu, ruta cum melle lana excepta, vtricę ſemen cum ſtacte.

Conceptum promouentia potu.

Conceptum adiuuant hæc in potu ſumpta: cratæogoni ſemen tum à viro tum & à muliere bibitum diebus xl. paſtinacæ ſemen & radix à muliere ſumpta in cibo ante congreſſum.

Idem præſtantia appoſita.

Vuluæ autem ſubdita conceptioni conferunt hæc: ammi cum medulla appoſitum ante congreſſum, coagulum leporinum cum butyro, peſſus è mercurialis ſemine aut ſucco.

Maſculi ſemini ve ſerui procreationem adiuuantia.

Fertur ad gignendam prolem maſculam conferre decoctum radicis maioris teſticuli herbæ, ante congreſſum & ante cibum ex aquę ternis cyathis diebus xlv. potum. Hæc eadem à viris eſitata, vt maſcula proles gignatur efficit: minor verò, vt fœminea, ſi à fœminis comedatur. Gallinacei albi teſtes ſi ſubinde à conceptu deglutiat mulier, priuſquàm aliud quicquam guſtarit, mares in vtero fieri dicuntur. Fertur & mercurialis maris ſemen mox à conceptu vuluæ admotum, vt mares: fœminæ verò ſemen ſimiliter vſurpatũ, vt fœminæ in lucem edantur efficere. Proditur quoque memoriæ ariſtolochiæ radix, ſtatim à concubitu admota vuluæ in carne bubula, mares figurare.

Conceptum roborantia.

Conceptum in vtero corporatum conſeruare traditur, alligatus lapis qui in Samia terra reperitur. Vt autem mulieres, quarum lubricus eſt vterus, ad ſtatum tempus ſuos gerant partus, néve abortiant, efficient ſeminis meláſpermi grana xli linteolo illigata & ſub ſpira crinium geſtata.

Ad partus difficultatem.

Difficulter parientibus aiunt anagyri folia vulitrer adalligari: ſed à partu ſtatim auferri abiicique

A ſσαγ, σπονδύλιον. πήγανον. σίλφιον. κρόμμυον. σχόροδον. κεφάλη περιστερᾶς μιᾶς σκέλεσι καὶ μετώπῳ.

LXXXVIII. Ὑποθυμιᾶται δὲ πρὸς ζωῦπα, γαγάτης λίθος. ὄνυξ ὁ ἀπὸ τῆς πορφυρῶν, πτηνέδυμον. σαγαπήνη ὀπός. σφονδύλιον. ἄσφαλτος. καστόριον. χαλβάνη. λιχὼ ἵππειον. φάκης πτύα. σίλφιον. κέρας ἐλαφου.

LXXXIX. Προσπάσσεται ἡ κεφ τὸ δαικυλλίου, πήγανον ζωμῷ μέλιτι ἐπὶ εἰρίῳ ἀναλιφθὲν. κριθῆς σπέρμα μετὰ σκιλλῆς.

XC. Πρὸς δὲ ταῖς συλλήψεις ἐνεργεῖ ποτὰ. κραταιόγονον, καὶ ὁ καρπὸς αὐτὸ, ἐπάν τι τῆ ἀνδρὸς καὶ τῆς γυναικὸς πινόμενον ὀκτὼ ἡμέρας μί. ἡ σὺν φυλίνῃ καρπὸς & ἡ ῥίζα ἐαθισμένη ὑπὸ τ γυναικὸς, πρὸ τ συνόδου.

XCI. Προσβλήματα δὲ ὠφελῆ πρὸς σύλληψιν, ἄμμι μετ μυελοῦ πρὸ τῆς συνόδου. λαγωοῦ πτύα σὺν βουτύρῳ. λινοζώστου σπέρμα ἐν χυλῷ, ἀνθρ πτασσό.

XCII. Ἰσχρᾶται δὲ ἀρρενοτοκίᾳ ποιᾷ, μὲθ ὕδατος κυάθοις γ'. πρὸ τ συνόδου, καὶ πρὸ τῦ δίπνου ὀκτὼ ἡμέρας μί. ὄρχεις τ Κοπτάνης τ μείζονος τὸ ἀποζέσαν πινόμενον. ἡ ἢ αὐτὸ ἐαθισμένη πρὸ τ ἀνδρὸς, ἀρρενογόνος ὄστιν. ἡ ἢ ἐλαφείου, θηλυγόνος, ὑπὸ τ γυναικῦ ἐαθισμένη. ὄρχις ἀλεκτρυόνος λευκοῦ μετὰ τῦ ἀποτίξη, πρὸς τὸ πινὸς γάλακτος καὶ κεφαλῆς πολύποδος. προσφέρεται δὲ λέγεται ἀρρενοβλαστεῖν ποιᾷ λινοζώστου τῆς ἄρρενος τὸ σπέρμα, μετ πρὸ συλλήψεως βοὸς θηλυκοῦ δὲ τῆς θηλείας, ἐμείσας. τυπτοῦται δὲ εἰς ἄρρεν ἐπορθῆται μετ πρὸ συνουσίας βοὸς προσφερομένη ἀριστολοχίας ῥίζα σὺν τοσίᾳ ὠμῇ.

XCIII. Φυλάσσει δὲ ἐμβρύῳ τὸ ὑστερωθὲν πηγάνιμον, προσφερομένη λίθος ὁ ἐν τῇ Σαμίᾳ γῇ ὑρισκόμενος λίθος. τελεσφορεῖ δὲ καὶ μὴ ἐπιβάλλειν τὸ ἔμβρυον ταῖς εὐολίαθος γυναιξὶ, ποιᾷ φορέμενον σπέρματος μελαναπίρμου, κἀκκαβὴ. ἐν ὀθονίῳ δεδεμένη, & φορεμένη ὑπὸ τῶν σκέλεων.

XCIIII. Πρὸς τὰς δυσλοχούσας παραπλέεσθαι φασὶν ὠφελῆ μετ ἀναλύρᾳ φύλλα. δεῖ δὲ μετ τὸ τεκεῖν εὐθὺς ἀφαιρεῖν τὸ

Malim, ἀμμὶ μυελοῦ ἀλεκτρυόνος λευκοῦ φύλλου.

ἀλεκτρυόνος. Geſn. fortè ἀφὶ ὄρνιθος πυέζεσθαι ἐαθισμένη προσφέρεται: addo autem ex Plinio, ἀρρενογόνος λέγεται.

πτύσσεται.

ἀριστολοχίας. Hæc ſunt apud Plinium lib. 5. de mat. vt alibi vos abunder.

πρὸς ὑστερωθὲν, ſed, φορεμένη mox etiã ſequẽs hic abundat.

Malim, ἀναλύρᾳ φύλλα.

σκίαπλον· ἡ λίθος ἰάσπις τῷ μηρῷ προσδεδεμένη, ἡ κυκλαμίνου ῥίζα ξηρὰ ὁμοίως· ἡ κυδωνίου χυλίσματος <ζ. σὺν ὑδρομέλιτος κυ. ἀδίαντον λεῖον μετ' οἴνου καὶ ἐλαίου ὠφελεῖ. καὶ πλαρμικὴ προσαγωγὴ τοῖς ῥώθωσι. βύσκει δὲ ποιοῦσι πίνουσαι, ἢ ὀπτὸν ἵππου οὖρον ἐπίσκιον.

Addit. πολίου.

Hæc 1 cap. 136. lib. huc transferre visum eſt.

oportet. Prodeſt & iaſpis femori adalligatus: ſimiliter & cyclaminis radix: ſucci coroneorum drachmia cum cyatho hydromelitis: adiantum quoque tritum cum vino & oleo confert, vti & ſternutatorium naribus adhibitũ. Parientibus denique faciliorem præſtabis partum, ſi vngulam equi ſuffumigauerit.

XCV. Γενέσθαι δὲ πρὸς τὸ μὴ συλλαμβάνειν, ὡς (συνεργήσοντα) ἱστόρηται· γυναικὸς αἷμα ἐκ τῆς καταμηνίου ξηρὸν δηλῆ ἡμιονείᾳ ἢ ἐλαφείᾳ δέρματι, καὶ ἀφεθὲν· ἢ ὑποβαινέτω ἀποθλίβουσα πρὸ τῆς συλλήψεως. ἄσπληνον βοτάνη καθ' ἑαυτὴν, καὶ σὺν ἡμιόνου ὁπλῇ προσαποδεθέν. δεῖ δὲ ὀρύσσειν αὐτὸ ἀστέλητον νυκτός. μυρίκης ξύλον καέν, καὶ σβεσθὲν ἰδίοις καταμηνίοις, προσαποδεθὲν βεκχίου. πίνεται δὲ πρὸς ἀσύλληψιν ἡμιόνιος πόα, λιγυίστης αὐτῆς ὁμοίως ἡμιόνου ὁπλῆς τὸ ἔσω μέρος. πτέρεως ῥίζα μετὰ γλυκέως πινομένη· θηλυπτέριδος ὁμοίως. ἵππουριδίου ῥίζα πινομένη ὑπὸ οἴνου. ὕδατος σκληροῦ. ἰτέας αὐθὶς καὶ τὰ φύλλα. χράμβης αὐθὶς πινόμενα μετὰ οἴνου μετὰ τὴν σύλληψιν. λαγωοῦ πιτύα μετὰ τὴν ἄφεδρον πλεῖστα ἕως ἡμέρας γ'. λεύκης φλοιὸς μετὰ τὸν καθαρσιν σὺν ὀξυκράτῳ πίνεσι. λίθου ὀστράκου <ζ. ἕως ἡμέρας δ'. πινέτω. προσδίδοται δὲ πρὸς τὸ μὴ συλλαμβάνειν πρὸ τῆς συνόδου ὑδύοσμον λεῖον. καὶ τὸ αἰδοῖον δὲ τῷ ἀνδρὸς πρὸ ξύλου ἀφεψήσαι. χράμβης αὖθις λεῖον ὑπὸ ποτῷ μετὰ τὴν σύλληψιν, ὅσα ἐᾷ πίνεσθαι. πεφυῆ πιτύα ἡμέρας γ'. προσπλεῖσα μετὰ τὸν καθαρσιν πελεκίνου κόπρια προσ συνουσίας. σπήλυγα ὑγρὰ ἡμίονος. ἢ πίλησις ἀφεψήματι προσ συνουσίας προσαλυζέσθω.

Abundat ſortè.

Lemnia ter.

μετ' ἡμίονου σπλῆνα, εἰ multi ſplenes. lib. 3. de mat. med. cap 131.

μυρίκης αὐτῆ τὸ ὅπτιον, &c.

Addit Auctor lib. 3 de mat. med. c. 109. μετ' ἡμίονου νεφρὸν, cum renes muli.

χοιρὸς

Βοτὰ βοείαι

Ad inhibendum conceptum hęc pro amuleto iuuare perhibentur: fœmineus ſanguis menſtruus ſiccatus, muli aut cerui corio illigatus & appenſus, aut ſicubi poſitum mulier ante concubitum ſupergrediatur: aſplenon herba per ſe & cum vngula muli adalligata, ſed eã illuni quapiam nocte effodiendã: myricæ lignum vſtum & proprio mulieris ſanguine menſtruo extinctum & brachio alligarum. Bibuntur autem ad conceptum prohibendum: hemionios herba, admixta vngulæ muli parte interiore, filicis radix cum paſſo, filicis fœminæ eodem modo, epimedij radix è vino, rubigo ferri, ſalicis flores & folia, braſſicæ flores à conceptu ex vino poti, leporis coagulum diebus tribus à menſtrua purgatione potum, populi albæ cortex poſt eandem purgationem ieiunis è poſca bibitus, oſtracites lapis drach. ij. pondere quatriduo potus. Vuluis ſubditur ante concubitum conceptus adimendi gratia, menta trita: eiuſdem etiã ſucco virile membrum circumlinitur: braſſicæ flores triti & à conceptu in peſſo ſubditi, ſemen coagulari non ſinunt: hinnuli coagulum triduo à purgatione muliebri appoſitum, ſpem partus adimit, vti & ſecundidacæ ſemen ſubditum ante coitum: ſimiliter & alumen liquidum; iuuat & muliebres locos ante concubitum fœnigræci decocto fouere.

Ad inhibendum conceptum impedimenta.

Venerem ſtimulat pudendique arrectionem promouet, hormini ſemen. Gladioli radix craſſior ſimul ac ſuperior in vino potui data, Veneris appetentiam facit, contrà verò quę gracilior ſimul & inferior eſt, eandem remittit. Teſticuli herbæ maior bulbus è lacte potus, libidinis impetum excuſcitat: minor ex aqua bibitus, eundem reprimit ac inhibet. Excitant & libidinem, vruicæ ſylueſtris ſemen cum vino potum,

Venerem ſtimulantia.

aniſum cum vino, ari radix cocta & eſitata: ſimiliter & menta, naſturtium eiúſque ſemen bibitum, coriandri ſemen quantitate exigua ex aqua ſumptum: (largiùs enim aſſumptum, altiorem ſoporem inducit:) coſtus cum vino vel mulſo, crocus ſimiliter. Lini ſemen admixtis mulſo ac pipere placentæ modo ſumptum, fœniculi lacryma, porri ſemen comeſtum, & ſuccus epotus: ſatyrium erythraicũ, cuius ſemen pyrorum malorúmve ſeminibus eſt ſimile, at ſplendidius viſcoſúmque mandenti: ſcincus Indicus potus, [accendendi Venerem, pudendúmque arrigendi maximam vim habet:] at ea reprimitur remittitúrque, lentis decocto ſuperbibito. Conciliant denique Venerem paſtinacę erraticæ ſemen, & terebinthi fructus eſitatus.

Ventres impetus inhibitus.

Porrò venereos impetus reprimunt, portulaca in cibo ſumpta, ruta tam ſatiua quàm agreſtis eſitata, lactucæ ſylueſtris æque ac ſatiuæ ſemen potum: dracunculi ſiccata radix è vino pota, rigida intentáque pudenda laxat & remittit. Iuuant & nuclei pinei cum cucumeris ſemine, portulacæ ſuccus, ac ficus in cibo ſumptæ.

al & portulaca ſucco.

Ad genituram, ſeu genituræ profluuium.

Quibus inuito ac præter voluntatem genitura effluit, hæc conducunt: iridis drach. ij. ex vino potæ, cicuta virgæ, teſti ac pubi pro cataplaſmate impoſita: nymphææ radix aut per ſe pota, aut cum polenta pulmentarij vice in cibo data, acetabuli menſura: anethi ſemen bibitum. Genituram porrò exoluunt hederæ corymbi nigri in potu ſumpti.

Ad veneris inſomnia, externa remedia.

Libidinum frequentes in ſomno imaginationes hæc adhibita compeſcunt: cicutæ ſemen teſtibus impoſitum: (nam ſi quis genitali applicuerit, id effœtum eneruatumque langueſcet:) nymphææ radix adhibita, coriandri aut ſolani ſuccus pudendis illitus, rhamni ſuccus cum nitro teſtibus illitus. Iuuat & portulacæ ſuccus expreſſus: ipſa quoque per ſe & cum polenta imponitur: viticis folia cum polenta, cuminum tritum cum Cimolia ſubactum.

Ad oculorum ſuffuſiones.

Obnoxiis libidinis per ſomnum

A αἴσιον σὺν οἴνῳ. ἄγριον ῥίζα ἐφθὴ ἐσθιομένη. ἡδύσμων ὁμοίως. καρδάμωμον καὶ ὃ σπέρμα πινόμενον. χωρὶς σπέρμα ὀλίγον μετ' ὕδατος· πλῆθος δὲ πολὺ, κάρον ποιεῖ. κόστος σὺν οἴνῳ ἢ οἰνομέλιτι. κρόκος ὁμοίως. λινόσπερμον μετ' οἰνομέλιτος καὶ πεπέρεως ἁλὶ κοπῆς λαμβανόμενον. μύραθρου δάκρυον. πράσου καρπὸς ἐσθιόμενος, καὶ χυλὸς πινόμενος. σατύριον ἐρυθραϊκὸν. ἔστι δὲ ὅμοιον σπέρμα τῷ ὸ τῶν ἀπίων· μέλανος, γλαφυρώτερον δὲ, καὶ γλίσχρον δραμαστηδόν. σκίγκος ποδὸς Ἰνδικός. ἀποπαύει δὲ ταῦ ἐντάσεις, φακοῦ ἀφέψημα ὑπιπόδιον. σαφυλίνου ἀγρίου σπέρμα. τερεβίνθου καρπὸς ἐσθιόμενος.

Porrò ἀγρ δὲ. Porrò δ μέλαν.

B

C

XCVII. Ἀφροδισίων δὲ ταῖς τῶν συνουσίαν ὁρμαῖς, αἱδοίων ἐσθιομένη, καὶ πήγανον ἄγριον καὶ ἥμερον ἐσθιόμενον. σηρίδακος ἀγρίας σπέρμα καὶ ἡμέρου πινόμενον. δρακοντίου ῥίζα σὺν οἴνῳ σωθεῖσα ξηρὰ· καὶ ὁ τῶν πόας πανὸς. τροβίλοι μετὰ σικύου σπέρματος. καὶ ὑδράχνης χυλὸς, καὶ σῦκα ἐσθιόμενα.

πολὺ πλῆθος.

D

XCVIII. Πρὸς δὲ τοὺς γόνους τῶν γιγνομένους ἀπορρήτους, ὠφελίμως δίδοται· ἴριδος < β'. μετ' οἴνου. καταπλασθὲν δὲ τὸ μόριον κύκλῳ κατὰ τὴν καυλοῦ, καὶ τοὺς διδύμους καὶ ὀφθαλμοῦ ὑπιπόδιον. νυμφαίας ῥίζα μετὰ ἀλφίτου διδομένη ἐσθιέσθαι ὡς μάζα, ὀξυβάφου πλῆθος· ἢ πινομένη καθ' ἑαυτήν. ἀνήθου σπέρμα πινόμενον. ἐκλύουσι δὲ γονὴν κισσοῦ κόρυμβοι μέλανες πινόμενοι.

E

XCIX. Πρὸς δὲ τοὺς ὀνειρώττοντας συνεχῶς, ἐμίζει τοῖς ὄρχεσι ταῦτα καταπλασσόμενα. κωνείου σπέρμα κατὰ τοὺ διδύμους καταπλασσόμενον. ἐαὶ γὰρ κατὰ τοὺ αἰδοίου τις καταπλάσῃ, οὐδὲν λυθήσεται. νυμφαίας ῥίζα καταπλασσομένη. καὶ αἰδοῖα κυρίου χυλῷ καὶ σικύου καταχρῖσαι, διδύμους καὶ ὄρχεις, καὶ ῥάμνου χυλῷ. ἀνδράχνης πίσσματα· ᾗ αὐτὴ ᾗ καταπλασσομένη καθ' ἑαυτὴν καὶ ἀλφίτου, καὶ ἄγνου φύλλα σὺν ἀλφίτῳ. ἢ κυμίνῳ λευκῷ μετὰ Κιμωλίας ψυχρᾶν.

πίσσματα. μετ'. πίσσινα ἐσθιόμενα.

C. Πολύποτα δὲ ὠφελεῖ ὑπὸ ὀνειρώτων-

ζας, νυμφαίας ῥίζης ἀπόζεμα, σπόδιον ἐπὶ τοῦ οἴνου A imaginibus cum genituræ profu-
λαμβανόμενον. τὴν ζοφὴν δὲ μυγουρίδιον ῥίζα ξηρὰ, καὶ τὸ σπέρμα ὁμοίως. καλαμίν-
θης ἀπόζεμα πινόμενον, ἰάται ὑπερωγμούς.
Ἡρίδανος σπέρμα ἐκ ὑδραγόης σὺν ὕδατι
πινόμενον.

sione opitulantur hęc in potu sum-
pta: nymphææ radicis decoctum
ante cibos assumptum: radix verò
sicca similitérque semen, etiam ci-
bis vtiliter miscentur: calaminthæ
decoctum bibitum, insomnia Ve-
neris adimit, itémque lactucæ aut
portulacæ semen ex aqua potum.

Τῶν κατὰ τοὺς νεφροὺς καὶ τὴν κύ-στιν παθῶν βοηθήματα. B

Renum ac vesica vitio-rum remedia.

c i. Τοὺς δὲ εἰσουροῦντας ἰᾶται διὰ τοῦ πλύξει, καὶ ὅταν δὲ ἡμέρας ὀλιγάκις τῆς οὐρήσεως, καὶ μεταξὺ κατέχειν ποιῇ τὴν αἰγίλωπα ἢ τὴν βατίαν κεκαυμένην πλίζει σὺν ὄξυ- C κράτῳ, ἢ ἐπιπιέσματι σὺν ᾧ οὖρει ὅτι θερμῇ κοπιδίᾳ δίδυναι φαγεῖν, ἐπάφας τι δι-φῶν ἀναλαβεῖν. ποιεῖ δὲ καὶ λαγῶὸς ἐγκέφαλος, ὅσον ἐρέβινθος, μετὰ χλιαίνης ἴσας ἴσου καὶ κόμμεως τῶν αὐτῶν καὶ ἀποπόμα, ἢ συμφυ-ρᾶσθαι ἀλφίτῳ, καὶ ἐσθιόμενα. *χοιρείας λείας κοχλιάριον μετὰ μελικράτου· ἢ κα- D στορείου, ἢ ἄγνου πεπόμου ὁ αὐτό.

Eorum qui stratis immeiunt, vri-næ incontinentiam emendabis, si increpueris & vrinæ tum inter-diu reddendæ tum etiam certis in-teruallis continendæ assuefeceris, prætereáque vesicam iis caprillam aut ouillam vltam è posca propina-ueris, aut cum vrina quam conti-net calentibus cineribus inassatam exhibueris, ac denique vesperi si-tim tolerare coëgeris. Inhibet & leporis cerebrum cũ æqualib. por-tionibus adipis anserini & gummi deglutitum, aut polentæ permix-tum & esitatum. Iuuat & vngulæ a-pri tritæ cochlearum cum meli-crato, aut castorei, vel viticis, vel rutæ tantundem.

Ad vrinæ in-continentiam.

& dual videtur abundare, vela-liter legendum. G. Ia. Forte, καὶ πεπτὸν ῥάμνου ὁ συμφυ-ρᾶσθαι, &c.

c ii. Νεφριτικοὺς δὲ ὠφελεῖ πόμενα· ἀγαρικοῦ ʒ ά. μετὰ οἴνου κυ. ά. ἀγχούσης ῥίζης ʒ ά. ὁμοίως. ἀλκυονίου ὀβ. β'. μετὰ ὕδατος. ἀμώμου ʒ ά. μετὰ οἴνου. ἀμύ̀δα-λα πικρὰ σὺν ὕδατι, ἢ ἐκ ἀλφίτων σὺν ῥητίνῃ τερμινθίνῃ. ἀναγαλλίδος, ἢ πολυγόνου E χυλὸς σὺν οἴνῳ, καὶ φύλλα σὺν ὄξει ἐσθιόμενα χωρὶς τῆς μελάντου. βουλὸν φύλλων καὶ τῆς ῥίζης ὁ χυλὸς ὅτι ἡμέρας ιβ'. πινόμενος μετὰ γλυκέως. ἢ γάλα. γλυκυσίδης ἀφέψημα. γλυκυῤῥίζης χυλός. ἐλάτης μυρσινικῆς ἀπόζεμα, πῖνον τὸ ἀφέψημα. σὰρξ ἐχίνου χερσαίου ἐσκελετευμένου σὺν οἴνῳ. σμυρ- F νίου σπέρμα σὺν γλυκεῖ. κασία σὺν οἴνῳ. καρδαμώμου ʒ ά. σὺν γλυκεῖ. κάλαμος ἀρωματίτης ὁμοίως. κιννάμωμον ὁμοίως. κέ-ντρου φύλλων ʒ ά. σὺν γλυκεῖ. ἀμυγδάλου ἀ-φέψημα ὁμοίως. μήκωνος ἀπόζεγμα ὁμοίως. μάλλων Λημνίας ʒ δ'. ὁμοίως. ὑπὸν ὄνου πε-πὶν ἐσταμένου ἐσθιόμενον. σὰρξ χελώνης σὺν ὕδατι, σκαμδίκης ἀφέψημα. σαφυλίνης ἀγρίας σπέρ-μα. τρόβιλοι ἐσθιόμενοι. συμφύτου πεπὶν ἀπόζεμα σὺν μελικράτῳ. σῦκα ξηρὰ

Nephriticis vtiliter hæc potui da-dentur: agarici drachma cum vini cyatho, anchusæ radicis drachma similiter, alcyonij oboli duo ex a-qua, amomi drachma cum vino, a-mygdalæ amaræ ex aqua potæ, aut cum resina terebinthina delinctæ, anagallidis aut polygoni succus cum vino, vuæ passæ demptis vina-ceis esitatæ, bunij succus è foliis & radice diebus duodecim potus ex passo, lac, aut pæoniæ decoctum, glycyrrhizæ succus, elates vnguen-tariæ decoctum, terrestris ernacei inueterata caro cum vino, myrtij semen cum passo, cassia cum vino, cardamomi drachma cum passo, calamus aromaticus similiter, i-témque cinnamomum, betonicæ foliorum drachma cum passo, iuni-peri decoctum similiter, itidémque mei dilutum, aut rubricę Lem-niæ drach. iij. Vrina asini pota au-xilio esse fertur, saccharum cum a-qua, scandicis decoctum, pastinacæ syluestris semen, nuclei pinei in cibo sumpti, symphyti petræi de-coctum in melicrato; ficus fiecæ esitatæ,

Ad vrinæ incontinentiam.

Ad vrinæ difficultatem.

esitatæ, chamæpityos decoctum in melicrato.

Ad vlcus virgæ. Vlceri virgæ morsum inferenti efficaciter auxiliatur, tragacanthæ drach. ij. in vino maceratæ & a ieiunis sumptę ad modũ eclegmatis.

Ad sanguinis mictum. Ad sanguinis mictum, aluminis scissilis drach. j. tragacanthę drach. ij. contundito, & pastillos fingito, quorum singuli binos pendant obolos: ex hisvnum è passo propinato. Sanguinis verò è renibus manantis profluuia sistit, stratiotes in aquis nascens epotus.

Ad vesicæ vlcera & asperitudines. Doloribus vesicæ medentur, lini semen crudum, sesamum, hormininum, singula per se ex passi cyatho vno pota: oxyschœni semen, bulborum ruforum semen similiter pariter & loti semen è vino, seminis papaueris nigri aut albi drachma ex aqua calida aut melicrato pota: cotoneorum flores, viris caprecolorum aut portulacæ decoctum, gentianæ denique succus ex aqua.

Ad eosdem admouenda. Dolenti vesicæ hæc vtiliter adhibentur: nymphææ radix & semen, polygonum, petroselinum, chamæpitys cũ vino & adipe suillo cocta, hordeaceus pollen, fœnum græcum, lini semen, palmulæ, mala cotonea cocta: capita denique papaueris cocta, hyoscyami farinæ ammixta.

Ad vesicæ vlcera. Vesicæ exulcerationibus medentur tum quę nephriticis bibenda præscripsimus, tum præterea hæc: radicis graminis tum Parnassij, tum etiam alius cuiuspiam ex aqua decoctum in potu: portulacæ succus cum passo, lac dulce, elates vnguentariæ decoctum: capressi folia cum myrrha pota, quæ vesicæ etiam fluxione tentatæ auxiliantur: mala in cibo sumpta, myrti denique baccæ esitatæ.

Ad vesicæ mordicationem. Vesicæ mordicationes rosione ęque leniunt, saccharum bibitum, scandicis decoctum epotum: phalaridis herbæ, quæ inter frumenta nascitur, contulæ succus expressus cum vino: symphyti decoctum, cneci pollen, amygdalę amaræ, nucleipinei tosti, pruni arboris gummi, tragacanthum in passo cum cornu ceruino vsto, addito etiam aluminis scissilis momento.

A ἐλατόμμα, χαμαιπίτυος ἀπάζεμα, ὀ μελικράτῳ.

CIII. Εαι ἕλκος δίτις ἔχῃ ἡ φλεγμονὴν, ἢ ὀδύνην, ἐνεργῶς βοηθῆ, πραγακάνθης < β'. ἐφεψήματος τὸ οἴνῳ νηστεῖ ἐλλεβόρου. *Ad vlcera intestinorum.*

CIIII. Εαι ἡ αἷμα ὑρῇ, χηνὸς < α'. πραγακάνθης < β'. κόψας αἰαλάμβανε ξυλίσκους αἷμ' ὀβ. β'. ἔπα διδοὺς ἐν γλυκεῖ. Ταὶς ἢ ὅσι περῶσι αἱμορραγίαις ἴσον, γραπόντος ὀβολὸν ἐν ὕδατι πινόμενος.

CV. Αλγήματα ἢ κύστεως ἰᾶται λινόσπερμον ὠμὸν, σήσαμον, ὄρμινον, ὑοσκύαμον ἀπὸ ξύλου πιν. μ. κατ' ἰδίαν σὺν γλυκεῖ πινόμενος. ὀξυσχοίνου σπέρμα. ἀ βολβῶν τῶν πυρῶν σπέρμα ὁμοίως. λώτου σπέρμα ὁμοίως ἐν οἴνῳ. μύκητες μελαίνης ἢ λευκῆς σπέρματος < α'. σὺν ὕδατι θερμῷ πινόμενοι, ἢ μελικράτῳ. κυδωνίων αἱ ἄνθαι ἐλίκων ἀμπέλου, ἢ ἀνδράχνης ἀφέψημα, πινόμενον. ἐλατηρίου χυλὸς σὺν ὕδατι.

CVI. Καθαρτικὰ ἢ ὠφελήσει ὅτι ἀλγώσης κύστεως· νυμφαίας ῥίζα τὸ σπέρμα. πολύγονον. πετροσέλινον. χαμαιπίτυος σὺν οἴνῳ, ἢ ὅταν ὑείῳ ἐφαμμόσῃ, χρίσῃ. γύψος. πῆλος. λινόσπερμα. φοίνικες μαλακοὶ ὑδατι ἑφθοί. καὶ διαμύκωσις ἐφθὴ ἐν ὑοσκυάμου ἀλφίτῳ μιχθεῖσα. *Ad eosdem admouenda.* *διαμύκωσις videtur addendum: vel legendum, ἀφεθεῖσα χύσει.* *μυξίσιν*

CVII. Ῥεῖα ἢ ἔσαι ἑλκώσεις τῆς κύστεως, τοιῷδε ἢ ἔσαι ὅτι ἐφεστικὰ αἰσχυντέα μιθία πρὸς ἁρμόζει ἢ ἐς ταῦτα. ἀγρώστεως τῆς ὀρεσσαίης φυομένης ῥίζα, ἐς τῆς ἄλλης τι ἀφεψηθὲν ὀδὸν πινόμενον. ἀνδράχνης χυλὸς σὺν γλυκεῖ. μάλαγα γλυκεῖ. ἐλατὸς μυρσινίτης διάζεμα. κυπαρίσσου φύλλα μὲν σμύρνης πολύποδ'. ἴσον ἢ κύστεως ῥήγνυται ἐξοδίλλει, μελόχα ἐαθτομένη, ἢ μύρσα ἐαθτομένη. *Malebant haec esse ad praecedentia: cum ambo de mat. copretti fiunt ad vesicæ rheumatismum laudantur. & legendum ἢ ἐς ταῦτα. Sed nihil prohibet nouis curationibus initium esse cum suo solum remedio subiungi mox, malua & myrti, quod magis probarim.*

CVIII. Επιδακνομένῳ ἢ κύστι ὠφελῇ, σάκχαρον πινόμενον· σκυόδικος ἀφέψημα πινόμενον. ἢ πλατυφύλλου φλοιὸς ἐρεσσαίης ποτίσιος κοτυλίσκος ἐξ. θλιβεὶς ὁ χυλὸς σὺν οἴνῳ γλυκεῖ πινόμενος ἢ ὁ τῶν σίτων σπέρμα· ἀφέψημα· κύπειρος ἢ λιόθειον, ἀμυγδάλαι πικραί. τροβίλια. παφρυγμένα. κόκκοι κυπαρίσσου μέλαν. βαλανίτου τὸ γλυκεῖ, ἢ χέρσαιος ἐλαφείου κεκαυμένου, μιγνύσης αὐτὰ χρῆς ὀλίγης. *Malim κύμινον κυπαρισσίαν. Malim κύμινον κυπαρισσίαν.*

CIX. Δυσουρίᾳ ἢ βοηθεῖ πτόρθυα, ἀ-
σπαράγγου ἀγρίου ῥίζης ἀπόζεμα, ἢ τὸ σπέρ-
μα σὺν οἴνῳ· πάναξ σὺν μέλικράτῳ. πεπὶ
δὲ τοὺς φωριασθέντας κύστιν πολυγόνου χυλός.
σαμψύχου ἀπόζεμα· σέσελι. σικύου ἡμέρου
σπέρμα καθαρόν, σὺν γάλακτι, ἢ γλυκεῖ,
καὶ πικροῖς ἀμυγδάλοις· ἢ αὐτὰ ταῦτα ἀ-
μύγδαλα. ἐκ γλυκεῖ. σκορδίου χύλισμα ἐκ
οἴνου. σταφυλίνου ἀγρίου σπέρμα, φιλυτρείου
ῥίζης ℥ α'. ἐκ κράμπης. φῦ ἀπόζεμα. χα-
μαιπίτυος ὁμοίως. χαμαιλέοντος λευκοῦ
℥ α'. ℈ β. μεθ' ὑδρομέλιτος ἀπόζεμα ἢ οἶ-
νον. φλοιοδούνου κλωσὶ δ' μεθ' ὕδατος. ὠκί-
μου σπέρμα. ἀβρότονον ὁμοίως ἀποζεσθὲν ἐν
ὕδατι, ἄχρις οὗ τέτταρα λειφθῇ. ἀγαρικοῦ
℥ α'. μεθ' οἴνου. γλυκυῤῥίζης ἀπόζεμα πι-
νόμενον. ὀξυμυρσίνης ἀγρίας ῥίζα ἀπόζε-
σθεῖσα. δαμασωνίου ῥίζης ℥ α'. σὺν οἴνῳ.
τρόχιλον καθαρὸν μεθ' ὑγροῦ σικύου σπέρματος ἢ
γλυκέος. ἀνθυλλίδος ℥ γ'. σὺν οἴνῳ· ἀνθεμί-
δος ῥίζαι ἢ τὰ ἄνθη ὁμοίως. ἀσπαλάθου ἀπό-
ζεμα ὁμοίως. ἀψίνθιον ἀποζεσθὲν σὺν σελίνου
ῥίζης ἴσον· σίκυος, ἢ νάρδου, ἢ μαράθρου ἐν ὕδα-
τι. βακχαρίδος ῥίζα ἐψηθεῖσα ἐν ὕδατι.
βουνίου τὰ φύλλα ἐκ τῆς ῥίζα. χυλισθέντα μεθ'
ὑδρομέλιτος. ἐλιχρύσου ἄνθος σὺν τοῖς φύλ-
λοις ἐν οἴνῳ. ἑρπύλλου ἀπόζεμα ὁμοίως.
σμυρνίου ῥίζα πινομένη ἐν οἴνῳ. ἠρύγγιος ῥίζα
μεθ' ὑδρομέλιτος ἢ οἴνου. ἱππο-
σελίνου ῥίζα καὶ σπέρμα ὁμοίως. κα ρδάμω-
μον μεθ' οἴνου, ἢ ὕδατος. κάλαμος ἀρωμα-
τίτης μεθ' ἀγρώστεως ῥίζης, ἢ σελίνου σπέρ-
ματος, ἐψηθὲν ἐν ὕδατι. κεδρίδιος πτόρ-
θυα μεθ' πεπέρεως ἢ οἴνῳ κινάμωμον σὺν
οἴνῳ. κοραλλίου ℥ α'. κλινοποδίου ἀπόζε-
μα ἐν ὕδατι. κυπαρίσσου τῶν φύλλων ὁ χυ-
λὸς πινόμενος σὺν οἴνῳ. λεύκης τοῦ δένδρου
φλοιὸς σὺν οἴνῳ. ἐξανύχου, τοῦ καὶ λιθοσπέρ-
μου, καρπὸς πινόμενος, ὁμοίως. αἱματίτης λί-
θος ἐν οἴνῳ. μαράθρου ἀφέψημα σὺν ὕδα-
τι. μυελὸς φύλλου ὁμοίως. πτελέας ῥίζα σὺν
γλυκεῖ. ὀνόθηρις ἐν οἴνῳ· οἱ ναὶ δὲ πόα καὶ ῥίζα.
ὄνου οἱ ἐπὶ ταῖς ὑδρίαις λῶποι πινόμενοι. ὄρ-
νιθος ἀποπατος σὺν οἴνῳ. εἰς ἣ τὸν ὀρνι-
θῶνα πόσῳ ἐστοιβάσθαι τοὺς ἐξουσισμοὺς
χύρεις ἀπὸ κλίνης λῶποι. κοριαπλάσται

A Vrinæ difficultati bibita auxiliãtur: radicis aſparagi decoctum, & ſemen eiuſdem cum vino, panax cum melicrato, qui quidem ſcabie laboranti veſicæ etiam ſuccurrit: polygoni ſuccus, ſampſuchi decoctum, ſeſeli, cucumeris ſatiui ſemen mundatum cum lacte aut paſſo & amygdalis amaris, aut ipſa amygdala amara è paſſo: ſcordij expreſſus ſuccus, è vino: paſtinacæ eraticæ ſemen, philetærij radicis drachma è vino diluto, phu decoctum, ſimiliter & chamæpityos, chamæleonis albi drachma vna aut altera cum origani decocto aut vino, pſeudobunij ramuli quatuor ex aqua, ocimi ſemen, ſimiliter & abrotonum ad tertias in aqua decoctum, agarici drachma cum vino, dulcis radicis decoctum potum, ruſci ſylueſtris decocta radix, damaſonij radicis drachma cum vino, nuclei pinei repurgati cum ſemine cucumeris & paſſo, anthyllidis drach iij. è vino, anthemidis radices ac flores ſimiliter, aſpalathi decoctum eodẽ modo, abſinthium decoctum cum æquali portione radicis apij, iuncus odoratus, aut nardus, aut fœniculum ex aqua, baccharidis radix decocta in aqua, bunij è foliis & radice ſuccus cum melicrato, elichryſi flos cum foliis è vino, ſerpylli decoctum ſimiliter, ſmyrnij radix pota è vino, eryngij radix cum ſemine paſtinacæ & vino, hippoſelini radix & ſemen ſimiliter, cardamomum cum vino vel aqua, calamus aromaticus cum radice graminis & apij ſemine coctus in aqua, cedri baccæ cum pipere ex vino potæ, cinnamomum cum vino, corallij drachma, clinopodij decoctum in aqua, cupreſſi foliorum ſuccus ex vino potus, populi albæ cortex cum vino, exonychi, quod & lithoſpermon dicitur, ſemen ſimiliter potum, hæmatites lapis è vino, fœniculi decoctum in aqua, millefolium ſimiliter, vlmi radix cum paſſo, onobrychis cum vino, œnanthe herba & radix, millepedæ quæ ſub vaſis aquariis degunt tritæ ac potæ, fimus gallinaceus cum vino. Cimices lectularij contriti vrinariæ fiſtulæ ad eliciendam vrinam inducuntur. Imponitur

Ad dyſuriam.

μυρσίνης.

℥ δ'. lib. 3 de mat. med. c. 153.

Moibanus legit ἀ χύρεις, ἢ καρδάμις ἀ μυρσίνης &c Malim ego, χύσεις, quamquã & lenticus vrinam pellit.

verò contra difficultatem vrinę farina erui cum aceto, & superilligatur: similiter & vrinas ciet meum tritum, pectinumq; ositum. Suffumigata quoque vrinas mouent, bdellium, artemisia, locustæ & pili ceruini: vndique vero vestibus cinctum coopertúmque esse oportet cui remedium adhibetur, vt ne suffitus vapor quaquaversum exhalet atque dissipetur. Sedes etiam amaracino vnguẽto circumlinatur.

Suffitus ad vesicæ affectiones.

Ad insessus autem decoquuntur in vesicæ affectionibus, anthemis, laurus, calamus aromaticus & cupressi folia.

Ad calculum

Calculos vesicę conterunt atque communuunt, adiantum, philetæri seu polemonij radicis drach. ij. smyrnij semen, ruscі radix in passo macerata, & semen eius cum vino, hippomarathri semen & radix, althææ radix & semen, alcyonij Milesij oboli duo ex aqua, amygdalæ amaræ cum passo, & ex iisdem oleum, anthemidis quę flore est purpureo & flos & radix, leucanthemi decoctum, ononidis radix cum vino mulso, bdellij drachma cum vino, tribuli è virenti fructu succus, auis, quam ossifragum Latini vocant, ventriculus arefactus paulatim epotus, pæonię acini sulphuri tum exiccati, tum etiam poti: (qui quidem puerulis calculo & scabie vesicæ laborantibus cõueniunt:) lauri è radice cortex, cyperi decoctum, nardi Indicæ & spica & folia, opopanax tragacantha, gentiana, cuminum latum, semen erucę & xanthij, nuclei pinei, muria, helenium, castorij drachma cum vino odorato, vmbilici Veneris radix & herba in cibo sumpta, cardamomi drachma vna cum æquali pondere corticũ radicis lauri è vino: gũmi amygdali amaræ, aut vitis, aut pruni cum passo: radix in vino cocta, exonychi, lithosperma semẽ cõtritum, lapides è spõgijs triti cũ vino, vrina taurina pota, parthenij, quod leucanthemũ dicitur, herba, palmæ semẽ, amomũ in cibo sumptum: (quod aquas etiã q̃ calculos gignũt emẽdat, & cũ iis coquatur:) iisymbrij decoctũ. Struthij radix cũ panace & capparis radice, etiã calculos cũ vrina pellit: polij decoctũ, lapis Iudaicus

A ὑ πρὸς δυσουρίας, ἄλφιτον βόειον σὺν ὄξει, καὶ ὀπὸν δῆσαι. ὁμοίως ὑ ἄλφι μῆνι λῖτον καταπλασθὲν μετ' ὄξους ἐφθαίου. ὑποθυμιώμενα ὑ ἄλφι βδέλλιον, ἀρτεμισία, ἀκρίδες. πρίχες ἐλάφου, θρεπτολισμένος ὑ ἔτω κύκλωθεν, ἵνα ἀδιαπνεύστως ἡ· θρίχες καὶ ⊛ δακτύλιον ἀμαρακίνῳ μύρῳ.

B CX. Εἰς ἐγκαθίσματα ὑ ἀποζέουσι τὸν ἐπὶ τῆς θρεπτῆς τῷ κύστει ἄνθεμις, αὐθέμις, δάφνη, κάλαμος ἀρωματίτης, κυπαρίσσου φύλλα.

CXI. Λίθους δὲ τοὺς ἐν κύστει θρύπτει πτισάνη. σὺν οἴνῳ· ἀδίαντου, φιλετæρείου ῥίζης < β'. σμυρνίου σπέρμα. ὀξυμυρσίνης ῥίζα ἐν γλυκεῖ ἀποβρεχομένη, καὶ ὁ καρπὸς σὺν οἴνῳ. ἱππομαραθίου σπέρμα ὑ ἡ ῥίζα, ἀλθαίας ῥίζα ⊗ τὸ σπέρμα. ἀλκυονίου Μιλησίου ὀβ. β'. σὺν ὕδατι. ἀμύγδαλα πικρὰ σὺν γλυκεῖ, ὑ τὸ ἔλαιον αὐτῶν· ἀνθέμιδος τῆς * πυρραίου ⊗ ἄνθος καὶ ἡ ῥίζα. λευκανθέμου ἀπόζεμα. ἐνώνιδος ῥίζα σὺν οἴνῳ ⊗ μέλιτι. βδελλίου < α'. σὺν οἴνῳ. τριβόλου χλωροῦ καρπὸς χυλός. φλοιὸς τῆς ὀρτου, ὃ ῥωμαῖοι ὀστιφράγην καλοῦσιν, ἡ κοιλία ξηρὰ κατ' ὀλίγον πτισθεῖσα. γλυκυσίδης ῥίζαι πυρροὶ ἐσθιόμενοι ὑ πινόμενοι * ἄλλως. ὀπὸς ὑ τῶν παίδων λιθιώντων καὶ πρὸς τὰ ψωριῶσαι κύστεις ἁρμόζει. δάφνης ῥίζης * τὸ ἐφιππίου φλοιὸν κυπέρου ἀφέψημα. σαχυς, φύλλα ἰνδικά. ὀποπανάξ. τραγάκανθα. γεντιανή. πλατυκύμινον. σπέρμα σὺν ὄξει καὶ γρυθίου. κοκκάρια. ἀλμη. ἔλαιον, ὄρχις κάστορος < α'. μετ' οἴνου εὐώδους. κυπαρίσσου ῥίζα καὶ ἡ πόα ἐσθιομένη. καρδαμώμου < α'. μετ' δάφνης ῥίζης τῶν φλοιῶν * < α'. σὺν οἴνῳ. κόμμεως ὑ σὺν ἀμυγδάλης πικρᾶς, ἢ ἀμπέλου, ἢ κερασίνων, μετὰ γλυκέος. ῥίζα ἐφθὴ ἐν οἴνῳ. ἐξωνύχου καρπὸς λεῖος· λίθοι οἱ ἀπὸ τῶν σπονδίλων λεῖοι μετ' οἴνου. ἅλες τοὺς ἐν τῷ πτισθέντι λεῖοι. παρθενίου τῆς λευκανθέμου καλουμένης ἡ πόα· παλιούρου σπέρμα. ἄμωμον ἐσθιόμενον. τοῦτο ὑ καὶ τὰ λιθιῶντα ὕδατα καθαίρει σὺν τροφῇ. σισυμβρείου ἀπόζεμα. γρυθίου ῥίζα σὺν πάνακι καὶ καππάρεως ῥίζῃ. καὶ ὄζους ὑ τοῦ πολιοῦ ἀπόζεμα. λίθος Ἰουδαϊκὸς

Molbaum legit ἐφύτιον, sibaudi ἄνωρ.

Gesnerus legendum suspicatur χυλὸς ὁ φλοιὸς Indicus.

Gesn. Poss. λεῖμον, malim pœonium notare, & subdere χρήσιμον, aut potius legere ξυλάλοιν.

Lib. 1 de materia hic pondus nominatur. mnaunia hæc.

Apparet aliquis nomen hic deesse. Suspicatur verò Gesnerus rumicis aut ononidis nomen hic desiderari.

ὀβολὸν ἔλαιον.

πελόμενος σὺν ὕδατι, καὶ πινόμενος. σκολοπένδριος βοτάνη, ἔστι δὲ καὶ διουρητικόν. ἰρίνου ἄνθος πινόμενον καθ' ἡμέραν. μυσκέλαιον μετ' ὀλίγου κρόκου καὶ σμύρνης πινόμενα σὺν ὕδατι· ἢ μετὰ λιβανωτοῦ ὀλίγου καὶ οἰνομέλιτος πολὺ θυμιαθέντα, ἢ τὸ ἀφέψημα αὐτοῦ. ἢ λίθος τῷ ἐξουρηθέντων ὑπ' αὐτῶν πεπτεῖς καὶ πολὺς ἐν οἴνῳ, A tritus cum aqua & potus, scolopendrium herba, quæ & vrinas cient: iunci odorati flos quotidie potus; muscerda cum pauciſſimo croco & myrrha propinata ex aqua, aut cum pauco thure copia largiore inſperſa vino mulſo, thuris etiam decoctum, ac denique lapis, quem calculo laborans excreuerit, tritus è vino potus. B

CXII. Οὐρητικὰ δέ ἐστι καὶ τὰ παρεδιδόμενα μὲν πρὸς δυσουρίας καὶ λιθιῶντας· καὶ ταῦτα δὲ πινόμενα σὺν οἴνῳ ὠφελεῖ δυσουρεῖν τοὺς, ἐφ' οἷς οὔρων κινοῦσιν βουλόμεθα, ὡς ὅτι ὑδρωπικοὺς ἐκπεπιεκότων ἀκάνθης λευκῆς ῥίζης ⊀ α'. ἀκάνθης τραγικῆς πεπαλαιωμένης ῥίζης ὁμοίως. ἀκόρου ῥίζα. τριφυλλίδος καρπὸς, ἐκ ὁ χυλὸς αὐτῆς, ἢ τὸ ἀπόζεμα. ἀρκείου ῥίζα, καὶ ὁ ἀφέψημα αὐτῆς. ἄρκιον καὶ προσωπίον ἢ φιλάνθρωπος, ἢ σκορδόνιον, ὃ Ῥωμαῖοι περσῶν. ἀκακίας τὸ σπέρμα ἄριστα ποιεῖ λιθιῶσι μετὰ πεπέρεως καὶ οἰνομέλιτος. Ἀρεταῖος ὄνομα ἐν τοῖς νεφριτικοῖς ἔγραψεν. ἢ νάρδου Συριακῆς ῥίζα. τραγορείγανον. καὶ χυλὸς ὀριγάνου καὶ πετροσελίνου, ἴριος. καρπὸς σελίνου. κρίθμου. πηγάνου ἀγρίου σπέρμα. κοίδης σπέρμα. δήθαιας τῆς ῥίζης ἀφέψημα, βρυωνίας ῥίζης λευκῆς· καὶ μελαίνης ⊀ α'. καὶ ὁ ἀσπάραγος ἐσθιόμενος. ἀμπελόπρασα ἐσθιόμενα. ἄνισον πινόμενον. ἄνηθον. ἄρακος ῥίζα ξηρὰ ἐν οἰνομέλιτι (καὶ) ἐφθή, ἐσθιομένη. καὶ δρακόντιον ὁμοίως. ἀρκευθίδων ἀφέψημα, ἢ αὐταὶ λεῖαι πινόμεναι σὺν οἴνῳ. ἀσφοδέλου ῥίζης ⊀ α'. σὺν οἴνῳ. ἄφακος ὁμοίως. ἀστραγάλου ῥίζα. βαλσάμου καρπὸς ⊀ α'. καὶ ὀπὸς βαλσάμου μετὰ γλυκέος. τριχομανὲς. ὑακίνθου ῥίζα. ἰατρικὸν. χαμαιδάφνης Ἀλεξανδρινῆς. γιγίδιον. δίκταμνον. βάλανοι δρύινοι ἐσθιόμεναι, ἢ ὁ ἀφέψημα αὐτῶν. ἐλατίνη ἀφέψημα. ἐλελισφάκου ἀφέψημα. ἐρεβίνθοι ἐσθιόμενοι, καὶ τὸ ἀφέψημα αὐτῶν. ἐρυθρόδανον. ἔχινος θαλάσσιος. ἥρμου ῥίζης ἀπόζεμα. σκίλλης ἐφθῆς, ὡς λάχανον ἐσθιομένη· ἢ ὄξυμελι, ἢ ὄξυμελι σκιλλητικὸν ῥίζα, ἢ τὰ φύλλα. ἰτέας ὀπός. καρπὸς. ὁ ὀπὸς τῶν ἡρίφων βρωθεὶς χυλὸς, δι' ὕρου ἄγει. καὶ λαπάθης ἀπόζεμα. κάγχρυος. κισσοῦ αἷμα ἄγει. tritus cum aqua & potus, scolopendrium herba, quæ & vrinas cient: iunci odorati flos quotidie potus; muscerda cum pauciſſimo croco & myrrha propinata ex aqua, aut cum pauco thure copia largiore inſperſa vino mulſo, thuris etiam decoctum, ac denique lapis, quem calculo laborans excreuerit, tritus è vino potus.

Vrinas cient tum quæ ad vrinæ difficultatē & calculos cōmemorauimus, tum & hæc ſequētia in vino pota, quæ quidē adiuuāt nō ſolùm vrinæ difficultate laborātes, ſed & cæteros quibus vrinas pellere conſultum fuerit, velut hydropicos & arquatos: ſpinæ albæ radicis drachma, acanthi pæderoris dicti radicis tantundē, acori radix: trifolij ſemē, ſuccus & decoctum: arctij radix & & eiuſdē decoctum, arcium quod & proſopium aut philanthropos aut ſcordonium, Latinis perſonata, dicitur: acaciæ ſemen præclarè calculoſis proficit cum pipere & vino mulſo. Aretæus inter nephriticorum remedia onoſma repoſuit. Nardi Syriacæ radix, tragoriganū, ſuccus origani, petroſelini, iridis: ſemen apij, crithmum, rutæ ſyluestris ſemē: vrticæ ſemē, althææ radicis decoctum, bryoniæ albæ aut nigræ drachma, aſparagus in cibo ſumptus, ampelopraſum eſitatum, aniſum bibitum, anethum, ari radix ſicca in mulſo cocta & eſitata, ſimiliter & dracunculi radix, baccarum iuniperi decoctum, & ipſæ quoq; tritę ex vino potę: aſphodeli radicis drachma cum vino, aſarum ſimili modo, aſtragali radix, carpobalſami drachma, opobalſamum cum paſſo, trichomanes, hyacinthi radix, hypericum, lauri Alexādrinę radix, gingidium, dictānus, glādes quernęin cibis ſumptę, ac earundē decoctum, helenij decoctum, ſaluiæ decoctum, cicer in cibo ſumptum, eiuſdem decoctum, rubia, echinus marinus, lupini radicis decoctum, lactuca elixa oleris inſtar in cibo ſumpta, thymus, thymbra, equiſeti radix & folia, ſalicis liquor, fumaria: cremor hordei aſſumptus vrinas trahit: calaminthæ decoctum, cachrys: hedera etiam ſanguinem cum lotio educit

ad prohibendam vrinam.

costus, crocum, huius radix cum passo, cepæ elixæ, ligustici radix & semen, lapides spongiarum, malabathri folia, nigella, gladioli radix superior, coreos semen cum vino, holoschœni semen, onobrychis, origanum, lyncis vrina trita ex aqua, capræ vrina similiter cum spica nardi, periclymeni folia, piper, ruta, pini cortex, polium, marrubium, porrum, elixum, raphanus eiusdémque semen, resina quæuis, præcipuè verò lentiscina: apium seu crudum seu etiam coctum, ac semen eiusdem, sideritis, quæ & Heraclea dicitur, sison, asarum, scillæ tostæ drachma cum oxymelite, sonchi radix & semen, struthij radix: pinei denique nuclei esitati vehementer vrinas promouent.

A κόστος, καὶ κρόκος, ἐκ ῥίζα μύρτου γλυκείας. κρόμμυα ἑφθά. λιγυστικοῦ ῥίζα καὶ ὁ καρπός. λίθοι οἱ ἐκ σπόγγων. μαλαβάθρου φύλλα. μελάνθιον. ξιφιδίου ῥίζα ἡ ἄνω. κόριος καρπὸς σὺν οἴνῳ. ὁλοσχοίνου καρπός. ὀνόβρυχις. ὀρίγανον. οὖρον λυγγὸς λεῖον σὺν ὕδατι. οὖρον δὲ αἰγὸς ὁμοίως μετὰ νάρδου στάχυος. περικλυμένου φύλλα. πίπερι. πήγανον. πίτυος φλοιός. πόλιον. πράσιον. πράσου ἑφθοῦ. ῥάφανος καὶ τὸ σπέρμα. ῥητίνη πᾶσα, μάλιστα δὲ ἐλάτου. σίλινον ὠμὸν καὶ ἑφθόν, καὶ ὁ σπέρμα αὐτῶν. σιδηρίτης, ἡ ἑ Ηρακλεία. σῦκον. ἄσαρον, σκίλλης ὀπῶς < α'. σὺν ὀξυμέλιτι. σόγχου ῥίζα καὶ ὁ καρπός. στρουθίου ῥίζα. ἴσχυρως δ' ῥητίνῃ εἴσι στρόβιλοι ἐδώδιμοι.

Ad canis rabiosi morsum.

Morsis à cane rabioso conferunt hæc: sanguis rabidi canis potus, & eiusdē iecur assum contestum, cancrorum fluuiatiliū oculi tosti & ex aquæ cyatho poti. Aut: cineris è cleris integris crematis drachma vna aut altera, gētianæ drachma vna, cineris vitis albæ dr̃ach. ij. misceātur & cū vino albo triduo bibātur. Iuuāt & dens caninus rabiosi canis qui momorderit, folliculo ex aluta inditus & brachio adalligatus: lyciū potui datū. Aristoloclīæ, gētianę, baccarum lauri & myrrhę partes æquales mixtæ propinātur, aut etiā vulneri ex morsu imponūtur: apparatæ etiā ranæ in cibo sumūtur, vti & canis coagulum in sapa. Vulneribus etiā adhiberi oportēt, quę diutius eadem dilatata seruent, nec tā citò sināt coire ac cicatrice obduci. Quare cōsultum fuerit, vt in quouis alio, ita maximè in canis rabiosi morsu alliū vſurpāte, seu per se, seu etiā cum melle. Proficiūt & vrticę folia cū sale aut melle, cepa cū sale aut ruta, silphiū cū sale, eiusdem liquor aut tritus insperſus, aut alioqui cataplasmatis instar applicitus, salsamētū omne, cinis sarmēticius cū oleo, sābuci folia cū sale, amygdalę amarę cū melle, balloces aut plātaginis folia cū sale, mentа similiter, nuces iuglādes cū cepa

B χλυμένου φύλλα. πίπερι. πήγανον. πίτυος φλοιός. πόλιον. πράσιον. πράσου ἑφθοῦ. ῥάφανος καὶ τὸ σπέρμα. ῥητίνη πᾶσα, μάλιστα δὲ ἐλάτου. σίλινον ὠμὸν καὶ ἑφθόν, καὶ ὁ σπέρμα αὐτῶν. σιδηρίτης, ἡ ἑ Ηρακλεία. σῦκον. ἄσαρον, σκίλλης ὀπῶς < α'. σὺν ὀξυμέλιτι. σόγχου ῥίζα καὶ ὁ καρπός. στρουθίου ῥίζα.

C ἴσχυρως δ' ῥητίνῃ εἴσι στρόβιλοι ἐδώδιμοι.

Θηριακα.

Theriaca, hoc est, contra morsus ictúsque venenatos auxilia.

CXIII. Λυσσοδήκτου δὲ ὠφελεῖ, ὅ αἷμα τοῦ λυσσῶντος κυνὸς πολὺ, καὶ τὸ ἧπαρ αὐτοῦ ὀπτὸν καὶ βρωθὲν. καρκίνων ποταμίων ὀφθαλμοὶ φωλεύοντες, καὶ μετ' ὕδατος ποθέντες κυ. ἀ. ἢ καὶ ὅλων καίντων τῶν τέφρας < ἀ. ἢ δ'. ἡμιπαοῦς < ἀ. καὶ ἀμπέλου λευκῆς τῆς τέφρας < β'. σὺν οἴνῳ λευκῷ ποθὲν ἡμέρας γ'. πινόμενον. καὶ ὁ κυνόδακτος δὲ τοῦ δακόντος κυνὸς, σπλὴν εἰς κυλίδα, καὶ πιεσαφθεὶς βραχέως, ὠφελεῖ. καὶ λύσιν ποιεῖ. ἢ ἀριστολοχίας καὶ ἡμιπαοῦς καὶ δαφνίδων, καὶ σμύρνης ἴσον ἑκάστου ἀναλαβὼν δίδου πιεῖν, ἢ καὶ ὅτι τὸ δῆγμα ἔπιπτε. βάτραχοι σκυαλαθέντες καὶ ἐσθιόμενοι. πιτύα κυνὸς ὀὸ ἐφθμαλῖ. καταπλάσσει δὲ λῆ ὅτι τὴν λυσσοδήκτων τὰ τραύματα πρὸς δυναμένοις τηρεῖν ἔφ' ἱκανὸν ἕλκη, καὶ μὴ ἐᾶν ταχέως ἐπουλοῦσθαι. βέλτιον δὲ, εἰ καὶ ὅτι πόλλι, εἰς αὐτὰ τὰ κυνόδακτα τραύματα λαμβανόμενον σύρεσθαι καθ' ἑαυτό, ἢ καὶ σὺν μέλλι. χελώνης φύλλα σὺν ἁλσὶ, ἢ μέλλι κρόμμυον μεθ' ἁλός, ἢ πηγάνου. σίλφιον μεθ' ἁλός. ὀπὸς σιλφίου παλαιόμενος λεῖος, ἢ καταπλατόμενος. πάντες πᾶς. τέφρα κληματίνη σὺν ἐλαίῳ, ἢ σκόροδον. ἀκτῆς φύλλα σὺν ἁλσὶν. ἀμύγδαλα πικρὰ σὺν μέλιτι. βαλλωτῆς φύλλα, ἢ ἡσυχολώτου σὺν ἁλσὶν. ἡδύοσμον ὁμοίως. κάρυα βασιλικὰ σὺν κρομμύῳ

D

E

F

G

καὶ ἁλὶ, καὶ μέλιτι. μελιτόφυλλον μὲθ' ἁ- A
λῶν. μυάκων σάρξ. νίτρον σὺν ὑείῳ στέατι.
ὀρόβινον μὲτ' μέλιτος. θέρμ' ἀνθρώπινον κα-
τάπλασμα. πήγανον σὺν ὄξει. πυρὸν ὠμὸν
μασηθέντες καὶ ἐπιτεθέντες. σικύου ἡμέρου
φύλλα σὺν οἴνῳ. ὀπὸς συκῆς ἐπισταζόμενος,
ἢ συκῆς φύλλα· ἢ κράδαι ἁπαλαὶ σὺν μέ-
λιτι. πέφυκε κληματίνη σὺν ἐλαίῳ. πέφυκε B
συκίνη σὺν κηρωτῇ. ὑὸς ἄφοδος σὺν ὄξει ἐ-
ψηθεῖσα. καὶ τὸ Περσικὸν μῆλον μασηθὲν
καὶ ἐπιτεθέν.

CXIIII. Πρὸς δὲ τὰ κοινὰ τοῖς ἑρπετοῖς
δίδοῦ· πιπέρεως σὺν ὄξει καὶ μηκωνίῳ. πηγά-
νου ἀγρίου σπέρμα. πλατάνου σφαιρία ὁ-
μοίως. πολεμωνίου, τοῦ καὶ φιλεταιρείου, < α'. C
σὺν οἴνῳ. πυρήθρας. πύρεθρον. πιτύα νεβρεί-
ου λαγωοῦ. σαγαπηνοῦ < α'. σελίνου σπέρ-
ματος σὺν σκορόδῳ < β'. τοῦ δὲ συχλίσμα-
τος < α'. ἀσπαραγίου ῥίζα καὶ ὁ καρπός. συ-
κάμινου ὀπός. τευθρίου· τευκρείου ῥίζης χυ-
λός. ταῦτα σὺν οἴνῳ λαμβανόμενα. πυρ-
ήθρης, καὶ ὁ ἵππουρις ὁ ξύλινος δηχθῇ, εἰ ἔχυθεῖσα δέρ- D
ματος σὺν ὀπῷ μιᾷ ζῇ.

CXV. Πρὸς δὲ τὰ τῶν ἐχέων δήγματα
τὰ σὺν οἴνῳ λαμβανόμενα, καὶ ὁ ἔχεως
μέρος, αἰτιακώτατον βοήθημα ἐστ' αὐτῶν, ἢ
σκορόδοφαγία· ἢ ἄκρατος ποσία· ὥστε αἱ ὑπα-
νδρίαι τῆς πλείονα βρῶσιν καὶ πόσιν, μὴ
δεῖσθαι ἄλλου βοηθήματος. ποιεῖ καὶ χελώ- E
νης θαλασσίας αἷμα ξηρὸν σὺν κυμίνῳ ἀ-
γρίῳ. πιτύα λαγωοῦ. αἰδοῖον ἐλάφου ἄρ-
ρενος < α'. ξηρᾶ. ἀκάνθης λευκῆς. συκῆς
φύλλα. ἀκόρου ῥίζα καὶ φύλλα. ἴριος. χα-
μελαίας. ναρδοῦ Συριακοῦ ῥίζα. ἀριστολοχίας
μακρᾶς ῥίζα. σμύρνιον. ἀσπάλακος χυλός. λι-
βανωτίδος ῥίζα. πηγάνου ἀγρίου ῥίζα. βρυ- F
ωνίας λευκῆς ἢ μελαίνης ῥίζα. ἀμπελό-
πρασον ἐσθιόμενον. ἀγαρικοῦ < α'. ἀνα-
γαλλίδος χυλός. ἄνισον. πεντεσπερμίτου ῥίζα.
ἀσπαράγου ἀφέψημα, ἢ σπέρμα. ἀρκευθί-
δες. ἀσφοδέλου ῥίζης < γ'. ἀσκληπιάδου
ῥίζα. ἀστὴρ Ἀττικὸς τὸ ἄνθος. ἀτρακτυλί- G
δος ἄνθη, καὶ τὰ φύλλα, ὅσον < α'. μὲτ' πε-
πέρεως. πεπάκια λάφανόμυα, βάτραχοι
ζωμῷ ἕψαντες καὶ ἐσθιόμενοι. βαλσάμου ὀ-
πὸς καρπὸν < α'. ἢ βδελλίου < α'. ἢ γα-

sale & melle: apiastrum cum sale, mytulorum caro, nitrum cum suillo adipe, farina erui cum melle, vrina humana affusa pro fotu, ruta cum aceto, triticum crudum mansum & impositum, cucumeris satiui folia cum vino: fici liquor instillatus, eiusdem folia aut tenelli furculi cum melle: cinis ficulneus cum cerato, succerda cum aceto cocta. Persicum denique malum commanducatum & impositum.

Ad quosuis serpentium morsus communia hæc remedia potui dantur: piper cum aceto & meconio, rutæ syluestris semen, platani pilulæ similiter: polemonij, quod & philetærium appellatur, drachma cum vino: pyritis seu pyrethrum, coagulum hinnuli ac leporis, sagapeni drachma, apij semen, scordij drachmæ duæ, densati verò eiusdem succi drachma vna, sparganij radix & semen, sycomori liquor, teucrium, radicis teucrij succus: hæc porrò cum vino sumenda. Pyritis verò etiam iumentorum ex morsu vulnera per os infusa sanat.

Inter ea quæ contra viperarum morsus in cibo potúque ex vino sumuntur, præsentissimum atque efficacissimum præstant auxilium alliorum esus & meraci potio, ita vt si quis frequentiùs & largiore copia illis vtatur, haudquaquam alio egeat remedio. Facit & præclarè testudinis marinæ sanguis exiccatus cum syluestri cumino, coagulum leporis, cerui maris pudendum aridum drachmæ vnius pondere, spinæ albæ [semen,] ficulnea folia, acori radix & folia, chamædrops, nardi Syriacæ radix, smyrnium, aparinæ succus, libanotidis radix, rutæ syluestris radix, bryoniæ tam albæ quàm nigræ radix, ampelopraſum in cibo sumptum, agarici drachma, anagallidis succus, anisum, verbenacæ radix, asparagi decoctum, aut semen, iuniperi baccæ, asphodeli radicis drach. iij. asclepiadis radix, asteris Attici flos: atractylidis flores & folia drachmę pondere, cú pipere: pistacia trita pota, ranæ in iure elixæ ac esitatę, balsami liquoris aut semi nis drachma, bdellij drachma, mu-

ſtelæ inueteratę & exiccatę drach. ij. gentianæ radicis drachm. ij. cum duobus piperis obolis & ruta; ſuci autem drachm. j. aſteris Samij drachm. ij. ſeminis dauci drachm. ij. cerebrum gallinaceum potum, glandes quernæ eſitatæ, iridis drachm. ij. helenij decoctum, elaphoboſci radix & ſemen, elichryſi decoctum, itidémque ſerpylli, rubiæ folia & caules: echij radix, folia, caulis & ſemen: ſeminis trifolij drachma & folia ſimiliter: tragoriganum, apri iecur tritum in vino, eryngij radicis drachma cum ſemine paſtinacæ, hippomarathri radix & ſemen, amomum, caſſia, cardamomum: cancri fluuiatiles triti cum lacte diſſoluti: itémque marini, ſed illis minùs efficaces: betonicæ foliorum drachm. ij. cinnamomum, clinopodij decoctum, coſti drachm. ij. cum totidem piperis obolis, origanum Heracleoticum, ac eius decoctum, braſſicæ ſuccus, cyclamini radix, cupreſſi pilulæ, cuminum tum ſatiuum tum & agreſte, leporis atque hinnuli coagulum, leontoperali radix, myricæ decoctum, fœniculi ſemen, myrrhidis radix, lapis hæmatites cum vino. Ariſtolochiæ radicis, myrrhæ, baccarum lauri, gentianæ partes æquales excipiuntur melle, atque conflatum ex iis medicamentum & potui datur & vulneri imponitur. Fraxini folia ex vino, ac eorundem ſuccus etiam moribundo proſunt. Vrina propria potа & impoſita, magnificè iuuat: necnon & anchuſa, platani fructus, naſturtium, cupreſſus, pini cortex cum vino, heliotropium.

Ad ceraſtæ morſum.

Priuatim verò ceraſtæ morſui aduerſantur, ammeos drachm. ij. cum myrrha & vino.

Valentibus ex ſerpentium morſibus admouenda.

Adhibentur verò ita vt adhærere ſcant: trifolij folia, fraxini folia, ruta, calaminthæ folia, lini ſemẽ cum ſale vel origano ac melle: gallinæ viuæ diſſectę & adhuc calentes impoſitæ: ſed in ipſarum locum aliæ ſubinde ſufficere oportet: ſimus caprinus coctus in aceto, ariſtolochiæ longæ radix cũ aqua: aſphodeli radix, flores & folia cum vino: cedria ſiue pix liquida cum ſale, quæ & cõtra ceraſtæ morſũ valet: lauri folia cum oleo cocta, ericę folia cũ vino,

A λεῶ σπελετθύσας καὶ ξηράνας, δίδου < β'. ἡμιτανῆς ῥίζης < β'. μετὰ δυεῖν ὀβολοῖν πεπέρεως καὶ πηγάνου. ϝ ἢ χυλὸν < α'. γῆς Σαμίας τοῦ ἀστέρος < β'. δαύκου σπέρματος < β'. ἐγκεφαλὸς ἀλεκτορείδων πινόμενος. βάλανοι δρύιναι ἐσθιόμεναι. ἴριδος < β'. ἐλενίου ἀπόζεμα. ἐλαφοβόσκου ῥίζα καὶ

B σπέρμα. ἐλιχρύσου ἀπόζεμα. ἑρπύλλου ἀπόζεμα. ἐρυθροδάνου φύλλα & καυλοί. ἐχίου ῥίζα καὶ καυλὸς, & φύλλα, & σπέρμα. τετραφυλλίδος σπέρματος < α'. καὶ τὰ φύλλα ὁμοίως. πραξείγλωσσος. ἵππῳ κάπρου λῶον τὸ οἶπον. ὑρύγγιος ῥίζης < α'. μετὰ τετραφυλλίνου σπέρματος. ἵππουρις & θυμὸς ῥίζα

C & σπέρμα. ἄμμωμον, καὶ κασία. καρδάμωμον, καὶ καρκίνοι ποταμίοι λῶοι, συνθλασθέντες ἧττον δ' οἱ θαλάσσιοι. κέστρου φύλλων < β'. κινάμωμον. κλινοποδίου ἀπόζεμα. κόστου < β'. μετὰ πεπέρεως ὀβολῶν β'. ὀρίγανος Ἡρακλεωτικὴ, & τὸ ἀπόζεμα αὐτῆς. κράμβης χυλός. κυκλαμίνου ῥίζα.

D κυπαρίσσου σφαῖρια. κύμινον ἥμερον καὶ ἄγριον. λαγωοῦ πυτία & νεβρῶν. λεοντοπεταλίου ῥίζα, μυελίνης ἀπόζεμα. μανδραγόρου σπέρμα. μυρρίδος ῥίζα. αἱματίτης λίθος σὺν οἴνῳ. ἀριστολοχίας ῥίζης, σμύρνης, δαφνίδων, θλιβανῆς, ἴσον ἑκάστου μέλιτι ἀναλιφθὲν πίνειν, & ἐπὶ τοῖς σκολοπενδρίοις ἐπιτίθεται. με-

E λίας φύλλα σὺν οἴνῳ, ἢ ὁ χυλὸς αὐτῆς, καὶ ὕδατι ἀποθήσεις. ϝ ἐγὼ τὸ ἴδιον πολὺ καὶ ἐπιπολὺ, μεγάλως ὠφελῆ. ἢ ἀγρίου. πλατάνου καρπός. κάρδαμον. κυπάρισσος. πίνους φλοιὸς σὺν οἴνῳ. ἡλιοτρόπιον.

CXVI. Κεφάλης & ἰδίας ἁρμόζει, ἄμμεως < β'. μετὰ σμύρνης καὶ οἴνου.

F CXVII. Καλοπλάστην & σκορπιοχῶν. τετραφυλλίδος φύλλα. μελίας φύλλα, πήγανον. καλαμίνθης φύλλα. λινόσπερμον σὺν ἁλὶ ἢ ὀρεγάνῳ & μέλιτι. πρὸς κεφαλαίας αἰσχεθείσας ζώσας & ἐπιτεθείσας θερμάς· ἀλλάσσειν & ἀφ' συνεχῶς. ἀσπάνου ἀγρίου ἐμπλάσσει. τὸ ὄξος. ἀριστολοχίας μακρᾶς ἢ ῥίζα μετ' ὕδατος. ἀσφοδέλου ῥίζα, & ἄνθη, φύλλα, σὺν οἴνῳ. κεδρία ἢ πίσσα ὑγρὰ σὺν ἁλὶ, & ἐπὶ τοῖς σκόλοψι. δάφνης φύλλα σὺν ἐλαίῳ ἐμπλάσσειν. ἐρέβινθος φύλλα σὺν οἴνῳ.

4. de mat. med. c. 1. drach. iij. in vini ſextarios.

Videtur legendum: καὶ ἐπὶ τοῖς σκόλοψιν ἐσόμ.

In aceto aut vino. 1. de mat. med. cap. 99.

ἐχίου φύλλα ὁμοίως. πηλὸς οἶνῳ μὲν ἀλφίτοις καὶ ὄξει. κρόμμυα ὁμοίως. ὀρόβινον σὺν οἴνῳ. πτελέου φύλλα μὲθ' ἁλὸς καὶ μέλιτος. πίτυος ὁ μετὰ οἴνου καὶ ὄξους ἑφθὸς. σέσελι ἐφθὸν ὄξει. ῥαφάνου φλοιὸς σὺν μέλιτι. σάμψυχον σὺν ἁλὶ καὶ ὄξει. σκίλλα ἑφθεῖσα σὺν ὄξει. σίσυμβρα σὺν ὄξει. τίφη πᾶσα σὺν ὄξει, καὶ μάλιστα δοκὸς ῥαφάνου, ἢ μελίνης. καταπλᾶσθαι δ' ὅτι πρῶτ' ἰοβόλων τετραφυλλίδος ἀπόζεμα. ὅτι δ' τῆς πληγῆς ἰδίως βούτυρον ὅτι πλεῖστον. ἀλφίτοις λῦσαι μετ' οἴνου, ἄγαν φύλλα, ἀδίαντον. ἕλκεσι δ' ἔτι ὅτι φαίλαν, ἐὰν ὅτι πολὺ ἐάσῃς. ῥητίνης φύλλα· πυέτιοσιν δὲ σὺν ὀξυμέλιτι.

μετὰ πηλοῦ ἀποβύσαντες, σὺν ruta decocto. 2. de mat. med. cap. 107.

Videtur aliquid deesse.

Vocabulum hoc corruptum apparet.

CXVIII. Πρὸς δὲ αἱμορροΐδας (καὶ ὀρυγῆρος) δύναται ὠφελῆσαι, ἀνδράχνη καταπλασθεῖσα, ἀρνόγλωσσον, σεσελιτικὸς φύλλα. αὐτὸ τὸ θρῖον καῦσαι καὶ καφαλὶ καὶ ὄπτιον πιεῖν. ὕοσκυαμον. ἀδίαντον. σίσυμβρον λευκὸν. πορτόλακα. πήγανον. κρόμμυον. κόνδυ. κάρδαμον, καὶ σπόρμα. σίσυμβρον λεῖον νεῦρ οἴνῳ πολλῷ. ἀσπαφίδες ἐσθιόμεναι. ποσσὶ ὁμοῦ ἐσθιόμενοι σὺν οἴνῳ.

ad haemorrhoides mor-sum.

portulaca, plantago, verbenacæ folia, ipsius serpentis caput crematum & impositum, hyssopus, calx viua, allium candidum, porrum, ruta, vrtica, nasturtium & eius semen, allium tritum ex vino potum, vuæ passæ esitatæ, pulli cruditi cum vino in cibo sumpti.

olòn.

In versione hic additur thymum è ficu, sanie euacua. Morbosos legendum suspicatur hermolaus, hostiles.

CXIX. Ἐπὶ δὲ ὀφεσῖν, ὁμοῦ χάριχες θύννου πολὺ ἐσθιόμενος. δεῖ δὲ οἶνον πολὺν ὕστερον πίνειν ἐμέσῃ.

fort. pulli-trum gallinaceorum cerebella.

ad morsum.

In presentis morsu, conditanei thunni caro abundè comesta auxiliatur: sed vino copioso deinde superbibito vomitus concitandus est.

CXX. Ἐπὶ δὲ ἀσπίδος, ἢ πτυάδος, κόριδες ζ. ἢ η. καταπόντες ὠφελοῦσιν. ὄξος πινόμενον. συνεχὴς διέγερσις, πλῆξαι, κίνησις ὅλου τοῦ σώματος. καταλλῆξαι δὲ ὠφελίμως θαλάσσατι θερμῷ.

ad aspidis pyadisve morsum.

Ad aspidis aut pyadis morsum, cimices septem octóve deuorati iuuant, acetum bibitum, assiduæ excitationes, percussiones & totius corporis agitationes. Vtiliter etiam aqua marina calens perfundirur.

Addo. scil. πλη-γὴν

CXXI. Σκορπίου καὶ φαλαγγίου, καὶ σφηκὸς, καὶ μελισσῶν, πιεῖν σὺν οἴνῳ λαμβανόμενα. ἀγαρικὸν ⊰ α'. ἀγερατου σπέρμα. ἀδίαντον, ἀσίζωον σκορπιοειδὲς, ἰδίως πρὸς σκορπίου πληγὴν ἕρπυλλος. ἀλθαίας ῥίζης ⊰ α'. λυχνίδος σπέρμα, ἰδίως γὰρ πρὸς φαλάγγια. συκαμίνου ῥίζης ὑγρὸν δοῦναι πιεῖν, ἢ σκορπίδες. ὀξαλίδος σπέρμα καὶ ἡ ῥίζα. ὀνοθήρου ⊰ δ'. ἄμμεως ⊰ β'. ἐξόχως πιεῖν. ἀσφοδίλου σπέρμα, καὶ τὸ ἄνθος πιεῖν. ὑακίνθου ῥίζα. χαμαιδρύος ἀπόζεμα, καὶ ὁ χυλός. γλυκέως. ἰτέας ⊰ β'. ἡδύσαρος ἀγρίας σπέρμα. ὑπερικὸν. κισσὸς ῥίζης χυλὸς σὺν ὄξει. κυπαρίσσου σφαῖρα σὺν οἴνῳ. μαλάχης ζωμὸς πινόμενος, καὶ αὐτὴ ἐφθὴ ἐσθιομένη.

Hunc meminit Nicander in Ther. Suspicatur Gesnerus esse chamæpityn, quam & ἰτέαμον seu ἀσπαγνον nominat: reperitur apud Dios.

ad scorpionis, phalangiorum, apum, vespa-rumque ictus remedia.

echij folia similiter, fæx vini cum polenta & aceto, cepę similiter, ersi farina cum vino, rutæ folia cum sale & melle, furfures in aceto decocti, porrum sectiuum, raphani cortex cum melle, sampsuchum cum sale & aceto, scilla in aceto cocta, allia cum aceto: cinis omnis cum aceto: maximè verò è brassica vel fraxino. Fouentur & à virulentis animantibus inflicta vulnera trifolij decocto: peculiariter autem ipsis vulneribus butyrum imponitur: abrotonum tritum cum vino, folia viticis, adiantum. Summam verò cutem vlcerant, si diutiùs reliqueris, folia: bibantur & ex aceto mulso.

Contra hæmorrhoidis [ac presteris] morsus hæc conueniunt:

melanthij drachma, meliſſophyllon & eius ſuccus, ſonchus in cibo ſumptus, virides myrti baccæ, myricæ ſeminis drachma, rutę ſemen, polygonon & eius ſuccus, terebinthi fructus, lauri baccæ contritæ, ſcorpiurus, cardamomum, anagallidis ſuccus, allia eſitata (quoniam refrigerationem inferunt ſcorpionum ictus:) hyoſcyami decoctum aut dilutum cum vino, ipſe ſcorpius aſſus in cibo ſumptus: fuligo denique è camino cum vino pota.

Ad ſcorpionum, apum veſparumque & phalangiorum ictus hęc applicita conueniunt: fimum bubulum, ſerpyllum, ſal tritus cum aceto, amomum cum ocimo, althæę folia elixa, oleo pauco admixta, falſamentum quoduis adhibitum: heliotropium, quod & ſcorpiuron nominant: conyza, origanum, lilij folia, cyclaminus, panacis Aſclepij flores & folia Chironij: polium cum aceto, lauri folia ſicca, fici arboris lac inſtillatum, maluæ folia cocta ac etiamnum cruda, ſycamini folia, ſiſymbrium aut cardamine cum aceto, meliſſophyllon, verbaſcum cum aceto, chamædrys ſimiliter, cupreſſus à ieiuno quopiam commanducata & impoſita, mures domeſtici diſſecti & impoſiti, caſeus ſalſus applicitus, cochlea contrita cum ſua teſta, ſtellio confeſtim diſſectus & impoſitus, ſulphur viuum reſina exceptum terebinthina & impoſitum, gentianæ radix ſimiliter: gramen tritum & impoſitum protinùs auxiliatur: iuuat & ipſe ſcorpius tritus & illitus, lacertus campeſtris diſſectus & impoſitus, ſonchi radix cum braſſicæ ſucco, ſycomori liquor. Fouetur & affecta pars aqua marina feruefacta: quin & eadem calenti oleo immittitur.

Ad ſcolopendras & muris araneí morſus hæc pro cataplaſmate adhibentur: ſal cum pice, cedria & melle: allium cum ficus foliis & cumino, calaminthæ folia, hordeum vſtum cum aceto: allium cum tenellis ficus ſurculis & foliis, farina etui

μελανθίου < ά. μελισσόφυλλον, καὶ ὁ χυλὸς αὐτοῦ. σόγχος ἐσθιόμενος. μύρτα χλωρά. μυρίκης καρποῦ < ά. πηγάνου σπέρμα. πολύγονον, καὶ ὁ χυλός, τερεβίνθου καρπός, δαφνίδες λᾶαι. σκορπίουρον. καρδάμωμον. ἀναγαλλίδος χυλός. σκόροδα ἐσθιόμενα ὅτι ψυχικὰ ὑποφέροντα. σκορπίων πεσόντος, ἢ ὑοσκυάμου ἀπὸ χῆς, ἢ ἀπὸ πορείας μετὰ οἴνου, ἁρμοζῇ πίδι, καὶ αὐτὸς ὁ σκορπίος ὀπτὸς βρωθεὶς. ἀσβόλη ἀπὸ τῆς καπνοδόχης μετ' οἴνου πινομένη.

Aldi ὑόσπαρτος legerim ἢ πεπὶ ὑοσκυάμου ἀπὸ χῆς, ἢ ἀπὸ πορείας μετὰ ὑοσκυάμου ἀπὸ χῆς, & ſed hyoſcyami vox mihi ſuſpecta eſt. Geſn.

CXXII. Καλὰ πλάσματα ἡ ἁρμὸζῃ σκορπιοπλήκτοις, καὶ μελισσῶν καὶ σφηκῶν, καὶ φαλαγγίων πληγαῖς ταῦτα. βοὸς κόπρος καλὰ πλαθεὶς ἔρπυλλον. ἅλες λεῖοι σὺν ὄξει. ἄμωμον μετὰ ὠκίμου. ἀλθαίας φύλλα ἑφθὰ μετ' ἐλαίου ὀλίγου μυρσίνου. πάσχης πᾶς καλὰ πλασσόμενος. ἡλιοτρόπιον, ὃ καὶ σκορπίουρον καλοῦσιν. κονύζα. ὀρίγανον. κρίνου φύλλα. κυκλάμινος. πανάκους ἀσκληπιαδίου ἄνθη, καὶ τὰ φύλλα χλωρά. πόλιον σὺν ὄξει. δάφνης φύλλα ξηρά. ὀπὸς συκῆς ὀπὸς ζορδός. μολόχης φύλλα ἑφθὰ καὶ ὠμά. συκαμίνου φύλλα. σισύμβριον, ἢ καρδαμίνη σὺν ὄξει. μελισσόφυλλον, φλόμος σὺν ὄξει. χαμαίδρυος ὁμοίως. κυπάρισσος μασηθεῖσα ὑπ' ἀνθρώπου νήστεως, καὶ ἐπιτεθεῖσα. μῦες οἰκόσιτοι ἁναμαθέντες ἢ ἐπιτεθέντες. μύες ἅλμῃ ἐσχεδὸς καλὰ πλασσόμενος. τυρὸς ἁλμυρὸς καλὰ πλασσόμενος. κοχλίας λεῖος σὺν ὀστράκῳ. ἀσκαλαβώτης τὰ σπλάγχνα ἁναμαθεὶς ἢ ἐπιτεθείς. θεῖον ἄπυρον ἁναληφθὲν ῥητίνῃ τερμινθίνῃ καὶ ἐπιτεθέν. γεντιανῆς ῥίζα ὁμοίως. ἄγρωστις πτίσα ἐπιτεθεῖσα πολὺ χρῆμα παύει. πτὶς καὶ αὐτὸς ὁ σκορπίος λεῖος ἐπιτριβεὶς καὶ ἐπιτεθείς. σαῦρος ἀγροτικὸς ἁναμαθεὶς ἢ ἐπιτεθείς. σογχου ῥίζα σὺν κράμβης χυλῷ. συκαμίνου ὀπός. Καταντλήσει ὁ ὠφελίμως θαλάσσῃ ζεστῇ· καὶ εἰς θέρμον ὕδωρ ἁλμυρὸν ὁ πεπληγὼς τὸπος καθιέσθω.

Liber 5 cap 22. cum lumbricine. Plin lib 32. cum ſemine lini, oleo & aceto.

Ἀσκάλαβος ſcarabeus.

CXXIII. Πρὸς σκολοπένδρας ἐ μυγαλῆς δίγματα καταπλάσσειν ἅλες σὺν πίσσῃ ἐ κεδρίᾳ ἐ μέλιτι. σκόροδον μετὰ συκῆς φύλλων καὶ κυμίνου. καλαμίνθης φύλλα. χριθὴ κεκαυμένη σὺν ὄξει. σκόροδον καὶ ἀρέμωνες συκῆς καὶ φύλλα, μετ' ὄρο-

οἴνου ἀλθόμενον καὶ οἴνου. πρὸς δὲ τοὺς μυ- A
γαλέους, αὐτὴ ἡ μυγαλὴ παχέως τεθεῖσα
σὺν οἴνῳ καὶ πολεῖσα. πίνεται δὲ κοπὲν πρὸς
ἀμφότερα, ἀψίνθιον σὺν οἴνῳ. ὑδυόσμου ἀ-
πόζεμα σὺν οἴνῳ· δράκοντίου ῥίζαν λέοντει-
ον σὺν μέλιτι καὶ οἴνου ἢ ἐλαίου, ποτίζει δὲ ὑγιέ-
σι μετ' ἀθρμοπυρείας ξυμμίσας ἐπιπλάσαι, καὶ ἰᾶται.

CXXIIII. Πρὸς δὲ πυγόνος θαλασ-
σίας πληγὴν καταπλάσσειν ὠφελίμως,
φακὸς μετὰ μέλιτος λεῖος.

CXXV. Πρὸς δὲ δράκοντος θαλασσίου
πληγὴν, αὐτὸς ὁ δράκων ἀναπυρθεὶς ἐπι-
τιθείς· καὶ ὁ ἐγκέφαλος αὐτοῦ πινόμενος,
καὶ τῇ πληγῇ ἔτι ἀνθρώπινον καταπλασθέν. ἕρπυλλον καταπλασθέν.

CXXVI. Σκορπίου θαλασσίου πλη-
γὴν ἰᾶται, θεῖον ἄπυρον σὺν ὄξει ἀναπελόμενον. ἢ τέγλα ἀναχριθῆσα, καὶ ἐπιτι-
θεῖσα. δαφνίδες τρὶς πινόμεναι.

CXXVII. Ἀσπαλακώπου δῆγμα ἰᾶται, σήσαμον.

CXXVIII. Διώκει δὲ τὰ θηρία ὑποσ-
τρωτύμενα, ἀζόστινος, ἄγνος, ἔχιον, καλα-
μίνθη, κόνυζα, ὀρίγανον, ἕρπυλλον, πόλιον, ἀσ-
φόδελος. θυμιώμενα δὲ· ἄγνου φύλλα, ἀσ-
φάλτου, βδέλλιον, ἐλάφου κέρας, καλα-
μίνθη, καρδάμωμον, χαλβάνη, κασίαν, κό-
νυζα. κυπαρίσσου, ἢ κέδρου ῥίσματα. γα-
γάτης λίθος. λυσιμάχιος. μελάνθιον. πευκέ-
δανον. σαγαπηνὸν. πόλιον.

CXXIX. Κτείνει δὲ θηρία παρατιθέντα,
χαλβάνη σὺν σπονδυλίῳ καὶ ἐλαίῳ. καρκί-
νοι ποθέντες σὺν ὀξυμέλιτι, καὶ παρατεθέντες,
σκορπίους κτείνουσι. λυχνὶς ἀγρία παρατι-
θεῖσα, σκορπίους σκληρίζει. σαφυλίνου ἀγρίου
σπέρμα παρατεθέν.

CXXX. Συληρόμενα δὲ, κωλύει θηρία
παραπλῆσαι, καὶ διώκει· ἀλθαίας καρπὸς μετὰ
ἐλαίου καὶ ὄξους. δαφνίδες σὺν ἐλαίῳ καὶ ὄ-
ξει. χαλβάνη, ἢ κεδρίδες σὺν ἐλαφείᾳ μυε-
λῷ, ἢ στέατι. πάνακος ἀσκληπιάδου καρ-
πὸς καὶ ἄνθη σὺν ἐλαίῳ καὶ ὄξει. μαλόχης
φύλλα λεῖα σὺν ἐλαίῳ ἀλφιτώμενος, ἄν-
θρηνος ἐκτὸς στρηθῇ καὶ μελιτωθῇ δρα-
χμῆ. πεῖσα καὶ κόμπτα ὑπὸ τῆς θαλάτ-
της σὺν ἐλαίῳ συληρόμενα.

ac vino. Priuatim verò ad muris a- A
ranei morsus facit, mus ipse ara-
neus statim cõtritus in vino & po-
tus. Communiter verò ad vtriusq;
morsus hæc bibuntur: abſinthium
cum vino, mentæ decoctum cum
vino: dracunculi radix trita cum vi-
no & oleo etiá propinatur. Pix ve-
rò liquida cum feruenti cinere sub-
acta & illita sanat. B

Ad pastinacæ marinæ ictum vti-
liter imponitur, lens cum melle
contrita.

Ad marini draconis ictum, draco
ipse diuulsus & impositus iuuat,
necnon & cerebrum eius epotum;
vulnus quoq; ipsum vrina humana
fouetur: imponitur & serpyllum.

Vulneri ex marini scorpionis i- C
ctu medetur, sulphur viuum cum
aceto cõtritum, aut mullus in lon-
gitudinem fissus & impositus. Tres
quoque lauri baccæ bibuntur.

Stellionis morsui sesamum me-
detur.

Serpentes exteráſque venena- D
tas bestias substrata fugant hæc:
abrotonum, vitex, echium, cala-
minthia, conyza, origanum, serpyl-
lum, polium, asphodelus. Suffitu
verò hęc: viticis folia, bitumẽ, bdel-
lium, cornu ceruinum, calamintha,
cardamomum, galbanum, casto-
rium, conyza, cupressi vel cedri ra-
menta, gagates lapis, lysimachia,
melanthium, peucedanum, saga-
penum, polium.

Admota verò hęc venenatas be- E
stias interimunt; galbanum cum
spondylio & oleo, cancri cum ocimo poti, itémque appositi scorpio-
nes necant. Lychnis syluestris ap-
posita scorpios tantum non exani-
mat. Facit & syluestris pastinacæ
semen appositum.

Illita verò hæc venenatas bestias
arcent ac etiamnum abigunt, al-
thææ semen cum oleo & aceto,
lauri baccæ cum oleo & aceto, gal-
banum & cedri baccæ cum cerui
medulla aut adipe, panacis Asscle-
pii semen & flores cum oleo & [la-
serpitij] liquore. Malvæ foliis tritis
ex oleo siquis perungatur, à vespis
& apibus minimè ferietur: ab iis-
dem etiam tuentur erucæ quæ in
oleribus nascuntur, ex oleo inun-
ctæ.

A serpentium morsibus præstantia.

A serpentium morsibus tutos hæc præstant atque præmuniunt: genitalis ficci è ceruo masculo drachma è vino pota, echij radix præbibita, pastinacæ erraticæ semen deuoratum. Dratunculi radicis succo si quis manus inunxerit, tutò ac citra offensionem viperas apprehendet, vti & qui peucedani liquore corpus vniuersum perunxerit.

A CXXXI. Ἀδήκτους ἡ ἀπὸ τῶν ἑρπετῶν τηρεῖ, ἐλάφου ἄρρενος αἰδοίου ξηροῦ < α'. πινομένη σὺν οἴνῳ. ἐχίου ῥίζα ποθεῖσα. σὺν φυ- ασπιδῶν.
λίνου ἀγρίου σπέρμα βρωθέν. δρακοντίου ῥίζης χυλῷ ἁπτόμενος τις συγχείσῃ τὰς χεῖρας, ἄφοβος ἔσται ὁ τοιοῦτος ἀλύπως ἐχίδνας. ἢ πτυελοῦ ὑπὸ ἕλκους συλλεισθέν.

Fortè, καὶ ὑλαίφ. Gesn.

B CXXXII. Ἐνδύεται ἡ αἴσπαθη τοὺς σκορπίους καὶ θηρία· ἱστορεῖται ὠφελεῖν τοὺς σκορπιοπλήκτους, ἡλιοτρόπιον τὸ μεγάλου τὸ σκορπιεῖον ῥίζα τοῖς παιομένοις. Νεκροῖ ἡ σκορπίου ἀκόντιον τοῖς σαρκοῖν ἐμβὰν ἢ ἑλλέβορος λευκὸς· ἀκόνιτος λευκῆς σπέρμα τοῖς παιομένοις. Θηρία διώκει λίθος ὀφίτης τοῖς παιομένοις. Ἀπώνιος πολιὸς μυελὸς ἐλάφου τοῖς χειρίμβοις. Ὀξαλίδος ῥίζα τοῖς σεσηπόσιν, φιλεταιρείου ῥίζα πεπαιωμένοις, ὑπὸ σκορπίου κεκλυκὸς ὅλως τι πάσχειν.

4 de mat. med. παραλύει, resolvit, seu torpore afficit.

Amuleta quædam antipathia scorpios & venenatas bestias aduersantur.

Sunt & amuleta quæ scorpionibus venenatisque bestiis aduersantur: ac heliotropij quidem maioris, quod scorpiurum vocant, radix alligata, ictis a scorpione salutaris perhibetur. Scorpius admoto aconito quasi moriturus torpescit, idémque apposito helleboro albo velut ad vitam reuocatur. Valet & spinæ albæ semen è collo suspensum. Fugat & venenatas bestias ophites lapis adalligatus. Incolumes & inoffensos præstat, medulla cerui ina circumlita: oxalidis radix admota, itidémque philetærij radix adalligata, ne quis a scorpio lædatur nóxámvè sentiat, omnino prohibent.

in

CXXXIII. Κώνωπος ἡ σὺν ὄξει ὀρεσέρχαλος, συνεχόμενον ἀφιδιωτικοῦ ἐλαίῳ D θυμιώμενα ἡ, κόνυζα, κυπαρίσσου σφαῖρα, καὶ κόμη, καὶ πρίσματα βόλβιτον.

Culices arcentia & abigentia.

Culices aduolatu arcet, absinthium cum oleo inunctum. Idem præstant suffitu, conyza, cupressi pilulæ, coma, ipsáque ramenta: denique & bubulum stercus.

CXXXIIII. Βδέλλας ἡ πὸς προσφυομένας παιδομίοις, ἡ καταπότῳ ἐ τομάχῳ, ἀποβάλλει ἄλμη καὶ ἀρροφιδίου ὄξος. ὀπὸς σιλφίου, μετ' ὄξους αἰσαγαργαισθείς, ἢ καταῤῥοφήσας. ἢ βύτυρον καὶ ὄξος μίξας E καὶ πυρώσας σίδηρον, βάλλοι αὐτὸ εἰς αὐλόν, καὶ δὸς πιεῖν, καὶ ἐκβαλεῖ ἢ βδέλλα· ἢ ὀπὸ φύλλου. ἢ χαλκηδόνι σὺν ὄξει αἰσαγαργαισθέν. ἢ λευκοῦ κυπαρίσσου χεῖρον τρίψας καλῶς, ἐμφύσησον τῷ ἔχοντι βδέλλας αὐτὸ καὶ ἐξέλθουσιν. ἢ χυλὸς αἰσαγαλλίδος πιόμενος. ἢ ὄξος δεινὸν μετ' ὄμου λιθάσαντες πιεῖν σφ. ἢ νίτρῳ καὶ ἁλὶ σὺν ὕδατι αἰσαγαργαισθέντα σφ. ἐκβαλοῦσι δὲ ἐμβαλόντες εἰς ἔμβαμα, διδοῦς ὕδωρ ψυχρὸν λίαν ἐν τῷ στόματι ἔχειν κρατοῦν. ἐλθόντας γὰρ ὅτι ὃ ψυχρὸν ἐκπυρώσουσι. καὶ μετ' ὃ αἰσαγαργαίζεσθαι πιεῖν τὸ σφάγμιον, ἀφεῖναι πως ἐκ τοῦ ὕδατος ἰλιγγιῶντας. τοῖς γὰρ τοιούτοις ἐκπεσοῦσιν.

Fortè, σύνοπα. Locus vitiatus corruptus.

In Alexipharmacis sic habentur καὶ ἢ ἐν τῷ βοηχῷ σπογγιᾷ· deest autem verbum ἐκβαλεῖ.

Ad denouandas hirudines.

Hirudines tonsillis, gulæ & orij ventriculi adhærescentes excutiunt, absorpta muria, acetum: itémque laserpitij liquor ex aceto gargarizatus aut sorbitione haustus. Aliud: in aceto & butyro mixtis ferrum ignitum vbi extinxeris, ea propinato, & prodibit hirudo. Aliud: laserpitij semen aut atramentum sutorium cum aceto gargarizato. Aliud: alumen scissile probè tritum inspirato in os habentis hirudines; & exibunt. Prodest & anagallidis succus epotus, vel haustum acetum acre in quo thymum intritum sit, itémque nitrum cum sale ex aqua gargarizatum. Eum verò, cuius faucibus hirudines inhæserint, in aquæ calidæ solium demittito, eique frigidissimam aquam ore continendam exhibeto: sic enim calore offensæ, protinus ad frigidam prorepent. Post os itidem aliquo ex antedictis collutum, rictus hiatu aquæ limus apprehendatur: eius enim odore allectæ illæ prosilient.

ΑΛΕΞΙΦΑΡΜΑΚΑ.

CXXXV. Πρὸς τὰ θανάσιμα, χυμῶς ἁρμόζῃ ἔλαιον πινόμενον, ἢ βούτυρον χλιαρὸν, ὅταν ἔλαιον μὴ πάρῃ. ἐμέτου δὲ πινομένου. Ἀβρότονου ⊀ α'. κόνυζα μετ' οἴνου ℈ ς. φυλλίου σπέρματος. κέδρου φύλλων ⊀ β'. σὺν οἴνῳ καὶ προπινόμενα ᾖ, δυσαλώπητος πᾶσι λογχίτιδος τῆς πόας ἀπόζεμα, σὺν οἴνῳ. χελιδονίου λάσι ὁ αὐτῷ. μίλτου Λημνίας ⊀ α'. νάρδου Κελτικῆς ⊀ β'. νάρδινος σὺν ἐλαίῳ. ῥιζῶν τῆς ῥοδοδένδρου ℈ αἴθουσιλφίου ὀπός. ἱπποποτάμου ὄρχεις. ὀποπάνακος σὺν ἀριστολοχίᾳ. ἀσκληπιάδος καρπὸς καὶ ℈ αὐτῆς. ἐκ τῶν χειρωνίου ῥίζων τὰ τοιαῦτα σὺν οἴνῳ. πολίου ἀφέψημα τῆς ῥίζης. πάσσυκου ὀπὸς ἐκ ῥίζης, πίσσης ὑγρᾶς ἑκάστου ⊀ α'. σαγαπήνιον ὁμοίως. ἔχει καὶ προπινόμενον θρόμβοι πλῆσον πήχεως ἐμεῖν.

CXXXVI. Ἀνενέργητα πρὸς τὰ θανάσιμα προπινόμενα· βουνιάδος σπέρμα, κεφαλαμίνθη πενθρήν. κάρυα βασιλικὰ μετ' ἰσχάδων, καὶ πήγανου φύλλων προσεσθιόμενα, καὶ ὑποβρωθίζα σὺν πηγάνῳ καὶ ἐλαίῳ.

CXXXVII. Ἰδίως δὲ πρὸς ἀκόνιτον ἁρμόζῃ, ἀφέψου τὰ μείζονος αἴθουσα μετ' οἴνου. ὑποβάλσαμον μετὰ γάλακτος. ἄκρατος πολὺς σὺν ἀψινθίῳ. κινάμωμον σὺν οἴνῳ. πάνακος Ἀσκληπιοῦ καρπὸς ἐν αἴθουσα. πηγάνου ἀγρίου σπέρμα, ἢ βρωθὶς ἄκρατος πιθήκου, πτισάνη ἐλαφείου σὺν ὄξει, ἢ λαγῴου, ἢ ἐλάφου σπλήνου σπονδεία πεπυρωμένη, ἐν δὲ ὀξυμέλιτι σβεσθεῖσα. ἢ σπλὴν ὑείου πυρωθεὶς καὶ μέλιτι σβεσθείς. ξωμὸς βοὸς κυνὸς μετ' οἴνου ἐν ἀβρότονον. σκόροδα σὺν οἴνῳ. χαμελαία σὺν οἴνῳ. πήγανον ὁμοίως. συκῆς φύλλα λάσι. χαμαιπίτυος καλῶς πασσ. ὀρείγανος ἐλίπου. πολύκνημον σὺν οἴνῳ. ὄρνιθος καθαρθείσης συγχυλισθείσης ζωμὸς. κρέας λιπαρὸν ὁμοίως. ὑποβάλσαμον σὺν γάλακτι γυναικείῳ, ἢ ὕδατι. μορέας ῥίζα ἑψήσας σὺν οἴνῳ, μέτρας μέλι, δίδου. ἄργυρος καὶ χρυσὸς πεπυρωμένα,

Alexipharmaca, hoc est, venenorũ assumptorũ remedia.

Contra lethalia venena hæc in genere faciunt: oleum bibitum, aut, si id non sit in promptu, butyrum tepidum: sed qui biberit, reuomat oportet: abrotoni drachma, conyza cum vino & pastinacæ [erraticæ] semine: betonicæ foliorum drach. ij. ex vino: sed & eadem præsumpta, à venenorum noxa præmuniunt: lonchitidis herbæ decoctum è vino, citrea mala cum vino contrita, rubricæ Lemniæ drachma, nardi Celticæ drach. ij. ferulæ medulla, nerij, quod & rhododendron dicitur, flores, silphij liquor, hippopotami testiculus, opopanax cum aristolochia, panacis Asclepij semen & flores: Chironij vero, radices: & horum quidem singula cum vino: polij radicis decoctum, peucedani liquor & radix, pix liquida delincta, expressus marrubio succus cum vino: similiter & sagapenum, vrina putris calens, copiosè hausta vomitioneque reddita.

Lethalia venena irrita inefficaciáque reddunt hæc, siquidem in potu præsumantur: buniadis seu napi semen & calamintha. Sed & iuglandes cum caricis & rutæ foliis in cibo præsumptæ, aut etiam postea sumptæ cum ruta & oleo, eundem præbent effectum.

Priuatim verò aduersus hausturn aconitum conferunt, sedi maioris flores cum vino, opobalsamum cũ lacte, meracum copiosum cum absinthio, cinnamomum cum vino, panacis Asclepij semen & flores: rutæ agrestis semen, quo etiam postea sumpto venenum hoc inefficax redditur: coagulum hœdi aut leporis aut cerui, cum aceto: scoria ferri ignita in aceto mulso restincta, aut ferramentum excandefactum & melle restinctum, ius bubulum, lixiuium cum vino & abrotono, marrubium cũ vino, chamelæa cum vino, ruta similiter, ficus folia contrita: chamæpitys egregiè iuuat: origanum onitis, polycnemũ cũ vino, gallinæ ius sicca discocta vt simul etiã omnis ex ea succus resoluatur, ius carnis pinguis similiter, opobalsamũ cũ lacte muliebri aut aqua: mori radix cum vino cocta & melle admixto adhibita: argẽtum & aurũ ignita, extincta

extincta melle: liquor * papaueris cum aceti fæce illitus. Sumpti autem aconiti signa sunt hæc: corpus contremiscit, subsultat, intumescit hiescítque.

Contra mel Ponticum.

Mel quod in Heraclea Ponti prouenit qui assumpsêre, insani fiunt. Remedio sunt mulsum præstans, & esitata rutæ folia: quoties autem mulsum euomuerint, iis toties denuò exhibeatur. Cæterùm eorum, qui mel huiusmodi comederint, stercus si sues canésve gustarint, eodem etiam mali genere afficiuntur.

Contra toxicum.

Toxico aduersantur: sanguis hirci, capræ, hœdi, anatis & canis, è vino: rapi satiui semen potum, galbanum cum vino & myrrha, vinum passum, quercus cortex cum lacte vaccino similiter, fagi aut ilicis folia, aut radicis succus cum vino copioso potus, malorum agrestium fructus esitatus, struthia mala similiter, mala cotonea trita in aqua cum pulegio, oleum rosaceum, aut irinum, amomum, carpobalsamum cum vino.

Ad venena quæ tela gladiósve illinunt.

Iis qui venenato telo gladióve icti sunt conuenit, laserpitij liquor è vino potus, itidémque vulneribus impositus cum decocto aliquo calfaciente.

Ad ixiam.

Contra potum ixiam, qui idem est cum nigro chamæleone, auxiliantur: absinthium tritum cum aceto, castoreum cum aceto, merata cum largius cum absinthio, acetum mulsum, acetum cum agrestis rutæ semine, silphij radix, tragoriganí decoctum, resina terebinthina aut pinea, nuces iuglandes, aut ipsius arboris germina, nardus cum castoreo, & silphij obolus cum vino, tragoriganum cum lacte. Nec desunt qui etiam thapsiæ succum epotum iuuare asserant.

Contra ficutæ venenum.

Hausto cicutæ veneno resistunt, oleum irinum aut absinthites largius cum vino bibitum, cardamomum similiter, cinnamomi drachma cum vino, meri potio, acetum calens, oleum amaracinum, rutæ agrestis semen, styrax cum vino, piper cum vrticæ semine ac vino, silphij liquor cum oleo & passo.

A σκεδάσται μέλιτι. ὁπόσοι μάκωνος ὀπὸν * σφέλιξι ὄξους χρίσι. σημεῖα δὲ ἀκονίτου, τρέμει τὸ σῶμα καὶ ἅλλεται, καὶ ἐξανίσται, καὶ πελιοῦται. * Forte, σφέλιγι.

XXXVIII. Μέλι τὸ ἐν Ἡρακλείᾳ τῇ Ποντικῇ γινόμενον βρωθὲν, μανίας τοὺς βοηθοῦντας ἢ οἰνόμελιτι καλῷ, καὶ παλαιῷ B ἐκθέλουσι. ὁπόσα δὲ αὖ ἐξεμέσωσι, τοσούτῳ φερέσθωσαν τὸ οἰνόμελι, τῷ ἀφόδου δὲ τῶν φαγόντων τὸ μέλι σῦες, ἢ κύνες φαγόντες, ὅ αὐτὸ πάσχουσι. Idem fere.

CXXXIX. Πρὸς δὲ τὸ τοξικὸν ποιεῖ· αἷμα τράγου καὶ αἰγὸς καὶ ἐρίφου, ἢ νάσσης, καὶ κυνὸς ἐν οἴνῳ. γαλβανίδες ἡμέρου σπέρμα πινόμενον· χαλβάνη σὺν οἴνῳ καὶ σμύρνῃ. C γλυκεῖ. δρυὸς φλοιὸς, μετὰ βοείου γάλακτος ὁμοίως. καὶ φηγοῦ ἢ ῥαΐνου φύλλα, ἢ ῥίζης χυλὸς (σὺν) οἴνῳ πολλῷ πολυωθείς. μήλων ἀγρίων καρπὸς ἐκθλόμενος. στρουθία μῆλα ὁμοίως. κυδώνια λεάσας ἐν ὕδατι σὺν γλήχωνι, δίδου. ἢ ῥόδινον, ἢ ἴρινον, ἢ ἄμωμον, ἢ βαλσάμου καρπὸν σὺν οἴνῳ. In Alexipharm. D

CXL. Πρὸς τὸν πεπλῆχθαι τὸ βέλος φαρμακωθέντος· εἰς τὰ τραύματα δὲ ἐπιτήδειόν ἐστι τὸ ξίφος φάρμακα, θερμόζῃ ὁπὸς σιλφίου πινόμενος μετ' οἴνου, καὶ ἐπιτηδείως τοῖς τραύμασι μετὰ τίνος τῶν θερμαινόντων ἐποξεμάτων. Inferendum videtur, τραύμασι.

CXLI. Ἰξίου δὴ, τὸ μέλανος χαμαιλέοντος λεγομένου, πολίου, βοηθεῖ· ἀψίθιον θριμμὸν μετὰ ὄξους. καστόριον σὺν ὄξει. ἄκρατος E οἶνος πολὺς σὺν ἀψιθίῳ. ὀξύμελι. ὄξος αὐτὸ πηγάνου ἀγρίου ἐπίρριμα. σιλφίου ῥίζα, παρθενικαίνου ἐπόξεμα. ῥητίνη τερμινθίνη, ἢ πιτυΐνη. κέρυα βασιλικὰ, ἢ τῶν καρύων οἱ βλαστοί. καρδαμώμου μετὰ καστορίου. καὶ σιλφίου ὀβολὸς μετ' οἴνου. παρθενίζουσι σὺν γάλακτι. ὅσοι δὲ φασι καὶ θαψίας χυλὸν πινόμενον ὠφελεῖν. 3. de mat. med. c. 26. cũ vino. Nicander, cum mulso. Cum Dioc. 3. de mat. med. cap. 21.

CXLII. Πρὸς δὲ τοὺς κώνειον πεπωκότας, ἔλαιον ἴρινον, ἢ * ἀψίθινον σὺν οἴνῳ πινόμενον· πολὺ. καρδάμωμον ὁμοίως. κιννάμωμον < ἀ. σὺν οἴνῳ. ἀκρατόποσία. ὄξος θερμόν. ἔλαιον ἀμάρακινον. πηγάνου ἀγρίου ἐπίρριμα. τύραξ σὺν οἴνῳ. πίπερι σὺν ἀψίθιον. Gelen. * vmf. Gesn.

κρίθης ἐπίρριμα καὶ οἴνῳ. ὁπὸς σιλφίου σὺν ἐλαίῳ καὶ γλυκεῖ.

CXLIII. Κορίῳ ἢ πολίῳ ὠφελεῖ, ἴ- A
ρινον ἔλαιον, καὶ οἶνος ἄκρατος σὺν ἀψινθίῳ,
ἢ ἄλφιτα ὠμὰ σὺν θαλάσσῃ, χιὼν σὺν
γλυκεῖ.

Contra potum coriandri.

CXLIIII. Σμίλακες ἢ πολίπτας, οὓς
ἔνιοι θυμαλλοὺς καλοῦσι, Ῥωμαῖοι δὲ ταξον,
δοτέον οἶνον πολύν. καὶ ὄξος, καὶ ὅσα τοῖς κώ-
νειον πεπωκόσιν ἁρμόζει, παραπλήσιον καὶ B
ὅτι τούτοις.

σίμακα.

Contra venenum taxi.

CXLV. Τοῖς δὲ ψύλλιον πεπωκόσιν ἁρ-
μόζει τὰ βοηθήματα, ἃ καὶ τοῖς κορίου παρα-
σεσήμασμένοις.

Contra potum psyllium.

CXLVI. Τοῖς δὲ φαρικὸν πεῦσιν, ἄκρατος πολὺς ἁρμόζει, σὺν ἀψινθίῳ, ἢ κιννάμωμον. γλυκὺς πολύς. νάρδος Κιλικία σὺν C
οἴνῳ. ἴρεως ἀγρία ὁμοίως. πήγανον σὺν χρι-
θίνῃ ἀλθύρῳ καὶ ὄξει.

Contra pharicum.

μέλικρατον ἰσχνόν.

CXLVII. Πρὸς δὲ μήκωνιον, ἔλαιον
σὺν ὕδατι. ἅλες σὺν ὀξυμέλιτι. γλυκὺς,
μέλι θερμανθὲν σὺν ῥοδίνῳ· ἄκρατος πολὺς
σὺν ἀψινθίῳ· ἢ κιννάμωμον σὺν μέλιτι. ὄ-
ξος θερμόν. ὀρίγανον σὺν χυλίᾳ καὶ γλυκεῖ. D
πηγάνου ἀγρίου σπέρμα. ῥοδίνον, ἴριον. ἢ
κόπρος ἔρχης λεῖος σὺν ὄξει, ἢ σὺν ὀξυμέ-
λιτι.

ἐξέμασι σὺν ἀλὶ πυρρῷ, ἢ μίλτῳ σὺν ῥοδίνῳ θερμῷ. Dioſc. in Alexiph.

σὺν ἀψινθίῳ ἢ κιννάμωμῳ, in Alexipharm.

Ἰρινον, legit Geſn.

Contra opium vel meconium.

CXLVIII. Ἐφημέρου δὲ πολίπτας, ὃ
καὶ Κολχικὸν καλοῦσιν, ὠφελεῖ καστανίων ὄ
σων τοὺς λέπυρους σὺν οἴνῳ. πολύποδος τὸ ἀπόζεμα.
ἐρίγανον σὺν χυλίᾳ. πολυγόνου χυλὸς καὶ B
ῥίζα σὺν γάλακτι γλυκεῖ. δρυὸς ἢ φηγοῦ ἢ
πρίνου φύλλα λειώσας, δίδου σὺν γάλακτι.
ἀμπέλου, ἢ βάτου χυλόν, ἢ καυλοὺς λείους
σὺν ὕδατι. καὶ νάρδηκος ἐντεινῶν μετ' οἴ-
νου. ἢ ἔρπυλλον μετ' οἴνου, ἢ μύρτων καρ-
πόν, ἢ ῥοιᾶς λέπη ἀποβρέξας εἰς οἶνον. γάλα
βόειον βουλεῖ, ὥστε αὐτὸ τοῦτο πιόντα τινὰ F
ζῆν τὸ γάλα, ἄλλου βοηθήματος οὐ χρείαν.

πολυπόδιον forte. Geſn.

Succum Polygoni cum vino ſimpliciter deſiderat Dioſc. in Alexiph. cap. 5.

Cum lacte, in Alexiph.

Contra dorycnium.

CXLIX. Δορυκνίου δὲ πολίπτας, γάλα.
γλυκὺ. ἔλαιον. εἰς ὄρνιθος σπλὴν καθεφθεὶς,
λέπυρον πολύν, καὶ ὁ ζωμός. ἐχῖνοι, κόγχοι, ἢ πορ-
φύραι, καὶ γραφίδες, πῖνες, χτένες, κήρυκες,
ὠμὰ καὶ ἑφθὰ ἐσθιόμενα.

γλυκεῖ οἶνος χλιαρῷ, καὶ ὄρ. Geſn.

κήρυκα, κίνας.

Contra ſolanum furioſum.

CL. Σπύχου δὲ μανικοῦ πολίπτας, ἁρ-
μόζει μυίκρατον, ἀμυγδάλας πικρὰς ἐσθιό-
μενα. ἄνισον πινόμενον, ζωμὸς λιπαρὸς, καὶ
ἄλλα τινὰ λίπος ἔχοντα χλιερὰ πινόμενα.

Coriandro poto aduerſantur, irinum oleum, merum cum abſinthio, polenta cruda cum aqua marina, nix cum paſſo.

Contra venenum taxi, quam Græci ſmilacem, nonnulli thymalon appellant, vinum copioſum dari oportet, itémque acerum & quæcunque conuenire diximus iis qui cicutam hauſerunt.

Aduerſus epotum pſyllium, eadem quæ hauſto coriandro remedia auxiliantur.

Contra pharicum potum conueniunt: meracum largius cum abſinthio aut cinnamomo, paſſum copioſum, nardus Ciliſſa cum vino, iris ſyluestris ſimiliter, ruta cum hordeacea farina & aceto.

Epoto papaueris liquore ſuccurrunt hæc: oleum cum aqua, ſal cum oxymelite, paſſum, mel calfactum cum roſaceo, merum copioſum cum abſinthio, cinnamomum cum melle, acetum calens, origanum cum lixiuia & paſſo, rutæ agreſtis ſemen, roſaceum, irinum, fimum gallinaceum tritum cum aceto aut oxymelite.

Contra potum ephemeron, quod etiam Colchicum appellant, auxiliantur hæc: interna caſtanearum tunicula cum vino, polypodij decoctum, origanum cum lixiuio, polygoni ſuccus & radix cum lacte dulci: quercus aut fagi, aut ilicis folia trita cum lacte, vitis aut rubi ſuccus, vel caulículi triti cum aqua, ferulæ medulla cum vino, ſerpyllum cum vinó, myrti fructus aut Punici cortices in aceto macerati. Quin & lactis vaccini potus vſque adeò eſt efficax, vt ſi quis illud quamprimùm ſumpſerit, non ſit aliud deſideraturus auxilium.

Contra dorycnium ſuccurrunt, lac, paſſum tepidum, gallinacei pectuſculi elixi triti ſuccus hauſtus, ipſúmque ius epotum: echini denique, conchæ, purpuræ, ſquillæ, pinnæ, pectines, buccina, ſeu cruda ſeu elixa comedantur.

Hauſto ſolano furioſo conueniunt, aqua mulſa, amygdalæ amaræ eſitatæ, aniſum potum, ius pingue, & alia quædam pinguia tepida in potu ſumpta.

Ad hyoſcyamum. Aduerſus hyoſcyamum, lac, aqua mulſa cum lacte aſinino, merum bibitum & vomitione redditum, amaracinum vnguentum, fœnumgræcum cum oleo, vrticæ ſemina cum vino aut folia, naſturtium, ſinapi, cichorium, raphanus. Cogendi porrò ad quietem qui hoc veneno potionati ſunt, quemadmodum qui vinum biberunt, vt ipſum exco quant. Hiſce porrò ſignis ſeſe prodit qui hyoſcyamum aſſumpſerit: plurimùm delirat, flagris cædi ſibi videtur his accedunt vehemens circa hypochondria dolor, virium exolutio & cruéta mictio.

Ad cantharidas. Ad cantharidas potas hæc ſunt auxilio: oleum cum aqua, irinum & roſaceum, lac: alę ac pedes ipſarum cantharidum è paſſo poti, vti quidam aſſerunt, dantur pro antidoto. Iuuát & oleum melinum, ruta cum irino, & ſemen quoque, ius ex adipe cerui ſumptum, pulegium cum aqua; eſitatum lini ſemen, quicum adeps caprina vel ouilla aut anſeris caro cocta fuerit: lac iniectum clyſtere, vitium tenelli palmites triti cum paſſo & potui dati, ſcorpioides cum melle, Samiæ terræ drachma cum ſapa.

Aduerſus bupreſtin. Iis qui bupreſtin aſſumpſerint, oleum tepidum exhibeto, caricas tritas & in vino coctas propinato, aut lac cum palmulis contritis. Iuuant & pyra ſyluestria ſicca multa cum vino trita, lac bubulum recés, itémque vrina muliebris pota & vomitione reddita.

Contra pityocampen. Cõtra hauſtas pinorũ erucas cõueniũt, lac dulce, oleũ melinũ & irinũ.

Ad ſalamandram. Hauſta ſalamandra auxiliantur, lac dulce cum aqua, reſina cum melle, chamæpityos in aqua decoctum cum nucleis pineis, vrticę ſemẽ aut folia cum hordeacea farina & oleo cocta: teſtudinis marinæ ſanguis & galbanum ſimul probè cocta ſumptáque, ranæ cum eryngij radice coctæ & in cibo ſumptæ.

Ad lepum marinum. Hauſto lepore marino ſunt auxilio hæc: lac muliebre vel aſininum potum, cedria è paſſo aut vino, cedri baccę comeſtę, cyclamini radix cum vino, maluæ caulis cum radice, ellebori nigri aut ſcammoniæ drachma, mala Punica vinoſa comeſta, eorúmq; nuclei. Qui hoc ve-

A CLII. Πρὸς δὲ ὑοσκύαμον, γάλα, μελίκρατον σὺν γάλακτι ὀνείῳ. ἄκρατον πῖσαι, ἐμεῖν. ἄμαρακίνου μύρου. τῶλις σὺν ἐλαίῳ. κρίδης σπέρμα σὺν οἴνῳ, ἢ τὰ φύλλα. καρδάμου, νάπυ χλωρά. ῥάφανος. ἡσυχάζειν δὲ νάπυ κριθῆναι. εἰ τὸν οἶνον πιοῦσαι ἐκοιμήθησαν. Alleg.

B δεῖ αὐτοὺς ἀναλήβειν, ἵνα ὥσπερ ⊗ οἶνον ἐκπίασιν. σημεῖα δὲ τούτου, μέγα καθελληρῆ, ὀδύνει μάστιγα σῶ δὲ καθαρῶν, μέγας αὐλιῶ, ὑποχόνδρια πόνος. ἰσχύος ἀπόλυσις, αἵματος οὔρησις.

CLIII. Καυθαρίδων δὲ πολισῶν, ἔαν λῇ ἔλαιον σὺν ὕδατι, καὶ ἴρινον, καὶ ῥόδινον γάλα. φασὶ δέ τινες, ὅτι τὰ πλευρὰ καὶ οἱ πόδες τῶν καυθαρίδων πινόμενα σὺν γλυκεῖ, αὐτὰ

C φάρμακόν ἐστι. ποιεῖ δὲ καὶ μήλινον ἔλαιον, πήγανον μετ' ἴρινου, καὶ τὸ σπέρμα. ἐλάφου σὺν τῆς πιμελῆς ζωμὸς λαμβανόμενος. γλίχων σὺν ὕδατι. λινόσπερμα, συγκαθεψόμενος αἰγὸς πιμελῇ, ἢ προβάτου, ἢ χηνὸς σάρκα, ἐσθιόμενον. ἔγκλυσις δὲ γάλα. καὶ ἀμπέλου καυλὸς θλασθεὶς σὺν γλυκεῖ δίδου. σκορπιοειδὲς σὺν μέλιτι. Σαμίας γῆς ἀ. μετὰ σταφίδος.

D CLIIII. Βυσπήστεως δὲ ληφθείσης, δίδου ἔλαιον χλιαρόν. ἰχάδας θλάσας καὶ ἑψήσας οἴνῳ, δίδου πιεῖν. ἢ γάλα σὺν φοίνιξι λείοις. ἀχράδας ξηρὰς πολλὰς σὺν οἴνῳ λείας. γάλα βόειον πιεῖν. ἔλαιον χλιαρόν. ὕδωρ γυναικεῖον θερμόζεσι πινόμενον καὶ ἐξεμοῦμενον. ista redundant.

E CLIIII. Πιτυοκάμπτης δὲ ληφθείσης, ἁρμόζει γάλα γλυκύ. μήλινον ἔλαιον καὶ ἴρινον.

CLV. Σαλαμάνδρας δὲ πολίσης βοηθεῖ, γάλα γλυκὺ σὺν ὕδατι, ῥητίνη σὺν μέλιτι. χαμαιπίτυος σὺν ἑψηθεῖσα τρίβολοι σὺν ὕδατι. κρίδης σπέρμα, ἢ φύλλα σὺν

F κριθίνῳ ἀλεύρῳ καὶ ἐλαίῳ ἑψήσας, δίδου. χαλκάνθου καὶ χαλκίτεως θαλασσίας αἷμα, συνεψηθέντα καλῶς καὶ λαμβανόμενα. βάτραχοι μετὰ ῥίζης ἠρυγγίου ἑψηθέντες, καὶ λαμβανόμενοι. cocti. In the marginal notes decocto pinei auricel simul streruntur. in Alexiph. ex ibis. σὺν κρίμνῳ, hoc eſt, ſorbo reſſiore, ſimpliciter Dioſc. in Alex. itemque Nicander. In Alexiph. ius ranarum ita coctarum exhibetur.

CLVI. Λαγῶὸ δὲ πολίντος βοηθεῖ. πόλιν γυναικὸς γάλα, ἢ ὄνου. κεδρία σὺν γλυκεῖ, ἢ οἴνῳ. κεδρίδες ἐκθλιμμέναι. κυκλαμίνου ῥίζα σὺν οἴνῳ. μελόχης τὸν καυλὸν σὺν τῇ ῥίζῃ. ἑλλεβόρου μέλανος, ἢ σκαμμωνίας ἀ. ῥοιαὶ ἐκθλιμμέναι οἰνώδεις, καὶ οἱ πυρῆνες.

οὐδὲν δὲ τῶν ἰχθύων ὑπομένουσι προσφέρεσθαι, εἰ μὴ καρχίνους ποταμίους· ᾧ τούτοις μόνοις πέπονται. λεκάνιον ὕδατος ἐὰν δύνασθαι σωθῆναι αὐτοὺς, ἐὰν ἰχθῦς ἡδέως προσενέγκωσιν. ἁρμόζει δὲ καὶ ἑλλέβορος λευκός. ἀναβλητέον ἐπ' αὐτῷ τοὺς ἐμοῦντας. βοηθεῖ δὲ καὶ ἀρχῇ ὕδωρ ἀνθρώπινον πολὺν καὶ ἐξεραλῆν. καὶ χηνὸς αἷμα πρασχεῖμα πινόμενον. Ὁ λαγωὸν θηλάσης πεπωκώς, ἐμεῖ πυκνά, καὶ χρώματα πολύδαπά. οἱονεὶ γὰρ σαπρόν τι φαγών, ἀναπτύει. τούτῳ χυμὸς καὶ ὄργης ἅμα ἅμα δὸς πιεῖν.

Ista quæ non suo habebantur loco post caput 111 huc reiecere vitium est.

ἀμπύος.

Cesn suspicatur legendum, ἢ ἄμυγμα, aut languorem.

CLVII. Πρὸς ὃ φρῦνον καὶ τὸ καφὸν βάτραχον βοηθεῖ· χελώνης θαλασσίας, ἢ χερσαίας αἷμα ξηρὸν μεθ' οἴνου. δαμασωνίου ῥίζης τροφάλου σὺν ὄξει ≺ ά. ξηρᾶς ὃ ≺ Ϛ'. ποιοῦσι δὲ ἄκρατος πολὺς πινόμενος καὶ ἐξεμούμενος. καλάμου ῥίζα σὺν οἴνῳ. κύπειρος σὺν οἴνῳ. δίψας ὃ καὶ περιπάτοις, ἢ δρόμοις χρώμενος, καὶ λύει ἐν πυριατηρίοις. ἰδίως δὲ τροφὸς φρυῶν, βάτραχος ἑφθὸς, ἢ ὀπὸς προσφερόμενος.

σὺν οἴνῳ, cum vino. Dioscor. lib. 3 de mat. med. cap. 169.

Forte, σμύα δέ.

CLVIII. Ἡ δὲ ταυρείου αἷματος, ἀφωνία, πνιγμὸς στομάχου, ὑπόχυσις καὶ δύνα ταυρείου αἵματος πολύτου, βοηθοῦσιν ὄλυνθοι σὺν ὄξει πολέντες. καὶ ἑαυτὸ ὄξος. πίνειν σὺν σιλφίῳ. πιτύα ἐρίφου, ἢ λαγωοῦ μεθ' οἴνου νίτρου ≺ ά. μεθ' οἴνου. κράμβης σπέρμα σὺν ὄξει. κονύζης φύλλα σὺν πεπέρει. ἢ βάτου χυλὸς σὺν ὄξει. καὶ φλεβοτομεῖν δεῖ. κοιλίαν τε κινεῖν. ἐμεῖσθαι δὲ φυλάττεσθαι ὡς βλαβερόν.

In Alexiph. σὺν ὀξυκράτῳ ποσίᾳ. νίτρον.

σὺν ὄξει, cum aceto, in Alexiph.

CLIX. Γάλακτος δὲ θρομβωθέντος, ὠφελίμως δίδοται γλυκὺς πολὺς. ὄξος χλιερόν. ἔλαιον σὺν ὄξει. ὀπὸς σιλφίου σὺν ὀξυκράτῳ, ἢ κονία. πιτύα λαγωοῦ, ἢ τεράς, ἢ ἐρίφου, ἢ ἀρνός, ἢ δορκάδος, ἢ βοδίου, ἢ μόσχου σὺν ὄξει. γλυκὺς σὺν ὄξει. ἡδύοσμον σὺν ὄξει. καὶ χοιλίδιον ὃ λύει. ἔνιοι δὲ ἡδύοσμον σὺν ὕδατι δίδασιν. ἀλυκὸν δὲ μηδὲν προσφέρειν. μᾶλλον γὰρ πήγνυται τὸ γάλα. ἀλλὰ σὺν ἁλῶν δεῖ· δι' ὃ δυσδιαπεπτότερον τὸ αἷμα τῶν.

Cesn δέον legendum suspicatur, vt sit: similium loco imperatum. Alioqui enim mentagra lium potius astringit, quam soluit. Forte, ἐπὶ δὲ τοῦτο δυσπ.

CLX. Πρὸς ὃ μύκητας ποιεῖ ἀλεξιφάρμακος ἄφοδος σὺν ὀξυκράτῳ. Ἀριστολοχίας ≺ ά. μετ' οἴνου. κληματίδος κονία, ἢ ὕδατος πεπεῖσα. καὶ συκάμινα ὃ τῶν

Contra rubetas & ranas mutæ venena.

Aduersus rubetæ & ranæ mutæ venena auxiliantur: testudinis marinæ aut terrestris sanguis exiccatus cū vino, damasonij radicis recētis cū aceto drachma, siccæ autem drachmæ duæ. Iuuat & meracū copia largiore potū ac vomitu reiectū, arūdinis radix cū vino, cyperus cū vino. Solicitādi etiā qui venena eiusmodi hauserint ad ambulationis aut cursus exercitia, itémq; lotiones crebras in caldariis cellis. Priuatim autē contra rubetā facit, rana elixa vel assa in cibo sumpta.

Cauere taurinū sanguinē hausturū.

Taurini sanguinis poti signa sūt, vocis interceptio, dolor stomachi, vrinæ retētio. Cōtra hoc venenum succurrūt, grossi ex aceto poti, acetū per se, nitrum cū laserpitio, coagulū hœdi aut leporis cū vino, nitri drachma cū vino, brassicę semē cum aceto, conyzæ folia cū pipere, rubi succus cum aceto. Tundenda etiam vena, ciendáque aluus: at vomitus, tanquam noxij, vitandi.

Ad Lac inuet. coagulatum.

Cōtra lac in grumos cōcretū vtiliter exhibētur, passum copiosum, acetum tepidū, grossi cum aceto, liquor silphij cum posca aut lixiuio: coagulū leporis, aut hinnuli, aut hœdi, aut agni, aut capreæ, aut bubali, aut vituli cū aceto, passum cū aceto, mēta cū aceto. Sed & soluēda est aluus. Sūt qui mētā cū vrina exhibeant. Salsi porro nihil offerēdum, quoniā lac magis coiret ac dēsaretur; at neq; his vomitus conuenit. Cæterū huic veneno ægriùs quàm taurino sanguini poto succurritur.

Adusta fimo gallinaceo.

Contra fungos hæc auxiliantur: fimum gallinaceum cum posca, aristolochiæ drachma cum vino, lixiuium à sarmentis vitium aut pyrastro arbore potum. Ipsi quoque pyrastri fructus

ac folia ſi cum fungis decoquantur, horum ſtrangulādi vim auferūt. Iuuat & abſinthiū cū aceto, mel delinctū vel in aqua potū, apiaſtrū cū nitro aut lixiuio, ſal cū aceto, pyra ſyluestria elitata, amaracinū potū, meracū hauſtū, panacis Aſclepij radix & ſemē, ruta cū aceto, fæx vini vſta & cruda quoq; pota ex aqua, raphanus in cibo ſumptus: atramētum ſutorium cum aceto egregiè opitulatur: naſturtium aut ſinapi, radix tragacanthæ cum aceto.

Contra gypſi potum. Contra gypſi potū proficiunt: lac vomitu reddēdum, oleum ex aqua mulſa aut ficuū decocto, lixiuiū ficulneum cū vino, origanum cum lixiuio vel aceto, maluæ decoctum.

Contra lubargyri potum. Iis qui ſpumā argēti biberint ſuccurrūt hęc: meracum largius cū abſinthio propinatū, apij ſyluestris ſemen è vino, hypericum, hyſſopum cum vino, myrrhæ oboli duo, hormini ſemē, limonium & apium, fimus palūbin* cū nardo exhibitus.

Contra ceruſſam. Ceruſſa pota, proſunt hęc: oleum, aqua mulſa, ficuum decoctum cum oleo calēte, lac potū vomitionēq; redditū, groſſi cū aceto, maluę cum radicibus decoctū, amaracinū, irinum, ſeſamū tritū è vino, lixiuiū è ſarmētis vitium, Perſicorum nuclei cū oleo aut hordei decocto, gummi pruni arboris, humor qui in folliculis vlmi continetur. Cæterùm poſt vomitiones etiā thapſiæ ſucco aut ſcāmoniæ liquore vtēdum eſt.

Aduerſus hydrargyrum. Argento viuo poto, conueniunt: lac hauſtum aut vinum cum abſinthio vel apij ſemine, hyſſopus cum vino, ita tamen vt deinde reuomātur: prōſunt & quæ proximè contra ſpumam argenti præſcripſimus auxilia. Mirificè verò adiuuat globulus è lamella auri perexigua deuoratus: illi enim argentum viuum propter cognationem circunfunditur & adhæreſcit, ac ſimul etiam lubrico laptu per ſedem egeritur.

EPILOGVS.

Hæc ſunt, chariſſime Andromache, quæ tibi, de ſimplicium medicamentorum vſu experimentis cōprobato, duobus digeſta libris mittere viſum eſt,

FINIS.

A μύκησιν αἱ ἀχράδες, καὶ τὰ φύλλα, αἴρουσι δὲ πνιγώδεις αὐτῶν. ἀψίνθιον μετ' ὄξους. μέλι σὺν λιβανωτῷ καὶ πτισάνῃ σὺν ὕδατι. μυρσινόφυλλον σὺν νίτρῳ, ἢ κονίᾳ. ἢ ἄλες σὺν ὄξει. ἀχράδες ἐσθιόμεναι. ἀμαράκινον πτισάνῃ. ἄκρατος πτισάνης. πάνακες Ασκληπιὸν ῥίζα καὶ καρπός. πήγανον σὺν ὄξει, τεῦτλον οἴνου κεκαυμένη, καὶ ὠμὴ πτισάνῃ μὲν ὕδατος, ῥαφανὶς ἐσθιομένη. ἄκρως δὲ ποιεῖ ὁ τῆς *χαλκοῦ ἄνθος σὺν ὄξει. καρδαμώμη, νάπυ. τραγακάνθου ῥίζα σὺν ὄξει.

σὺν ὀξυμέλιτι, cū aceto mulſo, Dioſc. 5. de mat. med. cap. 116.

Gelſa. κάρδαμον ὁ κάππι legēdum ſuſpicatur.

CLXI. Γύψου δὲ πολίσις ποιεῖ γάλα, ἐμεῖται δὲ ἔλαιον σὺν μυρσινάτῳ, ἢ σύκων ἀφεψήματι. κονία συκίνη σὺν οἴνῳ. ὀρίγανον σὺν κονίᾳ ἢ ὄξει. μολόχης ἔμπλασμα.

C

CLXII. Πρὸς δὲ τοὺς λιθάργυρον πιόντας ποιεῖ, ἄκρατος πολὺς διδόμενος σὺν ἀψινθίῳ, *στέλινα ἀγρίου σπέρμα σὺν οἴνῳ. *ζαρικόν. ὕσσωπον σὺν οἴνῳ. σμύρνης ὀβ. ὁ. ὁρμίνου σπέρμα. λιβανωτόν, καὶ στέλινον. καὶ ἀγρίου τοῦ ἱερῶν κόπτουσι δοθῆσα μετὰ νάρδου.

στέλινον σπέρμα ſimpliciter in Alexipharm. In Alexiph. additur ἀγρίου, ſyluestris.

D CLXIII. Ψιμμυθίου δὲ πολίοντος, ἔλαιον, μυρσινάτον. σύκων ἀφέψημα σὺν ἐλαίῳ θερμῷ. γάλα, ἐμοῦσαι δὲ αὐτό. ὀλιγοῦσι σὺν ὄξει. μολόχης ἀφέψημα σὺν ταῖς ῥίζαις. ἀμαράκινον, ἴρινον. σήσαμον λεῖον μετ' οἴνου. κονία καπνώδης. *σέρσιον ὁσᾶ σὺν ἐλαίῳ. *κριθῶν ἀφέψημα. κύμινι κοκκυμήλων, τελείας τὸ ἐν

Πεφανῶν, in Alexiphar.

E ἰοῖς θυλακίοις ὑγρόν. χρῶνται δὲ μὴ πολλοὶ ἐμέτοις, ἢ θαψίας χυλῷ, ἢ σκαμμωνίας ὀπῷ.

CLXIIII. Ὑδραργύρῳ πολίσις ἁρμόζει γάλα πιόμενον, ἢ οἶνος σὺν ἀψινθίῳ, ἢ στέλινα σπέρματα. ἢ ὕσσωπον σὺν οἴνῳ. ἐμεῖται δ' αὐτό. καὶ τὰ πρὸς λιθάργυρον αἰσχρὰ μυῶν κόπρος. ἄκρως δὲ βοηθοῦνται χρυσοῦ ἐλάσματιον μικρόν τι καταπίνοντες. *σέρσιον, vnde σέρσινον.

F *σέρσιον δὲ τῷ χρυσῷ δεῖ συλλέγειν, καὶ συνολισθαίνειν διὰ τῆς ἕδρας.

EPILOGOS.

Ὅσα διὰ πείρας ἡμῖν, ὦ φίλτατε Ἀνδρόμαχε, τῶν ἁπλῶν φαρμάκων ἐν δυσὶ τόμοις συνέλεξάμην, ἐπεσταλκέναι σοι.

TELOS.

ISTA QVAE SEQVVNTVR, HINC INDE Dioſcoridis περὶ ὑποθέσεων contextui falsò aſcripta, in hunc locum reiecimus.

Πρὸς κεφαλαλγίας.

Hæc quæ in contextu Græco ad cap. 2 calcem legebantur, tanquã ſpuria Molybdus præterm.

Βοὸς πίσσης καὶ χορτοθείσης, ὃ δ' λείψανον πιὼν ἰαθήσεται. Ἄλλο. Ἀναγαλλίδος χυλὸν ἀμελάθμους, ὃ λέγεται καλλίτριχον, ἢ σεύτλου, ταῖς μυκτῆρσιν ἔμβαλε, καὶ τὰ ὑπὸ τῇ κεφαλῇ φλέγματα καθαίρει.

Cap. 41. μεθ' ὃ, ἐβένου ῥίζωμα σὺν οἴνῳ.

Hæc ſimachebis meminit Geſnero ſuſpecta eſt.

δρᾶς τὸ δίδυμον κείμενον εἰς τὸ ὕδωρ ἔτη ῥ. γίνεται ἔβενος. τὸ δὲ εἶδος αὐτοῦ, μέλαν.

Πρὸς ᾧ μὴ δύναιτο τις συγγενέσθαι μετὰ τῆς ἰδίας γυναικός.

Lapathi ſylueſtris virentis plenum manipulum coque in lacte bubulo, & propina cum vino, in quo priùs idem lapathum vna nocte macerauerit. Aliter: Pyrethri & galangæ, ana drach. iij. tere, & mitte cum zambacini olei vnc. iij. & in vitreo vaſe ſuſpende ad ſolem diebus xxx. Eo remedio laborantis vmbilicum & lumbos inunge, effectúmque miraberis.

Λαπάθου χλωρᾶς ἀγρίᾳ δράγμα ἓν πλῆρες ἓψε σὺν γάλακτι βοὸς, καὶ δὸς πιεῖν μετ' οἴνου, ἐπιβρίξας αὐτὸ πρῶτον εἰς τὸν οἶνον ἐν αὐτῷ μίαν. Ἄλλως. Πύρεθρον καὶ γαλάγγαν, ἀνὰ < γ'. τρίψας ἔλαιον μετὰ ζάμβακος ῆ. γ'. βαλὼν αὐτὸ εἰς ὑαλοῦν, καὶ κρέμασον εἰς ἥλιον ἡμέρας λ'. καὶ λαβὼν ἐξ αὐτοῦ, ἄλιφε ᾧ ὀμφαλὸν καὶ τὰς ψοιὰς τὸ παχέως, καὶ θαυμάσῃς.

Πρὸς δύσπνοιαν.

Hoc caput poſt lib. 2. 59. legebatur ſed tanquam illegitimum loco mouimus.

Φλεβοτόμησον τὴν ἀριστερᾶς χειρὸς μετ' ὄρμιον μετ' δι' ἡμέρας ζ'. πίνε πρὸ ἀντιδότου ἢ τ' Εὐπόριστον καὶ μετ' ἕτερας ζ'. ἡμέρας λαβ' ἐπὶ ἡμέρας ἐ. μετὰ ἀντίδοτον τ' δι' γ' τριπέπερον. καὶ μετ' ἕτερας ζ'. ἡμέρας τῆς καθάρσεως, φλεβοτόμησον αὐτοῦ πρὸ δεξιᾶς χειρός.

Hoc caput quod poſt 19. cap. lib. 2. locatum erat, tanquam nobis ſuſpectum, huc tranſferendum duximus.

Geſnerus forte contemplabitur hæc ſuperiora cum his quæ ſequuntur. Ex cruore ſanguine ſanabis.

Εἰς ἧπαρ καὶ σπλῆνα.

Εἰς δὲ δεξιὸν αὐτῶν τὸ ὑπερφρένιον φλέβα κόψας, ἐξερχόμενον δὲ αἷμα θαυμάσῃ· τὸ δὲ τὸν σπλῆνα πονῆς, τὸ ἀριστερὸν αὐτῶν.

Lege σπλῆνα hîc & in ſequentibus.

pag. 97 ὑποχονδρίου.

Hæc ad ſplenem pertinentia remedia quæ minus apte legebãtur cap. 65. tanquam ex parte ſuperſtitioſa &

Ἐνέγκας σπλῆνας βοὸς, χίσον αὐτὸ καὶ διάκαλλε ᾧ πάχος, καὶ πρὸς σπλῆνα τοῦ βοὸς κρέμασον εἰς τὸν καπνὸν, καὶ ζύσου

Ad capitis dolores.

A

RELIQVVM de aqua, è qua vacca ad ſaturitatem biberit, hauſtum ſanat. Aliud: Extractum ſuccum anagallidis (quæ Callitrichum dicitur) aut betæ: naribus immitte, & pituitam è capite proliciet.

Ad oculorum hebetudinem.

B

Quercus arbor in aqua deliteſcens annos centum, fit Ebenus. Eſt autem ei colos niger.

Ad eum qui cum propria vxore concumbere nequit.

Lapathi ſylueſtris virentis plenum manipulum coque in lacte bubulo, & propina cum vino, in C quo priùs idem lapathum vna nocte macerueris. Aliter: Pyrethri & galangæ, ana drach. iij. tere, & mitte cum zambacini olei vnc. iij. & in vitreo vaſe ſuſpende ad ſolem diebus xxx. Eo remedio laborantis vmbilicum & lumbos inunge, effectúmque miraberis.

Ad ſpirandi difficultatem.

D

De ſiniſtra ægri manu aquæ calenti poſt venæ apertionem indita ſanguinem detrahito. Poſt dies ſeptem bibat antidotum Diarrhodon aut Euporiſton. Poſt alios verò ſeptem dies, ſumat antidoton è tribus piperum generibus. Tandémque poſt alios ſeptem à purgatione dies, manus dextræ venam tundito. E

Ad hepatis & ſplenis affectus.

Laborante hepate venam quæ in ſumma dextræ auriculæ parte reperitur tundito, ita vt ſanguis emanet: ſplene verò laborante, ſiniſtræ auriculæ venam incidito.

F

Splenem bouis medium diffindito, & ægrotum per ipſum tranſmittito: tum ſplenem bubulum ad fumum ſuſpẽdito: hoc areſcente &

æger ipſe ſanabitur. Aliud: Splenem ouis feruentem ægri ſpleni imponito, & ferro igneo crucis formam deſuper imprimito: tùm aſſumptum ſplenem ad fumum ſuſpendito, & portulacæ ſucco cum roſaceo permixto ægrotantem inunge. Aliud: Myricæ fructum & radicem vbi contuderis, in vino vetere biduo macera, & inde ieiuno hauſtum vnum propinato: Hoc genus remedij probatum eſt.

Vt ne mulier ſcortetur, vir cum ea congreſſurus pudendo ſuo fel ſcari piſcis illinet: ſic enim rem cum alio non eſt habitura.

A ψυχομυΐου ὁ πάχων ὕλαίγ. Ἄλλο. λέβων καλλιῶας τοῦ βάτου, ξέουσαι ὀπίθες κατὰ τῆς τῆ αἰθιόπου. καὶ πυρώσας σίδηρῳ, ποίησον χαρὸν ἐπάνωθεν. καὶ εἶθ' οὕτως λαβὼν τὴν καλλιῶαν, κρέμασον εἰς τὸ καπνόν. καὶ αἱ δράχης χυλὸν μετὰ ῥοδίνου μίξας, ἄλιφε τὸν πάσχοντα. Ἄλλο. μυείκης καρπὸν καὶ τὴν ῥίζαν κόψας, βρέχε εἰς οἶνον παλαιὸν ἡμέρας β'. δίδου πίνειν νηστικῷ χρᾶσιν ἀ. δέκιμον.

Diosc. ſylo diſſentanea loco meritus.

pag. 107. Κιμωλίας φυσαλίδ.

Γῆς ὃ μὲν πορίζουσι γυναῖκα, χολῇ σκάρου τοῦ ἰχθύος καλύψας τὸ αἰδοῖον αὐτῆς ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, καὶ συγγενόμενος μετ' ἄλλου, καὶ οὐ μίγνυται μετ' ἄλλου.

Hæc cum minùs apte adiuncta cap. 99. & Dioſc. ſectioni minus conſentanea in hunc locum reiecimus. ἀλιφε

Ad horum librorum calcem Doctiſſ. Geſnerus varias adiecit tum oxymelitis, tum & aliorum medicamentorum præparationes, quas in exemplari manuſcripto reperit: quamuis minimè Dioſcoridis eſſe, & ipſa margini aſcripta cenſura & longè diuerſa dictio abundè teſtabantur. Eas nos, tum quia corruptæ deprauataque ſunt adeò, vt reſtitui vix vllo modo poſſint, tum quia partim ex Nicolao Myrepſo & Aëtio, partim etiam aliunde deprompta videbantur, hîc tranſcribere ſuperuacaneum duximus. Erant præterea nonnulla ad quoſdam particulares affectus non minùs mendoſa remedia, quædam etiam ſimplicium aliquot mangonia, quæ nos omnia conſultò prætermiſimus. Quòd ad illa verba attinet, tam ad captandos ſerpentes quàm ad eorundem morſus pronuntianda, ea non miror probitate inſigni virum D. Geſnerum ſua interpretatione indigna cenſuiſſe: quippe cùm ſint planè ſuperſtitioſa, imo potiùs Magica, adeóque Chriſtianis auribus δυσφόρητα. Quòd ſi quis tamen curioſiùs iſthæc additamenta deſideret, ea ex Dioſcoridis Βασιλείων editione Argentinenſi repetat, per me licet.

IANI ANTONII SARACENI LVgdunæi Scholia αἰτιολόγα in Dioscoridis ὑπομνήματα Librum priorem.

CAP. II. ἀμύγδαλα πικρά] Amygdalæ amaræ frustra hîc repetuntur, quoniam earum iam est facta mentio sub huiusce capitis initium, vsurpandarum itidem cum aceto & rosaceo.

CAP. VIII. πρὸς τοὺς συνεχῶς πταίοντας] His refragatur Aëtius, qui sub finem ser. 2. Tetr. 2. inter rationes sistendi sternutamenta, hanc ipsam etiam recenset, quæ sit venis ad magnos angulos sitis ab vtraque nasi parte compressis. Aristoteles etiam, vti patet ex Probl. sect. 33. perfricato oculo aut etiam naso desinere sternutamenta existimauit.

μυῶν δὲ πλησμοί] His repugnat Dioscor. 2. de mat. med. cap. 172. vbi de eodem ocimi semine agens, scribit in hæc verba: μυῶν δὲ πλησμοὶ πάντας ὀπτεσθέντες δ' ὑπερίσους, hoc est, assecta in aures attractum subinde sternutamenta mouet: quâquâ & reperiuntur vetusti codices, in quibus & eo loco ἀπὸ τῶ, ποιῶ, ποιῶν, legitur, id est, sedat. Vtrumque porrò verum esse potest pro varia humoris cerebro contenti, seu inquàm quieti, seu etiam agitati, dispositione: id quod etiam rectè Moibanus admonuit.

πρὸς ἰε. γ'] Malim, πρὸς ιε. Cùm enim epilepticos purgans remedium hîc proponatur, enici seu cartami facultas, quàm croci, cõuenientior videtur.

ὑπὸ φύλλου] Moibanus silphij semen vertit, & rectè: nam ὑπὸ φύλλου, quod huic eidem Authori cap. 89. huiusce libri, voce composita ὑποφύλλιον dicitur, laserpitij semen satis designat: siquidem & ὑπὸ Hippocrati interdum non silphij modò succum, sed ipsum quoque silphium seu laserpitium significat; & φύλλον, teste Gal. in glossis Hipp. etiam per se simpliciter effertur, pro ipsius laserpitij semine, quia instar folij latum sit.

CAP. XXVIII. ὑπὸ τῆς μαγίδος] Moibanus restituit, αἰγίδος. *Fuligo*, inquit, *quæ de populo nigra colligitur.* Gesnerus, καμίνου, legendum suspicatur, & *fornacum fuligine* interpretatur. Malui equidem, ne tantopere à manuscripti codicis lectione recederem, μαγείρου legere, vertique *aquariam fuligine.*

CAP. XLVI. ὕσσωπον πεπαμένον] Ad quid, quæso, hyssopum vstum? Malim ergo, σίσυμον. Nam & cæsypum ad genas callosas ciliorúmque defluuio laborantes commendat Dioscorides, 2. de mat. med. Sed is error, vt ὕσσωπος ἀντὶ τῦ σισύμου accipiatur, & hîc alibi & aliâs frequenter apud Medicos occurrit.

CAP. XLVII. ἡ ἀμυλίς] βλεφαρίξουσα vocat Paulus, quo loco idem curationis genus comprobat, quod tamen Aëtio minimè probatur.

CAP. LIII. Ἀναπεπόμενον δὲ] Suspicor legendum, αἰωρεῖσθαι δὲ, aut ἀναπεπόμενα δὲ, vel, αἰωρεῖσθαι δὲ ἐοῦσι, &c. Sic vbi legitur, χονδρίλλης ἢ κόμμι, restituo, ἢ χονδρίλλης κόμμι ἐοῦσης. Nam etsi quoduis gummi pilos fortasse glutinare valet, vti legitur apud Paulum & Oribasium, tamen vis ea peculiariter tribuitur à Dioscor. 2. de mat. med. cap. 161. ei gummi, quod circa ramulos chondrillæ mastiches simile reperiri asserit.

CAP. LVII. κρὸς δὲ τὰ τῶ λίπους, &c.] Hæc alioqui mendosissima sic emendat Moibanus, & τὰ λίπους ἀπὸ τῶ ἐλαίου, ὃς καλεῖται γλαῦξ, ἢ σκίουρος ἢ σπάρος λέγεται, hoc est, *& pinguedo gliris, quæ à nonnullis Logonicus & sciurus dicitur.* Malim: ὃς καλεῖται γλαῦξ Ῥωμαίοις, παρ' ἡμῖν ἢ μυοξὺς ὑπὸ λαγόπους λέγεται. Sed de gliris apud Græcos variis synonymis vide Hesychium, Suidam & Varinum. Est verò σπάρος, aliud animantis genus vmbram sibi cauda faciens, quod & Hesychius alio nomine σκιουρον, ab inflectenda cauda, seu σκιὰν οὐρᾶς, à caudæ magnitudine, dici asserit: quanquam & fortasis huius pinguedo æquè ac gliris ad iuuandos dolores accommodatur.

CAP. LIX. ἰσχνὸς εἰς ὄξος ἁλμυρὸν] Hæc ad finem vsque capitis quàm corruptissimè scripta sic emendat Moibanus: ἰσχνὸν εἰς ὄξος ἁλμυρὸν, ἢ κρεμμύου χλωροῦ, ἢ θρυμμάτων, ἢ θαλλὸς ἐστὶ μαλακὸς δὲ ἢ κατὰ τὸ ἔαρ, ὑποβαλὼν τὸ εἰς ὄξος θρυμμὸ μίσχε πολὺ αἰ'χμα, hoc est: *Aptum, cui infusum sit oleum & aparum succus, calfacta, idque per lanam spongiæ vnctuosum in aures instillato calens quamvtum sustines ager.* Malim verò sic: ἰσχνὸν εἰς ὄξος ἁλμυρὸν ἢ κρεμμύου χλωροῦ, ἢ θρυμμάτων, ἢ θαλλὸς ἐστὶ μαλακὸς δὲ ἢ κατὰ τὸ ἔαρ, ὑποβαλὼν τὸ εἰς ὄξος θρυμμὸ μίσχε πολὺ αἰ'χμα.

CAP. LXIX. μᾶλλον, ὑποφύλλου μικροῦ] Rectiùs fortasse, μᾶλλον σπέρμα μικροῦ, &c. aut ὑποφύλλου accipiendum pro laserpitij semine, quod etiam φύλλον iam antè monuimus simpliciter nominari ab Hippocrate, teste Gal. in Gloss. quia latum sit. Inferiùs verò, καὶ τὸ θαλλὸν ἢ φύλλον, rectiùs legas, καὶ θαλλὸν ἢ σπέρμα. Itidémque ad capitis calcem, pro ἀλειφόμενος, malim, ἀλειφόμενον.

CAP. LXXXVII. κύαθος ιβ'] Dosis hæc, ceu nimia, mihi non parum suspecta est.

CAP. LXXXVIII. πρὸς τοὺς ἐμοῦντας] fortè, πρὸς τοὺς δι, &c. De vomitum cientibus hîc nouum caput fecit Moibanus, id quod vti Gesnero, ita & mihi improbatur: quâuis & ex iis quæ sequuntur remediis nonnulla vomitum prouocant, quem in anginis interdum esse vtilem rectè monet Aëtius.

CAP. XCII. ἔχει δὲ] Moibanus, αἰτιᾶται δὲ, reponit. At malim ego, paucioribus immutatis literis, βρίζει restituere.

CAP. XCVI. καὶ ἐπάνω] Malim, ἐπάνω, vti etiam legendum censuimus, lib. 4. de mat. med. cap. 136. de adianto.

CAP. XCVIII. φρὶξ ὄξους] Aëtius, φρὶξ εἶτον ἁλμυρὸν, *fiet sane nouum.* Pro eo verò quod sequitur, μᾶζα χριτὴ & κατ' ἐλαίου, rectiùs legas, μετὰ χριτοῦ ἢ βαλανείου ἐλαίου. Sed & pro eo quod habetur, δι' ἅλης τυκτὸς, Plinius idem commemorans remedium, *ana nocte*, reddit: quod ipsum & Paulus &

Aëtius innuere videntur.

CAP. XCIX. καὶ ἀκακίας χύλισμα] Moibanus hîc redundare nonnulla existimat. Ego verò coniicio potiùs ita legendum, ἀκακίας χύλισμα ἢ ἀπὸ μυρσίνων ἢ φύλλων τῆς ἀκακίας, ἢ ἀπὸ τῶν πυτάρων αὐτῆς καὶ ῥιζῶν χυλὸς, &c. Nam & hæc duo succi Acaciæ genera memorantur apud Dioſc. lib. 1. de mat. med. cap. 133.

μυρσίνης οἴνου ἑψηθέν] Fortè vinum myrtinum intelligit Dioſcorides, quod è baccis in eo decoctis parabatur, vti videre est apud eundem, lib. 5. de mat. med. cap. 36.

κυνοσβάτου ῥίζαι] Moibanus, κυνόρρου, reſtituit: attamen malim, κυνοσπάστου, quoniam capparis radices σκώληκι τοὺς τριχῶν μαλάσσειν, ad denigrandos capillos, vſurpari à Medicis est in confesto.

τῆς ῥίζης ἀφεψήσεως] Malim, ἀφεψήσεις, κυνοσπαστάσεις, ſcilicet φαιάς: itémque pro, ἀφεψιζήθρου, ἀφεψιζήθρου, ſeu potiùs, ἀφεψιζήθρου.

CAP. CIII. ἄχρις οὗ ξηράνῃ] Moib. quouſque exudet. Scilicet illi ἐξιδρώσῃ, vel ἐξηράνῃ legere viſum est. Et certè quidem de eodem ad abolendos pilos remedio agens Dioſcor. lib. 4. cap. 189. illicò pòſt addit, cutem vbi exudauerit abſtergendam, deindéque recentem dryopterin imponendam. At huic loco, meo quidem iudicio, aptius conuenientiúſque fuerit, ſi legerimus, ξιφιάσωσα. Est enim ξιφιάζειν ſeu ξιφιδίζειν Heſychio, τὰς τρίχας ἐκβάλλειν. Siquidem ἴουλος, addit ille, ἡ ἐπὶ τοῖς τριχῶν ἢ τῶν ὑπηνίων, hoc est, pilorum radicem, aut quod è pilo extra cutem emunctum, ſignificat. Est etiam ipſi Suidæ, ἴουλος, λέγεται δὲ καὶ τὸ ἔντερον ἀπὸ τοῦ ὄρχεως ἐκφυόμενον τῇ τρίχᾳ, id est, primæ lanugo, aut, qui primi efflorescunt exoriuntúrque pili.

πολίου ἄλειφαρ] μαίου potiùs, quàm ἄλειφαρ, hîc legendum ſatis indicat quod ſequitur, χλόον ſine adiuncto: adde quòd vnguentum telinum, ſeu quod è fœnogræco paratur, ſcribit idem Author, 1. de mat. med. cap. 57. ὡς καλέσματα μήνιγγι, hoc est, medicamenta ad ſuci nimium inducendum commodè.

CAP. CXIII. ἰρινοῦν ἰείῳ] Irino vnguento reſtincta, vertit Moibanus. Sed rectiùs legas, ἰρινοῦν οἴνῳ ſimpliciter, aut, οἴνῳ χλόῃ, hoc est, mixto odorato. Sic Paulus lib. 3. cap. 36. ad hircoſa vitia alarum plumbaginem vrit, vinóque odorato reſtinguit. Adde quòd terra Chia vſta vnguento irino iniecto incenderetur potiùs, quàm reſtingueretur. Neque tamen illud, ἰείῳ, omittendum cenſeo: interiicienda modò diſtinctio. Nam & ipſum per ſe irinum vnguentum quidni, vt ozænarum graueolentiam, teſte Dioſc. 1. de ma. med. cap. 66. ita etiam hircoſum alarum fœtorem emendet?

CAP. CXVII. ἀφεῖναι ἄλειφαρ] Rectiùs fortaſſe legas, λύειναι μύρῳ, aut, σύντον μύρῳ. Nam & Dioſcor. lib. 1. de mat. med. cap. 162. de ſuſino ſeu liliaceo vnguento, ſic habet: μύλαντι ἢ ἔγχλῳ μαλάσσειν καὶ ὑγραίνειν αὐτῷ, id est, vibices quamprimùm emendat & reliquas cutis colores efficit. Sed & Orib. 3. ad Eunap. ad finem cap. 36. ſcribit, vibices colores ſtatim ſanare oleum liliaceum omninò inunctum.

CAP. CXVIII. ἀλφοὶ δὲ λεῦκαι καὶ λέπραι] Sunt qui ἀλφοὶ λεῦκαι & λέπραι pro eodem cutis vitio accipiunt: ſed hîc rectè manifestò diſtinguuntur. Siquidem ἀλφὸς λεύκη, ſeu vitiligo alba, ἀλφὸς ſimpliciter Celſo vulgóque Medicorum plerunque dicta, in cute potiſſimùm hæret: & λέπρα præterquàm quòd albida magis est, altiùs etiam deſcendit, carnémque ipſam occupat. Sed de his vide Gal. 3. de cauſis ſympt. & Celſum, lib. v. cap. vlt.

CAP. CXXIII. πάλιν ἀπὸ ὑγρᾶς] Sic legit Moibanus. Malim tamen, πάλιν ἀπὸ ὑγρᾶς, vel, πάλιν ἀπὸ ὑγρᾶς. Nam & ſuem marinam aquam conferre prurigini, vel ipſe teſtatur Dioſc. lib. de ma. med. v. cap. 19. At potò non est dubium quin, vti ſalſamenta omnia cateráque quæ praui ſunt ſuccí, pruritum excitet, nedum tollat: niſi fortè per accidens, dum, qua pollet vi cathartica, pruritum gignentes humores expurgat.

CAP. CXXX. ἴξῃ σὺν τρίχι] Τρίξ inter alia ἄκρον ſeu calcem ſignificat. Ideò verò calcem hoc loco potiùs, quàm lixiuium aut cinerem lixiuum vertere placuit, vti & Moibano, quòd & ipſe Dioſc. lib. 3. de ma. med. cap. 103. viſcum ſcribit vngues ſcabros efficaciùs auferre, addita calce: μιγὶς ἀσβέστου, inquit ille.

CAP. CXXXII. καλῶν ἰειχίρων] Contrà *erigeron* ſcribit Plinius, lib. 26. cap. vlt. *ex paſſo mammas uberiores facere.* Moibanus pro, ἰειχίρων, reponit, κύκνων, hoc est, cicutæ: & reverà quidem in cicutæ genere, quàm & ipſe Autor, lib. 3. de mat. med. cap. 79. aſſerit in virginibus mammarum incrementum inhibere, ibidem Cretica præfertur. Cicutam porrò ἄγριον quidem & ἀκαλήφην nonnullis σκοτεινὸν dici reperio inter notha Dioſc. at ἰειχίρων nuſquam. Verùm quia proximè ſequenti capite etiam κωνεῖον, hoc est, cicutæ, ſit mentio, cui eadem vis tribuitur, quæ modò citato cap. lib. 3. de mat. med. neceſſe fuerit, aut caput hoc tanquam ſupernacaneum περίττωμα, adeóque vna litura expungi, aut non de cicuta, ſed de altera quapiam herba fieri hoc loco mentionem. Ea verò quænam qualiſve ſit, mihi adhuc incompertum est: peritioribus aliis coniectandum relinquo.

CAP. CXXXVI. ἄλειφαρ κυμίνου] Aëtius, aut certè ipſius Interpres, Tetrab. 4. ſer. 4. cap. 35. legiſſe videtur, ἄλειφαρ κυμίνου, aut etiam, κύμινον ſimpliciter; rurſúmque, pro eo quod habetur, σκευάσια ὀσμὴν ἡδεῖαν, ὀσμὴν ἡδεῖαν, legiſſe comperitur. Attamen Oribaſius, 4. ad Eunap. cap. 82. ab hoc noſtro contextu nihil euariat.

αἱματὸς δὲ καὶ τυρῶν] Poſt commemorata alia ad lactis coagulationem auxilia, tale quid ſpecialiter de apio refert Aëtius, loco modò citato: Moibanus redundare hanc poſtremam periodum exiſtimat, vt qui vix vllum inter χυλιστήρας & πυρομυλίους μαλάσσοντας diſcrimen agnoſcat. Ego verò hanc ipſam periodum ad proximè ſequens caput potiùs pertinere iudico, quaſi hoc ſit illius initium: neque dubito quin deglutita cera æquè ad coagulationis curationem valeat, atque ad ipſius ἀγωγὴν λάκτος. Cùm enim, ex ſententia Galeni, circa principium lib. 4. de ſanit. tu. eadem ſit ratio mali quod imminet arcendi, & eius quod iam inuaſit depellendi, conſentaneum videtur, vt vno & eodem remedio lactis coagulatio & præcaueri & profligari poſsit. Cæterùm quæ & hoc capite & proximè ſequenti continentur ſi quis vnico capite complecteretur, rectè, nec id abs re, facturus videbitur.

CAP. CXL. γυναικὸς ἐκβολὴν] Hæc è cap. 135. cui

quidem minùs aptè congruebant, in hunc locum, ceu commodiorem, transferre visum est.

CAP. CLX. ἄχρις αὖ πυοῦνται] Ista lectio tolerari potest, ἄχρις αὖ πυοῦνται, *donec maturata fuerint*, nempe ozænæ. Tùm enim vlcera maturata dicuntur, cùm ad pus saniémque perducta sunt. Alioqui maluissem hoc loco legere, vti apud Gal. 3. καθ' ἵππ., cùm de ozæna & polypis agit, ἄχρις αὖ ὑπὸ ἐχενάδων, quasi continuanda sit illitio è Polyidæ trochiscis, qui ἐχενηΐδες nomine designantur, *donec ozænas persanaueris*: aut, ἄχρις αὖ ὑπὸ φιλλυρίδος ὑπουλωθῶσι, *donec vlcerum crustæ excidérint*.

CAP. CLXIII. ἴσχει δὲ καὶ φύλλα] Moibanus pro his restituit, ἴσχει δὲ καὶ τὰ φύλλα, quoniam Dioscorides, lib. 1. de mat. med. cap. 111. vlmi non tantùm corticem, sed & folia in eundem vsum commendat. Sed hic ego nihil immutãdum censeo. Nam vti citato loco dixerat Autor, vlmi corticem vulnera egregiè glutinare fasciæ loco circumuolutum, quia sit lori modo flexilis: ita hoc loco, eundem voluisse iudico vulneribus superuiligari fasciæ instar, quia sint coruçi vlmi tenues tunicæ, ceu etiam tiliæ, aut potiùs quia sint illi cortici tunicæ seu membranæ instar philyrarum. Philyræ enim seu philuræ etiam dicuntur tenuissimæ tunicæ, quæ inter tiliæ arboris corticem & lignum reperiuntur, quæque, quia facilè instar fasciarum obuoluuntur, pro fasciis vsurpari possunt. Sic nanque Plin. lib. 16. cap. 14. *Mirum tiliæ esse inter corticem & lignum tenues quasdam multiplici membranæ; quibus vincula tiliæ vocantur: tenuissimæ earum philyræ, coronarum lemniscis celebres, antiquorumque honore.* Porrò & ab harum similitudine, aliarum arborum ac etiamnum papyri membranæ, philyræ seu philuræ dicuntur.

CAP. CLXV. ὑποδρομίους] Moibanus emendat, ὑποδρομους: sed ego malim, ὑποδρομου ἰοειδους, scilicet ῥίζα. Nam & narcissi radicem potissimùm ad glutinanda vulnera commendat Dioscor. 4. de mat. med.

CAP. CLXVI. χελαινῆς ῥίζα] Moibanus restituendum censet, λευκακάνθης ῥίζα, hoc est, *leucacanthæ radix*: maximè cùm leucacantha eximiè siccet, ac remissè calfaciat, adeóque extrahendis ossibus infractis apta esse possit. Maluissem, ἐχενηΐδος ῥίζα, id est, *ozænæ spinæ radix*, quoniam ipsam quoque testatur, lib. 1. de mat. med. ca. 122. infixa corpori spicula & aculeos extrahere. Sed quoniam Plinius, lib. 34. cap. 12. scribit, *chalanthum ossa fracta extrahere cum semine hyoscyami*, facilius adducor vt credam, hic quoque legendum, χαλανθου σὺν ὑοσκυαμου σπέρματι.

CAP. CLXVIII. ῥίζα κυκλαμῖνος, &c.] Lego, κυκλαμίνου ῥίζα ἐψηθεῖσα, (seu ἐψηλαφηθεῖσα,) ἐλαίου σὺν μυρσίνῃ αὐτῇ ἐπιχριόμενος, hoc est, *cyclaminis radix, cui myrtea oleum cum ea myrtho sit*. Sic esse legendum constat ex Dioscor. de mat. med. lib. 2. cap. 194. vbi de cyclamini radice sic habetur, quanquam ibidem id remedium non ad ambusta, sed ad perniones commendatur: ἐψηλαφᾶται δὲ καὶ τρυφᾶται τῷ ἐλαίῳ, καὶ οὕτως ἐπὶ θερμασμοῖς. μετριάζουσι δὲ οἱνῳ καὶ κηρῷ Τυρρηνικῷ ἐλαίῳ, &c. quæ sic vertimus: *Ipsa quoque cyclamini radix exacuato oleo impletur, & cerei feruenti imponitur, addito interdum cera Tyrrhenica mollita*. Porrò ex illo ipso loco hunc quidem ceu mutilum restituendum esse monuit Moibanus: at quo modo esset restituendus, haud quaquam expressit.

CAP. CLXXIX. κυκλαμίνου ῥίζης] Malim, κυκλαμίνου ῥίζης ἀφέψημα, quia mori radix nusquam, quod sciam, ad perniones commendatur: at cyclamini radix tum à Dioscoride, loco modò citato, tum ab Aëtio, iiij. Tetrab. ser. 2. cap. 73. ad perniones sanandos expetitur: fuit verò facilis librarij lapsus.

CAP. CLXXXI. μύρτινον] Hanc periodũ ita legendam existimo: ἐπὶ μορῶν μὲν ἐλαίου μύρτινον, λέγω: alioqui nullus constabit sensus.

CAP. CXCIII. σὺν πολλῷ ὀπῷ] Moibanus, σὺν μετὰ; legendum suspicatur: Gesnerus non multò melius, σὺν κηρῷ: id est, *cum cera candela*, nisi fortè κηρῷ, hoc est, *cera*, ibidem legẽdum est. At ego, σὺν ὀπῷ, potiùs legẽdum esse crediderim, hoc est, *cum lana*, ita vt cinis ille foliorum hederaceorum in oleo tritus lana aut vellere excipiatur, anóque indatur.

CAP. CCI. μυρίνου φύλλα] Vix alibi, quod sciam, folia myricæ ad emarginandas gangrænas vsurpantur: at myrti folia in eum vsum commendantur à Paulo, lib. 4. cap. 19. quo loco inter alia gangrænæ remedia ex Oribasio recensẽt, μυρσίνου τε αὖ φύλλα λείῃ μελὶ μίσγειν, hoc est, *myrti folia mixta cum melle tritaque cum melle*. Iccircò & hoc loco σὺν τῷ μυρίνῃ, μυρσίνῃ, reponendum iudicaui.

CAP. CCX. αἱμάτων ἀναδόσεις.] Fateor tum à Dioscoride, tum & à Galeno vim Anthyllidi tribui glutinandorum sanandorúmque vulnerũ, adeóque sistendæ etiam hæmorrhagiæ illam nõ male accõmodari posse. Sed quæ loca citat Moibanus ex Paulo & Aëtio, non satisfaciunt. Nam vtrobique, in Aldinis saltem eorum Autorum exemplaribus, αἱμάτων potiùs, quàm αἱμορροΐδων legi reperio, nempe apud Paulum, lib. 4. cap. 53. & apud Aëtium, tetr. 2. serm. 2. cap. 94. Ergo nil vetat, quominùs quę hîc dicũtur, de arundinis propẽdẽte coma seu panicula interpretemur, & hãc lectionẽ, αἱμάτων ἀναδόσεις, retineamus: nisi malumus simul & semel pro iis vocibus, αἱμάτων ἐκκρίσεις, reponere. At fortasse vero similius est, id quod & ipse suspicatur Gesnerus, αἱμάτων nomẽ hîc à Dioscoride accipi pro phlei seu flœbes flore, quoniam & apud Theophr. αἷμα simpliciter & sine addito, florem eum significat. Nostram hanc confirmant sentẽtiam Dioscorides & Plinius, dum phleõ seu flœben (eiusdem enim sunt plantæ nomina) hæmorrhagiæ mederi scripto prodidẽre.

ἢ ὑπὸ τῆ λεύκῃ] Rectiùs, ἢ ὑπὸ τῆς λεύκης, vt is sit sensus, quem ego expressi. Sic & oui candidum ad sanguinis profluuia gypso admiscet Oribasius, 3. ad Eunap. cap. 36. & 7. ad Eustathium, c. 20. Itémq; Aëtius, 4. Tetr. ser. 2. cap. 51. sed illi prætereà desiderant tritici pollinem, qualis molendinorum parietibus adhæresci.

καὶ τῆς ἐλαίας] Haud dubiè tota hæc periodus obscura quidem est: attamen partim ab Aëtio, partim etiam ab ipso Paulo illustrari posse videtur. Ille enim, tetr. 2. ser. 2. cap. 94. inter remedia ad hæmorragiam è naribus, καὶ ἢ, inquit, καὶ ἐκ τῶν ἐλαίας καρπῶν ὄνυξ, *bonum*, inquàm, *est & unges arà aburare*: atque hîc quoque fortassis αἱ τῆ, ἐμπλασσόμενα, legẽdum, ἐμπλασσόμενα. Hic verò, lib. 2. cap. 58. de sistendo agens sanguinis profluuio,

quod febribus interdum superuenit, ἀναῖμ δι, inquit, καὶ τὸν πόδα ἐν ἄρδην ἰδρῶτα ἐπίχυσιν καὶ ὀλίγον αἱματῶδες. *Creditur & præputij deliquio peculiariter sanguinis profluuia cohibere.* Sed & secùndum hanc ipsa periodo propositum remedium, etsi depravatum ita est, vt quantumuis oculatissimus Gesnerus sensum nullũ elicere potuerit, illud ipsum esse coniicio, quod ego reddidi. Pro his enim καὶ τὸ ἐν ἀναιμίᾳ ἀναίμακτον αὐτοῦ, legendum suspicor, ἢ τὸ ἐν τῷ ἰνίῳ ἀναίμακτον αὐτοῦ: vel, quod magis placet, quia τὸ ἀναίμακτον, αὐτὴ ἡ ἀναίμακτος μεγαλόνευρ, nusquam alibi, quod sciam, reperitur, ἀναίμακτος αὐτῆς, aut καὶ τὸ ἐν τῷ ἰνίῳ ἀναίμακτον αὐτοῦ μέρος. Porrò & huius remedij meminit Aëtius, loco modò citato, vbi, καὶ ἀναίμακτον, inquit, τὸ ἐν τῷ ἰνίῳ σκέπασμα μετ' ὀλιγίστου, hoc est, *& carpitio exiguum adhibens cum sarcinatione.*

Cap. CCXIII. καὶ ἐπὶ τῆς ἐπιστάξεως] Moibanus: *eas obtinet nec finit euerti*, suspicatúrq; mendum aliquod subesse. Nos verò, *eas obtinet nec finit inuerti*, nihilque immutandum censemus. Siquidem illud ceu ratum certúmque ponimus, quæcunque hæmorrhoidas prouocant, easdem simul & semel extrahere atque euertere: alioqui & nos αἰεὶ τῶ, καὶ χειρ, lubenter ἀναστόμωσιν reposuissemus. At remedia quæ hoc loco proponuntur, ex mente Dioscoridis, præterquàm quòd illas extrahunt euertúntque, simul & semel cohibent ne intrò reuertantur. Ista porrò sic intelligenda satis supérque patet ex Aëtio, 4. Tetr. ser. 2. cap. 6. qui quidem cùm duplicem eo loco tradat hæmorrhoidum curationem, nempe tum eam quę manus opera & auxilio, tum & eam quæ medicamentis instituitur, neutram rectè commodéque perfici posse simul etiam admonet, quin priùs sedes ac ipsæ quoque hæmorrhoides extrahantur euertantúrve, euersáque cohibeantur, vt ne statim inuertãtur seu intrò vertantur. Hoc verò præstant ἀναστόμωσα dicta medicamenta: quo in numero cyclamini succum & alia id genus eo ipso loco recenset, quorum pleraque proculdubio ex 9. Galen. de comp. med. κατὰ γ. cap. 7. deprompsit.

Cap. CCXXVIII. καὶ δι' ὧν τῆς ἐδέρμεως] Ista prætermisit Moibanus, quoniam, vti fatetur, quid sibi vellent diuinare haud potuit. Ego probabili cõiectura ductus, quæ in hac periodo corrupta & depravata videbantur ita restitui, vt καὶ δι, ἢ γὰρ μάδου ἢ τῆς σκληρίας, ἢ γὰρ μάδου ἢ τῆς σκληρίας legerim, adeóque, nisi fallor, mentem Autoris sum assecutus. Enimuerò de Vitice & ipse Dioscorides 1. de mat. med. cap. 135. scribit in hũc modum: ἀναῖμ δι καὶ κωνώπειον ἢ ὁ ἐδέρμεως ἀφεψηθέντα, ὅπως μάδος αὐτὸς ἀφῇ χεῖρα κερατίζει: quod nostrũ vertimus: *Creditur & muscis virgæ inuertigines adstare, si eam manu, dum terit ficis, manu tenus.* Quin & Plinius lib. 24. ca. 9. *virgam* (agni inquit) *quibus manu habeant aut cinctu, negantur inuertigines sentire.* De artemisia verò etiam inter notha Dioscoridis hęc reperiuntur. ἀρτεμισίαν τινὲς βοτάνην εἶναί φασιν ἣν ἐὰν ἐν τῇ ὁδῷ, κἂν τὸν πόδα πονῇ, quę quidẽ Apuleius, cap. x. ita vertit: *Herbam artemisiam monachum si quis ser fasciem secum in manu portauerit, non sentiet itineris laborem.* Sed & Plinius, lib. 26. cap. 15. *Artemisiam*, inquit, *& oleisphacon alligatus qui habeat manu, negatur lassitudinem sentire.* Lassitudinem porrò non tantùm ex attritu neruosárũ partium, sed etiam ex membrorum interuigine & attritu calceamentorum in itineribus oriri, neminem esse credo, qui non aliquando sit expertus.

Cap. CCXXXVII. ῥάδιος καὶ πὶς φόμους] Plinius itidem, lib. 24. cap. 9. de Sparto agens, quod genitiua sit nécne dubitat: *Rami*, inquit, *similiter cum fronde in aceto macerati fucum dentifricijs imitantur, cyathi unius pars*, &c. At Dioscor. lib. 4. de mat. med. cap. 158. ramos seu virgas non quidem aceto, sed aqua macerat: præterea verò foliorum frondísve nullam facit mentionem: quippe qui eodem capite Sparto ῥάδιος tribuisset ἀφόμους, hoc est, *virgas sine folijs.*

Cap. CCXL. ἄλυδρον ἐψήσασα] Malim, ἐψᾶν, aut, legendum: πίσσινον καὶ κεδρινον ἄλυδρον, ἐψήσασα, &c. Sic inferiùs, pro, πολλοὶ δὲ διὰ τοῦτο, legendum videtur, πολλοὶ δὲ διὰ τοῦτο, aut subintelligendum σκῶμμα, ita vt quemadmodum sisymbrij, ita & colocynthidis semen hic recipiatur.

ῥαφανιτιδικὴ δὲ ἀγρία] Moibanus suspicatur legendum, σισυμβρίου. Sed sinapismi iam est facta mentio, proximè præcedenti capitè. Ego ῥαφανιτιδικὸν vocem libenter retineo. Est autem ῥαφανιτιδικὸς, θλῖψις illa seu percussio, quam τῶν ἀλφιτοπαλτικῶν λίθων, hoc est, *mancipiorum mangonibus*, vsitatam refert Gal. 14. Meth. cap. 16. quoties gracilem extenuatámve partem ἀλφιτόκοπον & pristino statui restituere nitebantur. Ita verò dicta huic Autori videtur, quia peream ῥαφάνου, hoc est *ferulæ* certo quodam modo partibus extenuatis incutiebantur.

ἐψωμένης, ἢ ὠμὸν ὄντος,] Vel legendum, ἐψωμένου ὠμοῦ ὄντος, vt sit idem cum eo quod alibi legitur apud Dioscor. ἄχρις ἡμίσους, *cocta*, inquã, *ad dimidias*: vel legendum, ἐψωμένου ὠμὸν ὄντος, vti etiam suspicatur Moibanus, ita vt subaudiamus μέρους. Hinc porrò constat mangonum dropacem alium fuisse à Medicorum dropace: ille enim, vt ex hoc ipso loco videre est, picis tam liquidæ quàm aridæ paribus constabat portionibus: hic verò etiam simplicissimus, vt magis minúsve compositos omittam, pice arida oleo paucissimo liquata, vti patet ex Aëtio, Tetrab. 1. ser. 3. cap. 180. Cæterùm sub finem capitis dictiones illæ, ὑπὸ δίκλωρα καὶ, proculdubiò redundant, adeóque videntur expungendæ, vel pro iis restituendum, καὶ ὡς σκῶμ, quasi, vt exiccentur hi trochiſci, in vmbra reponi debeant, vti etiam disertis verbis admonet Aëtius, 3. Tetr. ser. 4. cap. 4.

Cap. CCXLII. ἴσως δ'] Ista cùm nihil significent, legendum haud dubiè ἴσως δ', &c. Hoc porrò capite ischiadicos vrendi varios modos satis anxiè & obscurè prosequitur Autor, qui tamen tum ex lib. de mat. med. 2. cap. 98. tum ab Aëtio ex Anthyllo 3. Tetr. ser. 4. cap. 3. tum etiam à Cælio Aureliano 5. Chron. cap. 2. vtcunque illustrãtur. Nos hodie siue superficie tenus, siue altiùs locum quempiam actu adurere placet, ignita ferramenta, ceu longè efficaciora promptioráque, neque ita crudeliter egros excarnificantia, præferimus.

IN LIBRVM II.

Cap. III. κατὰ τὰ ἐμφύσεμα θέλει.] Pro eodem habet Paulus, lib. 3. cap. 37. ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς. Vertunt Interpretes, *in oculis*. Malim ego, *cum intenditur affectus*. Intenditur verò augetúrq; quando non tantùm ventriculus aut os ipsius, sed & intestina inflantur, malumque ipsum ita

cerebro communicatur, vt mens etiam ipsa de suo statu dimoueatur.

CAP. IX. ἀπὸ ἀλφίτου ἐπάλξεα] fortè, ἔπαλξα, *insperſa*, vti & cap. 3. lib. v. de mat. med. vbi de vinaceis sic legitur: ἐπαλξίζει δὲ καὶ ἀπὸ ἀλφίτου ἔπαλξα πᾶσιν, ἀμείζω διαπνεῖται, καὶ ἧττον ἰσχναίνει, δὲ μὴ ἐπάλξει ἀπὸ ἀλφίτου. quæ sic vertit Plin. lib. 23. cap. 1. *Nudis acinorum tosti tritique, stomacho vtiles sunt: insperguntur farina eorum polenta modo ponens dysenterias & coliacos, & dissolutis stomacho.*

CAP. X. ἐμβρέχειν δὲ] hoc capitulum, quod duodecimum legebatur, placuit cum decimo coniungere: quippe quod ab eo non nisi librarij culpa disiunctum videbatur. Sed & illum pleraque alia perperàm similiter disiunxisse, aut etiam transpoſuiſſe conſtat. Cæterùm pro, καὶ μᾶλλον, lubentiùs legerem, καὶ μᾶλλον ἀφυλλᾶναι: alioqui fomentum fuerit siccum, non item irrigatio seu perfusio, quam verbum illud, ἐμβρέχειν, haudquaquam dubiè designat.

CAP. XIII. ἡ καλὴ ἄλθινος] Lego, ἀκαλήφης ἀλθινῆς ῥίζα. hoc est, *spinæ albæ radix*. Nam & ipse Dioscor. 3. de mat. med. c. 14. spinæ albæ radicem potam stomachicis conferre prodidit. Moibanus καλὴ καὶ ἡ ἄλθινος, &c. legit, hoc est, *imò odorati flos, populi albæ radix*, &c. Suam coniecturam ex eo confirmat, quòd scripserit Autor, 1. de mat. med. cap. 16. iancum odoratum vim habere inflationes discutiendi, ac florem ipsum in potiones adhibitum vtilem esse ad oris ventriculi affectus. Sed hoc quantumuis ita sit, ad quid, quæso, illa populi albæ radix, quam quidem nusquàm, quòd sciam, auditum est à Medicis propinari solitam? Etsi fateor ipsius arboris corticem ac ipsa quoque folia dari posse potui, ad lentorum viscidorúmque humorum abstersionem, qui obstructiones faciunt.

ἐπιφορήματα ἀγαρικόν] Contrà, lib. 3. de materiâ med. cap. 1. stomachicis quidem agaricum commanducatum deuoratúmque conferre prodidit: sed ea tamen conditione addita, vt nullus deinde liquor superbibatur. Sunt enim hæc illo loco Authoris de agarico verba, quæ etiam hoc libro paucis immutatis, proximè sequenti capite, repetuntur: ἐπιφορήματα δὲ ἐστὶ θηριακοῖσιν ἢ τραγακανθίνοις, μανδύῃ ἐχεῖν ἐπιφορήματα.

CAP. XVIII. ῥίζῃσιν καὶ ὕδατι] Malim ex Aëtio, Tetr. 2. ser. 1. cap. 118. ῥίζῃσι καὶ μάλθῃ, ἢ καὶ ἰσχνῷ, hoc est, *rasuris cum malue, aut etiam per se.*

CAP. XXI. καὶ ἐὰν μὴ ἐσχάσῃ, &c.] Moibanus, ἐσχάσει, legit, & sequentes duas voces redundare putat. Malim equidem, καὶ ἐὰν μὴ ἐσχάσῃ φλεβοτομηθῇς λίτρῳ, καὶ ἰδρώσει πολύ. vel, καὶ ἐὰν μὴ ἐσχάσῃ φλεβοτομηθῇς λίτρῳ καὶ ἱδρώσει πολύ. Equidem si verbum verbo non reddidi, attamen Autoris mentem expressisse mihi videor.

CAP. XXV. μεγάλαι δὲ ὀσμαὶ] Quanuis lassitudines, ἀσθένειαι, sudores ἱδρῶτες, & affectio cardiaca, symptomata sunt, quorum alia febres antecedunt, alia easdem comitantur aut subsequuntur, attamen locis cõmodioribus reponi poterant.

Κομανικὸς λίθος] Moibanus Comanicum lapidem, ni fallor, à Comania regione Asiæ, in qua fortasse is reperitur, sic dictum, vnum & eundem esse cum Gagate suspicatur. Neque dubito quin, cùm lapis is e bitumine liquido nigro gignatur, vbicunque bitumen eiusmodi reperitur, ipse etiam reperiri possit. Hinc que adeò præter illa cognomina & alia sortitus est, vti Samothracij ab Insula Samothrace, Thracij à fluuio Thracio Ponto dicto, itémq; Obsidiani ab Obsidio, qui primus in Æthiopia eum inuenisse fertur. Vtut sit, Gagatem lapidem acopis misceri Dioscorides scripto prodidit, lib. v. de mat. medic. cap. 146.

CAP. XXXI. μανδραγόρου ῥίζα μαν.] Malim, μανδραλίου. Nam de Caucalide tale nihil proditur à Dioscoride & Galeno, in simplicibus. Sed de Cacalia seu Cancano sic Dioscor. lib. 4. de mat. med. cap. 123. *Radix in mero macerata, an tragacantha, & delecta commanducatione per se, stillæ & aruinæ salubritatem medetur.* Eadem totidem verbis à Gal. 7. simpl. itémque ab Aëtio repetuntur.

καρυωτὰ βοτάνης] Moibanus pro voce, καρυωτὰ, καρίνοις, hoc est, *nucis*, vel κάρυος, hoc est, *nucatus*, reponendum censuit. Ego καρυωτὰς vocem retineo. Nam & Dioscor. lib. 1. de mat. med. cap. de Palma 148. *Caryotæ seu caryondes*, inquit, *si cum mero deuorentur, sanguinis asperitatem mederentur.*

καὶ ἐπὶ ὀπισθότονον τῆς βοτάνης] Legendum, ὀπισθότονοι, καὶ τὰ, ὀπισθότονος. hoc est, *cum morbum augeruntur tussis, vrgente tussi.* Sic legimus apud Paulum, lib. 3. cap. 37. dum de ventriculi inflatione agit, ἐν τοῖς ὀπισθότονοι, quod minùs rectè interpretes verterũt, *in conuulsionibus*, vti iam antè monuimus.

CAP. XXXV. ἀγαλλόχου ῥίζα] ἀγαλλοῦ, legisse videtur Moibanus. Sed & de agallochi radice Dioscor. 1. de mat. med. cap. 21. *Ea quos lateris dolor excruciat, bibita ex aqua opitulatur.*

CAP. XLVII. Ἡρακλεώτης] fortè, Ἡρακλεώτου, aut, Ἡρακλεωτικῆς, aut etiam Ἡρακλείας, vti cap. 33. lib. 4. de mat. med.

ἐλάτης μυροψικῆς] Ad differentiam abietis, quæ est in arborum genere, Palmæ inuolucrum, quod alio nomine σπάθη dicitur, hoc loco ἐλάτη μυροψικὴ cognominatur, quòd vnguentarij eo ad vnguentorum spissamenta vterentur, vti scripsit idem Dioscor. lib. 1. de mat. med. cap. 150. *nos elatem unguentariam vertimus.*

ἐκτὸς μετ' οἴνου] Malim, πρὸς μετ' οἴνου, *ad cum vino*, aut, πρὸς μετ' οἴνου, *ad cum vino*. Si quidé Ceram in sorbitiones addi dysentericis scribit Dioscorides, lib. 2. de mat. med. cap. 105. Gallas verò, lib. 1. c. 146. dysentericis etiã ex aqua aut vino bibitas conuenire. Nam quòd ad iridem spectat, mihi saltem nostrâs, æque ac doctiss. Gesnero, in dysenteriis curandis suspecta est. Florentia verò, quatenus, vel ipso Gal. teste variis in locis, vlcera citra morsum abstergit, exiccat & carne explet, non omnino spernenda videtur.

CAP. XLIX. πρὸς γλαύκιον φύλλα] Hoc loco videtur Autor plantaginem ex oleo & aceto coctam desiderare. Sed quando bis hoc eodem capite remedium idem è plantagine repetitur, his verbis, πρὸς γλαύκιον ἐλαίῳ, vel πρὸς ταῦτα ea verba dicendum est, vel plantaginem aliter paratam expeti. Et certè quidem priore loco videtur Autor eam coctam sumi velle cum oleo & aceto: posteriore verò, cum aceto tantùm. At lib. 2. de mat. med. c. 153. cum sale & aceto sumptam dysentericis & cœliacis subuenire tradidit: nisi fortè eo loco καὶ ἐν ἁλὶ καὶ ἄλατι, *cum sale*, legendum, καὶ ἐλαίῳ, vti ego suspicor, hoc est, *cum oleo.*

καὶ ὄγχνα δὲ ὀπτὰ σταφιδίνα] Fatilè crediderim tum

doctiſſ. Geſnero legendum hoc loco, ὀξυμελίσαι, quippe cùm galla trita rectiùs vino inſpergatur, quàm illinatur. Quin & 1. de mat. med. cap. 146. de Galla, vbi legitur: ἀμύζουσι δὲ καὶ αἱμοπτοϊκοῖς καὶ δυσεντερικοῖς ὀξυμελιζόμεναι οἶνῳ καὶ ὕδατι πίνειν, ἢ πτισάνῃ αἴθῃ τῇ ὀξυμελιζομένῃ, fateor legendum ὀξυμελιζόμεναι, adeóque Latinam meam verſionem ſic reſtituendam: *Tritæ cœliacis & dyſentericis aquæ aut vino inſperſæ ac bibitæ conueniunt.*

Cap. lii. κυάμου Ἑλληνικοῦ τὸ λεπτόν] κυάμου Ἑλληνικοῦ σὺν τῷ λέπει &c. reſtituit Geſnerus. Ego malim, κυάμου Ἑλληνικοῦ τὸ λέπος, *fabæ Græcæ corticis*: aut citra immutationem, κυάμου Ἑλληνικοῦ τὸ λεπτόν, exponendum *fabæ Græcæ minoris*: ſiquidem pro terrarum diuerſitate varióque cultu fabæ aliæ maiores, aliæ minores reperiuntur. Neque verò de faba Græca Plinij, quę reuera Loti arboris fructus eſt, ſed de faba communi, quam Græci Græcam ad AEgyptię differentiam cognominauerunt, hæc, & quæcunque alibi de faba Græca referuntur, accipienda ſunt.

Cap. lvi. ἀλεχεσιλόου τὸ σπέρμα καὶ τῆς χλωρίδος] Hæc videntur à librario quopiam, ſicut & pleraque alia, malè tranſcripta. Enimuerò Autor, cap. 53. lib. 4. de mat. med. ſcribit in hunc modum, de lichene qui petris innaſcitur: σύμφυτοι δὲ καὶ ἐπιπεφυκυῖαι μᾶλλον ἀλεχεσίλοφοι. σύμφυτος δὲ καὶ τῆς χλωρίδος βλαστάνουσι παραπλησίως, hoc eſt, *Innat & adnatæ cum melle peruncti: oris autem ac linguæ defluxionibus ſuccurrit.* Ita quæ eo loco diſtincta diſiunctáque ſunt, perperàm hîc coniungi videntur.

Cap. lviii. ὀξαλίδος ἀγριάδος] Trifolium id paruum, quod vulgo acetatum dicitur, hoc loco intelligi videtur. Officinæ *panem cuculi* nominant. Plinio oxys dicitur, lib. 27. cap. 12. Eſt autem Galen. ὀξὺς eadem quæ & ὀξαλὶς, lib. 4. de ſimpl. cap. 3.

Cap. lxiii. σχοῖνος ἀνθώδης] σχοῖνος reſtituit Geſnerus: fortè verò piperis ſpicam nominat, quæ veriùs piper longum dicitur.

ἀμφιδύσασθαι δὲ] Lubens hoc verbum, ἀμφιδύσασθαι, ad hilaritatem, aut etiam geſtationem aliquódve penſile exercitamenti genus retuliſſem; quaſi voluerit Autor, epoto eo ex vrina caprę remedio hilaritati ſeſe tradant ægri. (nam & verbum ἀμφιδύσασθαι tale quid interdum ſignificat) vel geſtatione aliove quopiam exercitij genere concutiantur & agitentur. Attamen non diſplicuit etiam Moibani coniectura, qui pro hiſce vocibus, ἀμφιδύσασθαι δὲ, reſtituendum cenſuit, δὲ αὐχμὸν &c. Enimuerò & ipſe Dioſcorides lib. 2. de mat. med. cap. 99. de eadem vrina caprę ſcribit in hunc modum: αἶγός δὲ [οὔρου] ὕδρωπα τὸν ὑπὸ σπόρου πεπόθησον κυάθῳ ναρδίνου σπόρου καθ' ἑκάστην ἡμέραν σὺν ὕδατι κυάθοις πλείοσι β'. ἄγει οὖρα καὶ κοιλίαν. quæ nos ita vertimus: *Caprinum lotium ad aquam quæ autem ſubit cum ſpica nardi & aquæ binis cyathis quotidie bibitum, vrinas & aluum ducit.*

ἡ ἀπιάς] Geſnerus ἀπίου, πυρίτου, ἀπιάστου, reſtituendum ſuſpicatur, & ad apij ſemina refert. Ego malim ἀσπαράγου. Nam & aſparagorum radices non minore quàm radices apij vrinæ ciendæ vi pollent. Cęterùm & ipſe Iubens, Actij exćplo, iſthæc omnia ad capitis vſque calcem vnico remedio compoſito comprehendiſſem: niſi quominùs id facerem, priores hæ diſiunctiuæ particulæ prohibuiſſent.

Cap. lxx. κυπείρινον] Rectiùs, κύπειρον. Hic enim vulvæ affectionibus cupreſſus parum congruit. At cyperus vulvæ perfrigerationib. & obſtructionibus fotui accommodatur, teſte ipſo Dioſc. lib. 1. de mat. med. cap. 4.

Cap. lxxxv. δύναται δὲ καὶ] Hoc erat principium capitis alterius, à priore diſtincti: ſed cum illo priore coniungendum exiſtimauimus, aut annectendum ſeptuageſimo ſeptimo. Neque verò dubium eſt, quin propoſita hîc remedia, quanuis ad collyria & peſſos accommodari poſſint, in eoſdem etiam vſus intus venęri rectè adhibeantur.

Cap. lxxxii. ἡ δὲ ἀπὸ τοῦ κύτους] Hanc eandem lanuginem vitatidam refert Autor, dum de Cynosbato agit, lib. 1. de mat. med. cap. 123. quò fit vt Cynosbaton hoc loco cum oxyacantha cōfudiſſe videatur. Rubum quidem canis, κυνόβατος Græcis dictum, fateor, eodē Autore teſte, etiam à nonnullis oxyacantham nominari ſolitum: ſed ea eſt oxyacantha propriè dicta, quam ipſe, citati libri cap. 122. fluori muliebri ſiſtendo idoneam agnoſcit.

Cap. lxxxvii. ἐπιτήδεια βλήχωνα] Malim, ἐπιτήδεια φλόγωνα (ſeu λύχνα) καὶ ἀποθέσθαι, hoc eſt, *extinctos lucernarum funiculos ſui muliebres anſi erant.* Eſt enim veriſimile Voluiſſe Autorem ellychnia viciſſim accendi & reſtingui, quò facilius citiuſve illorum extinctorum odore mulieres ab vtero ſuffocare reuocarentur. βλήχωνα verò eadem ſeu madefacta, & ocyùs reſtinguuntur, & minùs facilè accenduntur.

Cap. xcvi. μετὰ τὸν σύνοδον] Aliud voldit Dioſc. lib. 4. de mat. med. cap. 191. Vult enim eo loco, non μετὰ τὸν σύνοδον, hoc eſt, *à concepto*, ſed μετὰ τὸν κάθαρσιν, hoc eſt, *à purgatione menſtrua*, mercurialis huius aut illius ſemen verēdis adhiberi, vt mares aut fœminæ concipiantur.

Cap. xciii. ὑπὸ τὸν σύμμαν] Geſnerus σύμμαν barbarum vocabulum eſſe ſuſpicatur, quod *vinum* aut *redimiculum* ſignificet. Ego, σύμμαν ſeu σύμμιν, legendū puto, cum hac voce etiam Athenæus vtatur. Eſt autem σύμμις Polluci, πλοκαμὶς, ἥν τινες τειχᾶν, *implexa aut intorta ſeu renodata coma*: crinium ſpiram aut nodum verterim: Futulos Varro & Feſtus videntur appellaſſe. Papinius ſuggeſtum comę. Eōdem ſpectat illud Heſychij, σύμμιν, περιφορὰν καταλλαγὴν βόστρυχος ἢ πλοκαμίδος, interpretatur. At EVſtathio in Homerum, ὥραιαι δὲ γυναῖκες ἐν πλοκαμίδι ἢ περιφορᾷ ἢ κρίκοις χαλκοῖς, nempe *ornamentum quoddam muliebre*; ſitne *vinum* ſiue *redimiculum* interpreteris parū intereſt. Capillare etiam Martiali dictū videtur, reticulum quo mulieres capillos inuoluunt. Cæterùm negat Geſnerus vſquam ſe inueniſſe, quænam ſit herba melanſpermon: at non recordatur eius quod apud Plinium legiſſe potuit. lib. 20. cap. 17. gith, melanthium & melanſpermon, varia eſſe vnius eiuſdémque plantæ nomina.

Cap. xcv. ἀπὸ τοῦτου μετὰ τὸν σύνοδον] Aliud eſt quod voluit Autor, lib. 2. de mat. med. cap. 146. Hunc enim braſſicæ florem intelligit adhibendum, non à conceptu, ſed à puerperio, vt cōceptus impediatur. Sunt enim eo loco hæc illius verba: τὸν δὲ αὐτὸν ἄνθινον, μετὰ τὸν τόκον ἐπιτήδειον ὄντα.

Cap. xcvi. ἐπιτήδειον δὲ καὶ ἀποθέσθαι] Hoc ea-

pitulum, quod priores Interpretes à præcedenti capite seiunxerant, nos illi annectendum censuimus: quippe cùm indubitanter eò pertineat, præsertim verò ad postrema illa verba, σκίλλης ἰσάκις πλείς. quanquam præterea nonnulla, quæ fortasis exciderunt, interiicienda videntur, quæque facile fuerit ex 2. de mat. med. cap. 71. supplere. Sunt enim illo loco hæc de scinco Dioscoridis verba: φασὶ δὲ δύναμιν ἔχειν μείζω πρὸς τὰ ἀφροδίσια πρὸς μίξεις, ἐὰν τὸ πέμπτον μέρος λάβῃ, ἐμπεπλεῦσθαι δὲ ὑπὸ ἀφροδισίων. ὁμοίως δὲ καὶ ὄφεως τοῦ ποταμίου φασὶ ἀφροδισιαστικὰ μᾶλλον μύελος πεπιῶσθαι, &c. quæ nos ita vertimus: *Aiunt sanè parum eam quæ rem amplectitur, drachmæ pondere in vino potum, Venerem accendendi vim habere: attamen lentis decocto cum melle intensam illam cupiditatem inhiberi.* Quotquot etiam alij rei Medicæ Scriptores de scinco egêre, tantam eo assumpto pudendi arrectionem excitari voluerunt, vt eam deinde adhibitis remediis comprimi remittique sit necesse: quod, vt aliàs, ita etiam obiter hoc loco, admonendum Autor existimauit. Quin & vox hæc, ἔπειτα δὲ, per se satis indicat, hanc periodum ad proximè præcedentem pertinere. Huc adde quòd quæ deinceps recensentur auxilia è pastinacæ semine ac terebinthi fructu petita, Venerem hauddubiè conciliandi, non item restinguendi, vim habent: quod tamen minimè agnouit Gesnerus, aut quisquis alius hæc à præcedentibus seiunxit: dum ipsa, æquè ac lentis decoctum, in eorum numero collocat, quæ valent intensam Veneris cupiditatem restinguere.

CAP. XCVII. δρακοντίου ῥίζα, &c.] Contrà dracunculi radicem ex vino potam Venerem excitare scribit Dioscor. lib. 2. de mat. med. ca. 196. At fortasis alia vis est radicis recentis, alia eiusdem exiccatæ. Hîc porrò de sicca radice agitur, illic verò de recenti sermonem haberi fit verisimile.

πρόσεισι μᾶλλον πτυέλου] Contrà nucleos pineos recensetur Orib. lib. 4. ad Eunap. cap. 105. inter excitandæ Veneri dicata remedia. Itémque Aëtius, Tetr. 1. ser. 3. cap. 238. in eorum eduliorum censu numerat, quæ copiosum semen generant. Fortasse verò aut hîc mendum subest, aut vis illa conciliandæ Veneris partim maceratione, partim seminis cucumeris admixtione restinguitur. Quid quòd iis portulacæ succum insuper Autor addi fortasse voluit? Suspicor enim αἰθρέμχης χυλοῦ, non, χυλός, hoc loco legendum, quoniam & Plinius, lib. 23. cap. 8. de iisdem pineis agens nucleis: *Mitigatur hi*, inquit, *contra uehementiores stomachi rosiones semen cucumeris, & suauis portulaca.* Quòd ad ficus spectat quæ præterea hîc commemorantur, maior subest difficultas. Nam & ab Aëtio, loco modò citato, inter copiosum semen gignentia edulia reponuntur. Et certè quidem, vel ipso Gal. teste, sit abundè nutriunt, ac flatulentæ sunt, totáque vi seu substantia corpori familiares.

CAP. C. καμήλου λάπη] Suidas καμήλους Græcis dictas refert, παρὰ τὸ ἐπὶ πλεῖστον τῆς φύσεως αὐτῶν καμηλὸν εἶναι τὸν τράχηλον, ἀπὸ τούτου οὖν τὰς καμήλους εἰκότως. τινὲς δὲ σημαίνειν φασὶν. hoc est, *carnes quæ camelo inter alas genitalium prominent, quæque in bellum extemo præciduntur, ut ne in posterum crescant.* Sed non constat vllum Medicinę Scriptorem earum meminisse: multò minùs siue ad hunc affectum, siue ad alium quemuis vsurpasse. Quare inclinat animus, vt cum Gesnero vel καμήλου ὀπὸς, vel, καμήλου οὖσας, hîc legendum putem. Nam & *urinæ monumentum habent*, inquit Plinius, lib. 28. cap. 15. *uesicæ aprinæ, si assa mandatur: ungulæ apri eius, potum insperso.* Suspicatur porrò & idem Gesnerus, καχλίας, fortasse legendum, quoniam & ad emendandam vrinæ incontinentiam Autor tertij Parabil. Galeno attributi, cochleam cum sua testa vstam tritámque in vino propinat ante somnum. Sed & Plin. lib. 32. cap. 9. scribit in hæc verba: *Iubent & cochleas Africanas cum sua carne comburi, cinerémque ex uino signino dari.* Quòd ad qualemcunque simum attinet, qui καμήλου etiam voce designatur à Græcis, hîc desiderari vix crediderim.

CAP. CV. ἡ βολβὸς πυρὸς] πυρίτης, legendum censui, ac bulbos rufos interpretatus sum. Nam & bulbum rufum qui ex Africa deferretur, ceu præstantiorem, commendauit Dioscor. lib. 2. de mat. med. cap. 200. Meminit & Hipp. variis in locis, βολβὸς τῶν ἐν τοῖς πυροῖς, aut, βολβίου τῶν ἐν τοῖς πυροῖς, hoc est, *bulbuli qui inter segetes tritici nascuntur*, atque ideò suspicatus est Gesnerus, hîc etiam bulbos eiusmodi desiderari.

CAP. CXI. πρὸς ἰσχουρίαν] Adderem libenter, ἢ στραγγουρίας. Nec enim contra vesicæ solùm, sed & contra renum calculos proficiunt pleraque eorum quæ sequuntur auxilia.

ἀνθεμίδος τῆς πρασοειδοῦς] Malim, τῆς πρωτοειδοῦς. Trium enim duntaxat anthemidis generum meminit Dioscorides, lib. 3. cap. 154. quæ pro florum externorum colore vario, candido, inquàm, melino & purpureo distinguerêtur. Hanc, quam ad calculum cæteris antefert, πρωτοειδῆ nominat, alteram, χρυσάνθεμον, tertiam, λευκάνθεμον, quanquam & hoc nomen parthenio quoque tribuitur. Cæterùm vox, ἄνθος, quæ in extremo capitis huiusce legitur, hauddubiè redundat.

ἔστι δὲ καὶ παιδίου] Ista ab hoc capite ext. minimè seiungenda duxi, quia quæ sequuntur auxilia non magis pueris, quàm ætatibus aliis conueniunt, nec magis vesicæ, quàm renum calculis: quamuis pueri vesicæ magis quàm renum calculis sint obnoxij. Spectat verò hæc periodus ad proximè præcedens è pæoniæ granis remedium. Nam & lib. 3. cap. 157. de granis pæoniæ fuluis seu rubentibus scribit in hæc verba: ἔστι δὲ καὶ παιδίων πτύελμα καὶ ῥόδοφλυσις, αἰχμὴ λευκὰ καὶ παραδοῦσι, à *puerulis*, inquàm, *pota efficiunt uitia calculorum eximunt.* Hæc cùm ita sint, in extrema hac peripdo, pro, αἰμάζει, rectiùs legas, λιμάζει.

CAP. CXII. Ἀρτεμίσιος ἄνθος] Gesnerus locum hunc planè mutilum corruptúmque censet. Ego, ἄνθος, lego, dum quis certius aliquid in medium protulerit.

χαμαιδάφνης] δάφνην Ἀλεξανδρίδα simpliciter vocat, lib. 4. de mat. med. Sed hîc fortè legendum vtrunque, χαμαιδάφνη, δάφνης Ἀλεξανδρίτης ῥίζα. Nam & lib. citato, cap. 149. Chamædaphnes succus ad ciendas vrinas commendatur.

CAP. CXIII. πεύκης] etiam sub finem capitis eiusdem herbæ fit mentio, sed vtrobique Gesnerus, πεύκης, legendum putat, & nardi montanæ radicem interpretatur: quanuis apud Gal. nõ πεύκης, sed πείκης legitur. Malim ego, πεύκης.

ac pyrethrum eo nomine designari existimo: quin & πύρεθρον, quod proximè sequitur, quódq; fortassis margini explicationis gratia ascriptum erat, inde in contextum perperàm translatum crediderim. Porrò & in Theriacis Nicander μελίδος φύλλων meminit, itémque in Alexipharmacis, ῥιζίδος μελίσσης: ac vtroque loco Scholiastes πύρεθρον interpretatur, asseritque Iolaum & Aristeam herbæ eodē insignitę nomine faciſſe mentionem, quam contra serpentis cuiusuis morsum plurimùm commendauerint. Sed & μελίσσα inter alias πυρέθρου nomenclaturas in ipsius Dioscoridis nothis reperitur.

CAP. CXXXIII. βδέλλας δὲ καὶ] Autor librorum de venenis qui Dioscoridi tribuūtur, caput de hirudinibus deuoratis, exemplo Nicādri, refert in Alexipharmaca, quia deglutitæ noceant, haud secus ac venena, quę in cibo potúve sumūtur. Nos cum Gesnero inter Theriaca reposuimus, quia, vt & serpentes aliáque id genus virulenta animantia, suo morsu noxam inferant. Neque tamen illas ita suo morsu nocere existimamus, quasi per se virus aliquod insigne corporibus imprimant, vti illa: sed per accidens duntaxat, dum suo suctu vasorum oscula recludūt, indéque fit vt sanguis in ventriculum confluat, ibíque tandem, vti alibi dum est extra propria vasa, concrescat & coaguletur, venenique naturam concipiat.

CAP. CXXXV. ἀσκλαπιάδος ῥιζοτόμοι] Sat scio Asclepiadis herbę radices in vino potas à Dioſc. lib. de mat. med. 3. cap. 106. commendari ad venenatorum animalium morsus. Sed hic cùm de foliis & semine agatur, panaces Asclepium potiùs desiderari existimo, vti deinceps Chironiū, etsi panacis nomen vtrobique minimè exprimitur. Enimuerò & Panacis Asclepij non radices quidem, sed semen & flores aduersus serpentes ex vino bibuntur, lib. citati cap. 56. Chironij verò radicis potæ iidem effectus prædicantur, capite proximè sequenti.

CAP. CXXXVII. ὄφεσι καὶ χυμοῖς] Hæc alioqui obscura iis illustrantur verbis, quæ addūtur in Alexiph. cap. 7. τῷ ὑγρῷ λαμβανομένῳ. Nec enim vult Dioscorides aurum argentúmve ipsum assumi, vti neque ferrum ferrive scoriam, de quibus paulò antè, sed liquorem in quo ea candentia restincta fuerint: quanquam quòd ad scoriam spectat, ipsemet contra aconiti venenum eam ex aceto mulso potam commēdat, lib. 5. de mat. med. cap. 94.

CAP. CXLIII. χόριον πιὸν γλυκεῖ] Sic Nicandro in Alexiph. commendatur ad coriandrum epotum χόριον γλυκερὸν μεγάλως πίνας, hoc est, *passi poculo nimis cum amore*. Dioscorides verò in Alexiph. itémque Paulus inter alia hausti coriandri remedia recēsent, γλυκεῖ πιὸν μετὰ ῥητίνης ὠφελεῖ λαμβανόμενον, hoc est, *passum cum lixiuio sumptum*.

CAP. CXLVI. ταρὰς Κελτικὴν πιὼν οἶνῳ] Celtica nardus desideratur à Dioſc. in Alexipharm. cap. 19. Cilicia seu Cilissa, quæ eadem est cum nardo montana, à Nicandro & AEgineta. Sed leue est discrimen, quando vtrique sunt eædem vires.

πίτυρον πιὼν κεχυτὸν ἁλίῳ] Deraſo capiti farinā hordeaceā cū ruta trita & aceto adhibet Dioſc. in Alexiph. citato capite: id quod fortassis hoc loco librarij culpa prætermissum est.

CAP. CL. τρύχου δὲ μανικοῦ] A Dorycnio solanum manicum seu furiosum manifestò distinguit hoc loco Dioscorides: sicuti etiā fecit, lib. de mat. med. 4. vtriusque historiā distinctis describēs capitibus. Attamen, seu Dioscorides seu quisquis est alius librorum de venenis Autor, in Alexipharmacis palàm ea cōfundit, haud secus atque quotquot alij è veteribus de venenis commentarios ediderunt, quasi dorycnion cum solano manico vnum idémque fuerit.

CAP. CLI. σκιμποῦς δὲ τοῦ] Corruptissimum hunc Grǽcum cōtextum ita emendat Gesnerus: σκιμπῦς δὲ τοῦτο, μόνα φυλλοῖ, δοκεῖ τι μαίζειν. μόνας οὖν ὑποχόνδρια πίνας, ἰχῖνι φυλλίνῃ, αἷμα πίνας οὖρον. Placuit illius coniectura, nisi quòd αἷμα τὸ, ἰχῖνι φυλλίνῃ, hoc est, *sanguinem resolutio, ἰμφανικόμενον* lego, ἰχῖνι ἕλκους, hoc est, *marinum exulceratio*. Vt verò ille quid sibi vellent hæ voces, τὸ δὲ κακόμοιρ, assequi minimè potuit, ita nec ipse, quid pro iis restituendum esset, diuinare potui. Lacunam explebunt alij, si videbitur, quibus erit ad manum Aëtij Grǽcum exemplar integrum.

CAP. CLX. χελιδὼν αἵτης] χελιδὼν ἅπτης legit Gesnerus. Vide annotationes nostras in 23. caput Alexipharm.

CAP. CLXIII. κριθῶν αἰρέσιμα] Malim, ἢ κριθῶν αἱρούμενα, Nam laudantur & Persicorum nuclei cum hordei decocto, in Alexiph. itémque à Paulo AEgineta: vti cum oleo, à Nicandro.

INDEX RERVM ET VERBORVM NOTATV DIGNIORVM QVAE I. ANT. SARACENI IN Dioscoridem Scholiis continentur.

Numerus paginam signat. A pagina columnam priorem. B posteriorem. P columna principium, M medium. F finem indicat. E vero Scholia notat in libros nouos.

A.

Cacias succi differentiæ 20.a.f
Acaciæ succi genera duo E 129.a.p
ἀκακίου κεφάλαια 20.a.m
ἀκακίου ξύλα 19.b.p
Acanthinum gummi Galenus Thebaicum cognominat 20.a.f
Acanthus arbor quæ 19.b.p
Acanthus cur ita dictus 57.a.m
Acerbi significatum 78.a.f
Aceti mixta qualitas cal. & frig. 106.b.m
ἄκινος 19.b.m
Aconitum cur ἀνήμερον dictum 85.a.f
Aconitum Scorpium cur dictũ 81.b.p
Aconitum vnde dictum 85.b.p
ἄκονιτον rectiùs scribas, quàm ἄκοντον 16.a.p
Acria vitione mitiora euadunt 117.b.m
Actuarij codex emendatur 4.a.m
Actuarius notatur 101.a.p 114.a.m
Adarces synonyma 120.a.f
Adianti effectus dispares 92.a.p
Adianti genera à trichomane distinguuntur 90.b.m
Adianto radicem cur denegarint Theophrastus & Plinius 92.a.p
Adiantum vnde sic dictum 92.a.m
Ægilopis significata 99.b.m
Æris flos interdum Hippocrati simpliciter dictus 111.a.m
Æris limatura facilius vritur 111.a.p
Æruginis sinceræ ab adulterina dignotio 111.b.m
Æruginis scoleciæ conficiendæ rationes variæ 111.b.f
Aëtitis lapidis genera 4. 123.a.m
Aëtius à Dioscoride dissidet E.128.a.p
Aëtius Dioscoridi cõciliatur 106.b.p
Aëtius emendatur 60.a.f 101.b.m
Aëtius notatur 20.a.m.111.b.f.114.a.m.115.b.m
in Agallocho optimo discurrentes venæ cinereæ 7.b.m
Agarico stomachicis exhibẽdo non superbibendus liquor E.132.a.m
Agaricum nostrum stomacho inimicum 53.b.f
Agaricũ verius fungus quam radix 53.a.m.125.b.m
ἀγαρικὸν E.133.a.m
Alabastrites lapis vnde dictus 122.a.f
ἄλαδον propriè de furijs frumentaceis 44.b.f
Alicmon Macedoniæ fluuius 61.a.p
Alicæ & ζέα discrimen 39.a.m
Allia flatus gignũt & discutiũt 47.b.p
Allij nucleorum synonyma 97.a.f
Alliorum eius efficacissimũ ad morsus viperæ remedium 139.b.m
Allium ἄνδρον Galeno genera quàm scribat Dioscor. 42.b.f
Allium oculorum hebetudinem mirabilè infert, modò tollit 48.a.p
Aloë an ictericum expurget 57.b.m
Aloës effectus contrarij vnde & deinceps. 57.b.f.
ἀλόης ἀδάμας aliud quàm ἄλιμα E.129.a.f
Alsine minimè astringit. 87.a.m
Altercum vnde dictum 84.a.p
Althæa dissaribus prædita viribus 75.a.f
Alumen scissile è lapide fit chalcitide 117.b.f
Aluminis factitij genera 118.a.m
Aluminis plura genera 117.b.f
in Alysso describendo diuersæ Autorum sententiæ 67.a.p
ἄλυσσον vnde dictum 67.b.p
Amaracus Gal. non est marum, sed parthenium 21.b.p
Amaracus quibusdam sampsuchum 60.a.f
Amatus Lusitanus notatur 9.a.m
Amiantum lapis aluminis scissili similis 118.a.m
Amiantus lapis idem qui Carystius 122 b.m
de Amomo discrepantes recentiorũ sententiæ 5.b.p
Ampelitis terra vnde dicta 124.a.m
inter Amphisbænam & Scytalen discrimen 135.b.f
Amygdalæ amarę qua ex causa ebrietatem arceant 24.b.m
ἀμυγδαλομέλιτον 31.b.m
ἀμυγδαλοπάστον 103.b.f
ἀμυγδαλωτὸν 31.a.m
Anchusæ genera 4 Galeno 79.a.f
ἀνθεμὶς ἡμερωτέρα 113.a.m
Anthemidis tria genera E.134.b.m
ἀνθερικὸς aliis alium asphodeli partem significat 50.a.m
ἄνθος E.130.b.m
ἄνθος vnde dictum 101.b.f
Anigrus amnis 73.b.m
Anthrax gleba è qua minium 111.a.f
ἀντίμιμον 93.a.m
Anticyræ duæ 95.a.f
Antirrhini Theophrastea & Plinianæ descriptio à Dioscoride discrepat 90.a.m
Antirrhini synonyma 90.a.m
Antispodia varia 110.b.f
ἀπάτιον 11.b.f
Apiastrum Plinij, ranunculus est 31.a.m
de Apij temperamento & viribus discrepantes Autorum sententiæ 63.a.m
Apollinis homine vires duæ diuersis designantur 16.a.f
Apomeli duplex 106.a.f
Apomeli insecterum ecceptis præstantius 106.b.p
Apomeli species hydromeli 106.a.m
Aponeli seu mellis quibus cõficiatur 106.b.p
Apuleius notatur 77.a.f
Apum vespartúmve ictuum notæ 138.a.f
Aquæ cœlestis inuentatio 106.a.m
Arabum error 55.b.f
Arabus lapis Ambitis gemma Plinij 122.a.m
Araneum quid in calamo aromatico 6.a.m
de Argenti viui temperamento discrepantes Autorum sententiæ 116.a.m
Argentum viuum nõ aliud est quàm natiuum contra Galenum 116.a.m
Argentum viuum vbi asseruetur. ibid.
Argentum viuum vnde 116.a.p
in Aristolochiæ descriptione discrepantes Autorum sententiæ 54.a.f
Aristolochia quæ indenda theriacæ 44.b.p
de Armenij colore discrepantes sententiæ 114.a.m
Armenij lapidis vis ibid.
Armenium à lapide Armenio diuersum 114.a.p
Aron pro natalis loci varietate magis vel minus acre 50.a.m
Artemisia gestata lassitudinem anteuertit E.131.a.f
Arundinis specierum varia cognomina, earúmq; etymologia 18.a.m
Asan etymologia 3.a.m
Asarum non est baccharis, nisi fortè Cretense 3.a.f
Asclepiadis nomine Pamaces Asclepium intelligitur E.135.a.m
Asius siue Asius lapis sarcophagus cur dictus 121.a.f
Asparagi lõgiorem coctionem non sustinent 41.b.f
de Asparago discrepantes sententiæ 43.a.f
Asparagorum differentiæ 43.a.m
Asparagus syluestris ἀγριόσπαρτος dictus

43.a.f
Aspidis morsus symptomata ex Aëtio 137.a.f
Aspidum species 3 Galeno 137 a.m
Aspidum species 16 Ægyptiis ibid.
Asplenon idem cum scolopendrio 73 b.m
Asteris duo genera pro floris colore vario 90 a.p
Astragali nomine iris astragalitis designatur 138.a.p
Athenæus notatur 27.a.m
Athera non è sola zea parabatur 53. b.p
Atlas Mauritaniæ mons 65 b.m
Atractylidis synonyma 67 b.m
ἄτριφον 61.b.p
Auena duplex, sativa & sterilis 91. b.p
Auicenna dissentit à Dioscoride 63. a.p
Auicenna notatur 137 a.p

B.

Baccharis & asari discrimen 3. a.f
Balaustium Plinio aliud quàm Dioscoridi 23.a.p
de Balsami arbuscula variæ tam priscorum quàm recentiorum sententiæ 6.b.p
Basiliscí morsus immedicabilis 140. b.f
Basiliscí morsus remedia ex Auicenna 140 b.f
Basiliscí morsus symptomata ex Nicandro & Aëtio 130 a.f
de Basilisco quæ recitantur Galenus fabulosa credidit 137.a.f
βάσκανος 14.a.m
Bdellio odor vnguis odorati ibid.
Betæ candidæ & nigræ vires diuersæ 42.b.p
Bion vini genus Plinio 105.b.m
βλητροπλήκτρον E. 128.a.f
βλίτον χρῶ 103.a.p
Blitri vsus in medicina 41.b.m
Blitum Hipp. à blito Dioscoridis differens ibid.
βλίτον τὸ ἐν τοῖς κυμινοῖς E.134.b.m
Bombyx etiam Plinio xylon dicitur 57.a.p
βουπρόστιον 5.b.f
βότρυος significata 5.b.m
βοτρυόδαφνος vnde dictus 74.b.m
Brassica ἀκρόκαυλος 42.a.m
de Brassicæ cyma Galeni & Plinij discrepantes sententiæ ibid.
Brassicæ syluestris efficacia in medicamentis 42.a.f
βρύα significatum 72.b.m
βρωμία propriè vitis nigra 101.b.f
βρῶμος 30.a.m
Bulbus rufus præfertur E 134.b.m
Bunias & rapi in alendo discrimen 41.a.m
Butyrinum vnguentum 11.b.f

C.

Cacalia Dioscoridis Cancamon Galeni 90.b.p
καλλος quæ planta 132.b.m
Calcis viuæ & extinctæ discrimen 120.a.m
Cadmiæ factitiæ duo genera 110. a.m
Cadmia crustas non inducit 109. b.f
Cadmia vnde gignatur 110.a.p
Calami aromatici varia cognomina 6.a.f
è Caneris medicamenti varia apud Autores varios descriptio variúsque vtendi modus 133.b.m
Cancrorum cineris vsus ad canis rabidi morsum 27.b.p
Cantharidum vsus 32.a.m
Capillamenta herbis quibusdam innascentia radicem an habeant 102. a.p
κάπνος herba vnde sic dicta 89. a.m
Capparis radix capillos denigrat E. 129.a.p
καρκίνος E. 134.a.f
καρκίνωμα sæpenumerò perperam κάρκινος, & vice versa 5. a.p
Cardui radix esculenta 56 b.m
Carlina non est chamæleon albus 55. b.f
καρπὸν ἀνδρὸς τὸ ἀφροδισιακὸν opponitur 46 b.m
Cassiæ species quæ κάσσια Dioscoridicitur variorum Autorum discrepantia nomina 4.b.m
Cassia & cinnamomum arbusta potiùs quàm frutices 4.b.p
de Cassiæ folio discrepantes Autorũ sententiæ 4.b.m
Castorum continentes folliculi à testibus differentes 29.a.m
καστορογόνα φαρμακα 124.b.m
καστορίου γνῶσις χρηστὸν 50.a.f
Caulis proprium significatum 90. b.m
καυλὸς impropriè arboribus tribuitur 65.b.f
κάχρυς seu κάγχρυς vnde dictus 136. b.m
Cedriæ significata 108 b.p
Cedrus arbor duplex 172 a.m
Cedrus emendatur 111.b.p
Celsus à Dioscoride dissidet 107.a.f
Cenchri synonyma 136 b.m
à Cenchro κεγχρὶς distinguit Nicander ibid.
in Centaurij maioris sapore dissentit Plinius a Dioscoride 55.a.p
Centaurium maius Cretæ à Dioscoride diuersum ibid.
Cepæ cur κεφαλῖτις 47.a.m
Cepæ & oculorum hebetudinem faciunt & eidem medentur ibid.
Cepæ flatulentæ 47 a.p
κεφαλικὰ σπέρματα quæ 61.b.m
Cera contra lactis in mammis coagulationem vtilis E.129.a.f
Cera Punica 37.a.f
Cerasorum facultates ex sapore distinctæ 23.a.f
Cerastæ morsus symptomata ex Nicandro 137 a.p
κεράστης vnde dictus 136.b.f
Cerealium seminum & leguminum differentia 39 b.p
Cerebrum leporinum ex qua causa omnibus tremoribus conferat 28. a.m
κερκὶς θαλασσία 37 a.f
Chalcanthum natiuum in chalcitin transit 117 a.p
χελώνιον & κνὶς serpentis discrimen 107.a.m
Chalcitidis & misyos discrimen 117. a.f
Chalcitis inueteratscens misy potiùs fit quàm sory 117.a.m
Chamæcissos Plinij alia à Dioscoridis chamæcisso. 90 b.m
Chamæleo ab ixia veneno diuersus 55.b.m
Chamæleonis albi radix etiam hominibus perniciosa, & tamen alexeteria vi prædita 56.a.m
Chamæleonis nigri radix venenata 56.a.p
Chamæleuce Plin. inter genera bechij 90 b.m
è Chamæmelo pastilli inungendis fricandis 74.a.m
Chamæpeuce diuersa à Plinij Chamæleuce 90.b.f
Chamæpityos appellationes 127.b.f
χαμαιπίτυος 101.a.m
ὁ ὑπὲρ χαμαίπιτυος pro ministro 112.a.m
Chelidoniæ etymon 52.b.p
Chelidonia visum hirundinibus restituit fabulosum 52.b.m
χελιδόνιον significatum 23.a.m
χελιδὼν & alcæ discrimen 39 a.m
Chrysanthemon quid 82.b.m
Chrysocolla gemina 113.b.f
Chrysocolla metallica duplex 113. b.f
χρυσόλιθος 35.a.f
χρυσὸς & ὠὸν discrimen 51.b.f
χυμὸς ceram plerunque Plinius perperàm vertit 7.a.m
κιττόκομον 40.a.f
Cicutæ semen inter rodentia Celsus falsò numerat 84.b.f
Cicutæ vim maleficam merum adiuuat 86.a.p
Cimoliæ terræ synonyma variáque genera 125.b.f
è Cimicibus ad quartanas remedium deridetur à Galeno 30.a.f
Cinnabaris factitiæ vsus in assumendis abdicandus 115.b.m
Cinnabaris lacrymæ species ibid.
Cinnamomi color 4 b.f
in Cinnamomi quarto genere describendo Galenus à Dioscoride discrepat 5.a.m
Cirsium vnde dictum 90 a.p
Clymeno tribuunt Theophrastus & Plinius, quæ Dioscorides periclymeno 78 a.p
κνέωρον idem quod κνίωρον 100.b.m
Coagulum contrà quam Dioscorides respuit Galenus in sanguinis è thorace reiectionibus 34. b.m
Cocci genus, quod Plinio κοκκύμηλον, nostris vermillon 81 a.p
Coccus baphica vbi reperiatur 80. b.f
Coccus orientalis quid 99.b.p
κόκκος sine κόκκωμα 33.a.f
κόκκος οὐ τὸ βοτρυῶδες 66.b.p
Colocynthidis diluti parandi ratio illustratur 101.b.p
Colocynthidis medullæ apud varios varia dosis 101.a.f
Colchis Asiæ prouincia 2.a.m
κολχικόν 40.b.p
Communis lapis E 131.a.f
κονία pro calce E.129.a.p
κονὶς quid 26.b.p
κόνυζα 16.a.p
κονυζίτης 74.a.p
Corallina fuci marini genus 88.a.p
Corallium extra aquam lapidescit 121.a.p
Cordus notatur 9.b.p

Coriandrum non aliud quàm ſatiuum 63.a.p
de Coriandri temperamento diſcordes ſententiæ conciliantur 62. b.m
Cornarius notatur 96.b.p
Cornu ceruinum dentibus affectis quæ ratione conſecrat 30.a.p
κέρμηκες & κέρμις pro eodem 93. a.m
Cotis aquariæ & oleariæ vires diſpares 123.b.m
κράδη vnde dicta 41.b.f
Crapula vnde dicta 108.a.m
κραιπάλη vnde dictum 72.a.f
de Crimno diſcordes ſententiæ conciliantur 53.a.m
Crimnon è quibus parari ſolitum 53. a.m
Crocum pingue Plinio quale 7.b.f
Crocodilea 36.a.f
κρωκὶς etymon 48.b.p
Cupreſſus an vrinæ difficultati auxilietur 16.b.f
de Cyani colore diſcrepantes ſententiæ 114.b.p
Cyani vim κυανωπικὴν, at non κυανωπικὴν Græci agnouerunt 114. b.p
Cyani vis ad bilem atram ibid.
Cyanus factitius 114.a.f
Cyano caules cur deneget Dioſcorides 94.a.p
Cynoglo ſſon Plinio caule præditum 20.a.p
Cynorrhodi radix ad rabiđi canis morſum 133.b.p
Cynoſbaton cum oxyacantha confundit Dioſcorides E.133.b.p
Cyprini vnguenti diſcrepantes deſcriptiones 11.a.m
Cyprus an ſit liguſtrum 19.a.p
κυπρίσσος 22.b.m
κυπρὶς ſignificata 3.b.m

D.

Δαυκίδια 10.a.f
διαπύημα quæ dicantur 2.b.m
διαχώρησις & διαχώρημα diſcrimen 11.a.m
Dicearchia eadem cum Puteolis 133. a.f.
Dictamno flos eſt & ſemen contra Dioſcoridis ſententiam 59.a.m
Dictamnus à quibuſuis quadrupedibus expetitur ad tela extrahenda 59.a.f
Dioſcoridem illuſtrat Aëtius 34.b.p. & 136.a.m
Dioſcorides ab Hipp. diſſentit 63. a.m
Dioſcorides à contradictione vindicatur 3.a.m. 5.a.m. 47. a.m. 106. b.m. E.128.a.m.& 134.a.m
Dioſcorides à Galeno notatur 30.a.f. 31.a.p.& in.35.b.m. 36.a.m. 41.a.f
Dioſcorides à Galeno notatus defenditur 34.a.m. 35.b.m
an Dioſcorides Anazarbæus autor librorum de venenis 124.a.m. 127. a.m
Dioſcorides à Theophraſto diſcrepat 59.b.p.84.b.p.85.b.m
Dioſcorides pugnantia ſcribit 65. b.m
Dioſcoridis de materia medica libri non plures quàm quinque 2. a.m
Dioſcoridis emendationes ceu minimùm frequentes omittimus.
Dioſcoridis locus ex Galeno illuſtratus 30.a.p
Diphilus à Dioſcoride diſſidet 41. b.m.44.b.m
Dipſadem à preſtere diſtinguit Lucanus 136.b.p
Dipſadem alij viperarum, alij alpidũ generi annumerant 136.b.m
Dipſadis ſynonyma 136.b.p
δρυμὸς 89.a.m
δρυὸς ὀπὸς 34.b.f
Doryeni ſuccus planè lacteus 127. a.m
Doryenium & ſolanum manicũ ceu diuerſa diſtinguuntur E.135.b.m
Draba ſeu Arabis Dioſcoridis eadẽ cum dryophono Plinij 48.b.m
Dueco arbor 81.b.p
Dracontij duo genera 49.b.m
Dracontium eſui inceptũ Theophraſto, contrà quàm ſenſerint Dioſcorides & Galenus 49.b.f
δρυμὸς quid 89.b.p
δρυὸς vnde dictus 136.a.f
Drymi varia ſynonyma 136.a.p
δρυὸς nomine glandiferæ omnes arbores comprehenduntur 81.a.m
Dulcedo in aqua quomodo intelligatur 106.b.m
Dulcis ſignificatum apud Plinium 8. b.m

E.

EBeni materia terendo reſoluitur 19.b.m
Echion Alcibium vnde dictum 79. b.p
Echium Galeno idem qui erinus, quanuis Paulus de iis agat diuerſis capitibus 79.b.f
ἐκτρώσια medicamenta E.131. a.m
ἔλλεβορος, veratrum 94.b.p
de Elaterij delectu diſcrepantes Autorum ſententiæ 95.b.f
Elaterij præparationes variæ 95. b.m
de Elaterij ætate & tempeſtiuitate diſcrepantes Autorum ſententiæ 96. a.m
Elaterium ſimul & flammam concipit & lumen extinguit 96. a.p
ἐλατήριον E.132.b.m
ἐλαία varia ſignificata 22.a.p
ἔλαιον, liquor manans ex olea Palmyrena 9.a.m
Electrum non eſt lacryma populi nigræ, ſed bituminis genus 17. b.m
ἐλένιον ſynonyma E.118.b.p
ἐλίχρυσον idem cum amaranto Dioſcoridis 81.b.p
ἐλίχρυσον vnde dictum ibid.
in Ellebori delectu Theophraſtus à Dioſc. diſcrepat 94.b.f
Ellebori ſemẽ cur ἀνεμωλὸς dictum ibid.
Elleborus admixto ſeſamoide temperatur 95.a.f
Elleborus niger Dioſcoridis à Theophrafteo diuerſus 94.a.f
Empetron alio nomine ἀσπαλαθὶς dictum 101.b.p
ἐγκεφαλὶς ſynonyma 22.a.m
Ephemerum duplex 86.b.f
ἐφημερὶς 79.a.m
Epithymi doſis apud varios varia 104.a.m
Epithymum Græcorum & Arabum vnum & idem 101.b.f
ἐπίθυμον ſeu ἐπίθυμος 45.a.m
ἐπίθυμος 31.a.f
ἐπιθύμου ἄνθος alia ab ea quæ ἐπίθυμον vel ἐπίθυμος dicitur ibid.
ἐρεμία 93.a.m
ἐρεμίη E.131.b f.132.b.m
ἔριδος αἰτίη ἐν ἐπιστάσιος 119.b.m
Erigerontis nomine dubium eſt quid ſignificet Dioſcorides E.129. a.m
ἐρίγηρον ſignificatum 26.a.m
Erinus herba vnde dicta 79.b.f
ἔρινα quæ dicantur 125.b.f
Erotianus emendatur 13.a.p
Erythrodanon Theophraſto aliter quàm Dioſc. deſcribitur 71.a.m
ἐρυσίμου duplex differentia 22.a.f
ἔσθιον 7.a.p
ἔσθιε odorem non perpetuò ſuauem, ſed interdum grauem ſignificat 5. a.m. 27.a.f
Eupatoria theriacæ 134.b.p
Eupatorium falsò argemone olim, & hodie agrimonia dicitur 51.b.p
Euphorbiæ ſuba inuentor eiuſdemque hiſtoriæ Scriptor 65.b.f
Euphorbij excipulum 65.b.m
de Euphorbij planta diſcrepantes ſententiæ 65.a.p
ἐφεδρὶς 127.b.f
ἐφεδρίζει E.139.a.m

F.

FAbæ priſcorum à noſtratibus diuerſæ 79.a.p
de Fabæ temperamento diſcrepantes ſententiæ 40.a.m
Faba Græca quæ Dioſcoridi E. 133. a.p
Fæx aceti facè vini valentior 119. b.f
Faloppius notatur 109.b.m
Fel candidi gallinacei præfertur 36. a.m
Fibri piſcibus non veſcuntur 18.b.f
in Ficus Cyprix deſcriptione Theophraſtus à Dioſcoride diſcrepat 25.b.m
Ficus Veneri haud aduerſa E.134. a.f
de Ficuum recentium facultate diuerſorum ſententiæ ibid.
Filicis & arundinis ἀνατροφὴ 103. a.f
Flores in parandis vnguentis non ſimul & ſemel, ſed paulatim macerandi 11.b.m
Fuci ſeu algæ marinæ genera 28. a.m
Fungi ægritæ quomodo producantur 17.a.f

G.

GAbala vrbs Syriæ 14.a.p
Gagates lapis vnde dictus 121. b.f
Gagatis lapidis varia cognomina E. 121.b.p
Galactites lapis vnde dictus 122.a.m
γαλακτοποιὸν ſignificatum 57.b.p
Galbani præparandi ratio 66.a.p
Galeni Interpres notatus 104.b.f
Galeni locus non bene intellectus 22.b.m
Galenus à contradictione vindicatur 20.b.f
Galenus à Dioſcoride diſcrepat 35.

b.f. 96.b.m. 98.b.p. 100.b.m. 101.b.f. 106.b.m. 112.a.p. 115.a.p. 117.a.m.
Galenus Dioscoridem illustrat 70.b. p. 71.a.p. 110.b.p.
Galenus Dioscor. reprehendit 26.b.p. 29.a.m. 33.b.m. 58.b.m. 116.b.f.
Galenus Dioscoridi conciliatur 42. a.p
Galenus emendatur 22. a.p. 25.a.m. 33.b.m. 35.b.p. & m. 69.b.m. 90.b.m. 100.a.p
Galenus notatur 116.b.m
Gallinarum & gallinaceorum iusculà diuersa vi prædita 31.a.f
Gaza notatur 34.a.p. 100.b.m.
Geodes lapis vnde dictus 123.b.m
Geranium terrium Plinio 71.a.f
Gleucinum nullatenus refrigerat contra Plinium 12.a.m
Glycyrrhiza cur γλυκὺρριζα dicta 54.b.f
Glycyrrhizæ synonyma 54.b.m
γομφίασις 31.b.f
Gompylus notatus 2.b.f
Gypsum duplex 116.b.m

H.

HÆmatites cum scissili lapide confertur 111.b.m
αἱματίτης lapis vnde dictus 110.b.m
ad Hæmorrhagiam è naribus aures cera obturantur E. 130.b.f
Hæmorrhoi ab hæmorrhoide distinctio 136.a.m
Hæmorrhoi & hæmorrhoidis ictus diuersa symptomata ibid.
ἅλιμος frutex vnde dictus 18.b.p
ἁλὶς ἀχὴ quid 119.a.m
Hedychroon vnguentum ab hedychroi magnate vt differat 12.b.m
in Heliotropij floris colore Autorũ diuersitas 104.b.p
Heliotropium cur ἡλιοτρόπιον dictum 102.b.m
Heliotropium vnde dictum 104.a.m
Helxine alia Plinio quàm Dioscoridi 80.a.m
Helxines synonyma 87.a.p
Hermodactylus an Ephemeron 86. b.f
Hesychius emendatur 89.a.p
ἱππακαὶ Scytharum 33.b.f
Hippophaës & hippophæstum vnde dicta 98.b.p
Hippophaës succi dosis apud Medicinæ Autores diuersa 98.a.m
Hippophaës synonyma ibid.
Hipposelinon Theophrasti Smyrnij Dioscoridis 65.a.f
ὑλικὸν μέλας ab Hybla monte 37.a.p
ὑπέρικον herba 46.a.m
Hydragoga ratiùs vsurpanda 95.b.m
Hydrargyrum non diuersum ab argento viuo 113.b.f
Hydri morsus symptomata 136.b.m
ὕδωρ seu χάλκανθος vnde dictus 136. b.m.
Hypnale aspidis species 137.a.f
Hypoglossum diuersum à lauro Alexandrina 93.b.m
ὑπογλαυκιον vnde dictum 90.a.m
ὑπόκαυστα ἢ ὑπὸ κάπνου E. 128.a.f

I.

IBeris eadem quæ lepidium 16.b. m. 81.a.p
ἰξοφόνημα 66.b.p
ἰόδωρον quid significet 25.b.f
de Indico Plinius sibiipsi contradicit 114.b.m
Indicum ab Indico lapide diuersum ibid.
Insula Campana Apuleij est Panacea Chironium Dioic. 8.b.m
Iordac E 119.a.m
Ἰσάτις an ἀσάτις legendum 27.a.p
ἰ particulæ significatum 1.a.f
Irinum aliud Dioscoridi, aliud Plinio commendatur 12.a.m
Iris Florentia in dysenteriis minus suspecta E. 132.b.f
Iris Illyrica laudatissima 1.b.m
Ischiadicorum vrendorum modos varios illustrant Cælius Aurelianus & Aëtius E 131.b.f
Iudaicus lapis cur ἰουδαϊκὸς dictus 122.b.p
Iulius Bassus idem qui alijs Tullius Bassus 1.a.p
Iuncti odorati cognomina varia tum apud Græcos tum apud Latinos 5. b.f
Iuncí varia genera 81.b.m
Iunco odorato rosæ odorem negat Garcias 6.a.m
Ixias an Chamæleon niger 119.a
de Ixia variæ discrepantesque sententiæ 55.a.m. & deinceps.

L.

Λαχανοκαλλιδες 43 b.p
LAc coagulatum quando edendum venenum 130.b.p
Lactis à sero dividendi ratio varia 33.b.p
Laserpitium vnde dictum 64.b.p
Lathyridis dosis varia 99.b.f
in Lemno terra triplex 116.b.m
è Lentisco dentiscalpia 35.a.f
de Lentis viribus discrepantes sententiæ conciliantur 40 b.m
Leontopodium Attij & Apulei, est ipsum leontopetalum 90.a.p
Leontopodion Dioscoridis, est Cemos Plinij 90.a.p
Leontopodiõ Plinij aliud à Leontopodio Dioscoridis 90.a.p
Lepidij vsus ex Columella 51.a.m
Lepidium Pauli aliud à Lepidio Dioscoridis 51.a.p
λεπὶς diuersa à vitiligine alba E. 119. a.f
Libanotis frugifera Dioscoridis an à Theophrasti libanotide diuersa 63. b.m
Lichen ictericis non tantùm illinitur, sed etiam propinatur 81.a.m
Lichen nõ est muscus, sed quasi muscus 82.a.p
Linum Carpasium 122 b.m
Liquor cuiusuis plantæ nõ perpetuò sicco præferendus 64 a.m
Lithargyri materia, solum plumbum 113.a.m
Lithargyri veneni curandi scopi duo ibid.
Lixiuiorum genera venenatis ictibus accommodata 137.b.f
Locus diuersus stirpis efficacium auget minuitve 59.b.p
Loræ synonyma 105 b.m
Lucianus emendatur 16.a.m
Lupinorum sativorum & sylvestrium discrimen 41.a.m
Lychnidos synonyma ex Plinio 68. a.m
Lycium idem cum pyracantho 6.b.m
λύκιον aranei genus 31.b.m
λυσίμαχον seu λυσιμάχεια 89.a.p
Lysimachia duplex 76.b.f

M.

MAgnetis synonyma & thymoen 122.a.m
μαγνησίτης quid 64.b.m
Magydaris radix Lybica 115.b.m
de Malabathri sapore & odore Autorum discrepantes sententiæ 4.a.f
Malabathrum, folium simpliciter dictum 4.a.p
Malabathrum quid ibid.
Malabathri tres differentiæ 4.a.f
Mãdragora Theophrasto alia quam Dioscoridi 85.a.p
Mandragora vnde μανδραγόρας dicta 83. a.m
μανδραγόρου vnde dictum 63.b.p
Marcellus Virgilius notatur 63.a.m
Marmaritæ seu Marmacides populi Lybyæ 50.b.f
μάσιον quid 64.a.f
Mathiolus notatur 44.a.f 114.b.p
Medicorum malorum synonyma 23. b.f
μεθυσκόμος vaguétum vnde dictum 12. b.m
Mel Heraclium qua de causa exitiosum 37.a.m
Melanteria Galeno astringentia omnia tenuitate superat 117.b.p
de Melitæ terræ colore discrepantes sententiæ 124.a.p
Melita terra vnde dicta ibid.
μῆλον etiam malum arborem significat 90.b.p
Melanthium panibus potiùs inspergebatur quàm indebatur 64.a.m
de Menta contradictiones conciliatur 59.b.f
Meri potus, efficacissimum ad morsus viperæ remedium 139.b.m
Mespilorum genera Theophrasto & Plinio 24.a.m
Mesuæus à Dioscoride discrepat 97. b.m
Mesuæus notatur 100.b.m
μετανάστασις quid 9.b.f
μετασυγκριτικα remedia quid 60.a.p
Metasynctitica remedia 10.a.p
de Metopio discrepantes sententiæ 65.b.p
μετωπὶς varia significata 23.a.p
Metopium idem cum metopo Hipp. 12.b.f
Metretes duplex 101.b.m
Milium cur fotibus accommodatum 39.a.f
Millepedarum descriptio ex Galeno 30.b.m
Millepedarum synonyma tum Græca tum Latina 30.b.p
Minium à Cinnabari diuersum 115. a.p
Minium duplex 115.a.m
Minium factitium vnde ibid.
Minium natiuũ, est Cinnabaris fossilis 115.b.f
Minium secundarium 115.a.f
Misyos & chalcitidis discrimen 117. a.f
Mithridaticę antidoti descriptio 125. a.p
Moly describens Theophrastus à Dioscoride dissentit 68.a.m
Molybdæna & lithargyri discrimen 113.a.p
Molybdæna non ex auro argentóve gignitur ibid.
μολύβδαινα 112.b.f

μυρία eadem quæ ναρδοστάχυς 24.b.f
Moretum 28.a.f
de Moris Diphilus aliter sentit ac Dioscorides 24.b.f
Morochthus lapis cur μόλυβδος dictus 122.a.f
Mulli discerpti effectus 139.a.p
Mulsa cocta & crudę discrimen 106. a.p
Mus araneus non nisi præquam locum vicerat 139.a.f
Muscus marinus nō est corallina 87. b.f
Myrobalani Arabicæ descriptio à Dioscoride prætermissa, quàquam illi non erat ignota 21.b.m
de Myrobalani folio & fructu discrepantes sententiæ 97.b.m
Myrobalani non tantùm cortice, sed & carne vnguentarij vruntur ibid.
Myrobalanus Dioscoridis, ab Arabū myrobalano diuersa ibid.
Myrobalanus vtra præferenda, recens an vetusta 97.b.f
in Myrrhę electione dissentit Plinius à Dioscoride 15.b.m
Myrrha Minæa vnde dicta ibid.
μυρσίνη & μυρίκη discrimen 23.a.m
μυρσίνη varia significata ibid.
Myrti folia ad gangrænas vtilia E. 130.b.m
μυσσῶνες 48.a.m
μυξα quid 123.a.m

N.

NAphtha & Aphtha vnum & idē oleum significant 16 b.p
Nardi spicæ, radicibus annumerandę 2.b.m
νάρδος pro malabathro 27.a.f
νάρδος pro vnguento nardino 13 b.p
νεφθαμωμον quid E.131.b.m
Narticem à cherydro distinguit Lucanus 136.b.m
Narticis ictus remedia ex Paulo & Aëtio 140 b.p
Nerij synonyma 84.b.m
Nerion an hominibus perniciosum 86.b.m
Nicandri locus emendatur 70.a.f
Nitri spuma & flos res diuersæ 119. b.p.

O.

OChra Attica optima 134.b.f
ὀμφακίς color qui 1.b.m.70.b.f
Omni temperamentum 45 b.p
Oenagræ synonyma 89 b.p
Oenanthinum oleum ventrem minimè mollit contra Myrepsum 11. a.p
οἰνάγρα etymon 89.b.p
οἶνος ἀμπέλινος 39 b.f
οἶνος κοπτός, vinum lene 105 a.f
οἰνόπεπον 34 a.f
Oleum balaninum vnde paretur 9. b.m
Oleum ex oleæ germinibus 9.b.p
Oliuæ cōditaneæ quæ ratione ἀνθρωπίναι dicantur Dioſc. 21.a.m
ὀλύνθιοι 109.a.m
ὄλυνθοι vnde dictum 77.a.f
Olyram à zea distinguit Plinius cōtrà quàm Dioscorides & Galenus 93.a.m
ὄλπη χύτρα pro nouæ ollæ 14 b.m
ὀμφάκιον aliud à galla omphacitide 21. b.p
in Omphacomeli parando Autorū diuersitas 107.b.f
ὄνυμις 21.a.f
Ononidis sive anonidis epitheta 57. a.m
Onychinum vnguentum vnde dictum 12.a.p
Ophitæ lapidis genera tria 123 a.f
ex Opio collyria periculosa 53 b.p
ὄρυζα Plinius malè succum vertit 51.b.f
ὀρυζίτης 84.a.m
ὀσύριτις E.128.a.m.& b.m
Orchidis bulborum effectus diuersi quos ex causa 73.a.m
Oribasius à Dioscoride discrepat 99. a.m
Oribasij locus emendatur 16.a.f
ὀρμενὶς vox omnis generis 59.a.p
Oroborum pro ratione colorus discrepantes vires 40.b.m
Orobanche Theophr. à Dioscoridis orobanche diuersa 45.b.m
ὄσπρια quæ dicantur Gal. 53 b.m
ὄσπριον & σπέρμα discrimen 30.b.p
Othonnæ historia incerta 52.b.f
Ouorum penes coctura triplex differentia 31.b.p
ὀφιόχρις 101.a.m
Oxyacantha eadem cum pyracantha 24.a.p
ὀξύγαλον 106.a.m
Oxymelitis Galeni sal nullus addatur 106.b.m

P.

ΠΑλάθη quid 14.a.m
Palma ἐγκεφαλοειδὴς quid 22.a.m
Palmulæ Thebaicæ non sunt tamarindi 21.b.f
Palmyra Syriæ Metropolis 9.a.m
in Panace Asclepio describendo Autorum diuersitas 61.b.f
in Panace Chironio itidem Autorū diuersitas 62.a.p
in Panace Herculeo describēdo Autorum discrepantes sententiæ 61. a.f
Panis genera quinque 37.b.m. & deinceps.
Papauer Herculeum vnde dictum 83.b.f
Papauer μήκων vnde dictum 83.b.p
μήκωνος εἶναι qui 132.b.f
Papyri quæ pars mandi solita 18.a.m
Parthia regio Asiæ 138 b.m
de Parthenio variæ sententiæ 74.a.f
Pastinacæ radij vis malefica 135.a.f
Pastinacæ radij vius in dentium dolore 28.b.p
Pastinaca φάλαγξ vnde dicta 62.a.p
Pauli Interpretes notantur 46.b.f
Paulus Dioscoridi conciliatur 7.b.m
Pauli locus emendatur 33.b.p. 72. b.p. 75 b.p
Paulus excusatur 44.a.p
Paulinæ locus emendatur 107 a.p
in Pentaphyllo describendo Dioscorides à Theophrasto dissidet 82. b.p
πενταφύλλου ἐπιπλοκὴ χρόνου 115.a.f
Pentaphyllon non est fragaria 80. b.m
Pepli synonyma 99 b.f
Peplum flatus pellit, nedum flatus gignat 100.a.p
φερεκράτιον vnde dicta 83 a.p
Persea & Persica, arbores diuersæ 26. b.p
περσικὸν 40 a.m
Petronius Diodorus Plinio vnus & idem 1.a.m
Phalangiorum varia genera 134.b.m
φαλαγγὶς vnde dictum 128 b.p
Phaselus à phaseolo diuersus 97.a.f
φάσηλος quasi fascula 120.a.p
φασήολος & φάσηλος differunt 19.a.m
Philyræ seu philuræ E.130.a.m
φιλύρεος vinum, ἐνδρομὶς cognominatur in Geopon. 1.9.a.m
φλάμουρον 87. a.f
φοίνικος 126. a.p
Phu flores longè minores quàm narcissi 3.b.f
φοῦς, alga 88.a.f
φοῦς βρύον 88.b.p
φῶς, cerussa ad fucum præparata 113.b.m
φῶτος, semen filphij E.128.a.m.& b.m
φυσαλὶς seu vesicaria vnde dicta 84. a.f
φύσσων vnde dictum 60.b.f
φυτοσκόροδα varia 130.b.f
φυσσὸς & φύσσον discrimen 35.a.p
Pineis nucleis ingenita vis conciliādæ Veneris, seminis cucumeris & succi Portulacæ admixtione retunditur E.134.a.f
de Piperis albi & nigri viribus discrepantes Veterum sententiæ 49. a.p
Piperis spica E.133.a.m
Piperis trium generum fructus diuersi contra veterum sententiam 49.a.p
πιτυοκάμπη synonyma 16.a.m
Pityusæ dotis varia 99.b.m
Pix Brutia 16.a.m
Plantæ imperfectæ quæ 126 a.p
Plantarum quæ primaria genera 125. b.f
πλατυφύλλου 84 b.f
Plinij locus suspectus 8.b.p. 86 b.p. 99 a.f
Plinius abstersor vindicatur 116. b.m
Plinius clematidem daphnoidē cum chamædaphne confundit 94.a.m
Plinius à contradictione vindicatur 110 a.f
Plinius à Dioscoride dissidet 2.p.1 a.f.& b.m.6.a.p & m. 6 b.m.7.b.p. 28. b.f.34.b.m.48.b.p.50.a.p.50.b.p. 51.a.m.60.b.p. 63 b.f.64 b.m.67 b. f.70 b.m.71 a.f.73.a f.75.a.p.76.a. p.77 b.f.78.b.m.80 a.p.81 b.f.83 a. m.f. 92. b.p.m.93.a.p.f & b.p.f 97 b.f.98 a.m & b.p.f.99 b.m.101 a.f.103.a.p. & b.f.104.a.m & f.105 b.f.107 b.p. & f.109.a.p.110.b m.114.b.m. 117. b.m.120 a.m
Plinius Dioscoridi conciliatur 54.a. m.70.b p.78 b.f.79 a.m
Plinius in Aristolochiæ clematitis viribus à Dioscoride simul & Galeno dissidet 54.b.p
Plinius in Bunij viribus sibi ipse cōtradicit 90.b.p
Plinius parum sibi constans 94.a.p
Plinius pugnantia scribit 97.b.p
Plinius rectiùs sensit quàm Dioscorides 118.a.p
Plinius emendatur 6.a.f & b.f.10.a. p.m 11.a.m.16 b.m 20.b.m.21.b.f. 37 a.f.41.a.m.51.a.f 54 a.m. & b.m. 61.a.p.63 a.f.64.a.m. & b.m.67 a. m.68.a.m.& b.f.70 b.m.71.b.f 74. a.f. & b.p.m 76 b.p. 77.b.m.f. 78. b.m.79. a.f. 81.b p.83. b.m.85. a f.

86.a.m.87.b.p. 89.b.m. 90.b.p. 94.
a.p. & b.p. 98. a.p. 101. a. p. & b.f.
102.a.f.& b.m.105 a.p.108.a.p. 108.
a.p.& m.109.a.m.110.a.p.111.a.m.
113.b p.115.a.m. 118.a.f.120. a.p.&
b.p.m.122.a.f.& b.p
Plinius notatur 18.a.f 19.a p m & f.
20.a.m.23 b.m. 24.b m 25.b.m.26.
a.p. 27.a.m.35.a.p. 36.b.f.39.
b.m.41 b.p 43.b.f 44.b m.48.b.m.
50.b.p.56 b.f.60.a m. 66.b.m. 68.
a.m & b m f 69.a.m. 70.a.m. 70.
b f 71.a.m. 72.a p.& m & b.f. 71.a.
m.& b p.74.a f.& b.m 76 b. f. 77.
b.m.78.b.p & f 79.a.m.& b.p 80.a.
p & b m 81 a.f.84.a.p & b.m 86 a.
m.87 a.m & b.m.f 90 b p & f 91.
b.f.96.b.m.99.a.f.100.b.m.101.a.p.
102.b m.104.b.m. 105.a.p.108.b.m.
111. b.p. 112.b.p. & m.115.b.p. & f.
116.b.f 119.b.m.120.b.p.121.a.m. &
f item b m.122.a.m.
Plumbum caua explet contra Dioſcoridem 112.a.f
Plumbum cur lauetur ibid.
Plumbum non aſtringit cõtra Dioſcoridem 112.a m
Prigitis terra vnde dicta 124.a p
Polenta ἄλφιτα quid 38.b.m
Pollux reſtituitur 64.b m
Polygala herba quæ 93.a.p
Polypodium bilem nigram trahit 103.b.m
φοῖνιξ fructus palmæ 41.b.m
Pompholyx cruſtas non inducit 110. b.m
Pompholyx ſpodio præſtantior 110. b.p
Ponticum eſt abſinthium, quo pingueſcunt pecora 58.a.m
πεπλίδιον ἀφόρητον 34.a.m
Portulaca ſylueſtris Plinio valet ad reſtinguendum hęmorrhoi & præſteris venenum 140.a.m
Potenum cur οἰνίτης dictum 56 b.f
Præcoqua ab Armeniacis diſtinguit Galenus 23.b.f
Præputij deligatio ſanguinis profluuia cohibet E.131.a.p
Prætutianus ager 105. b.p
πρασιὰ 78 b.m
Preſter cum dipſade idem 136 a.f
πρηστήριος 80.a.f
πρηστικὸν ὄμμα quæ dicantur 72.a.p
Prunorum Damaſcenorum vis 24. b.p
ψαμμώνιος idem cum ἀμμοχάρις 123. b p
Pſeudanchuſa eadem cum echio 79. b.p
ψίλωσις etiam ſiccare ſignificat 10.b.a
Ptiſanæ vires 38.a.m
πτισάνιον vnde dicta 38 a.f
Pullorum diſciſſorum venenatis ictibus adhibitorum effectus 137. b f
Pumice addito eorum quæ feruent feruor reſtinguitur 118.b.m
Punicorum pro ſaporum differentia facultas diuerſa 22.b.p
πυξὶνος nardi montanæ radix E.134. b.f
πυρῆνες ἡμεροι non tantùm Punici nucleos, ſed etiam ipſos acinos ſignificant 22.b.m
πυρὸς ἄκανθα 50.b.m
Pyrites lapis duplex 121.b p
πυρὸς pro pyrethro E.135.a.p

R.

Rabidi canis indicia 131.a m
ῥάφανος pro braſſica 41 b p
Rha Ponticum & Barbaricum eiuſdem ſunt generis radices 54 a.p
Rha Ponticum vnde dictum 53 b.f
Reſina cur dicta crapula 108 a m
Reſina pinea quæ ratione Salamandræ veneno reſiſtat 116.b.m
in Reſinarum electione Galenus à Dioſcoride diſſidet 15.b p
ῥόδινον ψῦδρον μύρον 16.b.m
Ricini foliorum μετεωρισμὸς 98. b.f
Ricini granorum doſis ibid.
Ricino abundant Ægyptij 9.b m
Ricinus an ſit in arborum genere 98. b.m
ῥίζαι 10.b.f
ῥιζοτυμίαι duplex 74.b f
Ruellius notatur 2.b.f.56.b. m. 98. a.p
Rubeta diuerſa à rana paluſtri 132. a m
Rubeta duplex ibid.
Rhus culinarius & coriarius eiuſdem fruticis diuerſæ partes 21 b.p
Rutæ & fici συκοβόλα 60.b.m
Rutæ ſemen contra ictus virulentos efficaciſſimum remedium 139.b.f

S.

Saccharum Arriano μέλι ἀφρῶδες 37.a.f
de Sagapeni planta diſcrepantes ſententiæ 64.b.f
Salamandræ vſus in pſilothris 32. b.m
Salamandra ignem non ita reſtinguit, quin & ipſa tandem vratur 32.b p
Sal Ammoniacus vnde dictus 118. b m
Salicis ſemen verùs eſt flos Theophraſto 21.a.p
Salicis ſuccj duo genera 21 a.m
Salis flos priùs extenuat potiùs quam inalbat 119.b p
Salis marini & foſſilis differentia 119.a.p
Salis ſpumæ cum ſale collatio 119. a. m
Salix ἀλικακάβη cur dicta 21.a.p
Sal Tartarus à Tarta lacu dictus 118. b.f
Sambuci acini maturi nigreſcunt 100.b f
Sampſuchinum & amaracinum vnguenta diuerſa 12 b.p
Sampſuchum idem cum amaraco 12.a.f
Sandaracharæ varia genera 126.a.m
Sandyx quid & vnde fiat 113.b.m
Sanicula fœmina elleborum nigrum Dioſcoridis 94 b m
Sãonium abſinthium vnde dictum 58.a.f
de Sarcocollæ ſapore & cõlore differentes ſententiæ 66.a f
σάρξ pro cute extima 8.b.f
Scãmoniæ ſuccus ſolus vtilis Theophraſto 100.b.p
Scammonij doſis apud varios varia 100.a.f
σκορπίος 15.a.f
σκόλοψ & σκῶλος diuerſa 6.a p
σκῶλος pro tunco paluſtri ibid.
Scinci potu incitata Venus lentis decocto remittitur E.134.a.p
Scelerata herba 51.a.f
de Scillæ maceratione ad conficiendum acetum ſcillitieum diſcrepantes ſententiæ 107.a.f
Scillæ ſegmenta in vmbra ſiccanda 107.b m
de Scillæ temperamento diſcrepantes Autorum ſententiæ 50.b p
σκόμβρος ſynonyma E 128 b.p
σκόμβρος quid E.133.b.f
Scolopendræ vtriuſque morſus venenatus, ſed haud plane ſimilia ſymptomata 135.a.p
σκουδαλόεις vox vnde ducta 47 b.m
Scorpionis aculeus, dens etiã dictus 2.a m
Scorpionis ictus pro ictarum partiũ varietate varia ſymptomata 135. a m
Scorpionum genera Nicandro octo: Æliano nouem ibid.
Scorpij nomine Theophraſtus aconitum σκορπίον intelligit 104.a.p
Scytale non eadem quæ amphiſbæna 135.b.m
Sedi tertium genus idem cum agreſti portulaca 87.a.f
Selenitæ lapidis ſynonyma & etymõ 122.b.f
Serapio notatur 41.b.f.93.b.m.99.a. f.112.b.m
Seſamoides Dioſcoridis an helleborine Theophraſti 95.a.f
Seſeli quando paſcantur ceruæ 61. a.m
Sicyonium oleum vnde dictum 9. a.p
σίκυος vnde dictus 44.b m
Siligo 37.b.p.& f
σιλλίβαμμα pro ricino 98.b.p
σίμωνος & σίμωνι idem 29.a m
σίμωνος 56.b.f
Simonianum trifolium vnde denominatum 69.b m
σίμωνος etymon 48.b p
Sinopidis genera tria 116.b.p
σὶς χαμαιδρυὸς ſeu χαμαιδρὺς 31.b.f
σὶς & ſerpentis ſpecies & lacertæ 107.a.m
σκιλλητικὸν ὄξος 13.b.p
σίνηπι vox quid ſignificet 13.a.f
σινήπεως ἔρνος 19.b.p
σινηπεῶδες & σινηπώδη diuerſa ſignificant 93.a.p
Smilacis hortenſis fructus σμίλαξ ſeu σμίλακος 46.a.m
Smilax læuis alia ab hortenſi 93. b p
Smilax Arcadica à taxo diuerſa 86. a.f
Smyrnium ab odore myrrhæ dictum 63.a.f
Soli vrbs Cypri 110.a m
Solinus notatur 18 b.p.115.b.p
Sonchus tertius Dioſcoridi 44.a.m
Spartium cur non videatur eſſe geniſta 97.a.m
Spartium triplex ibid.
Spicata ſemina 76.b.m
σπαλίσιμος 32.b.m
Spina Arabica etiam Ægyptia dicta Galeno 56 b.p
Spongiarum lapidibus Galenus vim comminuendi veſicæ calculi denegat 123.a.f
Spongiarum tria genera 120.b.m
Squamæ æris duo genera 121. b.p
Squamæ ferri duo genera ibid.

πάχη 39.b.f
στάχυς & spicæ significata 2.a.f
στάχυς quid 76 b m
Staphis agria non est vua taminia 96 b.p
στέμμα αἷμα τῆ ῥιζοτόμῳ 48.b.m.112.b m
στέφανος significatum 26 a.p
στέφανος & στεμμὰς discrimen 35 a.p
στυφόω significata 23 b.p
Stercus gallinaceum contra fungos efficax 129.b.p
Stibij synonyma 111 b.m
Stœchades insulæ ab ordine sic dictæ 58.b.f
στόλος eadem cum phleo 77.b.p
στόμωμα quid 11.a.f
Strabonis locus restituitur 16 a.m
Stratiotem aquaticam radice carere fabulosum 88.b m
Strobili significata 15.a.m. 104.a.f
στροβίλια synonyma 15.a.m
στρυχνὸς 34 b p
Styracinum vnguentum 11 b.f
στύφει καταπότιον vnde dictus 14.a.p
Styrax pallidus præfertur Galeno 13. b.f
in Suctione venenati vulneris adhibenda cautio 137 b m
Susini olei synonyma 11.b.p
Susinum oleum clariùs à Paulo describitur ibid.
Susinum oleum vnde dictum ibid.
Sycomori fructus circa scalpturam non matureſcit 25.b.p
συκομόρου etymologia diuersa 25.a.m
συμπάσχειν 77.a.m
Syriacus lapis idem qui Iudaicus 122.b.p
Syricum quid 123.b.m
συφορμὶς 25.b.f
Syropicum Plinio quid 123.b.m

T.

TAurino sanguine poto non nisi post aceti vsum tentandus vomitus 130.a.m
de Tazi baccis discrepantes sententiæ 86.a.f
Tazi vmbra quando lethalis 86.b.p
Θάσια ῥίζα pro amygdalis 103 b.f
Telini olei discrepantes descriptiones 11.a.p
τερμινθίνη 119.a.p
Θαψία seu Θαψὶς 103.b.f
Θαψὶς 9.a.f
Thapsia τραγία cognominata Nicandro 96.b.f
Theophrastus cum Dioscoride conciliatur 84.a.m
Theophrastus Dioscoridem illustrat 89.a.f
Theophrastus emendatur 8.a.m.18. b.m.51.a.m.72.b p.72.b.f. 73.a.f.75. b p.83 b.m. 90.a.m. 97.a.p. 101.b.f. 116.a.f
Θηριακὰ ἀπὸ τῶ ἐπιθέματος 36. a.p
Theriaci tractatus Dioscoridis varia distinctio 137.a.f
Θηριακὸν ὄξος 89.b m
Θὶς seu Θοὶς, vipera 135.b p
Θοάσιος vnde dictum 48.b.p
Thracij lapidis vis mirabilis 122.a.p
Θυμίαμα in genere ammoniaci 66. a.m
de Thuris manna vi Galenus à Dioscoride dissentit 14.b.m
Thus astringendi vi præditum necne sit 14.a.f
Thus ἰσχάδιον vnde dictum 14.a.m
Thyina ligna 8.a.f
Thymbra non eadem cum satureia 60.a.m
in Tithymalo paralio describendo discrepantes sententiæ 99 b.m
in Tithymalorum cognominibus & natalibus Plinius à Dioscoride discrepat 99.a.p
Tithymalorũ genera tria Theophr. ibid.
Tmolus Lydiæ mons 65.b.m
τοξικὸν quid & vnde dictum 118.b.f
Tragopogonis nomen vnde inditum 45.b.f
Tragus cerealis à farre factitio distinguitur 53.b.p
Tragus è quibus parari solitus 53. b.m
Tragus notatur 104.a.m
Tragus Plinij scorpius est Theophrasti, à Dioscoride discrepans 81.a.f
Tragus τράγος de suo ibid.
Tribuli terrestris duo genera 78. a.m
Trifolij bituminosi synonyma & eorum origo 69.a.m
è Trifolio bituminoso fotus in ictibus virulenti s diu multúmque cõtinuandus 139.b.m
Trifolium acetosum 8.133. a.m
Tritici genera 37.b.p
τρόμος significata 86.b.m
Tubera quale præbeant alimentum 46.a.m
Tuber, terræ callus Theophrasto & Plinio ibid.

V.

VEratrum quam ætatem ferat 1. a.f
in Verbaci differentiis distinguendis Plinius à Dioscoride discrepat 88.b.m
Vetonica triplex 76.a.m
Vina pithia & melampsithia vnde dicta 105. a.m
Vina θαλάσσια & ἀθάλασσα quæ 105. a.p
Viperæ maris quàm fœminæ morsus an perniciosior 135.b.m
Viperæ vtriusque morsus ex vulneris vestigiis distinguitur ibid.
Viperarum vtrumque amputandarum ratio 27.b.f
Vipera sexu distinguitur 135.b.p
Viperina caro pediculos gignit 28. a.p
Visci varia nomina 66.b.f
Viscus vnde gignatur ibid.
de Viticis facultate discrepantes sententiæ 20. b.m
Viticis virga vinitoribus vtilis 8.131. a.f
Vitruuius emendatur 115.a.f
Vnedo ab arbuto diuersa 29 b m
Vnguentis alia ad spissamentum, alia ad odorem, alia ad crassamentum, alia ad conseruationem adiiciuntur 19.b.m
Vnguentum myrtinum discrepans à Dioscorideo 10.a.m
Vngues ferrei 6.b.m.25.b.p
Vrtica an profluuiũ sanguinis è naribus sistat 87.b.m

X.

Χαμαιδρυὶς 37.a.p
χόλος varia significata 13.a.p

Z.

ZEa semen Plinio 39.a.p
de Zingiberis historia discrepãtes sententiæ 49.a.m
Zingiber μύρρα myrrha serpenumerò transcripsêre, librarij notæ similitudine decepti 13. a.m
Zythi præparatio 58.b.m

BIBLIOTECA NAZ. ROMA

S.N. IV. 6

Digitized by Google